Taller de encuadernaciones y fábrica de rayados de J. R. Gilabert Málaga.

La Puntualidad.
Málaga: *Pasaje de Larios, Puerta del Mar.*
Se encuaderna de todas clases.—Se forran, encuadran y charolan mapas y vistas.—Se hacen carteras y estuches.—Se dora papel, tarjetas, etc.

ENCICLOPEDIA

DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA.

FORMULARIO UNIVERSAL

O

GUIA PRACTICA

DEL MEDICO, DEL CIRUJANO

Y DEL FARMACEUTICO.

POR

DON FRANCISCO ALVAREZ ALCALÁ,

Dr. en Medicina y Cirujía.

SEGUNDA EDICION

enteramente refundida y aumentada.

TOMO III.

MADRID: 1850.

Librería de Don Angel Calleja, Editor.

LIMA:

CASA DE LOS SRES. CALLEJA, OJEA Y COMPAÑIA.



IMPRENTA DE DON ALEJANDRO GOMEZ FUENTENEBRO

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA



CONTINUACION

DE LA

PARTE TERCERA.

LAPICEROS.

3140. LAPICEROS DERMOGRÁFICOS (*Pirlas*).

℥ Manteca.	1
Trementina de Venecia.	2
Cera.	3
Negro de humo.	c. s.

Se funde, se agita y se malaxa con una espátula, añadiendo poco á poco el negro de humo hasta que tenga la consistencia poco blanda. En seguida se aparta todo del fuego y se agita hasta que se enfrie. Se da á la masa la figura de lapicero.

Para quitar las líneas trazadas con este lapicero, basta frotar ligeramente la parte con un lienzo empapado en esencia de trementina.

Si se quiere obtener un lapicero que dure menos y se borre á un simple frote, se reemplazará la trementina con jabon comun, y se pondrá partes iguales de cera; finalmente si se quiere que sea rojo, se pondrá cinabrio ó bióxido de mercurio (precipitado roja) en lugar del negro de humo.

3141. *Otro*, n. 2.

℥ Colofonia.	ʒxc (15 gr.).
Estearina.	ʒj (4 gr.).
Cera.	ʒß (2 gr.).
Negro de humo.	c. s.

Se funde, se agita y se malaxa con una espátula, añadiendo un poco de negro de humo, basta que tenga una consistencia un poco blanda; despues se la vierte en moldes para formar lapiceros y se deja enfriar.

Esta fórmula es mas conveniente en estio, porque la anterior se ablanda con facilidad con el calor.

3142. L. DE NITRATO DE PLATA Y POTASA (*Cadet de Gassicourt*).

Se mezcla el nitrato de plata con el de potasa, se los funde en un crisol de plata ó platino, se agita de cuando en cuando la mezcla con una barrita de vidrio, y apenas esté fundido se le echa en una rielera calentada antes y cubierta de sebo para que no se pegue el nitrato de plata. Cuando se ha fundido el nitrato se abre la rielera, se sacan los cilindros y se los guarda en una caja.

Se preparan en la proporcion de $^1/_{12}$, $^1/_{8}$ ó $^1/_{6}$ de nitrato de plata, y se aconsejan para cauterizar la

conjuntiva en lugar del nitrato de plata en los casos en que existan granulaciones vasculares pálidas ó cartilaginosas. Se emplean en los casos en que el sulfato de cobre es insuficiente, y cuando el nitrato de plata determina accidentes graves.

LÁUDANOS.

3443. LÁUDANO CIDONIADO (*Vanhelmont*).

℞ Opio en bruto en polvo. . . . . ℥jv (125 gr.).
Zumo de membrillos reciente. . . . . ℔jv (2000 gr.).

Se digiere durante tres semanas y se añade entonces:

Clavo machacado,
Nuez moscada machacada, ãã. . . . ℥j (30 gr.).

Se calienta ligeramente, se digiere despues de nuevo durante ocho dias y se añade:

Azafran. . . . . ℥j (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . ℥jv (125 gr.).

Cuando el azúcar esté disuelta y el azafran bien infundido durante veinticuatro horas, se filtra; despues se evapora el líquido en el baño maría hasta que se reduzca al tercio de la cantidad.

D. Diez gotas de esta tintura contienen ℊj (5 cent.) de opio.

3444. L. CINABARINO ó *Extracto de opio cinabarino* (F. E.).

℞ Extr. acuoso de opio. . 5vj (24 gr.).
Azafran pulverizado,
Cinabrio nativo levigado, ãã. . . . . 5iij (12 gr.).

Se hace una masa con un poco de agua, y se forman pastillas ó cilindros que se secan y guardan.

3445. L. DE FORD.

℞ Opio. . . . . ℥j (30 gr.).
Canela,
Clavo, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Espíritu de vino,
Agua, ãã. . . . . ℔ß (250 gr.).

Se macera durante tres semanas y se filtra.

D. Doce gotas en una pocion.

3446. L. LÍQUIDO DE SYDENHAM ó *Tintura vinosa de opio de Sydenham* (F. E.).

℞ Opio escogido partido en pedazos. ℥ij (60 gr.).
Azafran. . . . . ℥j (30 gr.).
Canela. . . . . ℥j (4 gr.).
Clavo en polvo. . . 3j (4 gr.).
Vino blanco bueno. ℥xviij (560 gr.).

Se contunden las sustancias y se ponen á digerir en el vino durante un mes en un matraz de vidrio, se cuela y se guarda en un frasco bien tapado.

D. Seis gotas á ℥j (12 dec.).

3447. VINO DE OPIO COMPUESTO ó *Láudano líquido de Sydenham* (F. F. Y F. P.).

℞ Opio escogido cortado en pedazos. . . . . ℥ij (64 gr.).
Azafran partido. . . . ℥j (32 gr.).
Canela quebrantada. . ℥j (4 gr.).
Clavo de especia. . . . 5j (4 gr.).
Vino de Málaga. . . . . ℔j (500 gr.).

Se pone todo en un matraz, se macera por quince dias, se cuela con expresion y se filtra.

Veinte gotas de este medicamento pesan quince granos, y representan ℊj (5 cent.) de extracto gomoso de opio.

Este vino que ha tenido gran reputacion, ha sido preconizado principalmente por Sydenham, quien le administraba en las enfermedades graves acompañadas de postracion, y en las viruelas cuya erupcion creia favorecer por su accion estimulante. En el dia, á pesar de las sustancias estimulantes de que se compone, todos están conformes en que el opio es su parte esencial.

Es uno de los medicamentos que mas se usa, ya interiormente ya exteriormente, en los casos en que conviene el opio. Se usa para detener las diarreas serosas crónicas, en el cólera y en las afecciones del estómago y de los intestinos en que conviene unir los tónicos y los sedantes. Se usa además en casi todas las enfermedades, á saber: en las manchas de la córnea, oftalmias, reumatismos, gastralgias, é interiormente en casi todas las flegmasias y neuralgias.

Entra en algunas lavativas y sirve para rociar diversas cataplasmas narcóticas y calmantes, que se prescriben unas y otras contra la diarrea, disenteria, ciertos cólicos, etc. Se administra puro interiormente, á la dosis de cuatro á ocho gotas que progresivamente se aumentan hasta quince ó veinte, las cuales equivalen á ℊj (5 cent.) de extracto acuoso de opio. Finalmente, tambien se usa algunas veces mezclado con agua contra ciertas oftalmias, instilándole entre los párpados.

3448. VINO DE OPIO DE LALOUETTE *ó Láudano de Lalouette.*

℞ Extr. acético de opio. ℥vj (24 gr.).
Vino de España. . . . . ℥x (320 gr.).
Aguardiente. . . . . ℥ij (64 gr.)

I. Conviene en casi todas las flegmasias é inflamaciones. *D.* ℊvj (3 dec.) á ℨß (2 gr.).

3449. LÁUDANO Ú OPIO DE ROUSSEAU, *Vino de opio obtenido por fermentacion* (F. F. Y F. P.).

℞ Opio escogido. . . . . ℥jv (125 gr.).
Miel blanca. . . . . ℥xij (375 gr.).
Agua caliente. Ibiij y ℥xij (1875 gr.).
Levadura de cerveza fresca. . . . . ℥ij (8 gr.).

Se deslien separadamente la miel y el opio en el agua caliente, se mezclan los líquidos, se les añade la levadura de cerveza y se dejan en digestion durante un mes cuando menos en un sitio en que la temperatura tenga cerca de 30° hasta que concluya la fermentacion. Se cuela con expresion, se filtra y se destila al calor del baño maría para extraer Ibj (500 gr.) de líquido alcohólico que se destilará de nuevo para obtener ℥xij (375 gr.), las cuales se reducirán á ℥jvß (141 gr.) por una tercera destilacion. Por separado se toma el líquido que forma el residuo de la primera destilacion y se le evapora en el baño maría hasta que pese ℥x (320 gr.); se le añade el alcohol opiado, se mezcla exactamente, se filtra si es necesario y se guarda.

Veinte gotas de este láudano corresponden á cerca de ℊijß (12 cent.) de extracto de opio.

Se usa comunmente como calmante, y se ha pretendido que no posee las propiedades excitantes de las demás preparaciones de opio.

I. Tiene las mismas propiedades que el láudano de Sydenham, aunque mas considerables por contener en proporcion mayor cantidad de opio. La dosis debe ser de dos á ocho gotas.

Se le usa en instilaciones en el ojo á la dosis de algunas gotas para moderar los dolores ocasionados por una inflamacion viva. Este láudano se emplea tambien para cubrir las cataplasmas emolientes y hacerlas sedantes.

3450. L. OPIADO *ó Extracto de opio azafranado* (F. E.).

℞ Ext. acuoso de opio. . ℥ij (60 gr.).
Azafran. . . . . ℥j (30 gr.).
Madre de perlas,
Jacintos orientales,
Corales, ãã. . . . . ℥jß (6 gr.).
Tierra sellada. . . . . ℥j (4 gr.).

Piedra bezoar. . . . . ℥jv (48 dec.).
Rasuras de cuerno de ciervo. . . . . ℥ij (24 dec.).

Se pulverizan sutilmente estas sustancias, y con un poco de agua se hace masa que se divide en trociscos que se guardan despues de secos.

D. ℊjv (2 dec.). No se usa.

3451. L. SIMPLE *ó Extracto acuoso de opio* (F. E.).

℞ Opio partido en pedacitos. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol añadiendo poco á poco suficiente cantidad de agua fria, se pone en digestion en un paraje caliente hasta que se disuelva perfectamente la parte extractiva, se cuela el licor y se evapora en baño de agua hasta la sequedad.

D. Hasta ℊij (1 dec.).

3452. L. URINARIO *ó Extracto de opio con regaliz* (F. E.).

℞ Extracto de regaliz. ℥iij (96 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ij (8 gr.).
Azafran. . . . . ℥viij (20,6 gr.).
Alquequenge, Trementina, ää. . . ℥j (32 gr.).
Goma tragacanto, Almáciga, ää. . . . ℥j (4 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℥ß (16 gr.).

Se mezclan los extractos en un almirez con un poco de agua hasta formar una masa de consistencia de miel, despues se añade la trementina y se pista hasta que se mezcle bien; últimamente se añaden las demás sustancias pulverizadas, machacando y revolviendo la masa hasta que se presente homogénea, y se forman trociscos que se guardan.

D. Hasta ℥j (12 dec.).

LAVATIVAS.

3453. LAVATIVA DE ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton tiglio. . . . . ℊiij (15 cent.).
Goma arábiga. . . . ℥jß (6 gr.).
Cocimiento de sen. . ℔j (500 gr.).

I. Estreñimiento, cólico saturnino, hidropesía pasiva, ascitis, helmintiasis, gastralgia, angina, tétanos, conjuntivitis. *D.* Para dos lavativas.

3454. L. DE ACEITE DE OPIO.

℞ Aceite de olivas. . . . ℥jv (125 gr.).
Tintura de opio. . . . 40 á 60 gotas.

M. I. Afecciones espasmódicas del cuello de la vejiga y sensacion molesta de la glándula próstata en la gonorrea. *D.* En inyeccion.

3455. L. DE ACEITE DE RICINO.

℞ Aceite de ricino. . . . ℥jß (45 gr.).
Cocim. de malvabisco. ℥x (300 gr.).
H. S. A.

3456. L. DE ACEITE DE RICINO (H. DE INGL.).

℞ Aceite de ricino. Miel comun, ää. . . . ℥j (30 gr.).
Cocimiento de harina de avena mondada. ℥x (300 gr.).

I. Se usa como vermífugo.

3457. L. DE ACEITE DE TÁRTAGOS.

℞ Aceite de tártagos. . . ℊxviij (1 gr.).
Cocim. de mercurial. ℔j (500 gr.).
Almidon. . . . . ℊxc (5 gr.).

I. Estreñimiento, cólico saturnino, hidropesía, ascitis, asfixia, asma, angina, conjuntivitis, acne. *D.* Para dos lavativas por la mañana.

3458. L. ACEITOSA.

℞ Aceite comun. . . . ℥ij (60 gr.).
Cocim. de malvabisco. ℥jx (270 gr.).
Miel. . . . . ℥j (30 gr.).

M. Si se juzga necesario, se puede añadir ʒß (15 gr.) de sulfato de sosa y sal comun.

3459. L. ACEITOSA (H. DE L.).

℞ Lavativa emoliente. . . número 1.
Aceite blanco. . . . . ʒij (60 gr.).
Mézclese.

3460. L. ACETOSA.

℞ Cocim. emoliente. . . ʒvj (180 gr.).
Vinagre. . . . . ʒj, ʒij ó ʒiij (30, 60 ó 90 gr.).

Se puede sustituir el agua pura ó el cocimiento de avena por el cocimiento emoliente, á las mismas dosis segun las indicaciones.

I. Ileo, estreñimiento rebelde, apoplejía.

3461. L. DE ACETATO DE MORFINA (*Bally*).

℞ Almidon. . . . . ʒijß (10 gr.).
Se diluye en
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Se añade:
Acetato de morfina. . gj (5 cent.).

Se la aconseja en las diarreas.

3462. L. ACÉTICA (*Frank*).

℞ Vinagre. . . . . ʒjv (16 gr.).
Agua. . . . . lbjß (750 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas.

3463. L. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar. . . . . ʒß á ʒij (2 á 8 gr.).
Yema de huevo. número 1.
Agua tibia. . . . lbj (500 gr.).
M. S. A.

3464. *Otra* (F. DE L.).

℞ Acíbar. . . . . ʒij (21 dec.).
Carbonato de potasa. ʒxv (75 cent.).
Cocim. de cebada . . lbj (500 gr.).
M. S. A.

3465. L. DE ADORMIDERAS *ó Lavativa calmante.*

℞ Cabezas de adormid. . número 1.
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).

Se abre la cabeza de la adormidera y se sacan las semillas, se la parte en pedazos, se echa encima el agua hirviendo, se deja infundir por dos horas y se cuela.

I. Se usa para combatir las diarreas ligeras.

Nota. Si á esta fórmula se añade ʒj (30 gr.) de almidon, se tiene la *lavativa de adormideras y almidon.*

3466. L. DE ALBAVALDE (*Devergie*).

℞ Acetato de plomo. . . . ʒij (1 dec.).
Carbonato de sosa. . . ʒj (5 cent.).

Se disuelven separadamente en un poco de agua, se vierten las soluciones en lbß (250 gr.) de cocimiento de lino y se añaden hasta cuatro gotas de láudano de Rousseau.

Se usa para calmar la diarrea de los tísicos.

3467. L. ALCANFORADA.

℞ Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).
Yema de huevo. . . número 1.
Cocim. de malvab. . lbij (1000 gr.).

M. I. Calenturas con adinamia, dolores neurálgicos, dismenorrea, etc.

3468. *Otra*, n. 2.

℞ Cocimiento de simiente de lino. . . . . lbj (500 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.)

Se divide el alcanfor por medio de un poco de yema de huevo y se diluye en el cocimiento de lino.

I. Dolores neurálgicos, dismenorrea.

3469. L. ALCANFORADA (H. M.).

℞ Infus. de manzanilla. ʒxij (375 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).
M. S. A. *I.* Irritacion inflamatoria de la vejiga de la orina y de la uretra. *D.* Para dos lavativas.

3470. L. DE ALMIDON *ó Enema de almidon* (H. DE M.).

℞ Cocimiento de arroz. ℥xij (375 gr.).
Almidon. . . . . ℥ß (15 gr.).

Se deslie el almidon en un poco de agua y se mezcla con el cocimiento de arroz caliente.

I. Irritaciones de los intestinos gruesos y particularmente del recto.

3471. L. DE ALMIDON Y DE ACETATO DE MORFINA, *ó Lavativa amilácea narcótica* (*Bally*).

℞ Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Almidon. . . . . ℥j (4 gr.).
Acetato de morfina . . ℊj (5 cent.).

M. S. A. *I.* Flujos crónicos de los intestinos.

Nota. Debe retenerse esta lavativa el mayor tiempo posible.

3472. L. CON ALMIZCLE.

℞ Almizcle. . . . . ℊxviij (1 gr.).

Se diluye en media yema de huevo y se añade:

Cocimiento de lino. . . lbß (250 gr.).

Añadiendo á esta lavativa 3ß (2 gr.) de alcanfor, se tiene la *lavativa moscada alcanforada.*

I. Priapismo, angina, cólera, vólvulo, cardialgia. *D.* Una lavativa.

3473. L. ALOETICA (*Clarck*).

℞ Acíbar en polvo. . . . ℥j (4 gr.).

Se disuelve en

Cocimiento de avena. . . ℥x (300 gr.).

Se usa contra las ascárides y para excitar las hemorroides.

3474. L. ALOETICA SALINA.

℞ Acíbar en polvo. . . . ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

Se trituran y se añade poco á poco:

Leche de vacas. . . . . ℥vj (200 gr.).
Cloruro de sodio. . . . ℥j (30 gr.).

I. Coriza, angina, aftas, asma, apoplejía, encefalitis, cefalalgia, esplenitis, plétora, pleuresía, convalecencia, tétanos, conjuntivitis, gastritis, hipocondría, histérico, ascárides vermiculares, partos laboriosos. *D.* Para dos medias lavativas.

3475. L. ANALÉPTICA.

℞ Yema de huevo. . . . . número 1.
Salep. . . . . ℥j (12 dec.).
Caldo de carne sin sal. ℥jv (125 gr.).

Radius indica otra fórmula, en que se reemplaza el salep por medio vaso de vino generoso.

3476. L. ANODINA.

℞ Opio. . . . . ℊj (5 cent.).
Goma arábiga. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua de menta pip. . ℥jv (125 gr.).

Se hace emulsion y se añade:

Agua destilada de almendras amargas. ℥j (4 gr.).

I. Es útil en el cólera.

3477. *Otra*, n. 2.

℞ Cocim. de malvabisco ó salvado . . . . . lbj (500 gr.).
Extr. gomoso de opio. ℊj (5 cent.).

M. S. A. *I.* Cólera, flegmasía gastro-intestinal, partos dolorosos, aborto, catarro útero vaginal, cálculos, cuerpos extraños, blenorragia, metritis, angina, aftas, encefalitis, gastralgia, gastritis, hepatitis, atrofia mesentérica, esplenalgia, cólicos, diarrea, disenteria, histérico, nefritis, vólvulo, dentición difícil, convalecencias. *D.* En dos lavativas.

3478. L. ANODINA DE ALMIDON (F. E.).

℞ Almidon. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se mezcla y se cuece hasta que se disuelva el almidon, y cuando el líquido está frío se le mezclan dos yemas de huevo.

I. Calma la irritacion y los dolores de vientre en la diarrea y disenteria.

La LAVATIVA AMILÁCEA de los H. M. es análoga á la anterior y contiene ℥ß (15 gr.) de almidon y lbß (250 gr.) de agua comun.

Se puede añadir de ℊviij á ℊxij (½ á 6 dec.) de tintura de opio.

3479. L. ANODINA (H. DE M.).

℞ Cocim. emoliente. . . ℥xij (375 gr.).
Elect. filonio romano. ℥j (4 gr.).

M. I. Cólicos nerviosos. *D.* Para dos lavativas.

3480. L. ANTIBLENORRÁGICA (*Velpeau*).

℞ Agua de goma. . . . . ℥jv (125 gr.).
Bálsamo de copaiba. ℥jv (15 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊj v (20 cent.).
Extr. acuoso de opio. ℊj (5 cent.).
Yema de huevo. . . . c. s.

H. S. A. *I.* Flujos blenorrágicos agudos ó crónicos.

Nota. Esta lavativa, preferible á todas las preparaciones de copaiba destinadas á ingerirse en el estómago, debe retenerse el mayor tiempo posible.

3481. L. ANTIDIARREICA (*Devergie*).

℞ Acetato de plomo neutro. ℊij, ℊjv ú ℊviij (10, 20 ó 40 cent.) aumentando progresivamente.
Carbonato de sosa. ℊj, ℊij ó ℊjv (5, 10 ó 20 cent.).
Láud. de Sydenham. . 4 gotas.
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

I. Diarrea de los tísicos. *D.* Una lavativa mañana y tarde.

3482. *Otra* (ROSTAN).

℞ Cocimiento de arroz. lbj (500 gr.).
Almidon. . . . . una pulgarada.
Goma tragacanto. . . ℥ß (2 gr.).
Láud. de Sydenham. 20 got.

D. Un cuarto de lavativa de seis en seis horas. Segun Rostan es muy eficaz y seguros sus resultados.

3483. L. ANTIHELMÍNTICA.

℞ Musgo de Córcega. . ℥ß (15 gr.).

Se hierve durante diez minutos en

Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se cuela y se añade:

Aceite de ricino. . . . ℥ij (60 gr.).

Nota. Se puede usar tambien un cocimiento de helecho macho, una infusion de santónico, etc.

3484. *Otra*, n. 2.

℞ Yerba de abrótano. Ʒvß á ℥j (22 á 30 gr.).
Agua birviendo. . . . . c. s.

Se digiere durante un cuarto de hora y á ℥vj ú ℥viij (180 á 250 gr.) de líquido colado se añade:

Aceite comun ó de linaza. ℥j (30 gr.).

M. I. Lombrices y principalmente contra las ascárides.

3485. *Otra* (DUNCAN).

℞ Hojas de sabina,
Hojas de ruda,
Hojas de ajenjos, ãã. ƷiIj (12 gr.).

Se reducen á pedazos y se infunden en

Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se cuela y se añade:

Aceite de ricino. . . . ℥ß (15 gr.).

3486. L. ANTIESPASMÓDICA.

℞ Extr. de valeriana. ℊxviij (1 gr.).
Agua caliente. . . . ℥iij (100 gr.).

I. Convulsiones y algunas neurosis.

3487. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Asa fétida. . . . . ℥ß (2 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Eclampsia, neurosis abdominales ó uterinas con hinchazon del bajo vientre, cólicos histéricos, etc.

3488. L. ANTIESPASMÓDICA (H. M.).

℞ Inf. de manzanilla. ℥xij (375 gr.).
Asa fétida disuelta en vinagre. . . . . ℥ß (15 gr.).
M. D. Para dos lavativas.

3489. L. ANTIESPASMODICA (P. DE MIGNOT).

℞ Valeriana quebrantada. ℥v (20 gr.).
Se infunde en
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Se cuela y se disuelve:
Extr. gomoso de opio. ℊj (5 cent.).
Se añade á la solucion despues de fria:
Eter sulfúrico. . . . . ℥ß (2 gr.).
I. Se usa para resolver las hernias. Al mismo tiempo se puede hacer irrigaciones etéreas sobre el tumor.

3490. L. ANTIESPASMÓDICA ALCALINA (*Mialhe*).

℞ Inf. de ℥ijß (10 gr.)
de valeriana. . . . ℥vj (200 gr.).
Asa fétida. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Carbonato de potasa. ℊjx (50 cent.).
Yema de huevo. . . número 1.
Se pista la asa fétida con el carbonato de potasa y algunas gotas de agua, despues se añade la yema de huevo y por fin la infusion de valeriana.

3491. L. ANTIESPASMÓDICA Y VERMÍFUGA.

℞ Agua caliente. . . . ℥iij (100 gr.).
Asa fétida. . . . . ℊjx á ℊxviij ó ℥j (50 cent. á 1 ó 4 gr.).
I. Convulsiones, corea, coqueluche, crup espasmódico, lombrices, ténia.

3492. L. ANTIPERIÓDICA.

℞ Sulfato de quinina. . ℊxviij (1 gr.).
ó Quina amarilla. . . . ℥j (30 gr.).
Cocim. de adormid. . ℥jv (125 gr.).
I. Calenturas intermitentes, neuralgias periódicas. *D.* En dos medias lavativas.

3493. L. ANTIPÚTRIDA (H. M.).

℞ Quina de Loja. . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . lbjß (750 gr.).
Se cuece hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:
Alcanfor. . . . . ℥ij (8 gr.).
I. Fiebres graves con disposicion á la gangrena. *D.* Para varias lavativas.

3494. L. ANTISÉPTICA.

℞ Alcanfor. . . . . ℥j (4 gr.)
Quina amarilla,
Serpentaria, ää. . . . ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
M. S. A. Se usa en las fiebres graves con tendencia á la gangrena.

3495. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . ℊxc (5 gr.).
Se tritura con
Yema de huevo. . . número 1.
Se añade:
Cocimiento de quina. ℥xiij (400 gr.).
Láudano líquido. . . . ℊjx (50 cent.).
I. Calentura adinámica ó tifoidea, cólera, cardialgia.

3496. L. ARSENICAL FEBRÍFUGA (*Boudin*).

℞ Arseniato de potasa. ℊj (5 cent.).
Agua destilada. . . 2 cuart. (1 lit.).
Divídase en diez partes. *D.* Para diez lavativas.

3497. L. ANTISIFILÍTICA.

℞ Deutocloruro de merc. ℊij (1 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥ij (60 gr.).
Cocimiento de semillas de lino. . . . . lbj (500 gr.).
I. Se usa en el caso en que el estómago soporta mal el sublimado, ó cuando el recto es el sitio de algunos síntomas sifilíticos.

3498. L. DE ASA FÉTIDA.

℞ Asa fétida. . . . ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).
ó Tint. de asa fét. ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Yema de huevo. número 1.
M. I. Afecciones nerviosas ó histéricas, etc.

3499. *Otra* (H. DE M.).

℞ Inf. de manzanilla. . ʒxij (375 gr.).
Asa fétida en polvo. . ʒj (4 gr.).
Yema de huevo. . . número 1.
Se tritura la asa fétida con la yema de huevo ó se incorpora á la infusion. V. n. 3488.
I. Se usa como antiespasmódica.

3500. *Otra* (MILLAR).

℞ Asa fétida. . . . . ʒij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥iij (90 gr.).
Cocimiento de malvab. ℥iij (90 gr.).
H. S. A. Millar la ha recomendado en la angina estridula.

3501. L. DE ASA FÉTIDA ALCANFORADA.

℞ Asa fétida. . . . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (12 dec.).
Aceite comun. . . . ʒjß (45 gr.).
Se trituran en un mortero con
Yema de huevo. . . número 2.
Inf. de manzanilla romana y raiz de valer. ℔ß (250 gr.).
I. Cólico flatulento, no acompañado de calentura ó plétora general ó local.

3502. L. ASTRINGENTE.

℞ Cocimiento de corteza de roble.
ó Cocimiento de bistorta,
ó Cocimiento de cáscara de granada,
ó Cocimiento de ratania. . . . . c. s.
I. Diarreas y disenterias crónicas.

3503. *Otra*, n. 2.

℞ Tanino. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Agua. . . . . ʒx (300 gr.).
Láudano de Sydenham. 6 gotas.
M. I. Diarreas, disenterias, colitis crónicas apiréticas, y diarreas de los niños.

3504. *Otra*, n. 3.

℞ Bistorta,
Rosa rojas, ää. . . . . ʒijß (40 gr.).
Agua. . . . . ʒx (300 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Láudano de Sydenham. 5 gotas.
I. Diarreas crónicas.

3505. *Otra* (H. DE M.).

℞ Cáscaras de granadas,
Pét. de rosas rojas, ää. ʒj (30 gr.).
Se cuece las cáscaras en c. s. de agua para obtener ℔j (500 gr.) de cocimiento y se infunde en el líquido colado
Diascordio. . . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Diarreas pasivas. *D.* Para tres veces.

3506. *Otra* (BOERHAAVE).

℞ Azafran,
Hipericon, ää. . . . . una pulgarada.
Trementina. . . . . ʒß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . número 2.
Triaca. . . . . ʒij (8 gr.).
Leche. . . . . c. s.
Se mezcla S. A. *I.* Disenterias y tenesmos crónicos acompañados de dolores vivos en las entrañas, que han resistido á las preparaciones de opio tomadas interiormente. Se usa en varias veces.

3507. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Extracto de ratania. . ʒj (12 dec.).
Mucil. de semillas de membrillos. . . . . ʒiij (12 gr.).
Cocimiento de salvia. ʒjß (48 gr.).
M. I. Diarrea rebelde y cólera morbo espasmódico.

3508. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Cocimiento de corteza de encina. . . . . ℥vj (180 gr.).
Acido sulfúr. diluido. ʒj (4 gr.).
M. I. Diarreas crónicas, disenteria, melena, hemorragia, ca-

tarro útero-vaginal. *D.* Para una lavativa.

3509. L. ASTRINGENTE (H. DE DIOS).

℞ Raiz de bistorta. . . ℥ij (60 gr.).
Cabezas de adormid. ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . Ibij (1000 gr.).

I. Diarreas y disenterías crónicas.

La LAVATIVA ASTRINGENTE DE LOS H. M. solo contiene ℥j (30 gr.) de raiz de bistorta contundida y ℥xviij (560 gr.) de agua comun. *D.* Para dos lavativas.

3510. L. ASTRINGENTE *ó de nitrato de plata* (*Trousseau*).

℞ Nitrato de plata. . . . ℊj (5 cent.).
Agua caliente. . . . . ℥vj (200 gr.).

I. Colitis crónicas apiréticas, diarreas de los niños.

3511. L. ASTRINGENTE ALUMINOSA.

℞ Alumbre. . . ß (2 gr.).
Opio. . . . . ℊj á ℊij (5 á 10 cent.)
Almidon. . . ℥j (4 gr.).
Agua calient. ℥vj (200 gr.).

I. Cólera, diarrea rebelde, procidencia del recto, melena, asfixia. *D.* En dos veces.

3512. L. ASTRINGENTE CALIBEADA.

℞ Bolas de Nancy. . . . . ℥jß (6 gr.).
Quina. . . . . ℥ß (15 gr.).
ó Mil en rama. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥v (150 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Procidencia del recto, disenteria, catarro útero-vaginal. *D.* Para dos lavativas.

3513. L. ASTRINGENTE *ó de cáscara de granada* (F. E.).

℞ Cáscaras de granadas machacadas. . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . Ibjß (750 gr.).

Se cuece y se cuela.

I. Es muy útil para combatir las diarreas y disenterías crónicas.

3514. L. ASTRINGENTE DE CATECÚ.

℞ Catecú. . . . . ℊxc (5 gr.).
Agua caliente. . . . . ℥x (300 gr.).

I. Diarrea crónica. Se prepara del mismo modo la lavativa astringente de goma quino.

3515. L. ASTRINGENTE CONTRA LAS GRIETAS DEL ANO (*Bretonneau y Trousseau*).

℞ Extracto de ratania 5jß (6 gr.).
Alcohol, c. s. para ablandarle.
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. Se retendrá el mayor tiempo posible, y se administrará antes una lavativa emoliente.

3516. L. ASTRINGENTE DE QUINO.

℞ Quino verdadero. . . ß (2 gr.).
Agua. . . . . Ibiij (1500 gr.).

M. Es muy eficaz en el tratamiento de ciertas diarreas atónicas.

3517. L. ASTRINGENTE Y TÓNICA (*Roucher*).

℞ Flores de arnica. . . ß (15 gr.).
Hojas de salicaria. . 1 puñado.
Agua hirviendo. . . . c. s.

Se infunde S. A., se cuela y se añade:

Tintura acuosa de ℊxxjv (12 dec.) de ipecacuana. . . . ℥jv (125 gr.).

I. Disenterías de carácter mucoso y con atonía. Disminuye la frecuencia de las deposiciones y fortifica el intestino recto.

3518. ENEMA ATEMPERANTE (H. DE M.).

℞ Tisana de cebada. . . ℥xij (375 gr.).
Nitrato de potasa. . . ℥j (4 gr.).

M. I. Calma el ardor de vientre en las fiebres, etc. *D.* Para una lavativa.

3519. ENEMA ATEMPERANTE ACETADO (H.-DE M.).

℞ Agua comun. . . . . ℥xviij (560 gr.).
Vinagre. . . . . ℥j (30 gr.).
Nitro. . . . . ʒj (4 gr.).

Disuélvase. *D.* Para dos lavativas.

3520. L. CON EL BÁLSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. . ʒß (15 gr.).

Se diluye en una yema de huevo y se añade:

Alcanfor. . . . . ℈jv (2 dec.).
Extr. acuoso de opio. ℈j (5 cent.).
Agua de goma . . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Blenorragia aguda ó crónica. Se procurará conservar la lavativa el mayor tiempo posible, para lo que se la hará preceder una ó dos lavativas emolientes.

3521. *Otra* (RICORD).

℞ Copaiba. . . . . ʒvj (21 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Extr. gomoso de opio. ℈j (5 cent.).
Agua. . . . . ℥vj (192 gr.).

Se usa en los casos en que no puede administrarse el bálsamo de copaiba por la boca.

3522. L. CON EL BÁLSAMO DE COPAIBA (*Velpeau*).

℞ Bálsamo de copaiba. ʒij á ℥j (8 á 30 gr.).
Láudano de Sydenham. ℈xviij á ℈xxxvj (1 á 2 gr.).
Yema de huevo. . . núm. 1.
Cocim. de malvabisc. lbß (250 gr.).

M. S. A. *I.* Flujos blenorrágicos agudos ó crónicos.

3523. L. DE BELLADONA.

℞ Hoj. secas de bellad. . ℈xij (6 dec.).
Agua hirviendo. . . . . ℥vj (180 gr.).

Se infunde.

I. Se usa para combatir la contraccion espasmódica que se opone algunas veces á la introduccion de la sonda en la vejiga, espasmos del recto, hernia estrangulada, parto difícil, vólvulo, disentería, cólera, esplenalgia, histérico, metrorragia. *D.* De una vez.

3524. *Otra* (RICORD).

℞ Extr. hidroalcohólico de belladona. . . . ℈ij (10 cent.).
Inf. de manzanilla. . . ℥iv (125 gr.).

Disuélvase. Se usa para facilitar la reduccion de las hernias estranguladas. *D.* Se repite cada tres ó cuatro horas.

3525. L. CALCAREA (*Freer*).

℞ Agua de cal tibia. . . . ℥x (300 gr.).

I. Contra las ascárides.

3526. L. CALMANTE (*Fouquet*).

℞ Opio. . . . . ℈ij (1 dec.).
Filonio romano. . . . ℈x (5 dec.).
Agua ó leche. . . . . c. s.

I. Producen á veces mejor efecto que estos mismos medicamentos tomados por la boca.

3527. *Otra*, n. 2.

℞ Cocimiento de raiz de malvabisco,
ó Cocimiento de linaza,
Cocim. de cabez. de adorm., ãã. c. s.

A veces se añaden diez ó quince gotas de láudano de Sydenham por lbj (500 gr.) de líquido.

3528. L. CARMINATIVA.

℞ Manzanilla,
Hojas de naranjo,
Hinojo,
Anis,
Cab. de adorm., ãã. ʒijß (10 gr.).
Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).

Se infunde bastante tiempo y se cuela.

I. Cólico ventoso, neumatosis, histérico.

3529. L. CARMINATIVA (F. M.).

℞ Cocim. carminativo. . ℥x (300 gr.).

Electuario de bayas de laurel. . . . . ʒß (15 gr.).
Aceite de anís destilado. ʒß (6 dec.).
Miel de ruda. . . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Dolores cólicos y afecciones ventosas.

3530. L. DE CATECÚ.

℞ Catecú. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcohol. . . . . ℥xviij (1 gr.).
Agua caliente. . . . . ʒjv (125 gr.).
I. Grietas del ano, catarro útero vaginal, diarrea, disenteria, hemorragia, melena. *D.* Para un cuarto de lavativa que se repite mañana y noche.

3531. L. DE CEBADILLA.

℞ Cebadilla. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥x (300 gr.).
Leche. . . . . ℔ß (250 gr.).
Se hierve la cebadilla en el agua de modo que se obtengan ʒvij (210 gr.), se cuela y se añade la leche.
I. Ascárides.

3532. L. CON CLARA DE HUEVO (*Ricord*).

℞ Cocimiento de semillas de lino. . . . . ℥xij (375 gr.).
Clara de huevo. . . . número 2 ó 3.
M. I. Diarreas crónicas.

3533. L. CLOROSA (*Collercau*).

℞ Hidrocloro medicinal. ʒij (8 gr.).
Jalea de almidon. . . . ʒjv (15 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℊß (25 mil.).
Agua destilada. . . . ʒvj (180 gr.).
M. S. A. *I.* Diarreas de los tísicos. *D.* Esta lavativa debe usarse por la mañana y retenerla el mayor tiempo posible.

3534. L. CLORURADA (*Labarraque*).

℞ Cloruro de sosa. . . . ʒijß (10 gr.).
Agua filtrada poco caliente. . . . . ℔j (500 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas.

3535. L. DE COLOQUINTIDA (F. DE L.).

℞ Extracto de coloquintida compuesto. . ʒij (24 dec.)
Jabon blando. . . . . ʒj (30 gr.)
Agua. . . . . ℥xviij (560 gr.).
Se mezclan y se trituran.

3536. L. CONTRA LA DIARREA.

℞ Jar. diacodion. ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.)
Cocimiento de almidon. . . . ℔ß (250 gr.).
M. I. Diarreas colicuativas y diarreas en los niños.

3537. L. CONTRA LAS DIARREAS DISENTÉRICAS DE LOS NIÑOS.

℞ Licopodio, cuatro cucharadas de café.
Yema de huevo. . . . . número 2.
Agua caliente. . . . . c. s.
Se puede añadir algunas gotas de tintura de opio.

3538. L. CONTRA LA DIARREA DE LOS TISICOS (*Devergie*).

℞ Acet. de plomo neutro. ʒij (8 gr.).
Carbonato de sosa. . . ʒj (4 gr.).
Láudano de Sydenham. 4 gotas.
I. Diarrea y sudores de los tísicos. *D.* Para una vez; se repite mañana y noche.
Nota. Las dos sales se descomponen y se forma acetato de sosa y carbonato de plomo.

3539. L. CONTRA LAS DIARREAS CRÓNICAS (*Rostan*).

℞ Goma tragacanto. ℊxviij á ℊxxxvj (1 á 2 gr.).
Almidon. . . . . ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Láudano de Sydenham. . . 20 gotas.
Agua. . ʒxij á ʒxvj (375 á 500 gr.)
M. S. A.

3540. L. CONTRA LAS HEMORROIDES FLUENTES (*Warten*).

℞ Colofonia en polvo. . ʒj (30 gr.).

Miel. . . . . lbß (250 gr.).
Agua. . . . . ℥x (300 gr.).

H. S. A. A veces añade Warten ℥ß (15 gr.) de bálsamo de copaiba.

3541. L. DE CUBEBAS.

℞ Cubebas. . . . . ℥ß (15 gr.).
Cocim. de malvabisco. ℥vj (200 gr.).
Alcanfor. . . . . ɡxviij (1 gr.).
Extr. de belladona. . ɡv (25 cent.).

I. Blenorragia, blenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* Para dos lavativas.

3542. *Otra* (VELPEAU).

℞ Pimienta cubebas en polvo. . . . . ℥jv (16 gr.).
Cocimiento muy cargado de malvabisco. . ℥vj (192 gr.).

H. S. A. *I.* Blenorragia aguda ó crónica. *D.* Se toma mañana y noche esta dosis, y se la debe retener el mayor tiempo posible.

Nota. Puede aumentarse la cantidad de cubebas hasta ℥j (30 gr.) y mas.

3543. L. DIURÉTICA.

℞ Cebolla albarrana. . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se hierve durante diez minutos y se cuela.

3544. *Otra*, n. 2.

℞ Digital,
Cebolla albarrana, ää. ℥j (4 gr.).

Se hierve durante diez minutos en
Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se cuela y se añade:
Láudano de Rousseau. 6 gotas.

3545. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Hojas de parietaria. . ℥j (4 gr.).

Se hierve en
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

I. Hidropesías. Se puede añadir ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.) de nitrato ó acetato de potasa.

3546. L. DRÁSTICA (*Moll*).

℞ Hojas de tabaco. . . . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
Aceite de croton. . . . 3 gotas.
Goma arábiga. . . . . ℥ij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa con buen éxito en los casos desesperados de íleo, apoplejía, encefalitis, lumbago. *D.* Para una lavativa.

3547. L. DULCIFICANTE (*Fouquet*).

℞ Salvado. . . . . medio puñado.
Agua comun. . . . . lbij (1000 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:
Yemas de huevo frescas. . . . . número 2.

I. Disenterías, diarreas, dolor nervioso en el recto. *D.* Se consume esta cantidad en las veinticuatro horas en cuatro lavativas.

3548. L. EMETIZADA.

℞ Tártaro emético. . . . ɡvj (3 dec.).

Se disuelve en
Infusion de árnica. . . lbj (500 gr.).

Se usa en la apoplejía, coma, etc.

3549. L. EMOLIENTE.

℞ Hojas de malva,
Hojas de acelga, ää. ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

Se hierve, se cuela y se añade:
Aceite comun. . . . ℥iij (90 gr.).

M. I. La misma que las siguientes.

3550. *Otra*, n. 2.

℞ Especies emolientes. . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . c. s.

para que resulte lbj (500 gr.).

3551. *Otra*, n. 3.

℞ Cocimiento de simiente de linaza,
ó Cocimiento de hojas de malvabisco,
ó Cocimiento de salvado,
ó Cocimiento de malvas,
ó Cocim. de manzanilla. lbj (500 gr.).
Ac. comun ó de linaza. ℥j (30 gr.).

I. Sirve para determinar evacuaciones alvinas y para templar el calor de los intestinos gruesos, flegmasías gastro-intestinales, es-

plenalgia, neumatoses, gastritis, gastralgia, peritonitis, nefritis, metritis, ovaritis, tifo, enuresis, catarro útero-vaginal. *D.* Para una ó dos lavativas.

El ENEMA EMOLIENTE DE LOS H. DE M. se compone de ℥xij (375 gr.) de cocimiento de raiz de malvabisco y ℥j (30 gr.) de aceite comun. D. De una vez.

3552. L. EMOLIENTE Y CALMANTE.

℞ Cocimiento de simiente de linaza. . . . . lbß (250 gr.).
Láudano líquido de Sydenham. . . . . 15 gotas.

H. S. A. *I.* Diarreas con dolores nerviosos y al fin de la disenteria.

3553. L. EMOLIENTE DE HOJAS DE MALVA (F. E.).

℞ Cocimiento emoliente de malvas. . . . . ℥x (300 gr.).
Miel,
Aceite comun, ãã. . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Se usa para humedecer los excrementos duros y secos, y en todas las enfermedades en que convenga mantener el vientre libre.

3554. L. EMOLIENTE Y LAXANTE (H. DE AL.).

℞ Aceite de alm. dulces. ℥j (30 gr.).
Cogucho pardo. . . . . ℥j (30 gr.).
Cocimiento de cebada. lbß (250 gr.).

M. I. Gastro-entero-colitis con estreñimiento, gastralgia, gastritis, angina, aftas, esplenalgia, metritis, perineumonía, atrofia mesentérica, disenteria, enagenacion, apoplejía, plétora, cefalalgia, encefalitis, soitis, lumbago, tifo, convalecencias, anteversion, cálculos, denticion difícil, envenenamiento. *D.* Para una lavativa.

3555. L. ESTIMULANTE.

℞ Sal comun . ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.).
Infusion de arnica. . . ℥xij (375 gr.).

Disuélvase. *I.* Parálisis, apoplejía, y se usa como purgante.

3556. L. ESTIMULANTE (H. DE M.).

℞ Agua tibia. . . . . ℥xij (375 gr.).
Aceite de ruda. . . . ℥jß (45 gr.).
Vino emético turbio. ℥ij (60 gr.).

M. I. Apoplejía y conmociones cerebrales.

3557. L. EXCITANTE Y ANTISÉPTICA.

℞ Cocimiento de quina,
Infusion de arnica, ãã. ℥ij (60 gr.).
Alcanfor diluido en una yema de huevo. . . ℥ß (2 gr.).

I. Paralisis, apoplejía, vértigos. *D.* En dos medias lavativas.

3558. L. FEBRIFUGA (H. M.).

℞ Cocimiento de quina. ℥xij (375 gr.).
Sulfato de quinina. . . gviij (4 dcr.).

Disuélvase. *I.* Calenturas intermitentes. *D.* Para dos lavativas.

3559. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina. . . ℊxvj (8 dcr.).
Láudano de Rousseau. 4 gotas.
Agua dest. de lechuga. ℥jv (125 gr.).

D. Para un cuarto de lavativa.

3560. *Otra*, n. 3.

℞ Cocimiento de quina. lbj (500 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ß (2 gr.).

Se disuelve el alcanfor en una yema de huevo, y se añade el cocimiento de quina.

3561. L. FERRUGINOSA ASTRINGENTE (*Sundelin*).

℞ Sum. de mil en rama. ℥ß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).

Se infunde durante quince á veinte minutos, se cuela con expresion y se añade S. A.

Tartrato de potasa y hierro. . . . . ℥jß (6 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Procidencia del recto. *D.* En dos veces al dia.

3562. L. FÉTIDA (H. DE ING.).

℞ Asa fétida. . . . . ℥ij (8 gr.).

Cocimiento de avena. . ʒx (300 gr.).
Mézclese triturando.
I. Afecciones nerviosas ó histéricas, etc.

3563. L. GELATINOSA.

℞ Cola de Flandes. . . . ʒß (15 gr.).
Agua comun. . . . . ℔j (500 gr.).
Disuélvase en caliente.

3564. L. DE GOMA QUINO.

℞ Goma quino,
Raiz de granado,
Raiz de tormentila, ãã. ʒß (15 gr.).
Cabezas de adormider. núm. 1.
Agua. . . . . ʒx (300 gr.).
I. Diarrea, disenteria, cólera, hemorragia uterina, melena. *D.* Para una lavativa.

3565. L. DE GRACIOLA.

℞ Graciola. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ʒxiij (400 gr.).
Se reduce un tercio por la coccion.
I. Procidencia del recto, hemorragia, delirio trémulo. *D.* Una lavativa para combatir el estreñimiento y destruir las ascárides.

3566. L. IODADA (*Cottereau*).

℞ Goma aráb. en polvo. ʒjv (16 gr.).
Agua comun. . . . . ʒvj (192 gr.).
Se disuelve y se añade al líquido
Tint. alcohól. de iodo. 5 gotas.
I. Amenorrea, dismenorrea, escrófulas y ciertas tisis. Se aumentará gradualmente la dosis de esta tintura, segun las indicaciones, hasta veinte gotas.
Nota. Debe retenerse esta lavativa el mayor tiempo posible.

3567. L. PROTOIODO FERRURADA.

℞ Solucion normal de protoioduro de hierro. . 45 á 50 got.
Solucion un poco viscosa de goma arábiga. ℔j (500 gr.).
D. En dos lavativas, mañana y noche.

3568. L. IRRITANTE DE TABACO (H. DE M.).

℞ Hoj. sec. de tabaco. ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒxxx (940 gr.).
Se infunden las hojas de tabaco y en el líquido se disuelve:
Tártaro emético. . . ϑß (6 dec.).
I. Asfixias y hernias estranguladas. *D.* Para tres enemas.
La LAVATIVA IRRITANTE DE LOS H. M. se prepara cociendo ʒj (30 gr.) de hojas de tabaco en ℔jß (750 gr.) de agua comun; se cuela y se añade ʒij (8 gr.) de trementina de Venecia incorporada con yema de huevo, y ʒij (60 gr.) de cloruro de sodio. D. Para dos lavativas.

3569. L. IRRITANTE ANTIMONIADA.

℞ Vino antimonial. . . . ʒij (60 gr.).
Hidroclorato de sosa. ʒß (15 gr.).
Cocimiento de sen. . ʒxij (375 gr.).
M. Apoplejía, afecciones comatosas. *D.* Para una lavativa.

3570. L. IRRITANTE DE VINO ANTIMONIADO (F. E.).

℞ Vino de óxido de antimonio. . . . . ʒjv (125 gr.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Se mezcla para usarla en una sola dosis.
I. Se usa como derivativo en la apoplejía, epilepsia, letargo, etc.

3571. L. DE JABON (H. DE IT.).

℞ Jabon medicinal. . . . ʒj (4 gr.).
Miel. . . . . ʒvj (24 gr.).
Cocimiento de cebada. ℔ß (250 gr.).
Disuélvase. *D.* Para una lavativa laxante.

3572. ENEMA JABONOSO (H. DE M.).

℞ Jabon. . . . . ʒvj (24 gr.).
Agua comun. . . . . ℔jß (750 gr.).
Se disuelve en caliente.
I. Se usa como un débil estimulante. Esta lavativa es revulsiva y derivativa. *D.* Para dos lavativas.

3573. L. DE KOEMPF.

℞ Raiz de valeriana menor,
Raiz de rubia, ãã. . . ʒj (30 gr.).
Hojas de diente de leon,
Hojas de manzanilla,
Hojas de tanaceto, ãã. medio puñado.

I. Embarazos abdominales y convalecencia de las calenturas intermitentes.

3574. L. LAUDANIZADA.

℞ Láud. de Sydenham. ℥ß (6 dec.).
Cocim. de malvabisco. ℔ß (250 gr.).

A veces se añade ʒß (15 gr.) de almidon y se tiene la *lavativa de almidon laudanizada*, que se usa para combatir las diarreas.

D. Para dos ó tres lavativas, segun la indicacion.

3575. L. LAXANTE.

℞ Cocimiento de linaza,
ó Raiz de malvabisco. . . . . c. s.
Miel de mercurial,
ó Jarabe de espino serbal,
Miel pura,
ó Aceite de ricino, ãã. ʒij á ʒjv (60 á 120 gr.).

Mézclese.

3576. ENEMA LAXANTE (H. DE M.).

℞ Especies emolientes. . . ʒij (60 gr.).
Sen. . . . . ʒß (15 gr.).
Sal de Glauhero. . . . . ʒij (8 gr.).

Se hierven las especies en c. s. de agua para obtener ℔ß (750 gr.) de cocimiento, se infunde en él las hojas de sen, se cuela y se disuelve el sulfato de sosa.

I. Estreñimiento pertinaz ó como derivativo. *D.* Para dos enemas.

3577. L. LAXANTE (H. M.).

℞ Cocim. de malvas. . ℔ß (750 gr.).
Sulfato de magnesia. ʒß (15 gr.).
Miel. . . . . ʒij (60 gr.).

I. La misma que la anterior. *D.* Para dos lavativas.

3578. L. LAXANTE ANTIESPASMODICA *ó Lavativa contra el estreñimiento* (*Lippich*).

℞ Asa fétida. . . . . ʒiij (12 gr.).
Vinagre comun. . . . ʒj (32 gr.).
Miel. . . . . ʒij (64 gr.).
Agua de cebada. . . . ʒx (320 gr.).
Yema de huevo. . . . c. s.

H. S. A. *I.* Estreñimiento nervioso. *D.* Para dos lavativas con una hora de intervalo.

3579. L. DE MANZANILLA.

℞ Manzanilla. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔j (500 gr.).

H. S. A. *I.* Cólicos nerviosos ó flatulentos.

3580. L. MERCURIAL (*Kopp*).

℞ Deutoclor. de merc. . ℊ½ (12 mil.).
Infusion de santónico. ʒjß (45 gr.).
Mucil. de goma aráb. ʒij (8 gr.).

M. I. Se usa contra las ascárides de los niños de siete á ocho años.

3581. L. MOSCADA (H. M.).

℞ Inf. de manzanilla. . ʒxij (375 gr.).
Almizcle. . . . . ℥ß (6 dec.).

I. Afecciones espasmódicas. *D.* Para dos lavativas.

3582. L. MUCILAGINOSA.

℞ Cocim. de malvabisco. ℔j (500 gr.).
Gelatina. . . . . ʒß (15 gr.).
Mucilago de goma. . . ʒijß (10 gr.).

I. Diarrea crónica, disenteria, caquexia, esplenalgia, hepatitis, metritis crónica. *D.* Para una lavativa.

3583. L. NARCÓTICA.

℞ Cocimiento de yerbamora. . . . 100
Cocimiento de beleño. 100
Cocimiento de adormideras. . . 100
Cocimiento de estramonio. . . . 100

I. Esplenalgia, vólvulo, catarro útero-vaginal, neumatosis, dentician difícil, metrorragia, metritis, nefritis, ovaritis, priapismo, hepatitis, histérico, perito-

nitis, disenteria, hernia. *D.* Para una ó dos medias lavativas.

3584. L. DE NUEZ DE AGALLA OPIADA (H. DE ING.).

℞ Cocimiento de nuez de agalla. . . . . ℔ß (250 gr.).
Tintura de opio. . . . 3j (4 gr.).
M. I. Diarreas rebeldes, disenterias crónicas, procidencia del recto.

3585. L. NUTRITIVA.

℞ Caldo de carne. . . . ℔j (500 gr.).
Carne roja muy picada. ℥jv (125 gr.).
Yemas de huevo. . . número 2.
Para una ó dos lavativas.

3586. *Otra*, n. 2.

℞ Caldo de carne,
Leche, ãã. . . . . ℥iij (90 gr.).
Gelatina de asta de ciervo. . . . . ℥j (30 gr.).
M. Se procurará retenerla por algun tiempo, cuando nada se puede tragar.

3587. *Otra* (NASSE).

℞ Caldo del puchero. . ℥xij (375 gr.).
Acido clorhídrico. . c. s.
para agriar el caldo y suplir los flúidos necesarios para la digestion.

3588. L. DE CORNEZUELO DE CENTENO *ó Lavativa obstétrica.*

℞ Cornez. de centeno. 3ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).
Se hierve durante diez minutos y se cuela.

3589. L. CON OJIMIEL.

℞ Ojimiel simple. . . . ℥jv (125 gr.).
Agua. . . . . ℔j (500 gr.).
M. I. Se usa como atemperante y ligeramente laxante.

3590. L. OPIADA Y ALCANFORADA (*Ricord*).

℞ Alcanfor. . . . . ℊjx 50 cent.).
Extracto de opio. . . . ℊj (5 cent.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Agua. . . . . ℥vj (200 gr.).
Disuélvase. *I.* Contra las erecciones, priapismo, vólvulo, cardialgia, cólera, angina, histérico, nefritis. *D.* En dos medias lavativas.

3591. L. DE PARIETARIA.

℞ Hoja secas de parietaria. . . . . 3j (4 gr.).
Agua. . . . . ℔ij (1000 gr.).
Se hierve, se cuela y se añade:
Nitro,
ó Acetato de potasa. . 5j (4 gr.).
M. I. Hidropesías.

3592. L. DE PLENCK CONTRA LAS ASCÁRIDES.

℞ Acíbar. . . . . 3ij (8 gr.).
Yema de huevo fresca. número 1.
Se trituran y se vierte poco á poco
Leche de vacas. ℥vj á ℥viij (180 á 250 gr.).
D. En una sola lavativa.

3593. L. PURGANTE.

℞ Tártaro emético. . . . ℊxx (1 gr.).
Solucion de goma arábiga. . . . . ℔ß (250 gr.).
Mézclese.

3594. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de magnesia. ℥ß (15 gr.).
Aceite de lino. . . . ℥jß (45 gr.).
Cocim. de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
Mézclese.

3595. L. PURGANTE *ó Lavativa de sen compuesta.*

℞ Hojas de sen,
Sulfato de sosa, ãã. . ℥ß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔j (500 gr.).
Se infunde el sen en el agua durante una hora, se cuela y se añade el sulfato de sosa.

I. Estreñimiento pertinaz.

3596. L. PURGANTE.

℞ Sen. . . . . 3ij (8 gr.).
Cocimiento de linaza hirviendo. . . . . lbij (1000 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Sulfato de sosa. . . . 3ß (15 gr.).
ó Sulfato de magnesia. 3ß (15 gr.).

M. I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vias y envenenamiento, calenturas tifoidea, verminosa ó biliosa, sincopes, tétanos, asma, destete, apoplejia, cefalalgia, denticion dificil, angina, plétora, convalecencia.

3597. *Otra* (H. M. F.).

℞ Sen. . . . . 3ß (16 gr.).
Sulfato de sosa. . . . 3v (20 gr.)
Tártaro emético. . . . gjv (2 dec.).
Agua, c. s. para obtener. . . . . lbj (500 gr.).

Se infunde el sen durante un cuarto de hora, se cuela con expresion y se añade la sal y el emético.

3598. ENEMA PURGANTE (H. DE M.).

℞ Cocim. de manzanilla. lbjß (750 gr.).
Sulfato de magnesia. 3j (30 gr.).

Disuélvase. *D.* Para dos enemas.

3599. L. PURGANTE EMETIZADA (*Radius, Foy*).

℞ Tártaro emético. . . . gxviij (1 gr.)
Infusion de arnica. . . 3vj (200 gr.).
Cocimiento de tabaco. lbj (500 gr.).

I. Apoplejía, sincopes, tétanos, asfixia, afecciones soporosas, angina, cefalalgia, coriza, hernia, convalecencias. *D.* Para una lavativa.

3600. L. PURGANTE DE MAGNESIA.

℞ Infusion de sen. . . lbij (1000 gr.).
Sulfato de magnesia. 3ij (60 gr.).
Aceite de linaza. . . 3jß (50 gr.).

I. Estreñimiento, ictericia, afecciones tifoideas, procidencia del recto, embarazo de las primeras vias, asma, denticion dificil, angina, laringitis, apoplejia, sincopes, plétora, cefalalgia, encefalitis, convalecencias. *D.* Para dos lavativas.

3601. L. PURGANTE *ó Lavativa de sen.*

℞ Sen. . . . . 3iij (12 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se hierve y se añade:

Miel de mercurial. . . 3jv (125 gr.).

Disuélvase.

3602. L. PURGANTE SALINA.

℞ Sulfato de sosa. . . . 3j (30 gr.).
Cocim. de malvabisco. lbj (500 gr.).

A veces se prescribe doble cantidad de la sal.

3603. L. DE QUINA.

℞ Quina amar. quebrant. 3vj (24 gr.).

Se hierve durante media hora en c. s. de agua para obtener ocho onzas de líquido colado. Se añade:

Láudano de Sydenham. 12 gotas.

Se usa contra las fiebres intermitentes.

3604. *Otra* (H. DE LA CARIDAD).

℞ Quina. . . . . 3j (30 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

I. Se usa como febrífugo y tónico cuando el estómago rehusa la ingestion de la quina, y como excitante y antipútrido en las calenturas tifoideas.

3605. L. DE QUINA ALCANFORADA *ó Lavativa antiséptica.*

℞ Quina roja. . . . . 3jv (15 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se hierve ligeramente, se cuela y por otra parte se toma:

Alcanfor. . . . . 9j (12 dec.).

Yema de huevo. . . . . número 1.

Se tritura el alcanfor en un mortero con algunas gotas de alcohol, se deslie en la yema de huevo y se añade poco á poco el cocimiento de quina.

I. Calenturas adinámicas.

3606. L. REFRESCANTE.

℞ Cocimiento de semillas de lino. . . . ℥xij (375 gr.).
Ojimiel simple. . . . ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . ʒj (4 gr.).

M. Se usa en las flegmasias agudas de las vias urinarias.

3607. L. SEDANTE.

℞ Extr. acuoso de bellad. gij (1 dec.).
Agua. . . . . ℥vj (200 gr.).

Disuélvase.

3608. L. SALINA.

℞ Cloruro de sodio. . . ℥j (30 gr.).
Cocimiento de lino. . lbij (1000 gr.).

M. I. Es un laxante ligero. Se puede añadir ʒij (8 gr.) de jabon.

3609. L. DE SIMIENTE DE LINAZA.

℞ Simiente de linaza. . . . ℥ß (15 gr.).

Se hierve durante quince minutos en c. s. de agua para obtener lbj (500 gr.) de líquido colado.

3610. L. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina disuelto en algunas gotas de ácido sulfúrico alcoholizado. . . . gvj á gxij (3 á 6 dec.).
Infus. de flor de tilo. ℥jv (125 gr.).
Extracto de opio. . . gr½ (2 cent.).

Para una lavativa que se debe retener.

3611. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina. . . gxviij (1 gr.).
Cocimiento de amapola
ó Adormideras. . . . . ℥v (150 gr.).
Acido sulfúrico alcoholizado, algunas gotas para disolver el sulfato de quinina.

Se retendrán estas lavativas el mayor tiempo posible.

3612. L. DE TABACO ESTIBIADA.

℞ Hojas de tabaco. . . ℥j (30 gr.).

Se hierve en

Agua. . . . . 2 cuart. (1 lit.).

Se cuela y se añade:

Tártaro emético. . . gxij (6 dec.).

I. Se usa como estimulante muy enérgico en la asfixia, etc., y se la ha aconsejado en las hidropesías pasivas del peritoneo.

3613. L. DE TABACO (*Page*).

℞ Hojas de tabaco. . . . ʒß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥xij (375 gr.).

Se infunde durante media hora.

I. Se la ha elogiado como estimulante en las neumonías, cuando se agravan á pesar del tratamiento antiflogístico. Tambien se puede usar para combatir el íleo, las hernias estranguladas y la constriccion espasmódica. Se la ha alabado contra el tétanos y entonces se eleva la dosis hasta glj v ó glxxij (3 á 4 gr.) para la misma cantidad de agua.

3614. L. DE TABACO Y CROTON (*Moll*).

℞ Hojas de tabaco. . . ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥v (150 gr.).
Aceite de croton. . . . 3 gotas.
Goma arábiga. . . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. Se usa en los casos desesperados de íleo.

3615. L. DE TANINO.

℞ Agua pura. . . . . lbj (500 gr.).
Tanino. . . . . ʒij (8 gr.).

Disuélvase. *I.* Sirve para atenuar los efectos producidos por las lavativas de opio, adormideras y morfina, administradas á grandes dosis.

3616. L. TÓNICA Y EMOLIENTE.

℞ Quina roja quebrant. ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se cuece ligeramente, se cuela y se suspende en el líquido un poco caliente:

Almidon. . . . . 3ij (8 gr.).

I. Diarreas, flujos atónicos, disenterías pútridas.

3617. L. DE TREMENTINA (H. DE AL.).

℞ Trementina. . . . . 3j (4 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

Se tritura y se añade:

Triaca. . . . . ʒß (15 gr.).

Se diluye todo en

Leche caliente. . . . . ʒjv (125 gr.).

Van Swieten usaba esta lavativa contra los cólicos y tenesmos que acompañan comunmente á la diarrea de los tísicos.

3618. ENEMA DE TREMENTINA (H. DE M.).

℞ Trementina. . . . . 3iij (12 gr.).
Yemas de huevo. . . número 2.
Agua comun. . . . . ʒxij (375 gr.).
Sulfato de sosa. . . . 3iij (12 gr.).

Se agita la trementina con las yemas de huevo hasta que se mezclen bien, y se añade poco á poco el agua, en la que se habrá disuelto antes el sulfato de sosa.

3619. L. DE ESENCIA DE TREMENTINA.

℞ Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Cocimiento de sen. . . ℔j (500 gr.).

I. Tétanos, ceática.

3620. L. TREMENTINADA (*Trousseau*).

℞ Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Agua. . . . . ℔j (500 gr.).

M. S. A. Cross usa esta lavativa contra las ascárides vermiculares, y Recamier en las neuralgias lumbares, parálisis, etc.

3621. L. DE VALERIANATO DE QUININA.

℞ Valerianato de quinina. . . . . ℊx (5 dec.).
Agua. . . . . ʒvj (200 gr.).
M. S. A.

3622. L. VERMÍFUGA.

℞ Hiel de vaca,
Oleosácaro de ajenjo, ãã. . . . . ℨij (24 dec.).
Miel. . . . . ʒvß (22 gr.).
Infusion de ajenjos. . . ʒv (160 gr.).

I. Ascárides. *D.* Para dos lavativas.

3623. *Otra*, n. 2.

℞ Santónico,
Valeriana, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).

Se infunde y se añade:

Asa fétida tritur. con una yema de huevo. ℊxc (5 gr.).

I. Afecciones verminosas, lombrices, ascárides. *D.* Para una lavativa.

3624. *Otra* (RASPAIL).

℞ Agua. . . . . ℔ij (1000 gr.).
Acíbar,
Tabaco,
Asa fétida, ãã. . . . ℊiij (15 cent.).
Aceite alcanforado. . ʒijß (10 gr.).

3625. ENEMA VERMÍFUGO (H. DE M.).

℞ Agua comun. . . . . ʒxij (375 gr.).
Hollin. . . . . ʒß (15 gr.).

Se infunde el hollin y se cuela.

3626. L. VERMÍFUGA TREMENTINADA.

℞ Asa fétida,
Tanaceto,
Santonico, ãã. . . . . ℊxc (5 gr.).
Trementina. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua. . . . . c. s.

I. Afecciones verminosas, hemacelinosis, neuralgias, lumbago. *D.* Para dos lavativas.

3627. L. DE VINAGRE (H. M.).

℞ Vinagre. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . ʒvj (180 gr.).

M. I. Afecciones tifoideas, etc.

3628. L. VISCERAL (*Koempf*).

℞ Raiz de valeriana,
Raiz de diente de leon,
Raiz de saponaria,
Salvado, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).
Centaura menor,
Marrubio blanco,
Cardo santo, ãã. . . ℥j (30 gr.).
Flores de gordolobo,
Flores de manzanilla,
Flores de arnica,
Meliloto, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . ℥xxvß (800 gr.)

que se reduce por la coccion á lbj (500 gr.).

I. Atrofia mesentérica, infartos de las vísceras abdominales, aftas, angina, esplenitis, hepatitis. *D.* Para dos lavativas. V. n. 3573.

3629. *Otra* (BERENDS).

℞ Diente de leon. . . . ℥iij (90 gr.).
Salvado. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se reduce á lbß (250 gr.) por la coccion y se añade al fin:

Manzanilla,
Valeriana, ãã. . . . ℥ij (8 gr.).

I. Obstrucciones del bajo vientre. *D.* Para dos lavativas.

LAVATORIOS.

3630. LAVATORIO ANODINO (H. DE M.).

℞ Cabezas de adormider. blancas. ℥ß (15 gr.).
Raiz de malvab. ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . ℥xxxvj (1125 gr.).

Se cuece hasta que quede en lbjß (750 gr.), se cuela y se añade:

Extracto de opio. ℊij (1 dec.).

3631. L. ANTIESCORBÚTICO ACIDULADO (H. DE M.).

℞ Cocimiento de cebada. . . . . lbjß (750 gr.).
Alcohol de cochearia,
Acido sulfúrico diluido, ãã. . . . . ℥ß (2 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥j (30 gr.).

Mézclese.

3632. L. ANTIESCORBÚTICO QUINADO (H. DE M.).

℞ Escordio,
Quina calisaya. ãã. ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . ℥xxviij (875 gr.).

Se hierve levemente, se cuela y se añade despues de frio:

Alcohol muriático etéreo. . . . . ℥ij (8 gr.).
Alcohol de cochear. ℥ß (15 gr.).
Jarabe de vinagre. ℥ij (60 gr.).

3633. L. ASTRINGENTE (H. DE M.).

℞ Hojas de arrayan,
Hojas de salvia, ãã. . . ℥j (30 gr.).

Se infunde en ℥xxviij (875 gr.) de agua, se cuela y se añade:

Alumbre. . . . . ℥j (4 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Reblandecimiento de las encias y laxitud de la membrana mucosa de la garganta.

LECHES.

3634. LECHE DE ALMENDRAS AMARGAS (*Trousseau*).

℞ Almendras dulces,
Almendras amargas, ãã. . . . ℥j á ℥jß (4 á 6 gr.).
Agua comun. . . lbj 500 gr.).
Azúcar. . . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *D.* A medios cortadillos en las veinticuatro horas.

Es muy sencilla, poco costosa y la mas segura de todas las preparaciones de las almendras amargas.

3635. L. ALUMINOSA.

℞ Alumbre. . . . . 3ij (8 gr.).
Leche birviendo. . . . lbj (500 gr.).
Disuélvase. *I.* Diarreas crónicas, hemorragias pasivas.

3636. L. AMONIACAL.

℞ Goma amoniaco. . . . ℥xij (6 dec.).
Ojimiel escilítico. . . . 3j (30 gr.).
Se tritura en un mortero de porcelana y se añade poco á poco:
Infusion de hisopo. . 3jv (125 gr.).
Se cuela por una manga.
I. Catarros pulmonares rebeldes con expectoracion abundante y difícil. *D.* Una cucharada cada dos horas.

3637. *Otra*, n. 2.

℞ Leche. . . . . 20 á 30
Amoniaco. 1
M. Se usa como emenagoga en inyecciones en la vagina.

3638. *Otra*, n. 3.

℞ Goma amoniaco. . . . 3j (4 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Tritúrese. Conviene añadir un poco de goma ó yema de huevo para que no se precipite la resina.

3639. L. ANALÉPTICA DE MUSGO DE IRLANDA.

℞ Musgo de Irlanda. . . ℥xc (5 gr.).
Leche de vacas. . . . . lbj (500 gr.).
Se cuece durante diez minutos y se añade:
Agua de flores de nar. 3j (30 gr.).
Canela. . . . . ℥xviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . 3j (30 gr.).
I. Convalecencia de las flegmasias agudas, marasmo. *D.* Media taza.

3640. L. ARTIFICIAL (*Rosenstein*).

℞ Almendras dulces. . . número 12.
Se vierte poco á poco sobre ellas despachurrándolas:
Agua birviendo. . . . 3jv (125 gr.).
Se echa encima:
Leche. . . . . 3vj (200 gr.).
Azúcar. . . . . 3j (4 gr.).
I. Sirve para alimentar á los niños que no pueden mamar, y en las convalecencias. *D.* Se da además dos cucharadas de caldo ligero, tres veces al dia, como alimento.

3641. L. ARTIFICIAL PARA LOS NIÑOS.

℞ Carbonato de potasa. . 9j (12 dec.).
Agua de tilo. . . . . 3ij (60 gr.).
Agua de cerezas negras,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . 3j (30 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 3.
Mucil. de goma aráb. ℥xc (5 gr.).
I. Destete prematuro de los niños, convalecencias, marasmo. *D.* Como alimento.

3642. L. DE BURRA, ARTIFICIAL.

℞ Caracoles. . . . . número 6.
Cuerno de ciervo,
Cebada perlada,
Raiz de cardo corredor, ãã. . . . . 3iij (12 gr.).
Agua. . . . . lbjß (750 gr.).
Se reduce á la mitad por la ebullicion y se añade:
Jarabe de culantrillo. 3j (30 gr.).
I. Marasmo, tisis, fetidez del aliento. *D.* A medias tazas.

3643. L. FABRICADA AL INSTANTE.

Se evapora á fuego lento la leche fresca de vacas hasta que se reduzca á polvo fino, que se guarda en vasijas bien tapadas. Para obtener una taza de leche ó cualquier cantidad de este líquido, se le mezcla ó disuelve en un poco de agua. Así puede durar la leche mucho tiempo.

3644. L. DE ASA FÉTIDA *ó Emulsion de asa fétida.*

℞ Asa fetida. . . . . 5j (4 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

ó Asa fétida. . . . . 5j (4 gr.).
Agua de menta. . . . . ℥vj (180 gr.).

3645. L. COSMÉTICA (F. CADET G.).

℞ Agua destil. de rosas. lbß (250 gr.).
Tintura de benjuí,
Tintura de bálsamo de la Meca, ãã. . . 5ß (2 gr.).
M. D. Una á dos lociones al dia.

3646. L. DE MAGNESIA (*Mialhe*).

Magnesia calcinada oficinal. . . . 100
Agua pura. 800
Agua de flores de naranjo. . . . 100

Se tritura la maguesia con el agua y se calienta la mezcla hasta la ebullicion, como se dirá en la preparacion de la medicina de magnesia, se cuela y se añade el agua aromática. Cada cucharada contiene 3ß (2 gr.) de óxido.

El autor recomienda que se cuele por una estameña; pero procediendo de esta manera queda sobre la tela toda la materia, por lo que es mejor colarla por un cedazo muy fino.

I. Absorvente y antiácida. *D.* Una cucharada de café por la mañana en ayunas, y una cucharada grande en la diabetes.

3647. L. MERCURIAL DE PLENCK.

℞ Mercurio. . . . . 5j (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℥ß (15 gr.).
Jarabe diacodion. . . c. s.

Se tritura hasta que se extinga perfectamente el metal y se añade poco á poco:

Leche de vacas birv. lbß (250 gr.).

I. Oftalmia gonorréica, úlceras sifilíticas, en lociones; úlceras del miembro, en baños; angina venérea, en gargarismo.

3648. L. NITRADA, SODATADA Ó CON VAINILLA.

℞ Nitro. . . . . ℈xxxij (16 dec.).
ó Bicarbonato de sosa. ℈xxxij (16 dec.).
ó Sacarolado de vain. ℥ß (15 gr.).
Leche. . . . . lbij (1000 gr.).

3649. L. DE PLOMO.

℞ Sal comun. 1

Se disuelve en la menor cantidad posible de agua y se añade poco á poco:

Extracto de Saturno. 2

Se recoge el precipitado y despues de bien lavado se le mezcla con

Emulsion comun. 24

I. Es cosmético.

3650. L. DE POLLO.

Es una crema que se compone de yema de huevo, agua caliente, azúcar y agua de flor de naranjo, batido todo junto.

3651. L. PURGANTE (*Planche*).

℞ Resina de escamonea. ℈viij (4 dec.).
Azúcar blanca. . . . 5ij (8 gr.).

Se trituran las dos sustancias y se les añade poco á poco:

Leche pura. . . . . ℥iij (90 gr.).
Agua de laurel real. 3 á 4 gotas.

Se da de una vez á un adulto. Es una medicina muy agradable y el mejor modo de administrar la escamonea.

3652. L. TREMENTINADA.

℞ Trementina. . . . . ℥jß (45 gr.).

Se la lava dos ó tres veces en aguardiente hasta que blanquee, se mezcla exactamente con una yema de huevo y se añade poco á poco:

Agua destilada de parietaria. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se tritura hasta que la mezcla tome un color de leche.

I. Afecciones de las vias urinarias. *D.* 5ß á 5j (15 á 30 gr.) en un vaso de agua.

3653. L. VIRGINAL ó *Agua cosmética.*

℞ Tintura de benjuí. . . 5j (4 gr.).
Agua de rosas,
ó Agua de meliloto. . . . lbj (500 gr.).
M. Se usa como cosmético.

3654. L. VIRGINAL.

℞ Almendras amargas. . 3ij (8 gr.).
Almendras dulces. . . . ℥j (30 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥v (150 gr.).
Flores de benjui. . . . 9j (12 dec.).
Hágase emulsion S. A.

3655. L. VIRGINAL MINERAL.

℞ Litargirio en polvo. ℥vj (180 gr.).
Vinagre destilado. . ℥xviij (560 gr.).
Se cuece hasta que se consuma la tercera parte del líquido, se cuela y se añade:
Alumbre. . . . . ℥jv (125 gr.).
disuelto en
Agua. . . . . lbjß (750 gr.).
y se conserva el licor lactescente que resulta de la mezcla.

I. Es un cosmético peligroso de usar.

LEJIAS.

3656. LEJÍA LITONTRIPTICA (*Saunders*).

℞ Agua hirviendo. . 8 cuart. (4 lit.).
Conchas de ostras calcinadas. . . . lbjß (750 gr.).
Potasa recien calcinada. . . . . lbß (250 gr.).

Se mezcla y se filtra despues de un dia de reposo.

D. 3ij á 3iij (8 á 12 gr.) al dia en tres tomas, en una infusion de semillas de lino, á la cual se añade:

Magnesia calcinada. ℈xv (75 cent.).

LICORES.

3657. LICOR ACÉTICO DE OPIO.

℞ Opio en bruto. 63
Ácido acético concentrado. . . . 29
Agua destilada. 263

Se filtra despues de haberle tenido cuatro dias en maceracion.

Cuatro gotas de esta tintura representan ℈j (5 cent.) de opio.

I. Calma los movimientos y los dolores espasmódicos. *D.* Dos á ocho gotas en una pocion.

3658. L. ÁCIDO DE HALLER (F. A.).

℞ Alcohol,
Ácido sulf. concentrado, ãã. . p. ig.

Se mezclan con cuidado en una vasija de vidrio, echando sucesivamente el ácido en el alcohol, y se le conserva en una botella de vidrio bien tapada. V. n. 1622.

D. Diez á treinta gotas.

3659. L. ACÉTICO DE MORFINA (*Dunglisson*).

℞ Acetato de morfina. . ℈xvj (8 dec.).
Vinagre. . . . . 3ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . 3vj (24 gr.).

Disuélvase. Se dan seis á veinticuatro gotas al dia como calmante.

3660. L. ALCANFORADO.

℞ Nitrato de potasa. . 3v (20 gr.).
Agua pura. . . . . lbiij (1500 gr.).

Se disuelve y se añade:

Alcohol rectificado alcanforado. . . . ℥j (30 gr.).

Se agita durante algun tiempo y se filtra.

D. Seis á veinticuatro gotas en un vaso de tisana.

3661. L. ALUMINOSO COMPUESTO.

℞ Alumbre,
Sulfato de zinc, ãã. 3j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . lbß (250 gr.).

Se disuelve y se filtra.

I. Se usa en inyecciones en las blenorragias crónicas, leucorreas, oftalmias rebeldes, etc. Se usa comunmente con el agua de rosas en la proporcion siguiente:

Licor alumínoso compuesto.	℥ß (15 gr.).
Agua de rosas.	℥vijß (235 gr.).

3662. L. AMONIACAL ANISADO (F. BR.).

℞ Alcohol.	400
Amoniaco líquido.	100
Aceite volátil de anis.	20

M. S. A. *I.* Enfermedades por gran debilidad y sin inflamacion, asma espasmódico. *D.* Diez gotas cuatro veces al dia para los adultos, y cinco gotas mañana y tarde para los niños.

Nota. Debe darse este licor en un vehículo apropiado.

3663. L. AMONIACAL BENZÓICO.

℞ Solucion de amoniaco cáustico concentrada, c. s. q.

Se tritura en caliente con el ácido benzóico y se filtra el licor.

I. Catarro crónico, asma de los ancianos. Esta preparacion es digna de fijar la atencion de los médicos.

3664. L. AMONIACAL ESTIBIADO.

℞ Linimento estomacal. ℥ij	(8 gr.).
Tártaro emético. . . .	ℊxviij (1 gr.).
Trementina.	℥j (4 gr.).

M. I. Reumatismo, lumbago, ciática. *D.* En fricciones.

3665. *Otro*, n. 2.

℞ Sucinato de amoniaco líquido. .	2
Extracto de regaliz.	2
Láudano líquido de Sydenham. .	1
Vino antimonial.	1

I. Coqueluche. *D.* Veinte á cuarenta gotas cada dos horas.

3666. L. ANODINO (*Triller*).

℞ Espíritu de sal amoniaco,	
Agua de Anhalt,	
Esencia de azafran,	
Esencia de castoreo, ää. ℥ij	(8 gr.).
Esencia de nuez mosc.	30 gotas.

M. I. Dolores reumáticos inveterados. *D.* En fomentos calientes.

3667. L. ANTICANCEROSO (*Kapeler*).

℞ Oxido blanco de arsénico.	ℊj (5 cent.).
Agua destilada.	℔j (500 gr.).

Disuélvase. *D.* Una gota al dia, aumentando progresivamente hasta una cucharada de café mañana y noche.

3668. L. ANTIDIARRÉICO (*William Kerr*).

℞ Alambre de hierro cortado en pedacitos ó limaduras de hierro, ℥jß	(45 gr.).
Acido nítrico. . . .	℥iij (90 gr.).
Agua comun. . . .	℥xxvij (840 gr.).
Acido clorhídrico. .	℥j (4 gr.).

Se colocan en una vasija de barro los pedazos de hierro, y se vierte encima el ácido nítrico diluido antes en ℥xv (470 gr.) de agua. Se deja obrar el ácido hasta que se disuelva completamente el metal, se filtra el líquido y se le añade el resto del agua y del ácido clorhídrico de suerte que todo forme ℥xxx (940 gr.) de licor.

Nota. Este producto, que no es mas que sesqui-nitrato de peróxido de hierro, es de color rojo oscuro cuando se le interpone entre el ojo y la luz, y de color negro cuando se le ve á la luz reflejada. Su sabor es muy astringente, pero no cáustico.

I. Este remedio produce muy buenos efectos en las afecciones de la membrana mucosa intestinal, sobre todo en las diarreas crónicas en que el opio no ha sido suficiente; lejos de producir malos accidentes, parece segun Kerr que disminuye la irritabilidad y la sensibilidad de los intestinos. Sin embargo no produce buenos efectos en las disenterias ni en las afecciones diarréicas tifoideas. Se le ha recomendado además en el priapismo, eczema, lupus, li-

quen, impétigo, lepra y herpes. *D.* Diez á veinte gotas en una infusion apropiada ó en una pocion astringente. A los niños ocho ó diez gotas en lavativas astringentes.

3669. L. ANTIEPILÉPTICO.

℞ Nitrato de plata. . . . gvjv (7 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥j (30 gr.).

Disuélvase. *D.* Veinte gotas mañana y noche.

3670. L. ANTIESCROFULOSO (*Hufeland*).

℞ Cloruro de bario. . . gij (40 cent.).
Agua destilada. . . . . ℥j (30 gr.).

Disuélvase. *I.* Escrófulas, para lavar las úlceras escrofulosas y atónicas y para tocar las aftas. *D.* Cinco á veinte gotas, tres veces al dia, á los niños hasta tres años; diez á treinta gotas á mayor edad, y cincuenta á sesenta gotas á los adultos.

3671. L. ANTIESPASMÓDICO (*Grimaud*).

℞ Licor de cuerno de ciervo sucinado. . . . . ℥j (30 gr.).
Licor anodino mineral de Hoffmann. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de manzanilla. . ʒj (4 gr.).

I. Esta mistura es antiespasmódica y calmante y se usa en las afecciones nerviosas. *D.* Veinte á treinta gotas en una taza de infusion de amapola fria, que se toma por la noche al acostarse.

3672. *Otro* (PIERQUIN).

℞ Licor mineral de Hoffmann. . . . . ℥ij (8 gr.).
Acido prúsico medicinal. . . . . 15 gotas.
Jarabe de malvabisco. . ℥iij (90 gr.).

Se mezcla la mezcla al tiempo de usarla.

I. Afecciones nerviosas de pecho ó síntomas nerviosos en las enfermedades inflamatorias de esta misma cavidad, dispepsia, tos héctica, tisis, palpitaciones, asma, coqueluche. *D.* Una cucharada de café de dos en dos horas.

3673. L. ANTINEFRÍTICO (*Adams*).

℞ Agua comun. . . . . lbij (1000 gr.).
Cabezas de adorm. . ℥vj (180 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la cuarta parte, se exprime fuertemente y se añade al líquido colado:

Nitrato de potasa. . ℥j (30 gr.).

I. Afecciones dolorosas de las vias urinarias, cálculos, catarros de la vejiga, etc. *D.* ℥ij (8 gr.) mañana y tarde en un vaso de cocimiento tibio de semilla de lino ó de raiz de malvabisco.

3674. L. ANTIERETÉRICO (*Hufeland*).

℞ Agua de laurel real,
Agua de Goulard, ää. ℥ij (60 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥iij (90 gr.).

M. I. Calmante de los dolores locales, neuralgias antiguas, principalmente la neuralgia facial.

3675. L. ANTIHERPÉTICO.

℞ Flores de azufre. 1
Aceite comun. 1
Alcohol. 1
Acido clorhídrico. 1

M. I. Afecciones herpéticas. *D.* ℥j, ℥ij ó ℥iij (30, 60 ó 90 gr.) en untura.

Se aumenta ó disminuye su actividad, dilatándole en mayor ó menor cantidad de infusion acuosa de flores de sauco.

A estas fricciones se añaden las píldoras de Belloste, las bebidas amargas, la de fumaria, escabiosa, etc. y un régimen alimenticio no salado ni ácido.

3676. L. ANTINEURÁLGICO (*Battley*).

Se prepara por digestion una solucion acuosa concentrada de quina calisaya, y se evapora á una temperatura de 50° hasta la consistencia de jarabe. Este licor se conserva bien; y para que no

se altere se le puede añadir gʒ½ (1 cent.) de éter sulfúrico.

I. Neuralgias rebeldes. *D.* Diez á veinte gotas y aun mas, tres veces al dia. El doctor Robert prefiere este licor al sulfato de quinina.

3677. L. ANTISIFILÍTICO (*Chaussier*).

℞ Cianuro de mercurio. . gj (5 cent.).
Agua destilada. . . . . ʒij (60 gr.).

Disuélvase *I.* Enfermedades venéreas rebeldes, y herpes escamosos húmedos acompañados de prurito violento. *D.* ʒjv á ʒj (15 á 30 gr.) al dia en muchas tomas, como el licor de Van Swieten.

3678. L. ANTIVENÉREO (*Richard de Aulensierk*).

℞ Sublimado corrosivo. ℈ß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . gjv (2 dec.).

Se tritura en un mortero de mármol, y se disuelve poco á poco:

Aguardiente. . . . . lbij (1000 gr.).

Al fin se añade:

Jarabe de amapolas. ʒj (30 gr.).

Se conserva en una botella.

D. Una á dos cucharadas mañana y noche en lbß (250 gr.) de tisana pectoral ó leche de vacas.

3679. *Otro* (SPANGENBERG).

℞ Sublimado corrosivo. . gij (1 dec.).
Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Agua de rosas. . . . . ʒjv (125 gr.).

Se lava el glande y el miembro despues de un coito sospechoso. Se tiene cuidado de dejar algunas gotitas entre el prepucio y el glande y hacer inyecciones con agua blanca.

3680. L. ARSENICAL (*Biett*).

℞ Arseniato de amoniac. gjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒjv (125 gr.).

D. Se usa á la dosis de doce gotas hasta ʒj (4 gr.) y aun mas en la mayor parte de las enfermedades crónicas de la piel, en el eczema, impétigo, liquen, etc.; pero principalmente en las afecciones escamosas, en la lepra y en la soriasis.

3681. L. ARSENICAL DE FOWLER ó *Arsenito de potasa* (F. F. Y F. P.).

℞ Acido arsenioso,
Carbon. de potasa, ää. gxc (5 gr.).
Agua destilada. . . . . lbj (500 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. . . . . ℥ß (16 gr.).

Se reduce á polvo el ácido arsenioso, se le mezcla con el carbonato de potasa y se hierve en una vasija de vidrio hasta que se haya disuelto enteramente el ácido arsenioso. Cuando esté frio se añade al líquido el alcohol de melisa, se filtra y se echa c. s. de agua hasta que represente lbj (500 gr.). De este modo se obtendrá un licor que contendrá una centésima parte de su peso de ácido arsenioso.

I. y *D.* V. t. 1, pág. 100.

El LICOR ARSENICAL DE FOWLER DE LOS H. DE M. tiene la misma composicion.

3682. L. ARSENICAL (*Bishop*).

℞ Arseniato de potasa líquido,
Licor de potasa, ää. . ʒj (4 gr.).
Cocim. de zarzapar. ʒxij (375 gr.).

Mézclese.

3683. L. ARSENICAL DE DEVERGIE.

℞ Acido arsenioso. . . . gij (10 cent.).
Carbonato de potasa. gij (10 cent.).
Agua destilada. . . . lbj (500 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. . . . gjx (50 cent.).
Tintura de cochinilla. c. s.

para darle color.

Veinte granos (1 gr.) de esta solucion representan $^{1}/_{4000}$ ó $^{2}/_{10000}$ de ácido arsenioso; mientras que en el de Fowler se encuentra $^{1}/_{500}$ de grano por 20 granos de licor.

El autor recomienda darle mucho color para que se pueda reconocer fácilmente su presencia en un julepe.

3684. L. ARSENICAL DE HEINECKE.

℞ Arseniato de sosa. . . gij (1 dec.).

Agua de menta pipe-
rita. . . . . 3vj (25 gr.).

Se añade á la solucion:

Agua de canela. . . . ℥xc (5 gr.).
Tintura de opio. . . . ℥xviij (1 gr.).

I. Afecciones cutáneas, calenturas intermitentes. *D.* ℥xviij á ℥xxxvj (9 á 18 dec.) dos veces al dia.

3685. L. ARSENICAL DE HEIM ó *Solucion de Heim.*

℞ Arsénico blanco,
Carbon. de potasa, ää. 3j (4 gr.).
Agua destilada. . . . ℥vj (192 gr.).

Se disuelve por medio de la ebullicion y se añade al licor enfriado:

Espíritu de angélica
compuesto. . . . . 3j (32 gr.).
Agua destilada. . . . c. s.

para obtener ℥xviij (564 gr.) de liquido.

D. Cuatro á ocho gotas en agua.

3686. L. ARSENICAL DE PEARSON ó *Arseniato de sosa liquido* (F. F.).

℞ Arseniato de sosa cris-
talizado. . . . . ℈j (5 cent.).
Agua destilada. . . . . 3j (32 gr.).

Se disuelve el arseniato en el agua y se filtra.

I. Calenturas intermitentes, jaquecas periódicas y afecciones cutáneas. Es un remedio muy venenoso, por lo cual se le debe prescribir con circunspeccion.

D De veinte á sesenta gotas en un liquido mucilaginoso.

3687. L. CALMANTE DE CHAUSSIER.

℞ Opio escogido. . . . 3j (30 gr.).
Agua destilada. . . . lbß (250 gr.).

Se divide el opio, se deja con el agua en maceracion por dos ó tres dias, agitando de cuando en cuando, se filtra y se guarda en frascos bien tapados. Cuando se haya de conservar mas de un mes se le añade 3ß (15 gr.) de alcohol de 36°. *D.* Ocho á veinticuatro gotas.

3688. L. DE CANELA.

℞ Canela de Ceylan. 100
Aguardiente bueno. 1000

Se macera durante ocho dias, se destila en el baño maria y se añade:

Jarabe simple blanco. 1000

M. Es muy útil para reanimar las fuerzas abatidas. *D.* 3ß á 3ij (15 á 90 gr.).

Se pueden preparar del mismo modo otras preparaciones análogas con sustancias aromáticas.

3689. L. DE CARBONATO DE POTASA.

℞ Carbonato de potasa. 1
Agua destilada. 1

Disuélvase. *I.* Absorvente, estimulante y diurético. *D.* 3j (4 gr.) en un vehículo apropiado.

3690. L. CATERÉTICO (*Schmalz*).

℞ Sulfato de cobre,
Sulfato de zinc,
Verde gris, ää. . . . 3ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbß (250 gr.).

M. I. Se usa para reprimir las fungosidades de las úlceras y contra las fístulas.

3691. L. CAUSTICO (*Freyberg*).

℞ Bicloruro de mercurio. . 3ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
Alcohol rectificado. . . . 3j (32 gr.).

Disuélvase. *I.* Grietas y vegetaciones sifilíticas. *D.* Una aplicacion cada tres ó cuatro dias.

3692. L. CÁUSTICO (*Plenck*).

℞ Deutocloruro de mercurio. 8
Sulfato acido de alúmina. 8
Alcanfor. 1
Subcarbonato de plomo. 1

Se trituran estas sustancias en

Alcohol rectificado. 96
Vinagre. 96

I. Escrecencias sifilíticas. *D.* Se aplica por medio de un pincel c. s. de este licor, que se agita siempre que se usa.

3693. L. CÍTRICO DE MORFINA ó *Licor del doctor Porter.*

℞ Opio. . . . . 3jv (125 gr.).

Ácido cítrico. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).

Se digiere durante veinticuatro horas y se filtra.

I. Se usa para reemplazar las gotas negras. *D.* Seis á veinticuatro gotas al dia.

3694. L. DE CLORURO DE PLATA AMONIACAL.

℞ Piedra infernal. . . . . ℈x (5 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒij (64 gr.).

Se disuelve, se filtra y se echa en el líquido:

Licor de muriato de sosa. . . . . c. s.

para obtener un precipitado, el cual se disolverá en el momento en

Licor de amoniaco cáustico. . . . . ʒjß (48 gr.).

Se añade:

Ácido clorhídrico. . . . ʒij (8 gr.)

ó c. s. para evitar que se precipite el cloruro de plata y permanezca en estado de solucion, y que dé un líquido que pese ʒijß (75 gr.).

3695. L. CONTRA LAS AFTAS (*Swediaur*).

℞ Borax en polvo. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada de rosas. ʒj (30 gr.).
Miel rosada. . . . . ʒij (60 gr.).
Tintura de mirra. . . . ʒj (30 gr.).

M. S. A. *D.* Se tocan las aftas muchas veces al dia con un pincel empapado en este licor.

3696. L. CONTRA LA EPISTAXIS (*Swediaur*).

℞ Alumbre. . . . . ʒß (2 gr.).
Bol arménico. . . . . ʒvj (24 gr.).
Vinagre,
Vino tinto, ää. . . . . ʒjv (16 gr.).

M. S. A. *I.* Se le ha propuesto para detener la hemorragia nasal.

3697. L. CONTRA EL VÓMITO DE LAS PREÑADAS (*Pigeaux*).

℞ Alcohol. . . . . ʒiij (90 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua pura. . . . . ʒjv (120 gr.).
Azúcar. . . . . ʒij (60 gr.).

Si los vómitos se presentan por la mañana en ayunas, se hace tomar uno ó dos pedazos de pan empapados en este licor; pero si acaecen despues de comer, se da una cucharada de este remedio, que es muy agradable, y puede aumentarse la dosis hasta una copa.

3698. L. CORDIAL (*Brodun*).

℞ Tintura de genciana
Tintura de cardamomo,
Tintura de quina,
Tintura de colombo,
Alcoholato de espliego compuesto,
Vino marcial, ää. . . . ʒjv (125 gr.).

I. Clorosis, escrófulas, escorbuto. *D.* ʒij á ʒv (8 á 20 gr.).

3699. *Otro* (WARGNER).

℞ Ruibarbo. . . . . ʒij (60 gr.).
Sen. . . . . ʒß (15 gr.).
Azafran. . . . . ʒj (4 gr.).
Regaliz. . . . . ʒß (15 gr.).
Pasas. . . . . lbj (500 gr.).
Alcohol de 24°. . . lbiij (1500 gr.).

Se digiere durante quince dias y se filtra.

I. Es estomacal. *D.* ʒj (30 gr.) como purgante.

3700. L. DE CUERNO DE CIERVO SUCINADO ó *Sucinato de amoniaco impuro.*

℞ Espíritu volátil de cuerno de ciervo. . . . . c. s. q.
Ácido sucínico medicinal. . . c. s.

Se añade bastante ácido sucínico para saturar el amoniaco del licor de cuerno de ciervo. Se separa una parte de aceite empireumático, que se aparta por medio de un filtro. V. t. I, pág. 87.

3701. L. DEPURATIVO (*François*).

℞ Zarzaparrilla roja. . ʒvj (180 gr.).

Se vierte encima:

Aguardiente de 22°. lbj (500 gr.).

Se infunden durante cuarenta y ocho horas:

Guayaco,
Dulcamara,
China, ää. . . . . ʒj (30 gr.).

Se vierte encima:

Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

Se macera durante cuarenta y ocho horas; se decanta la infusion espirituosa y se la pone aparte; se añade el residuo á las demás sustancias en maceracion, se hierve durante un cuarto de hora y se añade:

Sasafrás. . . . . ʒj (30 gr.).

Se aparta del fuego, se deja enfriar y se mezcla el cocimiento con la infusion espirituosa añadiendo:

Jarabe simple. . . . lbij (1000 gr.).

Este licor puede reemplazar muy bien al jarabe de Cuisinier.

D. Se usa solo á cucharadas, una ó dos veces al dia, ó en un vaso de tisana. Se emplea como vehículo útil para administrar la solucion de deutocloruro de mercurio ó la de iodo, segun la indicacion.

3702. L. DEPURATIVO DE KOECHLIN.

℞ Limaduras de cobre. . ʒj (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . ʒjß (48 gr.).

Se deja digerir en frio hasta que el líquido tenga un color azul, se decanta en seguida y se guarda.

Para preparar el licor se toma de este líquido que se llama *Tintura de cobre amoniacal*, y se le mezcla con las sustancias siguientes:

℞ Tintura de cobre amoniacal. . . . . ʒj (32 gr.).
Acido clorhídrico á 22°. ʒijß (10 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒv (160 gr.).

I. Afecciones escrofulosas, atrofia mesentérica, coxalgia, ciertos casos de tisis incipiente, raquitis, sífilis constitucional, tiña, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Una cucharadita despues de comer, á los niños de tres á once años, una vez al dia; despues se hace beber una ó dos cucharadas de un buen vino azucarado.

Nota. Cada onza (30 gr.) contiene gjv (2 dec.) de cobre.

3703. L. DESINFECTANTE DE CLORURO DE OXIDO DE SODIO (*Labarraque*).

℞ Carbonato de sosa. 5
Agua. 20

Se disuelve. Por separado se introduce en un matraz una mezcla de

Cloruro de sosa. 8
Manganesa. 3

Se dispone el aparato de Woulff y se vierte por partes sobre la mezcla precedente:

Acido sulfúrico. 8

Dilatado en

Agua. 6

Se deja primero que empiece la operacion en frio, y despues se calienta progresivamente hasta que cese el desprendimiento.

I. Se usa para las autopsias, embalsamamientos, disecciones, contra la gangrena, etc. V. t. I, pág. 337.

3704. L. DIURÉTICO (*J. P. Frank*).

℞ Ceniza de madera. . lbj (500 gr.).
Sumid. de ajenjos. ʒj (30 gr.).

Se infunde en frio durante veinticuatro horas en

Vino acídulo. . . . . 2 cuart. (1 lit.).

D. ʒij (60 gr.) dos ó tres veces al dia.

3705. L. DE ENEBRO.

℞ Aguardiente. . . . . lbij (1000 gr.).
Bayas de enebro verdes. . . . . ʒjv (125 gr.).
Azafran,
Macis,
Canela, ää. . . . . ʒj (12 dec.).

Se digieren en el alcohol, se filtra y se endulza con

Jarabe simple. . . . lbjß (750 gr.).

Se usa como un excelente estomacal.

3706. L. FUNDENTE (*Hancke*).

℞ Iodo.	ℊxv	(75 cent.).
Ioduro de potasio. .	ʒß	(2 gr.).
Agua destilada. . . .	ʒv	(150 gr.).
Alcohol.	ʒj	(30 gr.).

Disuélvase S. A. Se aplica durante algunas horas: al principio produce una sensacion considerable de quemadura, pero luego calma.

I. Prurito herpético del perineo.

Se continúa usando el remedio por tres semanas con los baños frecuentes, y al cabo de este tiempo es completa la curacion.

3707. L. DE GOWLAND, *Locion de Gowland*, *Emulsion cosmética de Gowland*.

℞ Almendras amargas. .	ʒiij	(90 gr.).
Agua.	lbj	(500 gr.).
Sublimado corrosivo. .	ℊxvj	(8 dec.).
Sal amoniaco.	ℊxvj	(8 dec.).
Alcohol,		
Agua de laurel real, ää.	ʒß	(15 gr.).

Se machaca las almendras mondadas con el agua comun y se cuela. Se disuelve las sales en el agua de laurel real y el alcohol, y se mezcla las dos soluciones.

Es medicamento y cosmético.

I. Pitiriasis, acne, líquenes y diversas formas de ezcema crónico. Se usa en compresas como cosmético: se le deslie en agua y da frescura y suavidad á la piel; combate las grietas, las irritaciones ligeras producidas por el frio, el calor y las navajas de afeitar.

Este licor no contiene sublimado, sino un compuesto nuevo, á saber la sal Alembrot soluble ó cloruro de mercurio y amoniaco. V. t. I, pág. 258.

3708. L. HIDROSULFUROSO PARA BAÑOS (F. A.).

℞ Sulfuro de cal. . .	ʒiv	(125 gr.).
Acido tártrico. . .	ʒj	(30 gr.).
Agua.	lbxvj	(8000 gr.).

Se disuelve agitando con fuerza y se vierte en el agua del baño.

I. Enfermedades de la piel.

3709. L. LLAMADO BITTERS DE LOS HOLANDESES.

℞ Genciana.	ʒß	(15 gr.).
Naranjas	ʒß	(15 gr.).
Canela.	ʒj	(4 gr.).
Cálamo aromático. . .	ʒj	(4 gr.).
Raiz de énula.	ʒß	(2 gr.).
Cilantro.	ʒiij	(12 gr.).

Se reduce á polvo grueso, se macera durante ocho dias en lbjv (2000 gr.) de enebro, y se añade ʒjv (125 gr.) de jarabe ó ʒiij (90 gr.) de azúcar.

3710. L. MERCURIAL ALCANFORADO (H. DE AL.).

℞ Deutocloruro de mercurio.	ʒß	(2 gr.).
Alcanfor.	ʒj	(4 gr.).
Alcohol.	ʒj	(32 gr.).

M. I. Se usa para destruir los condilomas y las vegetaciones sifilíticas.

3711. L. MERCURIAL NORMAL (*Miathe*).

℞ Agua destilada. . . .	lbj	(500 gr.).
Sal comun,		
Sal amoniaco, ää. . .	ℊxviij	(1 gr.).
Clara de huevo. . . .	número 1.	
Sublimado corrosivo.	ℊvj	(30 cent.).

Se bate la clara de huevo en el agua destilada, se filtra y despues se disuelven los tres compuestos salinos en el agua albuminosa y se filtra de nuevo.

Cada onza (30 gr.) contiene ℊ½ (2 cent.) ó ℊ1/15 (1 cent.) por cucharada. V. ns. 3723 y 24.

3712 L. DE MIRRA (F. BR.).

℞ Agua destilada. . . .	lbß	(250 gr.).
Mirra macharada. . .	ʒij	(60 gr.).

Se digiere en el baño maría y se filtra. Segun la farmacopea de Bremen se puede añadir una sesta parte de miel.

I. Se usa como antiséptico en el

tratamiento de las úlceras de mal carácter. *D.* C. s. para empapar ligeramente una planchuela de hilas.

3713. L. DE MURIATO DE CAL.

℞ Cloruro de calcio. . .	℥ij (60 gr.).
Agua destilada.	℥iij (90 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, infarto de las glándulas linfáticas. *D.* Treinta á setenta y dos gotas en dos ó tres veces al dia en agua azucarada.

3714. L. DE NITRO ALCANFORADO (*Baumé*).

℞ Agua pura.	lbiij (1500 gr.).
Nitrato de potasa purificado.	℥vj (180 gr.).
Alcohol rectificado alcanforado. . . .	℥j (30 gr.).

Se disuelve el nitrato de potasa en el agua, se añade el alcohol alcanforado, se agita la mezcla por algun tiempo para facilitar la solucion del alcanfor que se ha precipitado al principio y se filtra.

I. Blenorragias. *D.* Seis á veinticuatro gotas en un vaso de bebida apropiada.

3715. L. DE POTASA (H. ING.).

℞ Subcarbonato de potasa.	12
Cal viva.	8
Agua destilada hirviendo.	64

M. I. Es litontríptico y diurético *D.* Ocho á treinta gotas en un vehículo mucilaginoso.

3716. L. DE PRESSAVIN.

℞ Tartrato de potasa,	
Mercurio precipitado de su nitrato por la potasa, ãã. . . .	p. ig.

Se disuelve en veinte veces su peso de agua y se filtra.

I. Afecciones herpéticas y sifilíticas. *D.* Dos cucharadas en un cuartillo de agua, que se toma en tres ó cuatro vasitos con una tisana apropiada.

Nota. Este remedio es muy infiel, por lo que se le ha abandonado.

3717. L. PROBATORIO DE HANNEMANN *ó licor hidrosulfurado acidulo* (F. A.).

℞ Sulfuro de cal,	
Acido tartrico, ãã. . .	℥ij (8 gr.).
Agua destilada. . . .	lbj (500 gr.).

Se mezclan en una botella bien tapada, agitando durante un cuarto de hora; despues se tiene en quietud hasta que se apose el tartrato de cal; se echa el licor claro en una botella de vidrio sobre

Acido tártrico.	℥ij (8 gr.)

y se guarda en una botella bien tapada.

3718. L. REFRIGERANTE Ó CIDRA ARTIFICIAL (*Cottereau*).

℞ Azúcar en bruto.	℥xx (625 gr.).
Vinagre de buena calidad. . . .	lbß (250 gr.).
Agua filtrada. . .	20 cuart. (10 lit.).
Flores secas de saúco.	℥ij (8 gr.).

Se disuelve el azúcar en el agua, se añade el vinagre y la flor de saúco, se mezclan, se dejan en maceracion durante veinticuatro ó treinta y seis horas en un cántaro de barro, libertándole del acceso del aire, y teniendo cuidado de menear de cuando en cuando; se cuela despues al través de un lienzo ó de un tamiz muy apretado, y se pone en botellas que despues de haberlas tapado con solidez, se colocan en cuevas, teniéndolas echadas. Al cabo de diez á quince dias se establece la fermentacion y está el líquido en disposicion de beberse. Se puede variar el gusto y el aroma, sustituyendo á las flores de saúco las hojas y tallos de salvia esclarea (*salvia sclarea*, *L.*) ó de la planta olorosa que se quiera; pero se procurará sobre todo emplear vinagre de buena calidad.

Esta bebida, que se vuelve muy

gaseosa por la fermentacion, tiene un sabor ligero á manzana de la reina; es diurética, como la cerveza y los vinos blancos espumosos; no molesta jamás y conviene principalmente en los calores del estío

3719. L. SEDANTE DE OPIO (*Battley*).

Opio en polvo fino, tres veces la cantidad prescrita en la F. de L. para lbij (1000 gr.) de tintura; se le añade lbij (1000 gr.) de ácido acético dilatado, y al cabo de algunas horas lbvj ú lbviij (3000 á 4000 gr.) de espíritu de vino rectificado; se macera durante siete dias, se filtra y destila; cuando el alcohol haya pasado enteramente, el producto que queda en la retorta, será el vinagre de opio sedante tan elogiado.

D. Una gota corresponde á tres gotas de tintura de opio.

3720. L. ESPIRITUOSO DE TIERRA FOLIADA DE TÁRTARO.

℞ Tierra foliada de tártaro bien seca. . . . . ℥ß (15 gr.).
Alcohol concentrado. . ℥ij (60 gr.).

Se deja en digestion durante algunos dias y se filtra.

I. Gota, hipocondría. *D.* Treinta á cuarenta gotas.

3721. L. DE VATLEBLED CONTRA LOS CALLOS.

℞ Sulfato de hierro. . lbj (500 gr.).
Lejía á 10°. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se pone al fuego en un perol de hierro, se calienta hasta la ebullicion, se añade lbj (500 gr.) de agua, en la cual se hierve durante un cuarto de hora una pulgarada de la planta llamada sangre de drago (*Rumex sanguineus*). Se deja enfriar, se aparta la materia espumosa que se ha formado en la superficie de la vasija y se hace evaporar hasta que quede en lbjvß (2250 gr.) de líquido.

Se aplican compresas empapadas en este licor y se renuevan dos ó tres veces al dia si es posible. Se dice que á los diez dias se destruyen los callos.

3722. L. DE WARNER.

℞ Ruibarbo. . . . . ℥j (30 gr.).
Sen. . . . . ℥ß (15 gr.).
Azafran. . . . . ℥j (4 gr.).
Regaliz. . . . . ℥ß (15 gr.).
Pasas. . . . . lbj (500 gr.).
Alcohol. . . . . lbiij (1500 gr.).

D. Una onza (30 gr.) como cordial purgante (*e. pr. ing.*).

3723. L. DE VAN SWIETEN *ó Solucion de deutocloruro de mercurio* (F. F. Y F. P.).

℞ Deutocloruro de mercurio. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Agua pura. . . . . ℥xxjx (900 gr.).
Alcohol rectificado. ℥iij (100 gr.).

Se disuelve el sublimado en el alcohol y se añade despues el agua destilada. Este licor contiene una milésima parte de su peso de sublimado corrosivo.

Nota. Se advierte que las dosis indicadas en diferentes farmacopeas para la preparacion del licor de Van Swieten, dan una solucion que contiene ℊß (25 mil.) de sublimado por ℥j (30 gr.) ó sea $^1/_{1200}$ de su peso mientras que esta fórmula lleva $^1/_{1000}$, es decir cerca de un décimo mas.

I. Sífilis, sifílides, pian. *D.* ℥ij á ℥ß (8 á 15 gr.) en ℥jv (125 gr.) de vehículo mucilaginoso.

EL LICOR DE VAN SWIETEN DE LOS H. DE M. se compone de ℊviij (4 dec.) de sublimado corrosivo, ℥xv (470 gr.) de agua destilada y ℥j (30 gr.) de alcohol á 34° B. D. ℥ij á ℥ß (8 á 15 gr.).

3724. L. DE VAN SWIETEN REFORMADO (*Mialhe*).

℞ Agua destilada. . . lbj (500 gr.).
Clorhidrato de amoniaco. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Cloruro de sodio. . . ℊxviij (1 gr.).

Bicloruro de merc. gviij (40 cent.).

M. I. Tiene las mismas proporciones de principio activo que el verdadero licor de Van Swieten, pero no tiene el inconveniente de causar dolores epigástricos; porque el sublimado, uniéndose con los cloruros alcalinos, ha perdido sus propiedades coagulantes. Cada onza (30 gr.) contiene gß (25 mil.) de sublimado.

D. Una cucharada grande, mañana y noche.

3725. L. VITAL (*J. Rucco, de Nápoles*).

℞ Hojas de ajenjo,
Tanaceto,
Dictamo blanco,
Yedra terrestre,
Genciana,
Verónica, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).

Se hierven en dos cuartillos (1000 gr.) de agua.

Angelica,
Anagálide, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).

Se infunden en un cuartillo (500 gr.) de aguardiente.

Hojas de naranjo,
Hojas de aristoloquia,
Hojas de énula campana,
Hojas de marrubio blanco,
Hojas de verónica, ãã. . ʒß (15 gr.).

Se infunde estas hojas en agua hirviendo, y por separado la misma cantidad en aguardiente; se filtra, se hace un jarabe con el producto de las infusiones y cocimientos acuosos y se le mezcla con el de las digestiones alcohólicas. Se añaden ʒij (60 gr.) de licor marcial.

I. Enfermedades con gran debilidad. *D.* ʒjv á ʒjv (15 á 125 gr.) al dia.

LIMONADAS. NARANJADAS.

3726. LIMONADA ALCOHÓLICA.

℞ Alcohol. . . . ʒij á ʒij (30 á 60 gr.).
Miel blanca. . . . . ʒj (30 gr.).
Jarabe tartárico. . . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . Ibij (1000 gr.).

I. Se usa en las enfermedades en que conviene reparar las fuerzas, como en las calenturas graves y en la convalecencia de enfermedades de larga duracion, afecciones tifoideas, delirio trémulo, hidroraquis.

3727. L. ALUMINOSA.

℞ Alumbre. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . Ibij (1000 gr.).

Se usa como profiláctica del cólico saturnino.

3728. L. DE CITRATO DE MAGNESIA (*Garot*).

℞ Hidrocarbonato de magnesia. . . . . ʒß (15 gr.).
Acido cítrico. . . . . gxxij (11 dec.).
Jarabe aromático de limon. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua una botella ó Ibß (750 gr.).

Se disuelve, se filtra y se recibe el líquido en la botella en que se hallará el jarabe. Para hacerla gaseosa, solo se echa la mitad del ácido disuelto sobre el carbonato, se pone el líquido turbio en la botella, se le añade despues la otra mitad de la solucion ácida, y se tapa bien.

3729. L. CÍTRICA.

℞ Acido cítrico. gxviij á gxxxvj (1 á 2 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . Ibij (1000 gr.).
Alcoholato de limones. . . . . c. s.

M. S. A. *I.* Calenturas ó inflamaciones en que hay mucha sed y calor. No se usa en las flegmasías de las membranas mucosas del

estómago ni de las vias nérveas.

La LIMONADA COMUN DE LOS H. M. es muy análoga á la anterior, y se diferencia en que contiene ℥j (12 dec.) de ácido cítrico cristalizado, lbjß (750 gr.) de agua comun y ℥ij (60 gr.) de jarabe simple. *D.* Para beber á pasto.

3730. L. CÍTRICA.

℞ Jarabe cítrico. . . .	℥ij	(60 gr.).
Agua.	lbij	(1000 gr.).
Alcoholato de limones.	ℊxviij	(1 gr.).

Reemplazando el jarabe por los de agracejo, cerezas, frambuesas, grosellas, limones, naranjas, manzanas ó vinagre, se obtienen unas bebidas atemperantes muy agradables y muy usadas en las calenturas inflamatorias.

Si se introduce estos líquidos en botellas fuertes con agua gaseosa simple, se pueden preparar bebidas gaseadas que tienen las mismas propiedades.

3731. L. CÍTRICA *ó Limonada vegetal comun.*

℞ Limones.	c. s.	
Jarabe simple. . . .	℥ij	(60 gr.).
Agua.	lbij	(1000 gr.).

Se exprime el zumo en agua fria y se añade el jarabe.

Añadiendo ℥ß (15 gr.) de goma, se tiene la limonada gomosa.

La LIMONADA CITRICA VINOSA se prepara añadiendo á la anterior:

Vino blanco tinto. . . .	℥iij	(90 gr.).

Del mismo modo se prepara LA NARANJADA. V. Agua de limon, n. 187.

3732. L. CLORHÍDRICA (*Martin Solon*).

℞ Acido clorhídrico. .	℥j	(4 gr.).
Agua comun. . . .	lbij	(1000 gr.).
Vino de Burdeos. . .	℥vj	(200 gr.).

M. I. Diabetes.

3733. L. COMPUESTA

℞ Jarabe de grosellas.	℥
Jarabe de frambuesas. . .	℥
Jarabe de agracejo.	℥
Agua.	ℨi

I. Calenturas inflamatorias, afecciones tifoideas, diarrea, acrodinia. *D.* A vasos.

3734. L. Ó AGUA DE CRÉMOR DE TÁRTARO.

℞ Crémor de tártaro, Azúcar, ää. . . .	℥j	(30 gr.).
Agua.	lbij	(1000 gr.).

Se filtra á las seis horas de contacto.

I. Es laxante.

Los alemanes la conocen con el nombre de *Agua cristalina.*

3735. L. CON EL CRÉMOR DE TÁRTARO.

℞ Crémor de tártaro soluble.	℥ß	(15 gr.).
Agua hirviendo. . . .	lbij	(1000 gr.).

Disuélvase. *I.* Es laxante y atemperante, y se usa en la encefalitis, etc.

3736. L. EMETIZADA.

℞ Emético.	ℊij	(4 dec.).
Azúcar.	℥ij	(60 gr.).
Limonada cítrica. . .	lbij	(1000 gr.).

M. Se usa como emeto-catártico á la dosis de medio vaso cada media hora.

I. Apoplejía, embarazo gástrico, calenturas biliosas.

3737. L. FERRUGINOSA Y ASTRINGENTE.

℞ Agua comun.	℥xx	(625 gr.).
Azúcar.	℥iv	(125 gr.).
Carbonato de hierro.	ℊjv	(2 dec.).
Carbonato de sosa. .	ℊjv	(2 dec.).
Solucion gomosa. . .	℥ij	(60 gr.).
Zumo de limon. . . .	20 gotas.	
Gas ácido carbónico, seis veces el volúmen del agua.		

I. Leucorrea antigua, flujos venéreos crónicos, infartos de las vísceras abdominales y catarros crónicos de la vejiga, cuando los enfermos están muy debilitados por estas enfermedades y no pue-

den soportar el uso de las aguas ferruginosas. *D.* Una botella al dia.

3738. L. GASEOSA.

Para cada botella de ℥xx (625 gr.) se emplean ℥iij (90 gr.) de jarabe de limon, y se aromatiza con un oleosácaro hecho frotando sobre un terron de azúcar una corteza de limon. Puede ponerse el jarabe en las botellas y llenarlas de agua gaseosa, ó cargar de gas la mezcla de agua y de jarabe. Para preparar la limonada gaseosa, es casi indispensable la llave para tapar la botella en el mismo sitio donde se llena, á causa de la viscosidad que el azúcar da al líquido.

Los fabricantes tienen cuidado de preparar la limonada gaseosa segun se necesita, porque se conserva mal.

Cuando las limonadas gaseosas deben conservarse mucho tiempo, ó por ejemplo se han de remitir á paises lejanos, deben azufrarse para que se conserven; y se consigue introduciendo en cada botella antes de llenarla de agua, una solucion que contenga gj (5 cent.) de sulfito de sosa. Entonces pueden guardar indefinidamente el sabor propio del sulfito.

De la misma manera se preparan las limonadas gaseosas con los jarabes de grosellas, frambuesas, vinagre, granadas, etc.

3739. L. GASEOSA ACÍDULA.

℞ Agua comun.	℥xx (625 gr.).
Azúcar.	℥jv (125 gr.).
Zumo de limon. . . .	20 gotas.
Solucion de goma. . .	℥ij (60 gr.).
Gas ácido carbónico, seis veces el volúmen del agua.	

I. Es antiflogística, reanima el apetito, favorece la diuresis, y es una bebida agradable y cómoda como bebida ordinaria.

3740. L. GASEOSA IODURADA (*Miathe*).

Se prepara añadiendo al agua gaseosa iodurada, una mezcla de 5vj (25 gr.) de jarabe de limon y 5vj (25 gr.) de jarabe simple.

3741. L. GASEOSA LÍQUIDA (*Chatard*).

℞ Azúcar muy blanca.	lbiij (1500 gr.).
Limones muy frescos.	número 12.
Crémor de tártaro muy puro. . . .	℥iij (90 gr.).
Agua filtrada. . . .	32 cuart. (16 lit.).

Se quita la cáscara de los limones, de modo que solo queden las células en que está contenido el zumo, se corta los limones en rebanadas muy delgadas, se quebranta el azúcar en pedazos y se la reduce á pasta grosera con las rebanadas de limones y el crémor de tártaro finamente pulverizado; por último, se echa encima el agua caliente filtrada, y se añade las cascaras de dos limones cortados en pedazos pequeños para aromatizarla. Entonces se deja macerar todo durante veinticuatro horas, meneando de cuando en cuando; se cuela despues al través de un lienzo ó de un tamiz de crin de mallas apretadas, y se echa en botellas ó mejor en cántaros de barro, que se deberán tapar herméticamente y atar con un bramante; se los bajará á la cueva, en donde se los colocará derechos. A los quince ó diez y ocho dias se verifica la fermentacion y puede beberse la limonada.

Nota. Puede reducirse la dosis del crémor de tártaro á ℥ij (60 gr.) ó aumentarse hasta ℥jv (125 gr.). La diferencia que resulta consiste en la mayor ó menor fermentacion; este movimiento es tanto mas activo, cuanto mas considerable es la dosis de esta sal;

pero es necesario emplear crémor de tártaro muy puro y no mezclado con el ácido bórico ó el borato de sosa. El azúcar debe ser tambien muy blanco; si fuese de calidad inferior, se estableceria una fermentacion tan violenta que infaliblemente se romperian los cántaros.

Si antes de embotellar el líquido de la maceracion se le mezcla con

Tintura de gengibre,
Espíritu de pimienta de la Jamaica, āā.. ʒjv (125 gr.)

se obtiene despues de la fermentacion una bebida muy semejante á la cerbeza de gengibre de los ingleses.

3742. L. GASEOSA EN POLVO.

℞ Azúcar. . . . . ʒjß (50 gr.).
Acido tartárico. . . . . grjv (3 gr.).

Se envuelve en un papel azul. Por separado se toma:

Bicarbonato de sosa. . 5ß (2 gr.).

Se guarda en un papel blanco.

Cuando se quiere hacer uso de ella, se disuelven el azucar y el ácido en lbij (1000 gr.) de agua y despues se añade la sal; se beberá interin se verifica el desprendimiento del ácido.

3743. NARANJADA GASEOSA PURGANTE.

℞ Crémor de tártaro soluble. . . . . ʒj (30 gr.).

Se disuelve en c. s. de agua, se filtra y se añade:

Jarabe de naranja. . . ʒiij (100 gr.).

Se introduce despues en una botella de agua de Seltz y se vierte despues:

Agua cargada de cuatro veces su volúmen de ácido carbónico, lbj (500 gr.).

Se tapa y ata.

Es una bebida laxante agradable. Se puede reemplazar el jarabe por el de frambuesas, groselllas, etc.

3744. L. LACTICA.

℞ Acido láctico. . ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.).
Agua comun. . . lbij (1000 gr.).
Jarabe simple. . ʒij (60 gr.).

Mézclese.

3745. L. LAXANTE.

℞ Crémor de tártaro soluble . . . . . ʒj (30 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

M. I. Embarazo gástrico, bilioso, etc. *D.* Por la mañana á vasos.

Se puede reemplazar el crémor por ʒij á ʒß (8 á 15 gr.) de tamarindos ó acederas. V. ns. 3734 y 3735.

3746. L. MAGNESIANA (*Midlhe*).

℞ Magnesia calcinada. 8
Acido cítrico. 2
Agua. 300
Jarabe de limones. 70

Se disuelve la magnesia en el ácido cítrico por medio del calor, se filtra el líquido hirviendo y se le echa en una botella en que se habrá puesto el jarabe. Esta dosis representa ʒ ß (45 gr.) de citrato de magnesia cristalizado.

3747. L. DE MANITO.

℞ Manito. . . . ʒj á ʒij 30 á 60 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒx (300 gr.).

Se disuelve y se añade c. s. de zumo de limon para hacer una bebida agradable.

Tiene un gusto muy grato y produce bastantes evacuaciones.

3748. L. MURIÁTICA.

℞ Acido clorhídrico. 5ß á 5j (2 á 4 gr.).
Azúcar,
ó Jarabe simple. . . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

I. Calenturas atáxico-adinámicas ó tifoideas, cólicos biliosos, diarreas, embarazo de las primeras vias, eczema, acne, liquen, reumatismo. *D.* A medias tazas. Para

los niños se reducirá á la mitad la dosis del ácido. V. n. 3732.

3749. L. NÍTRICA (H. M. Y H. DE M.).

℞ Acido nítrico puro. .	ʒj (12 dec.).
Agua comun.	Ibjß (750 gr.).
Jarabe simple.	℥ij (60 gr.).

M. I. Se usa como atemperante en las fiebres adinámicas, hemorragias pasivas, hemorragias uterinas, hepatitis crónica, disenteria, calenturas nerviosas petequiales, tifo, escorbuto. *D.* Un cortadillo tres ó cuatro veces al dia.

Biett la usa en las erupciones con prurito y exaltacion, liquen, eczema, algunas sifílides y blenorragias.

La LIMONADA NÍTRICA DE FORGET se compone de ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) de ácido nítrico (rara vez mas), Ibij (1000 gr.) de agua y ℥iij (100 gr.) de jarabe simple. Es muy elogiada contra la albuminuria.

3750. L. PURGANTE.

℞ Raiz de jalapa.	20
Tartrato de potasa neutro. . . .	4
Azúcar.	100
Aceite esencial de naranja. . . .	2

Se hace un eleosácaro, se añade la sal y despues la jalapa.

I. Purgante agradable, que se usa en las afecciones biliosas, embarazo gástrico, ictericia, asfixia, apoplejía. *D.* ʒijß á ʒiij (10 á 12 gr.) en Ibj (500 gr.) de naranjada que se toma á vasos.

3751. *Otra*, n. 2.

℞ Citrato de magnesia.	40
Acido cítrico.	4
Jarabe simple.	100
Tint. de cásc. frescas de limon.	2
Agua.	550

Se disuelve el citrato en agua caliente y se mezcla todo S. A.

D. Dos ó tres vasos al dia. V. número 3752.

3752. L. PURGANTE DE CITRATO DE MAGNESIA *ó citro-magnesiana* (*Garot*).

	Para 40.	Para 50.
℞ Carb. de magnesia.	15	18
Acido cítrico. . . .	23	28
Agua.	350	350

Se hace reaccionar en caliente en un vaso de vidrio ó porcelana. Verificada la reaccion se pone en un frasco y se añade:

Jarabe de limon	100
Bicarbonato de sosa.	4

Se tapa muy bien. Se puede reemplazar el jarabe de limon por el de grosellas, cerezas, frambuesas, etc.

Esta limonada no tiene color, es trasparente y de sabor agradable, sin que se presuma la presencia de una sal magnesiana que contiene en gran cantidad.

3753. L. PURGANTE GASEOSA.

℞ Citrato de magnesia.	40
Agua.	600

Se disuelve, se filtra y se añade:

Jarabe simple.	90
Alcoholato de limon.	20
Bicarbonato de sosa.	4
Acido cítrico.	5

Se tapa bien. Se toma en tres veces.

3754. L. PURGANTE GASEOSA EN POLVO, DE CITRATO DE MAGNESIA (*Cadet*).

Se toma las cantidades de ácido cítrico y de magnesia calcinada en las proporciones necesarias para representar diez dosis de ʒjß ó 50 partes de citrato magnesiano. A saber:

Acido cítrico.	260 gr.
Magnesia calcinada.	80 gr.
Acido bórico.	113 gr.

Se disuelve el ácido cítrico en Ibjv (2000 gr.) de agua destilada y se filtra.

Se pone despues en una cazuela de porcelana la magnesia y el ácido bórico, y se vierte en ella

poco á poco la solucion ácida para formar una pasta, ayudando con una espátula de vidrio; despues se extiende y diluye esta pasta vertiendo en ella el resto de la solucion; se disuelve la mezcla á la temperatura de una ebullicion sostenida. Luego que está espesa la materia se la aparta del fuego, se la reune con cuidado y se acaba de desecar en la estufa. Se pulveriza el citrato desecado.

℞ Sal anterior en polvo. 413
Azúcar blanca en polvo. 737
Ácido cítrico en polvo. 100
Bicarbonato de sosa. 50

Se mezclan exactamente, se aromatizan con la tintura de cáscaras de limon y se divide en diez frascos que contengan 130 gramos cada uno.

La base de esta limonada es un citro-borato de magnesia, que es soluble. V. la siguiente.

3755. POLVO PARA LIMONADA GASEOSA DE CITRATO DE MAGNESIA (*Maury*).

℞ Óxido de magnesio. . . 5ij (8 gr.).
Magnesia comun. . . . 5j (4 gr.).
Azúcar aromatizada. . 3jß (50 gr.).
Ácido cítrico en polvo. 3vjß (26 gr.).

Se mezcla en un mortero de porcelana.

Este polvo, puesto en una botella de agua, da á la media hora una limonada gaseosa purgante muy clara si la magnesia es pura.

3756. L. SECA PARA VIAJEROS.

℞ Ácido cítrico ó tártrico. . . . . 3j (4 gr.).
Azúcar. . . . . 3jv (125 gr.).
Esencia de limon. . . 8 gotas.

M. Se pone una cucharada de este polvo en un vaso de agua. Se prepara una naranjada seca, sustituyendo la esencia de naranja á la de limon. Cuando se reemplaza el ácido cítrico por el ácido tartárico, no es tan agradable el sabor de esta bebida.

I. Flegmasías gastro-intestinales, calenturas inflamatorias, ictericia, calentura amarilla, asténia, diarrea.

3757. L. SECA (*Fascio*).

℞ Oxalato de potasa. . . 5iij (12 gr.).
Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Esencia de limon. . . gviij (4 dec.).

I. Enfermedades inflamatorias, flegmasías agudas, gastritis, inflamacion, absceso, acrodinia, diabetes, diarrea, liquen. *D.* 3j (30 gr.) en lbj (500 gr.) de agua, que se toma á medias tazas.

3758. L. SOLUTIVA (F. P.).

℞ Pulpa de tamarindos, Maná,
Cáscara de limon, ãã. 3ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . 3x (320 gr.).

Se macera y se menea hasta que se disuelva bien.

3759. L. SULFÚRICA Ó MINERAL.

℞ Agua. . . . . lbij (1000 gr.).
Azúcar. . . . . 3ij (60 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . 36 gotas ó c. s. para dar un sabor agradable.

I. Calenturas adinámicas, hemorragias pasivas, calenturas inflamatorias, biliosas ó atáxicas, ictericia, urticaria, liquen, hemorragias, diabetes, absceso, eczema, delirio trémulo, congestion, diarrea, cólicos. *D.* A vasos.

3760. L. SULFÚRICA.

℞ Ácido sulfúr. á 66°. 5j (4 gr.).
Agua comun filtrada. . . . . lbiij (1500 gr.).

M. I. Se usa como preservativo de los cólicos de plomo, en las hemorragias pasivas, fiebres graves, etc. *D.* A vasos en el dia.

Nota. Debe endulzarse cada vaso en el momento de tomarle con 3j (30 gr.) de jarabe de goma.

La LIMONADA SULFÚRICA DE LOS H. M. contiene 9j (12 dec.) de ácido sulfúrico concentrado, lbjß (750 gr.) de agua

comun y ℥ij (60 gr. de jarabe simple.
I. y D. Las mismas que la anterior.

3761. L. SULFÚRICA SIMPLE (H. DE M.).

℞ Agua comun. . . . . Ibjß (750 gr.).
Acido sulfúrico á 66°. 20 gotas.
Jarabe simple. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Es atemperante y ligeramente astringente. V. ns. 3759 y 3760.

3762. L. SULFÚRICA HORDEADA (H. DE M.).

℞ Cocim. de cebada. . Ibjß (750 gr.).
Acido sulf. de 66°. . 20 gotas.
Jarabe simple. . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Se usa como atemperante.

3763. L. DE TARTRATO DE MAGNESIA (*Garnier*).

℞ Carbonato de magnesia comun. . 15
Acido tártrico. 22
Agua. 600
Se disuelve, se filtra y se endulza con 60 partes de jarabe tártrico aromatizado con naranja ó limon.

El tartrato preparado asi tiene poco sabor y es purgante, lo mismo que el citrato.

3764. L. DE BOROTARTRATO DE MAGNESIA.

℞ Borotartrato de potasa y magnesia. . . . . ℥j (30 gr.).
Acido cítrico. . . . . 3ß (2 gr.).
Jarabe aromatizado con limon. . . . . ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . ℥v (300 gr.).

3765. L. TÁRTRICA *ó Tisana con jarabe tártrico* (F. F.).

℞ Jarabe tártrico. . . . ℥ij (64 gr.).
Agua. . . . . ℥xxx (930 gr.).
M. Esta limonada refrigerante es bastante agradable, y deberia preferirse á otras muchas bebidas ácidas porque es poco irritante. Tal vez es laxante cuando se toma en gran cantidad.

I. Flegmasías agudas, calenturas inflamatorias, absceso, liquen, eczema, diabetes, cólicos, diarreas, congestion, apoplejía. *D.* A tazas.

3766. L. TÁRTRICA SECA (H. DE AL.).

℞ Acido tártrico. . . . . ℥ij (60 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de limon. . . . 8 gotas.
M. D. ℥j á 3ß (12 dec. á 2 gr.) en Ibß (250 gr.) de agua.

3767. L. VEGETAL *ó Limonada cocida.*

℞ Limon. . . . . número 1.
Se le corta en rebanadas, y se le infunde en
Agua hirviendo. . . . Ibj (500 gr.).
Se añade:
Azúcar. . . . . ℥iij (100 gr.).
I. Enfermedades inflamatorias, flegmasías, gastritis, gastro enteritis, acrodinia, diabetes. *D.* A medias tazas. V. *Agua de limon.*

3768. L. VINOSA.

℞ Vino tinto. 8
Agua. 22
Jarabe. 2
M. I. Afecciones atónicas, etc. *D.* A vasos.

3769. *Otra*, n. 2.

℞ Vino blanco,
Agua, ää. . . . . Ibj (500 gr.)
Alcohol,
Jarabe tártrico, ää. . . ℥j (30 gr.).
I. Afecciones atónicas. *D.* A medias tazas.

3770. L. VINOSA ALCOHÓLICA.

℞ Vino blanco. . . . . Ibj (500 gr.).
Agua. . . . . Ibj (500 gr.).
Alcohol. . . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe tártrico. . . . ℥ij (60 gr.).
Se usa como la limonada alcohólica.

LINIMENTOS.

3771. L. DE ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton. 1
Aceite comun. 5

M. Se usa como revulsivo en fricciones varias veces al dia. Produce un exantema pustuloso que durante algunos dias deja fluir un licor amarillento, y despues vuelve la piel á su estado natural.

3772. *Otro*, n. 2.

℞ Aceite de croton. . . ℊj (50 cent.).
Carbonato de sosa. . ℊxviij (4 gr.).
Esencia de trementina. . . . . ℊlv (3 gr.).

I. Reumatismo crónico, ronquera, afonía, pleuresía, pleurodinia, asma, asfixia, bronquitis, cardítis, crup, adenitis, gastralgias, disenteria, estreñimiento, envenenamiento, neuralgia. *D.* En dos fricciones ó una aplicacion, y en los casos en que se quiera producir una rubefaccion revulsiva.

3773. L. DE ACONITINA (*Turnbull*).

℞ Aconitina. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Aceite comun. . . . ℊxxxvj (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).

M. I. Afecciones nerviosas, catarata reciente, ciertas afecciones del oido. *D.* En fricciones dos ó tres veces al dia.

3774. *Otro*, n. 2.

℞ Aconitina. . . . . ℊjx (50 cent.).
Aceite comun. . . . ℥ß (2 gr.).
Manteca de cerdo. . . ʒv (20 gr.).

M. I. Amaurosis, iritis, opacidad de la córnea, catarata capsular. *D.* En fricciones, mañana y noche, en las cejas, párpados y globo del ojo. Reumatismo, ciática, otalgia, histeralgia, dolores osteocopos, hidroraquis. En fricciones en las partes afectadas.

3775. L. AFRODISIACO.

℞ Aceite de manzanilla. . ℥ij (60 gr.).
Aceite de laurel. . . . . ℥j (30 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . ℥ß (15 gr.).
Tintura de mirra,
Tintura de acibar,
Ambar, ãã. . . . . c. s.

I. Paralisis momentánea de los órganos genitales, fetidez de las narices. *D.* En fricciones en el perineo y en el pubis al acostarse.

3776. L. DE AJO.

Se machaca el ajo con partes iguales de manteca; se frota las plantas de los piés y se aplica bajo la forma de emplasto.

Bucban le recomienda contra la coqueluche y las toses pertinaces.

3777. L. ALCALINO (*Plenck*).

℞ Carbonato de potasa líquido. . . . . ℥ij (60 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥v (125 gr.).
Yema de huevo. . . . número 2.

Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

I. Grietas del ano, vegetaciones sifilíticas.

3778. L. ALCANFORADO (*Fournier*).

℞ Aceite comun. . . . . ℥ij (60 gr.).
Amoniaco líquido,
Alcanfor, ãã. . . . . ℥ij (8 gr.).

M. S. A. *I.* Reumatismo. *D.* La misma que los siguientes.

3779. *Otro* (H. DE M.).

℞ Ungüento de altea,
Aceite comun, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈ß (6 dec.).

Se pulveriza el alcanfor con dos gotas de alcohol y se disuelve en

el aceite; se añade este poco á poco al ungüento, agitando á cada adicion á fin de que la mezcla resulte homogénea.

I. Infartos é induraciones del tegido celular. *D.* En fricciones.

3780. *Otro* (H. M.).

℞ Linimento amoniacal. . ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).

M. S. A. *I.* Reumatismo. *D.* La misma que la siguiente.

3781. *Otro* (VAYDI).

℞ Aceite comun
ó Aceite de almendras. : . ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Sarna, etc. *D.* C. s. para fricciones en las partes en que hay granos.

Nota Este linimento cura en doce ó quince dias.

El LINIMENTO DE ALCANFOR DE LA F. DE L. se compone de ℥j (30 gr.) por ℥jv (125 gr.) de aceite comun.

3782. L. ALCANFORADO ANODINO (H. DE M.).

℞ Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Esencia de trementina,
Láudano líquido, ää. . . ʒij (8 gr.)
Bálsamo tranquilo. . . . ℥ij (60 gr.).

Se disuelve el alcanfor en el bálsamo tranquilo y se añade los demás componentes. Se agitará bien al tiempo de hacer uso de él.

I. Vómito espasmódico, iscuria. *D.* En fricciones en el epigastrio ó sobre el pubis.

3783. L. ALCANFORADO Y OPIADO.

℞ Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Esencia de manzanilla. . ℥j (30 gr.).
Láudano de Sydenham. . ʒij (8 gr.).
Aceite de beleño. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Reumatismo, ceática, contusiones, quemaduras, sabañones, fracturas, congelacion, espasmos, crup, insomnio, ablactacion, apoplejia, esceleroma, efidrosis, torticolis, bocio, tialismo, gastralgia, cardiopalmia, histeralgia, metritis, cistitis, calenturas tifoideas, envenenamiento. *D.* En fricciones mañana y noche.

3784. *Otro*, n. 2.

℞ Bálsamo tranquilo,
Aceite blanco, ää. . . . ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).
Láudano de Sydenham. . ℥j (4 gr.).
Mézclese.

3785. *Otro* (LEVACHER).

℞ Alcohol alcanforado. . ℥iij (100 gr.).
Amoniaco líquido. . . ʒvj (25 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒvj (25 gr.).

M. I. Se usa en las Antillas en los casos de tétanos.

3786. L. ALUMINOSO.

℞ Alumbre. . . . . ʒß (15 gr.).
Clara de huevo. . . . número 1.
Aguardiente alcanforado. ʒx á ℥ij (40 á 60 gr.).

M. I. Escoriaciones por permanecer mucho tiempo en la cama, sabañones, intertrigo, eritema, astenia, reumatismo, amaurosis. *D.* Se aplica á la parte enferma.

3787. L. AMONIACAL, *Linimento volátil ó jaboncillo amoniacal* (F. E., F. F. Y F. P.).

℞ Aceite comun. . . . . ℥ij (64 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ʒij (8 gr.).

Se mezcla en una vasija tapada y se agita al tiempo de usarle.

I. Sarna, infartos crónicos de las articulaciones, ascitis, dolores reumáticos, angina linfática, parálisis, neuralgia, ceática, tumores lácteos, tumores atónicos de los testículos, bubones, oftalmia reumática. *D.* ʒij (8 gr.) en friccion por la noche.

Nota. Este linimento cura la sarna en doce ó quince dias.

El LINIMENTO AMONIACAL DE LOS H. DE M. se compone de ℥j (30 gr.) de aceite comun y ʒß (2 gr.) de amoniaco líquido á 22°.

3788. L. AMONIACAL ALCANFORADO (H. DE M.).

℞ Aceite comun. . . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈j (12 dec.).
Amon. líquido de 22°. ℥ß (2 gr.).
Se disuelve el alcanfor en el aceite, se añade el amoniaco y se agita.

I. Reuma crónico, infartos lácteos. *D.* En fricciones.

3789. L. AMONIACAL CANTARIDADO.

℞ Linimento amoniacal. . ℥j (30 gr.).
Tintura de cantáridas,
Tintura aromática,
Aceite de romero, ää. ℊxc (5 gr.).
H. S. A. *I.* Reumatismo crónico, lumbago, ciática, cólera, hidrofobia, parálisis, hipocondría, aftas, torticolis, torceduras, entropion, cretinismo, atrofia, esclerema, neumatosis, envenenamiento, espasmo, cólera. *D.* En fricciones.

3790. *Otro* (H. DE ITALIA).

℞ Tintura de cantáridas. . ℥iij (12 gr.).
Alcanfor . . . . . ℥j (4 gr.).
Linimento volátil. . . . ℥jß (45 gr.).
M. I. Parálisis.

3791. L. AMONIACAL ESTIBIADO.

℞ Linimento amoniacal. ℥ij (8 gr.).
Tártaro emético. . . ℊxviij (1 gr.).
Trementina. . . . . ℥j (4 gr.).
M. I. Reumatismo, lumbago, ciática. *D.* En fricciones.

3792. L. AMONIACAL FÉTIDO.

℞ Amoniaco líquido. 30
Aceite animal de Dippel. 10
Aceite de manzanilla. 70
I. Reumatismo, histérico, hipocondría, cólicos ventosos, timpanitis atónica, neumatosis, espasmos, torceduras, contusiones. *D.* En fricciones al abdómen, etc.

3793. L. AMONIACAL CON PETRÓLEO.

℞ Amoniaco líquido. . . ℥j (30 gr.).
Petróleo. . . . . ℥ß (15 gr.).
I. Inflamaciones atónicas, espasmos, cólico nervioso, disentería, neumatosis, apoplejía, calenturas intermitentes, hipocondría, parálisis, meningitis, entropion, envenenamiento. *D.* En fricciones en el punto dolorido.

3794. L. AMONIACAL DE NUEZ VÓMICA.

℞ Tintura de nuez vómica. . . . . ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . ℥ijß (10 gr.).
M. I. Cólera, parálisis, corea, artritis, reumatismo, gota, atrofia, disenteria, meningitis, diabetes, enuresis, hidrofobia. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

3795. L. AMONIACAL SULFURADO.

℞ Amoniaco líquido. . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈ß (2 gr.).
Sulfuro de potasa. . . ℥ß (15 gr.).
Aceite ℈comun. . . . . ℥vj (200 gr.).
I. Tiña, sarna, prurigo, parálisis, apoplejía, espasmos, calenturas intermitentes, angina, beriberi, disentería, meningitis, hidrocéfalo, hipocondría, artritis, artrocace, sífilis, diabetes, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3796. L. AMONIACAL TREMENTINADO.

℞ Linimento amoniacal. . ℥jß (45 gr.).
Esencia de trementina. ℥ß (15 gr.).
Mézclese.

3797. *Otro*, n. 2.

℞ Aceite de manzanilla,
Aceite de beleño,
Esencia de trement., ää. ℥ij (60 gr.).
Amoniaco líquido,
Tintura de pimienta de Guinea, ää. . . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ß (15 gr.).

M. I. Gota asténica, reumatismo crónico, lumbago, artrodinia, ceática, edema, neuritis, neurosis, parálisis, acrodinia, artrocace, pleurodinia, cistitis, meningitis, apoplejía, tétanos, diabetes, entropion, angina, calenturas intermitentes, neumatoses, hipocondría, ictericia, ictiosis, acne, soriasis, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3798. L. ANODINO.

℞ Aceite de beleño,
Aceite de haba de San Ignacio, āā. . . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . 5j (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . . 5jß (6 gr.).
Tintura de opio. . . . . 5ij (8 gr.).

I. Espasmos, calambres, parto laborioso, metritis, peritonitis, calentura puerperal, tos, catarro vexical, catarro bronquial, histeralgia, tialismo, congelacion, neuralgias, lumbago, dentición difícil, dolores osteocopos, insomnio, cistitis, histérico, hipocondría, neumatosis. *D.* En fricciones.

3799. *Otro*, n. 2.

℞ Tintura de opio. 1
Aceite comun. 8

Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

D. Se usa en fricciones en las partes doloridas.

3800. *Otro*, n. 3.

℞ Ungüento populeon,
Aceite comun,
Bálsamo tranquilo, āā. 5v (20 gr.).
Láudano de Rousseau. . 5ß (2 gr.).

I. Dolores reumáticos, hemorroides.

3801. *Otro* (CAZENAVE).

℞ Extr. de belladona. 3ij (8 gr.).
Agua de cal. . . . . ℔ß (250 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . ℥jv (125 gr.).

I. Superficies inflamadas del eczema, pórrigo, impétigo. *D.* En unturas.

3802. *Otro* (BOYER).

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ℥ij (60 gr.).
Bálsamo tranquilo. . . ℥ij (60 gr.).
Ungüento de altea. . ℥j (30 gr.).
Extr. acuoso de opio. 3ijß (10 gr.).

I. Dolores violentos, sobre todo cuando son de naturaleza nerviosa. *D.* En fricciones en los puntos doloridos.

3803. *Otro* (H. M.).

℞ Aceite comun. . . . . ℥ij (61 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
Tintura vinosa de opio. 3j (4 gr.).

Mézclese exactamente. Se le agita antes de usarle.

I. Reumatismo.

3804. L. ANODINO Y RESOLUTIVO (*Dupuytren*).

℞ Extracto de beleño. . 5ß (2 gr.).
Jabon blanco. . . . . 3ij (8 gr.).
Aceite de lirio. . . . ℥vj (180 gr.).

M. I. Infartos glandulares. *D.* Una cucharada para cada friccion.

3805. L. ANTIAFTOSO.

℞ Alumbre calcinado. . ℊxviij (1 gr.).
Goma laca. . . . . 5jß (6 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Aftas, grietas, ulceraciones de la boca. *D.* En fricciones.

3806. L. ANTIARTRITICO.

℞ Alcanfor. 1
Aceite de trementina. 10

Disuélvase. *I.* Afecciones reumáticas crónicas, gota, etc. *D.* En fricciones.

3807. *Otro* (DESBOIS DE ROCHEFORT).

℞ Aceite,
Agua triacal, āā. . . . . ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . 3ij (8 gr.).
Láudano líquido. . . . 5j (4 gr.).

M. S. A. *D.* 5j á 3ij (4 á 8 gr.) en fricciones, mañana y noche.

3808. L. ANTIARTRÍTICO (*Home*).

℞ Alcanfor. . . . . ℥ij (24 dec.).
Esencia de trement. ʒij (8 gr.).
Jabon negro. . . . . ʒj (30 gr.).
Ungüento nervino. . ʒß (15 gr.).
Semillas de comino en polvo. . . . . ʒij (8 gr.).
Carbonato de amoniaco. . . . . ℈xv (75 cent.).

Se disuelve el alcanfor en la esencia de trementina y despues se mezcla todo S. A.

I. Afecciones gotosas ó reumáticas crónicas, ciática, gota, artritis, lumbago, eczema, calenturas intermitentes, torceduras, apoplejía, atrofia, cólera, disentería, peritonitis, meningitis. *D.* La misma que el anterior.

3809. *Otro* (TURCK).

Se preparan primero lejías de potasa cáustica de 2, 4, 6, 8, 10 y 12° Beaumé, en las que se disuelve alúmina recien precipitada (alumbre por medio del amoniaco líquido) en c. s. para hacer desaparecer la reaccion alcalina del licor, ó por mejor decir hasta la completa saturacion.

Para diez botellas de licor así saturado (de cualquier grado que sea) se toma:

℞ Goma arábiga. . . . . ℥x (320 gr.).
Trement. de Venecia. ℥vj (200 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥vj (200 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥iij (100 gr.).

y con una yema de huevo se hace una emulsion que se reparte exactamente en las diez botellas, á las que se añade aun:

Esp. de vino de 36° B. ℔ß (250 gr.)

en el cual se disuelve todo el alcanfor posible.

Se conservará esta mezcla en botellas tapadas con cuidado, y se agitará al tiempo de usarla.

La botella contendrá ℔jß (750 gr.). Se prescribe el remedio de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6° segun la intensidad del mal.

3810. L. ANTIASMÁTICO (*Graves*).

℞ Ácido acético fuerte. ʒß (2 gr.).
Esenc. de trementina. ʒiij (12 gr.).
Agua de rosas. . . . . ʒjß (6 gr.).
Aceite de limon. . . . algunas gotas.
Yema de huevo. . . . c. s.

M. S. A. *I.* Se usa en fricciones por medio de una esponja en la nuca, lados del cuello y en la parte anterior del pecho.

3811. L. ANTICOLÉRICO.

℞ Esencia de menta pip. ℈jv (3 gr.).
Tintura tebáica. . . . ʒj (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒjß (6 gr.).
Aceite de beleño. . . ʒij (60 gr.).

M. I. Cólera, vómitos espasmódicos. *D.* En fricciones al vientre y al epigastrio.

3812. L. ANTIEPSÓRICO.

℞ Jabon negro. 2
Agua comun. 2

Se disuelve y se incorpora poco á poco:

Azufre sublimado. 1

Se mezcla y se agita al tiempo de usarle.

3813. *Otro* (H. DE IT.).

℞ Cal viva,
Flores de azufre, ãã. . ʒij (60 gr.).
Aceite comun. . . . . c. s.

M. I. Sarna, herpes. *D.* En fricciones mañana y noche.

3814. L. ANTIHERPÉTICO (*Neumann*).

℞ Cloruro de cal. . . . ℈xviij (9 dec.).
Carbon preparado. . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . c. s.

I. Herpes. *D.* Se menea con cuidado antes de usarle.

3815. L. ANTIESPASMÓDICO DE SELLE (H. DE M.).

℞ Ungüento de altea. . . ʒij (60 gr.).
Alcanfor,
Láudano líquido, ãã. . ʒj (4 gr.)

Se pulveriza el alcanfor por me-

dio del alcohol, se mezcla con el ungüento y se añade el láudano.

I. Es muy eficaz en todas las afecciones espasmódicas de los intestinos, á saber, la gastralgia, enteralgia, cólicos, en las pleuresías y dolores reumáticos. Se unta el bajo vientre con algunas dracmas de este linimento y se cubre despues con una bayeta caliente ó cataplasma emoliente.

3816. L. ANTIESPASMÓDICO. (*Chrestien*).

℞ Aguardiente. . . . . ℥xij (375 gr.).
Acetato de potasa. . ℥jv (125 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒv (20 gr.).
Extracto de opio. . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Cólico nervioso. *D.* En fomentos al abdómen.

3817. *Otro* (SIEBOLD).

℞ Tintura amoniacal anisada. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcoholato de espliego. ʒjv (16 gr.).

M. I. Hipo de los niños. *D.* Dos fricciones al dia sobre el pecho y vientre de los niños.

3818. *Otro* (WEBER).

℞ Opio puro,
Aceite de manzanilla, ãã. ʒß (2 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Espasmos de los párpados. *D.* En fricciones al rededor de los ojos.

3819. L. ANTIGOTOSO (*Boubée*).

℞ Aceite alcanforado. . ʒjv (125 gr.).
Aceite de croton. . . . ℈x (5 dec.).
Aceite animal de Dippel. . . . . ʒß (2 gr.).

Disuélvase. *I.* Dolores vagos y tumefacciones gotosas que resisten al uso de los antiflogísticos internos.

3820. L. ANTIHELMÍNTICO.

℞ Santónico,
Valeriana, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.

para obtener ℔ß (250 gr.) de infusion, á la que se añade:

Asa fétida. . . . . ʒj (4 gr.)

triturada en una yema de huevo.

3821. *Otro* (BRERA).

℞ Hiel de buey,
Jabon amigdalino, ãã. ʒj (4 gr.).

Se mezcla y se añade:

Aceite de tanaceto. . ʒjv (125 gr.).

H. S. A. Se usa en fricciones en la region umbilical.

3822. *Otro* (DUBOIS).

℞ Aceite rancio de nuez. ʒij (90 gr.).
Ajos machacados. . . . número 3.
Alcohol alcanforado. . ʒij (60 gr.).
Bálsamo de Fioraventi. ʒj (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ʒj (4 gr.).

Se hace la mezcla en un mortero de mármol, se echa en un frasco, se añade el amoniaco y se tapa bien.

D. Se frota el vientre del enfermo mañana y noche con parte de este linimento, despues de haber agitado bien el frasco.

3823. L. ANTIHEMORROIDAL (*Andry*).

℞ Aceite de olivas,
Miel,
Trementi. de Venecia, ãã. ʒj (30 gr.).

M. S. A. *D.* Se usa la cantidad suficiente para cubrir muchas veces al dia los tumores hemorroidales y sabañones. Se menea al tiempo de usarle.

3824. *Otro* (H. M.).

℞ Ungüento populeon. . . ʒj (30 gr.).
Tintura vinosa de opio. ʒij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

M. I. Tumores hemorroidales dolorosos. *D.* C. s. para fricciones. Se aplica por medio de una planchuela de hilas.

3825. L. ANTINEURÁLGICO (*Jung*).

℞ Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).

Acetato de morfina. . . ʒj (30 gr.).
Linimento jabonoso alcanforado. . . . . ʒij (60 gr.).

H. S. A una mistura muy homogénea.

I. Es eficaz en las neuralgias ó irritacion intestinal. *D.* En fricciones sobre la parte enferma muchas veces al dia.

3826. L. ANTIHEMORROIDAL (*Ware*).

℞ Nuez de agalla en polvo. ʒij (8 gr.).
Alcanfor en polvo. . . . ʒj (4 gr.).

Se mezcla é incorpora en

Cera liquidada. . . . . ʒj (30 gr.).

Se añade S. A.

Alcoholado de opio. . . . ʒij (8 gr.).

D. Dos ó tres unturas al dia.

3827. *Otro* (H. DE M.).

℞ Ungüento populeon. . . ʒij (60 gr.).
Láudano líquido. . . . ʒß (2 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.
Sal de Saturno. . . . . ϑß (6 dec.).

Se mezcla las yemas con el ungüento y el acetato, se añade despues el láudano y se agita perfectamente la mezcla.

I. Se usa cuando los síntomas inflamatorios han disminuido.

3828. L. ANTINEUROPATICO DEL DOCTOR RANQUE.

Véase *Tratamiento del cólico de plomo por el doctor Ranque.*

I. Cólico saturnino, neurosis, neuralgias.

3829. L. ANTIOFTÁLMICO (*Plenck*).

℞ Agua de rosas. . . . . ʒj (30 gr.).
Sulfato ácido de alúmina en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 1.

Se funde el alumbre en el agua, se añade la yema de huevo y se cuela la mezcla.

I. Oftalmias que han llegado á su declinacion y enfermedades crónicas de los párpados. *D.* Muchas aplicaciones ligeras en el discurso del dia.

3830. L. ANTIPERIÓDICO.

℞ Esencia de trementina. ʒjv (125 gr.).
Láudano de Rousseau. ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes rebeldes al sulfato de quinina ó no rebeldes. *D.* Dos cucharadas en fricciones en la columna vertebral mañana y noche durante la apirexia.

3831. *Otro* (SCHUSTER).

℞ Sulfato de quinina. . . ʒß (2 gr.).
Tártaro emético. . . . ℈vj (3 dec.).
Extr. acuoso de opio. ℈xij (6 dec.).
Alcohol alcanforado. . ʒij (60 gr.).

I. Calenturas intermitentes perniciosas, neuralgias periódicas, gota y reumatismo periódico, envenenamiento. *D.* ʒijß (10 gr.) ocho veces al dia y en fricciones en el epigastrio.

3832. L. ANTIREUMATICO (H. DE M.).

℞ Jabon comun. . . . . ʒß (15 gr.).
Aguardiente de 18°. . . ʒij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ϑj (12 dec.).

M. D. La misma que la del siguiente. V. n. 3938.

3833. *Otro* (TORTUAL).

℞ Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Aceite de cajeput. . . . ʒij (8 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒj (32 gr.).

M. I. Dolores reumáticos. *D.* Dos ó tres fricciones al dia.

3834. L. ANTISÉPTICO (*Behrends*).

℞ Alcanfor. . . . . ʒjß (6 gr.).
Carbon de boj en polvo,
Quina en polvo, ää. . . ʒj (30 gr.).
Esencia de trementina rectificada. . . . . c. s.

M. S. A. *I.* Gangrena, úlceras pútridas. *D.* Dos ó tres unturas al dia.

*

3835. L. AROMATICO.

℞ Amon. liquido. ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).
Espíritu de espliego. ʒij (60 gr.).
Espir. de enebro. . . ʒjß (45 gr.).
Mézclese bien. *I.* Cólera.

3836. *Otro* (ROSEN).

℞ Alcohol de enebro. . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de clavo,
Aceite espeso de nuez moscada, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
M. S. A. *I.* Lienteria, diarrea de los niños producida por atonía, enfermedades convulsivas, como el baile de San Vito; astenia de la matriz y hemorragias uterinas. *D.* ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) para fricciones en las diferentes partes con que se corresponden los órganos afectados.

3837. L. ARSENICAL (*Swediaur*).

℞ Aceite comun. . . . . ʒj (30 gr.).
Oxido de arsénico. . . . gij (1 dec.).
M. S. A. *I.* Ulceras cancerosas, úlceras de mal carácter, afecciones cutáneas rebeldes, parálisis, sífilides, anestesia, cáncer, etc. *D.* C. s. para una aplicacion muy ligera hecha con mucha prudencia.

3838. L. ASTRINGENTE (*Knachstedt*).

℞ Extracto de Saturno,
Aceite de beleño, ãã. . . . . c. s. q.
Agua de rosas. . . . . c. s.
Mézclese por trituracion.
I. Quemaduras en segundo, tercero ó cuarto grado. *D.* Se aplica por medio de compresas finas.
Cuando supuran mucho se puede usar el ungüento de zinc con mirra.

3839. *Otro* (SCHWARTZ).

℞ Extracto de Saturno. ʒj (30 gr.).
Aceite de linaza. . . . lbß (250 gr.).
Clara de huevo. . . . número 6.
Se bate todo.
I. Recomendado en las quemaduras.

3840. L. BALSÁMICO (*Dennemann*).

℞ Goma arábiga en polvo. ʒij (8 gr.).
Aceite de alm. dulces. . ʒjß (6 gr.).
Bálsamo negro del Perú. ʒj (4 gr.).
Agua destilada de rosas. ʒj (30 gr.).
M. S. A. *I.* Grietas del pecho en las nodrizas. *D.* Seis ó siete aplicaciones al dia. Se lava el pezon con agua tibia antes de dar de mamar.

3841. L. BARÍTICO.

℞ Agua de barita saturada en frio. 1
Aceite comun. 6
M. I. Herpes, tiña.

3842 L. DE BAUMÉS.

℞ Aceite de belladona. . . ʒjß (45 gr.).
Agua de cal. . . . . ʒiij (90 gr.).
Cerato de Galeno . . . . ʒv (20 gr.).
Clorhidrato de morfina. gx (5 dec.).
I. Erupciones vesiculosas ó purovesiculosas, acompañadas de alguna irritacion.

3843. L. DE BECK.

℞ Alcoholato de espliego,
Alcoholato de sérpol, ãã. ʒij (60 gr.).
Eter sulfúrico. ʒij á ʒiij (8 á 12 gr.).
Mézclese por agitacion. *I.* Vértigos nerviosos. *D.* Se hacen lociones, muchas veces al dia, en la frente y en las sienes.

3844. L. DE BELLADONA (*Sordet*).

℞ Extracto de belladona. . ʒj (30 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒij (60 gr.).
I. Se usa para facilitar la reduccion de las hernias estranguladas. *D.* En unturas frecuentes. En los intervalos se cubre el tumor con cataplasmas emolientes y narcóticas.
Nota. No es posible ejecutar esta fórmula.

3845. L. DE BENJUÍ.

℞ Tintura de benjuí. . 5j (4 gr.).
Tintura de bálsamo del Perú. . . . . ℥xviij (1 gr.).
Aceite de almendras dulces.
Agua de rosas, aã. . ℥j (30 gr.).
M. S. A. *I.* Plica, sabañones, neumatoses, gota, lumbago. *D.* En fricciones.

3846. L. BORATADO (*Harless*).

℞ Borax. . . . . 5j (4 gr.).
Yema de huevo,
Clara de huevo, aã. . . 5ij (8 gr.).
Aceite de almendras dulc. ℥j (30 gr.).
Bálsamo negro del Perú. 5jß (6 gr.).
M. I. Grietas del pezon. *D.* Tres ó cuatro aplicaciones al dia.

3847. L. CALCAREO *ó Jabon calizo* (F. F.).

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ℥ij (64 gr.).
Agua de cal. . . . . lbj (500 gr.).
Se agita en una botella, se deja aposar y se separa la masa blanda jabonosa que sube á la superficie.
I. Se usa como dulcificante y resolutivo contra las quemaduras en primer grado, es decir con rubefaccion pero sin elevacion de la epidermis. *D.* C. s. para cubrir ligeramente un pedazo de lienzo fino ó de papel de estraza muy delgado.

3848. L. CALMANTE.

℞ Alcanfor. . . . . 5ij (7 gr.).
Esencia de manzanilla. ℥ß (15 gr.).
Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
I. En fricciones en el epigastrio contra los vómitos, y en el pubis contra la iscuria.

3849. *Otro* (JUNG).

℞ Extracto de belladona. 5j (4 gr.).
Acetato de morfina. . . ℥vj (3 dec.).
Jabon blando. . . . . ℥j (30 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥j (30 gr.).
I. Irritacion espinal y ciertas neuralgias. *D.* En fricciones en la columna vertebral.

3850. L. CALMANTE Y RESOLUTIVO (*Boyer*).

℞ Bálsamo de Fioraventi,
Alcohol de enebro,
Agua triacal, aã. . . . ℥ij (60 gr.).
Aceite de clavo. . . . . 3j (4 gr.).
Láudano de Rousseau. ℥iij (12 gr.).
I. Dolores reumáticos.

3851. L. CANTARIDADO.

℞ Linimento amoniacal. ℥iij (90 gr.).
Alcanfor en polvo. . . ℥iij (12 gr.).
Tintura de cantáridas. 20 á 30 gotas.
Se agitará al tiempo de usarle.
I. Es estimulante enérgico que se usa en la parálisis, etc. *D.* En fricciones.

3852. *Otro.* n. 2.

℞ Tintura de cantáridas. ℥j (30 gr.).
Alcohol alcanforado. . ℥ij (60 gr.).
M. I. y *D.* Se usa en fricciones sobre los miembros paralíticos y sobre las partes que se quiere estimular.

3853. *Otro*, n. 3.

℞ Tintura de cantáridas. ℥ijß (10 gr.).
Alcohol alcanforado. . ℥j (30 gr.).
Mostaza en polvo. . . ℥xc (15 gr.).
Alcoholato de espliego. ℥j (30 gr.).
Aceite de laurel. . . . ℥jß (50 gr.).
M. I. Reumatismo crónico, ciática, lumbago, parálisis, sarcocele, meningitis, peritonitis. *D.* En fricciones dos veces al dia.

3854. L. DE SESQUICARBONATO DE AMONIACO (F. DE L.).

℞ Solucion de sesquicarbonato de amoniaco. ℥j (30 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥ij (90 gr.).
M. Se agitan ambos líquidos hasta que estén bien mezclados.
I. Es excitante y se usa en fricciones.

3855. L. DE CARBURO DE AZUFRE.

℞ Carburo de azufre. . . . ℥ß (15 gr.).

Alcanfor. . . . . 5ij (8 gr.).
Alcohol. . . . . ℥j (30 gr.).
ó Aceite de almendras dulc. ℥j (30 gr.).

I. Reumatismo, gota apirética, tofo artrítico, artrocace, gastralgia, aborto, parto laborioso. *D.* En fricciones.

3856. L. CARMINATIVO (*Writt*).

℞ Bálsamo anodino de Bath. . . . . ℥j (30 gr.).
Aceite de macis. . . . . ʒß (15 gr.).
Esencia de yerbabuena. 3ij (8 gr.).
Mézclese perfectamente.

D. Una cucharada para frotar el epigastrio, cuando el enfermo se va á acostar.

3857. L. CIANURADO (*Caspari*).

℞ Cianuro de sodio. . . ℈j (12 dec.).
Láudano de Sidenham. ℈ij (24 dec.).
Manteca. . . . . 5iij (12 gr.).

I. Peritonitis puerperal acompañada de accidentes convulsivos. *D.* En unturas al abdómen.

3858. L. CLOROSO (*Deimann*).

℞ Hidrocloro medicinal. . 60 gotas.
Aceite comun. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Sarna inveterada, tiña anular, tiña favosa, úlceras atónicas, úlceras de mal carácter, manchas cutáneas á consecuencia de pústulas venéreas consecutivas. *D.* Dos ó tres aplicaciones al dia.

3859. L. CLORURADO (*Kopp*).

℞ Cloruro de cal líquido. ʒvj (24 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥jß (48 gr.).

M. I. Sarna inveterada, tiña, úlceras de mal carácter. *D.* Dos ó tres aplicaciones al dia.

3860. L. CONFORTANTE (*Dubois*).

℞ Bálsamo de Fioraventi,
Alcohol alcanforado,
Aceite de almendras dulces,
Amoniaco líquido, ää. . ℥ij (60 gr.).

I. Infartos de las glándulas linfáticas. *D.* En fricciones.

3861. L. CONTRA LAS ALMORRANAS.

℞ Ungüento populeon. . . ℥j (30 gr.).
Aceite de sucino. . . . . 5ij (8 gr.).

M. I. Mitiga el dolor de las almorranas endurecidas.

3862. L. CONTRA LA ASCITIS (*Lippich*).

℞ Bálsamo opodeldoc,
Ungüento de altea, ää. . ℥j (30 gr.).
Ungüento gris. . . . . ʒß (15 gr.).

M. S. A. *D.* En fricciones en el vientre.

Cuando hay mucha atonía se usa el siguiente:

Tintura de cantáridas. . 5j (4 gr.).
Bálsamo opodeldoc,
Aceite volátil de enebro,
Ungüento gris, ää. . . . 5iij (12 gr.).

M. S. A. *D.* En fricciones en los tegumentos abdominales.

3863. L. CONTRA EL CÓLERA ADINÁMICO (*Banque*).

℞ Aceite de manzanilla. 2
Tintura etérea de quina amarilla. 1

Mézclese y agítese al tiempo de usarle.

D. Una cucharada en fricciones en la parte interna de los muslos ó de las piernas, y principalmente en la parte lumbar del raquis.

3864. L. CONTRA LA COREA (*Chretien*).

℞ Alcoholato de enebro. ℥jv (125 gr.).
Esencia de clavo,
Bálsamo de nuez moscada, ää. . . . . gxc (5 gr.).

M. D. Se usa en fricciones en la columna vertebral con una cucharada de café de este linimento.

3865. L. CONTRA LAS ESCORIACIONES ó *Escitodépsico*.

℞ Cocimiento de ℥ij (60 gr.) de corteza de encina. . . . . lbß (250 gr.).
Extracto de Saturno. . . . . c. s.

ó hasta que no se forme precipitado, al que se lava y añade:

Alcohol. . . . . 3ij (7 gr.).

I. Escoriaciones por permanecer mucho tiempo en la cama.

3866. L. CONTRA LA GOTA.

℞ Agua de laurel real. 16
Eter sulfúrico. 2
Extracto de belladona. 1
Extracto de beleño. 1
Mézclese.

3867. L. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PEZONES (H. DE AL.).

℞ Agua de cal,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . 3iij (12 gr.)
Extr. acuoso de opio. . ℈j (5 cent.).

M. I. Se cubren los pechos con hilas empapadas en este linimento, y se colocan encima pezones artificiales con agujeritos para dar salida al aceite.

3868. L. CONTRA LA HIPERTROFIA DEL BAZO.

℞ Extracto de cicuta. . . ℈ij (3 gr.).
Aceite de beleño,
Bálsamo opodeldoc, ãã. 3iij (12 gr.).

M. I. Infartos del bazo por intermitentes prolongadas.

3869. L. CONTRA LAS HIDROPESIAS.

NÚMERO 1.

℞ Tintura de escila, *
Tintura de digital, ãã. . . . . p. ig.

NÚMERO 2.

Tintura de digital, *
Vinagre escilítico. . . . . p. ig.

NÚMERO 3.

Tintura de semillas de cólchico,
Aceite amoniacal alcanf., ãã. p. ig.

3870. L. CONTRA LA INFLAMACION DE LOS CARTÍLAGOS DE LOS PARPADOS.

℞ Mucílago de semillas de membrillos,
Albayalde, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
Almidon. . . . . 3ij (8 gr.).
Goma tragacanto. . . ℈xij (6 dec.).
Agua de rosas. . . . . c. s.

Se prepara S. A. una mezcla de la consistencia de ungüento.

D. C. s. para cubrir muchas veces al dia el borde libre de los párpados inflamados.

3871. L. CONTRA LAS QUEMADURAS (H. M.).

℞ Agua de cal. . . . . ℥jv (125 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . ℥ß (15 gr.)

M. Se usa como los siguientes.

3872. *Otro* (BOURGE).

℞ Cloruro de cal líquido,
Aceite blanco, ãã. . . . . p. ig.
Mézclese bien.

Se debe aplicar por medio de un lienzo fino ó hule agujereado. Se coloca tambien sobre este lafetan un poco de algodon cardado empapado en la misma solucion.

3873. L. PARA QUEMADURAS (H. DE M.).

℞ Agua de cal. . . . . ℥xij (375 gr.).
Aceite de simiente de linaza. . . . . ℥jv (125 gr.).
Yemas de huevo. . . número 4.

Se bate las yemas de huevo con el aceite en un mortero de mármol, y se añade en veces el agua de cal, agitando fuertemente la materia á cada adicion.

I. Se aplica humedeciendo las compresas ó planchuelas que cubren las quemaduras.

3874. L. CALMANTE Ó CONTRA LOS REUMATISMOS (*Reveillé Parisé*).

℞ Extracto de belladona. 5ij (8 gr.).
Se diluye en
Agua de laurel real. ℥jv (125 gr.).
Se añade:
Láudano de Rousseau. ℥j (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ℥j (30 gr.).
Se mezcla al tiempo de usarle.

3875. L. CONTRA LOS SABAÑONES (*Berton*).

℞ Bálsamo de Fioraventi. . 3ij (8 gr.).
Acetato de plomo. . . . 3iij (12 gr.).
Aceite comun. . . . . 3iij (12 gr.).
Acido clorhídrico. . . . 3j (4 gr.).

Se pone estas sustancias en un frasco de cristal, y se agitan hasta que la mezcla esté homogénea y forme linimento.

I. Se usa en fomentos ó fricciones suaves en los sabañones, principalmente para evitar la ulceracion.

3876. *Otro*, n. 2.

℞ Agua de laurel real. . 3v (150 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 3v (20 gr.).
Extracto de belladona,
Extracto de beleño, ãã. 3ijß (10 gr.).

M. I. Sabañones no ulcerados, grietas. *D.* En fricciones.

3877. *Otro*, n. 3.

℞ Manteca,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . 3j (30 gr.).
Cera amarilla. . . . . 3ijß (10 gr.).

Se funde á fuego lento, se vierte en un mortero calentado, se agita, y cuando la mezcla esté casi fria se añade:

Alcanfor. . . . . ʒLjv (3 gr.)

disuelto en

Tintura de semillas de mostaza negra. . . 3jß (6 gr.).
Aceite de espliego. . . 3ij (8 gr.).
Amoniaco liquido. . . 3jß (6 gr.).

Se tritura el aceite con el álcali, se añade al jaboncillo la tintura que tiene el alcanfor en solucion, y se vierte todo en la masa fundida, agitando vivamente con la mano del mortero.

I. Sabañones no ulcerados. Se usa en fricciones estando cerca de la lumbre.

3878. *Otro* (COTTEREAU Y VERDÉ-DELISLE).

℞ Aceite de almendras dulces,
Agua de cal, ãã. . . . . 3ij (60 gr.).
Tintura de iodo. . . . . 5j (4 gr.).
Láudano de Rousseau. . 3iij (8 gr.).

M. S. A. *I.* Sabañones que han llegado al segundo período. *D.* Se curan las ulceraciones mañana y noche con lienzos finos agujereados, empapados en este linimento.

3879. L. CONTRA LOS SABAÑONES.

℞ Acido clorhídrico,
Cera blanca,
Esperma de ballena, ãã. 5ij (8 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . 5j (4 gr.).
Agua. . . . . 3vj (24 gr.).
Aceite de olivas. . . . . 3ij (64 gr.).

M. I. y *D.* Las mismas que el anterior.

3880. L. CONTRA LOS SABAÑONES ó *Pomada de Pearson.*

℞ Aceite comun . . . . . ʒv (150 gr.).
Esencia de trementina. 3ij (60 gr.).
Acido sulfúrico diluido. 3ß (15 gr.).

H. S. A. *I.* Sabañones no ulcerados, neuralgias. *D.* C. s. para dar fricciones con cuidado en las partes enfermas.

Nota. El linimento de Pearson contra las neuralgias se compone de ʒij (60 gr.) de aceite comun, ʒiß (45 gr.) de aceite de trementina y 5j (4 gr.) de ácido sulfúrico.

3881. *Otro* (RICHARDIN).

℞ Alcohol rectificado. . ʒvij (224 gr.).
Alcanfor,
Amoniaco liquido, ãã. ʒß (16 gr.).
Aceite volátil de manzanilla romana.
Aceite volátil de enebro, ãã. . . . . ʒLjv (3 gr.).

3882. L. CONTRA LOS SABAÑONES INMINENTES ó *Linimento estimulante* (*Pievée*).

℞ Bálsamo de Fioraventi. ʒjv (125 gr.).
Acido clorhídrico. . . 32 gotas.

M. S. A. *D.* Una cucharada en fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3883. L. CONTRA LA TIÑA (*Pourché*).

℞ Aceite de olivas. . . . ʒvj (192 gr.).

Sulfuro de potasa. . . ʒjv (16 gr.).
Amoniaco. . . . . ʒj (32 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).

M. S. A. *I.* Se hace caer las costras tiñosas con aceite comun, y se da diariamente una friccion sobre las partes enfermas.

Nota. Debe aumentarse la dosis del amoniaco hasta duplicarla.

3884. L. CONTRA LA TIÑA (*Sydenham*).

℞ Aceite de almendras,
Aceite de laurel,
Ceniza de hojas de abrótano, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).

Mézclese con cuidado. *D.* En fricciones á la cabeza cubriéndola despues con una vejiga de cerdo.

3885. L. DE DESADE.

℞ Deutocloruro de mercurio. . . . . ʒij (8 gr.).
Alcohol rectificado. . . ʒvj (24 gr.).

Se disuelve y se añade:

Aceite de manzanilla alcanforado. . . . . ʒij (64 gr.).
Aceite volátil de trementina. . . . . ʒj (32 gr.).
Láudano líquido de Sydenham. . . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Dolores osteocopos. *D.* Dos aplicaciones al dia.

3886. L. DESECANTE Y CALMANTE.

℞ Aceite de belladona. . . ʒj (30 gr.).
Agua de cal. . . . . ʒij (60 gr.).

Se mezcla y se añade:

Cerato. . . . . ʒij (8 gr.).
Clorhidrato de morfina. gʒvj (3 dec.).

I. Eczema crónico, afecciones pruriginosas.

3887. L. DE DIGITAL.

℞ Extracto de digital. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de belladona. ʒß (2 gr.).
Jabon amigdalino. . . . ʒß (15 gr.).
Tintura de beleño. . . . ʒiij (90 gr.).

H. S. A. *I.* Palpitaciones, endocarditis, cardialgia, hipertrofia, afecciones orgánicas del corazon, esplenitis, hepatítis, sabañones, hidrartrosis, hidrocéfalo, gota. *D.* En fricciones en la region precordial.

3888. L. DIURÉTICO.

℞ Tintura de digital,
Vinagre escilítico, ãã. . ʒj (30 gr.).

Se usa como los siguientes.

3889. *Otro*, n. 2.

℞ Tintura de semillas de cólchico. . . . . ʒß (15 gr.).
Aceite alcanforado amoniacal. . . . . ʒj (90 gr.).

M. Se usa como los siguientes.

3890. *Otro* (H. DE JT.).

℞ Cebolla albarrana en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Jugo gástrico de vaca. . ʒij (60 gr.).

M. I. Hidropesías. *D.* Se hacen fricciones mañana y noche en la region de los lomos, en los casos de hidropesía cuando el enfermo no puede tomar interiormente las preparaciones de escila.

3891. *Otro* (KIESER).

℞ Yema de huevo. . . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de trementina. . ʒj (30 gr.).

Se los agita en un mortero de vidrio hasta mezclarlos perfectamente y despues se vierte poco á poco, meneando siempre,

Agua de menta piperita. ʒiij (90 gr.).

I. Disuria, iscuria y estrangurria espasmódicas. *D.* ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) en fricciones en la region inguinal, mañana y noche.

3892. *Otro* (RULLIER).

℞ Tintura de escila,
Tintura de digital, ãã. . ʒij (60 gr.).

I. Produce buenos efectos en la anasarca sintomática, hidropesías, infiltraciones, hidrocele, hidrartrosis.

3893. *Otro* (SCHUBART).

℞ Hojas de digital. . . . . ʒij (8 gr.).

Agua hirviendo. . . . ʒjß (45 gr.).
Se infunde hasta que se enfrie, se cuela y se añade S. A.
Esencia de trementina. ʒj (30 gr.).
Extracto de escila. . . ʒj (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

I. Hidropesías, ascitis. *D.* En fricciones en el epigastrio y en lo interior de los muslos.

3894. L. DIURÉTICO (*Schmitt*).

℞ Hojas secas de tabaco. ʒiij (12 gr.).
Hojas secas de digital. . ʒiij (12 gr.).
Se infunden en ʒjv (125 gr.) de agua hirviendo, y despues de fria la infusion se añade:
Extracto de escila. . . ʒj (4 gr.).
Esencia de trementina. ʒj (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

I. Ascitis. *D.* Se hacen dos ó tres fricciones al dia en la region de los riñones con una cucharada de este linimento.

3895. L. DIURÉTICO COMPUESTO.

℞ Lúpulo. . . . . ʒj (4 gr.).
ó Escila. . . . . ʒß (2 gr.).
Enebro. . . . . ʒß (15 gr.).
Poligala. . . . . ʒiij (12 gr.).
Se hierve en lbj (500 gr.) de agua, se añade ʒß (2 gr.) de éter nítrico y se endulza.

I. Hidropesías, absceso, acne. *D.* Una cucharada cada dos horas.

3896. L. DULCIFICANTE (*Radius*).

℞ Yemas de huevo. . . . número 1.
Aceite de linaza. . . . ʒij (60 gr.).
Se mezcla por agitacion.

I. Quemaduras.

3897. L. EMOLIENTE (H. DE M.).

℞ Ungüento de altea,
Aceite comun, ää. . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese.

3898. L. EPILATORIO DE PIERQUIN *ó rusma de los Orientales.*

℞ Cal viva. . . . . ʒij (60 gr.).
Sulfuro de arsénico
(amarillo ó rojo). . ʒß (15 gr.).
Lejia alcalina. . . . . lbj (500 gr.).
Se hierve hasta que el líquido sea bastante activo para que sumergida una pluma en él y extraida, se caigan sus barbas con facilidad.

D. Se aplica esta preparacion fria sobre las partes en que se quiere destruir los pelos; pero debe usarse con mucha circunspeccion por ser muy cáustica.

3899. L. EXCITANTE.

℞ Bálsamo de Fioraventi,
Aceite comun, ää. . . . ʒij (60 gr.).
Alcohol alcanforado. . . ʒj (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Se usa contra los reumatismos, parálisis, gangrena.

3900. *Otro*, n. 2.

℞ Aceite de almendras
dulces. . . . . ʒj (30 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ʒj (4 gr.).
Alcoholato vulnerario. ʒj (4 gr.).
Tintura de cantáridas. ʒß (15 gr.).
Mézclese.

3901. L. ESTIMULANTE INGLÉS. *Bálsamo de vida externo ó Alcohol de jabon amoniacal trementinado.*

℞ Jabon medicinal. . ʒj (30 gr.).
Se disuelve y se añade S. A.
Espíritu de sérpol. lbjv (2000 gr.).
Esencia de trement. lbß (250 gr.).
Amon. líquido. ʒij á ʒj (8 á 30 gr.).

I. Parálisis, anquilosis falsa, tumores fríos y artrodinia. *D.* ʒjv á ʒj (15 á 30 gr.) para fricciones mañana y noche en las partes enfermas.

Nota. Algunas veces se añade un cuartillo (½ lit.) de agua para hacer embrocaciones resolutivas.

3902. L. ESTIMULANTE.

℞ Acido nítrico. . . . . ʒij (60 gr.).
Esencia de trementina. ʒiij (90 gr.).
Triaca. . . . . ʒj (4 gr.).
Miel. . . . . ʒj (30 gr.).
Alcohol. . . . . ʒvj (180 gr.).
M. I. Cólera. *D.* En fricciones.

3902. L. ESTIMULANTE BALSAMICO (*Reil*).

℞ Bals. negro del Perú. ℥ß (15 gr.).
Aceite de bayas de laurel. . . . . ℥ß (15 gr.).
Aceite de nuez moscada. . . . . 5ijß (10 gr.).
Esencia de clavo. . . . ℥ß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Amaurosis por atonía, parálisis de los párpados, blefaroplejia. *D.* gxviij á 5j (1 á ¼ gr.) en fricciones en las sienes y párpados.

3904. L. ESTIMULANTE (*Magendie*).

℞ Tintura de nuez vómica. ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido . . . ℥ij (8 gr.).

M. I. Parálisis. *D.* En fricciones.

3905. L. ESPIRITUOSO ANODINO.

℞ Opio. . . . . ℥j (4 gr.).
Jabon blanco raspado. ℥ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ij (8 gr.).
Alcohol. . . . . ℥jv (125 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa como resolutivo y fortificante, y tiene mucha anologia con el bálsamo opodeldoc.

3906. *Otro* (SCHMITH).

℞ Digital en polvo. . . . . ℥iij (12 gr.).
Tabaco en polvo. . . . ℥iij (12 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥v (150 gr.).

Se infunde hasta que se enfrie, se cuela y despues se añade S. A.
Extracto de escila. . . ℥j (4 gr.).
Esencia de trementina. ℥j (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

I. Ascitis esencial. *D.* Una cucharadita de café en fricciones, en la region de los riñones, dos ó tres veces al dia.

3907. L. ESTIMULANTE OPIADO (*Fahnestock*).

℞ Aceite animal de Dippel,
Aceite volátil de orégano,
Aceite comun,
Tintura de opio ää. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Reumatismo muscular y fibroso. *D.* Cada veinte minutos se aplica una cucharada de este linimento calentado en una vasija tapada, y se aplica encima una franela bien caliente ó un hule.

3908. L. ESTIMULANTE RESOLUTIVO.

℞ Alcoholato de Fioraventi. . . . . ℥ij (60 gr.).
Alcoholato de romero. ℥ij (60 gr.).
Tintura de cantáridas. . 5ij (8 gr.).

M. I. Reumatismo, parálisis, etc. *D.* Se usa en fricciones.

3909. L. ESTIMULANTE RUBEFACIENTE (*Petit*).

℞ Esencia de trementina. ℥ij (60 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Se usa en fricciones ó se aplica sobre la columna vertebral en los casos de cólera ó de tétanos.

3910. L. DE ESTRICNINA.

℞ Estricnina. . . . . ℥ß (2 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥jß (45 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Amaurosis. *D.* Diez gotas en fricciones que se repiten tres veces al dia en las sienes. Es ventajoso aplicar una cataplasma para favorecer la absorcion de la sustancia activa.

3911. *Otro* (FURNARI).

℞ Aceite comun. . . . ℥jv (125 gr.).
Amoniaco líquido. . . 5ij (8 gr.).
Bálsamo de Fioraventi. . . . . ℥ß (15 gr.).
Estricnina. . . . . ℈vj (3 dec.).

I. Amaurosis tórpida. *D.* En fricciones en las sienes y frente.

3912. L. ETÉREO DE TREMENTINA.

℞ Eter nítrico. . . . . ℥ß (15 gr.).
Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).

I. Hepatitis crónica, cálculos biliarios, espasmos, ictericia, diabetes, pleurodinia, acrodinia, reu-

matismo, gota, lumbago, herpes, neumatosis, tétanos, meningitis, neuritis y parálisis. *D.* En fricciones en el hipocondrio derecho.

3913. L. EXCITANTE.

℞ Tinturas de opio,
Aceite de sucino rectificado, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ʒß (15 gr.).
Aguardiente. . . . . ʒij (60 gr.).

I. y *D.* Aconsejado en fricciones entre las espaldillas contra la coqueluche.

3914. *Otro*, n. 2.

℞ Alcanfor,
Nuez moscada, ãã. . . . 5j (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒß (15 gr.).

I. Parálisis. *D.* En fricciones en la columna vertebral.

3915. *Otro* (GRAEFFE).

℞ Alcoholato de menta,
Alcoholato de sérpol,
Alcoholato de romero,
Alcoholato de espl., ãã. ʒij (60 gr.).
Mistura oleo-balsámica. ʒß (15 gr.).
Tintura amoniacal. . . ʒj (30 gr.).

I. Parálisis parcial debida á una conmocion fuerte. *D.* ʒij á ʒß (8 á 15 gr.) al dia en fricciones.

3916. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Amoniaco líquido,
Petróleo, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. y *D.* Se usa en fricciones sobre el vientre en los cólicos nerviosos y sobre los miembros en los espasmos, etc.

3917. *Otro* (H. M. F.).

℞ Tintura de cantáridas. . 5j (4 gr.).
Jabon medicinal seco. . 5ij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Reumatismo crónico.

El LINIMENTO EXCITANTE CANTARIDADO se prepara añadiendo al anterior ℈xc (5 gr.) de alcanfor.

3918. L. EXCITANTE CANTARIDADO (*Chomel*).

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ʒjv (125 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.).

Disuélvase. Por separado se toma:

Tintura de cantáridas. ʒß (15 gr.).
Jabon medicinal. . . ʒj (30 gr.).

Se disuelve S. A. y despues se añade la solucion aceitosa y se mezcla.

I. Reumatismos crónicos. *D.* Dos ó tres fricciones al dia.

3919. L. EXCITANTE TREMENTINADO.

℞ Pimienta de Guinea. 60
Alcanfor. 15
Esencia de trementina. 100
Alcohol. 200

M. S. A. *I.* Tétanos, cólera, artrodinia, pleurodinia, meningitis, anquilosis, lumbago, gota, nefritis, cistitis, diabetes, parálisis, hidrocéfalo. *D.* En fricciones en el raquis.

3920. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Tintura de cantáridas. ʒiij (12 gr.).
Esencia de trementina. ʒjß (45 gr.).
Amoniaco líquido. . . ʒjß (6 gr.).

M. I. Parálisis.

3921. L. DE EXTRACTO DE BELLADONA.

℞ Extracto blando de belladona. . . . . 5j (4 gr.).
Cerato simple. . . . . 5j (4 gr.).
Aceite. . . . . ʒv (20 gr.).

Se diluye el extracto en ʒj (4 gr.) de agua, se pone el cerato en un mortero, se vierte un poco de aceite, se tritura y se añade luego la solucion del extracto.

3922. L. FEBRÍFUGO *ó Linimento trementinado* (*Bellecontre*).

℞ Esencia de trement. . ʒjv (125 gr.).
Láudano de Rousseau. 5j (4 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes rebeldes al sulfato de quinina. *D.* En fricciones en la columna vertebral durante la apirexia, á la dosis de dos cucharadas cada friccion á los adultos. Se hará cada

friccion una ó dos horas antes del paroxismo, y se continuará así durante algun tiempo para impedir la recidiva de la fiebre.

Se harán las fricciones con suavidad para que no se irrite la piel, y se aumentará gradualmente la dosis de la esencia de trementina para que no pierda su accion.

3923. L. FORTIFICANTE (*Double*).

℞ Bálsamo de Fioraventi,
Tintura de quina,
Alcohol,
Aguard. alcanfor., ãã. ʒß (15 gr.).
Agua de melisa compuesta. . . . . ʒj (30 gr.).
Tintura etérea de digital. . . . . ʒij (60 gr.).
Mézclese.

3924. L. FOSFORADO.

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ℔j (500 gr.).
Fósforo en pedazos. gxxx (15 dec.).
Se disuelve á fuego lento y se cuela despues de frio.

I. Reumatismos rebeldes, parálisis, atrofia y ciertas afecciones herpéticas. *D.* ʒß á ʒj (15 á 30 gr.) para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3925. *Otro* (GERDESSEN).

℞ Fósforo. . . . . gvj (3 dec.).
Aceite animal de Dippel. . . . . ʒijß (10 gr.).
Disuélvase. *I.* Parálisis parciales. *D.* gxviij (1 gr.) en fricciones dos ó tres veces al dia.

3926. *Otro* (GORDEN).

℞ Fósforo. . . . . ʒij (24 dec.).
Esencia de trementina,
Esencia de sabina, ãã. ʒß (15 gr.).
Se disuelve y se añade:
Amoniaco líquido. . . ʒij (60 gr.).
M. I. Gota, reumatismos crónicos. *D.* Una friccion al dia, al salir de un baño tibio.

3927. L. FOSFORADO AMONIACAL.

℞ Fósforo. . . . . gxviij (1 gr.).
Aceite de sabina. . . . ʒj (32 gr.).
Aceite de trementina. ʒv (20 gr.).
Alcanfor. . . . . gxc (3 gr.).
Amoniaco líquido. . . ʒß (2 gr.).
I. Reumatismo crónico, lumbago, parálisis, apoplejía, pleuresía, espasmos, tétanos, calenturas intermitentes, neumatosis, atrofia, diabetes, disenteria, meningitis, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3928. L. DE GOMA AMONIACO.

℞ Goma amoniaco. . . . ʒjv (125 gr.).
Vinagre escilítico. . . c. s.
I. Tumores blancos de las articulaciones, tumores enquistados.

3929. L. DE HENSCHEL.

℞ Bálsamo del Perú. . . . ʒß (2 gr.).
Eter clorhídrico. . . . . ʒij (8 gr.)
Tintura de opio. . . . . ʒij (8 gr.).
M. I. Sabañones, grietas del pecho, crup. *D.* Para dos ó tres fricciones.

3930. L. DE HUFELAND.

℞ Ungüento de altea. . . ʒj (30 gr.)
Hiel de buey reciente,
Jabon blanco, ãã. . . . ʒiij (12 gr.).
Aceite de petróleo. . . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Sal volátil de cuerno de ciervo. . . . . ʒß (2 gr.).
M. S. A. *I.* Tumores glandulosos y particularmente los que se atribuyen á causa escrofulosa. *D.* Una cucharada de café para fricciones cada tres horas en las partes enfermas.

3931. L. HÚNGARO.

℞ Alcanfor en polvo. . . ʒj (40 gr.).
Pimienta en polvo. . . ʒß (20 gr.).
Harina de mostaza. . ʒj (40 gr.).
Ajo machacado. . . . . ʒß (20 gr.).
Cantáridas en polvo. . ʒij (10 gr.).
Se digiere durante veinticuatro horas en:
Vinagre. . . . . ʒij (80 gr.).
Alcohol rectificado. . ʒjv (160 gr.).
I. Es un excitante enérgico que

se usa en fricciones en el cólera, para llamar el calor á los pies; en el reumatismo, ceática, gota, torceduras.

3932. L. IRRITANTE CANFARIDADO.

℞ Tintura de cantáridas. . 5ijß (10 gr.).
Alcanfor. . . . . 3jß (6 gr.).
Esencia de trementina 3j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . gxc (5 gr.).

M. I. Reumatismo, ceática crónica, lumbago, parálisis, anestesia, tétanos, sarcocele, cólera, meningitis, envenenamiento. *D.* En fricciones.

3933. L. IODADO.

℞ Tintura de iodo. . . . gxc (5 gr.).
Láudano de Rousseau. 5ijß (10 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . 3ij (60 gr.).
Agua de cal. . . . . 3ij (60 gr.).

M. I. Sabañones, heridas, escrófulas, adenitis ulcerada. *D.* En lociones y fricciones.

3934. L. DE IODO (*Mac Diarmid*).

℞ Iodo. . . . . gxviij (1 gr.).
Aceite comun. . . . . 3j (30 gr.).

I. Diarreas y otras afecciones intestinales. *D.* Una ó dos aplicaciones á todo el abdómen á los niños y algunas mas á los adultos. Alivia muy pronto las diarreas agudas de los niños. En las formas crónicas conviene unirle á otros medicamentos; así en el tratamiento de la atrofia mesentérica se le une al aceite de hígado de bacalao en lugar del aceite comun.

3935. L. DE JABON COMPUESTO ó *Alcohol de jabon alcanforado* (F. DE I.).

℞ Jabon duro raspado. . 3iij (90 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (30 gr.).
Alcoholato de romero. Ibj (500 gr.).

Se disuelve el alcanfor en el espíritu, se añade el jabon y se digiere á fuego lento hasta que se funda.

3936. L. JABONOSO.

℞ Jabon medicinal. . . . 3ß (15 gr.).
Bálsamo de Fioraventi. 3ij (60 gr.).
Alcohol de 30°. . . . . 3ß (15 gr.).

M. I. Se usa como resolutivo en los casos de tumores crónicos é indolentes, dolores reumáticos, infartos y contractura de las articulaciones.

3937. *Otro* (F. F.).

℞ Tintura de jabon. . . . 3j (32 gr.).
Aceite de olivas. . . . 5j (4 gr.).
Alcohol de 31 . . . . . 3j (32 gr.).

Se mezclan agitándolos, y se conserva el producto en una botella bien tapada.

I. Es irritante y se usa como resolutivo á la vez en las afecciones reumáticas y gotosas, neuralgias, etc. Se aplica en los puntos en que reside la enfermedad.

Añadiendo 3ij (8 gr.) de amoniaco, se tendrá el linimento jabonoso amoniacal, y con 5ij (8 gr.) de alcanfor, el linimento amoniacal alcanforado que tiene los mismos usos que el bálsamo opodeldoc.

3938. L. JABONOSO ALCANFORADO (F. N. P.).

℞ Jabon duro raspado. 3jv (125 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (30 gr.).
Alcohol de 25°. . . . 3xij (375 gr.).
Esencia de romero. . 3ß (15 gr.).

H. S. A. *I.* Tumores atónicos, contusiones despues de haber pasado el período inflamatorio, dolores reumáticos crónicos. *D.* En fricciones.

3939. *Otro* (FERRIAR).

℞ Ungüento digestivo amarillo. . . . . 3j (30 gr.).
Jabon verde de trementina. . . . . 3ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ij (8 gr.).

M. S. A. *I.* Reumatismos, dolores

artríticos, lupias y tumores enquistados. *D.* 3j á 3ij (4 á 8 gr.) para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

3940. L. JABONOSO HIDROSULFURADO *ó Pomada de Jadelot* (F. F.).

℞ Jabon blanco. . . .	1bj (500 gr.).
Aceite de simiente de adormideras. . . .	1hij (1000 gr.).
Sulfuro de potasa en polvo seco.	3iij (96 gr.).

Se ralla ó se corta el jabon segun su consistencia y se reblandece con 3j (30 gr.) de agua en una cazuela al calor del baño maría, batiéndole con la mano de un mortero, y cuando la masa esté bien homogénea se va echando en veces primero el aceite y despues el sulfuro de potasa sin dejarlo de agitar.

Este medicamento se altera muy pronto cuando se expone al aire, por lo que solo se debe preparar la cantidad que se necesite.

I. Sarna y otras afecciones de la piel. *D.* 3j (30 gr.) cada dia en fricciones.

Nota. El tratamiento dura comunmente ocho dias.

3941. L. JABONOSO (*Koempf*).

℞ Alcohol á 30°. . . .	3jv (125 gr.).
Jabon alcalino de sosa.	3j (30 gr.).
Alcanfor.	gLx (30 dec.).

Se pone el jabon raspado en una cazuela con el alcohol, despues se le inflama y se menea la mezcla con una barra de vidrio, y cuando cesa de arder se mezcla exactamente el alcanfor.

I. y *D.* Esta preparacion, análoga al bálsamo opodeldoc, tiene los mismos usos.

3942. L. JABONOSO IODURADO (*Dr. Morrés*).

℞ Jabon medicinal. . . .	5v (20 gr.).
Ioduro de potasio. . . .	5ß (2 gr.).

Mézclese é incorpórese exactamente S. A.

Morrés le ha usado con ventaja en el tratamiento del hidrocele.

D. En fricciones en el tumor por la noche. Se ha usado tambien en fricciones en los casos de bocio, y en algunos casos se ha obtenido la curacion ó un grande alivio.

3943. L. JABONOSO OPIADO *ó Linimento anodino* (F. P.).

℞ Aceite de almendras dulces.	3ij (64 gr.).
Jabon medicinal. . . .	3jv (16 gr.).
Tintura de opio. . . .	3j (32 gr.).

Se disuelve el jabon en el alcohol y se añade el aceite.

3944. L. JABONOSO TREMENTINADO (*Jack*).

℞ Jabon animal en polvo.	5ijß (10 gr.).
Esencia de trementina.	3v (160 gr.).

Se funde en el baño maría y se echa en frascos como los del bálsamo opodeldoc. Se le pueden añadir esencias de buen olor, como aceites etéreos, alcanfor, etc.

3945. L. DE LOS JUDIOS.

℞ Vinagre.	1bß (250 gr.).
Alcohol.	1bj (500 gr.).
Alcanfor en polvo. . .	3ß (15 gr.).
Pimiento en polvo. . .	5ij (8 gr.).
Mostaza en polvo. . .	3ß (15 gr.).
Ajo machacado. . . .	5ij (8 gr.).
Cantáridas en polvo.	5ß (2 gr.).

Se pone en un frasco tapado y se infunde durante ocho dias.

I. Cólera, reumatismo, ceática, gota, torceduras. *D.* En fricciones.

Nota. Solo se diferencia del linimento húngaro en las cantidades de los componentes.

3946. L. LAUDANIZADO.

℞ Cerato simple (sin agua).	5j (4 gr.).

Láudano líquido. . . . . 3j (4 gr.).
Aceite de almendras. . . 3j (30 gr.).

Se mezcla el cerato con un poco del aceite en un mortero, se tritura, se añade el láudano por partes y de cuando en cuando se echa un poco de aceite.

3947. L. MAMILAR (*Dannemann*).

℞ Bálsamo del Perú. . . . 3j (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . 3ij (8 gr.).
Aceite de almendras. . . 3jß (6 gr.).
Agua de rosas. . . . . 3j (30 gr.).

M. D. En fricciones en los pechos ulcerados.

3948. *Otro* (RIBKE).

℞ Bálsamo del Perú. . . . 3j (4 gr.).
Manteca de cacao. . . . 3ß (15 gr.).

M. I. Ulceras de los pechos. *D.* Se aplica tres ó cuatro veces al dia á las partes afectadas.

3949. *Otro* (HACLESS).

℞ Bálsamo del Perú. . . . 3jß (6 gr.).
Borax. . . . . 3j (4 gr.).
Yema y clara de huevo, 3jv á 3vj (16 á 24 gr.).
Aceite de almendras. . 3j (32 gr.).

M. I. Grietas de los pechos. *D.* En fricciones.

3950. L. MERCURIAL OPIADO *ó Linimento antivenéreo.*

℞ Ungüento mercurial doble. . . . 4
Aceite de almendras dulces. . . . 48
Láudano líquido. 3

Mézclese bien.

I. Ulceras muy inflamadas del glande. *D.* Se usa en inyecciones ó lociones, segun el estado del prepucio, dos ó tres veces al dia.

3951. L. MERCURIAL (*Most*).

℞ Aceite de beleño. . . . 3j (30 gr.).
Pomada mercur. doble. 3jß (6 gr.).
Acido clorhídrico. . . . 3ß (15 gr.).

M. I. Anginas en su principio. *D.* Dos fricciones al dia al cuello.

3952. L. MERCURIAL AMONIACAL (H. DE M.).

℞ Ungüento de mercurio terciado,
Amoniaco líq. á 22°, ää. 3j (4 gr.).
Aceite comun. . . . . 3j (30 gr.).

Se mezcla el aceite con el ungüento y se añade el amoniaco.

I. Infartos glandulares indolentes de naturaleza venérea y bubones venéreos.

3953. L. MERCURIAL AMONIACAL ALCANFORADO (H. DE M.).

℞ Ungüento de mercurio terciado,
Manteca, ää. . . . . 3ij (60 gr.).
Alcanfor,
Amon. líquido á 22°, ää. 3ij (8 gr.).

Se pulveriza el alcanfor con un poco de alcohol, se incorpora con la manteca y el ungüento de mercurio, se añade despues el amoniaco y se agita perfectamente.

I. y *D.* Se usa en fricciones para favorecer la resolucion de los tumores venéreos.

3954. L. MERCURIAL COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Ungüento mercurial fuerte,
Manteca, ää. . . . . 3jv (125 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (30 gr.).
Espír. de vino rectific. 3j (30 gr.).
Solucion de amoniaco. 3jv (125 gr.).

Se tritura el alcanfor en el espíritu, y despues la manteca y el ungüento; se vierte despues poco á poco la solucion de amoniaco y se mezcla todo.

3955. L. MURIÁTICO COMPUESTO.

℞ Bálsamo del Perú. . . . 3j (4 gr.).
Esperma de ballena,
Cera blanca,
Acido clorhídrico, ää. . 3ij (8 gr.).
Agua. . . . . 3j (30 gr.).
Aceite comun. . . . . 3ij (60 gr.).

M. I. Sabañones. *D.* En fricciones.

3956. L. DE MUSTARD.

℞ Ungüento epispástico. 3j (30 gr.).

Alcanfor. . . . . ʒß (15 gr.).
Esencia de trementina. ʒiij (12 gr.).

H. S. A. *I.* Gota y reumatismos crónicos. *D.* C. s. para fricciones ligeras, mañana y noche, en las partes enfermas.

3957. L. NARCÓTICO.

℞ Bálsamo de Fioraventi. ʒj (30 gr.).
Bálsamo tranquilo. . . ʒß (15 gr.).
Vino de opio compuesto. ʒj (4 gr.).

I. Dolores vivos con poca inflamacion.

3958. *Otro*, n. 2.

℞ Aceite de almendras dulces. . . . 16
Láudano de Rousseau. 1
ó Láudano de Sydenham. 2

M. I. Reumatismo. *D.* C. s. para fricciones ligeras.

3959. *Otro* (F. F.).

℞ Bálsamo tranquilo. . . . ʒij (64 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒij (8 gr.).

Se mezclan agitándolos fuertemente.

I. Dolores nerviosos y reumáticos, neuralgias, etc. *D.* En fricciones en los puntos doloridos.

El LINIMENTO SEDANTE DE LOS H. DE M. es igual al anterior.

3960. L. NEGRO (*Schmucker*).

℞ Emplasto negro de Boc-
koltz. . . . . ʒj (30 gr.).
Aceite de hipericon. . ʒjß (45 gr.).

M. I. Úlceras en los pechos que se encaminan á degenerar en cáncer; pero no cura las úlceras verdaderamente cancerosas.

3961. L. DE NEUMANN.

℞ Alcanfor. . . . . ℈xij (6 dec.).
Éter sulfúrico. . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de clavo. . . . 6 gotas.

I. Viruelas en la conjuntiva. Se aplica por medio de un lienzo.

3962. L. NITRO ALCANFORADO (*J. Frank*).

℞ Alcanfor en polvo. . . . ʒj (4 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ʒij (8 gr.).
Miel sin espuma. . . . . c. s.

H. S. A. un linimento difluente.

I. Efélides. *D.* Dos fricciones al dia.

3963. L. OBSTÉTRICO.

℞ Carburo de azufre. . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de cornezuelo de
centeno. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Inercia de la matriz, partos laboriosos, aborto. *D.* En fricciones al abdómen.

3964. L. OFTÁLMICO (*Magne*).

℞ Amoniaco líquido. . . . ʒij (8 gr.).
Tintura concentrada de
nuez vómica. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de azafran. . . . ʒß (2 gr.).
Alcoholato de bergamota. ʒß (2 gr.).
Alcoholato de espliego. . ʒj (4 gr.).
Éter acético. . . . . ʒj (4 gr.).

I. Anubliopía y amaurosis asténica. *D.* Media cucharada de café en fricciones, una ó dos veces al dia, en las sienes, frente y al rededor de las órbitas.

3965. L. OLEOSO COMPUESTO.

℞ Aceite de olivas. . . . ʒijß (75 gr.).
Aceite de trementina. ʒj (30 gr.).
Ácido clorhídrico. . . 45 gotas.

Se mezclan los aceites, y despues se añadirá poco á poco el ácido clorhídrico mezclándolo todo bien.

I. Enfermedades crónicas de las articulaciones; corrige los efectos de las dislocaciones y contusiones.

3966. L. OLEO ZINCADO (*Meyer*).

℞ Óxido de zinc sublim. ℈xij (6 dec.).
Aceite de almendras dulces,
Manteca de cacao, ää. ʒj (4 gr.).
Esencia de bergamota. ℈vj (3 dec.).

I. Grietas de los pechos, de los labios y de las manos; hemorroides. *D.* En aplicacion ó en fricciones.

3967. L. OPIADO.

℞ Linimento calcáreo. . ℥j (30 gr.).
Láud. de Sydenham. 15 á 20 gotas.
I. Quemaduras no ulceradas.

3968. L. DE OPIO (F. DE L.).

℞ Linimento de jabon. . ℥vj (180 gr.).
Tintura de opio. . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Gastrodinia, dolores reumáticos. *D.* En fricciones.

3969. L. PAREGÓRICO.

℞ Extracto de acónito,
Extracto gomoso de opio,
Extr. de belladona, ää. ℊix (50 cent.).
Amoniaco líquido. . . ʒß (2 gr.).
Aceite alcanforado de beleño. . . . . ℥iij (100 gr.).
Esencia de trementina. ℥ijß (10 gr.).
H. S. A. *I.* Dolores osteocopos, reumatismo crónico, ceática, hidroraquis, histeralgia, otalgia. *D.* En fricciones, mañana y noche.

3970. L. DE PISSIER.

℞ Cera blanca. 4
Se liquida en
Aceite de linaza. 8
Se añade despues de frio:
Tintura de opio. 2
Se empapa una planchuela de hilas, con la cual se curan los cánceres ulcerados.

3971. L. PURGANTE Ó RUBEFACIENTE.

℞ Carbonato de sosa. . . ℊx (5 dec.).
Se tritura en un mortero de vidrio y se añade poco á poco:
Alcohol de yerbabuena. ʒß (15 gr.).
Aceite de croton tiglio. ℊjv (2 dec.).
I. Afecciones reumáticas y como purgante. *D.* Se usa en fricciones sobre el abdómen.

3972. L. PURGANTE.

℞ Aceite de croton. . . . . 6 gotas.
Aceite comun. . . . . ℥j (4 gr.).
Se agita con violencia.
I. Se usa en fricciones al rededor del ombligo. Se cubrirá con una piel el dedo con que se ha de hacer las fricciones.

3973. L. PURGANTE (*Moll*).

℞ Aceite de croton. . . . 3 gotas.
Goma arábiga. . . . . ℥jß (6 gr.).
Infusion de ℥j (4 gr.) de tabaco. . . . . ℥v (150 gr.).
I. Aconsejado contra el vómito estercoráceo.

3974. L. DEL DOCTOR RAST.

℞ Aceite rosado. . . . . ℥ij (60 gr.).
Ungüento populeon. . . ʒß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de Saturno. . ℥j (4 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Meteorismo de vientre, que procede del órgano uterino. *D.* En unturas al vientre.

3975. L. DE REIL.

℞ Aceite de laurel. . . . ℥v (20 gr.).
Aceite de macis. . . . ℥ijß (10 gr.).
Aceite de clavo. . . . ℥j (4 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ℥v (20 gr.).
M. I. Blefaroplejía. *D.* En fricciones en las sienes y los párpados.

3976. L. RESOLUTIVO.

℞ Alcoholato de Fioraventi,
Alcoholato de melisa compuesto, ää. . . ℥ij (60 gr.).
M. Se usa en fricciones

3977. *Otro*, n. 2.

℞ Agua de cal. . . . . ʒß (2 gr.).
Aceite blanco. . . . . ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ij (8 gr.).
M. I. Inflamaciones superficiales de la piel.

3978. *Otro*, n. 3.

℞ Aceite comun . . . . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de trementina. ʒß (15 gr.).
Mézclese y agítese al tiempo de usarle.
I. Produce buenos efectos con-

tra el edema parcial ó general de los miembros inferiores.

El LINIMENTO DE KENTISH se diferencia del anterior en que contiene ungüento basilicon en lugar del aceite comun, y produce tambien buenos efectos en las hinchazones edematosas.

3979. L. RESOLUTIVO.

℞ Vinagre. . . . . ℥xij (6 dec.).
Sal amoniaco. . . . . ʒij (8 gr.).
M. I. Tumores glandulosos.

3980. *Otro*, n. 2.

℞ Hiel de buey. . . . . lbß (250 gr.).
Sal comun. . . . . ʒjß (45 gr.).
Aceite de nuez. . . . ʒij (60 gr.).
Se expone la mezcla al calor moderado de un horno durante treinta y seis horas.
I. Tumores frios é indolentes. *D.* Se empapa un poco de estopa ó hilas en este linimento, y se le aplica sobre el tumor.

3981. *Otro*, n. 3.

℞ Vino aromático. . . . ʒvj (180 gr.).
Tintura de iodo,
Tintura de quina, ää. ʒij (60 gr.).
I. Infartos edematosos de los miembros inferiores. *D.* Una friccion por las mañanas.

3982. *Otro* (BECKER).

℞ Alcohol alcanforado.
Alcohol de enebro, ää. ʒj (30 gr.).
Vinagre escilítico. . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Tumores sanguíneos de la cabeza en los recien nacidos. *D.* Tres ó cuatro aplicaciones tibias al dia.

3983. *Otro* (FRANK).

℞ Alcanfor. 4
Subcarbonato de potasa. . . . 7
Miel. . . . . c. s.
I. Para resolver las equimosis.

3984. L. RESOLUTIVO (*Grekler*).

℞ Acido clorhídrico,
Acido nítrico, ää. . . ʒß (15 gr.).
Aceite de linaza. . . . ʒjv (125 gr.).
M. I. Manchas escorbúticas, dando interiormente el cloro ó una mezcla de una parte de ácido nítrico y dos de ácido clorhídrico.

3985. *Otro* (HUFELAND).

℞ Ungüento de altea. . . ʒj (30 gr.).
Hiel de buey,
Jabon blanco, ää. . . . ʒiij (12 gr.).
Aceite de petroleo,
Carbonato de amoniaco piroaceitoso, ää. . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
I. Atrofia mesentérica, escrófulas, apoplejía. *D.* En fricciones al vientre cada tres horas.

3986. *Otro* (POTT.)

℞ Esencia de trementina. ʒij (60 gr.).
Acido clorhídrico. . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Reumatismo, dolores artríticos, lupias y tumores enquistados. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) para fricciones en las partes enfermas, mañana y noche.

El LINIMENTO RESOLUTIVO DE POTT DE LOS H. DE M. se compone de ʒij (60 gr.) de trementina y ʒß (15 gr.) de ácido clorhídrico.

3987. L. RESOLUTIVO ALCANFORADO.

℞ Alcanfor,
Jabon negro, ää. . . . ʒijß (10 gr.).
Agua de cal. . . . . ʒß (15 gr.).
Aceite de beleño. . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de trementina. ʒß (15 gr.).
I. Reumatismo, ciática, neuralgias, contusiones, escrófulas, quemaduras, congelacion, tialismo, cistitis, gastralgia, cardiopalmía. *D.* En dos fricciones.

3988. L. RESOLUTIVO CON PETROLEO (*Tott*).

℞ Bálsamo opodeldoc. . . ʒj (30 gr.).
Petroleo. . . . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. *I.* Hidrartrosis, orquitis crónica, tumores glandulosos. *D.* Dos ó tres unturas al dia.

3989. L. RESOLUTIVO Y ESTIMULANTE (*Stoll*).

℞ Emplasto vejigatorio,
Ungüento de altea, ää. ℥j (30 gr.).
Aceite de linaza,
Aceite de almendras,
ó Aceite comun . . . . . c. s.
para hacer un linimento al que se añade:
Tintura de cantáridas. ℈j (12 dec.).
M. I. Parálisis, gota asténica, reumatismo crónico, infartos frios. *D.* En fricciones en la parte enferma. Prepara á las partes enfermas á la accion de tópicos mas activos.

3990. L. DE RICHARDIN.

℞ Alcanfor. . . . . ℈v (20 gr.).
Amoniáco líquido. . . . ℈v (20 gr.).
Alcohol alcanforado. . ℥x (320 gr.)
Esencia de manzanilla. ℊtjv (3 gr.).
Esencia de enebro. . . ℊtjv (3 gr.).
M. I. Se usa contra los sabañones.

3991. L. DE ROSEN.

℞ Alcohol. . . . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de clavo. . . . ℥ß (2 gr.).
Aceite de nuez moscada. ℥ß (2 gr.).
M. I. Se usa contra el marasmo de los niños, en fricciones á lo largo de la columna vertebral, dos veces al dia; y Chrestien le ha usado con buen éxito en la corea, en fricciones, á la dosis de una cucharadita de café, tres veces al dia.

3992. L. DE RONCALLI *ó Linimento antiescrofuloso de Roncalli.*

℞ Vejiga de hiel de buey llena de bilis. . . . . número 1.
Cloruro de sodio. . ℥iij (90 gr.).
Aceite de nuez. . . tres cucharadas.
Se echan la sal y el aceite en la vejiga, y se expone todo durante algun tiempo á un calor lento.
I. Tumores escrofulosos que no están muy inflamados. *D. C. s.* para empapar ligeramente una pinchuela de hilas, que se aplica sobre las partes hinchadas y se renueva dos ó tres veces al dia. Es necesario acompañar á esta aplicacion un tratamiento interno.
Nota. Algunas veces se aplica sobre estos tumores el remedio húngaro, que se compone de goma amoniaco disuelta en vinagre y espesada hasta la consistencia de emplasto.

3993. L. RUBEFACIENTE.

℞ Aceite de croton. . . . ℊij (4 dec.).
Esencia de trementina. ℊxij (6 dec.).
M. I. Ronquera, enfermedades de la laringe. *D.* En fricciones. *I.* Bronquitis y enteritis crónica. *D.* Se pone una parte de aceite de croton con cinco de diaquilon gomado, y se extiende en la piel de modo que se forme un escudo que se aplica.

3994. L. SEDANTE.

℞ Aceite alcanforado. 1
Aceite de manzanilla. 1
Aceite de beleño. 1
Bálsamo tranquilo. 1
I. Reumatismo.

3995. *Otro*, n. 2.

Yema de huevo. 1
Grasa narcótica. 16
M. I Se usa como tópico en las hemorroides.

3996. *Otro*, n. 3.

℞ Bálsamo tranquilo. . ℥j (30 gr.).
Extracto de beleño. . ℥ß (2 gr.).
Jabon blanco. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Aceite alcanforado de manzanilla. . . . ℥v (150 gr.).
M. I. Reumatismo agudo, infarto glandular de las mamas, adenitis, sabañones, acne, escrófulas, bocio, crup. *D.* En embrocaciones.

3997. *Otro*, n. 4.

℞ Jabon medicinal. 1

Aceite de almendras dulces. . . . 4
Tintura de opio. 2
M. I. Reumatismos.

3998. L. SEDANTE (*Collereau*).

℞ Extracto hidro-alcohólico de digital. . . . 3j (4 gr.).
Extracto de belladona. 3ß (2 gr.).
Jabon amigdalino. . . 3ij (12 gr.).
Tintura alcohólica de beleño. . . . . ℥ij (96 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Afecciones del corazon, asma, coqueluche, cardiopalmia, congelacion, sabañones, diviesos, hemorroides, cistitis, marco, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café para fricciones en la region precordial, tres veces al dia.

3999. L. SEDANTE CON LAUDANO.

℞ Esencia de trementina. 3ij (8 gr.).
Acido clorhídrico. . . 3j (4 gr.).
ó Extracto de belladona. 3ß (2 gr.).
Dilúyase en
Agua de laurel real. ℥j (30 gr.).
Se añade:
Láudano de Sydenham. . . . . ℔xviij (1 gr.).
Eter sulfúrico. . . . 3ij (8 gr.).

I. Reumatismo, dolores artríticos, hemorroides. *D.* En fricciones.

4000. *Otro* (TROUSSEAU).

℞ Extr. de estramonio. 3ß (2 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Hidroclor. de morfina. ℥vj (3 dec.).

M. I. Grietas del ano y hemorroides ulceradas. *D.* Se empapan hilas en el líquido y se aplican á la parte enferma.

4001. L. DE SIEBOLD.

℞ Alcoholado de amoniaco anisado. . . . . 3j (4 gr.).
Alcoholado de espliego. ℥ij (60 gr.).

M. I. Hipo de los niños. *D.* En fricciones en el epigastrio.

4002. L. SINAPIZADO.

℞ Aceite volátil de semillas de mostaza. . . . 5j 1 gr.
Alcohol á 40°. . . . . 3ij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥ij (64 gr.).

I. Es un rubefaciente de la piel.

4003. L. DE SCHUSTER.

℞ Sulfato de quinina. . . 3ß (2 gr.).
Licor de Hoffmann. . . 3vj (24 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes. *D.* 3j (4 gr.) para fricciones en el epigastrio tres veces al dia.

4004. *Otro* (SCHUSTER).

℞ Sulfato de quinina. . . 3ß (2 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. . . . . ℥vj (3 dec.).
Extr. acuoso de opio. . ℥xij (6 dec.).
Alcohol alcanforado. . 3x (40 gr.).

H. S. A. *I.* La misma que el anterior. *D.* 3iij (12 gr.) para fricciones en el epigastrio tres veces al dia.

4005. L. DE STOKÉS.

℞ Esencia de trementina. ℥iij (90 gr.).
Acido acético. . . . . 3v (20 gr.).
Agua de rosas. . . . . 3xx (80 gr.).
Esencia de limon. . . . 3j (4 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 1.

M. I. Epilepsia, primer período de la tisis. *D.* En fricciones.

4006. L. SULFÚRICO (*Brodie*).

℞ Acido sulfúrico. . . . ℥ß (15 gr.).
Aceite de linaza . . . . ℥jß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Hidrartrosis, reumatismo articular crónico. *D.* En fricciones en el dia.

4007. L. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (*Radius*).

℞ Sulfuro de antimonio y calcio. . . . . 3ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).
Brea. . . . . ℥ij (60 gr.).

I. Parálisis, adenitis crónica, espasmos nerviosos, sabañones, diabetes, ictiosis, eczema. *D.* En fricciones dos ó tres veces al dia.

4008. L. DE SULFURO DE CAL Ó ARCANO DE ARCHIDETI.

℞ Sulfuro de cal. . . . . ℥j 30 gr.).

Aceite de enebro,
Aceite animal de Dippel, ãã. . . . . 10 gotas.
Mézclese bien.

I. Se le ha aconsejado contra la gota.

4009. L. DE SULFURO DE CARBONO ALCANFORADO (H. DE AL.).

℞ Sulfuro de carbono. . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ß (2 gr.).
Aceite de alm. dulces. . 3j (30 gr.).
M. I. Reumatismos, tumores artríticos crónicos y tofos recientes. *D.* En fricciones.

4010. *Otro* (WUTZER Y PELLENGAM).

℞ Sulfuro de carbono. . 5ij (8 gr.).
Aguardiente alcanfor. ℥jv (125 gr.).
ó Aceite comun. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Reumatismo, gota, tofos recientes. *D.* En fricciones. Se diferencia muy poco del anterior.

4011. L. DE TANATO DE PLOMO (*José Leon*).

℞ Tanato de plomo. . . . . 5j (4 gr.).
Cerato simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de rosas. . . . . 2 gotas.
M. Se usa para fortificar la piel de los pezones y como profiláctico de las grietas. *D.* Se usa en fricciones en el pezon una vez al dia, un mes antes del parto. Se lavará antes el pecho con agua tibia. Cuando la mujer es muy excitable se suprime la esencia.

4012. L. CON LA TINTURA DE CANTÁRIDAS Y ALCANFOR.

℞ Tintura de cantáridas. ℥ß (15 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥jv (125 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ij (8 gr.).
U. S. A. *I.* Es excitante de la piel, útil en la parálisis y dolores reumáticos.

4013. L. TREMENTINADO.

℞ Esencia de trementina. 8
Acido clorhídrico. 4
I. Reumatismo y dolores artríticos. Es ligeramente rubefaciente.

4014. *Otro* (F. DEL).

℞ Jabon blando. . . . . ℥ij (60 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de trementina. lbj (500 gr.).
I. Reumatismos. *D.* En fricciones.

4015. L. TREMENTINADO OPIADO *ó Linimento trementinado.*

℞ Esencia de trementina. ℥j (30 gr.).
Aceite de manzanilla. . ℥ij (60 gr.).
Láudano de Sydenham. 3j (4 gr.).
M. I. Neuralgias, cuando no se puede soportar el uso interno de la trementina; ciática, gota.

4016. L. DE VALENTIN.

℞ Aceite de alm. dulces. ℥j (30 gr.).
Sulfuro de cal. . . . . 3j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈j (12 dec.).
I. Sarna. *D.* Se dan fricciones tres veces al dia. El tratamiento dura diez á doce dias, término medio.

4017. L. DE VERATRINA (*Turnbull*).

℞ Veratrina. . . . . 3ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
Aceite comun. . . . . 5j (4 gr.).
M. Si se disuelve la veratrina en el alcohol ó éter la mezcla es mas activa.
I. Afecciones nerviosas, reumatismos. *D.* Se usa en fricciones.

4018. L. DE VERATRINA É IODURO DE POTASIO (*Turnbull*).

℞ Veratrina. . . . . ℈j (12 dec.).
Ioduro de potasio. . . . 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
M. I. Reumatismo, angina de

pecho, hipertrofia del corazon. *D.* En fricciones.

4019. L. DE VERATRINA Y MERCURIO.

℞ Veratrina. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Ioduro de potasio. . . ʒß (2 gr.).
Manteca,
ó Ungüento mercurial doble. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Infartos linfáticos, escrófulas, amaurosis, otalgia, meningitis, espasmos. hipocondria, histérico, reumatismo, ceática, gota, disenteria, envenenamiento. *D.* En fricciones.

4020. *Otro* (TURNBULL).

℞ Veratrina. . . . . ʒß (2 gr.).
Ungüento mercurial doble. . . . . ʒj (32 gr.).

M. Se usa como los anteriores.

4021. L. DE VERDE GRIS (F. DE L.).

℞ Verde gris en polvo. ʒj (30 gr.).
Vinagre. . . . . ʒvij (210 gr.).
Miel. . . . . ʒxjv (420 gr.).

Se disuelve el verde gris en el vinagre y se cuela por un lienzo; y despues de haber echado la miel se cuece hasta la consistencia conveniente.

I. Ulceras venéreas y en inyecciones en la uretra.

4022. L. VERMÍFUGO (*Petrequin*).

℞ Aceite de ricino. . . . ʒj (30 gr.).
Aceite de ajenjos. . . . ʒß (15 gr.).
Aceite de tanaceto. . . ʒß (15 gr.).
Tintura etérea de renuevos de helecho del Dr. Peschier. . . . . 20 gotas.

D. En fricciones en el vientre. En los casos urgentes se le hace mas activo macerando en el aceite de tanaceto un poco de ajo machacado.

4023. L. VEXICANTE *ó Licor exutorio de Swediaur.*

℞ Cantáridas en polvo. . ʒß (2 gr.).
Esencia de trementina. ʒij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ℈xviij (1 gr.).

Se digiere en el baño maría durante algunos dias, se exprime, se cuela y se añade:

Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).

Se filtra. Se aplica por medio de compresas; antes de una hora de aplicado se levanta la epidermis, se enrojece la piel y se cubre de ampollas.

4024. L. VINOSO BALSAMICO (*Meyer*).

℞ Azúcar cande roja. . . ʒj (30 gr.).
Vino tinto generoso. . ʒß (15 gr.).
Bals. negro del Perú. . ʒjß (6 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Grietas de los pezones. *D.* Una aplicacion despues que el niño deja de mamar.

4025. L. VOLÁTIL DE PLENCK.

℞ Aceite de almend. dulces. ʒj (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Cólico ventoso, timpanitis, inflamaciones del pecho ó del bajo vientre y angina de pecho. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones sobre el abdómen, el pecho ó el cuello, segun el sitio de la enfermedad.

4026. L. VOLÁTIL ALCANFORADO Y OPIADO.

℞ Amoniaco líquido,
Alcanfor,
Tintura de opio, ãã. . ʒijß (10 gr.).
Aceite comun. . . . . ʒxx (80 gr.).

I. Dolores reumáticos ó gotosos, ceática, calambres, espasmos, ictericia, hipocondria, cólicos nerviosos, neumatoses, cistitis, iscuria espasmódica, ablactacion, atrofia, glositis, aftas, torticolis, artritis, artrocace, neuritis, insomnio, escleroma, peritonitis, disenteria, meningitis, gastralgia, hipo, espasmos, envenenamiento, calenturas intermitentes, beriberi, cólera, diabetes, ic-

tiosis, bocio, cretinismo, entropion. *D.* En fricciones.

4027. L. DE WHITEREAD.

℞ Aceite de trementina. . ʒiij (90 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).
Esencia de romero. . . ʒj (4 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ʒij (8 gr.).

I. Reumatismo. *D.* En fricciones en las partes doloridas.

4028. L. DE WILKINSON.

℞ Cera blanca. . . . . ʒj (12 dec. .
Flores de azufre. . . . ʒß (45 gr.)
Manteca. . . . . ʒß (45 gr.).
Brea. . . . . ʒß (45 gr.).
Licor humeante de Boyle. . . . . gxij (6 dec.).

I. Exantemas crónicos y aun en la tiña. *D.* Se frota cierta extension de la piel y no se pasa á otra sin limpiar la anterior.

LOCIONES.

4029. LOCION ACEITOSA.

℞ Aceite de beleño,
Aceite comun,
Aceite de manzanilla, ãã. ʒj (30 gr.).

I. Partos dolorosos, acrodinia, abscesos, insolacion, hipopion, nefralgias, dislocaciones, torceduras. *D.* En lociones.

4030. L. DE ACETATO DE AMONIACO.

℞ Acetato de amoniaco,
Agua, ãã. . . . . ʒjß (50 gr.).

M. I. Hidrocele de los niños. Se aplica por medio de compresas empapadas en este licor, y se las tendrá aplicadas y húmedas durante un mes cuando menos.

4031. L. ACIDA.

℞ Acido nítrico,
Acido clorhídrico, ãã. ʒj (12 dec.).
Agua destilada. . . . . ℔ß (250 gr.).

M. I. Liquen y eczema crónicos.

4032. L. DE ÁCIDO MURIÁTICO (*Sundelin*).

℞ Acido clorhídrico puro. 15 gotas.
Arrope de moras. . . . ʒiij (90 gr.).
Tintura de catecú. . . ʒj (4 gr.).

M. I. Fungosidades de la boca. *D.* Se emplea empapando un pincelito con el cual se toca la fungosidad.

4033. L. ALCALINA.

℞ Carbonato de sosa. . ʒij (8 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℔ß (250 gr.).

Disuélvase. *I.* Liquen, prurigo, eczema y otras enfermedades crónicas de la piel.

4034. *Otra*, n. 2.

℞ Acetato de amoniaco. ʒiij (90 gr. .
Alcohol. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de rosas. . . . ʒjv (125 gr.).

I. Liquen con comezon demasiado viva. *D.* C. s. para lociones con una esponja fina.

4035. *Otra* (F. F.).

℞ Carbonato de potasa. ʒij (64 gr.).
Agua. . . . . ℔ij (1000 gr.).

Disuélvase. Se usa para lavar la cabeza y las demás partes afectadas de sarna, herpes, prurito, prúrigo, eczema, tiña, etc.

4036. L. ALCALINA SULFUROSA (*Blasius*).

℞ Sulfuro de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Bicarbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
Agua destilada. . . . . ℔j (500 gr.).

Disuélvase. *I.* Prúrigo. *D.* Tres ó cuatro lociones al dia.

4037. L. ALCANFORADA.

℞ Alcohol alcanforado. . ʒij (60 gr.).

Infusion de flores de saúco. . . . . lbj (500 gr.).
Subcarbon. de potasa. 3ijß (10 gr.).

M. I. Infartos linfáticos y escrofulosos, induraciones lácteas, contusiones, úlceras escrofulosas, gota, lumbago, ictiosis. *D.* En lociones mañana y tarde.

4038. L. ALCOHÓLICA (*Swediaur*).

℞ Agua de cal. 2
Alcohol. 1

M. I. Ulceras rebeldes, inflamaciones erisipelatosas de la cara y de las demás partes del cuerpo. Se usa en inyeccion en los trayectos fistulosos.

4039. L. ALCOHÓLICA JABONOSA.

℞ Jabon blanco. . . . . ℥ij (60 gr.).
Alcohol. . . . . lbj (500 gr.).

Disuélvase. *I.* Es resolutiva y se usa en el tratamiento de la sarna.

4040. L. ALOETICA.

℞ Acíbar,
Mirra,
Azafran, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Subcarbon. de potasa. ℈ij (3 gr.).
Zumo de regaliz. . . . 3ß (15 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:
Tintura de cardamomo. ℥jv (125 gr.).

I. Para llamar las hemorroides. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) en lociones.

4041. L. ALUMINOSA.

℞ Alumbre. . . . . 3iij (12 gr.).
Sal amoniaco. . . . . 3j (4 gr.).
Agua de Bareges. . . ℈ij (3 gr.).
Agua de rosas. . . . . lbß (250 gr.).

4042. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de zinc,
Sulfato de alúmina, ää. 3ß (2 gr.).

Disuélvase en ℥jv (125 gr.) de agua de llanten.

I. Herpes, manchas hepáticas sin irritacion de la piel, eczema, impétigo, metrorragias, hemorroides, heridas, ulceras. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

4043. L. ALUMINOSA Y SULFUROSA (*Gall*).

℞ Alumbre. . . . . 3j (4 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥ij (60 gr.).

Se disuelve el alumbre en el agua de rosas y se añade:
Azufre lavado. . . . . 3ß (2 gr.).

Se agitará al tiempo de usarla.

I. Herpes y manchas hepáticas sin irritacion de la piel. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

4044. L. AMONIACAL.

℞ Flores de saúco. . . 3ijß (10 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).

Se infunde y se añade:
Sal amoniaco. . . . . ℈xc (15 gr.).

I. Heridas envenenadas, envenenamiento, enteritis? escarlatina. *D.* En lociones ligeras.

4045. L. ANTICANCEROSA.

℞ Flores de calendula,
Cicuta, ää. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).

Se infunde y se añade:
Cloruro de hierro líquido. . . . . 3ß (15 gr.).
Agua de laurel real. ℥vj (200 gr.).
Tintura de opio. . . ℥j (30 gr.).

I. Cáncer ulcerado. *D.* En lociones dos veces al dia.

4046. *Otra* (RUST).

℞ Extracto de caléndula,
Extr. de manzanilla, ää. 5ij (8 gr.).
Agua de laurel real. . ℥ij (60 gr.).

Se disuelve y se añade:
Tintura de opio. . . . 3j (4 gr.).

M. I. Ulceras cancerosas. *D.* En lociones y curas.

4047. L. ANTIPSÓRICA.

℞ Sublimado corrosivo. . 5j (4 gr.).
Agua destilada. . . . . lbj (500 gr.).

Disuélvase.

4048. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfuro de sosa. . . . ℥iij (90 gr.).

Agua de cal. . . . . lbß (250 gr.).
Se añade:
Jabon blanco. . . . . 5jß (6 gr.).
Disuelto en
Alcohol. . . . . 5iij (12 gr.).
Se lava la cabeza dos veces al dia (tiña) ó el sitio dolorido (eczema y sarna).

4049. L. ANTIEPSÓRICA (H. M.).

℞ Sulfuro de potasa. . ℥ij (60 gr.).
Agua comun. . . . . lbjß (750 gr.).
Se disuelve y se añade:
Acido sulfúrico concentrado. . . . . 3j (4 gr.).
D. Se usa dos ó tres veces al dia en lociones.

4050. *Otra* (H. DE SAN LUIS DE PARIS).

LICOR NUMERO 1.

℞ Sulfuro de potasa. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

LICOR NUMERO 2.

℞ Acido clorhídrico. ℥i á ℥ij (30 á 60 gr.).
Agua destilada. . . . . lbj (500 gr.).
Se echa ℥j (30 gr.) de cada licor en ℥jv (125 gr.) de agua caliente. Esta mezcla servirá para lociones.

4051. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Sulfuro de potasa. . . 3j (4 gr.).
Jabon blanco. . . . . 5ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . lbß (250 gr.).
I. Prúrigo, sarna, pórrigo.

4052. L. ANTIEPSORICA DE AGUA DE CAL (*Pii*).

℞ Cal viva,
Azufre, ää. . . . . ℥jß (45 gr.).
Aceite comun. . . . . c. s.
M. I. Sarna, tiña, urticaria, hipopion, gangrena de hospital. *D.* En fricciones.

4053. L. ANTIHERPETICA (*Bietl*).

℞ Sulfuro de sosa. . . . 5iij (12 gr.).
Jabon. . . . . ℥ß (15 gr.).
Alcohol. . . . . 5ij (8 gr.).
Agua de cal. . . . . lbj (500 gr.).
M. I. Afecciones herpéticas. *D.* En lociones.

4054. *Otra* (WENZEL).

℞ Hojas de tabaco. . . . . 5j (4 gr.).
Agua. . . . . c. s.
para obtener ℥viij (250 gr.) de cocimiento; se añade al fin
Hojas de cicuta. . . . . 3ij (8 gr.).
I. Aconsejada en los casos de tiña de los niños.

4055. L. ANTISÉPTICA.

℞ Cocimiento de quina. lbj (500 gr.).
Aguardiente alcanfor. ℥ß (15 gr.).
H. S. A. *I.* Ulceras de mal carácter. *D.* C. s. para lociones en las partes enfermas dos ó tres veces al dia.

4056. L. ANTISIFILÍTICA (*Richard*).

℞ Agua destilada. . . . lbß (250 gr.).
Ioduro de potasio. . ℈xviij (4 gr.).
Tintura de iodo. . . 5j (4 gr.).
M. I. Ulceras sifilíticas y en particular contra las de la garganta. *D.* En lociones.

4057. L. ANTIEPSORICA DE DUPUYTREN (H. DE M.).

℞ Hígado de azufre. . ℥jv (125 gr.).
Agua. . . . . ℥xij (375 gr.).
Acido sulfúrico. . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Se lavan tres veces al dia las partes afectadas de sarna, en cuya curacion se emplea con mucho éxito. *D.* ℥ß (15 gr.) para cada locion.

4058. L. AROMÁTICA.

℞ Cocimiento aromático. lbj (500 gr.).
Acido clorhídrico. . . . ℈xc (5 gr.).
I. Efélides, horripilaciones, gangrena, ictiosis, lumbago, íleo. *D.* En lociones.

4059. L. AROMÁTICA ALCOHOLIZADA (*Cazenave*).

℞ Esencia de menta,

Esencia de romero,
Esencia de espliego,
Esencia de limon, ãã. gjv (20 cent.).
Alcohol de 32°. . . . ℥jß (50 gr.).
Infusion ligera de tomillo. . . . . lbx (5 lit.).

I. Sarna. El tratamiento dura ocho dias.

4060. L. AROMÁTICA JABONOSA.

℞ Jabon blanco raspado. ℥ij (60 gr.).
Alcohol rectificado. . . ℥iij (90 gr.).

Se disuelve y se añade:

Esencia de espliego. . ℥jß (45 gr.).

I. Sarna. *D.* ℥ij (60 gr.) para cada friccion. Es buena preparacion.

4061. L. ASTRINGENTE.

℞ Cocimiento de bistorta, corteza de encina ó nuez de agalla. lbij (1000 gr.).
Miel. . . . . lbß (250 gr.).
Sal amoniaco en polv. ℥j (30 gr.).

I. Hidrocele. *D.* Se rocía el tumor muchas veces al dia con este líquido y se le cubre con compresas empapadas en él.

4062. *Otra*, n. 2.

℞ Alumbre,
Sulfato de zinc, ãã . 5ij (8 gr.).
Agua de llanten. . . . lbj (500 gr.).

Se disuelve y se filtra.

I. Blenorrea, hemorragia, leucorrea, dislocaciones, torceduras, protoptosis, telangiectasia. *D.* En lociones en las heridas y úlceras, y en las superficies que dan sangre. En inyeccion mezclada con seis partes de agua de rosas.

4063. *Otra* (BELL).

℞ Acetato de plomo. . . ℈ß (6 dec.).
Agua de rosas. . . . . lbß (250 gr.).
Magisterio de azufre. 5ij (8 gr.).

I. Aconsejada en las erupciones herpéticas.

4064. *Otro* (GUEPIN).

℞ Alcohol alcanforado. . ℥j (30 gr.).
Alumbre. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . ℥jv (125 gr.).

Se usan compresas empapadas en este líquido siempre que el enfermo siente calor en el ojo.

Guepin reemplaza á veces el alcohol alcanforado por ʒß (2 gr.) de extracto de belladona.

4065. L. ASTRINGENTE ALCOHOLIZADA (*Hey*).

℞ Corteza de encina en polvo. . . . . ℥jv (125 gr.).
Agua de cal. . . . . lbij (1000 gr.).

Se macera durante ocho dias, se cuela y se añade S. A.:

Alcohol rectificado. ℥jv (125 gr.).

I. Caida del recto. *D.* Se lavan las partes que han salido, y despues que se hayan reducido se aplican compresas empapadas en el líquido y se sujetan por medio de un vendaje de T.

4066. L. ASTRINGENTE ALCOHÓLICA.

℞ Alcohol. . . . . ℥ij (60 gr.)
Agua de cal. . . . . lbß (250 gr.).

I. Dislocaciones, torceduras, blenorragia, viruela, fístulas. *D.* En lociones.

4067. L. ASTRINGENTE Y ANTIHERPÉTICA (*Alibert*).

℞ Agua de rosas. . . . . lbß (250 gr.).
Alumbre. . . . . 5iij (12 gr.).
Sal amoniaco. . . . . 5j (4 gr.).
Solucion sulfurosa de Bareges. . . . . ℥j (12 dec.).

H. S. A. *I.* Herpes húmedos, eczema, angina. *D.* C. s. para hacer lociones ligeras en las partes enfermas, mañana y tarde.

4068. L. ASTRINGENTE CON AGUA DE CAL.

℞ Agua de cal. . . . . 5j (500 gr.).
Infusion de quina. . . ℥jß (45 gr.).

M. I. Úlceras atónicas, gangrena, aftas, sarcocele. *D.* Para lociones, dos veces al dia.

4069. L. ASTRINGENTE OPIADA.

℞ Sulfato de zinc. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.)
Licor de mirra. . . . . ʒj (30 gr.).
Láud. de Sydenham. ʒij (8 gr.).
I. Ulceras escrofulosas atónicas. *D.* En la cura.

4070. L. DE BARLOW.

℞ Sulfuro de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Jabon blanco. . . . . ʒijß (10 gr.).
Alcohol rectificado. . ʒij (8 gr.).
Se trituran en un mortero de porcelana y se añade:
Agua de cal. . . . . ʒvij (224 gr.).
I. Se usa contra la tiña. *D.* En compresas.

4071. L. DE BELEÑO ó *Locion calmante.*

℞ Extracto de beleño. . . ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
Disuélvase.

4072. L. DE BORATO DE SOSA (*Hufeland*).

℞ Borato de sosa. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua de rosas,
Agua de flores de naranjo, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Pecas, gangrena, prúrigo del pubis, metrorragia, fetidez, impétigo, eczema. *D.* Se humedecen tres ó cuatro veces al dia con esta solucion las partes afectadas, teniendo cuidado de dejarla secar sobre ellas. Se dice que desaparecen las manchas al cabo de algunos dias.

4073 L. CALMANTE.

℞ Agua de Goulard. 1
Cocimiento de yerba mora. 1
Cocimiento de beleño negro. . . . 1
I. Comezones ocasionadas por el prúrigo y eczema.

4074. *Otra* (TROUSSEAU).

℞ Carbonato de potasa. ʒiij (12 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
I. Prurito de la vagina.

4075. L. CALMANTE *ó Locion cianhídrica de Magendie.*

℞ Acido prúsico medicinal. . . . . 1 á 2
Agua de lechuga. 125
M. I. Herpes, cáncer ulcerado, caries, eczema, ictiosis, cánceres, úlceras, neuralgias, metrorragia y gangrena de hospital; y en inyecciones en los casos de cáncer de la matriz.

4076. L. CALCAREA Y OPIADA.

℞ Agua de cal.
Aceite de linaza, ãã. . ʒj (30 gr.).
Láudano líquido. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Grietas del pecho, gangrena de hospital, tiña, plica, quemaduras del segundo y tercer grado.

4077. L. DE CAZENAVE.

℞ Alumbre. . . . . ʒij (8 gr.).
Infusion de rosas rojas. lbj (500 gr.).
I. Acne, liquen, pian, herpes y aun eczema, impétigo.

4078. L. CIANURADA (*Cazenave*).

℞ Cianuro de potasio. . ʒß (6 dec.).
Emulsion de almendras amargas. . . . ʒvj (192 gr.).
I. Erupciones crónicas de la piel con prurito.

4079. L. DE CLORITO DE CAL.

℞ Clorito de cal. 1
Agua. 5
Disuélvase y filtrese.
I. Sarna, sífilis, úlceras, plica, prúrigo, tiña, urticaria, escarlatina, impétigo, gangrena de hospital, antrax. *D.* En lociones á los muslos, piernas y brazos, dos ó tres veces al dia. El tratamiento de la sarna dura seis dias.

4080. L. CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS.

℞ Dientes de ajos. . . 3 á 4.
Alcohol. . . . . ʒxxiij (840 gr.).
Se macera durante treinta y seis

boras, se decanta y despues se añade:

Cocim. de bardana. . ℔ß (250 gr.).

Se empapa una esponja en este licor, y se lava con ella la cabeza por la noche durante media semana.

4081. L. CONTRA LOS GANGLIOS (*Ricord*).

℞ Tintura alcohólica de iodo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (96 gr.).

Se empapan planchuelas en esta solucion.

Obra como ligero caterético; la piel se desprende sin dolores y se cura el tumor en ocho dias.

4082. L. CONTRA EL LÍQUEN Y ECZEMA CRÓNICOS (*Biett*).

℞ Acido nítrico,
Acido clorhídrico, ää. 25 gotas.
Agua destilada. . . . . ʒx (300 gr.).
Mézclese.

4083 L. CONTRA LA NEURALGIA FACIAL (*Bermel*).

℞ Agua de laurel real. . ʒjv (125 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒj (30 gr.).
Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).

Se empapa algodon en esta solucion y se aplica al sitio dolorido.

4084. L. CONTRA LA PITIRIASIS VERSICOLOR (*Biett*).

℞ Cloro. . . . . ʒj (4 gr.).
ó Licor de potasa. . . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . ℔j (500 gr.).
Mézclese.

4085. L. CONTRA LOS PÓLIPOS DE LAS FOSAS NASALES (*Dallavay*).

℞ Sulfato de zinc. ʒij á ʒj (24 dec. á 4 gr.).
Agua comun. . . . . ʒj (30 gr.).

Se introducen por medio de un estilete, cuatro ó cinco veces al dia, unas hilas humedecidas, y se dice que los pólipos se curan en quince dias.

4086. *Otra* (DURR).

℞ Tintura de opio. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒj (4 gr.).

Se aplica tres veces al dia esta preparacion á los pólipos por medio de un pincel. Se disminuye gradualmente el agua hasta usar solo el opio. Con esta locion los pólipos se arrugan y reducen á bolitas, siendo fácil arrancarlos sin dolor.

4087. L. CONTRA EL PRURITO DE LA VULVA.

℞ Borato de sosa. . . . ʒß (16 gr.).
Sulfato de morfina. . ɡrvj (30 cent.).
Agua dest. de rosas. ℔ß (250 gr.).

M. Se lavan primero las partes afectadas con agua de salvado tibia, y despues se enjugan con cuidado. Entonces se hace una locion con una esponja ó un lienzo empapado en la mistura anterior. *D.* Se repite tres veces al dia esta locion.

4088. L. CONTRA LOS SABAÑONES.

℞ Acido nítrico,
Agua de can. vinosa, ää. ʒj (30 gr.).

I. Sabañones indolentes. *D.* Se tocan dos ó tres veces al dia los sabañones indolentes con la barba de una pluma empapada en este licor.

4089. L. CONTRA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS.

℞ Alumbre . . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒx (300 gr.).
Disuélvase.

4090. L. CONTRA LOS SABAÑONES (*Brugnatelli*).

℞ Carbonato de potasa, ʒj (30 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℔j (500 gr.).

Disuélvase. Se aplican sobre los sabañones lienzos empapados en este líquido.

4091. L. CONTRA LA SARNA.

℞ Esencia de trementina de abeto plateado. ʒv (20 gr.).

Alcohol rectificado. . ℥iij (100 gr.).
Bijoduro de mercurio. gij (1 dec.).
Ioduro de potasio. . . ℊjv (2 dec.).

U. S. A. *D.* Una cucharada de este licor en un vaso de agua para lociones con una esponja fina.

4092. *Otra* (DORNBLUETH).

℞ Jabon negro. . . . . ℥iv (125 gr.).
Raiz de eléboro blanco en polvo. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua de fuente caliente. . . . . c. s.

H. S. A. una mistura de la consistencia de jarabe.

Se aplica este linimento con la palma de la mano ó con un pincel sobre todas las partes del cuerpo que presentan el menor indicio de exantema, principalmente en las articulaciones, caderas y dorso, en una cantidad proporcionada á la sensibilidad del enfermo; pero se cesa de aplicar el linimento apenas éste sienta en la parte una sensacion de quemadura con rubicundez, lo cual acaece á la segunda, tercera ó cuarta aplicacion en lugar de la picazon que se sentia antes, y se ve que aparecen nuevos botones. Al dia siguiente se frota el cuerpo con ℥iv (125 gr.) de jabon negro, y despues se le lava con cuidado en agua caliente que contenga igual dosis de jabon. Entonces no falta mas que cambiar de ropa y vestidos, lavando antes y desinfectando al enfermo por medio del ácido sulfuroso gaseoso.

4093. *Otra* (MANRY).

℞ Mercurio. . . . . ℥ij (8 gr.).
Acido nítrico. . . . ℥iv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Agua destilada. . . 10 cuart. (5 lit.).

M. D. ℥ß (15 gr.) en lociones, mañana y noche.

4094. *Otra* (DUPUYTREN).

℞ Sulfuro de potasa. . ℥iv (125 gr.).
Agua pura. . . . . lbij (1000 gr.).

Se disuelve y se añade:

Acido sulfúrico. . . ℥iv (16 gr.).

M. I. Sarna. *D.* Dos ó tres lociones al dia con ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.) de esta locion, que se dilata en un poco de agua si es muy irritante; se usa en fomentos sobre las partes enfermas y á veces en baños simples.

4095. L. CONTRA LA TIÑA.

℞ Agua de cal. . . . . lbj (500 gr.).
Sulfuro de sosa. . . . ℥vj (180 gr.).
Alcohol. . . . . ℥vj (24 gr.).
Jabon blanco. . . . . ℥ijß (10 gr.).

D. Se aplica dos veces al dia una compresa empapada en este licor.

4096. L. CONTRA LA TIÑA Y HERPES (H. DE M.).

℞ Hígado de azufre. . ℥vj (180 gr.).
Jabon de sosa . . . . ℥iij (12 gr.).
Agua de cal. . . . . ℥xviij (560 gr.).
Alcohol de 24° B. . ℥ß (15 gr.).

Se disuelve el jabon en un poco de agua caliente, y en la de cal el hígado de azufre, se juntan ambos líquidos, y se añade el alcohol. *D.* Se aplica una compresa empapada en esta solucion.

4097. L. CONTRA LAS ÚLCERAS VENÉREAS (*Gibert*).

℞ Agua clorurada. . . ℥j (4 gr.).
ó Agua aluminosa. . . ℥j (4 gr.).
Agua destilada. . . . lbj (500 gr.).
ó Agua comun. . . . . lbij (1000 gr.).
Sublimado corrosivo. ℊviij (4 dec.).
Láud. de Sydenham. 8 gotas.

4098. L. COSMÉTICA (*Laforest*).

℞ Vino tinto. . . . . ℥xij (375 gr.).
Sal comun. . . . . ℥j (4 gr.).
Sulfato de hierro. . . ℥ij (8 gr.).

Se cuece durante algunos minutos y se añade:

Oxido de cobre. . . . ℥j (4 gr.).

Se deja dos minutos al fuego y se añade:

Nuez de agalla en polvo. . . . . ℥ij (8 gr.).

I. Para teñir el pelo de negro. Se

frota el pelo con este licor, se seca con un lienzo caliente al cabo de algunos minutos, y se lava con agua comun.

4099. *Otra* (PIERQUIN).

℞ Acido clorhídrico. . . . . 3j (4 gr.).
Aceite de alm. amargas. 3j (30 gr.).

I. Equimosis, manchas de la piel, etc.

4100. L. DIURÉTICA.

℞ Tabaco,
Digital, ää. . . . . 3jß (6 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.

para obtener 3ij (60 gr.) de infusion; se cuela y se añade:

Esencia de trementina. 3ß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

Se hace una emulsion y se añade:

Extracto de escila. . . . 3ß (2 gr.).

I. Hidropesía. *D.* En fricciones en los lomos.

4101. L. DE ELÉBORO (*Swediaur*).

℞ Raiz de eléboro bl. 3jv (15 gr.).
Agua hirviendo. . . Ibij (1000 gr.).

Se cuela despues de fria y se añade:

Tintura de eléboro blanco. . . . . 3jvß (135 gr.).

I. Prúrigo y pórrigo faboso.

4102. L. EXCITANTE.

℞ Petroleo. . . . . 3ß (15 gr.).
Esenc. de trementina. 3j (4 gr.).
Espíritu de enebro. . 3jv (125 gr.).

I. Hidropesía, sabañones, congelacion, atonía de las vías urinarias. *D.* En fricciones en los lomos ó en los miembros.

4103. *Otra* (HELNSCHEL).

℞ Tintura de opio,
Eter clorhídrico, ää. . . 3ij (8 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . 3ß (2 gr.).

I. Sabañones no ulcerados, plica, viruelas. *D.* En lociones.

4104. L. ESTIMULANTE (*Sachse*).

℞ Tintura de cantáridas,
Espír. de romero, ää. 3j (4 gr.).
Solucion de carbonato de potasa. . . . . 3jß (6 gr.).
Agua. . . . . 3jv (125 gr.).

I. Alopecia, viruelas, úlceras, plica, hemacelinosis, pleurodinia, fungo medular. Sirve para hacer que nazcan los cabellos cuando una erupcion cutánea los ha hecho caer. *D.* Dos lociones al dia.

4105. L. EXCITANTE Y CÁUSTICA (*Alibert*).

℞ Cloro líquido. 2
Agua. 1

D. Se aplica por medio de un pincel de hilas sobre ciertos herpes rebeldes.

4106. L. ESTIMULANTE (*Saviard*).

℞ Potasa cáustica. . . . 3ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . 9ij (24 dec.).
Azúcar. . . . . 3ij (60 gr.).
Agua. . . . . Ibij (1000 gr.).

Disuélvase. *I.* Ulceras atónicas y fungosas, heridas indolentes, viruelas, pleurodinia, hemacelinosis. *D.* En lociones y aplicaciones.

4107. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . 9j (12 dec.).
Alcohol. . . . . 3ij (60 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vinagre. . . . . Ibß (250 gr.).

I. Fiebres asténicas y exantemas repercutidos.

4108. L. DE EXTRACTO DE RATANIA (*Trousseau*).

℞ Extracto de ratania. . 3ijß (10 gr.).
Tintura de ratania. . 3j (30 gr.).
Agua. . . . . 3vj (200 gr.).

Se pone la tercera parte de esta preparacion en dos tercios de agua caliente, y con esta mezcla se hacen lociones tres ó cuatro veces al dia, obligando al enfermo

á que haga esfuerzos como si fuera á defecar. Despues se aplica una porcion de hilas empapadas en la mistura anterior, que se dejará aplicada á la grieta. V. número 3515.

El régimen debe ser acomodado á las circunstancias, y para facilitar las deposiciones se deben dar lavativas simples ó un purgante.

Cuando en lugar de grietas existen erosiones, se usan las lavativas de nitrato de plata preparadas como sigue:

Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Nitrato de plata. . . . ʒij (4 dec.).

Esta lavativa se administra todos los dias, si bien para facilitar la absorcion se aplicará una lavativa de agua simple.

4109. L. FEBRÍFUGA (*Guatanica*).

℞ Sulfato de quinina. . ℥viij (4 dec.).
Alcohol de 36°. . . . . ʒß (15 gr.).

En fricciones á lo largo de la columna vertebral.

4110. L. FULIGINOSA.

℞ Hollin. . . . . 2 puñados.
Agua. . . . . 2 cuart. (4 lit.).

Se hierve durante media hora y se cuela.

I. Ulceras herpéticas, sóricas y venéreas. *D.* En lociones.

4111. L. GOMOSA Y MERCURIAL (*Frank*).

℞ Sublimado corrosivo. ℥ij (4 dec.).
Agua destilada. . . . ℥xij (375 gr.).
Goma arábiga. . . . ʒß (15 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Sarna, erupciones sifilíticas, etc.

4112. L. DE GUERLAIN, *Agua cosmética ó contra las pecas* (*Guerlain*).

℞ Agua destilada de laurel real.
Agua destilada de melocoton, ãã. lbxx (10,000 gr.).
Tintura de benjuí. . . ʒß (15 gr.).
Extracto de Saturno. ʒjv (125 gr.).
Alcohol mezclado con la tintura. . . . . ʒij (60 gr.).

I. Cosmético y contra las pecas.

4113. L. DE HENRY.

℞ Bicloruro de mercur. ℥jv (2 dec.).
Agua destilada. . . . ℥vj (200 gr.).
Alcoholato de menta. ʒß (15 gr.).

H. S. A. *I.* Comezones intensas, herpes sifilíticos y otros.

4114. L. HIDROCIÁNICA (*Magendie*).

℞ Acido cianhídrico. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Agua de lechuga. lbij (1000 gr.).

M. I. Herpes y cánceres ulcerados. Se usa en inyecciones en los casos de cáncer de la matriz.

4115. L. HIDROSULFURADA Ó SULFUROSA (*Dupuytren*).

℞ Sulfuro de potasa seco. ʒiij (90 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se disuelve y se filtra.

Al tiempo de usarla se añade:

Acido sulfúrico. . . . ʒj (4 gr.).

dilatado en un poco de agua.

I. Sarna. *D.* Se usa en lociones.

4116. L. IODURO SULFUROSA (*Dauvergne*).

Se prepara con ʒij (8 gr.) de la solucion número 1, y ʒjv (16 gr.) de la solucion número 2.

NÚMERO 1.

℞ Iodo 3
Ioduro de potasio. 6
Agua destilada. 24

NÚMERO 2.

℞ Sulfuro de potasa. 32
Agua destilada. 64

I. Herpes crustáceo, tiña, sifílides, sarna, impétigo, prurigo, hidrargiria, oftalmias. *D.* ʒiij á ʒvj (12 á 24 gr.) para una cubeta de agua fria ó tibia.

4117. L. CON LAS HOJAS DE NOGAL (*Negrier*).

℞ Hojas sec. de nogal. ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

Se hierve durante algunos minutos, se cuela y se empapan con-

presas ó planchuelas que se aplican á las úlceras escrofulosas.

4118. L. IODADA.

℞ Iodo. . . . . ℈j á ℈ij (5 á 10 cent.).
Alcohol rectificado. . . ℥j (4 gr.).
Se tritura en un mortero de vidrio y se añade:
Agua pura. . . . . lbj (500 gr.).
I. Ulceras de naturaleza escrofulosa.

4119. L. IODOCLORURADA (*Rhigini*).

℞ Cloruro de cal. . . . . ʒv (20 gr.).
Se tritura en un mortero de vidrio y se añade ℥ij (96 gr.) de agua; se deja aposar, se filtra y se añade:
Tintura alcohólica de iodo. . . . . ℈xc (3 gr.).
Se mezcla y se conserva en una vasija bien tapada.
I. Es útil para detener las úlceras herpéticas ó sifilíticas y las heridas de mal carácter, lavándolas muchas veces al dia con esta solucion.

4120. L. IODURADA CONTRA LA SARNA (*Cazenave*).

℞ Ioduro de potasio,
Ioduro de azufre, ää. ʒß (6 gr.).
Agua comun . . . . lbij (1000 gr.).
Disuélvase. Se auxilia esta medicacion por medio de un baño sulfuroso.

4121. L. DE JABON.

℞ Jabon blanco del comercio. . . . . ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).
Se disuelve en caliente. Se usa contra los herpes, tumores frios, edemas.

4122. L. LITONTRIPTICA.

℞ Acido clorhídrico. . . 60 gotas.
Cocimiento de cebada. ℥vj (180 gr.).
Disuélvase *I.* Cálculos, principalmente los de cal. *D.* ℥j (30 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

4123. L. MERCURIAL (*Adams*).

℞ Sublimado corrosivo. ℈x (5 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥x (300 gr.).
Se disuelve y se añade:
Tintura de cantáridas. ʒß (15 gr.).
I. Sarna.

4124. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Bicloruro de merc. ℈ß (6 dec.).
Agua destilada. . . 2 cuart. (1 lit.).
Alcohol. . . . . ℥iij (96 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).
Disuélvase. *I.* Comezones.

4125. *Otra* (MAURY).

℞ Agua destilada. . 40 cuart. (5 lit.).
Acido nítrico. . . ℥jv (125 gr.).
Mercurio crudo. . ℥ij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Sarna. *D.* ʒß (15 gr.) en lociones, mañana y tarde.
Es un medio muy cómodo que produce buenos efectos y no mancha la ropa.

4126. *Otra* (RUST).

℞ Bicloruro de mercurio. ℈ij á ℈vj (15 á 30 cent.).
Agua destilada. . . . . c. s.
Se disuelve y se añade:
Extracto de cicuta,
Extr. de manzan., ää. ʒj (4 gr.).
Tintura de opio. . . . ʒij (24 dec.).
Miel rosada. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Ulceras sifilíticas de la boca posterior, de la nariz y de las partes sexuales de la mujer. *D.* Se aplica dos á tres veces al dia por medio de un pincel. En los casos rebeldes se reemplaza la tintura por ℈j (12 dec.) de opio impuro.

4127. L. MERCURIAL ALCOHÓLICA (*Baumés*).

℞ Sublimado corrosivo. . ℈xviij (1 gr.).
Agua destil. de rosas. ℥v (150 gr.).
Agua de Colonia. . . . ʒijß (10 gr.).
I. Barros, acne, erupciones vesiculosas ó puro-vesiculosas antiguas.

4128. L. MERCURIAL ANTIHERPÉTICA (*Trousseau*).

℞ Sublimado corrosivo. ʒij (8 gr.).
Alcohol, c. s. para disolverle.
Se añade:
Agua destilada. . . . ℥vj (192 gr.).

I. Prurito de las partes exteriores de los órganos de la generacion de uno y otro sexo, y en la mayor parte de las afecciones herpéticas. *D.* Una á cuatro cucharadas en un cuartillo de agua.

4129. L. MUCILAGINOSA.

℞ Mucilago de goma,
Mucilago de membrillo,
Mucilago de linaza,
Mucilago de zaragat., ãã. ℥j (30 gr.).

I. Abscesos, heridas, eritema, insolacion, dislocaciones, torceduras. *D.* En lociones y fomentos.

4130. L. MUNDIFICANTE (*Boerhaave*).

℞ Sublimado corrosivo. ℊj (2 dec.).
Agua dest. de rosas. ℥jv (125 gr.).

D. Se lavará mañana y tarde con este licor los sitios infestados de piojos y otros animales parásitos.

4131. L. MURIÁTICA.

℞ Acido clorhídrico. . . . ℥v (20 gr.).
Agua. . . . . ℥v (160 gr.).

Disuélvase. *I.* Herpes, impétigo, sarna, tiña, eczema, prúrigo, heridas, carbunclo, envenenamiento, neuralgia. *D.* En lociones.

4132. L. MURIATADA.

℞ Cloruro de sodio. . . ℊxviij (4 gr.).
Agua. . . . . ℥vj (25 gr.).

Disuélvase. *I.* Torceduras, relajacion de las articulaciones. Se puede usar contra la sarna á la dosis de ℥ij (90 gr.) para lociones, dos ó tres veces al dia.

4133. L. NARCÓTICA.

℞ Cocimiento de yerba mora, ó Cocimiento narcótico. lbij (1000 gr.).
Opio en bruto. . . . ʒj (4 gr.).

I. Zona, soriasis, pedionalgia, gangrena de hospital, ciática, esofagismo, oftalmias. *D.* En lociones ó fricciones.

4134. L. OPIADA *ó Fomento narcótico opiado.*

℞ Opio impuro. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).

Se reduce el opio á polvo grueso, se vierte encima el agua y se deja infundir durante dos horas teniendo cuidado de menear de cuando en cuando, se cuela, se deja aposar y se decanta.

I. Abscesos, caries, gota, metrorragia, disenteria, hidrofobia, insolacion, eczema, eritema, ictiosis, impétigo, oftalmia. *D.* En lociones, inyecciones y fomentos.

4135. L. NÍTRICA Ó ÁCIDA.

℞ Acido nítrico. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

M. Se recomienda este licor para lavar las úlceras fétidas.

4136 L. DE PETROLEO.

℞ Petroleo. . . . . ℥ß (15 gr.).
Esencia de trementina. ℊxc (5 gr.).
Espíritu de enebro,
* Espíritu de espliego, ãã. ℥jß (45 gr.).
Amoniaco líquido. . . . ℥ß (15 gr.).

I. Reumatismo crónico. *D.* En fricciones en el lado enfermo y en la region lumbar en las hidropesías crónicas.

4137. L. PURGANTE.

℞ Aceite de ricino. . . . ℥jß (45 gr.).
Tint. de coloquintida. ℥ß (15 gr.).

M. I. Estreñimiento, hernia estrangulada por atascamiento. *D.* ℥ijß (10 gr.) en fricciones en el abdómen.

4138. L. DE RATANIA.

℞ Ratania. . . . . ʒv (20 gr.).

Agua. . . . . lbij (1000 gr.).
Se cuece y se añade:
Extracto de ratania. ʒß (15 gr.).
Tintura de catecú,
Tintura de goma quino, ãã. . . . ʒjß (6 gr.).
I. Leucorrea, blenorrea, caida de la vagina, metrorragia pasiva. *D.* En lociones ó inyecciones.

4139. L. RESOLUTIVA.

℞ Agua. . . . . lbij (1000 gr.).
Aguardiente alcanforado,
Extr. de Saturno, ãã. ʒß (15 gr.).
M. S. A. *I.* Contusiones, torceduras, heridas, quemaduras recientes y tumores que se quiere resolver. *D.* C. s. para hacer lociones tres ó cuatro veces al dia en las partes enfermas.

4140. *Otra*, n. 2.

℞ Agua de rosas. . . . . lbß (250 gr.).
Subcarbonato de potasa. . . . . ʒß (15 gr.).
I. Sabañones. *D.* Se aplica por medio de compresas.

4141. *Otra*, n. 3.

℞ Cal viva. . . . . ʒij (8 gr.).
Mercurio vivo. . . . ʒß (2 gr.).
Se tritura hasta que se extinga el mercurio y se añade:
Agua de jabon. . . . . lbij (1000 gr.).
I. Tumores, glándulas ingurgitadas é indolentes. *D.* Se aplica en compresas.

4142. L. RUBEFACIENTE.

℞ Tintura de pimiento,
Alcohol alcanfor., ãã. ʒiij (100 gr.).
Amoniaco líquido.
Esencia de trem., ãã. ʒjß (50 gr.).
I. Angina membranosa, escarlatina, sarampion, viruelas cuando es difícil la erupcion, corea, eczema. *D.* En fricciones en los muslos, epigastrio, delante del cuello, etc.
Nota. Algunas veces no contiene la esencia de trementina.

4143. L. RUBEFACIENTE ESTIBIADA.

℞ Tártaro emético. . . . ʒj (4 gr.).
Sublimado corrosivo. gr. 25 cent.
Agua. . . . . ʒij (30 gr.).
Espíritu de espliego compuesto. . . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Sarna, herpes, sifílides, angina, viruelas, escarlatina, plica. *D.* En fricciones en las partes que se quiera poner rubicundas y en lociones.

4144. L. SATURNINA.

℞ Acetato de plomo. . . . ʒj (4 gr.).
Agua de rosas,
Agua de llanten. . . ãã. ʒij (60 gr.).
Magisterio de azufre. . ʒj (4 gr.).
I. Erupciones herpéticas, úlceras, excrescencias, urticaria, zona, eflidrosis, insolacion. *D.* En lociones.

4145. L. DE SAÚCO CON ALCOHOL ALCANFORADO.

℞ Alcohol alcanforado. . ʒij (60 gr.).
Infusion de flores de saúco. . . . . lbj (500 gr.).
M. I. Infartos glandulosos indolentes en los niños escrofulosos.

4146. L. DE SCHARN.

℞ Sucinato de amoniaco. ʒß (2 gr.).
Jarabe de opio. . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
M. I. Corea de los que se embriagan.

4147. L. DE SUBLIMADO (*Trousseau*).

℞ Sublimado. . . . . ʒijß (10 gr.).
Alcohol. . . . . ʒiij (96 gr.).
Se usa para lociones una cucharada de café de esta solucion en lbj (500 gr.) de agua muy caliente. Se podrá segun las circunstancias aumentar ó disminuir la cantidad proporcional de la solucion alcohólica de sublimado.
I. Afecciones herpéticas pruriginosas.

4148. L. SULFO-JABONOSA.

℞. Jabon blanco raspad. ʒjß (50 gr.).
Agua. . . . . ʒxij (400 gr.).
Se disuelve y se añade:
Sulfuro de potasa liq. ʒjß (50 gr.).
I. Sarna. *D.* Es una preparacion muy eficaz.

4149. *Otra*, n. 2.

℞ Agua. . . . . ʒv (150 gr.).
Azufre,
Jabon blanco, ãã. . . . ʒj (30 gr.).
Se funde el jabon raspado en el agua en frio, se cuela con expresion al través de un lienzo y despues se añade el azufre.
I. Sarna. *D.* C. s. para hacer lociones mañana y tarde en las partes cubiertas de granos.
Nota. Es un medio irritante, que cura comunmente en quince ó veinte dias.

4150. L. SULFUROSA (H. DE M.).

℞ Hígado de azufre. . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . ʒxij (375 gr.).
Disuélvase. *I.* Erupciones herpéticas.

4151. L. SULFUROSA (*Dupuytren*).

℞ Agua destilada. . . . Ibjß (750 gr.).
Sulfuro de potasa. . . ʒjv (125 gr.).
Acido sulfúrico. . . . ʒß (15 gr.).
Se disuelve el sulfuro y se añade poco á poco el ácido sulfúrico.
I. Herpes ligeros, sarna. *D.* Las mismas que las anteriores.

4152. L. Y FOMENTOS SULFUROSOS.

℞ Polisulfuro de potasio líquido. . . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . ʒviij (250 gr.).
Láud. de Sydenham. ʒj (4 gr.).
Mézclese y consérvese en una vasija bien tapada.
I. Afecciones crónicas del sistema cutáneo, herpes furfuráceos con comezon y prurito, dolores vagos reumáticos ó gotosos de las articulaciones pequeñas.

4153. L. SULFUROSA ALCANFORADA (*Rust*).

℞ Azufre sublimado. . ʒx (40 gr.).
Alcanfor en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . Ibij (1000 gr.).
M. I. Acne, barros. *D.* Una aplicacion por la noche; al dia siguiente se quita con un lienzo el azufre adherido.

4154. L. SULFUROSA ALCALINA (H. DE M.).

℞ Azufre pulverizado. . ʒij (8 gr.).
Carbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
Agua comun. . . . . ʒxij (375 gr.).
Se tritura el azufre con el carbonato de potasa y se mezcla con el agua.
I. En los mismos casos que la locion sulfurosa alcalina.

4155. L. TREMENTINADA.

℞ Tabaco,
Dígital, ãã. . . . . ʒjß (6 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒij (60 gr.).
Se infunde y se añade:
Esencia de trementina. ʒß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . núm. 1.
Se hace emulsion y se añade:
Extracto de escila. . . ʒß (2 gr.).
I. Hidropesías, ascitis, reumatismo, acne, escarlatina, pleurodinia. *D.* En fricciones en los lomos.

4156. *Otra*, n. 2.

℞ Esencia de trementina,
Alcohol, ãã. . . . . ʒjv (125 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
I. Pitiriasis de los ancianos.

4157. L. CON VINAGRE.

℞ Vinagre blanco. . . Ibß (250 gr.).
Agua fria. . . . . Ibij (1000 gr.).
M. Se usa en fricciones ligeramente estimulantes. Se reemplaza ventajosamente el vinagre comun

por el aromático, y esta locion es muy útil para calmar las comezones y contra las granulaciones del cuello de la matriz.

4158. L. Ó FOMENTO VINOSO.

℞ Vino tinto. . . . . 2 cuart. (4 lit.).
Miel. . . . . ℥iv (125 gr.).
Disuélvase en frio.

I. Ulceras y heridas de mal aspecto.

4159. L. DE ZINC.

℞ Oxido de zinc. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de flores de saúco. ℈xc (5 gr.).
I. Erisipela flemonosa, excrescencias, úlceras, gangrena, metrorragia. *D.* En lociones.

LOOCS.

4160. LOOC ACEITOSO (F. F.).

℞ Aceite de almendras dulces,
Goma aráb. en polv., ãã. ℥ß (16 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥j (32 gr.).
Agua de flor. de naranjo. ℥ß (16 gr.).
Agua comun. . . . . ℥iij (96 gr.).
Se prepara un mucílago con la goma y una parte del agua, se añade el aceite en pequeñas cantidades para dividirle por una trituracion prolongada, y se diluye por último en el resto de los líquidos.

I. Neumonía, catarro, tos, bronquitis, ronquera, sarampion, cálculos, y en los cólicos ventosos, irritaciones intestinales ó de los órganos urinarios con estreñimiento. *D.* Se usa del mismo modo que el looc blanco.

4161. L. ACEITOSO EMÉTICO.

℞ Quermes mineral. . . . ℈j (5 cent.).
Ojimiel escilítico. . . . . ℥ß (15 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jar. de ipecacuana, ãã. ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . . ℥ij (60 gr.).
H. S. A. una emulsion. Se toma á cucharadas hasta que produzca el vómito.

4162. L. ALCANFORADO.

℞ Alcanfor. . . . . ℈v (25 cent.).
Mucílago de goma arábiga,
Jarabe de malvab., ãã. ℥ß (15 gr.).
Jarab. de flor. de nar. ℥j (30 gr.).
M. D. Una cucharadita cada dos horas.

4163. L. ALCANFORADO Y NITRADO.

℞ Alcanfor,
Nitro, ãã. . . . . ℈xv (75 cent.).
Extracto de opio. . . ℈ij (10 cent.).
Looc blanco,
Agua de lechuga, ãã. ℥iij (96 gr.).
M. I. Cistitis, blenorragia, uretritis aguda, catarro agudo, vómitos espasmódicos, vértigos, polidipsia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4164. L. DE ALMENDRAS SUCINADO.

℞ Esencia de sucino. . . 12 gotas.
Looc de almendras. . ℥vj (180 gr.).
M. I. Catarros, bronquitis crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4165. L. DE ÁLMIDON (F. P.).

℞ Almidon. 8
Catecú. 4
Jarabe de Tolú ó balsámico. . . 32
Clara de huevo batida en un poco de agua. 32
H. S. A. *I.* Diarreas rebeldes. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4166. L. AMARILLO Ó DE HUEVO.

℞ Yema de huevo. . . . . núm. 1.
Aceite de almendr. dulc. ℥j (30 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥j (30 gr.).
Agua de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).
Agua de amapolas. . . . ℥ij (60 gr.).
Se mezclan el aceite, el jarabe

y una corta cantidad de agua, haciéndolo por partes, con la yema de huevo en un mortero de mármol, se bate bien y por último se incorpora el resto de las aguas destiladas. Se usa como pectoral. *D.* ℥ij á ℥jv (60 á 120 gr.) al dia.

4167. L. AMIGDALINO.

℞ Azúcar. . . . . un terroncito.
Goma tragacanto . . . ℈xvj (8 dec.).
Jarabe simple. . . . . ℥ß (48 gr.).
Agua de flor de naranj. ℥ij (8 gr.).

Se hace un mucilago con el azúcar, la goma y el jarabe, y se añade el agua de flor de naranjo.

Se hacen ℥iij (96 gr.) de emulsion con

Almendras amargas. . ℥ß (2 gr.).
Almendras dulces . . . ℥ß (16 gr.).
Agua. . . . . c. s.

y se añade al mucilago. Cuando hay que añadir calomelanos se suprime las almendras amargas para que no se forme cloruro ó cianuro de mercurio.

4168. L. ANISADO PARA LOS NIÑOS.

℞ Anís. . . . . ℥ß (2 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol y se añade poco á poco:

Agua comun. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se cuela. *I.* Flatuosidades. *D.* A cucharadas.

4169. L. ANISADO (F. DE HAMB.).

℞ Anís,
Hinojo,
Zumo de regaliz, ää. . ℥j (30 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥xij (375 gr.).

M. I. Cólico ventoso de los niños, neumatosis. *D.* A cucharaditas de café.

4170. L. ANISADO CON JARABE DE IPECACUANA.

℞ Jarabe de ipecacuana. ℥j (30 gr.).
Looc anisado. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Se usa para hacer expeler á los niños las mucosidades de las primeras vías.

4171. L. ANODINO ALCANFORADO (H. DE M.)

℞ Looc blanco. . . . . ℥jv (125 gr.).
Extracto de opio. . . . ℊj (5 cent.).
Alcanfor. . . . . ℊvj (3 dec.).

Se pulveriza el alcanfor con dos gotas de alcohol y se le agita con un poco de mucilago espeso de goma arábiga ó de tragacanto; se deslie en el looc, y por último se añade el extracto disuelto en una corta cantidad de agua.

I. Catarros con los espasmódica pertinaz. *D.* A cucharadas.

4172. L. ANTIHELMÍNTICO.

℞ Looc gomoso. . . . . ℥jv (125 gr.).
Coralina de Córcega pulverizada. . . . . ℥ß (2 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jarabe de limon, ää. ℥j (30 gr.).

M. I. Lombrices lumbricoides de los niños, despues de haber usado la coralina de Córcega.

4173. L. ASTRINGENTE (F. N. P.).

℞ Conserva de rosas roj. ℥j (30 gr.).
Conserv. de inosbastos. ℥j (30 gr.).
Alumbre. . . . . ℈j (12 dec.).
Aceite de almend. dulc. ℥ß (15 gr.).
Jarabe de rosas. . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Astringente útil en las hemorragias pasivas estomacales ó pectorales. *D.* ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.).

4174. L. ASTRINGENTE (*Swediaur*).

℞ Cateco. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de canela . . . . ℥jv (125 gr.).

Se disuelve en frio y despues se prepara una emulsion con

Salep. . . . . ℥ß (6 gr.).
Jarabe de amapolas. . ℥ij (60 gr.).
Jar. de bals. de Tolu. ℥j (30 gr.).

M. I. Disenteria, hemotisis y diarrea crónicas, bronquitis, hemorragias pasivas, etc. *D.* Una cucharada cada hora.

4175. L. BALSÁMICO.

℞ Báls. negro del Perú. una gota.
Mézclese con
Aceite de almend. dulc. ℥ß (15 gr.).
Se mezcla en un mortero con
Goma arábiga en polvo. ʒijß (40 gr.).
Se añade poco á poco
Jarabe simple. . . . . ℥jß (45 gr.).
Emulsion simple. . . . ℥vj (180 gr.).
M. I. Bronquitis rebeldes. *D.* A cucharadas.

4176. *Otro*, n. 2.

℞ Bálsamo del Canadá. . ℊxc (5 gr.).
Yemas de huevo. . . . núm. 2.
Tintura de benjuí compuesta,
Tintura de guayaco, ää. ℥ß (15 gr.).
Aceite de menta piper. ℊxviij (1 gr.).
M. I. Gota, leucorrea, blenorrea, catarro útero-vaginal, bronquitis. *D.* A cucharadas mañana y tarde.

4177. L. BLANCO (F. F.).

℞ Almendras dulces sin
cáscara. . . . . ʒjvß (18 gr.).
Almendras amargas
mondadas. . . . . ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒjv (16 gr.).
Aceite de almend. dulc. ʒjv (16 gr.).
Polvos de gom. tragac. ℊxvj (8 dec.).
Agua de flor de naranj. ʒjv (16 gr.).
Agua comun. . . . . ℥jv (125 gr.).
Se hace una emulsion con las almendras, el agua comun y casi todo el azucar; se deslie poco á poco en esta emulsion, hasta que se obtenga un mucílago un poco claro, la goma tragacanto, que se tendrá mezclada con el resto del azucar; se añade por partes el aceite de almendras dulces y se bate por mucho tiempo; por último se diluye la mezcla con el resto de la emulsion y el agua de flores de naranjo.

I. Se usa en todas las afecciones ligeras de pecho, ronquera, bronquitis, neumonía, pleuresía, cuando la tos es seca y difícil, gota, priapismo, cistitis. *D.* A cucharadas en diferentes horas del dia.

A veces se añade:
Jarabe de diacodion,
ó Jarabe de morfina. . . ʒj (30 gr.).

4178. L. BLANCO (H. DE M.).

℞ Almendras dulces. . . núm. 12.
Azúcar blanco. . . . . ʒvj (24 gr.).
Goma tragacanto. . . . ℈ß (6 dec.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
Agua de cidra. . . . . ʒj (4 gr.).
Se hace una emulsion con las almendras, el agua y el azúcar; se cuela, se forma mucílago con la goma, se disuelve y se añade el agua de cidra.

I. V. la fórmula anterior. *D.* ʒij á ʒiij (60 á 90 gr.).

4179. L. CALMANTE.

℞ Looc blanco. . . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

4180. L. CALMANTE DE AGUA DE CAL (*Radius*).

℞ Goma arábiga. . . . . ʒijß (70 gr.).
Yemas de huevo. . . . núm. 2.
Agua de cal. . . . . ʒiij (90 gr.).
Tintura de opio. . . . ℊxc (5 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jarabe diacodion, ää. ʒj (30 gr.).
M. I. Cólico nefrítico, cálculos urinarios, arenillas, neumatosis, bronquitis.

4181. L. DE CAÑAMONES.

℞ Cañamones. . . . . ʒvß (22 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de perejil. . . . ℥v (160 gr.).
Jarabe de bálsamo del
Perú. . . . . ʒj (32 gr.).
M. I. Gonorrea. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4182. L. DE CATECÚ Y ALMIDON.

℞ Catecú. 1

Almidon. 2

Se diluye en:

Clara de huevo batida en un poco de agua y jarabe de Tolú. . . 8

M. I. Diarreas rebeldes. *D.* ʒjv á ʒv (120 á 150 gr.) á cucharadas en las veinticuatro horas.

4183. L. CIDONIADO.

℞ Semillas de membrill. ʒijß (10 gr.).
Agua de lirio,
Agua de adormid., ãã. ʒij (64 gr.).
Jarabe de violetas. . . ʒjß (48 gr.).

M. I. Disenteria, diarrea crónica, lienteria, vómitos espasmódicos, vértigos, cardialgia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4184. L. COMPUESTO.

℞ Alcanfor. . . . . ℈vj (3 dec.).
Looc blanco. . . . . ʒjv (125 gr.).
Extracto de opio. . . . ℈j (5 cent.).
Extracto de quina. . . ℈jv (2 dec.).

M. I. Catarros pulmonares con secrecion abundante de mucosidades. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4185. L. CONTRAESTIMULANTE.

℞ Looc blanco de la F. F. ʒv (150 gr.).
Quermes mineral. . . . gxviij (1 gr.).

M. D. A cucharadas cada dos horas.

4186. L. CONTRAESTIMULANTE *ó contra la neumonía* (*Trousseau*).

℞ Looc blanco. . . . . ʒjv (125 gr.).
Antimonio diaforético lavado. . . . . ʒj (4 gr.).

D. Se da una cucharada cada dos horas. Se agita al tiempo de usarle.

Se administra durante muchos dias luego que se han calmado un poco los primeros síntomas de la neumonía.

4187. L. DULCIFICANTE (*Gaubius*).

℞ Esperma de ballena,
Goma arábiga, ãã. . ʒij (8 gr.).
Agua de rosas. . . . . ʒjx (288 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒvj (24 gr.).

Se tritura durante mucho tiempo la esperma de ballena con la goma y el azúcar hasta que estén bien divididos, se añade un poco de agua de rosas, se tritura durante diez minutos y se mezcla poco á poco el resto del agua.

I. Se usa en las enfermedades de pecho para calmar la tos. *D.* Una cucharada cada hora.

4188. L. ESCILÍTICO.

℞ Looc simple gomoso. ʒjv (125 gr.).
Miel escilítica. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Es expectorante. *D.* A cucharadas.

4189. L. EXPECTORANTE.

℞ Raiz de poligala. . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvj (180 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Goma amoniaco. . . . ʒj (4 gr.).
Jarab. de báls. de Tolú. ʒij (60 gr.).

I. Catarro pulmonar, bronquitis crónica, asma. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4190. *Otro* (BARBEYRAC).

℞ Jarabe de violetas. . . ʒjß (45 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒß (2 gr.).
Flores de benjui. . . . ʒß (15 gr.).

Mézclese para un looc.

I. Asma. *D.* A cucharadas para favorecer la expectoracion en los ancianos asmáticos.

4191. *Otro* (ROUCHER).

℞ Jarabe de malvabisco,
Jarabe de tusílago, ãã. ʒjß (45 gr.).
Goma arábiga. . . . ℈xx (10 dec.).
Agua de lirio. . . . . ʒij (60 gr.).

I. Tos; modera la irritacion de la traquearteria y facilita la expectoracion.

4192. L. EXPECTORANTE DE ÁCIDO BENZÓICO.

℞ Ácido benzóico. . . . gxc (5 gr.).

Mucílago de goma aráb. ʒijß (40 gr.).
Se tritura y se añade:
Jarabe de báls. de Tolú. ℥ij (60 gr.).
I. Catarro, bronquitis, neumonia crónica, neumatosis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

4193. L. EXPECTORANTE É INCISIVO (*Astruc*).

℞ Miel de Narbona,
Pulpa de pasas, ää. . . ℥ij (60 gr.).
Flores de benjuí,
Flores de azufre, ää. . ʒj (4 gr.).
Jarabe de erisimo. . . . c. s.
I. Afecciones crónicas de pecho, asma húmedo. *D.* Una cucharada de café, tres ó cuatro veces al dia.

4194. L. DE GOMA ARÁBIGA (F. N. P.).

℞ Goma aráb. en polvo. ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . . ℥jv (125 gr.).
Aceite de almend. dulc. ʒß (15 gr.).
Jarabe de altea. . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. *I.* Afecciones catarrales, ronquera. *D.* ʒß á ℥j (15 á 30 gr.) dos ó mas veces al dia.

4195. L GOMOSO.

℞ Goma arábiga en polvo. . . . 2 á 4
Se tritura en un mortero de mármol con
Jarabe de miel, de malvabisco ó de culantrillo, etc. 8
Agua comun ó infusion de flores pectorales. 32
M. I. Diarreas rebeldes. *D.* ℥jv á ℥v (120 á 150 gr.) al dia.

4196. L. DE GORDON.

℞ Jarabe de lombarda. Ibj (500 gr.).
Agua. . . . . Ibß (250 gr.).
Azafran. . . . . ʒiij (12 gr.).
Se hierve un momento y despues se cuela por una estameña.
I. Asma húmedo, romadizo y catarros. *D.* Una cucharada cada hora.

4197. L. DE HUEVO (F. F. ANT.).

℞ Aceite de almendr. dulc. ℥ij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 1.
Jarabe de malvabisco. . ℥j (32 gr.).
M. I. Tos, ronquera, catarro, bronquitis, neumonia. *D.* A cucharadas.

4198. L. INGRASANTE (*Gaubius*).

℞ Aceite de almend. dulc. ʒß (45 gr.).
Jarabe de violetas,
Miel blanca,
Yema de huevo, ää. . ʒß (15 gr.).
M. S. A. *I.* Enfermedades de pecho cuando se han suprimido los esputos. *D.* Una cucharada cada media hora.

4199. L. JABONOSO (F. ED.).

℞ Aceite de almendr. dulc. ℥j (30 gr.).
Jarabe de limones. . . . ʒjß (6 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ℥j (4 gr.).
H. S. A. *I.* Se usa como laxante y antiácido para los niños. *D.* Una cucharada cada hora hasta producir evacuaciones.

4200. L. DE J. P. FRANK.

℞ Mucílago de goma arábiga,
Miel cocida, ää. . . . . ℥ß (30 gr.).
M. D. A cucharadas, y se bebe despues una taza ó vaso de infusion de flores de violetas, borraja ó frutos béquicos.

4201. L. LAXANTE PARA LOS NIÑOS.

℞ Looc blanco. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de rosas pálidas. ℥j (30 gr.).
Se da la mitad por la tarde y el resto al otro dia por la mañana.
Se puede usar el jarabe de achicorias compuesto en lugar del solutivo.

4202. L. DE NAFTALINA (*Dupasquier*).

℞ Looc blanco. . . . . número 1.
Naftalina. gx á ʒß (50 cent. á 2 gr.).
Mézclese bien.
I. Romadizos y catarros crónicos. *D.* A cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

1203. L. OPIADO.

℞ Extr. acuoso de opio. ℈ß (6 dec.)
Looc de almendras dulces. . . . . ℥v (150 gr.).

Disuélvase. *I.* Vómitos, gastritis, pleuresía, neumonía, bronquitis, ronquera, tétanos, hemacelinosis, neumatosis, hipocondría. *D.* A cucharaditas de café de dos en dos horas.

1204. L. PECTORAL (*Berends*).

℞ Goma amoniaco. . . . . ʒij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 1.
Agua de hinojo. . . . . ℥v (150 gr.).
Amoniaco anisado. . . ʒiij (12 gr.).
Vino emético. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe escilítico. . . . ℥j (32 gr.).

M. I. Catarro sofocante, asma húmedo, neumonía, sarampion, bronquitis. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

1205. *Otro* (FRANK).

℞ Goma amoniaco. . . . . ʒijß (10 gr.).
Acetato de amoniaco. ℥ij (96 gr.)
Vino emético. . . . . gtc (5 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ℥j (32 gr.).
Infusion de saúco. . . ℥ij (96 gr.).

I. Catarro crónico, bronquitis, neumonía crónica, hidrotorax, sarampion. *D.* Una cucharada cada dos horas.

1206. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Ojimiel escilítico,
Jarabe de malvabisco,
Mucílago de goma arábiga, ää. p. ig.

M. I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una cucharada cada dos horas.

1207. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . gjv (2 dec.).
Mucílago de goma aráb.,
Miel blanca, ää. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. A cucharadas.

1208. *Otro* (PREZIOZI).

℞ Agua destil. de saúco. ℥v (150 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . ℥jß (45 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de polígala. . . ℥jß (45 gr.).
Jarabe de violetas. . . ℥j (30 gr.).
Kermes mineral. . . . gij (1 dec.).

H. S. A. *I.* Tisis pulmonar. *D.* A cucharadas.

1209. L. PECTORAL SULFURO ANTIMONIADO.

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de marrubio blanco,
Extr. de polígala, ää. ʒj (4 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ℥j (30 gr.).
Jarabe de erisimo. . . ℥ij (60 gr.).

I. Catarro, bronquitis, neumonía crónica. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

1210. L. PURGANTE.

℞ Resina de jalapa. . . gvj (30 cent.).
Looc blanco. . . . . ℥iv (125 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa como purgante en los niños de seis á diez años. *D.* De una vez por la mañana en ayunas.

1211. *Otro*, n. 2.

℞ Raiz de jalapa,
Escamonea, ää. . . . . gviij (4 dec.).
Jarabe de horchata. . ℥j (30 gr.).
Agua de fl. de naranjo. ℥jß (45 gr.).
Esencia de limon. . . 2 gotas.

I. Afecciones biliosas, cálculos, embarazo gástrico. *D.* Por la mañana en ayunas como purgante.

1212. L. PURGANTE CON TÁRTAGO.

℞ Aceite de tártago. . . . 10 gotas.
Aceite de almend. dulc. ʒß (15 gr.).

Se echan en tres dracmas de goma en polvo, y se añade poco á poco:

Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (90 gr.).
Alcoholato de limon. . . 10 gotas.

Se toma de una vez como purgante. Reemplazando las diez gotas de aceite de tártago por una

gota de aceite de croton tiglio se obtiene el *looc purgante de croton*.

4213. L. QUERMETIZADO.

℞ Looc blanco. . . . . ℥jv (125 gr.).
Quermes. . . ℊj á ℊjv (5 á 20 cent.).
M. S. A. *I.* Es incisivo y diaforético. *D.* A cucharadas de hora en hora. V. *Looc contraestimulante.*

4214. L. QUERMETIZADO Y ALCANFORADO.

℞ Quermes mineral. . . ℊiij (15 cent.).
Alcanfor. . . . . ℊjv (20 cent.).
Mucil. de goma aráb. ℥ß (15 gr.).
Jarab. de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Crup en el principio, neumonía, vómitos espasmódicos. *D.* A cucharadas.

4215. L. SÓLIDO (*Gallot*).

℞ Almendras dulces. . lbj (500 gr.).
Almendras amargas. ℥ij (60 gr.).
Goma arábiga. . . . . lbij (1000 gr.).
Azúcar blanca. . . . lbij (1000 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. S. A. una pasta.

4216. L. SIMPLE DE RESINEONA.

℞ Looc blanco de la F. F. sin azúcar. . . . . ℥jv (125 gr.).
Sacaruro de resineona. ℥j (30 gr.).
Se puede poner cinco partes de resineona con nuevecientas noventa y cinco de aceite de almendras dulces para componer los loocs en lugar del sacaruro, en la cantidad de ℥j (30 gr.).
D. ℥ß (15 gr.) en una pocion de ℥jv (125 gr.).

4217. L. COMPUESTO DE RESINEONA.

℞ Aceite de almendras dulces . . . . . ℥ß (15 gr.).
Jarabe de violetas. . . ℥ß (15 gr.).
Sacarur. de resineona. ℥j (30 gr.).
Infusion béquica. . . ℥iij (90 gr.).
Agua de flor de naranjo. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Goma arábiga en polv. c. s.

4218. L. TREMENTINADO (*Recamier*).

℞ Esencia de trementina. ℥iij (12 gr.).
Yema de huevo. . . . . número 2.
Jarabe de yerbabuena. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe de éter. . . . . ℥j (30 gr.).
Tintura de canela. . . . ℥ß (2 gr.).
M. S. A. *I.* Neuralgia, ciática, neuritis, parálisis, gangrena de hospital, lepra. *D.* Tres cucharadas al dia.
Nota. Cuando este medicamento produce vómitos se añade:
Láud. liquido de Sydenham. ℥j (4 gr.).

4219. *Otro* (H. DE M.).

℞ Esencia de trementina. ℥iij (12 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.
Agua de yerbabuena,
Jarabe de cidra, ää. . . ℥ij (60 gr.).
Alcohol de canela. . . . ℥ß (2 gr.).
Se tritura la esencia con las yemas de huevo en un mortero de vidrio, se añade despues el jarabe y por último poco á poco el agua agitando bien la mezcla.
I. Neuralgias. *D.* A cucharadas.

4220. L. VERDE *ó Looc de azafran* (F. F. ANTIGUA).

℞ Alfónsigos recientes. . número 11.
Azafran. . . . . ℊjv (2 dec.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de violetas. . . ℥j (30 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ℥ij (8 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . ℥ß (15 gr.).
Goma tragacanto en polvo. . . . . ℊxvj (8 dec.).
M. S. A. *I.* Bronquitis, neumonía crónica. *D.* A cucharadas de hora en hora.
El *looc rojo* se diferencia de este en que se reemplazan los alfónsigos por ℥j (4 gr.) de quermes mineral. Siendo difícil encontrar los

alfónsigos secos, se los sustituye con las almendras dulces; y para darle color basta el jarabe de violetas y el azafran.

4221. L. VERMÍFUGO.

℞ Infusion de musgo de Córcega.	℥iij (90 gr.).
Aceite de ricino. . . .	℥jß (45 gr.).
Jarabe de flores de melocoton.	℥j (30 gr.).
Calomelanos.	ℊvj (30 cent.).
Ruibarbo.	ℊviij (4 dec.).

H. S. A. *I.* Afecciones verminosas. *D.* A cucharadas cada dos horas.

4222. L. DE YERBA ESCARCHADA.

℞ Zumo de yerba escarchada, reciente y espumado.	℥j (30 gr.).
Jarabe de visco acerciono.	℥ß (15 gr.).

Mézclese.

MACERACIONES.

4223. MACERACION AMARGA (*Plisson*).

℞ Corteza de quina. . .	℥ijß (10 gr.).
Raiz de colombo. . .	℥j (4 gr.).
Raiz de ruibarbo. . .	℥j (4 gr.).
Semillas de anis. . .	℥j (4 gr.).
Hojas de ajenjos. . .	℥ß (2 gr.).
Magnesia.	℈j (12 dec.).
Agua fria.	lbij (1000 gr.).

Se deja en maceracion durante doce horas y se filtra por un papel.

I. Es muy eficaz en las dispepsias, anorexias, debilidades y languideces del estómago. *D.* Un vaso, dos veces al dia, antes de comer y cenar.

4224. MACERADO ANTICTÉRICO (*Souberbielle*).

℞ Polv. de hojas de nogal.	℥j (4 gr.).
Vino blanco.	℥v (150 gr.).

Se macera durante doce horas y se cuela.

D. En una toma por la mañana en ayunas.

4225. M. CALCAREO DE ZARZAPARRILLA (*O'Beirne*).

℞ Zarzaparrilla roja cortada.	℥jv (125 gr.).
Raiz de regaliz. . . .	℥ß (15 gr.).
Agua de cal.	lbij (1000 gr.).

Se macera durante veinticuatro horas y se cuela.

I. Formas secundarias de la sífilis. *D.* lbj (500 gr.) al dia.

MANILUVIOS.

4226. MANILUVIOS.

Se preparan con mostaza, carbonato de potasa y algunas veces con el ácido clorhídrico.

Son útiles cuando la sangre afluye en abundancia al pecho, como en la hemotisis, aneurisma del corazon, asma, etc.

Se usa la mitad de las dosis que en los baños de piés.

MASAS.

4227. MASA ODONTÁLGICA (*Henry*).

Se satura de éter sulfúrico la almáciga, se decanta despues de algunos dias de maceracion, se empapa una bolita de algodon de igual grosor que la cavidad del diente cariado y se aglutina de modo que se llene el vacío del diente. V. *Odontoides*.

4228. *Otra* (VOGLER).

℞ Opio desecado.	℥j (30 gr.).
Almáciga,	
Sandaraca, ãã.	℥ij (8 gr.).
Sangre de drago.	℥ß (2 gr.).
Aceite volátil de romero.	8 gotas.
Espíritu de cochearia. . .	c. s.

Despues de haber pulverizado separadamente la almáciga, la sandaraca, la sangre de drago y el opio, se los mezcla; se los humedece con el aceite volátil, se los pista en un mortero de mármol y se añade poco á poco el espíritu, para formar una masa uniforme, de consistencia blanda y semiductil.

I. Dolores de dientes. *D* Se extiende sobre la encía enferma una porcion de esta masa como el volúmen de un guisante.

MASTICATORIOS.

4229. MASTICATORIO AROMÁTICO.

℞ Mirra.	4
Canela.	3
Alcanfor.	1
Trementina cocida.	16

Se incorporan los dos polvos en la trementina fundida con el alcanfor.

4230. M. INDIANO.

℞ Hojas de pimienta betel.	1

Se machacan é incorporan poco á poco con

Nuez de areca en polvo.	2
Cal viva preparada con conchas de ostras.	1

Mézclese.

4231. M. IRRITANTE.

℞ Almáciga en polvo.	6
Liquidambar.	3

Se funde y se incorpora poco á poco:

Polvo de raiz de pelitre.	2
Polvo de pimiento anual.	1

MEDICINAS.

4232. MEDICINA DE MANÁ CON FRAMBUESA.

℞ Maná en lágrimas. . .	℥jß (45 gr.).
Agua.	℥jv (125 gr.).
Carbon animal. . . .	℈xc (5 gr.).
Jarabe de frambuesas.	℥j (30 gr.).
Jarabe de flores de melocoton.	℥j (30 gr.).

Se funde el maná á fuego lento, se añade el carbon y se mantiene la mezcla al fuego por espacio de media hora, agitando sin cesar; se echa en un filtro y despues de frio se añade el maná y los dos jarabes.

Esta dosis es para un adulto.

Purga con suavidad sin producir dolores, y es el mas agradable de los purgantes líquidos conocidos.

1233. M. DE CAFÉ.

2ℓ Sen.	ʒijß (40 gr.).
Sulfato de magnesia. .	ʒß (15 gr.).
Café tostado.	ʒß (15 gr.)
Agua.	ʒiv (125 gr.).

Se hierven estas sustancias durante algunos instantes, se cuela y se añade:

Jarabe simple.	ʒjß (45 gr.).

D. De una vez.

Esta medicina es un purgante muy agradable. V. n. 699.

1234. M. DE MAGNESIA *ó Medicina blanca (Mialhe).*

2ℓ Magnesia calcinada oficinal.	ʒij (8 gr.).
Agua simple.	ʒx (40 gr.).
Azúcar en polv. grueso.	ʒjß (50 gr.).
Agua de flores de naranjo.	ʒv (20 gr.).

Se trituran exactamente en un mortero de porcelana la magnesia calcinada con el agua comun, se introduce despues esta leche magnesiana en un cazo de plata, y se calienta hasta la ebullicion completa agitando sin cesar con una espátula de plata, para evitar que el óxido magnésico se precipite hidratándose. Hecho esto se aparta el cazo del fuego, se añade el azúcar y se continúa agitando hasta que se haya disuelto enteramente esta última; finalmente se añade el agua de flor de naranjo y se cuela por una estameña. Se mantiene siempre líquida.

I. Es buen purgante sin producir incomodidad ni cólicos; produce pocas evacuaciones, pero copiosas, y como pultáceas, blandas; y tarda en obrar cinco á seis horas.

D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas y despues medio vaso de agua fria, pero no mas.

1235. M. DE NAPOLEON *(Corvisart).*

2ℓ Crémor de tártaro soluble.	ʒj (30 gr.).
Tartrato de potasa y de antimonio. . . .	ɡß (25 milig.).
Azúcar.	ʒij (60 gr.).
Agua.	lbij (1000 gr.).

H. S. A. *I.* y *D.* Es un laxante suave, del que se presentaban algunos vasos por la mañana á Napoleon.

Nota. Es necesario preferir el crémor de tártaro hecho soluble por el procedimiento de Soubeiran.

MERMELADAS.

1236. M. DE ALBARICOQUES *ó Electuario de albaricoques.*

2ℓ Albaricoques bien maduros.	lbvj (3000 gr.).
Azúcar blanca. . . .	lbjv (2000 gr.).

Se abren por medio los albaricoques para separar los huesos; se cortan en pedazos; se ponen en un lebrillo con el azúcar en polvo grueso; se agita de cuando en cuando por veinticuatro horas para que se disuelva el azúcar en el zumo de los albaricoques; se pone todo en un perol al fuego, y se cuece prontamente meneándolo sin cesar hasta que la mermelada al enfriarse tome una consistencia firme; entonces se le añade una parte de las almendras de albaricoques que se han separado de los huesos y mondado de sus películas, y se echa en vasijas.

Se usa en la economía doméstica.

Del mismo modo se preparan las MERMELADAS DE CIRUELAS Y MELOCOTONES, pero en estas no entran las almendras de los frutos.

1237. M. ANTIESCORBÚTICA *ó Alimentacion antiescorbútica.*

℞ Patatas cocidas al vapor. . . .	100
Quina en polvo.	6
Jarabe simple.	25
Agua.	100

Hágase una pasta.

D. ʒjv (125 gr.) que se duplica al quinto ó sesto dia.

1238. M. ASTRINGENTE.

℞ Trementina cocida. . .	ʒj (30 gr.).
Bálsamo de copaiba. .	ʒß (15 gr.).

Mézclese exactamente en un mortero calentado y añádase:

Mucílago de goma arábiga.	ʒj (30 gr.).
Conserv. de rosas roj.	ʒjv (125 gr.).

I. Gonorrea inveterada. *D.* ʒjß á ʒiij (6 á 12 gr.) tres veces al dia.

1239. M. ASTRINGENTE (*Olier*).

℞ Bálsamo de copaiba. .	ʒjv (125 gr.).
Aceite de sucino. . . .	ʒjv (16 gr.).
Láudano líquido. . .	ʒij (8 gr.).
Subcarbon. de potasa.	ʒjß (6 gr.).

Se mezclan estas sustancias en un mortero de mármol y se añade c. s. de una mezcla de

Almidon.	1
Azúcar blanca.	2

H. S. A. *I.* Gonorreas crónicas. *D.* Una cucharada de café por la mañana, al mediodía y por la tarde, aumentando una cucharada cada tres dias.

1240. M. CONTRA LOS CATARROS CRÓNICOS.

℞ Miel.	ʒviij (250 gr.).

Se funde en una vasija de barro y al apartarla del fuego se añade:

Flores de azufre,	
Raiz de énula campana,	
Extracto de regaliz,	
Agua de rosas, ää. .	ʒij (8 gr.).

H. S. A. *D.* El volúmen de una nuez moscada tres ó cuatro veces al dia, y se bebe despues un vaso de infusion de pétalos de amapola ó de flores de saúco caliente y bien azucarada.

1241. M. EXPECTORANTE.

℞ Maná en lágrimas. .	ʒvj (180 gr.).
Quermes mineral.	ɡjv á ɡvj (2 á 3 dec.).
Aceite de almendras dulces,	
Jarabe de poligala,	
Jarabe escilítico, ää.	ʒij (8 gr.).

Mézclese bien.

D. Una cucharada de café cuatro ó cinco veces al dia. Se bebe despues una taza de té ligero.

1242. M. EXPECTORANTE DE BENJUÍ Ó BENZÓICA.

℞ Flores de benjuí,	
Azufre, ää.	ɡxviij (1 gr.).
Ipecacuana.	ɡvj (3 dec.).
Miel.	ʒv (150 gr.).
Jarabe de poligala de Virginia,	
Jarabe escilítico, ää.	ʒj (30 gr.).

M. I. Catarro y neumonía crónica de los ancianos, bronquitis. *D.* Una cucharada de café, tres ó cuatro veces al dia.

1243. M. DE GENGIBRE *ó Mermelada estimulante.*

℞ Gengibre en polvo. .	ʒß (15 gr.).
Miel.	ʒvj (180 gr.).

I. Bronquitis, catarro pulmonar crónico, afonía. *D.* Una cucharada de café dos ó tres veces al dia. Es la *mermelada de Rosem.*

1244. M. JABONOSA.

℞ Jabon medicinal. . . .	ʒß (2 gr.).
Agua de menta. . . .	ʒiij (12 gr.).

Se añade:

Yemas de huevo. . . .	número 2.
Magnesia blanca. . . .	ɡr.jv (3 gr.).
Ruibarbo.	ʒß (2 gr.).
Jarabe de malvabisco,	
Jar. de manzanilla, ää.	ʒijß (10 gr.).

I. Cólicos de los niños, neumatosis. *D.* A cucharadas.

1245. M. PECTORAL (*Vergnes*).

℞ Ipecacuana.	℈ß (6 dec.).
Azufre.	℈j (12 dec.).
Lirio.	ʒj (4 gr.).
Jarabe de malvabisco. .	ʒij (60 gr.).

Maná. . . . . ʒij (60 gr.).

I. Coqueluche. *D.* Una cucharada de café dos ó tres veces al dia.

4246. M. SUCINADA.

℞ Quermes mineral. . . ǧjv (2 dec.).
Aceite de sucino,
Jarabe de poligala,
Jarabe escilítico, ãã. ʒij (8 gr.).
Maná. . . . . ʒvj (180 gr.).
Hágase una pasta blanda.

I. Neumonía crónica, para facilitar la expectoracion en los catarros crónicos. *D.* A cucharadas.

4247. M. DE TRONCHIN.

℞ Maná en lágrimas,
Jarabe de violetas,
Pulpa de cañafístula,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . ʒj (32 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ʒj (4 gr.).

II. S. A. *I.* Se usa como purgante suave en los catarros, bronquitis y neumonía. *D.* Esta dosis se toma en dos mañanas y á cucharadas de hora en hora; se bebe un caldo ligero despues de cada toma.

4248. M. DE ZANETTI.

℞ Quermes mineral. . . . ǧjv (2 dec.).
Maná en lágrimas. . ʒij (60 gr.).
Manteca de cacao. . . ʒvj (24 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Cañafístula cocida, ãã. ʒj (30 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒjß (45 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ʒß (15 gr.).

II. S. A. *I.* Catarro, bronquitis, neumonía crónica, atrofia mesentérica. *D.* Algunas cucharadas de café al dia cuando se quiere favorecer la expectoracion y mantener al mismo tiempo el vientre libre.

MEZCLAS.

4249. MEZCLA ACÚSTICA (*Richter*).

℞ Bálsamo del Perú. . . ʒj (4 gr.).
Hiel de buey. . . . . ʒiij (12 gr.).

M. I. Flujos purulentos y fétidos de los oidos. *D.* Se llena de esta mezcla el conducto auditivo, y despues de algunos minutos de contacto se deja salir el líquido; se renueva esta operacion dos ó tres veces al dia.

4250. M. ANTICANCEROSA (*Rust*).

℞ Flores de caléndula,
Hojas de caléndula,
Hojas de cicuta, ãã. ʒj (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ij (1000 gr.).

Se infunde durante media hora, se cuela y se añade S. A.

Alcoholado de cloruro de hierro. . . . ʒß (15 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ʒvj (180 gr.).

D. En lociones, fomentos ó inyecciones, segun los casos.

4251. M. ANTICATARRAL (*Richter*).

℞ Raiz de rubia. . . . ʒij (8 gr.).
Raiz de cardo corredor. . . . . ʒvj (24 gr.).
Agua comun. . . . . ℔jß (750 gr.).

Se hierve durante media hora y se añade:

Salep. . . . . ʒj (4 gr.).

Se continúa hirviendo hasta que se reduzca la mitad, se cuela y se añade:

Jarabe de malvabisc. ʒj (30 gr.).

I. Catarros crónicos inveterados. *D.* Dos cucharadas de dos en dos horas.

4252. M. ANTIESPASMÓDICA (*Armstrong*).

℞ Extracto de cicuta. . . ǧxvj (8 dec.).

Agua de menta,
Agua comun, ãã. . . ʒjv (135 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Coqueluche en segundo ó tercer período. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

4253. M. ANTIESPASMÓDICA (*Blache*).

℞ Oxido de zinc. . . . . ʒij (8 gr.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . . ʒj (4 gr.).
Valeriana en polvo. . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en setenta tomas.

I. Enfermedades epilépticas de los niños. *D.* Dos tomas al dia, una por la mañana en ayunas y otra antes de comer.

4254. *Otra* (MOST).

℞ Raiz de cálamo aromático,
Raiz de angélica, ãã. ʒij (8 gr.).
Hojas de melisa,
Hoj. de naranjo, ãã. ʒj (4 gr.).
Hojas de sena. . . . ʒß (2 gr.).
Cilantro. . . . . ℈xij (60 cent.).

I. Histérico acompañado de estreñimiento. *D.* Esta dosis todos los dias en infusion de lbj (500 gr.) de agua.

4255. M. ANTILEUCORRÉICA (*Neumann*).

℞ Verde gris,
Sulfato de cobre,
Sulfato de zinc, ãã. ʒij (8 gr.).
Agua de fuente. . . lbjß (750 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca una tercera parte

I Leucorrea vaginal crónica. *D.* Una parte de la mezcla con tres partes de infusion de salvia en inyecciones.

4256. M. ANTIODONTÁLGICA (*Toirac*).

℞ Acetato de plomo,
Sulfato de zinc, ãã. . ℈xviij (1 gr.).
Tintura de opio. . . ℈xxxvj (2 gr.).

I. Odontalgia por caries. Se pone en la cavidad del diente un poco de esta mezcla que abulte como la cabeza de un alfiler.

4257. M. ANTISIFILÍTICA (*Pihorel*).

℞ Ungüento mercurial. . . . . ʒ
Sulfuro de cal. . . . . ʒ

Mézclese. Se hace una friccion por las noches al acostarse con ʒj (4 gr.) de esta mezcla, que se extiende con un pedazo de piel para dar una friccion en la parte interna de las dos piernas ó en la parte anterior del antebrazo. Al dia siguiente se lavan las partes en que se ha hecho la friccion con agua de salvado ó de jabon. Siguiendo este método no hay que temer la salivacion; los enfermos que han empezado á salivar con una friccion de menos de ʒß (2 gr.) han dejado de salivar con fricciones de ʒj (4 gr.) de la mezcla.

4258. M. BALSÁMICA (*Smith*).

℞ Bals. negro del Perú. ʒß (2 gr.).
Hiel de buey . . . . . ʒjß (45 gr.).

M. I. Otitis crónica. *D.* Se echan algunas gotitas en el oido muchas veces al dia, despues de haberle limpiado con agua de jabon. V. núm. 4249.

4259. M. CONTRA LA TIÑA (*Blaud*).

℞ [redacted]llin. . . . . ʒij (60 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 6.

Mézclese exactamente.

4260. M. DE CIANURO DE ZINC (*Magendie*).

℞ Cianuro de zinc. . . . ℊvj (3 dec.).
Magnesia calcinada. . ℊv (2 dec.).
Polvo de canela. . . . ℊij 15 cent.).

M. I. Calambres de estómago. *D.* Se toma cada cuatro horas.

4261. M. DESINFECTANTE (*Siret*).

℞ Sulfato de hierro. lbxl (20000 gr.).
Sulfato de zinc. . lbij (1000 gr.).
Sulfato de cal. . . lbliij (26500 gr.).

Carbon vegetal. . lbij (1000 gr.).

Mézclese y con c. s. de agua se hace una pasta con la que se desinfectarán cien varas con ciento veinte libras.

4262. M. DESINFECTANTE (*Knod*).

℞ Flores de caléndula. . ʒiij (12 gr.).
Agua de fuente. . . . . ℥v (150 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca dos quintas partes, se cuela con expresion y se añade S. A.

Extracto de caléndula. ʒj (4 gr.).
Brea. . . . . ʒij (60 gr.).
Acido piroleñoso. . . . ʒjß (45 gr.).
Goma arábiga en polvo. c. s.

I. Sirve para destruir el olor fétido que se exhala de ciertas úlceras cancerosas. *D.* Dos ó tres aplicaciones al dia.

4263. M. EMENAGOGA (*Mansfeld*).

℞ Sulfuro de carbono. . ʒj (32 gr.).
Iodo. . . . . ℈v (25 cent.).

M. D. Dos gotas en una taza de cocimiento de harina de avena azucarada, tres veces al dia.

4264. M. FRIGORÍFICAS.

1.ª Acido clorhídrico del comercio. . 1
Sulfato de zinc reducido á polvo fino. 1

Hace bajar la temperatura desde + 10° á — 7° ó 17°.

2.ª Sal amoniaco. 5
Sal de nitro. 5
Agua. 16

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 12° ó 22°.

3.ª Sulfato de sosa. 3
Acido nítrico diluido. 2

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 19° ó 26°.

4.ª Sulfato de sosa. 3
Nitrato de amoniaco. 5
Acido nítrico diluido. 4

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 26° ó 36°.

5.ª Fosfato de sosa. 9
Nitrato de amoniaco. 6
Acido nítrico diluido. 4

Hace bajar la temperatura de + 10° á — 30° ó 40°.

Se puede preparar hielo artificial colocando una vasija llena de agua en medio de estas mezclas.

Se pueden obtener temperaturas mas bajas mezclando hielo ó nieve, ácidos ó sales, pero estos frios no son necesarios sino en las operaciones de química.

4265. *Otra* (BOUTIGNI DE EU).

℞ Sulfato de sosa no eflorescido en polvo. . . . . lbjv (2000 gr.).
Acido sulf. á 41°. . lbiij (1500 gr.).

Nota. El ácido sulfúrico á 41° resulta de la mezcla de siete partes en peso de ácido sulfúrico del comercio y cinco partes de agua, que se deja enfriar colocando la vasija que le contiene en agua fresca.

Se pone en una caja la mezcla y dentro de ella se sumergen dos cajas de hoja de lata de cabida cada una lbiij (1500 gr.) de agua, la que puede helarse con tres dosis de la mezcla anterior cuando se opera á la temperatura de 10°.

4266. HIELO ARTIFICIAL (*Courdemanche*).

℞ Sulfato de sosa pulverizado. . . lbvjß (3250 gr.).
Acido sulfúrico á 36°. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se mezclan estas sustancias en un barril, en que se sumergen cilindros de hoja de lata que contengan el agua que se quiere helar; al cabo de tres mezclas, renovadas consecutivamente, se verifica la congelacion.

4267. *Otro* (FILHOL).

Las mezclas frigoríficas que usa son las siguientes:

NÚMERO 1.

℞ Sulfuro de sosa. 800

Acido clorhídrico del comercio. 500

NÚMERO 2.

Nitrato de amoniaco. 1000
Agua. 1000

4268. M. REFRIGERANTE INGLESA, *Sal ó fomento refrigerante* (*Vauquelin*).

℞ Cloruro de potasa. 38
Sal amoniaco. 32
Nitrato de potasa. 10

M. Nota. Esta mezcla salina, disuelta en cuatrocientas partes de agua fría, hace bajar 15° R. la temperatura de este líquido.

4269. M. MERCURIAL (*Cazenave*).

℞ Oxido rojo de mercurio. ʒj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . . ʒlj v (3 gr.).

Mézclese y divídase en diez papeles iguales.

I. Sífilis terciaria. *D.* Uno por la mañana y al dia siguiente otro por la tarde. De este modo se podria aumentar hasta dos ó tres papeles mañana y tarde.

Es un medicamento activo, que determina pronto la salivacion.

4270. *Otra* (VELPEAU).

℞ Calomelanos. . . . . ʒxc (5 gr.).
Agua de malvabisco. . ʒv (150 gr.).

Se agita fuertemente la mezcla, y se empapan planchuelas que se colocan sobre las partes afectadas de grietas y úlceras sifilíticas.

4271. M. ODONTALGICA (*Rust*).

℞ Eter sulfúrico,
Alcoholado de opio, ää. ʒß (2 gr.).
Esencia de clavo. . . . ʒj (12 dec.).

M. I. Odontalgia por caries. *D.* Algunas gotas en la cavidad del diente.

4272. M. OLEO-SINAPIZADA (*P. Frank*).

℞ Harina de mostaza negra muy fina. . . . . ʒiij (12 gr.).
Aceite de almendras. . ʒß (15 gr.).
Zumo de limon. . . . . c. s.

H. S. A. una mezcla blanda.

I. Efélides. *D.* En fricciones mañana y noche.

4273. M. PARA DESENGRASAR LAS TELAS DE SEDA.

℞ Jabon negro. 125
Miel. 150
Aguardiente. 400

Se lava la tela en esta mezcla y despues se aclara en agua.

4274. M. PARA FUMAR ó *Fumigacion calmante* (*Trousseau*).

℞ Hojas de estramonio,
Hojas de salvia, ää. . . . . c. s.

para fumar en una pipa ó en un cigarro.

I. Asma seco ó húmedo. Echadas en las ascuas calman los accesos de tos, los catarros crónicos y el asma.

4275. M. PARA LOCIONES (*Biett*).

℞ Alumbre. . . . . ʒiij (12 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ʒj (4 gr.).
Sulfuro de potasa líquido. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . ℔ß (250 gr.).

I. Al fin del eczema, impétigo. *D.* En lociones.

4276. *Otra* (BIETT).

℞ Dulcamara,
Beleño,
Yerbamora, ää. . . . . un puñado.

Se hierven en agua con un poco de raiz de malvabisco, y se aplican sobre las partes enfermas compresas empapadas en este cocimiento.

I. Acne, liquen.

4277. *Otra* (BIETT).

℞ Extracto de belladona. ʒij (8 gr.).
Agua de cal. . . . . ℔ß (250 gr.).
Aceite de alm. dulc. ʒjv (125 gr.).

H. S. A. un linimento.

Sirve para untar las superficies

inflamadas del eczema y del impétigo.

4278. M. PARA LOCIONES (*Biett*).

℞ Cianuro de potasio. . ℊxij (6 dec.).
Emulsion de almendras amargas. . . . ℥vj (190 gr.).

Se usa en las erupciones crónicas con prurito.

4279. *Otra* (BIETT).

℞ Acetato de amoniaco. ℥iij (90 gr.).
Alcohol. . . . . ℥iv (15 gr.).
Agua de rosas. . . . ℥jv (125 gr.).

Se usa en el liquen para hacer lociones en las partes enfermas con una esponja fina, cuando es muy viva la comezon.

4280. *Otra* (BIETT).

℞ Acido cianhídrico. . ℥ij (8 gr.).
Sublimado corrosivo ℊij (1 dec.).
Emulsion de almendras amargas. . . . ℥x (300 gr.).

Se usa en las erupciones crónicas con prurito.

4281. *Otra* (BIETT).

℞ Sulfato de zinc,
Acetato de plomo, ää. ℈j (12 dec.).
Agua de rosas. . . . . ℥v (150 gr.).
Mucil. de membrillos. ℥j (32 gr.).

Se usa en ciertos casos de eczema y de impétigo de la cara y de los oidos. Se emplea en la leucorrea crónica.

4282. *Otra* (BIETT).

℞ Cocimiento de raiz de malvabisco. . . . . lbj (500 gr.).
Extracto de Saturno. . ℥j (4 gr.).

Se usa en el liquen y eczema crónicos.

4283. *Otra* (BIETT).

℞ Sulfuro de potasa. . . ℥j (4 gr.).
Jabon blanco. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . lbß (250 gr.).

Se usa contra el prurigo, sarna y pórrigo.

4284. *Otra* (BIETT).

℞ Subcarb. de potasa. . ℥j (4 gr.).
Azufre sublimado. . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se usa en el prurigo y principalmente en su declinacion, cuando ha disminuido el prurito.

4285. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Acido nítrico,
Acido clorhídrico, ää. 24 gotas.
Agua destilada. . . . ℥x (300 gr.).

Se usa en el liquen y eczema crónicos.

4286. *Otra* (MAGENDIE).

℞ Agua destilada de lechuga. . . . . lbij (1000 gr.).
Acido cianhídrico medicinal. . . . ℥ij 8 gr.)

M. I. y *D.* C. s. para aplicarla sobre los herpes, cánceres ulcerados, y para hacer inyecciones en el caso de cáncer de la matriz, comezon y dolores excesivos.

Nota. Se puede aumentar la dosis del ácido hasta ℥jv (15 gr.).

4287. M. PECTORAL (*Magendie*).

℞ Agua destilada. . . . lbj (500 gr.).
Azúcar pura. . . . ℥jß (45 gr.).
Acido cianhídrico medicinal. . . . . ℥j (4 gr.).

M. S. A. *I.* Tisis. *D.* Una cucharada mañana y noche; se menea cada vez que haya que usarla.

Nota. Parece preferible no poner primero mas que ℥ß (2 gr.) de ácido y aumentar sucesivamente la dosis.

4288. *Otra* (SANTA MARIA).

℞ Goma arábiga en polvo. 1
Miel. 1

M. I. Tos catarral con estreñimiento. *D.* ℥ß á ℥ij (15 á 60 gr.) y mas al dia.

4289. *Otra* (VILLERMÉ).

℞ Agua destilada. . . . . lbj (500 gr.).

Azucar pura. . . . . ʒjß (45 gr.).
Hidrocianato de potasa medicinal. . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Tisis. *D.* Una cucharada mañana y noche; se puede dividir la dosis hasta darla seis ú ocho veces en veinticuatro horas.

1290. M. PULVERULENTA.

℞ Cloruro de oro y sodio. ḡj (3 cent.).
Polvo de licopodio. . ḡij (10 cent.).

Mézclese y divídase en quince papeles. En seguida se divide otra dosis igual en catorce papeles, luego en trece, en doce y en diez.

I. Sífilis. *D.* Un papel al dia en fricciones en la lengua y en las encías.

1291. M. RESOLUTIVA (*Becker*).

℞ Alcohol alcanforado,
Alcoholato de enceb., ãã. ʒj (30 gr.).
Vinagre escilítico. . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Tumores sanguíneos de la cabeza de los recien nacidos. *D.* Tres ó cuatro aplicaciones al dia.

1292. M. VOMITIVA (*Magendie*).

℞ Emetina de color. . . ḡjv (20 cent.).
Infusion ligera de hojas de naranjo. . . ʒij (60 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . . . ʒß (15 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Catarros pulmonares crónicos, coqueluche, diarreas antiguas. *D.* Una cucharada de media en media hora.

1293. M. PARA LOS APARATOS INMÓBILES.

℞ Destrina. . . . . ℔jß (750 gr.).
Goma. . . . . ℔ß (250 gr.).

Disuélvase en caliente.

Es muy aglutinante y da gran solidez á las compresas impregnadas en ella.

Las proporciones de polvo y agua necesarias para producir una solucion de una densidad conveniente, son:

Polvo. . . . 1 litro que pesa 500 gr.
Agua. . . . . ℔v (2500 gr.).

Esta solucion será suficiente para 100 compresas que tengan 43 centímetros de largo por 38 de ancho.

1294. VENDAJE DE DESTRINA.

℞ Agua . . . . . ℔xx (10000 gr.).
Destrina. . ʒjv á ʒv (120 á 150 gr.).

Se disuelve por medio del agua hirviendo. Se empapa en la solucion una venda con que se cubre las dos terceras partes de la anchura de la venda sin usar compresas, sin necesidad de poner las vueltas unas encima de otras. Se quitará el vendaje á los tres dias, y aunque parezca flexible se mojará bien con agua tibia antes de quitarle para que se haga pronto, tomando las mayores precauciones para que no arranque la epidermis.

I. Eczema con varices y edema, despues que haya pasado el período agudo.

Quitado el vendaje, deben pasar veinticuatro horas antes de aplicar otro nuevo.

MIELES.

1295. MELITO SIMPLE *ó Jarabe de miel* (F. F.).

℞ Miel blanca. . . . . ℔vj (3000 gr.).
Agua comun . . . . ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve en caliente, se despuma y cuando el melito hirviendo señale 30°, se cuela por una bayeta.

I. Sirve para dulcificar las tisanas y pociones demulcentes, y es ligeramente laxante para los niños. *D.* ʒj á ʒiij (30 á 90 gr.).

1296. MIEL ANTISIFILITICA (F. N. P.).

℞ Miel rosada. . . . . ʒij (64 gr.).
Tintura de mirra. . . . ʒjv (16 gr.).

Sublimado corrosivo. . gjv (2 dec.).

U. S. A. *I.* Ulceras venéreas de la boca, garganta y nariz, sobre las que se aplica por medio de un pincel.

4297. M. DE BORAX (F. P.).

℞ Borax en polvo. . . . . ʒjv (16 gr.).
Miel. . . . . ʒiij (96 gr.).

M. I. Aftas, úlceras de la boca.

4298. MELITO DE CELEDONIA.

℞ Zumo de celedonia. 2
Miel. 3

M. I. Se usa exteriormente como detersivo, y lo es mas que la miel rosada.

Del mismo modo se prepara la MIEL DE ROMERO.

4299. M. DE ELATERIO.

℞ Frutos maduros de cohombrillo amargo. 1
Miel. 2

Se machaca todo, se echa en un saco de tela que estará colgado, se mezclará lo que fluye con el producto de la expresion, y se evaporará hasta la consistencia de jarabe espeso.

D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en lavativas.

4300. M. ESCILÍTICA *ó Melito de escila* (F. F.).

℞ Escamas secas de cebolla albarrana. . ʒj (32 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbj (500 gr.).
Miel blanca. . . . . ʒxij (375 gr.).

Se infunde la escila en el agua durante doce horas, se cuela con expresion, se deja aposar, se decanta, se añade la miel y se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Hidropesías, catarro crónico, bronquitis crónica, hemorragia pasiva, absceso escrofuloso; se usa como diurético y expectorante. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en un vehículo apropiado.

Del mismo modo se prepara la MIEL DE COLCHICO. *I.* Catarro crónico, hidropesía pasiva, bronquitis crónica. *D.* ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).

4301. M. DE ESCILA COMPUESTA.

℞ Escamas de escila. . . ʒjv (125 gr.).
Poligala de Virginia. . ʒjv (125 gr.).

Se hierve en lbviij (4000 gr.) de agua hasta que se reduzca la cuarta parte, se cuela y se añade:

Miel depurada. . . . lbij (1000 gr.).

Se reduce á la cuarta parte, se cuela y á cada libra (500 gr.) se añade:

Tártaro emético. . . gjv (2 dec.).

4302. M. DE MERCURIAL, *Melito de mercurial* (F. F.).

℞ Zumo depurado de mercurial. . . . . lbij (1000 gr.).
Miel blanca. . . . . lbij (1000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

D. ʒj á ʒjv (30 á 125 gr.) para una lavativa. V. t. I, pág. 353.

4303. M. DE MERCURIAL COMPUESTA *ó Jarabe de larga vida* (F. F.).

℞ Raiz reciente de lirio. ʒij (64 gr.).
Raiz seca de genciana. . . . . ʒj (32 gr.).
Vino blanco. . . . . ʒxij (375 gr.).
Zumo depurado de mercurial. . . . . lbij (1000 gr.).
Zumo depurado de borraja. . . . . lbß (250 gr.).
Zumo depurado de buglosa. . . . . lbß (250 gr.).
Miel blanca. . . . . lbij (1500 gr.).

Se maceran durante veinticuatro horas las raices de lirio y la genciana en el vino blanco; se cuela el líquido con expresion, se le mezcla con los zumos de las plantas y la miel, se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Es purgante, estomacal y emenagoga. *D.* ʒj á ʒjv (30 á 125 gr.).

4304. M. DE MERCURIAL COMPUESTA.

℞ Jarabe de larga vida,
Zumo clarificado de mercurial, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Zumo de borraja,
Zumo de buglosa, ãã. ʒij (8 gr.).
Lirio. . . . . ʒß (2 gr.).
Genciana,
Sen, ãã. . . . . ℊxviij (4 gr.).
Vino blanco. . . . . ʒiij (12 gr.).
Miel. . . . . ℥jß (45 gr.).

I. Estreñimiento, atrofia mesentérica. *D.* ʒj á ℥j (4 á 30 gr.) como laxante.

4305. M. DE MERCURIAL COMPUESTA *ó Jarabe vinoso de larga vida.*

℞ Raiz de genciana. . ʒij (64 gr.).
Lirio de Florencia. ℥v (125 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒij (8 gr.).
Sen escogido.. . . . ʒij (8 gr.).

Se cortan en pedacitos los tres primeros ingredientes, y se ponen con el sen en un cántaro bien barnizado ó en una redoma de vidrio grueso, que es mejor; se echa

Vino blanco seco. . 1 azumbre (2 lit.)

y se deja en infusion por veinticuatro horas sobre ceniza caliente ó cuarenta y ocho horas al sol, meneando cuatro ó cinco veces; se cuela por un paño bien limpio y sin exprimir, y se vuelve á echar en la vasija bien limpia.

Se añade:

Zumo de mercurial,
Zumo de buglosa,
Zum. de borraja, ãã. lbj (500 gr.).
Miel blanca buena. lbvj (3000 gr.).

Se mezclan muy bien con la tintura, y se pone la mezcla en un perol sobre un hornillo muy encendido, en el cual se echará la composicion para que hierva, teniendo cuidado de espumarla bien mientras cuece; se cuela por una manga y se pone al fuego hasta que tome la consistencia de jarabe, se sacará del perol, se deja enfriar y se embotella. Estando bien tapado, se podrá conservar por largo tiempo, teniendo asimismo el cuidado de colocarle en un paraje templado. *D.* Se toma por las mañanas una cucharada; no se comerá ni beberá hasta pasadas dos ó tres horas.

Este medicamento ha sido preconizado últimamente como un remedio universal, capaz de prolongar mucho la vida, conservando buena salud; el lector juzgará al considerar los ingredientes de que se compone, hasta qué punto pueden corresponder estos elogios con los efectos del medicamento. Con este objeto se le hace tomar dos largas temporadas al año, en primavera y en otoño. Conviene tomar este jarabe por espacio de seis meses ó un año contra las enfermedades inveteradas, y tambien para corroborar la salud é impedir las recaidas.

I. Se le ha aconsejado en el asma, ictericia, vértigos, jaquecas y generalmente en todas las enfermedades internas, tercianas, cuartanas y fiebres contínuas.

4306. M. MERCURIAL (*Swediaur*).

℞ Oxido rojo de mercurio,
Azúcar blanca, ãã. . . ʒj (12 dec.).
Miel blanca. . . . . ʒiij (90 gr.).

U. S. A. I. Se usa para aplicarla á las úlceras sifilíticas por medio de una planchuela.

4307. M. DE MERCURIO DULCE (*Swediaur*).

℞ Mercurio dulce. . . . . ʒj (4 gr.).
Miel. . . . . ℥j (30 gr.)

M. I. Ulceraciones venéreas de la garganta y de las partes genitales.

4308. M. DE MORAS *ó Arrope de moras* (F. E.).

℞ Zumo de moras negras recien exprimido. . . . . ℥xij (375 gr.).

Miel. . . . . lbjß 250 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se cuece en una vasija de Talavera hasta que tome la consistencia de jarabe espeso y se cuela.

I. Se usa en gargarismos en las inflamaciones y escoriaciones de la boca, de la garganta y de la lengua. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

4309. M. CON PROTOIODURO DE MERCURIO (*Biett*).

℞ Miel. . . . . ℥xij (375 gr.).
Protoioduro de merc. ℥j (30 gr.).

Se tocan ligeramente las ulceraciones sifilíticas.

4310. M. DE QUININA (*Petzold*).

℞ Miel purificada. . . . ℥jß (45 gr.).
Sulfato de quinina. . ℈jx (50 cent.).
Alcohol sulfúrico. . ℥j (4 gr.).

I. Calenturas intermitentes de los niños. *D.* Una cucharadita de café de dos en dos horas despues de mezclarle exactamente. Se continuará por el tiempo suficiente.

4311. MELITO DE RÁBANO RUSTICANO.

℞ Zumo de rábano rusticano. . . . . ℥iij (90 gr.).
Miel. . . . . ℥xij (375 gr.).

Se mezcla en frio.

I. Coriza; bronquitis, catarro crónico, edema del pulmon. *D.* ℥j á ℥iij (30 á 90 gr.) para endulzar una tisana pectoral.

4312. M. DE ROMERO.

℞ Sumidád. de romero. ℥xij (375 gr.).
Miel blanca. . . . . lbjß (750 gr.).
Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).

Se clarifica la miel, se la vierte hirviendo sobre la planta y se cuela á las veinticuatro horas.

4313. MIEL ROSADA ó *Melito de rosas rojas* (F. F.).

℞ Pétalos secos de rosas rojas. . . lbij (1000 gr.).
Agua hirviendo. . . lbxij (6000 gr.).
Miel blanca. . . . . lbxij (6000 gr.).

Se infunden las rosas en el agua por espacio de veinticuatro horas, se cuela con expresion, se deja aposar, se decanta, se añade la miel al licor, se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Anginas, aftas, afonia, poligalaccia. Es astringente y se usa principalmente en las afecciones de la boca ó de la faringe. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.) para un gargarismo. Se usa solo por medio de un pincel en las aftas de la boca ó de la faringe.

4314. M. ROSADA TREMENTINADA (*Martinet*).

℞ Esencia de trementina. ℥ß (2 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥j (30 gr.).

A veces se añade:

Jarabe diacodion. . . . ℥ijß (10 gr.).

H. S. A. *I.* Lumbago, neuralgias, ciática. *D.* ℥ß á ℥ij (15 á 60 gr.) ó tres cucharadas al dia.

4315. M. TREMENTINADA (*Recamier*).

℞ Esencia de trementina. ℥ij (8 gr.).
Miel blanca. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Neuralgias, lumbago, ciática. A veces se añade ocho partes de jarabe diacodion. *D.* Tres cucharadas al dia.

4316. M. DE SALVIA (*Neuber*).

℞ Hojas de salvia. . . . ℥ij (64 gr.)
Agua hirviendo. . . . . c. s.

para obtener lbß (250 gr.) de infusion; se añade:

Miel blanca. . . . . lbß (250 gr.).

Se evapora S. A. hasta la consistencia de miel sin espuma.

4317. MIEL DE BAYAS DE SAÚCO ó *Arrope de saúco* (F. E.).

℞ Zumo del fruto maduro de saúco. . . ℥xij (375 gr.).
Miel clarificada. . . . lbjß (750 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se cuece hasta que tome la con-

sistencia de jarabe y se cuela para usarla.

I. Hidropesía é ictericia; es sudorífica y produce buenos efectos en la gota. *D.* ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.).

4318. M. DE VIOLETAS *ó Miel violada.*

℞ Violetas frescas con sus cálices. 1
Miel blanca. 5

Se infunden las violetas en doble de su peso de agua hirviendo, se mezcla la infusion con la miel y se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. y *D.* Se usa como laxante en lavativas á la dosis de ℥j á ℥jv (30 á 120 gr.).

4319. M. DE ROSAS ROJAS, *Miel rosada, Rodomel* (F. E.).

℞ Zumo de rosas rojas,
Miel buena, ää. . . Ibij (1000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe espeso y se cuela.

RODOMEL.

4320. RODOMEL CIDONIADO.

℞ Semillas de membrillo. ℥j (30 gr.).

Se hierve en Ibij (1000 gr.) de agua hasta que se reduzca la tercera parte; se añade al líquido colado:

Subborato de sosa. . . ℥ij (12 gr.).
Rodomel. . . . . ℥ij (60 gr.).

D. Se usa en gargarismos cinco á seis veces al dia.

MISTURAS.

4321. MISTURA ABSORVENTE AROMÁTICA (*Ringj.*

℞ Creta preparada. . . . ʒjv (48 dec.).
Goma arábiga en polv. ʒij (24 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥jv (125 gr.).
Hidrolato de canela. . ℥jß (43 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥jß (15 gr.).

U. S. A. *I.* Diarreas crónicas. *D.* Dos cucharadas despues de cada evacuacion.

4322. M. ABSORVENTE.

℞ Magnesia calcinada. ℈v á ℈viij (25 á 40 cent.).
Jarabe de goma. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Acedías, vómitos de los niños, diarrea. *D.* A cucharaditas de café, cada dos horas.

4323. *Otra*, n. 2.

℞ Tintura de opio. . . . 60 gotas.
Tint. de goma quino. ℥ij 8 gr.
Creta preparada. . . . ʒiij (12 gr.).
Goma arábiga,
Azúcar, ää. . . . . ℥jß (6 gr.).
Agua de menta. . . . ℥vj (192 gr.).

M. I. Diarreas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4324. M. CON ACEITE ÉTÉREO DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Bonjean y Wright*).

℞ Aceite etéreo de cornezuelo de centeno. ℈xviij (1 gr.).
Azúcar en polvo. . . . ℥jß (45 gr.).

I. Conviene en los mismos casos que la infusion de cornezuelo de centeno. *D.* En dos tomas con un poco de vino blanco.

4325. M. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Roesch*).

℞ Aceite de hígado de bacalao,
Jarabe de cáscara de naranja,
Agua destil. de anis, ää. ℥j (30 gr.).

Esencia de cálamo aromático. . . . . 3 gotas.

M. I. Afecciones escrofulosas, tabes mesentérica, coxalgia, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos, tisis incipiente. *D.* Tres cucharadas al dia.

1326. M. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO (*Rayer*).

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ʒiij (90 gr.).
Agua comun,
Jarabe de opio, ãã. . . ʒij (60 gr.).
Goma arábiga en polvo. ʒß (15 gr.).

M. I. Gastritis crónica, neumonia crónica, raquitis, escrófulas, tubérculos pulmonares. *D.* Se tomará esta pocion en tres dias en tres tomas iguales al dia.

1327. M. ACEITOSA CALMANTE (H. DE AL.).

℞ Aceite de ricino,
Jarabe de cáscara de naranja, ãã. . . . . ʒiij (90 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒß (15 gr.).

M. D. Una cucharada cada media hora.

1328. M. ACÉTICA (*Sundelin*).

℞ Eter acético. . . . . ʒß (2 gr.).
Vinagre concent. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Agua de sangüesas. . ʒv (150 gr.).
Jarabe de sangüesas. . ʒij (60 gr.).

D. Se toma una cucharada cada hora ó cada dos horas.

I. Conviene en el eretismo de las calenturas nerviosas.

1329. M. ACIDA.

℞ Acido nítrico,
Acido clorhíd., ãã. ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . ℔ij (1500 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒij (64 gr.).

M. S. A. I. Hinchazones glandulares sifilíticas. *D.* En varias tomas al dia.

1330. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Sulfato de potasa. . ʒß 2 gr.
Cocim. de cebada. . ℔ij (1000 gr.).

Se disuelve y se añade:

Ojimiel simple. . . . ʒj 32 gr.
Vinagre. . . . . ʒjß (6 gr.).

1331. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Acido nítrico. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . ℔ij (750 gr.).
Jarabe de canela. . . ʒjß (48 gr.).

M. I. Sífilis, hepatitis crónica, tifo, etc. *D.* Una cucharada cada tres horas.

1332. *Otra* (SELLE).

℞ Agua pura. . . . . ʒxx (625 gr.).
Ojimiel simple. . . . ʒjv (125 gr.).
Acido sulfúrico. . . . ʒj (4 gr.).

M. S. A. I. Fiebres adinámicas. *D.* Una taza cada hora.

1333. M. ACIDA CON CANELA (*Most*).

℞ Elixir ácido de Haller. ʒijß (10 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒß (2 gr.).
Alcoholado de canela. ʒj (30 gr.).

M. I. Metrorragia debida á un estado de espasmo. *D.* Veinticinco á cincuenta gotas cada media hora.

1334. M. ACIDA CONTRA LAS DISENTERIAS REBELDES (*Malgaine*).

℞ Acido nítrico. . . . . ʒß (2 gr.).
Acido sulfúrico. . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . ℔ij (1000 gr.).

D. Una cucharada por la mañana, otra por la tarde y la tercera al otro dia por la mañana. Se aguarda veinticuatro horas para ver el efecto del medicamento, y se vuelve á empezar si no ha producido el efecto que se desea.

1335. M. ACIDA OPIADA (*Most*).

℞ Elixir vitriólico de Mynsicht. . . . . ʒiij (12 gr.).
Elixir ácido de Haller. . ʒij (8 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒj (4 gr.).

M. I. Delirio trémulo, particularmente cuando se teme una congestion hácia el encéfalo. *D.* Treinta gotas, tres ó cuatro veces al dia.

4336. M. DE ACIDO BENZOICO (*Sundelin*).

℞ Acido benzóico. . . . . gviij (4 dec.).
Licor amoniacal anisado. . . . . 3ß (2 gr.).
Vino emético. . . . . 3ij (8 gr.).
Jarabe de poligala del Senegal,
Ojimiel escilítico,
Jarabe de altea, ãã. . 3iij (12 gr.).
M. D. Una cucharada de las de café cada hora ó cada dos horas.

4337. M. CON ACIDO FOSFÓRICO (*Sundelin*).

℞ Palo de Campeche. 3jß (45 gr.).
Agua comun. . . . . lbiij (1500 gr.).
Se cuece hasta que queden lbij (1000 gr.) y al fin de la coccion se añade:
Cáscara de naranja. 3ß (15 gr.).
Se cuela y se añade:
Acido fosfórico puro. 3ij (8 gr.).
Jarabe de canela. . 3ij (60 gr.).
I. Metrorragia asténica.

4338. M. DE AGUARDIENTE (F. DE L.).

℞ Aguardiente,
Yemas de huevo,
Agua de canela, ãã. . 3jv (125 gr.).
Azúcar purificada. . . 3ß (15 gr.).
Aceite de canela. . . 2 gotas.
Mézclese.

4339. M. ALCALINA *ó Mistura de bicarbonato de sosa* (BIETT).

℞ Jarabe de fumaria. . lbj (500 gr.).
Bicarbonato de sosa. . 3iij (12 gr.).
M. I. Eczema, liquen, prurigo, etc. *D.* Se toman dos cucharadas, una por la mañana en ayunas y otra por la noche al tiempo de acostarse.

4340. M. ALCALINA DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO.

℞ Aceite de higado de bacalao. . . . . 3j (30 gr.).
Carbonato de potasa. . . 3j (4 gr.).
Jar. de flor de naranjo. 3j (30 gr.).
Agua. . . . . 3ij 60 gr.).
M. I. Neumonía crónica, raquitis, escrófulas, tubérculos pulmonares.

4341. M. ALCANFORADA (H. DE INGL.).

℞ Alcanfor. . . . . 9j (12 dec.).
Alcohol. . . . . 10 gotas.
Azúcar blanca. . . . . 3ß (15 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Se tritura primero el alcanfor con el alcohol, despues el azúcar, se añade el agua y se cuela.
I. Blenorragia, inflamacion de los órganos génito-urinarios. *D.* 3j á 3ij (30 á 60 gr.) cada tres ó cuatro horas, solo ó como vehículo de otros medicamentos.

4342. M. ALCANFORADA COMPUESTA (*Duncan*).

℞ Alcanfor. . . . . 9ij (24 dec.).
Azúcar. . . . . 3ß (15 gr.).
Se tritura y se añade poco á poco:
Agua de menta piperita. 3vj (180 gr.).
I. Afecciones gangrenosas. *D.* 3jß (45 gr.) cada tres horas.

4343. M. DE ALMENDRAS DULCES (F. DE L.).

℞ Confeccion de almendras dulces. . . . . 3ijß (75 gr.).
Agua destilada. . . . . lbj (500 gr.).
Se añade poco á poco el agua á la confeccion de almendras, triturando siempre hasta que se mezcle exactamente y se cuela por un lienzo.

4344. M. ALMIZCLADA *ó Julepe moscado* (F. E.).

℞ Flor de naranjo,
Clavos de especia,
Azafran, ãã. . . . . 9j (12 dec.).
Agua comun. . . . . 3xij (375 gr.).
Se deja en infusion por una hora, se cuela y se añade:
Almizcle,
Ambar gris, ãã. . . gij (1 dec.).
Carbonato de amoniaco de cuerno de ciervo. . . . . gj (5 cent.

Se trituran juntas estas tres sustancias y se añade:

Confeccion de sándalos cordial. . . . . 5ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒjß (45 gr.).

Se mezclan y se añade la infusion anterior.

I. Calenturas nerviosas malignas, fiebres pútridas con afecciones catarrales. *D.* ʒiij (90 gr.) que deben repetirse por intervalos.

4345. M. DE ALMIZCLE (F. DE L.).

℞ Almizcle,
Goma arábiga en polvo,
Azúcar, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Agua de rosas. . . . . ʒvj (180 gr.).

Se tritura el almizcle con el azúcar, despues con la goma, añadiendo poco á poco el agua de rosas.

D. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.) cada dos ó tres horas.

4346. M. ALOÉTICA DIURÉTICA (*Cruveilhier*).

℞ Alcoholado de acíbar. . . ʒij (8 gr.).
Alcoholado de digital,
Alcoholado de escila, ãã. 20 gotas.

M. I. Pleuresía crónica. *D.* En una toma por la mañana en ayunas, y se repite esta dosis dos ó tres dias.

4347. M. ALOÉTICA.

℞ Extracto de acíbar,
Extr. de mirra, ãã. 5j (4 gr.
Agua de menta piperita. . . . . ʒvj (180 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒß (15 gr.).

H. S. A. *I.* Apoplejía, vértigos, cálculos, acne, *D.* Una cucharada mañana y noche para provocar las hemorroides.

4348. M. AMONIACO-MERCURIAL (*Blanc*).

℞ Deutocloruro de mércurio. . . . . gij (1 dec.
Alcohol. . . . . ʒjv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vino amoniacal. . . . 25 gotas.

I. Sífilis y reumatismo crónico. *D.* 5ß (15 gr.) dos veces al dia.

4349. M. DE AMONIACO (H. DE AL.).

℞ Amoniaco líquido. . 5ß (2 gr.).
Agua de yerbabuena. lbß (250 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja. . . . . ʒj (30 gr.).

Mézclese. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4350. M. ANALÉPTICA (*Lewis*).

℞ Agua destilada de canela. ʒj á 5ij (4 á 8 gr.).
Crema de leche. . . . ʒvj (180 gr.).
Yema de huevo. . . . número 2.
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).

Mézclese agitando.

I. Sirve para reparar las fuerzas debilitadas á consecuencia del abuso del coito, de la masturbacion ó cualquiera otra causa.

Nota. Esta preparacion es mas bien una crema.

4351. M. ANTIÁCIDA Y ABSORVENTE (*Delile*).

℞ Agua de cal,
Leche, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Se toma en una sola dosis cada dos horas en los casos de irritacion violenta del estómago. Se usa con buen éxito en los casos de calentura amarilla.

4352. M. ANTIARTRÍTICA (*Augustin*).

℞ Extracto de acónito. . . ʒß (2 gr.).
Solucion de jabon estibiada. . . . . ʒj (30 gr.).
Tintura amoniacal de guayaco,
Eter sulfúrico, ãã. . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, ciática. *D.* Sesenta á setenta gotas cada dos horas.

4353. *Otra* (BURDACH).

℞ Sublimado corrosivo. . gij (1 dec.

Agua destilada. . . . . ℥jß (45 gr.).

Se disuelve y se añade:

Vino de cólchico. . . . ℥ß (15 gr.).

I. Gota aguda. *D.* Treinta á cuarenta gotas cada dos horas.

4354. M. ANTIBLENORRÁGICA (*Eisenmann*).

℞ Trement. de copaiba. . ℥ß (15 gr.).
Aceite volátil de menta piperita. . . . . cuatro gotas.
Aceite volátil de clavo. una gota.
Alcoholado de opio. . ℥ij (24 dec.).

H. S. A. *I.* En la declinacion de la blenorragia. *D.* Treinta á cuarenta gotas al dia.

4355. *Otra* (LISEMANN).

℞ Clorhidr. de morfina. ℊjx (10 dec.).
Ioduro de potasio. . . ℥ß (2 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ℥ß (15 gr.).
Aceite de cubebas. . . ℥ß (15 gr.).
Agua de potasa. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada de café, cada cuatro horas, en un cocimiento de cebada.

4356. M. ANTICATARRAL (*Hufeland*).

℞ Extr. de cardo santo. ℥j (4 gr.).
Extr. de dulcamara. . ℥j (12 dec.).
Agua destil. de hinojo. ℥j (30 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ℥j (4 gr.)

Disuélvase S. A. *I.* Catarro pulmonar crónico. *D.* Sesenta gotas cuatro veces al dia.

4357. M. ANTICATARRAL RUSA.

℞ Elixir paregórico inglés. . . . . ℥v (150 gr.).
Tintura de escila. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. Una cucharada de café mañana y noche.

4358. M. ANTICEFÁLICA (*Schultz*).

℞ Alcoholado de valeriana. ℥j (4 gr.).
Acido sulfúr. alcoholizado. ℥j (4 gr.).

M. I. Cefalea nerviosa. *D.* Diez á veinte gotas cada dos horas.

4359. M. ANTICOLÉRICA.

℞ Tintura de gengibre. . ℥ijßß (10 gr.).
Tintura de cáscaras de naranja. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).

M. I. Cólera y neuralgias. *D.* ℊxviij á ℊxxxvj (1 á 2 gr.) en ℥iij (90 gr.) de infusion de saúco ó de menta piperita.

4360. *Otra* (BANG).

℞ Alcanfor. . . . . ℥ij (24 dec.).
Eter sulfúrico alcoholizado. . . . . ℥ß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Cólera espasmódico. *D.* Veinte gotas de hora en hora.

4361. M. ANTIDIARRÉICA (*Mialhe*).

℞ Cuerno de ciervo calcinado y porfirizado. . ℥ijß (10 gr.).
Goma arábiga en polvo. ℥v (20 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥xx (80 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ℥x (40 gr.).

H. S. A. una mistura que se agitará siempre que haya que usarla.

D. Una cucharada de media en media hora, en todos los casos en que está indicado el cocimiento blanco de Sydenham. Véanse los números 1025 al 28.

4362. M. ANTIDIARRÉICA (*Lentin*).

℞ Salep en polvo. . . . . ℥ij (8 gr.
Agua comun. . . . . ℥x (300 gr.).

Se hierve durante doce á quince minutos, se cuela y se añade S. A.

Borato de sosa. . . . . ℥ß (2 gr.).
Extracto de palo de Campeche. . . . . ℥j (4 gr.).
Extracto de quina. . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥ß (15 gr.).

I. Diarrea de los niños recien nacidos, acompañada de aftas. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

4363. M. ANTIDISENTÉRICA (*Swediaur*).

℞ Tártaro emético. . . . ℊj (5 cent.).
Goma arábiga. . . . . ℊxc (5 gr.).
Jarabe de cabezas de adormideras. . . . . ℨj (30 gr.).
Agua de manzanilla. . ℨvj (180 gr.).

I. En el principio de la disentería, diarreas. *D.* Media cucharada de cuarto en cuarto de hora.

4364. *Otra* (RICHTER).

℞ Vino estibiado. . . . . 5iij (12 gr.).
Alcoholado de opio. . . 5j (4 gr.).

M. I. Disentería reumática. *D.* Quince gotas de hora en hora.

4365. M. ANTIEMÉTICA (H. DE M.).

℞ Agua comun. . . . . ℨj (30 gr.).
Agua lacticinosa de canela. . . . . 5j (4 gr.).
Bicarbonato de potasa. . ʒß (2 gr.).

Se disuelve y se mezcla.

I. Vómitos espasmódicos y en los ocasionados por una dosis crecida de tártaro emético. *D.* En dos tomas, añadiendo á cada una 5iij (12 gr.) de zumo de limon en el momento de administrarla.

4366. M. ANTIEMÉTICA *ó Mistura de carbonato de potasa de ajenjos* (F. E.).

℞ Agua. . . . . ℨj (32 gr.).
Agua lactic. de canela. 5j (4 gr.).
Sal de ajenjos. . . . . ʒß (2 gr.).
Zumo reciente de limon. ʒvj (24 gr.).

M. I. Vómitos nerviosos pertinaces. *D.* De una vez. El enfermo debe tomarla en el acto de la efervescencia.

4367. M. ANTIEPILÉPTICA (*Tott*).

℞ Sulfato de cobre amoniacal. . . . . 5j (4 gr.).
Agua de canela. . . . . ʒvj (24 gr.).
Sucinato de amoniaco líquido. . . . . 5iij (8 gr.).

M. D. Tres ó cuatro gotas, tres veces al dia, al principio, aumentando gradualmente segun los efectos que se observen.

4368. M. ANTIESCORBÚTICA.

℞ Miel rosada. . . . . ℨj (30 gr.).
Alcohol de cocleária.
Tintura de quina, ää. . 5ij (8 gr.).

M. Se aplica esta mezcla pura sobre las encías enfermas. Es muy eficaz.

4369. *Otra* (NEUMANN).

℞ Levadura de cerveza. ℨij (60 gr.).
Jarabe de miel. . . . . ℨj (30 gr.).
Agua destilada. . . . . lbß (250 gr.).

H. S. A. *D.* Una á dos cucharadas de hora en hora.

4370. M. ANTIESCROFULOSA.

℞ Aceite de hígado de bacalao. ʒv á ʒviij (20 á 30 gr.).
Jarabe antiescorbútico. . ℨj (30 gr.).

M. I. Raquitis. *D.* En dos tomas al dia.

4371. POCION ANTIESPASMÓDICA.

℞ Aceite animal de Dippel. ℨj (4 gr.).
Licor de Hoffmann. . . 5iij (12 gr.).

I. Corea, tétanos. *D.* Veinte á treinta gotas cuatro veces al dia.

4372. M. ANTIESPASMÓDICA (*Armstrong*).

℞ Extracto de cicuta. . . ℊxvj (8 dec.).
Agua de menta. . . . ℨjv (120 gr.).
Agua comun. . . . . ℨjv (120 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℨij (60 gr.).

I. Coqueluche que ha llegado al segundo ó tercer periodo. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

4373. M. ANTIESPASMÓDICA SIMPLE (H. DE M.).

℞ Agua de melisa. . . . lbß (250 gr.).
Licor anodino mineral. 5j (4 gr.).
Agua de canela. . . . ℨij (8 gr.).
Jarabe de corteza de cidra. . . . . ℨj (30 gr.).

I. Afecciones espasmódicas. *D.* A cucharadas.

4374. M. ANTIESPASMÓDICA ANODINA (H. DE M.).

℞ Agua de yerbabuena. lb ß (250 gr.).
Agua de canela. . . . . ℥j (30 gr.).
Licor anodino mineral. ℥j (4 gr.).
Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).
Jarabe de corteza de cidra. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Afecciones espasmódicas, etc. *D.* A cucharadas.

4375. M. ANTIESPASMÓDICA (*Blache*).

℞ Oxido de zinc. . . . . ℥ij (8 gr.).
Calomelanos al vapor. . . ℥j (4 gr.)
Valeriana en polvo. . . . ℥j (4 gr.).

Mézclese y divídase en setenta partes iguales.

I. Enfermedades epileptiformes de los niños. *D.* Dos tomas al dia, una por la mañana en ayunas y la otra despues de comer.

4376. *Otra* (J. FRANK).

℞ Almizcle escogido. . . . ℊij (1 dec.).
Mucílago de goma arábiga, Jarabe de rosas amarillas, ää. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua destilada de rosas. ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Asma agudo de Millar, coqueluche en el tercer período. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

4377. *Otra* (CLARUS).

℞ Sulfuro de carbono. . ℈j (12 dec.).
Leche de vacas. . . . ℥vj (180 gr.)
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.).

Disuélvase. *I.* Disfagia espasmódica. *D.* Una cucharada cada cuatro horas.

4378. *Otra* (DUMERIL).

℞ Agua de canela hordeada, Agua de menta, ää. . ℥ß (15 gr.).
Láudano de Rousseau. ℈j (12 dec.).
Jarabe de éter. . . . ℥j (30 gr.).

M. D. A cucharaditas de café.

4379. *Otra* (KUENZLI).

℞ Acido cianhídrico medicinal. . . 1
Alcohol rectificado. 1
Agua destil. de flores de naranjo. 1

Se guarda en un frasco con tapon esmerilado.

I. Convulsiones á consecuencia de afecciones morales. *D.* Cinco gotas, tres veces al dia.

4380. *Otra* (SYDENHAM).

℞ Tintura de valeriana. ℥ß (2 gr.).
Tintura de castóreo. . ℥j (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 15 gotas.
Agua de eneldo. . . . . ℥ijß (75 gr.).

M. D. A cucharadas de café al dia.

4381. M. ANTIESCROFULOSA (*Remer*).

℞ Cloruro de calcio. . . . ℥ij (8 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥ijß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Afecciones escrofulosas, atrofia mesentérica, coxalgia, bócio, ciertos casos de tisis al principio, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Treinta gotas, dos veces al dia.

4382. M. ANTIHELMÍNTICA.

℞ Tintura de coloquintida. 5 á 10 gotas.
Agua destilada de manzanilla. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de flores de melocoton. . . . . ℥j (30 gr.).

M. D. A cucharadas de hora en hora.

4383. M. ANTIHELMÍNTICA *ó Pocion vermífuga.*

℞ Esencia de trementina. ℥ß (15 gr.).
Aceite de nuez. . . . . ℥iij (90 gr.).

Agítese. Se toma de una vez contra la ténia.

4384. M. ANTIHEMORRÁGICA (*Gall*).

℞ Extracto de guayaco. ℥j (4 gr.).
Agua destilada de menta piperita. . . . . ℥jv (125 gr.).
Alcoholato de canela, Alcoholato de opio, ää. 20 gotas.

H. S. A. *I.* Hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

4385. M. ANTIHIDRÓPICA (*Morries*).

℞ Elaterio. . . . . ℈j (5 cent.).
Alcohol rectificado. . . . ℥j (30 gr.).
Acido nítrico. . . . . 4 gotas.
H. S. A. *I.* Anasarca. *D.* Treinta á cuarenta gotas, dos ó tres veces al dia.

4386. *Otra* (RUST).

℞ Jarabe de espino serval,
Rob de enebro,
Rob de saúco, ãã. . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Hidropesía, ascitis. *D.* Media cucharada cada dos ó tres horas.

4387. M. ANTIHISTÉRICA.

℞ Asa fétida. . . . . ʒß (2 gr.).
Espíritu de Minderero. . ℥j (30 gr.).
M. D. Cuarenta á cincuenta gotas cuatro veces al dia.

4388. *Otra* (FOY).

℞ Asa fétida. . . . . ʒj (4 gr.).
Se tritura con
Agua de menta piperit. ℥jß (48 gr.)
Se cuela y se añade:
Tintura de valeriana amoniacal. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de castórco. . ℥iij (12 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒj (4 gr.).
I. Afecciones histéricas ó convulsivas, etc. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4389. M. ANTIICTÉRICA (*Quarin*).

℞ Agua destil. de hinoj. ℥vj (180 gr.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
Extracto líquido de taraxacon,
Acetato de potasa, ãã. ʒß (15 gr.).
Extracto de cicuta. . ℈x (5 dec.).
H. S. A. *D.* Dos cucharadas cada cuatro horas.

4390. M. ANTILETÁRGICA (*Frank*).

℞ Esencia de menta piperita. . . . . ℥vj (180 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒvj (24 gr.).
Láudano líquido de Sydenham. . . . . ʒß (15 gr.).
M. S. A. *D.* Una cucharadita de café de cuarto en cuarto de hora.

4391. M. ANTIMETRORRÁGICA (*Thilenius*).

℞ Esencia de canela. . . . . 10 gotas.
Eter sulfúrico. . . . . ʒj (4 gr.).
I. Metrorragia durante y despues del parto. *D.* Diez á trece gotas cada veinte á treinta minutos.

4392. M. ANTIMONIAL DE MASDEVAL (H. DE M.).

℞ Cocimiento de escorzonera. . . . . ℥v (150 gr.).
Vino emético claro. . . ℥j (30 gr.).
Tartr. ácido de potasa. ʒj (4 gr.).
I. Fiebres malignas, tifo, etc. Se usa como emético. *D.* A cucharadas.

4393. M. ANTIMONIO-MERCURIAL (*Blanc*).

℞ Protocloruro de merc. ℈ij (1 dec.).
Alcohol. . . . . ℥iv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Vino amoniacal. . . . 25 gotas.
M. I. Sífilis y reumatismo crónico. *D.* ʒß (15 gr.) al dia.

4394. M. ANTINEUROPÁTICA (*Nevermann*).

℞ Tintura de nuez vómica,
Tintura de opio,
Tintura etérea de estramonio, ãã. . . ʒijß (10 gr.).
Aceite volátil de valeriana . . . . . 16 gotas.
M. I. Cardialgias y neuralgias reumáticas. Es un remedio muy peligroso. *D.* Veinte á treinta gotas en una taza de infusion ligera de manzanilla azucarada, cada veinticuatro horas. Se disminuirá la dosis segun vayan cediendo los dolores.

4395. M. ANTIODONTÁLGICA.

℞ Aceite esencial de clavo. . . . . gtvij (5 dec.

Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒijß (10 gr.).

M. I. Odontalgia. *D.* Se aplica al diente cariado una bolita de hilas empapada en esta mezcla.

4396. M. ANTIODONTÁLGICA.

℞ Láudano de Sydenham. ʒß (2 gr.).
Extr. de beleño negro. ℊviij (4 dec.).
Acido sulfúrico dilatado en 7 partes de agua. . . . . ℊxij (6 dec.).
Esencia de clavo. . . . ʒß (6 dec.).

H. S. A. Se toma la mitad de esta mezcla en una bocanada de agua, y se tiene en la boca, inclinada la cabeza sobre el lado dañado para que el líquido se ponga en contacto de la parte enferma. A los cinco ó seis minutos se arroja el líquido. Si aparece el dolor se repite la aplicacion con la otra mitad del agua.

El autor asegura que es muy eficaz.

4397. *Otra* (CARUS).

℞ Tintura de valeriana. . . ʒj (32 gr.).
Tintura de guayaco. . . ʒvj (24 gr.).
Tintura de benjuí compuesta.
Alcoholato de cochlearia, ää. . . . . ʒij (8 gr.).
Láudano de Sydenham. . ʒj (4 gr.).

M. D. Una cucharadita de café en una taza de agua caliente para colutorio.

4398. *Otra* (LEMAZURIER).

℞ Agua destilada de laurel real. . . . . ʒij (60 gr.).
Acetato de morfina. . . ℊj (5 cent.).

H. S. A. *I.* Dolores de muelas. *D.* Se usa en gargarismos á la dosis de algunas gotas, en ʒij (60 gr.) de agua tibia para una vez.

Calma muy pronto los dolores sin irritar la mucosa de la boca.

4399. M. ANTIPRURIGINOSA (*Biett*).

℞ Jarabe de pensamiento silvestre. . . . . ʒxv (470 gr.).
Jarabe de torbisco. . ʒij (60 gr.).
Sulfito sulfurado de sosa . . . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Prúrigo. *D.* Dos cucharadas por la mañana en ayunas.

4400. M. ANTIREUMÁTICA (*Weber*).

℞ Extracto de acónito. . . ʒj (4 gr.).
Vino de semillas de cólchico. . . . . ʒß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Artritis reumática, gota, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Quince á cuarenta gotas, tres veces al dia.

4401. M. ANTISÉPTICA (*Peacok*).

℞ Confeccion de jacintos,
Polvo de gengibre,
Carbonato de amoniaco, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcoholado de opio. . ʒij (8 gr.).
Agua destilada de menta piperita. . . ℔ß (250 gr.).

H. S. A. *I.* Afecciones gangrenosas. *D.* Una á dos cucharadas, cada dos ó tres horas.

4402. M. ANTISIFILÍTICA (*Cazenave*).

℞ Jarabe de dafne mecereon. . . . . ʒij (64 gr.).
Jarabe balsámico de Tolú. . . . . ʒjv (125 gr.).
Subcarbonato de amoniaco. . . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Sífilis constitucional. *D.* Se dan dos cucharadas, una por la mañana y otra por la tarde.

4403. *Otra* (CIRILLO).

℞ Agua pura. . . . . ʒij (60 gr.).
Ungüento egipciaco. . . ʒij (8 gr.).

M. S. A. *I.* Ulceras sifilíticas. *D.* Se aplica dos veces al dia sobre las partes enfermas una compresa empapada en esta mistura.

4404. *Otra* (PLISSON).

℞ Infusion de hojas de naranjo. . . . . ℔j (500 gr.).

Ioduro de potasio. . . . ℊx (5 dec.).
Jarabe de sasafrás. . . ℥jß (45 gr.).
D. En tres dosis al dia.

4405. M. ANTIVOMITIVA.

℣ Esencia de ajenjos. . . 3ß (2 gr.).
Alcohol rectificado,
Licor mineral de Hoffmann, ää. . . . . 3ß (16 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja. . . . . 3v (20 gr.).
M I. Gastritis, gastralgia, vómitos espasmódicos. *D.* A medias cucharadas.

4406. M. APERITIVA.

℣ Sal amoniaco. . . . . ℊxc (5 gr.).
Agua de manzanilla. . ℥x (300 gr.).
Se disuelve y se añade:
Vino antimonial. . . . 3j (4 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ℥ij (60 gr.).
I. Es estimulante, alterante y fundente. *D.* A vasos.

4407. M. AROMÁTICA.

℣ Extracto de cascarilla. 3j (4 gr.).
Oleosácaro de manzan. 3vj (24 gr.).
Goma tragacanto. . . 3ß (2 gr.).
Láud. de Sydenham. . ℊxviij (1 gr.).
Agua de canela. . . . ℥ij (60 gr.).
Agua de menta-pipe-rita. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Disentería, diarrea crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4408. *Otra* (LAUDERER).

℣ Hojas de laurel. . . . ℥iij (90 gr.).
Clavo. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Alcohol de espliego,
Alcohol de orégano, ää. ℥v (150 gr.).
Se digiere durante diez dias, se cuela y se añade:
Eter sulfúrico. . . . . ℥ß (15 gr.).
Se dice que esta tintura hace crecer mucho los cabellos.

4409. M. DE ASA FÉTIDA (*Kopp*).

℣ Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Mucílago de goma aráb. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥j (30 gr.
H. S. A. *I.* Coqueluche, cuando está en toda su violencia, histérico, tos espasmódica. *D.* Una cucharada de café cada dos horas para los niños; una cucharada grande para los adultos.

4410. *Otra* (P. DE L.).

℣ Asa fétida. . . . . 3v (20 gr.).
Agua de yerbabuena. . lbj (500 gr.).
H. S. A. *D.* A cucharaditas cada dos horas.

4411. M. ASTRINGENTE.

℣ Salep en polvo. . . . . 3ij (8 gr.).
Agua comun. . . . . ℥x (300 gr.)
Se hierve durante doce á quince minutos, se cuela y se añade S. A.
Borato de sosa. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de palo de Campeche,
Extracto de quina, ää. 3j (4 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥ß (15 gr.).
D. Una cucharada de café ó grande cada dos horas, si es un niño recien nacido ó de cinco á siete años.

4412. M. ASTRINGENTE DE CADET (H. DE M.).

℣ Bálsamo de copaiba,
Jarabe simple, ää. . . ℥j (30 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥jv (125 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℥j (30 gr.).
Espíritu de nitro dulc. 3j (4 gr.).
Se forma un mucílago espeso con la goma, se añade el bálsamo y el jarabe, se agita la mezcla sin intermision, concluyendo por añadir toda la cantidad de agua y por fin el espíritu de nitro dulce.
I. Blenorreas inveteradas. *D.* La mitad al acostarse y la otra en ayunas el dia siguiente.

4413. M. ASTRINGENTE (*Hecker*).

℣ Trement. de Venecia. 5iij (12 gr.).
Acido sulfúr. concent. 3vj (24 gr.).
H. S. A. y añádase poco á poco:
Alcohol rectificado. . ℥iij (90 gr.).
I. Hemorragias pasivas, flujos mucosos crónicos. *D.* Quince á treinta gotas cada hora.

4414. M. ASTRINGENTE (H. DE AL.).

℞ Sulfato de zinc. . . . . ℈ß (6 dec.).
Agua de rosas. . . . . ℥jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Mucil. de goma aráb. ℥ß (15 gr.).
M. I. Blenorragias rebeldes. *D.* Una cucharada cada tres horas.

4415. *Otra* (LALLEMAND).

℞ Trementina,
Bálsamo de copaiba,
Aceite de sucino, ää. . ℥ß (15 gr.).
Disuélvase. *I.* Ciertos casos de poluciones nocturnas, blenorragia, leucorrea. *D.* Treinta á sesenta gotas en una cucharada de azúcar, tres veces al dia.

4416. *Otra* (WADELET).

℞ Bálsamo de copaiba,
Tintura de espliego compuesta, ää. . . . . p. ig.
M. I. Diarreas atónicas, leucorreas, etc. *D.* Quince á veinte gotas, tres ó cuatro veces al dia, en ℥ij (60 gr.) de infusion de gayuba.

4417. M. ASTRINGENTE ALCANFORADA (*Haase*).

℞ Palo de Campeche. . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . . Ibj (500 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:
Alcanfor. . . . . ℈j (12 dec.).
M. I. Diarrea indolente á consecuencia del tifo y de la calentura tifoidea, etc. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

4418. M. ASTRINGENTE VINOSA (*Dreyssig*).

℞ Alumbre. . . . . ℥ij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo,
Goma quino, ää. . . ℥j (4 gr.).
Vino del Rin. . . . . ℥jv (125 gr.).
Agua destilada de canela alcoholizada. . Ibß (250 gr.).
Mézclese y disuélvase S. A.
I. Incontinencia de orina por atonia. *D.* Una cucharada cada hora.

4419. M. ATEMPERANTE (H. DE AL.).

℞ Vinagre. . . . . ℥iij (90 gr.).
Miel. . . . . ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . Ibjv (2000 gr.).
M. D. A tazas.

4420. M. BALSÁMICA.

℞ Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
Emuls. de goma aráb. Ibß (250 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥ß (15 gr.).
M. I. Catarros pulmonares crónicos, blenorrea. *D.* En cuatro veces por la noche.

4421. *Otra* (FRICKE).

℞ Bálsamo del Perú. . . . ʒvj (24 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥iij (90 gr.).
Yemas de huevo. . . : número 2.
Se trituran y se añade poco á poco:
Vinagre. . . . . ℥iij (90 gr.).
M. I. Gonorreas antiguas y rebeldes. *D.* Una cucharada cada dos horas. Es necesario tener cuidado de menear la botella antes de echar el líquido en la cuchara.

4422. M. BALSAMICA *ó Mistura de bálsamo de copaiba, de Fuller* (F. E.).

℞ Bálsamo de copaiba. . ℈ß (15 gr.).
Yemas de huevo. . . número 2.
Vino blanco. . . . . Ibß (250 gr.).
Jarabe simple. . . . : ℥ij (60 gr.).
Se mezcla la resina de copaiba con las yemas de huevo en un mortero, se añade poco á poco el vino, y despues el jarabe, agitando convenientemente hasta que se forme una mistura como emulsion; se cuela y se guarda.
I. Catarros crónicos de la vejiga, del útero ó de la uretra, blenorragia crónica. *D.* Hasta ℥ij (60 gr.) al dia.

4423. *Otra* (H. DE M.).

℞ Vino blanco. . . . . ℥jv (125 gr.).

Bálsamo de copaiba. . ʒij (8 gr.).
Jarabe de altea. . . . . ʒj (30 gr.).
Yemas de huevo. . . número 2.

Se agita por largo tiempo en un mortero de vidrio ó mármol el bálsamo con las yemas de huevo, y se añade por veces, agitando fuertemente en los intermedios, primero el jarabe y despues el vino blanco.

I. V. n. 4417.

4124. M. BALSÁMICA (*Lallemand*).

℞ Aceite de sucino rectificado,
Bálsamo de copaiba,
Trementina, ää. . . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Blenorragia, poluciones y flores blancas. *D.* Seis á treinta gotas, dos ó tres veces al dia, en una cucharadita de azúcar en polvo.

4125. M. BARÍTICA AMONIACO FERRUGINOSA (*Clarus*).

℞ Cloruro de hierro amoniacal,
Cloruro de bario, ää. . ϑj (12 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒij (60 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, coxalgia, bócio, ciertos casos de tisis al principio, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos, etc. *D.* Veinte á treinta gotas, dos ó tres veces al dia.

4126. M. BARÍTICA CON CICUTA (*Vogt*).

℞ Cloruro de bario. . . . ϑß (6 dec.).
Extracto de cicuta. . . ϑj (12 dec.).
Agua destil. de canela. ʒß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas, coxalgia, bócio, tisis incipiente, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Veinte á treinta gotas, tres ó cuatro veces al dia.

4127. M. DE BAUMES CONTRA LA ATROFIA MESENTÉRICA.

℞ Extracto de cicuta. . ℊij (10 cent.).
Extracto de quina. . ℊij (15 cent.).
Acetato de potasa. . ℊx (50 cent.).
Infusion de hojas de
pensamiento. . . . ʒiij (90 gr.).

M. I. Se usa cuando la enfermedad es producida por la repercusion de la costra láctea. *D.* A cucharadas, tres ó cuatro veces al dia, á los niños de dos años.

4128. M. DE BELLADONA (*Hufeland*).

℞ Extracto de belladona. ℊvj (3 dec.).
Agua de laurel real. . ʒß (15 gr.).

Disuélvase. *I.* Escirros, particularmente los del estómago. *D.* Cuarenta á cincuenta gotas, tres veces al dia.

4129. M. BENZOICA.

℞ Acido benzóico. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Fosfato de sosa. . . . ʒijß (10 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Gota y cálculos de ácido úrico. *D.* En tres veces en el dia. El fosfato de sosa sirve para facilitar la disolucion del ácido benzóico.

4130. M. DE BIETT.

℞ Jarabe de fumaria. . ʒvij (375 gr.).
Jarabe de trinitaria
silvestre. . . . . ʒiij (90 gr.).
Hiposulfito de sosa. . ʒij (8 gr.).

I. Enfermedades crónicas de la piel y principalmente el eczema y liquen. *D.* A cucharadas.

4131. M. DE BOYLE.

℞ Zumo de siempreviva mayor,
Miel, ää. . . . . ʒj (30 gr.).
Sulfato de alúmina. . . ϑj (12 dec.).

M. S. A. *I.* Aftas. *D.* C. s. para tocar cada hora las partes enfermas.

4132. M. BRASILEÑA CONTRA LA GONORREA.

℞ Bálsamo de copaiba. . ʒiij (90 gr.).
Yema de huevo.
Jarabe de goma ará-
biga, ää. . . . . ʒj (30 gr.).

Tintura de azafran. . 5ij (8 gr.).
Agua. . . . . Ibß (250 gr.).

Se tritura primero el bálsamo de copaiba y las yemas de huevo, y se añade sucesivamente el agua, el jarabe y la tintura.

I. Blenorragia, blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* 3j á 3iij (30 á 90 gr.) al dia.

4133. M. BRASILEÑA LÍQUIDA (*Lepère*).

℞ Bálsamo de la Meca reducido á la consistencia de pasta. . . . 125
Bálsamo de copaiba muy puro. 400
Extracto de azafran. 1

H. S. A. *I.* Gonorrea. *D.* 3j (30 gr.) al dia en dos veces.

Nota. Se necesitan comunmente 3vj (180 gr.) para cada tratamiento. Este producto no tiene propiedades mas activas que la trementina de copaiba sola.

Se puede reemplazar el bálsamo de la Meca por la trementina, y se espesa lo mismo que el bálsamo de copaiba, hirviéndola en agua para desalojar parte de la esencia.

4134. M. BRASILEÑA EN PASTA.

℞ Mistura brasileña líquida. . . . . 3iijß (105 gr.).
Bálsamo de la Meca de la consistencia de maná. . . . . 3vij (210 gr.).

H. S. A. *I.* La misma que la anterior. *D.* 3j (30 gr.) al dia en dos veces, ó en cuatro ú ocho dosis con iguales intervalos.

Nota. Comunmente se necesitan 3vj (180 gr.) y mas para cada tratamiento.

4135. M. DE BRUCINA (*Dieffembach*).

℞ Brucina. . . . . gij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 3ij (8 gr.).

Mézclese y añádase poco á poco:

Agua destilada. . . . . 3ij (60 gr.).

I. Parálisis. *D.* Media cucharada mañana y noche.

La FORMULA DE MAGENDIE contiene gvj (3 dec.) de brucina.

4136. M. CALMANTE.

℞ Agua de lechuga. . . . . 3j (30 gr.).
Láudano de Sydenham. 6 á 20 gotas.
Jarabe simple. . . . . 3ß (15 gr.).

Se puede añadir 3ß (2 gr.) de licor de Hoffmann.

D. Una cucharada de café cada media hora.

4137. *Otra* (GOELIS).

℞ Tintura de digital. . . . 5jß (6 gr.).
Sucinato de amoniaco. . 3ß (2 gr.).
Láudano de Sydenham. 9j (12 dec.).

M. I. Palpitaciones de corazon en los niños. *D.* Tres á seis gotas, tres veces al dia.

4138. *Otra* (HOULTON).

℞ Licor acético de opio. . 10 gotas.
Espíritu de nitro etéreo. 3ß (2 gr.).
Agua destilada. . . . . 3j (30 gr.).

I. Esta mistura reemplaza ventajosamente á las demás preparaciones de opio cuando hay que administrarlas á grandes dosis, como en las enfermedades cancerosas, y cuando provocan náuseas y aun vómitos. Produce mejor efecto que cuarenta gotas de láudano líquido en una pocion. *D.* Se toma de una vez.

4139. *Otra* (RECAMIER).

℞ Miel. . . . . 3jv (125 gr.).
Láudano de Rousseau. 3ß (15 gr.).

M. I. Cáncer uterino. *D.* Se empapan hilas en esta mistura y se aplican al cuello del útero por medio del especulum.

4140. *Otra* (ROUX).

℞ Agua de laurel real. . 3jv (125 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 3j (30 gr.).
Extracto de belladona. 3j (4 gr.).

M. I. y *D.* Se usa en fricciones en los dolores nerviosos, reumáticos, gotosos, etc.

4441. M. CALMANTE ASTRINGENTE (*Kopp*).

℞ Extracto de ratania. . 3ij (12 gr.).
Agua de cerezas negr. 3vj (180 gr.).
Agua de laurel real. . 3j (4 gr.).
Mézclese y disuélvase. *I.* Hemorragias pasivas, especialmente la hemotísis y flujos mucosos crónicos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4442. *Otra* (MONIN).

℞ Acetato de plomo. . . . gjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . 3j (30 gr.).
Extracto de opio. . . . . gij (1 dec.).
I. Disenteria. *D.* Se da una cucharada cada dos horas.

4443. M. DE CANTÁRIDAS BALSÁMICA (*Kopp*).

℞ Bálsamo del Perú,
Tintura de cantáridas, āā. 3ij (8 gr.).
M. I. Incontinencia de orina en los ancianos. *D.* ℈j (12 dec.) cuatro veces al dia en vino.

4444. M. CANTARIDADA Y OPIADA (*Rayer*).

℞ Solucion de goma arábiga. . . . . 3jv (125 gr.).
Tintura de cantáridas, 12 gotas.
Láudano líquido de Sydenham. . . . . 40 gotas.
M. I. Parálisis de la vejiga. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

4445. M. ESTOMACAL DE CARBONATO DE POTASA DE AJENJOS, *Julepe estomacal* (F. E.).

℞ Agua destilada de corteza de cidra,
Agua destilada de ajenjos,
Agua destilada de yerbabuena, āā. . . . 3jv (125 gr.).
Agua destilada de canela. . . . . 3ij (60 gr.).
Carbonato de potasa. ℈jv (5 gr.).
Tintura de leño áloes. 5ij (8 gr.).
Jarabe de corteza de cidra. . . . . 3j (30 gr.).
H. S. A. *D.* Una cucharada ó 3ß (15 gr.).

4446. M. CARMINATIVA.

℞ Raiz de malvabisco. . . 3j (30 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Se reduce á la mitad y se añade:
Anis,
Hinojo,
Cilantro, āā. . . . . gxc (5 gr.).
Agua de ruda. . . . . 3ij (60 gr.).
Se macera y se añade:
Jarabe diacodion. . . . 3ij (60 gr.).
Láudano de Sydenham. 3ß (2 gr.).
I. Cólico ventoso de los niños, neumatosis, calambres de estómago, mareo, gastralgia, helmintiasis. *D.* A cucharadas.

4447. *Otra* (RICHTER).

℞ Tintura de castóreo,
Eter sulfúrico alcoholizado, āā. . . . . 5j (4 gr.).
M. I. Cólico ventoso. *D.* Treinta gotas, tres ó cuatro veces al dia.

4448. M. DE CASCARILLA COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Infus. de cascarilla. 3xvij (530 gr.).
Vinagre escilítico. . 3j (30 gr.).
Tintura de alcanfor compuesta. . . . 3ij (60 gr.).
Mézclese.

4449. M. DE CASTOREO ALOETICA (*Hufeland*).

℞ Tint. de cásc. de naranja. 5ij (8 gr.).
Tintura de castóreo,
Tintura de aribar, āā. . . 5j (4 gr.).
I. Jaqueca histérica acompañada de vómitos. *D.* Sesenta gotas, dos veces al dia, contra los paroxismos.

4450. M. CATÁRTICA ÁRABE.

℞ Jarabe de limon. . . . 3j (30 gr.).
Escamonea de Alepo en polvo. . . . . ℈j (12 dec.).
Sulfuro de antimonio en polvo. . . . . gxij (6 dec.).
H. S. A. *I.* Hidropesía. *D.* Toda la dosis de una sola vez.

4451. M. CATÁRTICA (*Hufeland*).

℞ Accite de almendras dulces,
Sulfato de magn., ãã. ʒj (30 gr.).
Extracto de acíbar. . ℈ß (6 dec.).
Extracto de beleño. . ʒj (12 dec.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Goma aráb. en polvo. c. s.

M. I. Ileo pertinaz. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

4452. M. DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Bocquet y Dufrenoy*).

℞ Elixir de Garus. . . . . ʒjß (45 gr.).
Agua destilada de menta,
Agua destil. de tilo, ãã. ʒj (30 gr.).
Cornezuelo de centeno
en polvo. . . . . ʒß (2 gr.).

M. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, expulsion tardía de las secundinas, hemorragia, especialmente de la matriz, ciertas paraplejías, retencion de orina por inercia de la vejiga. *D.* Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

4453. M. DE CICUTA (*Moore Neligan*).

℞ Zumo de cicuta. . . . ʒijß (10 gr.).
Alcohol rectificado. . . ʒß (2 gr.).
Mézclese y filtrese.

I. Afecciones reumáticas subagudas ó crónicas, principalmente con dolores violentos ó neuralgias, gangrena senil.

4454. M. DE CICUTA CONTRA LA FOTOFOBIA ESCROFULOSA (*Seidel*).

℞ Extracto reciente de
cicuta. . . . . ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒß (2 gr.).

Se tritura exactamente y se añade poco á poco, continuando la trituracion sin detenerse,

Agua destilada. . . . . ʒß (15 gr.).

Despues de bien disuelto se guarda en un frasco que tape bien.

D. Cuatro á diez gotas cada dia en un vehículo apropiado y endulzado. En los casos rebeldes puede aumentarse la dosis á los adultos hasta veinte ó veinticinco gotas.

El autor dice que nunca ha observado que se presente síntoma alguno de narcotismo.

4455. M. CIDONIADA.

℞ Mucil. de membrillos. ʒj (30 gr.).
Miel rosada. . . . . ʒiij (90 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

M. I. Ronquera, bronquitis, catarro agudo, vómitos espasmódicos, vértigos. *D.* Una cucharada de café cuatro á cinco veces al dia.

4456. M. DE CLARUS.

℞ Cloruro de hierro amoniacal. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Cloruro de bario. . . ℊxviij (1 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒjß (30 gr.).

I. Escrófulas. *D.* Veinte á treinta gotas, dos ó tres veces al dia.

4457. M. CLORONÍTRICA (*Koechlin*).

℞ Acido nítrico debilitado. ʒjß (6 gr.).
Acido clorhídrico debilit. ʒß (2 gr.).

M. I. Ictericia dependiente de la induracion del hígado, escorbuto. *D.* Veinte gotas cuatro veces al dia.

4458. M. CLORURADA ALCOHÓLICA (*Trusen*).

℞ Cloruro de cal. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua comun. . . . . ʒij (60 gr.).

Se disuelve por trituracion, se filtra y se añade:

Alcohol de 22°. . . . . ʒij (60 gr.).
Esencia de rosas. . . . 4 gotas.

M. I. Salivacion mercurial ú otra. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua para gargarismo.

4459. M. DE CLORURO DE CAL (*Biett*).

℞ Cloruro de cal. ʒij á ʒjv (8 á 16 gr.).
Agua destilada. . . . ℔j (500 gr.).
Jarabe de genciana. . ʒij (60 gr.).

I. Blenorragia muy intensa. *D.*

Dos, tres ó cuatro cucharadas al dia.

4460. M. COBREOSA ALCANFORADA (*Swediaur*).

℞ Sulfato de cobre. . . 3jv (16 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
Se tritura en
Agua comun. . . . . ℔jv (2000 gr.).
I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias traumáticas. *D.* En inyeccion, locion ó colirio, segun los casos, diluido en c. s. de agua.

4461. M. DE COCHINILLA (*Dieudonné*).

℞ Cochinilla. ℈xv á ℈xx (75 á 80 cent.).
Carbonato de potasa. ℈v á ℈xv (25 á 75 cent.).
Agua hirviendo. . . . . 3iij (90 gr.).
Jarabe de flor de naranjo. . . . . 3j (30 gr.).
M. I. Coqueluche. *D.* Cuatro cucharaditas en el primer dia á los niños de un año, aumentando hasta dar una cucharadita cada dos horas. A los de mas edad se da mayor dosis.

4462. M. DE CONICINA (*Frommueller*).

℞ Conicina. . . . . 3 gotas.
Alcohol. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Agua destilada. . . . 3v (20 gr.).
M. I. Oftalmia escrofulosa. *D.* ℈xv (75 cent.) tres veces al dia, en agua.

4463. M. COLCHÍTICA.

℞ Ojimiel colchico,
Acetato de amon., ää. 3ij (60 gr.).
Agua de perejil. . . . 3vj (180 gr.).
M. I. Hidropesia, reumatismo, gota. *D.* A cucharadas cada dos horas.

4464. M. CONTRA LAS AFTAS.

℞ Crema de leche,
Agua destilada de rosas, ää. . . . . 3j (30 gr.).
Yema de huevo fresca. número 1.
Jarabe de adormideras. 3ß (15 gr.)
Mézclese bien.
D. Una cucharada de cuando en cuando, de modo que se consuma en veinticuatro horas.

4465. M. CONTRA LA ATROFIA MESENTÉRICA.

℞ Miel. . . . . 3jv (125 gr.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . 3j (4 gr.).
Limaduras de hierro porfirizadas. 3ß á 3j (2 á 4 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. *D.* Media cucharadita de café á los niños de seis meses; una entera á los de un año; dos para los de dos años, y se aumenta en todos los casos media cucharadita de café cada tres ó cuatro dias.

4466. *Otra* (BAUMÉS).

℞ Extracto de cicuta. . ℈ij (10 cent.).
Extracto de quina. . ℈iij (15 cent.).
Acetato de potasa. . ℈x (5 dec.).
Infusion de hojas de pensamientos. . . . 3iij (90 gr.).
D. A cucharadas, tres ó cuatro veces al dia para un niño de dos años.

4467. M. CONTRA EL BOCIO (*Veret*).

℞ Ioduro de potasio. . ℈viij (4 dec.).
Agua destilada. . . . . 3jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de goma. . . . 3iß (45 gr.).
Tintura de canela. . . 3ß (15 gr.).
M. I. Bocio. *D.* Una cucharada todas las mañanas en ayunas. Se usa en Suiza.

4468. M. CONTRA LA CALENTURA PUERPERAL (*Most*).

℞ Elixir ácido de Haller. 3ß (2 gr.).
Láud. de Sydenham. ℈xviij (1 gr.).
M. D. Se toman quince á veinte gotas en un vaso de agua de cebada, cada tres horas. Se continúa ordinariamente durante vein-

ticuatro horas. Smith elogia mucho el uso de este remedio.

1169. M. CONTRA LA COQUELUCHE.

℞ Cochinilla. . . . . ʒxviij (1 gr.).
Bitartrato de potasa. ʒxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (200 gr.).

D. Una cucharada de café tres veces al dia. Se tomará en treinta y seis ó cuarenta horas á lo mas, porque se descompone pronto.

Los alemanes elogian mucho esta mistura. V. *Mistura de cochinilla*.

1170. *Otra* (SOBREGONDI).

℞ Tanino puro. . . . . ʒvj (3 dec.).
Extracto de belladona. ʒj (5 cent.).
Extracto de cicuta. . . . ʒjv (2 dec.).
Infusion de sen. . . . ℥ij (60 gr.).
Agua destilada de hinojo. ℥j (30 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥vj (25 gr.).

H. S. A. *D.* Media cucharada cada dos horas. Produce deposiciones líquidas, y apenas se ha tomado toda la mistura desaparece la coqueluche para no volver!!

1171. M. CONTRA EL CRUP.

℞ Agua de poleo. . . . . ℥iij (90 gr.).
Espíritu de Mindererо. ℥j (30 gr.).
Asa fétida. . . . . ℥ij (8 gr.).

H. S. A. *D* Una cucharada cada hora, sin despreciar el uso de los remedios generales.

1172. M. CONTRA LA EPILEPSIA (*Bonorden*).

℞ Eter fosforado . . . . ℥iij (90 gr.)
Tintura de coloquint. ℥j (4 gr.).
Tintura de arnica. . . ℥ij (8 gr.).
Extracto alcohólico de nuez vómica. . . . ʒlx (50 cent.).

H. S. A. *D.* Tres á cuatro gotas tres veces al dia, aumentando gradualmente la dosis.

1173. M. CONTRA LA FETIDEZ DEL ALIENTO.

℞ Acido nítrico puro á 32°. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de fuente. . . . Ibij (1000 gr.).
Azúcar blanca,
Jarabe de frambuesas, ää. . . . . ℥iij (90 gr.).

M. S. A. *D.* Se toman algunas tacitas al dia, despues de haberla dilatado con partes iguales de agua de Seltz.

1174. *Otra*, n. 2.

℞ Cloruro de cal seco. ℥ß (2 gr.).
Se dilaye en:
Agua comun. . . . . Ibij (1000 gr.).
Se filtra y despues se añade S. A.
Azúcar blanca. . . . ℥vj (180 gr.).
Agua destilada de yerbabuena de sabor de pimienta. . ℥j (30 gr.).

D. Se toman en cinco ó seis medias tazas en el espacio del dia.

1175. M. CONTRA LAS FUNGOSIDADES DE LAS ENCIAS (*Schneider*).

℞ Acido clorhídrico. . . . ℥ij (8 gr.).
Alcohol de mirra . . . ℥ß (15 gr.).
Miel rosada. . . . . ℥vj (24 gr.).
Extracto de ratania. . . ʒß (2 gr.).

H. S. A. *D.* En fricciones cuatro veces al dia, pero antes se hace excision de las fungosidades.

1176. M. CONTRA LA GALACTIRREA (*Roëseberg*).

℞ Iodo. . . . . ʒij (1 dec.).
Ioduro de potasio. . . ʒxviij (1 gr.).
Agua. . . . . ℥vj (80 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

D. A cucharadas en el dia.

1177. M. CONTRA LA GONORREA (H. DE AL.).

℞ Resina de copaiba. 5
Espíritu de nitro dulce. 6
Tintura de opio. 4
Tintura de espliego. 1

M. I. Gonorreas rebeldes cuando el estómago del enfermo está en buen estado. *D.* Una cucharadita de café, dos ó tres veces al dia, en un vaso de agua azucarada.

1478. M. CONTRA LA GONORREA (*Lisemann*).

℞ Bálsamo de copaiba . ʒß (15 gr.).
Esencia de yerbabuena de sabor de pimienta. . . . . 4 gotas.
Esencia de clavo de especia. . . . . 1 gota.
Tintura de opio simple. ʒij (24 dec.).
Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

D. Una cucharada de café en un vaso de agua azucarada.

1479. M. CONTRA LA GOTA (*Fievée*).

℞ Tintura de bulbos de cólchico. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de semillas de cólchico. . . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de limones. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. A cucharadas. Dada esta mezcla en las veinticuatro horas produce muchas evacuaciones de vientre. Generalmente cede el infarto gotoso y el enfermo se alivia al punto. Al tiempo de usar este remedio no se debe dar alimentos, y si vigilar con atencion el conducto digestivo.

1480. M. CONTRA LA HIDROPESIA (*Kenner*).

℞ Digital purpúrea. . . ʒß (2 gr.).
Gatuña. . . . . ʒj (4 gr.).
Poligala de Virginia. . ʒjß (6 gr.).
Agua comun. . . . . lbß (250 gr.).
Se hierve durante diez á quince minutos, se cuela y se añade al líquido frio:
Nitro. . . . . ʒj (4 gr.).
D. A cucharadas cada dos ó tres horas. Es muy eficaz.

1481. M. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA.

℞ Tintura alcohólica de cantáridas. . . . . ʒj 4 gr.).
Jarabe de cancla,
Jarabe de goma, ãã. ʒij (64 gr.).
D. Se da una cucharada de café al tiempo de acostarse. Se aumentará sucesivamente la dosis.

1482. M. CONTRA EL INSOMNIO (*Graves*).

℞ Tintura de colombo.
Tintura de cuasia.
Tintura de genciana,
Tintura de quina, ãã. ʒiß (45 gr.).
Morfina. . . . . gij (1 dec.).
D. Tres cucharaditas al dia.

1483. M. CONTRA EL LIQUEN CRÓNICO (*Biett*).

℞ Jarabe de pensamiento silvestre. . . . . lbß (250 gr.).
Subcarbon. de potasa. ʒijß (10 gr.).
D. Una cucharada en un poco de agua todas las mañanas.

1484. *Otra*, n. 2.

℞ Infus. de escabiosa. lbij (1000 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
M. I. Liquen, impétigo. *D.* A cucharadas en media taza de cocimiento de dulcamara ó cualquiera tisana amarga.

1485. M. CONTRA EL LIQUEN CRÓNICO DE LAS MANOS.

℞ Jarabe de torbisco. . ʒij (60 gr.).
Jar. de pensamientos. ʒxjv (340 gr.).
Hiposulfito de sosa. . ʒij (8 gr.).

1486. M. CONTRA LA PARÁLISIS (*Payan*).

℞ Cornezuelo de centen. gxviij (1 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒv (150 gr.).
Se infunde y se añade:
Jarabe simple. . . . ʒß (15 gr.).
I. Payan la usa contra la parálisis de los miembros inferiores, y es útil en la del recto y de la vejiga. Puede aumentarse sucesivamente la dosis del cornezuelo hasta ʒß (2 gr.). *D.* Se toma en dos veces al dia.

4487. M. CONTRA LOS PIOJOS.

℞ Eter sulfúrico. . . . . 5j (4 gr.).
Aceite de anis. . . . . 15 gotas.
Se empapa el peine antes de peinarse.

4488. M. CONTRA LA PIROSIS (*Vogt*).

℞ Bicarbonato de sosa. . 5ijß (10 gr.).
Extracto de genciana. 5jv (16 gr.).
Se disuelve en
Agua de menta pip. ℥v (160 gr.).
Eter sulfúr. alcoholiz. 5ij (8 gr.).
Tint. acuosa de ruibarbo: 5vj (24 gr.).
M. I. Pirosis y dispepsia producidas por el abuso de los licores fuertes. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

Esta TINTURA ACUOSA DE RUIBARBO se compone de seis partes de ruibarbo, una y media de carbonato de potasa, setenta de agua y una corta cantidad de agua de canela.

4489. M. CONTRA EL PROLAPSO DEL RECTO (*Bavez*).

℞ Salep en polvo. . . . . ℈xc (3 gr.).
Agua comun. . . . . ℥x (300 gr.).
Se hierve durante quince á veinte minutos, se cuela y se añade:
Extracto acuoso de nuez vómica. . . . . ℈j (5 cent.).
Disuélvase S. A.
D. A cucharadas en las veinticuatro horas. Conviene elevar gradualmente la dosis hasta ℈jv (20 cent.) en la misma cantidad de vehículo.

4490. M. CONTRA LOS SABAÑONES (*Marjolin*).

℞ Bálsamo del Perú. . . ℥ß (15 gr.).
Alcohol. . . . . ℥jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Acido clorhídrico. . . 5j (4 gr.).
Tintura de benjuí. . . ℥ß (15 gr.).
D. Se hacen al dia muchas embrocaciones sobre las partes enfermas.

4491. M. CONTRA EL SORIASIS LABIAL (*Biett*).

℞ Infus. de rosas rojas. lbj (500 gr.).
Acido sulfúrico. . . . . 5j (12 dec.).
Jarabe de malvabisco. ℥ij (60 gr.).
M. D. Dos á ocho cucharadas al dia.

4492. M. CONTRA LA SORIASIS (*Cazenave*).

℞ Hiposulfito de sosa. 5
Jarabe de china. 150
Jarabe de torbisco. 150
M. I. Soriasis. *D.* Una cucharada mañana y noche.

4493. M. CONTRA LA TISIS (*Wilson*).

℞ Nafta purificada. . . . . 5v (20 gr.)
Láudano de Sydenham. gxc (3 gr.).
M. S. A. *D.* Quince gotas, tres veces al dia, en una taza de agua caliente azucarada con el jarabe de Tolú.

4494. M. CONTRA LA TUMEFACCION CRÓNICA DE LAS AGALLAS (*Becker*).

℞ Extr. de cáscara de nuez. 5j (4 gr.).
Agua destilada simple. . ℥ij (64 gr.).
Disuélvase para uso externo.
D. En lociones al órgano enfermo por medio de un pincel.

4495. M. CONTRA EL VÓMITO DE LAS PREÑADAS (*Kroyher*).

℞ Agua destilada de laurel real. . . . . 5j (4 gr.).
Tint. de nuez vómica. 2 gotas.
M. D. Diez gotas por la mañana.
Pigeaux prefiere la siguiente:
Alcohol á 32°. . . . ℥vj (180 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Azúcar. . . . . ℥v (125 gr.).
M. D. Una cucharada despues de cada comida.

4496. M. DE COPAIBA SUCINADA (*Niemann*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Trementina de alerce,
Aceite de sucino, ãã. . . 5j (4 gr.).
I. Blenorrea, poluciones noc-

turnas, espermatorreo. *D.* Treinta á sesenta gotas cada hora.

4497. M. DE CREOSOTA (F. DE ED.).

℞ Acido acético,
Creosota, āā. . . . . 9ß (6 dec.).
Espír. de cneb. comp. 3vj (24 gr.).
Jarabe simple. . . . . 3vj (24 gr.).
Agua. . . . . 3xj (330 gr.).

Se mezcla la creosota con el ácido, se añade gradualmente el agua y despues el jarabe y el alcoholato.

4498. M. CRETACEA (F. P. Y F. DE L.).

℞ Cal preparada. 16
Azúcar refinada. 12
Mucilago de goma arábiga. . . . 32
Agua. 384

Mézclese triturando.

I. Se usa como antiácida y absorvente en la gastralgia y pirosis, diarrea. *D.* 3iij (90 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

4499. M. DE CRETA COMPUESTA (*Brande*).

℞ Mistura de creta. . . . 3v (150 gr.).
Tintura de catecú,
Tintura de canela, āā. 3ß (15 gr.).

D. Se da una cucharada de hora en hora contra los eructos ácidos y las diarreas.

4500. M. DE CRONIER.

℞ Raiz de malvabisco,
Raiz de grama, āā. . . 3iij (12 gr.).

Se hierve durante media hora en
Agua. . . . . 3vj (192 gr.).

Se añade:
Sal amoniaco. . . . . 3ij (12 gr.).
Mucil. de goma arāb. 3ß (16 gr.).

I. Flegmasias uretro-vesicales con secrecion abundante de mucosidades. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4501. M. DIAFORÉTICA.

℞ Miel pura. 1
Infusion de flores de saúco. . . . 5

Se disuelve y se añade:
Acetato de amoniaco líquido. . . . 1

D. Media taza cada hora; se agitará la mezcla al tiempo de usarla.

4502. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Arrope de saúco. . . . . 3vj (24 gr.).
Agua destilada. . . . . 3j (30 gr.).

Se disuelve y se añade:
Acetato de amoniaco. . 3jv (16 gr.).
Ojimiel simple. . . . . 3ij (32 gr.).

M. D. Dos cucharadas cada dos horas.

4503. *Otra* (SELLE).

℞ Agua de flor de saúco. lbß (250 gr.).
Acetato de amoniaco. 3vj (180 gr.).
Antimonio diaforético lavado. . . . . 3ij (8 gr.).

Disuélvase S. A. *I.* Calenturas agudas en que es necesario provocar la traspiracion. *D.* Media taza de hora en hora.

4504. M. DISOLVENTE COMPUESTA (F. POLACA).

℞ Sal amoniaco. . . . . 3ij (8 gr.).
Emético. . . . . gj (5 cent.).

Se disuelve en
Macerado de raiz de malvabisco. . . . . 3vj (180 gr.).

Se endulza con
Solucion de zumo de regaliz. . . . . 3ß (15 gr.).

I. Es febrífuga y sudorífica. *D.* A cucharadas en el dia.

Nota. La *mistura disolvente simple* no contiene tártaro emético.

4505. M. DIURÉTICA.

℞ Esencia de trementina. 3j (30 gr.).
Alcohol de cocleária. . . 3ß (15 gr.).
Acido clorhídrico,
Espír. de nitr. dulce, āā. 3iij (12 gr.).
Espíritu volátil de succino,
Elixir de propiedad, āā. 3ij (8 gr.).

H. S. A. *D.* Cuatro á quince gotas en vino blanco durante muchos dias.

4506. M. DIURÉTICA.

℞ Tint. de cebolla albarr. ʒij (8 gr.).
Eter nítrico. . . . . ʒj (30 gr.).
M.-D. Una cucharadita de café, cinco á seis veces al dia, en una taza de infusion de enebro.

4507. *Otra* (CRUVEILHIER).

℞ Tintura de acíbar. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de digital,
Tintura de escila, ãã. . 20 gotas.
M. I. Pleuresía crónica. *D.* De una vez por la mañana en ayunas, y se repite cada dos ó tres dias.

4508. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Ojimiel cólchico,
Espir. de Minder., ãã. ʒij (60 gr.).
Agua dest. de perejil. ʒvj (180 gr.).
M. D. Una cucharada de dos en dos horas.

4509. *Otra* (HILDEMBRAND).

℞ Tintura de semillas de cólchico,
Tintura de digital, ãã. ʒij (8 gr.).
Eter nitr. alcoholizado. ℥j (12 dec.).
M. I. Hidrotorax. *D.* Veinte gotas cada tres ó cuatro horas.

4510. *Otra* (HUFELAND).

℞ Aceite esencial de enebro. . . . . ʒß (2 gr.).
Eter nítrico,
Tintura de digital, ãã. ʒijß (10 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ʒß (15 gr.).
I. Hidropesías, hernias. *D.* gxviij (1 gr.) cada tres horas.

4511. *Otra* (LEYRAT).

℞ Rob de saúco,
Rob de enebro,
Elixir de genciana,
Jarabe de espino cerval,
Jarabe de las cinco raices, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Jarabe de culantrillo. . ʒij (60 gr.).
M. I. Asma. *D.* A cucharadas.

4512. *Otra* (RAYER).

℞ Inf. de rábano rustic. ʒjv (125 gr.).
Tintura de cantáridas. 8 gotas.
Láudano líquido de Sydenham. . . . . 12 gotas.
Jarabe simple. . . . ʒß (15 gr.).
M. S. A. *I.* Hidropesía consecutiva á la nefritis albuminosa crónica. *D.* En tres tomas en las veinticuatro horas. Puede aumentarse gradualmente las dosis de la tintura de cantáridas hasta treinta y seis gotas, aumentando al mismo tiempo la del láudano hasta diez y ocho gotas.

4513. M. DIURÉTICA ESTIBIADA (*Meyer*).

℞ Extracto de celedonia. ʒß (2 gr.).
Tártaro emético. . . . gj (5 cent.).
Agua dest. de enebro. ʒjv (125 gr.).
Se disuelve S. A. y se añade:
Ojimiel escilítico,
Jarabe de hinojo, ãã. ʒß (15 gr.).
I. Hidropesías pasivas. *D.* Una cucharada cada tres horas.

4514. M. DIURÉTICA OPIADA (*Schneider*).

℞ Digital purpúrea. . . ʒß (2 gr.).
Cardo santo. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbß (250 gr.).
Se infunde hasta que se enfrie, se cuela y se añade S. A.:
Extracto de lechuga virosa. . . . . ʒjß (6 gr.).
Extracto de escila. . gxviij (1 gr.).
Nitro,
Eter nítrico alcoholizado, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Láud. de Sydenham. . ʒß (2 gr.).
Alcoholato de enebro. ʒvj (24 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ʒij (60 gr.).
I. Hidropesías pasivas. *D.* Una cucharada cada tres horas.

4515. M. DIURÉTICO-SUDORIFICA (*Lippich*).

℞ Raiz de grama. . . . . ʒij (60 gr.).

Agua. . . . . Ibj (500 gr.).

Se hierve durante quince á veinte minutos, se cuela y se añade al líquido enfriado:

Acetato de amoniaco. 5j (4 gr.).
Acetato de potasa liq. 5ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . 5j (30 gr.).

M. S. A. *I.* Sirve para provocar las orinas y los sudores en los casos de calenturas catarrales gástricas, pleuresía con derrame seroso, etc. *D.* Se toma por cuartas partes de taza ó mas en las veinticuatro horas.

4516. M. DEL DOCTOR BORIES *contra el dolor de muelas.*

℞ Alcanfor,
Esencia de anis, ãã. 5j (4 gr.).
Acido clorhídrico. . . 20 gotas.
Opio. . . . . 5ß (2 gr.).
Esencia de clavo. . . 5ij (8 gr.).
Éter sulfúrico. . . . . 5j (4 gr.).
Alcohol. . . . . 5j (30 gr.).

Mézclese exactamente S. A.

D. Se pone una gota en la muela cariada, y es muy raro que se necesiten mas de tres ó cuatro gotas para calmar el dolor.

4517. M. DRÁSTICA (*Andral*).

℞ Aguardiente aleman,
Jar. de espino serv., ãã. 5j (30 gr.).

D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas, y obra sin producir dolores de tripas y sin ninguna reaccion febril.

4518. M. EMENAGOGA.

℞ Sulfuro de carbono. . 5j (30 gr.).
Iodo. . . . . gv (25 cent.).

I. Amenorrea, dismenorrea. *D.* gtij (15 cent.) dos veces al dia, en medio vaso de líquido mucilaginoso azucarado.

4519. M. EMETO-ANODINA.

℞ Láudano de Sydenham,
Éter sulfúrico. ãã. . . 9j (42 dec.).
Quermes mineral. . . gij (4 dec.).
Jarabe simple. . . . . 5j (30 gr.).
Agua. . . . . 5jv (125 gr.).

M. I. Es calmante y expectorante. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4520. M. EMOLIENTE (*Monro*).

℞ Cera blanca ó amarilla. 3
Jabon blanco. 4

Se disuelve á un calor lento y se deslie en

Agua pura. 8

Se añade poco á poco, triturando todo en un mortero de mármol:

Jarabe de quina,
Jarabe de canela, ãã. 8

M. I. Disentería. *D.* A cucharadas. Se agitará al tiempo de usarla.

4521. M. EMULSIVA CALMANTE (*Henke*).

℞ Aceite de alm. dulces. 5ß (15 gr.).
Agua de saúco. . . . . 5iij (90 gr.).
Extracto de beleño. . . gjv (2 dec.).
Extracto de opio. . . . gj (5 cent.).
Goma arábiga en polvo. c. s.

M. I. Tos catarral. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

4522. M. DE ESCABIOSA ÁCIDA (*Biett*).

℞ Infus. de escabiosa. Ibij (1000 gr.).
Jar. de malvabisco. 5ij (60 gr.).
Acido sulfúrico. . . . 9j (12 dec.).

I. Prúrigo, tiña. *D.* Cuatro á seis cucharadas al dia.

4523. M. ESCILÍTICA ANTIMONIADA (*Wildberg*).

℞ Vino antimonial de Huxham,
Ojimiel escilítico, ãã. . . . . p. ig.

M. I. Se recomienda como preservativo de la escarlatina. *D.* Diez gotas á los niños de un año, y se aumentan cinco gotas por cada año mas.

4524. M. EXCITANTE (H. DE ITALIA.).

℞ Ext. de zumaque venen. 5j (30 gr.).

Agua. . . . . 3j (4 gr.).

Disuélvase. *D.* Diez gotas dos veces al dia. Se aumenta progresivamente hasta una cucharada de café.

4525. M. EXCITANTE (H. DE M.).

℞ Agua de menta piper. ℥vj (180 gr.).
Elixir estomacal. . . . 3j (4 gr.).
Jarabe de cidra. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Digestiones lentas por debilidad del estómago. *D.* A cucharadas.

4526. M. DE ESPÍRITU DE VINO (F. DE L.).

℞ Aguardiente de azúcar,
Yema de huevo,
Agua de canela, ää. . ℥jv (125 gr.).
Azúcar pura. . . . . ʒß (15 gr.).
Esencia de canela. . . gʒ½ (8 cent.).

Mézclese.

4527. M. ESTIBIO-ESTIMULANTE.

℞ Vino antimonial. . . . ℥j (30 gr.).
Eter clorhídrico. . . . 3ij (24 dec.).
Tintura tebaica. . . . 3j (12 dec.).

I. Cólera asiático. *D.* Diez gotas en azucar, de media en media hora.

4528. M. ESTIMULANTE (*Neumann*).

℞ Vino estibiado. . . . . ℥j (30 gr.).
Esp. muriático etéreo. 3ij (24 dec.).
Tintura tebaica. . . . 3j (12 dec.).

M. I. En los dos primeros períodos del cólera esporádico ó asiático. *D.* Diez gotas en azucar, cada hora ó cada media hora.

4529. *Otra* (HORN).

℞ Tintura de pimiento anual,
Tint. de coloquintida, ää. 3j (4 gr.).
Tintura de arnica. . . . ʒij (8 gr.).
Esencia de sabina. . . . ʒß (2 gr.).

M. I. Parálisis por astenia. *D.* Diez á quince gotas, una vez al dia.

4530. M. ESTOMACAL (*J. P. Frank*).

℞ Extr. de genciana. . ʒß (2 gr.).
Agua de menta piper. ℥vj (180 gr.).

M. I. Estomacal excelente. *D.* Dos ó tres cucharadas de café en medio vaso de agua azucarada, ó en una infusion de flores de manzanilla ú hojas de naranjo.

4531. M. ESTÍPTICA *ó Agua de sulfato de cobre con canela.*

℞ Sulfato de cobre. . . 3j (12 dec.).
Agua de canela. . . ℔jß (750 gr.).

Disuélvase. *I.* Hemorragias uterinas rebeldes. *D.* 3iij á 3vj (12 á 24 gr.) tres ó cuatro veces al dia en un vehiculo apropiado.

4532. M. ESTÍPTICA (*Ryan*).

℞ Acetato de plomo. gjv á gx (2 á 5 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (90 gr.).
Acido acético débil. . . 3ij (8 gr.).
Licor sedante de opio. 3ß (2 gr.).
Jarabe simple . . . . . 3vj (24 gr.).

M. I. Hemorragias activas de los pulmones, del estómago ó de los riñones, etc. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

4533. M. ETÉREA PIRO-ACEITOSA (*Horn*).

℞ Aceite animal de Dippel. 3ß (2 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 3ij (8 gr.).

M. I. Artritis reumática, reumatismos muscular y fibroso. *D.* Quince á treinta gotas cada dos ó tres horas.

4534. M. ETÉREA.

℞ Eter sulfúrico. . . . gxc (5 gr.).
Aceite de anis. . . . gxviij (1 gr.).

M. I. Neuralgias, síncopes, vértigos, tétanos, tifo, beriberi, dismenorrea, enfermedades pediculares; se empapa el peine y se le pasa por los cabellos. *D.* En fricciones.

4535. M. ETÉREA (H. DE M.).

℞ Agua dest. de lechuga. ℥vj (180 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒj (4 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Histerismo, asma y otras enfermedades nerviosas. *D.* A cucharadas.

4536. M. FEBRÍFUGA METÁLICA Ó M. ARSENICAL.

℞ Arseniato de potas. g̃ ¼ (1 cent.).
Ag. de yerbabuen. ʒxxvß (100 gr.).
Jarabe simple. . . ʒß (15 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes rebeldes, neuralgias. *D.* Se da á cucharadas durante la apirexia. Cada cucharada, que pesa cerca de ʒv (20 gr.), contiene una vigésima quinta parte de grano de arseniato.

4537. M. FERRUGINOSA (*Pitschaft*).

℞ Tintura etérea de percloruro de hierro de Klaproth. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de vainilla. . . . ʒj (30 gr.).
Tintura de cáscara de naranja. . . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Clorosis. *D.* Veinte gotas en una cucharada de agua cada dos horas.

4538. M. FÉTIDA.

℞ Alcohol amoniacal fétido. . . . . ℥j (30 gr.)
Agua de menta piper. ℥vij (210 gr.).
I. Síncope de las histéricas. *D.* Dos cucharadas.

4539. M. FORTIFICANTE DE SEILE (H. DE M.).

℞ Extracto de cascarilla,
Extr. de genciana, ãã. ʒj (4 gr.).
Agua de menta piper. ℥vj (180 gr.).
Tintura de Marte tartarizada. . . . . ʒß (15 gr.).
Mézclese y disuélvase S. A.
I. Debilidades de estómago é intestinos despues de las enfermedades adinámicas. *D.* Algunas cucharadas al dia.

4540. M. FUNDENTE (*Hufeland*).

℞ Extracto de dulcamara. ʒß (6 gr.).
Extracto de poligala. . ʒj (4 gr.).
Extracto de cicuta. . . ʒß (2 gr.).
Vino estibiado,
Agua de canela, ãã. . ʒß (15 gr.).
M. I. Tumores blancos. *D.* Cuarenta á ochenta gotas, cuatro veces al dia.

4541. M. FUNDENTE (*Mutzel*).

℞ Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Tartrato de potasa. . ʒß (15 gr.).
Extracto de genciana,
Extr. de centaura, ãã. ʒij (8 gr.).
Disuélvase S. A. *I.* Hepatitis y esplenitis crónica, degeneracion de las vísceras abdominales. *D.* ʒß (15 gr.) cada dos horas.

4542. M. FUNDENTE ESPIRITUOSA.

℞ Tintura de antimonio. ʒj (32 gr.).
Tintura de pimpinela. ʒvß (22 gr.).
Tintura de sucino. . . ʒiij (12 gr.).
Jalon de Alicante. . . ʒij (8 gr.).
I. Es estimulante, tónica, balsámica, fundente, diaforética, etc. *D.* Cuarenta á setenta gotas.

4543. M. DE GENCIANA COMPUESTA (F. DE L.).

℞ Infusion de genciana compuesta. . . . . ʒxij (375 gr.).
Infusion de sen compuesta. . . . . ʒvj (180 gr.).
Tintura de cardamomo compuesta. . . . . ʒij (60 gr.).
Mézclese.

4544. M. DE GOMA AMONIACO ó *Emulsion de Brunero* (F. E. Y H. DE M.).

℞ Goma amoniaco. . . . ʒjß (6 gr.).
Agua de hisopo. . . . ℥iv (125 gr.).
Vino blanco bueno. . ʒij (60 gr.).
Se pulveriza la goma-resina, se mezcla en un almirez con el vino, se añade el agua y se cuela.

I. Es expectorante incindente en el catarro pulmonar crónico, asma. *D.* En dos tomas. V. n. 1955.

4545. M. DE GOMA ARABIGA (F. DE L.).

℞ Goma aráb. en polv. ℥x (300 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥xiij (560 gr.).

Se tritura la goma con el agua, que se echará poco á poco y se disuelve.

4546. M. GOMOSA DE SULFATO DE HIERRO (F. E.).

℞ Sulfato de hierro. . . ʒjß (6 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥xij (375 gr.).

Se disuelve y se cuela.

I. Esta mistura es astringente y conviene en las diarreas crónicas. *D.* ʒj á ʒß (4 á 15 gr.).

4547. M. DE GUAYACO (F. DE L.).

℞ Resina de guayaco. . ʒiij (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒß (15 gr.).
Mucil. de goma aráb. ʒß (15 gr.).
Agua de canela. . . . ℥xjx (300 gr.).

Se tritura la resina y el azúcar con el mucílago, y se añade poco á poco la canela.

D. ʒß á ʒij (15 á 60 gr.) dos ó tres veces al dia. Se bebe despues un vaso de cocimiento de cebada tibio.

4548. M. HIDRAGOGA (*Sundelin*).

℞ Cebolla albarrana. . . . . ʒß (2 gr.).
Poligala del Senegal. . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.

para obtener ℥v (150 gr.) de líquido despues de colado; se digiere hasta que se enfrie completamente, se cuela y se añade:

Tintura de coloquintida. ℥j (12 dec.).
Jar. de cásc. de naranja. ℥j (30 gr.).

M. I. Hidropesías pasivas. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

4549. *Otra* (VAN SWIETEN).

℞ Rob de enebro. . . . . ℥iv (125 gr.).

Se diluye en ℔ij (1000 gr.) de agua destilada de bayas de enebro, y se añade:

Espíritu de enebro . ℥ij (60 gr.).

D. Media á dos cucharadas, cuatro á ocho veces al dia.

Nota. Cuando los enfermos están muy alterados, se añade algunas veces á toda la mistura ʒß (15 gr.) de espíritu de nitro dulce.

4550. M. DE HIERRO COMPUESTA DE GRIFFITH (F. DE L.).

℞ Mirra en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Subcarb. de potasa. ʒj (4 gr.).

Se trituran y se añade:

Sulfato de hierro en polvo. . . . . ℈iij ß (30 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.).
Espíritu de nuez moscada. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de rosas. . . . ℥xviij (560 gr.).

Se tritura la mirra con el espíritu de nuez moscada y el carbonato de potasa, y se añade triturando siempre, primero el agua, luego agua de rosas con azúcar, y despues el sulfato de hierro; la mistura se pone en una vasija que se tapa bien.

I. Se usa como tónica y emenagoga. *D.* ℥j á ʒij (30 á 60 gr.).

4551. M. DE HIERRO AROMATICA.

℞ Quina de Loja. . . . . ℥j (30 gr.).
Clavillo. . . . . ʒij (8 gr.).
Colombo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Hierro. . . . . ʒß (15 gr.).

Se digiere durante tres dias en una vasija tapada, agitando de cuando en cuando, en c. s. de agua de menta para obtener ℥xij (375 gr.) de líquido despues de colado, y se añade:

Tintura de cardamomo compuesta. . . . . ʒiij (90 gr.).
Tintura de naranja. . . ʒiij (12 gr.).

I. Es tónica, estimulante y carminativa. *D.* ʒv á ʒjß (20 á 45 gr.).

4552. M. DE HIPOSULFITO DE SOSA (*Cazenave*).

℞ Hiposulfito de sosa. . 3j (4 gr.).
Jarabe de dafne mecereon,
Jarabe de china, ãã. . ℥jv (125 gr.).

I. Soriasis. *D.* Una cucharada mañana y noche.

4553. M. IODADA.

℞ Iodo. . . . . ℊv (25 cent.).
Se disuelve en
Espíritu de vino. . . . 3ij (8 gr.).
Agua de canela. . . . . 3xx (80 gr.).
Jarabe simple. . . . . 3jv (16 gr.).

M. I. Salivacion mercurial. *D.* Cuatro medias cucharadas al dia, y despues cuatro cucharadas enteras.

4554. *Otra* (CLOSS).

℞ Iodo. . . . . ℊvj (3 dec.).
Ioduro de potasio. . . 3j (4 gr.).
Se disuelve en
Agua. . . . . ℥ij (60 gr.).
Se añade:
Tintura aromática. . . . 3j (4 gr.).

M. I. Escrófulas. *D.* Tres cucharaditas de café al dia en una taza de agua fria.

4555. M. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (H. DE M.).

℞ Deutoioduro de mercurio. . . . . ℊj (5 cent.).
Ioduro de potasio. . . 3j (4 gr.).
Agua destilada. . . . ℥vij (270 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).

Se tritura en un mortero de vidrio el deutoioduro de mercurio con el ioduro de potasio, se disuelve y se añade despues el jarabe.

I. Enfermedades venéreas complicadas con escrófulas. *D.* Una cucharada en una taza de leche ó agua azucarada.

4556. M. DE IPECACUANA Y CRETA COMPUESTA (*Hooper*).

℞ Ipecacuana en polvo. ℊv (25 cent.).
Jarabe de amapola. . 3j (5 gr.).
Espíritu de canela. . . 3ij (10 gr.).
Mistura de creta. . . 3xiij (50 gr.).

M. S. A. *I.* Diarrea y disenteria crónicas. *D.* De una vez, que se repite cada cuarto de hora.

4557. M. JABONOSA (*Fehr*).

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ℥j (30 gr.).
Carbon. de potasa liq. 5ij (8 gr.).
Se mezcla y se añade:
Jar. de cásc. de naranja. ℥j (30 gr.).
Esenc. de cálamo arom. 3 gotas.

I. Afecciones escrofulosas, atrofia mesentérica, ciertos casos de tisis incipiente, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos, etc. *D.* Una á dos cucharadas de café, mañana y noche.

4558. M. JABONOSA PURGANTE (*Plenck*).

Se prepara del mismo modo que la mistura resinoso-jabonosa de Plenck, empleando la jalapa en lugar del guayaco.

Purga bien y sin producir cólicos á los niños; se da líquida á la dosis de 3ß á 5jß (2 á 6 gr.) ó seca á la de ℊx á ℊxx (5 á 10 dec.).

4559. M. LITONTRIPTICA *ó Litontríptico de Tulp.*

℞ Cantáridas. . . . . 3j (4 gr.).
Cardamomo menor. . . 3j (4 gr.).
Alcohol de 34° Cartier. ℥j (30 gr.).
Acido nítrico. . . . . ℥ß (15 gr.).
Se macera y se filtra.

D. Doce gotas en medio vaso de agua azucarada.

4560. *Otra* (DURANDE).

℞ Eter sulfúrico. . . . . 5vij (28 gr.).
Esencia de trementina. 3jv (16 gr.).

H. S. A. *I.* Se recomienda por algunos médicos para fundir los cálculos biliarios y combatir los cólicos hepáticos.

Nota. Algunas veces se asocia al éter la yema y el aceite de huevo. Otras veces se aumenta ó disminuye la proporcion del aceite

volátil de trementina y se le asocia el jarabe de violetas, de diacodion, de amapola ó de cáscara de naranja. *D.* Se usa como la mistura de Whitt, á la que se parece mucho. V. n 2195.

4561. M. DE LIEBIG Y WOHLER.

℞ Almendras dulces.	5ij (8 gr.).
Agua.	c. s.
Amigdalina. . . .	gxvij (95 cent.).

Se hace una emulsion con las almendras y el agua y se añade la amigdalina.

Esta mistura contiene gj de ácido prúsico anhidro, gjxß (47 cent.) de ácido prúsico medicinal y gviij (4 dec.) de esencia de almendras amargas. V. *Acido cianhidrico.*

4562. M. DE MAGNESIA AROMÁTICA.

℞ Magnesia.	5ß (2 gr.).
Jarabe de gengibre. .	5ij (8 gr.).

Se trituran y se añade:

Agua de yerbabuena de sabor de pimient.	5ijß (75 gr.).
Espíritu de espliego compuesto.	5ß (2 gr.).
Espíritu de alcaravea.	5ß (15 gr.).

I. Cardialgia, flatuosidades, etc. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4563. M. MARINA (*Monkain*).

℞ Sulfato de magnesia. . . .	10 á 12
Hidroclorato de magnesia.	4
Extracto cinárico.	4
Carbonato de cal.	2
Cola de Flandes.	3

Mézclense y divídase en dosis de á 5ij ó 5iij (60 ó 90 gr.).

D. Una dosis para un baño, al cual se añade de lbj á lbij (500 á 1000 gr.) de sal comun.

4564. M. MERCURIAL (*Langembeck*).

℞ Deutocloruro de mercurio.	gj 5 cent.
Tintura de opio. . . .	5j 1 gr.).
Goma arábiga en polv.	5iij (12 gr.).
Agua destilada. . . .	℥vj (180 gr.).

M. I. Amaurosis por causa reumática. *D.* Una cucharada, mañana y noche.

4565. M. Ó JARABE MERCURIAL DE PLENCK (H. DE M.).

℞ Azúcar vermífugo,	
Goma arábiga, ää. . . .	5j (4 gr.).
Jarabe de achicorias con ruibarbo.	5ij (60 gr.).

Se tritura la goma arábiga y el azúcar vermífugo con 6j (4 gr.) de agua y despues se añade el jarabe. Se la debe agitar para hacer uso de ella.

I. Enfermedades venéreas de los niños. *D.* Una cucharadita.

4566. M. DE MIRRA ALCALIZADA (*Griffith*).

℞ Mirra escogida. . . .	5ij 8 gr.).
Carbonato de potasa.	5j (4 gr.).

Se trituran exactamente y se añade:

Agua de yerbabuena.	lbß (250 gr.).
Alcohol de yerbab.	5jß (45 gr.).
Jarabe de Tolú. . . .	5j (30 gr.).
Sulfato de hierro.	gx á gxxx (10 á 15 dec.).

I. Caquexia hidrópica, clorosis, leucorrea y debilidad que sigue á la fiebre adinámica. *D.* Cuatro cucharadas tres veces al dia.

4567. M. Ó JULEPE MOSCADO (H. DE M.).

℞ Infusion de azahar. . .	℥vj (180 gr.).
Agua de canela. . . .	5j (30 gr.).
Almizcle.	gviij (4 dec.).
Carbonato de amoniac.	gij (1 dec.).
Tintura de castóreo. .	5j (4 gr.).

Se mezcla primero el jarabe con la tintura de castóreo, se tritura el almizcle con el carbonato de amoniaco, se añade la infusion y se reune todo.

I. Es antiespasmódica y se administra especialmente contra el tétanos y las fiebres nerviosas. *D.* A cucharadas.

4568. M. MOSCADA Y ALCANFORADA *ó Julepe moscado.*

℞ Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.).
Almizcle. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Amoniaco líquido. . . ℊxvj (8 dec.).
Jar. de cásc. de naranj. ℥j (30 gr.).
Agua de canela. . . . . ℥iij (90 gr.).

M. I. Neuralgias, histérico, calenturas tifoideas y atáxicas, tifo, tétanos, vómitos espasmódicos, cardiopalmia, cardialgia, bronquitis, neumonia, esofagismo, gangrena de hospital. *D.* A cucharadas de hora en hora.

4569. M. DE NAFTA (*Hasting*).

℞ Nafta rectificada. . . . ℥j (32 gr.).
Láudano de Sydenham. . ℥ij (8 gr.).

I. Tisis pulmonar. *D.* Quince gotas tres veces al dia en agua azucarada ó un jarabe.

4570. M. DE NITRATO DE PLATA CRISTALIZADO.

℞ Nitrato de plata cristalizado. ℊß á ℊj (25 á 50 mil.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Mucílago de salep. . . ℥ijß (75 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥ß (15 gr.).

M. D. Una cucharada de café cuatro veces al dia.

4571. M. NITROSA.

℞ Nitro. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Miel pura. . . . . ℥v (20 gr.).
Se disuelve en
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

I. Se usa como atemperante y diurética. *D.* A vasitos, en el dia.

4572. M. NITROSA Y OPIADA CONTRA LA DISENTERIA (*Hope*).

℞ Acido nítrico. . . . . 5j (4 gr.).
Mistura alcanforada. . ℥iij (90 gr.).
Tintura de opio. . . . 40 gotas.

H. S. A. *I.* Disenteria, cólera y diarrea, para calmar la sed y disminuir la intensidad de los dolores. *D.* La cuarta parte, cada tres ó cuatro horas.

4573. M. OBSTÉTRICA (*Goupil*).

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥jß (45 gr.).
Espíritu de menta. . . 3 gotas.

Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, hemorragias uterinas. *D.* Una cucharada de diez en diez minutos. Se puede añadir ℥j (30 gr.) de agua de canela.

4574. M. ODONTALGICA.

℞ Alumbre. . . . . ℊjv (2 dec.).
Eter nítrico. . . . . ℊxjv (7 dec.).

I. Odontalgia. *D.* Se empapa un poquito de algodon, que se introduce en el hueco del diente cariado.

4575. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Aceite esencial de clavo. 8 gotas.
Tintura de opio. . . . ℥j (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ℥iij (12 gr.).

Mézclese y agítese al tiempo de usarla.

Se aplica sobre el diente cariado un poco de algodon empapado en esta mezcla.

4576. *Otra* (CARUS).

℞ Tintura de resina de guayaco. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Aceite de valeriana. . ℥iij (12 gr.).
Jarabe de cochearia,
Tintura de benjuí compuesta, ää. . . . . ℥j (4 gr.).
Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).

I. Dolor de muelas. *D.* Una cucharada diluida en media taza de agua caliente, que se tendrá en la boca.

4577. *Otra* (G. L. CADET).

℞ Eter sulfúrico,
Láudano líquido,
Bálsamo del Comendador, ää. ℥j (4 gr.).
Esencia de clavo. . . . 20 gotas.

H. S. A. *D.* Se aplica por medio de un poco de algodon sobre el diente enfermo.

4578. M. ODONTALGICA (*Oudet*).

℞ Eter acético,
Láudano de Sydenham,
Esencia de clavo, ãã. . . 5ß (2 gr.).

Se empapa en este licor un poco de algodon, que se coloca en el diente enfermo.

4579. *Otra* (TOIRAC).

℞ Alcohol saturado de alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
Bálsamo del Comendador. ℈x (5 dec.).
Tintura de opio. . . . . 30 gotas.
Aceite esenc. de menta. 10 gotas.

Se empapa en este líquido un poco de algodon que se introduce en el diente cariado, y se renueva muchas veces al dia en las veinticuatro horas para apagar el dolor.

4580. *Otra* (PIESTE).

℞ Amoniaco líquido. . . 3v (20 gr.).
Tintura de clavo. . . . 3ijß (10 gr.).

M. I. Odontalgia por caries. *D.* Se empapa un poco de algodon en rama en el líquido, y se le introduce en la cavidad de la muela. Como obra por el amoniaco se puede usar otra tintura distinta que la de clavo. Obra cauterizando el nervio. Es buen medicamento.

4581. M. OLEOSO-RESINOSA (*Ramm*).

℞ Aceite de ricino. . . . . 3ij (8 gr.).
Trementina de alerce. . 3vj (24 gr.).
Trement. de copaiba. . 3j (32 gr.).

M. I. Retencion de orina por falta de secrecion. *D.* Treinta gotas, tres veces al dia, en emulsion comun ó en leche. Conviene hacer al mismo tiempo fricciones con esencia de trementina, y dar al enfermo por alimento exclusivo espárragos, rábanos, apio, y por bebida la cerveza.

4582. M. OLEOSA ACIDA (H. DE AL.).

℞ Zumo de limon,
Aceite de linaza reciente, ãã. . . . . 3iij (90 gr.).
Extracto de opio. . . . ℈jv (2 dec.).

M. I. Hernias estranguladas. *D.* Una cucharada cada media hora.

4583. M. PARA CURAR LAS GRIETAS DEL ANO (*Bretonneau*).

℞ Extracto de ratania. . 3ß (15 gr.).
Tintura de ratania. . 3jv (125 gr.).

Mézclese por trituracion. *D.* Se administra una ó dos cucharadas de esta mistura en una cuarta parte de lavativa de agua.

4584. M. PARA LAS ENCIAS.

℞ Alcobolato de coclearia compuesto. 1
Tintura alcohólica de quina. 1
Miel rosada. 1

I. Afecciones escorbúticas de las encias. *D.* Se usa pura ó mezclada con agua.

4585. M. PECTORAL (*Boherhaave*).

℞ Cocimiento de cebada perlada. . . . . lbß (250 gr.).
Agua dest. de hisopo. 3jv (125 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . 3iij (90 gr.).
Vinagre escilítico. . . 3vj (24 gr.).
Sulfato de sosa. . . . . 3j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Afecciones catarrales crónicas, en que es difícil la expectoracion. *D.* 3j (30 gr.) cada media hora.

4586. *Otra* (COTTEREAU).

℞ Liquen islándico no privado de su principio amargo. . . 3jv (16 gr.).
Agua comun. . . . . lbjß (750 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, se cuela con expresion y se disuelve S. A. en el líquido colado

Azúcar de leche. . . 3jß (48 gr.).

I. Se usa ventajosamente en el período de la tisis pulmonar en

que los enfermos padecen sudores nocturnos excesivos, seguidos de ataques de tos violentos. *D.* Dos cucharadas, tres ó cuatro veces al dia.

4587. M. PECTORAL (M. DE AL.).

℞ Sal amoniaco. . . . . 3ij 8 gr.
Cocim. de malvabisc. ℥xij (375 gr.).
Zumo de regaliz. . . ℥vj (24 gr.).

M. I. Enfermedades crónicas del pulmon. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

4588. *Otra* (QUARIN).

℞ Goma amoniaco disuelta en una yema de huevo. . . . . 3ij 8 gr.
Ojimiel escilítico,
Jarabe de hisopo, ää. ℥jß (45 gr.).
Agua de hisopo. . . . Jbß (250 gr.).
Extr. de énula camp. Dij (24 dec.).

H. S. A. *I.* Apoplejía acompañada de tos, con silbido y dificultad de expectorar las materias mucosas muy tenaces que amenazan sufocacion. *D.* Una cucharada de media en media hora.

4589. M. PIROTARTRICA CONTRA EL CÓLERA.

NÚMERO 1.

℞ Mistura pirotártrica. . . 3ij 8 gr.).
Tintura simple de opio. 3ß (2 gr.).

M. D. Veinte gotas para un adulto.

NÚMERO 2.

℞ Corteza de cascarilla. . 3ß (6 dec.).
Polvo aromático. . . . . ℈jv (2 dec.).
Alumbre crudo. . . . . gij (1 dec.).
Opio en bruto. . . . . gj (5 cent.).

Para una dosis, que se puede repetir cuando sea necesario.

4590. M. DE POTASA (*Wendt*).

℞ Potasa cáustica. . . . . gxij (6 dec.
Agua destilada de cáscara de naranja. . . ℥j (30 gr.).

Disuélvase. *I.* Afecciones escrofulosas. *D.* Diez á veinte gotas, cuatro veces al dia.

4591. M. DE PULSATILA ESTIBIADA (*Rust*).

℞ Extracto de zumo no depurado de pulsatila. 5ß (2 gr.).
Vino emético. . . . . ℥ß 15 gr.

Disuélvase. *I.* Amaurosis. *D.* Veinte á sesenta gotas, tres veces al dia.

4592. M. PURGANTE.

℞ Tintura de jalapa. . . . ℥j 4 gr.
Azucar blanca. . . . . ℥j (4 gr.).
Aceite de ricino. . . . . ℥ß 30 gr.
Maná. . . . . ℥ß (30 gr.).
Jarabe de rosas. . . . . c. s.

I. Cólico de los pintores. *D.* Dos cucharadas de media en media hora.

4593. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de croton tiglio. 1 gota.
Yema de huevo. . . . . 3ij 8 gr.

Tritúrense y añádase:

Agua de yerbabuena. . ℥j 30 gr.
Jar. de flor de naranjo. ℥j 30 gr.

Se da de una vez por la mañana en ayunas.

4594. *Otra*, n. 3.

℞ Sulfato de sosa. . . . . 5ß (15 gr.).
Sen molido. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se infunde durante la noche.

I. Embarazo gastro-intestinal mucoso ó bilioso. *D.* De una vez.

Puede servir de excipiente el cocimiento de ciruelas.

4595. *Otra* (ANDRY).

℞ Escamonea en polvo. gvj (30 cent.).
Alcoholato de romero. 5ß (2 gr.).

Se trituran en un mortero de porcelana y se añade poco á poco:

Agua de flores de naranjo,
Jarabe de flores de albérchigo, ää. . . . . ℥jß (45 gr.).

Se da una toma por la mañana en ayunas.

4596. *Otra* (CHOMEL).

℞ Aceite de alm. dulces. . ℥j (60 gr.

Jarabe de goma. . . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de croton. . . . ♃ gotas.
Mézclese.

4597. M. PURGANTE CON ACEITE DE RICINO (H. DE M.).

℞ Aceite de ricino. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua de azahar,
Jarabe simple, ää. . . . ʒß (15 gr.).
Se mezcla el aceite con una yema de huevo y ʒß (2 gr.) de mucílago de goma arábiga, se añade luego el jarabe y las aguas.
D. En cuatro veces de hora en hora.

4598. M. DE QUARIN.

℞ Extracto de cicuta,
Acetato de potasa,
Extracto de diente de leon, ää. . . . . ʒß (15 gr.).
Disuélvase en
Agua de hinojo. . . . . ʒvj (180 gr.).
Se añade:
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa como diurético y sedante; ictericia. *D.* Dos cucharadas cada cuatro horas.

4599. M. DE QUARIN CONTRA LA HEMOTISIS.

℞ Alumbre. . . . . ʒß (2 gr.).
Goma arábiga en polv. ʒß (15 gr.).
Inf. de flor. de amap. ℔ß (250 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas tifoideas, hemotisis pasivas y otras hemorragias de la misma naturaleza. *D.* Una cucharada de media en media hora.

4600. M. DE QUINA.

℞ Jarabe de quina. . . . ʒj (32 gr.).
Alcohol de melisa. ʒij y gxviij (9 gr.).
Extr. blando de quina. ʒj (4 gr.).
Pocion gomosa. . . . . ʒjv (125 gr.).
I. Calenturas intermitentes, periodo adinámico de las enfermedades, atonía de los órganos digestivos. *D.* A cucharadas.

4601. M. REFRIGERANTE (H. DE AL.).

℞ Nitro. . . . . ʒß (15 gr.)
Agua pura. . . . . ʒvj (24 gr.).
Se disuelve y se añade:
Vinagre,
Jarabe de vinagre con frambuesas, ää. . . . ʒj (30 gr.).
M. D. Una cucharada cada dos horas.

4602. M RESOLUTIVA (*Schwartz*).

℞ Crémor de tártaro soluble. . . . . ʒv (20 gr.).
Extracto blando de diente de leon. . . . . ʒijß (10 gr.).
Extracto de celedonia. . gxc (5 gr.).
Agua destil. de melisa. ʒv (150 gr.).
M. I. Hepatitis crónica. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas

4603. *Otra* (CARUS).

℞ Clorhidrato de amoniaco,
Tintura de arnica, ää. ʒijß (10 gr.).
Agua destil. de ruda. ʒx (300 gr.).
Vinagre de ruda. . . . ʒv (150 gr.).
M. I. Hidrocele de los niños. *D.* Se la aplica al escroto por medio de compresas.

4604. M RESINOSO-JABONOSA (*Plenck*).

℞ Alcohol rectificado. . ℔ß (250 gr.).
Resina de guayaco,
Jabon amigdalino, ää. ʒj (30 gr.).
Disuélvase S. A. *I.* Reumatismo y gota. *D.* Se usa esta tintura líquida á la dosis de ʒj (4 gr.) en una bebida apropiada; ó bien se la hace evaporar hasta la sequedad y entonces se da el residuo á la dosis de gxviij (1 gr.) y se llama *extracto resinoso-jabonoso de Plenck.* V. n. 2240.

4605. M. RESOLUTIVA AMONIACAL

℞ Agua dest. de manzan. ʒx (300 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ʒij (60 gr.).
Sal amoniaco,
Vino emético, ää. . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Fiebres en que hay que combatir éxtasis pertinaces, infartos de las vísceras abdominales, atrofia mesentérica. *D.* Media taza de hora en hora.

4606. M. RESOLUTIVA PARA LOS APARATOS INAMOVIBLES (*Larrey*).

℞ Alcohol alcanforado,
Extracto de Saturno,
Clara de huevo,
Agua, ää. . . . . ʒij (60 gr.).
Mézclese.

4607. M. DE SABINA ALCANFORADA (*Horn*).

℞ Sabina. . . . . ʒjß (6 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ʒv (150 gr.).
Se infunde durante quince minutos, se cuela y se añade:
Alcanfor. . . . . gvj (3 dec.).
I. Incontinencia de orina á consecuencia de partos laboriosos. *D.* Una cucharada de hora en hora.

4608. M. SALINA SIMPLE (F. P.).

℞ Bicarbonato de potasa. 4
Zumo de limon agrio. . . . . c. s.
basta saturar completamente el ácido.
Agua destilada. 160
Jarabe simple. 16
I. Es antiemética y antiflogística. *D.* Hasta ʒjv (120 gr.).

4609. M. SALINA (H. DE M.).

℞ Cocimiento de cebada. ʒvj (180 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒvj (24 gr.).
Zumo de limon. . . . . ʒj (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).
Miel depurada. . . . . ʒij (60 gr.).
H. S. A. *I.* Es aperitiva y refrigerante. *D.* A cucharadas.

4610. M. SALINA FERRUGINOSA (H. DE ING.).

℞ Sulfato de magnesia,
Sulfato de sosa, ää. ʒv (20 gr.).
Sulfato de hierro. . . gij (1 dec.).
Agua hirviendo. . . lbij (1000 gr.).
M. D. ʒjv á lbß (125 á 250 gr.) dos veces al dia.

4611. M. DE SCUDAMORE.

℞ Carbonato de magnes. ʒjß (6 gr.).
Agua de yerbabuena de sabor de pimient. ʒjv (125 gr.).
Vinagre de colchico,
Jarabe simple, ää. . . ʒß (15 gr.).
Mézclese y agítese al tiempo de usarla.
Se da á cucharadas como estimulante y diurética.

4612. M. SEDANTE (*Cottereau*).

℞ Extracto hidro-alcohólico de puntas de espárragos. . . . . ʒj (4 gr
Extracto hidro-alcohólico de beleño. . . . ʒß (2 gr.).
Extracto hidro-alcohólico de digital. . . . gxviij (1 gr.).
Hidrolato de hinojo. . . ʒj (30 gr.).
Esencia de laurel real. 4 gotas.
H. S. A. *I.* Afecciones del corazon, angina de pecho, asma, catarro pulmonar crónico, neurosis, tisis, los espasmódica. *D.* Quince á treinta gotas, tres veces al dia.

4613. *Otra* (HARRISON).

℞ Tintura de beleño. . . . ʒj (1 gr.).
Tintura de guayaco. . . . ʒij (8 gr.).
I. Gastralgia, catarro útero-vaginal, odontalgia. *D.* gxviij á ʒj (1 á 4 gr.) en dos tomas.

4614. M. DE SEN COMPUESTA (H. DE ING.).

℞ Sen,
Menta verde, ää. . . ʒj (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbij (1000 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Sulfato de magnesia, ʒvj (180 gr.).
M. D. ʒj á ʒjv (8 á 15 gr.).

4615. M. DE SILVIO CONTRA EL VÓMITO DE SANGRE, *ó Mistura de opio astringente de Silvio* (F. E.).

℞ Agua destilada. . . . ʒijß (75 gr.).
Vinagre destilado. . . ʒß (15 gr.).
Opio puro pulverizado. gij (1 dec.).

Se disuelve y se añade:

Coral rojo levigado. . ʒß (2 gr.).
Catecú en polvo. . . . ʒß (6 dec.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).

I. Detiene el vómito de sangre, la hemotisis, y las hemorragias uterinas. *D.* ʒß (15 gr.), que se repite por intervalos.

Nota. Cada onza (30 gr.) de esta mistura contiene gß (25 mil.) de opio.

La FORMULA DE LOS H. DE M. se distingue solo de la anterior en que no contiene el opio y se sustituye el jarabe de meconio al jarabe simple.

4616. M. SUDORIFICA.

℞ Acetato de amoniaco líq. ʒj (30 gr.)
Jarabe de culantrillo. . . ʒij (8 gr.).
Láudano líquido,
Vino emético, ãã. . . . 20 gotas.

H. S. A. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

4617. M. CON EL SULFATO DE QUININA TARTARIZADA (*Righini*).

℞ Sulfato de quinina. . ℊxviij (9 dec.).
Acido tártrico. . . . . ʒj (12 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de menta piperit. ʒij (60 gr.).

H. S. A. *D.* En tres tomas.

4618. M. SULFUROSA (*Cazenave*).

℞ Jarabe de fumaria. . . ʒij (60 gr.).
Jar. de pensam. silv. ʒjv (125 gr.).
Sulfito sulfur. de sosa. ʒij (8 gr.).

I. Se usa con utilidad en el tratamiento de muchas dermatosis crónicas, y particularmente contra el eczema y liquen. *D.* Dos cucharadas al dia.

4619. M. SULFÚRICA (*Todd*).

℞ Acido sulfúrico debilitado. ʒij (8 gr.).
Jarabe de frambuesas. ʒxjv (56 gr.).

I. Hemorragias pasivas y principalmente la hemotisis. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

4620. M. TREMENTINADA Y OPIADA (*Rayer*).

℞ Emulsion comun. . . . ʒij (61 gr.).
Esencia de trementina. 36 gotas.
Jarabe diacodion. . . . ʒvj (24 gr.).

I. Ceática, lumbago, hocio, reumatismo, neuralgias, parálisis, neuroses, visceralgias, helmintiasis, lepra, gangrena de hospital. *D.* En una sola toma por la noche al acostarse. Se puede aumentar la dosis de la trementina hasta ʒj (4 gr.) sin aumentar por eso la dosis del jarabe diacodion.

4621. M. TÓNICA (*Gall*).

℞ Tintura de genciana. . ʒjß (45 gr.)
Tintura de ruibarbo,
Tintura de canela, ãã. ʒß (15 gr.).
Tintura anodina. . . . 10 gotas.

M. I. Diarreas y disenterias no inflamatorias y afecciones gastro-intestinales de invasion repentina, producidas por el abuso de los helados, frutas rojas, etc., y que se presentan acompañadas de dolores vivos sin calor abdominal. Primer período del cólera esporádico, interin persistan los dolores. *D.* A cucharaditas de café de hora en hora.

4622. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Sulfato de hierro. . . . ℊij (1 dec.).
Acido sulfúrico. . . . . ℊx (5 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua comun. . . . . ʒj (30 gr.).

Se usa como tónico para los niños. *D.* Una cucharadita de café cada dos ó tres horas.

4623. *Otra* (HERGT.).

℞ Protocloruro de hierr. ℊjv (20 cent.).
Almizcle. . . . . ℊv (25 cent.).
Agua destilada. . . . . ʒij (60 gr.).
Jar. de cásc. de nar. ʒj (30 gr.).

M. I. Gastromalacia. *D.* Una cucharadita de café cada hora.

4624. *Otra* (J. P. FRANK).

℞ Mirra escogida. . . . . ʒj (4 gr.).

Se tritura en un mortero y se echa poco á poco en

Infusion de manzanilla. ʒvj (180 gr.).

Se añade despues:

Agua de canela. . . . . 3vj (24 gr.).
Sal de Marte. . . . . ʒxv (75 cent.).
Jar. de cásc. de naranj. ʒj (30 gr.).

M. I. Tiranteces de pecho que siguen á la lactancia prolongada.

1625. M. TÓNICA Y ESTIMULANTE (*Ranque*).

℞ Vino de Alicante. 2
Agua de cebada. 1

M. I. Cólera adinámico, afecciones tifoideas. *D.* Una cucharada cada hora.

1626. M. TÓNICA Y ESTIMULANTE *ó Pocion tónica y estimulante* (*Dubois*).

℞ Extr. seco de quina. ʒj (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de malvabisco,
Jarabe balsámico de Tolú, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . ʒvj (180 gr.)

M. S. A. *D.* Una cucharada de tres en tres horas. Se la vuelve antiespasmódica segun los casos, añadiendo:

Licor anod. de Hoffmann. ʒß (2 gr.).

1627. M. DE TREMENTINA (*Frank*).

℞ Aceite de trementina. ʒß (15 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒij (8 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒß (15 gr.).
Agua destilada de manzanilla. . . . . lbj (500 gr.).

I. Ténia. *D.* Se toma una cucharada llena mañana y noche.

1628. M. TREMENTINADA (*Most*).

℞ Esencia de trementin. ʒß (15 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒjß (45 gr.).

Se mezcla por trituracion y se añade meneando siempre:

Ag. de yerbab. de sab. de pimienta,
Ag. de cardam., ãã. ʒvj (180 gr.).

I. Neuralgias y principalmente la ceática. *D.* Una cucharada cuatro ó cinco veces al dia durante cuatro semanas.

1629. *Otra* (H. DE SAN JUAN DE DIOS Y H. DE M.).

℞ Trementina. . . . . 5j (4 gr.).
Yema de huevo. . . número 1.
Emulsion comun. . . ʒxij (375 gr.).

Se tritura convenientemente la trementina con la yema de huevo hasta que se haya interpuesto bien, y se añade el líquido por pequeñas porciones.

I. Catarros pulmonares crónicos y tambien de la vejiga. *D.* A cucharadas.

1630. M. TRIACAL (*Dubois*).

℞ Triaca. . . . . 5ijß (10 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol y se añade poco á poco:

Agua. . . . . ʒvij (210 gr.).

I. Es tónica y calmante y conviene en la debilidad de estómago. *D.* A cucharadas.

1631. M. DE VALERIANA LAUDANIZADA (*Richter*).

℞ Tintura de castóreo. . . ʒj (4 gr.).
Tintura de valeriana. . ʒij (8 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒß (6 dec.).

M. I. Histérico, espasmos. *D.* Diez á veinte gotas de hora en hora.

1632. M. DE VALERIANA ETEREA (*Schneider*).

℞ Esencia de valeriana. ʒj (12 dec.).
Eter acético. . . . . ʒjv (16 gr.).

M. I. Neuralgias acompañadas de jaqueca, neuralgia facial. *D.* Diez á quince gotas de hora en hora.

1633. M. DE WERLHOF.

℞ Bálsamo del Perú. . . ʒj (4 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 2.

Se disuelve y se añade:

Extracto de quina. . ʒjv (16 gr.).
Miel rosada. . . . . ʒvj (192 gr.).

M. I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una cucharada tres veces al dia.

4634. M. VERMIFUGA.

℞ Helecho macho. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).

Se hierve, se reduce una tercera parte, se cuela y se añade despues de fria:

Eter sulfúrico. . . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . ʒj (30 gr.).

M. D. Una cucharada de hora en hora.

4635. M. VOMITIVA (*Hufeland*).

℞ Polvo de ipecacuana. . ʒj (12 dcc.).
Ojimiel escilítico,
Jarabe de frambuesas,
Agua comun, ãã. . . . ʒjv (16 gr.).

M. S. A. Se hace tomar á los niños, que no han llegado aun á la edad de un año, una cucharadita de café hasta que empiece el vómito.

4636. M. DE WHITT.

℞ Eter sulfúrico. . . . . ʒj (30 gr.).
Esencia de trementina. ʒß (15 gr.).

M. S. A. *I.* Cálculos biliarios. *D.* Se toman durante muchos meses quince ó veinte gotas cada dia en una cucharada de agua azucarada, y se bebe despues una taza de suero clarificado ó agua de cebada. Debe usarse esta mistura durante muchos años.

MUCILAGOS.

4637. MUCILAGO CANTARIDADO (H. DE AL.).

℞ Tintura de cantáridas. 4 gotas.
Mucil. de goma aráb. ʒjv (125 gr.).

M. I. Gonorrea y leucorrea crónicas. *D.* Una cucharada cada tres horas. Cada cucharada que pesa ʒv (20 gr.) contiene ¹/₄ de grano de tintura de cantáridas.

4638. M. DE CARACÓLES.

℞ Caracoles de viña. . . . número 4.
Jarabe simple. . . . . ʒvij (28 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua comun. . . . . ʒiij (96 gr.).

Se prepara los caracoles del mismo modo que para hacer el caldo; en seguida se corta la carne en pedacitos y se la bate bien durante un cuarto de hora en la cantidad de agua prescrita; se cuela el líquido con expresion por un lienzo claro, y se añade el jarabe y el agua de flores de naranjo.

4639. M. DE GOMA ARÁBIGA (F. F. Y F. P.).

℞ Polvo de goma arábiga. ʒj (32 gr.).
Agua fria. . . . . ʒj (32 gr.).

Se divide exactamente en un mortero de mármol.

I. Tiene las mismas propiedades que el agua de goma arábiga, aunque mas caracterizadas porque está mas cargado. Generalmente se le prescribe como excipiente ó intermedio. *D.* ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).

4640. M. DE GOMA TRAGACANTO (F. F. Y F. P.).

℞ Goma tragac. entera. ʒj (32 gr.).
Agua caliente. . . . . lbß (250 gr.).

Se limpia la goma haciendo saltar con un cortaplumas las impurezas que se adhieren á su superficie, se pone en una vasija de loza blanca con el agua prescrita, y se deja en digestion por veinticuatro horas; se cuela con expresion, y se agita el mucílago en un mortero de mármol hasta que

se presente enteramente homogéneo.

I. Posee las propiedades emulsivas de los medicamentos mucilaginosos, mas marcadas que las de la goma arábiga; así se le usa con preferencia para hacer pildoras y suspender medicamentos insolubles en el agua. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

4641. M. DE LINAZA (F. F.).

℞ Semillas de linaza. . . ℥j (32 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (192 gr.).

Se digieren durante seis horas meneando de cuando en cuando y se cuela con expresion.

Del mismo modo se preparan los MUCILAGOS DE SEMILLAS DE MEMBRILLOS, ZARAGATONA Ó RAIZ DE MALVABISCO.

Se usa exteriormente en lociones, tomentos ó inyecciones emolientes.

4642. M. DE MUSGO MARINO.

℞ Musgo marino. . . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . . lbiij (1500 gr.).

Se cuece por quince á veinte minutos, se cuela por partes, y exprimiendo por una manga de bayeta se obtienen lbiij (1500 gr.) de mucilago.

4643. M. OFTÁLMICO.

℞ Mucilago de semillas de membrillo. . . . ℥vj (192 gr.).
Flores de zinc. . . . . 3ij (8 gr.).

Mézclese bien.

I. Se emplea para la oftalmia, y las escoriaciones que resultan en la circunferencia del ojo.

ODONTALGICOS.

4644. ODONTINA (*Pelletier*).

Es una mezcla de magnesia y manteca de cacao aromatizada con esencias.

Es una composicion sólida, de olor y sabor agradables, que tiene la propiedad de blanquear los dientes y conservar su esmalte y prevenir y detener su caries. V. tomo I, página 276.

4645. ODONTALGICO ALCANFORADO (*Cottereau, hijo*).

℞ Eter sulfúrico. . . . . ℥iij (90 gr.).
Alcanfor.

toda la cantidad que se pueda disolver, á lo que se añade dos ó tres gotas de amoniaco.

Sirve para cauterizar los dientes cariados y hace cesar inmediatamente la odontalgia. Es buena preparacion.

4646. CIMENTO PARA LOS DIENTES.

℞ Almáciga en lágrimas. . . . c. s. q.
Eter sulfúrico. . . . . c. s.

Se echa mayor cantidad de almáciga que de éter, y á los dos dias de maceracion se decanta. La solucion contiene 82 por 100 de resina.

Se empapa una bolita de algodon del grandor de la parte cariada, y se aplica á la cavidad del diente despues de haberla enjugado.

La fórmula del ODONTOIDE DE BILLARD es igual á la anterior y se usa del mismo modo.

OJIMIELES.

4647. OJIMIEL DE AJO.

℞ Vinagre de ajo. 1
Miel blanca. 2

Se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Catarro crónico, aftas, acne. *D.* A cucharadas, tres veces al dia en una tisana pectoral.

4648. O. DE CÓLCHICO (F. F.).

℞ Vinagre de cólchico. lbij (1000 gr.).
Miel. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Se usa como diurético en las hidropesías, anasarca, hidrotorax, gota, reumatismo. *D.* ʒij (8 gr.) aumentando progresivamente hasta ʒj (30 gr.), dos veces al dia, en un vehículo mucilaginoso.

4649. O. SIMPLE Ó MIEL DE VINAGRE (F. E., F. F. Y F. P.).

℞ Miel buena. . . . . lbjv (2000 gr.).
Vinagre blanco bueno y filtrado. . . lbij (1000 gr.).

Se disuelve en una vasija de loza de Talavera, se evapora á fuego lento hasta que espume y tome la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Es expectorante y se usa para favorecer la expectoracion en los catarros crónicos, asma, etc.; se usa tambien en las obstrucciones. *D.* ʒj á ʒiij (30 á 90 gr.) solo ó mezclado con el jarabe de goma ó de altea, ó en una bebida apropiada.

4650. O. DE ELÉBORO.

℞ Vinagre de eléboro negro. 1
Miel blanca. 1

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

4651. O. ESCILÍTICO *ó Miel de vinagre de cebolla albarrana* (F. E.).

℞ Vinagre recien preparado de cebolla albarrana. . . . . lbij (1000 gr.).
Miel clarificada. . . lbjv (2000 gr.).

Se disuelve en una vasija de loza de Talavera ó en un baño acuoso y se cuela.

I. Es diurético y expectorante, y en algunos casos se le usa como excitante general; se emplea en el asma, catarros crónicos, hidropesias, afecciones reumático-gotosas.

Del mismo modo se prepara, segun la F. E., EL OJIMIEL CÓLCHICO Ó MIEL DE VINAGRE DE CÓLCHICO.

4652. O. ESCILÍTICO (F. F. Y F. P.).

℞ Vinagre escilítico. . lbij (1000 gr.).
Miel blanca. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de jarabe y se cuela.

I. Albuminuria, pica, enagenacion, crup, asma, bronquitis, afecciones reumáticas gotosas. *D.* ʒiij á ʒviij en un vehículo apropiado, tal como la tisana de grama, etc.

4653. O. DE NARCISO DE LOS PRADOS (*Van Mons*).

℞ Vinagre de narciso de los prados. 1
Miel blanca 4

Se cuece hasta la consistencia de jarabe.

I. Coqueluche y asma convulsivo. *D.* Una cucharadita de café.

4654. O. PECTORAL DE EDIMBURGO.

℞ Miel. . . . . lbß (250 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒj (30 gr.).

Raiz de énula campana,
Lirio de Florencia, ää. ʒß (45 gr.).

Despues de haber mondado, cortado y machacado las raices se las hierven en ʒxx (625 gr.) de agua hasta que se reduzca á ʒvij (210 gr.). Por separado se disuelve la goma amoniaco en ʒiij (90 gr.) de vinagre bueno. Se mezcla esta solucion con el cocimiento de las raices, despues se decanta y se cuela la mezcla por un lienzo muy apretado; por último se añade la miel y se cuece todo hasta la consistencia conveniente.

I. Afecciones catarrales. *D.* ʒj á ʒjß (30 á 45 gr.) al dia, pura ó en una pocion apropiada.

4655. O. PECTORAL DE LOS DANESES.

℞ Raiz de énula campan. ʒi (30 gr.).
Lirio de Florencia. . . ʒß (2 gr.).

Se dividen estas sustancias y se las hierve en ʒxxxvj (1125 gr.) de agua de fuente. Se cuela el cocimiento y se le añade:

Miel blanca. . . . . lbj (500 gr.).
Goma amoniaco disuelta en c. s. de vinagr. ʒj (30 gr.).

Se pone todo al fuego y se hierve hasta la consistencia de jarabe.

I. Asmas húmedos y catarros pulmonares crónicos. *D.* Una cucharada de cuando en cuando.

4656. O. TARTAROSO.

℞ Crémor de tártaro. . . ʒijß (10 gr.).
Miel sin espuma. . . . ʒv (20 gr.).

M. I. Embarazo de las primeras vias, calenturas biliosas, hidropesias, ascitis. *D.* A cucharadas en un vaso de limonada.

OLEOSACAROS.

4657. OLEOSACARO DE ACEITE DE CROTON TIGLIO (H. DE AL.).

℞ Aceite de croton. . . . . 1 gota.
Oleosácaro de canela. . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles. *I.* Se usa como purgante. *D.* Un papel cada hora, hasta que produzca deposiciones.

4658. O. DE ANIS (F. F.).

℞ Esencia de anis. . . . . 1 gota.
Azúcar blanca. . . . . ʒj (4 gr.).

Se trituran en un mortero de mármol, porcelana ó vidrio hasta que estén bien mezcladas.

Se usa como el aceite esencial de anís para aromatizar las pociones tónicas, estomacales y carminativas.

4659. O. GOMOSO *para cubrir las píldoras de copaiba ú otro medicamento repugnante.*

℞ Azúcar blanca. . . . . ʒiv (125 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒj (30 gr.).
Esencia de limon, de menta ó cualquiera otra. . . . . 6 gotas.

Se pulveriza el azúcar despues de haber echado la esencia, se cuela por un tamiz de cerda y se mezcla con la goma.

Este oleosácaro debe conservarse para cuando se necesite, en un frasco con tapon esmerilado. Roy reviste con él las píldoras segun el procedimiento ordinario.

4660. O. DE LIMON (F. F.).

℞ Limones recientes. . . . número 1.
Azúcar de pilon en pedaz. ʒij (8 gr.).

Se frotan los pedazos del azúcar contra la corteza exterior del limon, hasta separar toda la parte amarilla, y se trituran en un mortero para mezclarlos exactamente.

Del mismo modo se preparan los oleosácaros de BERGAMOTA, CIDRA Y NARANJA.

I. Tienen las mismas propieda-

des que los aceites volátiles de su nombre, y se usan como ellos para aromatizar algunas pociones estomacales, antiespasmódicas y vermífugas.

4661. O. DE MACIS (F. A.).

℞ Macis. . . . . 9j (12 dec.).
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).

Se mezcla triturando en un mortero de vidrio y se conserva en una vasija bien tapada.

4662. O. DE MANZANILLA.

℞ Esencia de manzanilla. . 24 gotas.
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).

A veces se usa el agua destilada de manzanilla.

4663. O. DE YERBABUENA DE SABOR DE PIMIENTA.

℞ Esencia de yerbabuena de sabor de pimienta. . . . 4 gota.
Azúcar blanca. . . . . ℥j (4 gr.).
Mézclese.

Del mismo modo se prepara el OLEOSÁCARO DE CANELA.

4664. O. DE SANTÓNICO.

℞ Esencia de santónico. . . 6 gotas.
Azúcar. . . . . ℥j (4 gr.).

Bouillon Lagrange le aconseja en la medicina de los niños.

D. De una vez.

OPIATAS.

4665. OPIATA ANTIBLENORRÁGICA.

℞ Bálsamo de copaiba. . . ℥jß (6 gr.).
Azúcar en polvo. . . . . ℥x (10 gr.).

Se mezcla y se añade poco á poco:

Jarabe simple,
Mucílago de goma arábiga, ãã. c. s.

I. Blenorrea, leucorrea, catarro útero-vaginal. *D.* 3j á ℥ijß (4 á 10 gr.) mañana y noche.

4666. *Otra* (DIDAY).

℞ Extr. alcohólico de cubebas,
Aceite esencial de bálsamo de copaiba, ãã. gr.xc (5 gr.).
Jalapa en polvo. . . . . gr.jv (3 gr.).
Pimienta cubebas en polvo c. s., cerca de ℥jß (6 gr.).

H. S. A. *D.* En tres tomas en las veinticuatro horas, entre hostias.

Nota. Si se quiere que no obre como purgante, se reemplaza la jalapa por mayor cantidad de cubebas en polvo.

Segun Diday la dosis de la opiata formulada antes, es igual á la de gr.xxij (16 dec.) de opiata comun, preparada con copaiba y pimienta al natural.

Apenas se alivia la afeccion con este remedio, se reduce la dosis un tercio; pero se continúa administrando el medicamento durante diez dias cuando menos.

4667. O. ANTIDISENTÉRICA (*Spielmann*).

℞ Triaca. . . . . ℥ij (60 gr.).
Diascordio. . . . . ℥ij (60 gr.).
Goma arábiga. . . . ℥ß (15 gr.).
Bol arménico. . . . . ℥iij (90 gr.).

I. Disenteria.

La OPIATA ANTIDISENTÉRICA BALSÁMICA DE SPIELMANN contiene además ℥ij (60 gr.) de bálsamo de Lucatel.

4668. O. ANTIESCORBÚTICA ó *Electuario antiescorbútico.*

℞ Carbon vegetal en polvo y tamizado. . . . . ℥j (30 gr.).
Quina gris en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Miel. . . . . c. s.

Se usa por medio de un pincel ó de una pluma.

4669. O. ANTIGONORREICA (*Douvonvistky*).

℞ Trementina de copaiba,
Azúcar, ãã. . . . . ℥jß (15 gr.).

Mucil. de goma aráb. . 3iij (12 gr.).
Carmin laca. . . . . 3j (4 gr.).
Hidroclorato de morfin. gx (5 dec.).
Ag. de menta piperita. c. s.

H. S. A. *I.* Es uno de los mejores y mas eficaces antigonorréicos que se conocen. *D.* 3j á 3ij (4 á 8 gr.) al dia, mañana y noche.

4670. O. ANTIGONORREICA (*Pajot Laforet*).

℞ Sublimado corrosivo. . gij (15 cent.).
Goma quino. . . . . 3ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . . 3jß (45 gr.).
Copaiba. . . . . 3ß (15 gr.).
Azúcar. . . . . 3v (150 gr.).
Agua de menta. . . . . c. s.

D. 3ij (8 gr.) mañana y noche.

4671. O. ANTILEUCORREICA (*Roberto Tomás de Salisbury*).

℞ Incienso en polvo,
Trem. de copaiba, ãã. 3jv (15 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . 3j (4 gr.).
Genciana en polvo. . . 3ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . 3iij (12 gr.).
Jarabe de gengibre. . c. s.

H. S. A. *D.* 3j (4 gr.) mañana y noche.

4672. O. ANTILEUCORREICA *ó antiblenorrágica* (*Swediaur*).

℞ Resina de copaiba. . 3j (30 gr.).
Azúcar en polvo. . . lbß (250 gr.)

Mézclese y añádase poco á poco:

Jarabe simple y mucilago de goma arábiga. . . . . c. s.

H. S. A. una masa homogénea de consistencia de opiata.

D. 3j á 3ij (4 á 8 gr.) mañana y noche.

4673. O. ANTIODONTÁLGICA.

℞ Extracto de belladona,
Extracto de beleño,
Opio, ãã. . . . . gxx (10 dec.).
Pelitre. . . . . 3ß (2 gr.).
Esencia de clavo. . . 20 gotas.

H. S. A. una masa, que se distribuye en píldoras de á grano (5 cent.).

4674. *Otra*, n. 2.

℞ Opio,
Alcanfor, ãã. . . . . gij (1 dec
Aceite de clavo,
Tint. de pimiento. ãã. . 1 gota.

Hágase pasta.

4675. O. ANTIPERIÓDICA Y TÓNICA.

℞ Antim. diaforét. lavado. 3j (4 gr.).
Canela del Malabar. . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de enebro. . . . 3ij (8 gr.).
Extracto de quina. . . . 3j (4 gr.).
Conserva de énula. . . . 3ij (8 gr.).
Jar. de achicorias comp. c. s.

H. S. A. *I.* y *D.* En seis tomas durante la apirexia de las calenturas intermitentes, diarrea, pleuresia, escorbuto.

4676. O. ÁRABE.

℞ Zarzaparrilla,
China,
Avellana tostada, ãã. . 3iij (90 gr.).
Clavo. . . . . 3jv (120 gr.).
Miel. . . . . c. s.

M. I. Ulceraciones sifilíticas de la garganta, ronquera, escorbuto. *D.* 3ij á 3jv (8 á 16 gr.).

4677. O. ASTRINGENTE.

℞ Bálsamo de copaiba,
Cubebas en polvo. ãã. . 3j (30 gr.).
Extracto de ratania . . 3j (4 gr.).

M. I. Gonorrea. *D.* 3j á 3jv (4 á 15 gr.) al dia.

4678. *Otra* (BABEYBAC).

℞ Conser. de cinosbastos. 3vj (180 gr.).
Bellotas de encina secas en polvo. . . . . 3iij (90 gr.).
Catecú,
Coral rojo prepar., ãã. 3jß (45 gr.).
Canela. . . . . 3iij (12 gr.).
Jarabe de rosas secas. c. s.

H. S. A. *I.* Disenteria y diarrea crónicas. *D.* 3j (4 gr.) cada cuatro horas.

4679. *Otra* (BOUCHER).

℞ Salicaria en polvo. . gxxx (15 dec

Raiz de arnica en polvo. 3ß (2 gr.).
Alumbre. . . . . gvj (3 dec.).
Conserva de cinosbast. . c. s.

I. Disenteria, cuando han cedido los síntomas de irritacion y predominan los signos de atonía y relajacion. *D.* Se da de una sola vez, que se puede repetir dos veces en las veinticuatro horas, diluida en una tisana apropiada.

4680. O. AZUFRADA.

℞ Azufre sublim. y lavad. 3vj (24 gr.).
Miel. . . . . c. s.

M. I. Es laxante. Enfermedades cutáneas, estreñimiento en las enfermedades herpéticas. *D.* 3ß á 3j (2 á 4 gr.), dos veces al dia.

4681. O. BALSÁMICA.

℞ Bálsamo de Tolú. . . 3iij (100 gr.).
Bálsamo de copaiba. . 3jß (50 gr.).

Se mezcla por medio de un calor suave, se añade almendras dulces en polvo, y se hace S. A. un electuario.

I. Blenorragias. *D.* En veinticinco tomas, tres á seis veces al dia.

4682. O. BALSÁMICA *ó antigonorréica* (*Berton*).

℞ Bálsamo de copaiba . . 3ij (60 gr.)
Cubebas. . . . . 3ij (60 gr.).
Alumbre. . . . . 3j (30 gr.).
Extracto de opio. . . . gvj (3 dec.).

H. S. A. *I.* Blenorragia, blenorrea, leucorrea, catarro úteroyaginal. *D.* 3j (4 gr.) mañana y noche en una ciruela.

4683. O. DE BALSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. . 3iij (12 gr.).
Pimienta cubebas. . . 3ß (16 gr.).
Polvos de jalapa. . . . 3jß (6 gr.).
Goma-gamba. . . . . 3ß (8 dec.).
Jarabe de rosas pálidas. c. s.

H. S. A. *D.* Se toma en dos dosis durante el dia.

4684. O. CON EL BALSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. 4
Almendras machacadas no completamente exprimidas. 8

Mézclese.

4685. *Otra*, n. 2.

℞ Bálsamo de copaiba. . 3ß (15 gr.)
ó Aceite esencial de copaiba . . . . . 3ij (8 gr.).
Magnesia inglesa. . . c. s.

H. S. A. una opiata añadiendo:
Jabon medicinal. . . . 3j (12 dec.).

Se aromatiza con algunas gotas de esencia de menta.

I. Flujos gonorréicos agudos y crónicos. *D.* En tres ó cuatro tomas en uno ó dos dias.

4686. *Otra* (BOUTIGNI).

℞ Bálsamo de copaiba 4
Cubebas 4
Azúcar. 4

Mézclese.

4687. *Otra* (LABELONYE).

℞ Cubebino impuro (oicholado de extracto resinoso de cubebas). . 4
Yema de huevo. 1
Regaliz en polvo. 1
Malvabisco. 1

4688. *Otra* (GIBERT).

℞ Cubebas. 4
Azafran. 1
Bálsamo de copaiba. 8

I. Blenorragias agudas ó crónicas. *D.* El grosor de una avellana muchas veces al dia.

4689. O. CALMANTE.

℞ Conserva de cinosbastos. 3ij (64 gr.).
Nitro. . . . . 3vj (24 gr.).
Sal de Saturno. . . . . 3ß (2 gr.).
Jarabe de culantrillo ó de manzanas. . . . . c. s.

I. Contra la salacidad en el hombre y en la mujer. *D.* 3ß (2 gr.) mañana y noche durante una semana. Se puede añadir alcanfor y láudano.

4690. O. DE CATECÚ.

℞ Catecú,
Cascarilla, ãã. . . . . 3ijß (10 gr.).

Bálsamo de Tolú. . . . ℥xc (5 gr.).
Quina. . . . . ʒß (15 gr.).
Rob de enebro. . . . c. s.

M. I. Leucorrea, blenorrea, catarro útero-vaginal. *D.* ʒj (4 gr.) mañana y noche.

4691. O. DE COLOMBO COMPUESTA.

℞ Colombo. . . . . ʒv (20 gr.).
Cascarilla. . . . . ʒijß (10 gr.).
Macis. . . . . gxc (3 gr.).
Jar. de cásc. de naranj. c. s.

I. Diarrea crónica, disenteria. *D.* Tres cucharadas al dia.

4692. O. DENTIFRICA TONICA.

℞ Quina roja en polvo. . . ʒij (60 gr.).
Canela en polvo. . . . . ʒj (30 gr.).
Hueso de jibia. . . . . ʒj (30 gr.).
Cochinilla. . . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Se aromatiza con c. s. de esencia de clavo.

4693. O. DENTÍFRICA ACIDA DE GOELIN.

℞ Alumbre calcinado. lbß (250 gr.).
Lirio en polvo. . . . lbß (250 gr.).
Crémor de tártaro. . ʒjv (125 gr.).
Hueso de jibia. . . . lbß (250 gr.).
Cochinilla en polvo. ʒj (30 gr.).
Jarabe de miel. . . . lbij (1000 gr.).

H. S. A. Se aromatiza con esencia de menta.

4694. O. DENTÍFRICA DE CARBON.

℞ Carbon vegetal en polvo. ʒj (30 gr.).
Clorato de potasa. . . . ʒß (2 gr.).
Agua de menta. . . . . c. s.

para hacer una pasta.

Se deja sin enjuagar la boca durante la noche, y en la mañana siguiente se la lava con el agua dentífrica clorurada.

4695. O. ESTOMACAL (*Helvetius*).

℞ Gengibre confitado. . ʒij (60 gr.).
Limones confitados,
Clavo confitado, ãã. . ʒj (30 gr.).
Opiata de Salomon. . . ʒß (15 gr.).
Nuez moscada confitada,
Canela, ãã. . . . . ʒij (12 gr.).
Cascarilla. . . . . ʒß (2 gr.).
Aceite esenc. de clavo. ℈ij (24 dec.).
Aceite esenc. de canela. 10 gotas.
Jarabe de claveles. . . c. s.

H. S. A. *I.* Se usa como estimulante de los órganos digestivos: es tambien afrodisíaco. *D.* Desde ℈j á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

4696. O. FEBRÍFUGA.

℞ Diaprunis solutivo,
Jarabe de flores de albérchigo,
Quina roja en polvo, ãã. ʒj (30 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ℈j (12 dec.).

H. S. A. y divídase en doce tomas. *D.* Una toma, mañana y noche.

Nota. Una hora despues de la ingestion de cada toma se da un caldo.

4697. *Otra* (LESCURE).

℞ Quina amarilla en polv. ʒß (15 gr.).
Canela. . . . . ℈j (12 dec.).
Polvo de cardo estrellado,
Polvo de manzanilla romana,
Polvo de valeriana,
Polvo de ajenjos,
Polvo de centaura menor, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Miel. . . . . c. s.

Se prepara S. A. una opiata, que se divide en cuatro partes iguales.

I. Calenturas intermitentes en los dias libres de acceso. *D.* Se da este remedio tres veces al dia.

4698. *Otra* (TISSOT).

℞ Polvo de centaura,
Polvo de mirra,
Polvo de ajenjos,
Conserva de enebro, ãã. ʒj (30 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . . c. s.

para hacer una opiata espesa.

D. ʒij (8 gr.).

4699. O. DE GENGIBRE.

℞ Incienso,
Bálsamo de copaiba, ãã. ʒß (16 gr.).

Ruibarbo. . . . . 3j (4 gr.).
Genciana. . . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . 3ijß (10 gr.).
Jarabe de gengibre. . c. s.

I. Broncorrea, leucorrea. *D.* 3j á 3ijß (4 á 10 gr.) mañana y noche.

4700. O. DE MARTINET.

℞ Electuario lenitivo. . . 3ij (60 gr.).
Crémor de tártaro,
Ruibarbo en polvo, ää. 3ß (15 gr.).
Bálsamo de copaiba. . 3jß (15 gr.).
Jarabe de rosas. . . . c. s.

H. S. A. una opiata. *I.* Gonorreas rebeldes. *D.* 5j (4 gr.) mañana y noche.

4701. O. MESENTÉRICA.

℞ Goma amoniaco. . . . 3ß (16 gr.).
Limaduras de hierro por-
firizadas. . . . . 3ß (16 gr.).
Sen. . . . . 3vj (24 gr.).
Ruibarbo,
Polvos cornachinos, ää. 3iij (12 gr.).
Calomelanos,
Raiz de yaro,
Acibar, ää. . . . . 3ij (8 gr.).
Jarabe de manzanas
compuesto. . . . . c. s.

I. Infartos viscerales ó mesentéricos, amenorrea. *D.* 3ß á 3j (2 á 4 gr.) como purgante, y gj á gvj (5 á 30 cent.) repetidos muchas veces al dia como emenagogo. Este electuario se enmagrece y endurece con el tiempo, pero se reblandece con un poco de jarabe.

4702. O. DE MICHEL.

℞ Triaca. . . . . 3j (30 gr.).
Extracto de quina. 3ij (8 gr.).
Ext. acuoso de opio. gxv (75 cent.).

H. S. A. *I.* Enfermedades crónicas de los pulmones. *D.* Se toma la dosis indicada en una ó dos veces en las veinticuatro horas.

4703. O. NAPOLITANA.

℞ Guayaco en polvo,
Zarzaparrilla en polvo,
Raiz de china en p., ää. 3ß (15 gr.).
Sen mondado,
Ruibarbo escogido, ää. 3ij (8 gr.).
Protocloruro de mercurio,
Jalapa, ää. . . . . 3jß (6 gr.).
Escamonea. . . . . 9j (12 dec.).
Jar. de rosas solutivo. c. s.

H. S. A. una opiata.

I. Enfermedades venéreas antiguas, afecciones reumáticas y enfermedades herpéticas complicadas con vicio sifilítico. *D.* 3j á 3ij (4 á 8 gr.) por la mañana en ayunas.

4704. O. PARA DILATAR LA PUPILA.

℞ Alcanfor. . . . . 9j (12 dec.).
Aceite de alm. dulces. c. s.

Se disuelve y se incorpora:

Extr. de belladona. . 3ij (8 gr.).

Se añade á la mezcla:

Ungüento napolitano. 3ij (8 gr.).

D. Se usa en unturas, en los párpados, cejas y sienes.

4705. O. PECTORAL.

℞ Culantrillo,
Pulmonaria, ää. . . . . 2 puñados.
Agua. . . . . c. s.

Se hierve para obtener lbjv (2000 gr.) de cocimiento, al que se añade al fin dos puñados de flores secas de tusilago. Se disuelve en este licor:

Azúcar blanca. lbv y 3v (2650 gr.).

Se hace un jarabe al que se añade:

Pulpa de malvab. 3xlij (1300 gr.).
Pulpa de énula,
Pulpa de pasas, ää. 3xiij (330 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de electuario y se añade aún:

Opio puro. . . . . 5j (4 gr.).

triturado con igual cantidad de azúcar.

Una onza (30 gr.) de esta preparacion contiene g⅒ (3 cent.) de opio.

Se podria preparar muy bien este medicamento bajo la forma de pasta.

4706. O. SULFURO-MAGNESIANA (*Mialhe*).

℞ Azufre lavado. 10
Carbonato de magnesia. 20
Miel de Narbona. 60
M. I. Estreñimiento que acompaña á ciertas enfermedades herpéticas de los niños.

4707. O. TREMENTINADA.

℞ Magnesia calcinada. ℈ℇx (30 dec.).
Mézclese en un mortero de porcelana con
Esencia de trementina. ʒj (4 gr.).
Esencia de yerbabuena. 8 gotas.
M. I. Neuralgias. *D.* El volúmen de una nuez tres veces al dia.

4708. O. TÓNICA CALIBEADA.

℞ Oxido negro de hierro. ʒß (2 gr.).
Limadoras de hierro. . ʒijß (10 gr.).
Quina,
Ruibarbo, ää. . . . . ℈xc (5 gr.).
Sulfato de potasa. . . . ʒß (2 gr.).
Rob de énula,
Miel, ää. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Caquexia, diarrea, escorbuto, bocio, amenorrea, espasmos, estomacace, calenturas intermitentes. *D.* ʒß (2 gr.) mañana y noche.

4709. O. VERMIFUGA (*Chirac*).

℞ Etiope mineral,
Semillas de hipericon,
Semillas de ruda,
Semillas de ajenjos,
Semillas de tanac., ää. ʒß (45 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . c. s.
D. ʒß (2 gr.) mañana y noche con un cocimiento de helecho macho.

OXICRATOS.

4710. OXICRATO DE ANDRIA.

℞ Vinagre. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).
M. D. Un vaso cada tres ó cuatro horas.

4711. OXICRATO (H. DE M.).

℞ Agua comun. . . . . lbij (1000 gr.).
Vinagre. . . . . lbj (500 gr.).
M. I. Inflamacion por causa externa, como contusiones, fracturas, dislocaciones, equimosis, enfermedades escorbúticas, etc.

PANES.

4712. PANES MEDICINALES.

Se preparan con carbonato de protóxido de hierro, con bicarbonato de sosa, óxido de zinc, nitrato de bismuto, etc.

4713. P. DE ANIS (*Sainte Marie-aux-Mines*).

℞ Harina blanca de primera calidad,
Azúcar blanca pulverizada, ää. . . . . lbj (500 gr.).
Semillas de anis verde enteras, ää. . . . . ʒij (60 gr.).
Claras de huevo. . . . número 4.
Yemas de huevo. . . . número 2.
Aceite de tártaro por deliquio, una cucharada de café.
Se amasa todo exactamente, despues se da la forma de panes, que se dejan aún doce ó veinticuatro horas sobre el horno de un panadero antes de meterlos en él.
Nota. Esta fórmula, dada por Jacquemin, boticario en Schirmeck (Vosgos), es la que se sigue

en Sainte-Marie; los panes de anís de esta ciudad deben su superioridad sobre los preparados por los confiteros de otras ciudades al uso del aceite de tártaro.

Esta fórmula tiene analogía con el pan de especias.

1714. P. FERRUGINOSO (*Louvel*).

Se prepara añadiendo ʒj (12 dec.) de subcarbonato de hierro á cada ℥jv (125 gr.) de pan.

Se usa como tónico en los casos de amenorrea, escrófulas, clorosis, etc.

1715. P. DE LACTATO DE HIERRO (*Boissiere*).

Se añaden ɡv (25 cent.) de lactato de hierro á la pasta de medio panes una preparacion muy eficaz.

1716. P. DE ESPECIAS.

℣ Anís.	℥ß	(15 gr.).
Cilantro.	℥ß	(15 gr.).
Clavo.	ʒß	(2 gr.).
Canela.	ʒß	(2 gr.).
Carbonato de pota.	ɡxc	(5 gr.).
Agua.	℔j	500 gr.).
Harina.	℔xx	(10000 gr.).
Miel.	c. s.	

H. S. A una pasta que se dividirá en partes iguales, que se barnizarán con yema de huevo y se cocerán como el pan de anís.

PAPELES. TAFETANES.

1717. PAPEL.

Se aplica el papel blanco mojado en aguardiente sobre las escoriaciones de las piernas, á consecuencia de una contusion. El papel blanco cortado en pedacitos y puesto en un frasco bien tapado con ácido nítrico ó agua fuerte, forma un cáustico (*mantequilla de papel*) eficaz para destruir los lobanillos y verrugas.

El papel que ha servido en las hojas ó panes de oro, sirve para reunir los bordes de la incision de una sangría.

1718. PERCALINA AGLUTINANTE ó *Espadrapo de cola de pescado.*

℣ Masa para tafetan de Inglaterra. c. s.

Se extiende sobre percalina blanca ó negra. Se adhiere con fuerza á la piel, principalmente cuando se la sumerge en agua tibia.

I. Heridas consecutivas á las amputaciones ó diversas operaciones, y cuando se desea obtener su adherencia inmediata. Es preferible al diaquilon por ser mas fácil de trasportar y no se pega ni se hiende.

1719 P. DE CAUTERIO.

℣ Cera amarilla,		
Pez resina, ää.	℥jv	(125 gr.).
Trement. de Venecia.	℥ij	(60 gr.).
Bálsamo del Perú. . .	ʒj	(4 gr.).

Se liquida á fuego lento, se cuela al través de una tela un poco tupida y se extiende sobre tiras de papel.

1720. P. DE CAUTERIO ó *Papel de Michaleshul* (*Buchner*).

℣ Euforbio.	6
Alcohol absoluto.	125

Se disuelve y se digiere:

Cantáridas en polvo.	12

Se añade:

Trementina de Venecia.	6

Se empapan en esta solucion los pedazos de papel y se dejan secar al aire.

1721. P. DE MOHR.

℣ Alcohol fuerte.	150

Cantáridas en polvo.	8
Euforbio.	2

Se digiere durante algun tiempo, se filtra, y se añade á la solucion:

Trementina de Venecia.	45
Resina.	60

Se extiende en capas delgadas sobre papel, interin la mezcla está caliente.

1722. P. DE CAUTERIO (F. DE WURT.).

℥ Euforbio.	1
Cantáridas en polvo.	48
Espíritu de vino.	125

Se digiere y se añade:

Brea.	240
Resina.	90
Trementina.	6
Aceite de linaza.	5

Se evapora hasta la consistencia de cerato y se extiende la mezcla sobre papel por medio del espadrapero.

1723. P. DE CAUTERIO *ó encerado.*

℥ Cera blanca.	100
Esperma de ballena.	50
Resina elemi.	50
Trementina fina.	60
Esencia de limon.	c. s.

Se liquida estas tres sustancias, se cuela por un lienzo, y se echa sobre hojas de papel alisado entre las dos reglas del espadrapero.

Es muy bueno para mantener los guisantes de cauterio, y preferible á las hojas de yedra que no es fácil adquirir, se secan ó se arrugan sobre la piel y á veces causan dolor.

I. Flegmasias, dispepsia, ablactacion.

1724. P. DERIVATIVO (*Pirwitz*).

℥ Polvo de cantáridas.	ʒß (15 gr.).
Resina de guayaco. .	ʒiij (90 gr.).
Gálbano.	ʒiij (90 gr.).
Alcohol.	ʒvj (180 gr.).

Se digiere durante ocho dias y se añade:

Resina de pino. . . .	ʒijß (75 gr.).
Resina de alerce. . .	ʒj (30 gr.).

U. S. A. Se aplica este barniz sobre papel, y se dará varias manos.

I. Dolores pleuríticos, dolores reumáticos crónicos. Se usa en los mismos casos que los emplastos de pez de Borgoña.

1725. P. DERIVATIVO DE ALEMANIA *ó Papel antireumático.*

℥ Colofonia negra.	300
Cera amarilla.	100
Pez naval fluida.	200

U. S. A. Se extiende esta mezcla, despues de haberla liquidado á fuego lento, en capas delgadas sobre pedazos de papel prolongado.

1726. P. DERIVATIVO REUMÁTICO (*Bery*).

℥ Cantáridas.	ʒß (15 gr.).
Euforbio.	ʒj (30 gr.).
Alcohol.	ʒv (150 gr.).

Se digiere durante ocho dias, se cuela y se añade:

Colofonia.	ʒij (60 gr.).
Trementina.	ʒjß (45 gr.).

Se cubre el papel con tres capas de esta mezcla.

I. Neuralgias, dolores artríticos, reumatismo, ciática, lumbago. *D.* Se aplica á la parte dolorida.

1727. P. EPISPÁSTICO.

Se extiende la mezcla que sirve para preparar el tafetan vejigatorio sobre papel vitela por medio del espadrapero; si se quiere cubrir las dos superficies, se extiende la materia sobre hojas de papel sin cola, que se colocan encima de un escalfador para mantener la materia fundida todo el tiempo necesario á fin de extenderla con uniformidad.

Sirve para promover la supuracion de los vejigatorios.

4728. P. ESPADRÁPICO (*Duclos*).

℔ Galipodio.	lbv	(2500 gr.).
Resina amarilla.	lbjv	(2000 gr.).
Cera amarilla.	lbv	(2500 gr.).
Esperma de ballena.	lbij	(1000 gr.).

Se liquida á fuego lento, se cuela al través de una tela un poco apretada y se extiende S. A. sobre tiras de papel.

4729. P. EPISPÁSTICO (*Vee*).

NUMERO 1.

℔ Cantáridas.	℥xx	(625 gr.).
Manteca de cerdo.	lbviij	(4000 gr.).
Cera muy blanca.	lbjv	(2000 gr.).

NÚMERO 2.

℔ Cantáridas.	lbij	(1000 gr.).
Ungüento de yerbamora.	lbxvj	(8000 gr.).
Cera blanca.	lbjv	(2000 gr.).

NÚMERO 3.

℔ Cantáridas.	lbij	(1500 gr.).
Manteca dada de color con anucsa.	lbxvj	(8000 gr.).
Cera blanca.	lbjv	(2000 gr.).

Se aplica diariamente á los vejigatorios ó fuentes, para mantenerlos en supuracion.

Se prepara del mismo modo que la POMADA EPISPÁSTICA AMARILLA.

4730. P. EPISPÁSTICO DE CANTÁRIDAS.

℔ Cantáridas en polvo grueso.	70
Manteca purificada.	260
Sebo purificado.	260

Se digiere en el baño maria durante tres ó cuatro horas á la temperatura del agua hirviendo, se cuela con expresion, se liquida de nuevo y se añade:

Cera amarilla.	60

Se agita la mezcla hasta que esté medio fria, y se aplica esta preparacion al papel, como se acostumbra con las demás.

4731. P. Y TAFETAN EPISPÁSTICOS (*Beral*).

NÚMERO 1.

℔ Cera blanca.	20
Aceite comun.	12
Manteca de cacao.	16
Esperma de ballena.	12
Trementina.	4
Cantáridas.	4
Agua.	32

NÚMERO 2.

℔ Cera blanca.	13
Aceite comun.	10
Manteca de cacao.	12
Esperma de ballena.	9
Trementina.	3
Cantáridas.	4
Agua.	32

Se liquidan, se sumergen las tiras de tafetan ó tela fina, ó se extiende en tiras de papel.

Se usan para curar los vejigatorios y reemplazar las pomadas epispásticas.

Nota. Se puede establecer fuentes con guisantes sumergidos diferentes veces en una mezcla de

Tint. etérea de cantár.	℥j (30 gr.).
Extracto alcohólico de corteza de torbisco,	
Alcohol rectificado, ää.	℥jv (120 gr.

4732. P. EPISPÁSTICO Ó VEJIGATORIO *ó Espadrapo epispástico.*

NUMERO 1.

℔ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90
Aceite comun.	120
Trementina.	30
Cantáridas en polvo.	30
Agua.	300

NUMERO 2.

℔ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90
Aceite comun.	120
Trementina.	30
Cantáridas en polvo.	40
Agua.	300

NÚMERO 3.

℔ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90

Aceite comun.	120
Trementina.	30
Cantáridas en polvo.	50
Agua.	300

Se hierve lentamente agitando y se cuela. Con esta mezcla se cubren las tiras de papel.

4733. P. EPISPÁSTICO DE TORBISCO.

℣ Corteza de torbisco en pedazos pequeños.	120
Agua.	800

Se hierve hasta que se reduzca á 400 partes de cocimiento fuerte; se cuela con expresion y se mezcla al cocimiento hirviendo:

Manteca purificada.	200
Sebo purificado.	200

Se evapora en baño maría toda la humedad y se añade:

Cera amarilla.	60

Se agita la mezcla hasta que esté medio fria y se empapan tiras de papel de cola, de treinta á cuarenta líneas de ancho y de todo el largo de la hoja; y segun que os las saque de la mezcla fundida al fuego, se las pasa entre dos reglas de hierro calentadas.

4734. P. PARA DESTRUIR LAS MOSCAS (*Wilsin*).

℣ Arseniato de potasa ó sosa.	4
Azúcar blanca.	2
Agua.	20

Disuélvase y empápese en la solucion hojas de papel un poco fuerte, de cola, y despues se cuelga para que se seque. Se coloca un poco de papel en un plato y se le humedece con algunas gotas de agua, que se renovará segun se seque.

Tiene el inconveniente de que las moscas tardan un poco en morir, y sus deposiciones manchan los puntos en que se paran.

4735. TAFETAN VEJIGATORIO.

℣ Cantáridas en polvo.	℥x (300 gr.).
Euforbio en polvo. .	℥j (30 gr.).
Alcohol á 90° c. . . .	lbj (1000 gr.).

Se introducen las cantáridas y el euforbio en un matraz, se vierte en él el alcohol y se tapa libremente. Se coloca el matraz en agua, se le calienta de modo que hierva el alcohol, se deja enfriar, se decanta, se filtra y se hace un segundo cocimiento con

Alcohol á 90° c. . . .	℔j (500 gr.).

Se deja enfriar, se decanta, se exprime el residuo, se filtra y se destila para obtener la mayor cantidad posible de alcohol.

Cola de pescado. . .	℥j (30 gr.
Agua.	c. s.

Se pone la cola de pescado en un vaso con agua, se la deja hinchar durante doce horas, y se calienta para disolverla; se cuela, se añade este hidrolado al alcoholado de cantáridas y se evapora para obtener ℥xij (375 gr.) de licor.

Se toma un pedazo de tafetan negro ó verde de tres cuartas de ancho por vara de largo, se extienden en él diversas veces por medio de un pincel las ℥xij (375 gr.) de licor, y despues de seca la materia vexicante se extiende una capa de alcoholado de benjuí con una parte de benjuí y tres de alcohol á 88° c.

Este tafetan se conserva mucho tiempo, para lo que basta arrollarle con papel y cubrirle. Para alcanforarle se extiende encima por medio de un pincel dos capas de alcohol á 90°, saturado de alcanfor.

4736. *Otro* (DUBISSON).

℣ Extracto hidroalcohólico de cantáridas preparado por maceracion.	4
Gelatina pura.	1
Agua.	c. s.

Se disuelve la gelatina en c. s. de agua, y se diluye el extracto hidroalcohólico para obtener una solucion poco cargada.

Se extiende sobre un hule por

medio de un pincel, y se le da diferentes veces de modo que se extienda con igualdad.

4737. *Otro* (DELOCHE).

Se agota las cantáridas por la esencia de trementina rectificada, se añade resina y cera amarilla, y se extiende en un tafetan. Antes de aplicar el vejigatorio, se extiende una gota de aceite por su superficie.

4738. T. VEJIGATORIO *ó Espadrapo vejigatorio (Guilbert).*

℥ Corteza de torbisco. ℥i (30 gr.).
Agua. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se hierve, se cuela y se añade:

Cantáridas,
Mirra,
Euforbio, ãã. . . . ℥i (30 gr.).

Se funde, se cuela, se evapora y se extiende con un pincel.

I. Vejigatorios, fuentes. *D.* Se aplica repetidas veces.

4739. T. VEJIGATORIO (F. F.).

℥ Polvo de cantáridas. lbij (1000 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . c. s.

Se prepara una tintura etérea de cantáridas por lixiviacion, se destila para sacar el éter, y el residuo será un aceite espeso muy epispástico; tómese de este:

Aceite de cantáridas. ℥iv (125 gr.).
Cera amarilla. . . . lbß (250 gr.).

Se lleva á un calor muy suave, y se extiende sobre un hule. Este espadrapo debe prepararse en cortas cantidades, y guardarse en un frasco bien tapado.

Se usa en los mismos casos que el de cantáridas y conviene principalmente á los niños y á las mujeres de piel fina, cuando no urge obtener una vexicacion pronta y enérgica.

I. Se usa como rubefaciente, vexicante y revulsivo. Reumatismo, ceática crónica, parálisis, bocio, isquidriosis.

4740. *Otro* (TIERRY).

℥ Euforbio en polvo. . . . . c. s. q.
Alcohol de 21° Cart. . . . . c. s.

Se hace una tintura saturada, y se extienden cuatro capas sucesivas sobre una tela encerada, procurando dejar secar una antes de aplicar otra; despues se extienden otras dos con la preparacion siguiente:

Bálsamo de Tolú. 1
Cantáridas en polvo. 3
Eter sulfúrico. 8

Se humedece este tafetan con un poco de alcohol para que se pegue bien.

4741. P. VEJIGATORIO *ó Espadrapo epispástico.*

NUMERO 1.

℥ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90
Aceite comun.	120
Trementina.	30
Extracto etéreo de torbisco. .	15

NUMERO 2.

℥ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90
Aceite comun.	120
Trementina.	30
Extracto etéreo de torbisco. . .	20

NUMERO 3.

℥ Cera blanca.	240
Esperma de ballena.	90
Aceite comun.	120
Trementina.	30
Extracto etéreo de torbisco. . .	30

H. S. A.

4742. P. Y TAFETAN VEJIGATORIO (*Beral*).

℥ Cera blanca.	18
Aceite comun.	9
Galipodio.	21
Extracto alcohólico de torbisco.	1
Alcohol de 34° Cart.	6

Se funde la cera y el aceite, y se añade la solucion alcohólica del extracto. Se evapora el alcohol á fuego lento, se añade el galipodio y se cuela por una tela de lana.

Se impregna de esta mezcla el papel, la tela ó el tafetan por uno ó los dos lados; el papel por medio del espadrapero, y la tela y el

tafetan por el método adoptado para preparar la tela de mayo.

Se obtiene el papel núm. 2, que es mas activo, usando la siguiente fórmula:

℞ Excipiente anterior. 32
Extracto de torbisco. 1
Alcohol de 31° Cart. 6
H. S. A.

El PAPEL EPISPÁSTICO DE ALBESPEYRES es, segun su propietario, la pomada epispástica de la F. F. extendida sobre un papel.

4743. T. VEJIGATORIO.

Se concentra en una retorta la tintura alcohólica de cantáridas; cuando está muy concentrada, se la extiende por medio de un pincel y en caliente sobre tafetan estirado por medio de un bastidor. Se deja secar el tafetan y se le cubre de una segunda capa y despues de otra tercera.

4744. *Otro*, n. 2.

℞ Eter acético. . . . . ʒij (60 gr.).
Cantáridas en polvo. . ʒjß (45 gr.).

Se infunden durante ocho dias, se decanta y se disuelve:

Colofonia. . . . . ʒij (8 gr.)

Se aplica sobre un hule.

4745. *Otro* (COLDEFY-DORLY).

℞ Manteca fresca. . . . . ʒjv (125 gr.).
Cera blanca lavada en agua hirviendo. . . . ʒvj (24 gr.).
Esperma de ballena. . ʒjv (16 gr.).

Se liquida á fuego lento, se mezcla exactamente y despues se añade:

Res. verde de torbisco. ʒj (12 dec.)

Se extiende una capa de esta pomada un poco caliente sobre papel de seda; se presenta el papel al fuego para que se empape, se aplican del mismo modo otras dos capas, no presentando la última vez el papel al fuego sino resbalando, para que fundiéndose solo la superficie adquiera un lustre que indique el lado por el cual debe aplicarse.

Nota. Coldefy-Dorly prepara dos papeles vejigatorios, núm. 1.° y núm. 2.°; el primero con ʒj (12 dec.) de resina, y el segundo solo con ɡxviij (1 gr.).

Coldefy-Dorly prepara del modo siguiente la *resina verde de torbisco.*

Corteza de torbisco. lbvj (3000 gr.).

Se machaca esta corteza en un mortero de hierro, humedeciéndola con alcohol hasta que presente una masa sedosa sin aspecto de corteza; se pone esta masa en baño maria con

Alcohol á 36°. . . lbvjß (3250 gr.).

Se calienta casi hasta la ebullicion, despues se deja enfriar casi completamente y se exprime con fuerza. Se repite la maceracion segunda y aun tercera vez con nuevo alcohol, disminuyendo cada vez dos cuartillos; se reunen y se filtran las tinturas; se destilan las tres cuartas partes del alcohol en el baño maria, se aparta del fuego, se deja enfriar un instante, se filtra y se pone á parte el producto; se reduce el líquido colado á cerca de las tres cuartas partes por la ebullicion; despues se deja enfriar, se decanta y se arroja el líquido; se pone el precipitado en un frasco con dos ó tres onzas de éter hidrático y se agita; se trata del mismo modo la resina que ha quedado sobre el filtro, se repite la locion hasta que el éter no se tiña ya de verde, se reunen las tinturas y se las evapora lentamente en el baño maria.

4746. P. VEJIGATORIO *ó Vejigatorio de Trousseau.*

Se empapa un papel de filtros del grandor y forma del vejigatorio que se quiere establecer en extracto etéreo de cantáridas, y se evapora hasta la consistencia de jarabe. Se aplica sobre un pedazo de espadrapo, cuyos bordes so-

bresalgan un poco de la circunferencia del papel de filtros. A las siete ó diez horas de la aplicacion se levanta la epidermis. Esta clase de vejigatorio produce buenos efectos.

PASTAS.

4747. PASTA DE ALMENDRAS.

℥ Alm. dulc. en polvo.	lbij (1000 gr.).
Harina de arroz. . .	℥jv (125 gr.).
Lirio de Florencia. .	℥jv (125 gr.).
Anacardo en polvo,	
Jabon en polvo, ää.	℥j (30 gr.).
Esencia de rosas. .	c. s.

Mézclese exactamente. Se usa como cosmético.

4748. P. DE ALMENDRAS ó *Linimento amigdalino.*

℥ Almendras dulces. .	℥ix (270 gr.).
Piñones dulces. . . .	℥iij (90 gr.).

Se machacan y se añade á la masa:

Yemas de huevo. . . .	número 6.

I. Sirve para mantener suave la piel y preservarla de grietas.

4749. *Otra* (FRAQUER).

℥ Goma.	℥ij (60 gr.).
Miel blanca.	℥vj (180 gr.).

Se mezclan en un mortero de mármol y se añade:

Jabon blanco de potasa y neutro. . .	℥iij (90 gr.).

Hecha la mezcla se incorpora poco á poco:

Aceite de almendras.	lbij (1000 gr.).
Yemas de huevo. . .	número 5.
Leche de pistachos preparada con agua de rosas. . . .	℥jv (125 gr.).

Si se quiere que tenga mas color verde, se añade aceite cargado de clorofila de espinacas. Se aromatiza con ʒß (2 gr.) de esencia de almendras amargas por lbj (500 gr.).

Es un jabon cosmético.

4750. P. DE ALMENDRAS PARA LAS MANOS.

℥ Almendras.	1500
Harina de arroz.	250
Lirio.	250
Benjuí.	60
Sal de tártaro.	60
Esperma de ballena.	60
Esencia de espliego.	3
Esencia de clavo.	3
Esencia de palo de Rodas. . . .	3

Mézclese.

4751. P. ALUMINOSA ACETICA (*Lefoulon*).

℥ Alumbre en polvo,	
Goma arábiga, ää. . .	ʒijß (10 gr.).
Eter acético.	ʒß (2 gr.).
Albúmina,	
ó Mucílago.	c. s.

para hacer una pasta con la que se llene la cavidad del diente cariado, su cuello y el intervalo que le separa de los inmediatos.

4752. P. AMIGDALINA (*Vée*).

℥ Almendras dulces mondadas. . .	600
Almendras amargas.	60
Azúcar real.	600
Agua destil. de flor de naranjo.	180

Se machacan las almendras y el azúcar en un mortero de mármol, añadiendo poco á poco el agua de flor de naranjo; luego que todo se haya reducido á una pasta grosera, se la acaba de moler en una piedra de chocolatero hasta que esté bien homogénea; se la conserva en pucheros cubiertos de azúcar en polvo y una hoja de estaño.

Vée propone esta preparacion para preparar al momento looc y emulsiones, evitando que se enrancien las almendras.

Para hacer un looc se toma

De esta preparacion. .	℥ij (60 gr.).

Agua comun. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se disuelve la pasta en el agua, se cuela y se obtiene al punto una emulsion, y se desarrollará el mucílago triturándola con

Goma trag. en polvo. ℊxjv (7 dec.).
Azúcar. . . . . ℊxc (5 gr.).

Para preparar el looc de la F. F. se reduce la proporcion de la pasta á ℥jß (50 gr.), y se añade ℥ß (10 gr.) de aceite de almendras dulces y ℊxvj (8 dec.) de goma tragacanto. Finalmente el uso de esta pasta abrevia y regulariza la preparacion del looc.

4753. *Otra* (MANGOLI).

℞ Almendras dulces. . . ℥vj (180 gr.).
Almendras amargas. . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).
Goma arábiga. . . . . lbj (500 gr.).
Azúcar blanca. . . . . lbj (500 gr.).
Agua de flores de naranjo. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥j (30 gr.).
Claras de huevo. . . . número 6.

Se hace una emulsion con las almendras y el agua, y en ella se disuelve la goma y despues el agua; evaporada la mezcla convenientemente se añaden las claras de huevo, batidas con las aguas aromáticas.

Esta fórmula da una pasta pectoral agradable.

4754. P. ANTIODONTALGICA (*Duerr*).

℞ Extracto de beleño. . . ʒj (4 gr.).
Extracto de belladona, Alcanfor en polvo, ää. ℊvj (3 dec.).
Opio puro en polvo. . ʒß (2 gr.).
Tintura volátil de guayaco. . . . . ℥ij (24 dec.).
Alcoholado de cantár. 8 gotas.
Aceite de cajeput. . . . 15 gotas.

I. Odontalgia por caries. *D.* Se llena la cavidad del diente.

4755. *Otra* (*Duerr*).

℞ Opio. . . . . ℊv (25 cent.).
Aceite de clavo. . . . 8 gotas.
Extracto de beleño. . ℊv (25 cent.).
Extracto de belladona. ℊjx (50 cent.).
Pelitre. . . . . c. s.

H. S. A. una pasta consistente que se introduce en el diente cariado.

I. Dolores de muelas.

4756. P. DE APIO.

℞ Raiz fresca de apio. . lbß (250 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se hierve ligeramente, se cuela por un lienzo y se añade:

Goma en polvo. . . . . lbj (500 gr.).
Azúcar. . . . . lbß (250 gr.).

Se funde, se cuela y se evapora del mismo modo que la pasta de azufaifas.

4757. P. ARSENICAL DE FRAY COSME.

℞ Arsénico blanco. . . ℊvj (3 dec.).
Cinabrio. . . . . ℊxxx (15 dec.).
Esponja calcinada. . ℊxv (75 cent.).

Se pulveriza; se diluye el polvo en un poco de agua hasta formar una masita clara; se la extiende con un pincel sobre las superficies ulceradas, teniendo cuidado de emplear mediana cantidad, pues es mejor repetir la operacion que exponerse á grandes absorciones, y se cubre despues con un poco de agárico mojado. Este agárico se despega á los diez, quince, veinte ó treinta dias, algunas veces mas tarde y se desprende con la escara. Soberville cura la escara con la pomada amarilla de Fray Cosme.

℞ Cera amarilla. . . . . ℥j (32 gr.).
Aceite rosado. . . . . ℥jß (48 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxv (75 cent.).
Extracto de Saturno. ℥v (160 gr.).

Se aplica esta pomada extendida en un lienzo hasta que la úlcera se cubra de una capa blanquecina. Si vuelven á aparecer fungosidades se aplica nuevamente la pasta, y se repite las veces que sea necesario hasta que se destruya completamente el cáncer.

Es muy importante, cuando la ulcera tiene mas de quince líneas cuadradas, dividir el tratamiento para no exponerse á la absorcion, y no cauterizar nueva porcion hasta que no se haya caido la primera escara. Además cuando los bordes son callosos, se los avivará aplicándoles un vejigatorio, porque el cáustico solo obra sobre carnes vivas y húmedas.

4758. P. ARSENICAL PARA DESTRUIR LOS ANIMALES DAÑINOS.

2° Sebo fundido.	1000
Harina de trigo.	1000
Acido arsenioso en polvo fino.	100
Negro de humo.	10
Esencia de anis.	1

Se funde el sebo á fuego lento y se añaden las demás sustancias.

Se usa sola ó mezclada con partes iguales de pan desmenuzado ó cualquier otra sustancia que apetezcan los animales que se quiera destruir.

4759. P. DE AZUFAIFAS (F. F.).

2° Azufaifas.	lbj (500 gr.).
Goma arábiga. . . .	lbvj (3000 gr.).
Azúcar blanca. . . .	lbv (2500 gr.).
Ag. de flor de naran.	℥vj (192 gr.).

Se hierven las azufaifas durante media hora en lbjv (2000 gr.) de agua, se cuela el líquido con expresion, se deja aposar y se decanta.

Por separado, se lava dos veces la goma en agua fria y despues se añade lbviij (4000 gr.) de agua fria, se disuelve en frio y se cuela sin expresion. Se pone en un perol el cocimiento de azufaifas y el azucar, y se clarifica con tres ó cuatro claras de huevo; entonces se añade la solucion de goma y se calienta, teniendo cuidado de menear sin cesar con una espátula de madera; inmediatamente que hierva el líquido se deja de menear y se mantiene una ebullicion lenta; cuando la pasta haya adquirido la consistencia de un extracto blando, se añade el agua aromática, se saca el perol del fuego, entonces se mete el perol dentro de otro lleno de agua hirviendo, y pasadas doce horas se quita la espuma espesa que se ha formado en la superficie y se echa la materia en moldes de hoja de lata, cuya superficie se haya frotado con un poco de mercurio. Se continúa la evaporacion en la estufa á la temperatura de 40°; se vuelve la pasta en los moldes luego que está bastante consistente, y se la deja en la estufa hasta que haya adquirido la consistencia conveniente.

El uso del mercurio para frotar la superficie interior de los moldes tiene el inconveniente de gastar un metal muy caro y peligroso y de desgastar los moldes: en general se prefiere darles de aceite, y entonces se tiene cuidado de limpiar muy bien el aceite pegado en la superficie de las pastillas cuando se las saca.

I. Bronquitis agudas y crónicas.

Del mismo modo se prepara la *Pasta de dátiles*.

4760. P. DE BOFES DE TERNERA.

2° Bofes de ternera. . .	℥xij (375 gr.).
Goma aráb. entera. .	lbij (1000 gr.).
Azúcar blanca.	lbj (500 gr.).
Cloruro de sodio. . .	ℊxviij (1 gr.).
Ag. de flor de naranj.	℥x (40 gr.).
Esencia de limon. . .	2 gotas.

Se corta los pulmones en pedazos, se los machaca, se los coloca en un puchero con sal y agua, se los cuece á fuego lento durante doce horas, se cuela y se exprime. Se lava la goma, se la funde en caldo, añadiendo agua si es necesario; se cuela por un lienzo apretado, se deja aposar durante media hora, se decanta para se-

parar las arenillas, se añade el azúcar, se cuece hasta la consistencia conveniente, se echa en moldes de hoja de lata dados de aceite y se calienta en la estufa.

4761. P. DE CARACOLES (*Figuier*).

℞ Caracoles sin conchas ni intestinos. . . . . ℥iij (96 gr.).
Azúcar blanca . . . . . lbj (500 gr.).

Se machacan los caracoles con el azúcar para obtener una pasta muy fina, que se dividirá perfectamente sobre una piedra de chocolatero, y se la pasa por un tamiz muy fino. Por separado se funde:

Goma arábiga blanca. lbj (500 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se cuela y se evapora en el baño maría hasta la consistencia de jarabe. Entonces se añade la mezcla de los caracoles y el azúcar, y seis claras de huevo batidas con cuidado en ℥jß (48 gr.) de agua de flores de naranjo. Se acaba la evaporacion en el baño maría hasta la consistencia conveniente, meneando continuamente con una espátula.

I. Catarros pulmonares, tisis.

4762. P. CÁUSTICA (*Graeffe*).

℞ Deutocloruro de mercurio. ℥ij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo,
Agua destilada, ãã. . ℥xviij (4 gr.).

M. I. Callosidad de las úlceras fistulosas. *D.* C. s. para aplicarla ligeramente.

4763. P. CÁUSTICA *ó Pasta cáustica de sulfato de cobre* (*Payan*).

℞ Sulfato de cobre en polvo. . . c. s. q.
Yema de huevo. . . . . c. s.

H. S. A. una pasta blanda.

Segun Payan este cáustico produce su efecto en cuatro ó cinco horas, y se cura la escara sin dejar cicatriz.

I. Manchas de la piel, lunares, y como revulsivo.

Se hace un polvo que se aplica como el polvo de Viena, y se le quita á los cuatro ó cinco minutos.

4764. P. PARA CAUTERIZAR LAS MUELAS CARIADAS.

℞ Alumbre en polvo,
Cal pura, ãã. . . . . ℥ß (2 gr.).
Éter nítrico. . . . . ℥ij (8 gr.).
Almáciga. . . . . c. s.

H. S. A. una pasta líquida con que se cubre un pedacito de yesca ó algodon que se introduce en el agujero de la caries, despues de haberle limpiado con un estilete y secado con un poco de algodon. Esta pasta tiene la ventaja de tener el mismo color que el diente, por lo que es poco visible.

4765. P. CONTRA LA EPIDIDIMITIS (*Desruelles*).

℞ Harina de linaza,
Tormentila en pol., ãã. ℥jv (125 gr.).
Ungüento mercurial. . ℥j (30 gr.).
Extracto de belladona. ℥j (4 gr.).
Aceite de cañamones. c. s.

H. S. A. una pasta que se extiende en un lienzo y se aplica al testículo enfermo.

Se renueva tres ó cuatro veces en las veinticuatro horas, y por las mañanas se toma un baño de asiento con agua de jabon negro.

Es un medio seguro y cómodo.

4766. P. CONTRA LOS SABAÑONES (*Swediaur*).

℞ Almendras amargas mondadas y molidas. lbß (250 gr.).
Miel pura. . . . . ℥vj (180 gr.).
Alcohol saturado de alcanfor,
Harina de mostaza negra, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
Alumbre fundido,
Incienso en polvo, ãã. ℥ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbß (250 gr.).
Yemas de huevo. . . . número 8.

H. S. A. *I.* Sabañones no ulcerados, sarna, pian. *D.* C. s. para frotar mañana y noche las partes enfermas, y lavar despues estas últimas con un poco de agua tibia.

4767. P. DENTIFRICA.

℞ Carbon vegetal.	℥j (30 gr.).
Clorato de potasa. . . .	ʒß (2 gr.).
Agua destilada de menta.	c. s.

Se limpia la boca con estos polvos y no se enjuagará hasta el dia siguiente con el cepillo empapado en la mezcla siguiente:

Aguardiente.	℥jv (125 gr.).
Agua de menta. . . .	℥jv (125 gr.).
Cloruro de sodio. . . .	1 cucharada.

4768. P. DEPILATORIA *ó Rusma de los turcos.*

℞ Cal viva.	40
Oro pimente.	5

Se pulveriza y se diluye en

Yema de huevo y lejía de jaboneros.	c. s.

Se aplica sobre las partes de que se quiere quitar el vello. Se deja secar lentamente y se lava con mucha agua.

Bandelocque usaba esta pasta contra la tiña y principalmente contra la estiomena.

4769. P. DEPILATORIA *ó Epilatorio de Plenck.*

℞ Cal viva.	12
Almidon.	10
Sulfuro amarillo de arsénico. . .	1

M. S. A. un polvo muy fino, que se reduce á pasta clara con c. s. de agua.

I. Tiña, favus. *D.* Se aplica esta pasta sobre la parte del cuerpo en que se quiere quitar el vello, y luego que está seca se la quita con agua tibia.

4770. P. DEPILATORIA.

℞ Oro pimente.	1
Cal viva.	16
Almidon.	10

Se reduce á polvo fino, se mezcla y guarda el polvo en una vasija bien tapada.

Se usa haciendo una pasta con este polvo y un poco de agua, y extendiéndola sobre las partes cubiertas de vello, se las deja secar lentamente y se lava despues con agua.

4771. P. DEPILATORIA *ó Epilatorio de Colley.*

℞ Cal viva.	℥j (30 gr.).
Nitro.	ʒj (4 gr.).
Lejía de jaboneros. .	℥jv (125 gr.).
Oropimente.	ʒiij (12 gr.).
Azufre.	ʒj (4 gr.).

Se evapora hasta la consistencia conveniente.

4772. P. O CERA PARA LOS DIENTES CARIADOS.

℞ Cera blanca.	ʒij (8 gr.).
Almáciga.	ʒj (4 gr.).
Aceite de almendras. .	ʒiij (12 gr.).
Opio puro.	gij (40 cent.).
Aceite de clavo. . . .	12 gotas.
Cochinilla.	gviij (4 dec.).

Se mezclan y se forman barritas del grosor de una pluma de escribir y se envuelven en un papel.

4773. P. ESCILITICA PARA DESTRUIR LOS RATONES (*Clommesny*).

℞ Escila en polvo. . . .	℥ij (60 gr.).
Queso oloroso. . . .	lbß (250 gr.).

M. S. A. Es un excelente medio para destruir las ratas y ratones. Tiene muchísima reputacion en Argél.

4774. P. ESCARÓTICA *ó Pasta de cloruro de zinc* (*Canquoin*).

℞ Cloruro de zinc.	50
Harina de trigo.	100

Se mezcla el cloruro reducido á polvo fino con la harina, y se añade bastante cantidad de agua para obtener una pasta muy sólida, que se extiende sobre un mármol con un rollo en capas del grosor de media á cuatro líneas, segun el grosor de la escara que se quiere obtener. Se conoce con el nombre de pasta número 2, la que

contiene tres partes de harina; pasta número 3, la que contiene cuatro partes de harina; y pasta número 4, la que contiene cinco partes de harina por una de cloruro. Generalmente se emplea el número 1.º Se corta la pasta de la forma de la escara que se quiere obtener, y se la aplica sobre la parte desnuda de la epidermis; excita al cabo de algunos minutos un calor doloroso, que llega á producir hasta la sensacion de una quemadura. La escara producida por esta pasta cae del octavo al décimo dia. Es blanca, muy dura y gruesa. Este cáustico es muy cómodo, pero muy doloroso.

I. Tisis, carcinoma de la cara, tumores cancerosos, lupus.

Añadiendo un poco de cloruro de antimonio, la pasta toma la consistencia de cera blanda y se amolda muy bien á las partes.

En los casos en que hay que aplicarla sobre tumores cancerosos desiguales, se usa con preferencia la siguiente:

Cloruro de antimonio.	1
Cloruro de zinc.	2
Harina.	3

Se aumenta ó disminuye la cantidad de harina, segun se desee que sea mas ó menos activa.

4775. P. FOSFORADA PARA DESTRUIR LOS ANIMALES DAÑINOS.

Se ponen en un puchero nuevo trescientas partes de harina de trigo; se vierte encima mil partes de agua hirviendo, agitando por medio de una espátula de madera; por otra parte se ponen seis partes de fósforo fundido en c. s. de agua caliente; se decanta de modo que solo quede un poco de esta cuando esté fundido; se hace un agujero en la pasta aun caliente y se echa el fósforo fundido, agitando suavemente, pero despues con mas velocidad hasta obtener una pasta en que el fósforo esté muy bien dividido.

Se extiende una capa delgada de esta mezcla sobre rebanadas de pan, que se colocan en los puntos en que hay ratones. V. n. 4758.

4776. P. DE GELATINA DE CUERNO DE CIERVO (*Mouchon*).

℞ Sacarol. de cuerno de ciervo. . . .	Ibij (1000 gr.).
Goma arábiga. . .	Ibij (1000 gr.).
Jarabe simple. . .	Ibjß (750 gr.).
Ag. de flor de nar.	Jbß (250 gr.).
Agua comun. . . .	Ibjvß (2250 gr.).

Se prepara como la pasta de liquen.

4777. P. DE GOMA ARÁBIGA, *llamada de malvabisco* (F. F.).

℞ Goma arábiga blanca.	Ibj (500 gr.).
Azúcar blanca. . . .	Ibj (500 gr.).
Agua comun.	Ibß (250 gr.).
Ag. de flor de naranjo.	℥ij (64 gr.).
Claras de huevo. . . .	número 6.

Se limpia la goma raspándola con un cortaplumas de todas las impurezas que pueda tener pegadas en su superficie; se la contunde y se la pasa por un tamiz de cerda; se la disuelve en el agua al calor del baño maría y en un perol plano; se añade el azúcar y se hace evaporar siempre en el baño maría, meneando continuamente hasta la consistencia de miel espesa. Por separado se baten las claras de huevo con el agua de flores de naranjo hasta que se reduzcan á una espuma blanca, ligera y voluminosa; se las añade entonces por partes á la pasta de goma que estará al fuego y que se meneará con velocidad: despues que se han echado todas las claras de huevo en la pasta, se continúa agitando para facilitar la evaporacion, y cuando la pasta haya adquirido tal consistencia que no se adhiera aplicándola con la espátula en el dorso de la mano, se la echa so-

bre una mesa ó en cajas cubiertas de almidon.

I. Catarros bronquiales ligeros y afecciones agudas leves de los órganos digestivos.

4778. P. DE LACTUCARIO.

℞ Masa de pasta de azufaifas.	lbij (1000 gr.).
Extracto alcohólico de lactucario. . . .	ʒxviij (1 gr.)
Tintura de bálsamo de Tolú.	ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Bronquitis. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

4779. P. DE LIQUEN (P. F.).

℞ Liquen islándico. . .	lbj (500 gr.).
Goma arábiga. . . .	lbv (2500 gr.).
Azúcar blanca. . . .	lbjv (2000 gr.).

Se pone el liquen en un perol con c. s. de agua, y se calienta casi hasta que hierva; se arroja el líquido y se hierve el liquen con nueva agua por una hora, se cuela con expresion, y en el líquido colado se echa la goma arábiga y el azúcar, las que se disuelven y evaporan hasta la consistencia de pasta muy firme: entonces se echa en un mármol untado ligeramente de aceite y cuando está fria se limpia con esmero para quitar el aceite, que pudiera tener adherido, y se guarda en cajas.

Si á estas cantidades se añade ʒj (4 gr.) de extracto de opio, se tendrá la pasta de liquen opiada, que contiene ɡß (25 mil.) de extracto por onza.

Esta pasta tiene las propiedades tónicas del liquen y conviene en las mismas circunstancias que él.

I. Catarros pulmonares crónicos, tisis. *D.* ʒß á ʒj (15 á 30 gr.) en las veinticuatro horas.

4780. P. DE LIQUEN OPIADA (*Henri*).

℞ Azúcar, Goma arab., ää.	lbviijß (4250 gr.).
Liquen islándico.	lbij (1000 gr.).
Ag. de fl. de nar.	lbj (500 gr.).
Extracto acuoso de opio.	ʒij (8 gr.).

H. S. A. *Nota.* La cantidad de opio es cerca de ɡß (25 mil.) por onza.

I. Catarros pulmonares crónicos, tisis, etc. *D.* La misma que la anterior.

4781. P. MAGNESIANA FERRUGINOSA (*Maurat*).

℞ Magnesia calcinada, Peróxido de hier., ää.	ʒjß (50 gr.)
Agua.	c. s.

H. S. A. *I.* Se aplica en los puntos en que la orina humedece y desorganiza la piel en los casos de incontinencia de orina.

4782. P. DE MALVABISCO (P. A.).

℞ Raiz de altea.	ʒiv (125 gr.).
Agua.	lbx (5000 gr.).

Se hierven hasta que se reduzcan á lbjx (4500 gr.), se cuela y se añade:

Goma aráb. en polvo.	lbij (1000 gr.).
Azúcar muy blanca.	lbij (1000 gr.).

Se evapora á fuego suave, agitando continuamente con una espátula de madera hasta que se espese el jarabe; despues de apartado del fuego, se mezcla agitando continuamente y con violencia:

Claras de huevo frescas, agitadas hasta que formen espuma, núm.	12.

Se espesan despues á fuego lento, agitando siempre, hasta que la masa no se pegue á los dedos, y entonces se añade:

Agua de flor de naranjo.	ʒij (60 gr.).

Téngase aun al fuego un poco tiempo; se saca la masa y se guarda espolvoreándola con almidon.

4783. P. DE MANÁ ó *Pasta de Calabria.*

℞ Goma arábiga. . . .	lbiij (1500 gr.)
Maná en lágrimas. .	ʒxij (375 gr.).
Azúcar.	lbij (1000 gr.).
Agua.	c. s.

Se prepara como la de azufaifas y al fin se aromatiza con

Digesto de báls. de Tolú. ℥iij (96 gr.).

4784. P. PARA MATAR LOS RATONES.

℞ Fósforo en pedacitos. . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (60 gr.).

Se pone todo en un frasco y se le sumerge en un baño maria. Luego que se ha liquidado el fósforo se le agita y se le deja enfriar. Se echan despues en un mortero los globulitos de fósforo y se los mezcla con ℥jß á ℥iij (50 á 100 gr.) de tocino; se tritura entonces la mezcla con violencia, se añade agua y lbß (750 gr.) de harina y cerca de ℥jß (50 gr.) de azúcar en polvo. Se divide esta pasta en bolitas del volúmen que se quiera.

La cantidad de azúcar que se añada debe variar, y debe ser mayor para los ratones que para otros animales.

4785. P. DE MUSGO MARINO.

℞ Musgo marino. 1
Goma arábiga. 8
Azúcar. 8

Se hierve dos veces en agua el musgo marino, se disuelve en el liquido la goma y el azúcar y se prepara una pasta como se hace la de azufaifas.

4786. *Otra* (MOUCHON).

℞ Musgo marino. . ℥jv (125 gr.).
Agua. . . . . lbxxjv (12000 gr.).

Se hierve primero en lbxvj (8000 gr.) de agua, y despues en el resto; se añade á los liquidos reunidos:

Goma arábiga blanca. lbij (1000 gr.).

Se funde, se cuela y se añade:

Azúcar. . . . . lbij (1000 gr.).

Se prepara el resto como la de azufaifas.

4787. P. OPIADA (*Tanchon*).

Se digiere durante veinticuatro horas á un fuego moderado (24° ó 25°) una dosis de opio impuro en pedazos, en c. s. de agua para obtener un caldo espeso.

Se cubre las ulceras cancerosas con una capa de una linea de esta preparacion, una ó dos veces al dia, y se coloca encima un pedazo de papel de cola o un hule para impedir que se evapore. Debe vigilarse mucho el uso de este medicamento.

4788. P. PECTORAL (*Parmentier*).

℞ Goma arábiga. . . . lbij (1000 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se disuelve y se añade:

Azúcar de uva. . . . ℥xxx (900 gr.).

Se evapora hasta la consistencia de jarabe espeso, y se añade:

Agua de flor de naranjo. . . . . ℥xc (5 gr.).

Se funde la goma en el agua, se añade el azucar de uva, se evapora hasta la consistencia de jarabe muy espeso, se aromatiza con agua de flor de naranjo y se distribuye este jarabe en moldes de hoja de lata, que se colocan en una estufa para acabar la evaporacion y dar la consistencia de pasta.

I. Flegmasias, catarro agudo, gastritis, gastro-enteritis, neumonía, pleuresía. *D.* ℥ß á ℥ij (15 á 60 gr.).

4789. P. PECTORAL BALSAMICA.

℞ Dátiles,
Azufaifas, ää. . . . ℥jv (125 gr.).

Se hierve durante una hora en c. s. de agua para obtener lbviij (4000 gr.) de liquido colado. Se vierte hirviendo sobre:

Flores de amapola. ℥jv (125 gr.).

Se cuela y se disuelven en el liquido:

Azúcar. . . . . lbv (2500 gr.).
Goma arábiga. . . . lbj (3000 gr.).

Se evapora en el baño maria hasta la consistencia de jarabe. Entonces se añade:

Bálsamo de Tolú. . 5ij 12 gr.
disuelto en:
Alcohol. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se mezclan, se vierte la mezcla en moldes de hoja de lata y se acaba la evaporacion en la estufa. Esta pasta conviene en la bronquitis y en otras afecciones del pecho. Puede reemplazar la pasta de Regnault.

4790. P. PECTORAL BALSÁMICA (*Regnault*).

℞ Cuatro flores pectorales . . . . . Ʒij (500 gr.).
Goma arábiga. . . . lbvj (3000 gr.).
Tintura de bálsamo de Tolú. . . . . 5vj (24 gr.).
Agua. . . . . lbiij (1500 gr.).

Se prepara del mismo modo que las demás pastas, y se deberá añadir lbv (2500 gr.) de azúcar.

Bouchardat propone que se añada gr½ (1 cent.) de extracto gomoso de opio por ℥j (30 gr.) de pasta.

I. Asma, catarro, bronquitis, gastritis, neumonía, pleuresía y otras flegmasias agudas.

4791. P. PECTORAL BALSÁMICA (*Baudry*).

℞ Goma arábiga. . . . lbvj (3000 gr.).
Azúcar blanca. . . . lbjv (2000 gr.).
Tridacio. . . . . 5ij (8 gr.).
Azúcar en terrones. ℥j (32 gr.)
Bálsamo de Tolú. . . 5x (40 gr.).
Agua de flor de naranjo . . . . . ℥vj (192 gr.).
Esencia de limon. . 4 gotas.
Claras de huevo. . . núm. 4.
Extracto de regaliz. 5x (40 gr.).

U. S. A. El extracto de regaliz debe prepararse con palo de regaliz por maceracion y en frio, y se espesa despues en baño maría hasta la consistencia necesaria.

I. Catarro, asma, coqueluche, bronquitis, gastritis, neumonía, pleuresía y otras enfermedades agudas. *D.* Diez á veinte pedazos al dia.

4792. P. PECTORAL DE BOFES DE TERNERA (*Pablo Gage*).

℞ Jalea de liquen.
Jarabe de bofes de ternera, ãã. . . . ℥xx (625 gr.).
Jarabe de moras.
Azúcar, ãã. . . . . ℥xij (375 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . 5ij (8 gr.).
Tridacio. . . . . ℊ.jv (3 gr.).
Extr. de ipecacuana. ℈ß (2 gr.).
Goma. . . . . lbv (2500 gr.).

U. S. A. una pasta que se corta en pedazos.

I. Asma, catarro, bronquitis, neumonía, tisis y otras flegmasías agudas. *D.* Diez á veinte pedazos en el dia.

4793. *Otra* (DEGENETAIS).

℞ Pulmon de ternera. lbij (1000 gr.).

Se echa los bofes de ternera en lbvj (3000 gr.) de agua hirviendo para lavarlos, se los pone despues con lbxjv (7 quil.) de agua, se los cuece á fuego lento durante cerca de seis horas en baño maría de estaño, y se cuela este cocimiento. Por otra parte se hierve durante una hora:

Higos grasos,
Dátiles,
Azufaifas, ãã. . . . . lbj (500 gr.)
en lbvj (3000 gr.) de agua, se cuela y se añade:
Jar. de adorm. blanc. lbj (500 gr.).
Goma arábiga. . . . lbvj (3000 gr.).
Azúcar cande. . . . lbiij (1500 gr.)
Bálsamo de Tolú. . . ℥jv (125 gr.).

Se reune todo y se reduce hasta casi la consistencia de pasta, se añade al fin:
Ag. de fl. de naranjo. ℥ij (96.6 gr.).
Tintura de vainilla. . 5j (3.82 gr.)
y algunas claras de huevo bien batidas en agua de flores de naranjo.

Se ha vendido este remedio con el nombre de *tesoro del pecho*, y en el privilegio de perfeccion se ha suprimido el jarabe de adormideras, y acaso se le ha susti-

tuido por una preparacion de opio. Bouchardat se inclina á creer que no contiene los bofes de ternera. (*Con privilegio.*)

4794. PASTA DE REGALIZ BLANCA.

℞ Raiz de regaliz raspad.	℥ij (64 gr.).
Goma arábiga.	℔j (500 gr.).
Azúcar blanca.	℔j (500 gr.).
Ag. de flor de naranjo.	℥ij (64 gr.).
Claras de huevo. . . .	número 6.

Se prepara del mismo modo que la pasta de goma, sirviéndose de la infusion de regaliz en lugar del agua para disolver la goma.

4795. P. DE REGALIZ PARDA (F. F.).

℞ Zumo de regaliz. . .	℥iij (96 gr.).
Goma arábiga. . . .	℔ij (1500 gr.).
Azúcar.	℔ij (1000 gr.).
Agua comun . . .	℔v (2500 gr.).
Extracto de opio. .	ℊxviij (1 gr.).

Se disuelve el zumo de regaliz en agua, se añade al líquido colado por la manga la goma arábiga mondada y lavada, se funde en el baño maría, se añade el azúcar y despues la solucion de opio, se evapora agitando continuamente, y cuando la pasta está cocida, se la echa sobre un mármol untado de aceite.

I. Catarros secos, convulsivos, afecciones ligeras de pecho acompañadas de tos.

4796. P. DE REGALIZ NEGRA (F. F.).

℞ Zumo de regaliz. . .	℔j (500 gr.).
Goma arábiga. . . .	℔ij (1000 gr.).
Azúcar.	℔j (500 gr.).
Agua.	℔jv (2000 gr.).

Se disuelve el zumo de regaliz en el agua fria y se cuela por una manga; se usa este líquido para disolver la goma y el azúcar, se le cuela otra vez sin dejar de agitar, se hace evaporar sobre un fuego suave hasta la consistencia de extracto de píldoras, se echa la masa en una piedra de mármol dada de aceite y se la divide en tiras que se cortan despues transversalmente en pedazos con las tijeras y se secan al sol ó en la estufa. Se puede aromatizar esta pasta agitándola dentro de un frasco en que se echan veinticuatro gotas de un aceite esencial, ó incorporándola ʒj (4 gr.) de polvo de lirio de Florencia.

I. Romadizos y catarros. *D.* ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).

4797. P. RUBEFACIENTE (*Clarus*).

℞ Acetato de plomo . . .	℥j (30 gr.).
Sulfato ácido de potasa.	℥iij (90 gr.).
Agua.	c. s.

Esta pasta es muy rubefaciente.

4798. P. PARA TEÑIR EL PELO DE NEGRO.

℞ Cal viva en polvo.	120
Litargirio en polvo.	80
Infusion de salvia.	280

Se hace una papilla con esta mezcla, se aplica la pasta cinco ó seis horas sobre el pelo, al que se lavará antes con una solucion de alumbre; cuando se quita la pasta se lava la cabeza con agua de salvado.

4799. P. PARA ENNEGRECER LOS CABELLOS.

℞ Nitrato de plata,	
Protonitrato de mercurio, ää.	℥ß (15 gr.).
Agua destilada. . . .	℥jvß (135 gr.).

Se disuelve, se filtra y se lava el depósito con c. s. de agua destilada, para obtener ℥vß (165 gr.) de solucion.

Se hace una pasta líquida con esta solucion y c. s. de almidon, y con ella se cubren los cabellos con precaucion. Se hace la operacion por la noche y se cubre la cabeza con un gorro de hule; al dia siguiente por la mañana se lava la cabeza, y despues se aplica una pomada ó un aceite cosmético. Esta preparacion no daña á la sustancia de los cabellos.

PASTILLAS. TABLETAS.

4800. PASTILLAS ABSORVENTES (*Chevallier*).

℞ Chocolate. . . . . ʒij (60 gr.).
Azúcar. . . . . ʒv (150 gr.).
Magnesia pura. . . . ʒj (30 gr.).

Se hace una pasta con estas sustancias por medio del mucilago de goma tragacanto, que se puede aromatizar segun se quiera, y se divide la masa en pastillas de gxiij, gxvj ó gxx (4, 8 ó 10 dec.) segun que se quiera que contengan gj, gij ó giij (5, 10 ó 15 cent.) de magnesia.

I. Agrios de estómago. *D.* Varia segun la cantidad de magnesia que se quiera administrar.

4801. TABLETAS DE ACEITE DE CROTON TIGLIO.

℞ Aceite de croton tiglio. cinco gotas.

Se le divide en un mortero de porcelana con

Almidon. . . . . ʒj (12 dec.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).

Se incorpora todo en

Chocolate con vainilla. ʒij (8 gr.).

Se mezcla exactamente y se preparan treinta píldoras, que se aplastan ligeramente sobre una lámina de hoja de lata calentada. Cada tableta contiene un sesto de gota de aceite de croton tiglio. Se necesitan de seis á doce para obtener una abundante purgacion.

I. Estreñimiento, lombrices.

4802. T. DE ACEITE DE TÁRTAGOS (*Bally y Cadet*).

℞ Chocolate con vainilla. ʒij (8 gr.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
Almidon. . . . . ʒj (12 dec.).
Canela en polvo. . . . gx (5 dec.).
Aceite de tártagos. . . . 30 gotas.

Se tritura el aceite con el azúcar y el almidon, y se le incorpora con el chocolate fundido; se divide en treinta píldoras que se aplastan en tabletas con una hoja de lata calentada.

Cada pastilla contiene una gota de aceite de tártagos. Es un purgante muy cómodo.

I. Casos en que conviene purgar. *D.* Una pastilla para purgar á los niños, y tres pueden producir el mismo efecto á los adultos.

4803. P. DE ÁCIDO CÍTRICO.

℞ Acido cítrico. . . . . ʒiij (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . . lbj (500 gr.).
Esencia de limon. . . . 16 gotas.
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de gxij (6 dec.).

I. Son atemperantes y refrigerantes. *D.* Tres á cuatro al dia. Generalmente se prefieren las limonadas secas.

4804. T. DE ÁCIDO LÁCTICO (*Magendie*).

℞ Acido láctico. . . . . ʒij (8 gr.).
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).
Vainilla. . . . . gxviij (4 gr.).
Mucil. de goma tragar. c. s.

H. S. A. pastillas de á ʒß (2 gr.).

Se dan cuatro al dia en los casos de dispepsia y cálculos de fosfato de cal.

4805. T. DE ÁCIDO OXÁLICO ó *Pastillas para la sed.*

℞ Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Acido oxálico puro porfirizado. . . . . ʒij (8 gr.).
Esencia de limon. . . 20 á 30 gotas.
Mucilago de goma trag. c. s.

H. S. A. tabletas de gxij (6 dec.) de peso. Estas pastillas atraen la humedad del aire, por lo que se prefieren las de sobreoxalato de potasa.

I. Anginas, calenturas, inter-

mitentes. Se usan como refrigerantes á la dosis de seis á ocho al dia.

4806. P. ACIDULAS PURGANTES (*Delvincourt*).

℞ Escamonea de Alepo. .	gviij (4 dec.).
Tint. alcohól. de sen.	48 gotas.
Crémor de tártaro soluble.	5jß (6 gr.).
Azúcar blanca en polvo fino.	5ij (8 gr.).
Goma tragacanto. . .	gv (23 cent.).
Esencia de bergamota.	1 gota.
Ag. destil. de flor de naranjo,	
Carmin, ãã.	c. s.

para hacer con la goma un mucílago de color, que servirá despues para preparar S. A. una pasta, la cual se dividirá en ocho pastillas muy iguales.

D. Se toman por la mañana en ayunas primero tres, que se dejan deshacer en la boca; detrás se bebe una taza de caldo. Un cuarto de hora despues se repite la misma ingestion y se toman las cuatro pastillas restantes á igual intervalo, si el individuo es difícil de purgar. Comunmente bastan seis para producir abundantes evacuaciones. A los niños se les da de una á cuatro.

Nota. Se beberá poco detrás de este medicamento, para no diseminar demasiado las partes activas.

4807. T. AFRODISIACAS (*Artune*).

℞ Almizcle,	
Ambar, ãã.	5j (4 gr.).
Confeccion alquermes.	5ij (8 gr.).
Azúcar.	lbj (500 gr.).

H. S. A. tabletas de gxxjv (12 dec.).

D. Tres al dia.

4808. P. DE AGRACEJO.

℞ Azúcar.	℥vj (180 gr.).
Zumo de agracejo. . .	5j (30 gr.).

Se calienta y se hacen pastillas.

4809. P. DE ALMIDON.

℞ Almidon,	
Raiz de regaliz, ãã. .	5ß (15 gr.).
Acido benzoico. . . .	gxviij (1 gr.).
Goma arábiga,	
Azúcar, ãã.	5j (30 gr.
Esencia de limon. . .	3 gotas.

H. S. A. pastillas de gvj (3 dec.).

I. Catarro agudo, diarrea aguda. *D.* Diez á veinte al dia.

4810. T. DE ALMIDON OPIADAS.

℞ Almidon,	
Goma arabiga, ãã. .	5ß (15 gr.).
Azúcar.	5ij (60 gr.).
Extracto de opio. . . .	gix (50 cent.).
Ag. de flor de naranjo.	c. s.

H. S. A. tabletas de gxviij (1 gr.).

I. Catarro agudo, diarrea aguda, disenteria. *D.* Ocho á diez al dia.

4811. P. DE AMBAR.

℞ Ambar.	3ß (6 dec.).
Esencia de canela. . . .	6 gotas.
Almizcle.	giv (2 dec.)
Azúcar blanca.	5j (30 gr.).
Mucil. de goma tragac.	c. s.

H. S. A. cien pastillas. *I.* Ozena. *D.* Diez al dia para perfumar el aliento.

4812. P. AMIGDALINAS.

℞ Sacarolado de almendras en polvo,	
Azúcar real, ãã. . .	lbß (250 gr.).
Goma tragacanto. . .	5ß (15 gr.).
Ag. de fl. de naranjo.	5ij (60 gr.).

H. S. A. tabletas de gxij (6 dec.) que se secarán en una estufa moderadamente caliente.

4813. T. ANTICATARRALES (*Delaurier*).

℞ Ipecacuana en polvo.	78
Poligala en polvo.	78
Extracto acuoso de adormideras.	47
Esencia de canela.	c. s.
Sagú.	1000
Goma tragacanto en polvo. . . .	24

Agua de flor de naranjo. . c. s.
Azúcar en polvo. 12000
H. S. A. *Con privilegio.*

4814. T. ANTICATARRALES ó *Tabletas gomosas quermetizadas* (*Tronchin*).

℞ Azúcar blanca. . . . Ibij (1000 gr.).
Goma aráb. en polv. Ibß (250 gr.).
Extracto de regaliz por infusion. . . . ℥ij (60 gr.).
Quermes mineral,
Semillas de anis, ää. ℈jv (5 gr.).
Ext. gomoso de opio. gr xij (6 dec.).
Goma tragacanto. . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥xx (625 gr.).
H. S. A. tabletas de á gr vj (3 dec.).

I. y *D.* Se toman de seis á ocho al dia cuando se quiere excitar la expectoracion.

4815. *Otras* (VANDAMME).

℞ Acido benzóico. . . ℥ij (8 gr.).
Azúcar en polvo. . . Ibij (1000 gr.).
Lirio de Florencia. . ℥ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . ℥ij (60 gr.).
Almidon,
Agua destilada, ää. ℥jv (125 gr.)
para hacer una masa que se divide en pastillas de ℈j (12 dec.).

4816. T. ANTIESCROFULOSAS (*Pierquin*).

℞ Azúc. blanc. en polvo. ℥jv (125 gr.).
Café de Moca en polv. ℥ß (2 gr.).
Ioduro de potasio. . . ℥ijß (75 gr.).
Mucílago de goma tragacanto preparado con una fuerte infusion de café de Moca. . . . . c. s.
para quinientas tabletas, y cada una contiene gr ½ (1 cent.) de ioduro.

I. Flores blancas, bocio, amenorrea, atrofia mesentérica, infartos escrofulosos, tumores fríos, tisis tuberculosa y otras afecciones escrofulosas.

4817. T. ANTIHELMINTICAS (H. DE AL.).

℞ Sulfato de hierro. . . . ℥ß (2 gr.).
Santónico. . . . . ℥ijß (6 gr.).
Azúcar. . . . . ℥vj (24 gr.).
Mucílago de goma aráb. c. s.
H. S. A. treinta y dos tabletas.

D. Dos ó tres al dia. Esta dosis es para un niño de siete á ocho años.

4818. P. ANTIHISTÉRICAS.

℞ Azafran. . . . . ℈ß (15 gr.).
Azúcar. . . . . Ibj (500 gr.).
Goma tragacanto,
Aceite de canela,
Agua, ää. . . . . c. s.

I. Son anodinas, pectorales, diaforéticas y emenagogas.

4819. P. ANTILEUCORRÉICAS Y EMENAGOGAS (*Pierquin*).

℞ Ioduro de hierro. . . . ℥j (4 gr.).
Azafran en polvo. . . . ℈ß (15 gr.).
Azúcar. . . . . ℥vij (210 gr.).
Mucílago de goma tragacanto,
Infusion de canela, ää. . . . . c. s.
para doscientas cuarenta pastillas.

I. Leucorrea, y si está acompañada de amenorrea se puede usar además la pomada antileucorréica. *D.* Quince ó veinte al dia, y se aumenta progresivamente.

4820. T. ANTIMONIALES DE KUNKEL (F. F.).

℞ Almendras dulces. . ℥ij (64 gr.).
Azúcar. . . . . ℥xiij (407 gr.).
Semillas de cardamomo menor. . . . ℥j (32 gr.).
Canela. . . . . ℈ß (16 gr.).
Sulfuro de antimonio porfirizado. . . . ℥j (32 gr.).
Goma tragacanto. . . ℥ij (8 gr.).
Se mondan y pulverizan las almendras y el azúcar, se añaden los demás polvos y con c. s. de mucílago se hacen tabletas de á gr xviij (1 gr.). Cada una contiene gj (5 cent.) de sulfuro de antimonio.

I. Enfermedades cutáneas, reumatismo, gota, helmintiasis, infartos escrofulosos, herpes. *D.* De cuatro á diez al dia.

1821. T. APERITIVAS (*Toda*).

℞ Flores de sal amoniaco marciales. 9
Canela. 2
Azúcar. . . . . c. s.
H. S. A. tabletas de ℊv (25 cent.).
I. Amenorrea por atonía. *D.* Dos ó tres pastillas varias veces al dia.

1822. P. AROMATICAS (*Steel*).

℞ Protosulfato de hierro. 10
Tintura de cantáridas. 2
Azúcar en polvo. 100
Mucilago con agua destilada de canela. . . . . c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).
I. Anafrodisia, astenia. *D.* Una tableta al dia.

1823. P. DE AZAFRAN.

℞ Sacarolado de azafran. . 3j (4 gr.).
Mucilago. . . . . c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxvj (8 dec.)

1824. T. DE AZUFRE (F. F., F. P.)

℞ Azufre lavado. . . . . ℥ij (64 gr.).
Azúcar en polvo. . . . Ibj (500 gr.).
Mucilago de goma tragacanto hecho con agua de rosas. . . . . c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.) y cada una contendrá ℊij (1 dec.) de azufre.
I. Afecciones epsóricas, herpes, bronquitis crónica. Convienen principalmente para los niños que repugnan las aguas y demás preparaciones sulfurosas. *D.* Dos á tres al dia.

1825. T. DE AZUFRE ANTIRUBEOLICAS.

℞ Azufre lavado. . . . . ℊj.v (3 gr.).
Azúcar. . . . . 3vj (25 gr.).
Mucil. con agua de rosa. c. s.
H. S. A. cuarenta tabletas.
I. Bronquitis, escarlatina, sarampion y como preservativo de la alfombrilla. *D.* Dos, mañana y noche.

1826. T. DE AZUFRE COMPUESTAS (F. F. AÑO DE 1818).

℞ Azufre lavado. . . . 3vj (24 gr.).
Flores de benjui. . ℊxxx (16 dec.).
Lirio de Florencia. . ℊc (5,3 gr.).
Aceite de anís. . . . ℊxx (1,1 gr.).
Azúcar. . . . . Ibj (500 gr.).
Mucilago de goma tragacanto c. s.
H. S. A. *I.* Se usan en los mismos casos que las tabletas de azufre simples. *D.* 36 á 3ij (4 á 8 gr.).

1827. P. AZULES (*Rodriguez*).

℞ Azul de Prusia. . . . . 3j (4 gr.).
Goma aráb. en polvo. 3j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . 3ij (8 gr.).
Canela en polvo. . . . 9j (12 dec.).
Jar. de cásc. de limon. c. s.
M. y H. S. A. una masa muy homogénea y de consistencia conveniente, que se dividirá en veinte pastillas iguales.
I. Calenturas intermitentes de los niños. *D.* Tres á seis al dia.

1828. T. DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

℞ Bálsamo de Tolú. . . . 3ß (15 gr.).
Azúcar. . . . . Ibj (500 gr.).
Mucilago de goma. . . c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).
I. Tisis, catarro crónico, neumonía crónica, bronquitis. *D.* Cuatro á diez al dia.

1829. T. DE BÁLSAMO DE TOLÚ (F. F.).

℞ Bálsamo de Tolú,
Alcoh. de 34° Cart. ãã. 3j (32 gr.).
Azúcar. . . . . Ibj (500 gr.).
Goma tragacanto. . . . 9jv (5,3 gr.).
Agua destilada. . . . . 3ij (64 gr.).
Se disuelve el bálsamo de Tolú en el alcohol, se añade el agua destilada, se calienta por algunos instantes en el baño maría, se filtra y con el líquido filtrado se prepara un mucilago con la goma tragacanto, para hacer S. A. pastillas de ℊxvj (8 dec.).

I. Afecciones catarrales crónicas, particularmente las de la mucosa bronquial, toses crónicas, catarros crónicos. *D.* De cuatro á seis al dia.

4830. P. DE BELEÑO (*Righini*).

℞ Azúcar refinada. . . . . ʒij (60 gr.).
Extracto de beleño. . . ϑj (12 dec.).

H. S. A. cuarenta y ocho pastillas con mucilago hecho en agua de lechuga.

I. Toses nerviosas. *D.* Cinco ó doce al dia.

4831. P. DE BICARBONATO DE SOSA, *Tabletas digestivas llamadas de Vichy ó d'Arcet* (F. F., H. DE M.).

℞ Bicarbonato de sosa. ʒj (32 gr.).
Azúcar cristalizado. . ʒxjx (600 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas de ɡxx (10 dec.). Cada una contendrá ɡj (5 cent.) de bicarbonato de sosa. Se acostumbra aromatizar estas tabletas con distintos aromas para satisfacer el gusto particular de algunos enfermos.

Nota. Veinte pastillas representan un vaso de agua de Vichy por la cantidad de bicarbonato.

I. Digestiones lentas con acidez del estómago, dispepsia, acidez de las primeras vias, agrios, fetidez del aliento, pirosis, cálculos, gota. *D.* Bastan dos ó tres pastillas, tomadas de cinco en cinco minutos, para restablecer la digestion; una sola la favorece. Se usan tambien como fundentes y litontripticas. Se puede aumentar la dosis hasta cuatro ó seis. Generalmente se usan antes ó despues de comer, por lo que se las llama digestivas.

4832. P. DE BORAX.

℞ Borax. . . . . ʒij (8 gr.)
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. treinta píldoras.

I. Aftas. *D.* Se funden en la boca.

4833. TABLETAS DE CAFÉ DE MOCA IODURADAS *ó Café iodurado* (F. DEL PIAMONTE).

℞ Ioduro de potasio. . . ʒj (4 gr.)
Café de Moca porfiriz. ʒß (2 gr.).
Azúcar en polvo. . . . ʒiv (125 gr.).
Mucílago de goma tragacanto hecho con una infusion de café. . . c. s.

H. S. A. trescientas tabletas, y cada una contiene cerca de ɡ$^1/_4$ (12 mil.) de ioduro. Se parecen mucho á las del n. 4816.

I. Bocio, escrófulas, atrofia mesentérica, flores blancas.

4834. T. DE CALDO (*Cadet*).

℞ Carne de pierna sin grasa. . . . . ℔xij (6000 gr.).
Pié de ternera. . . número 6.
Zanahoria,
Nabos,
Puerros,
Apio, ää. . . . . un buen manojo.
Cebollas tostadas,
Clavos, ää. . . . . número 6.
Goma arábiga. . . ʒxx (600 gr.).

Se corta en pedazos la carne muscular, se la tritura en un mortero de mármol con c. s. de agua, y se exprime; se repite este tratamiento hasta agotar la carne, y finalmente se prensa. Se hierve un instante los líquidos reunidos, se cuela por una tela, se evapora el líquido colado en el baño maría hasta que se haya reducido á cerca de un cuartillo ($^1/_2$ lit.).

Se lavan y cortan en pedazos las legumbres y los pies de vaca, se ponen estas sustancias en una olla con tapadera con la cebolla y los clavos, y se añade agua de rio para cubrir todo; se hierve á fuego lento, se deja enfriar un poco antes de abrir la tapadera, se cuela el cocimiento, se le deja enfriar enteramente, se le quita la grasa, y se le pone al fuego para clarificarle con clara de huevo batida. Se cuela y se evapora el líquido en el baño maría.

Durante estas operaciones se funde la goma arábiga en su peso de agua, y se cuela por una tela; despues se vierte la solucion en el caldo de los pies de vaca y legumbres evaporado hasta las tres cuartas partes, se continúa evaporando, y finalmente se añade el primer producto que se apartó; se mezcla continuando la evaporacion, despues se echa en moldes S. A. y se deja secar á fuego suave.

D. Cada tableta que pesa ʒß (15 gr.) fundida en Ibß (250 gr.) de agua hirviendo, con ℈xviij (1 gr.) de sal, da una buena taza de caldo.

4835. PASTILLAS DE CARACOLES (*Mouchon*).

℞ Sacarolado de caracol. Ibj (500 gr.).
Goma tragacanto. . . . ʒj (4 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒjß (45 gr.).
H. S. A. tabletas de ℈xvj (8 dec.). Cada una equivale á dos caracoles.

4836. TABLETAS DE CARBON (F. F.).

℞ Carbon vegetal. . . . ʒjv (125 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒxij (375 gr.).
Mucil. de gom. tragac. c. s.
Se procede S. A. á formar tabletas de á ℈xvj (8 dec.).

Su uso está casi limitado al de masticatorio para corregir el mal olor de la boca. La dosis es indeterminada.

4837. T. DE CARBON ANIMAL.

℞ Carbon animal lavado y porfirizado,
Azúcar, ää. . . . . ʒiij (90 gr.).
Chocolate. . . . . ʒjx (270 gr.).
H. S. A. tabletas de á ℈xviij (1 gr.).

I. Fetidez del aliento.

4838. T. DE CARBON Y CHOCOLATE DE A. CHEVALIER (F. P.).

℞ Chocolate en polvo. 3
Carbon vegetal lavado y porfiriz. 1
Azúcar blanca. 1
Mucílago de goma tragacanto preparado con agua de flor de naranjo, c. s.
H. S. A. tabletas de á ℈xij (6 dec.) de peso.

I. Fetidez del aliento, expectoracion purulenta, tisis, estomacace. Se usan para destruir el mal olor del aliento; se emplean algunas veces contra los esputos de pus y la tisis. *D.* De seis á doce al dia.

4839. T. DE CATECÚ (F. F. Y F. P.).

℞ Extracto de catecú. . . ʒjv (125 gr.).
Azúcar blanca. . . . . Ibj (500 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s. para hacer tabletas de ℈xij (6 dec.).

I. Son astringentes y se usan en las diarreas rebeldes, disentería, hinchazon escorbútica de las encías, fetidez del aliento, leucorrea, etc. Se usan como estomacales. *D.* De tres á diez y mas al dia.

Algunas veces se reduce la masa á bolos, á que se da el nombre de *granos de catecú*. Los usan los fumadores para corregir el humo del tabaco.

4840. PASTILLAS DE CATECÚ, CANELA Y MAGNESIA.

℞ Extracto de catecú. . . ʒjv (16 gr.).
Magnesia calcinada. . . ʒj (32 gr.).
Canela en polvo. . . . ʒvj (24 gr.).
Azúcar. . . . . Ibj (500 gr.).
Mucílago con agua de canela. c. s.
H. S. A. pastillas de ℈xij (6 dec.).

I. Atonía del estómago acompañada de agrios y diarrea, dispepsia, fetidez del aliento, agrios, diarrea por esta causa.

4841. TABLETAS DE CATECÚ Y MAGNESIA (F. F.).

℞ Magnesia pura. . . ʒij 64 gr.

Catecú en polvo. . . ʒj (32 gr.).
Azúcar en polvo. . . ʒxiij (407 gr.).
Mucilago de goma tragacanto hecho con agua de canela. . . . . c. s.

Se hacen tabletas de gxvj (8 dec.), de las que cada una contendrá gij (15 cent.) de catecú y gij (1 dec.) de magnesia.

I. Fetidez del aliento causada por reblandecimiento de las encías, dispepsia debida á un aumento de secrecion del jugo gástrico ó á un estado de atonía de la mucosa del estómago.

1842. PASTILLAS DE CIANURO DE ORO (*Chrestien*).

℞ Cianuro de oro. . . . . gij (1 dec.).
Pasta de chocolate. . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. veinticuatro pastillas.

D. Una á cuatro al dia en la amenorrea.

1843. P. DE CIANURO DE ORO Y CHOCOLATE (*Chrestien*).

℞ Cianuro de oro. . . . . gij (5 cent.).
Pasta de chocolate. . . ʒj (30 gr.).

Se mezclan exactamente en un mortero de mármol calentado y se dividen en veinticuatro pastillas.

I. Enfermedades sifilíticas y escrofulosas. *D.* Una diariamente y se aumenta otra cada ocho dias.

1844. P. DE CITRATO DE HIERRO.

℞ Citrato de hierro,
Ácido cítrico, ää. . . ʒjß (10 gr.).
Esencia de limon. . . diez gotas.
Azúcar. . . . . ʒvj (200 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. pastillas de gjx (50 cent.).

I. Amenorrea, dismenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, dispepsia, congestion, catarro útero-vaginal. *D.* Se dan cinco á seis pastillas ó mas. Es una preparacion de hierro muy eficaz.

1845. *Otras* (BERAL).

℞ Azúcar en polvo. . . . ʒjv (16 gr.).
Citrato de hierro y amoniaco anhidro,
Sacaruro de clavo y vainilla, ää. . . . gxviij (1 gr.).

Se hace pasta que se divide en pastillas de gxvj (8 dec.).

1846. TABLETAS DE CITRATO DE HIERRO.

℞ Sacarolado de citrato de hierro. . . . . ʒüj (90 gr.).
Mucíl. de goma tragac. ʒß (15 gr.).

Háganse tabletas de gjx (50 cent.).

I. Amenorrea, clorosis, catarro útero-vaginal, bulimia. *D.* Cinco á seis al dia.

1847. PASTILLAS Ó TABLETAS DE CITRATO DE MAGNESIA.

℞ Citrato de magnesia. 400
Azúcar buena. 200
Acido cítrico. 5
Mucilago aromatizado con c. s. de tintura de cáscaras frescas de naranja. . . . . c. s.

H. S. A. tabletas de ʒß (2 gr.).

D. Una á seis á los niños valetudinarios, como laxante.

1848. PASTILLAS DE CLORURO DE CAL.

℞ Cloruro de cal. . . . . ʒß. (2 gr.).
Azúcar con vainilla. . ʒiij (90 gr.).
Catecú. . . . . ʒß (15 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de gxviij (1 gr.).

I. Fetidez del aliento, estomacace. *D.* Una á diez al dia.

1849. T. DE CLORURO DE CAL (*Deschamps*).

℞ Cloruro de cal seco. 460
Azúcar blanca. 5000
Almidon. 640
Goma tragacanto en polvo. . . 80
Carmin. 3

H. S. A. tabletas de gxviij á gxx (9 á 10 dec.).

I. Destruye el mal olor del aliento. *D.* La misma que la anterior y la siguiente.

1850 T. DE CLORURO DE CAL ó *Tabletas desinfectantes de A. Chevalier.*

℞ Cloruro de cal seco. . ℈xij (6 dec.).
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).
Goma tragac. en polvo. ℈xv (10 dec.).

Se divide el cloruro de cal en un mortero de vidrio; se le trata por el agua en pequeña cantidad; se usa este líquido para convertir el azúcar y la goma en una masa homogénea, que se divide en tabletas de ℈xviij á ℈xx (9 á 10 dec.) de peso.

Nota. Se las puede aromatizar mezclando con el azúcar un aceite volátil, segun la prescripcion del práctico.

I. Se emplean para destruir el mal olor del aliento, contra la expectoracion purulenta, tisis. *D.* De seis á ocho al dia.

1851. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Chrestien*).

℞ Cloruro de oro y sodio. ℈v (25 cent.).
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).
Mucil. de gom. tragac. c. s.

H. S. A. sesenta pastillas. Cada una contiene una sesta parte de la sal de oro.

I. Sífilis, incontinencia de orina, enuresis, herpes corrosivos, lepra, escrófulas, estomatitis, congestion. *D.* Una mañana y noche.

1852. T. CONTRA EL BOCIO (*Dubois*).

℞ Esponja en polvo. ♎ . ʒß (15 gr.).
Carbonato de sosa. . . ʒij (8 gr.).
Canela. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒjß (45 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. tabletas de á ℈x (10 dec.).

I. Escrófulas, bocio, infartos linfáticos. *D.* Una mañana y noche.

1853. P. CONTRA EL ASMA (*Bodin*).

℞ Ipecacuana. . . . ℈xx (10 dec.).
Goma arábiga. . . . ℈xv (75 cent.).
Hojas de naranjo en polvo. . . . . ℈xviij (90 cent.).
Azúcar blanca. . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. quince pastillas.

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una todas las mañanas.

1854. P. CONTRA EL ROMADIZO (*Lepère*).

℞ Azúcar en polvo. . . . lbj (500 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒj (30 gr.).
Azafran en polvo. . . ʒß (2 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ℈xxjv (12 dec.). *D.* Tres á cuatro al dia.

1855. P. CONTRA LA TOS (*Lepère*).

℞ Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Hidroclorato de morf. ℈xij (6 dec.).
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. pastillas de ℈xviij (1 gr.). Se toman cuatro al dia en las bronquitis agudas.

1856. P. CONTRA LAS TOSES NERVIOSAS (*Lepère*).

℞ Azúcar en polvo. . . . lbj (500 gr.).
Ipecacuana en polvo. . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈xviij (1 gr.).

H. S. A. pastillas de ℈xij (6 dec.).

1857. P. DE CRÉMOR DE TARTARO.

℞ Crémor de tárt. solub. ʒij (60 gr.).
Azúcar. . . . . ʒxjv (420 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒj (4 gr.).
Ag. de cáse. de limon. ʒj (30 gr.).

H. S. A. pastillas.

1858. P. DE CUBEBINO.

℞ Cubebino. . . . . ʒvj (25 gr.).
Alcohol. . . . . ʒiij (100 gr.).
Azúcar. . . . . ʒjß (50 gr.).
Aceite de menta piper. 5 gotas.
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de ℈jx (50 cent.).

I. Blenorragia. *D.* Cinco mañana y noche, aumentando gradualmente hasta diez.

4859. P. DE CHAUSSIER.

℞ Opio. . . . . ḡvj (3 dec.).
Alcanfor. . . . . ḡxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . ℥iij (12 gr.).
Mucil. de goma trag. c. s.
H. S. A. cincuenta pastillas.
I. Catarro agudo, bronquitis, tisis. *D.* Cinco á diez al dia.

4860. P. DE CHOCOLATE CON CLORURO DE PLATA *ó Pastillas de cloruro de plata* (*Sicard*).

℞ Cloruro de plata. . . . ḡj (5 cent.).
Chocolate. . . . . c. s.
para doce pastillas.
I. Escrófulas. *D.* Una al dia.

4861. P. DE CHOCOLATE Y HIERRO REDUCIDO POR EL HIDRÓGENO (*Miquelard y Quevenne*).

℞ Hierro reducido por el hidróg. 100
Chocolate fino. 1100
Se pone el hierro en el chocolate ablandado á fuego lento y se hacen pastillas de gxviij (1 gr.).
Nota. Cada una contendrá $\frac{1}{11}$ de su peso de hierro ó cerca de ḡj (5 cent.).

4862. P. DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE DIGITAL (*Labelonye*).

℞ Extr. alcohol de digit. gxviij (1 gr.).
Azúcar en polvo. . . . ℔ß (250 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.
H. S. A. doscientas ochenta y ocho tabletas, cada una de las cuales contendrá cerca de $\bar{g}\frac{1}{288}$ de extracto hidroalcohólico de digital.
I. Son diuréticas y expectorantes. *D.* De cuatro á diez y seis pastillas al dia.

4863. P. DIVINAS.

℞ Ambar gris,
Almizcle, ãã. . . . ḡvj (3 dec.).
Estoraque calamita. . ʒß (2 gr.).
Nuez moscada. . . . ḡxij (6 dec.).
Cáscara de naranja,
Semillas de albahaca, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Macis. . . . . ḡxij (6 dec.).
Clavo. . . . . ʒß (2 gr.).
Azafran. . . . . ḡjv (2 dec.).
Azúcar. . . . . ℥xij (375 gr.).
Mucil. de gom. trag. c. s.
H. S. A. pastillas de ḡxij (6 dec.).

4864. T. DE EMETINA PECTORALES (*Magendie*).

℞ Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Emetina de color. . . ḡviij (4 dec.).
Mucil. de goma tragac. c. s.
H. S. A. sesenta y dos pastillas muy iguales.
I. y *D.* Una cada dos ó tres horas para facilitar la expectoracion en los catarros pulmonares crónicos y en la coqueluche. Se usan tambien como astringentes en los casos de diarrea sin inflamacion. Es esencial suspender su uso si se experimentan náuseas.
Nota. Se suele dar á estas pastillas el color de rosa; con este objeto se usa un poco de laca carminada.

4865. T. DE EMETINA VOMITIVAS (*Magendie*).

℞ Azúcar. . . . . ʒx (40 gr.).
Emetina de color. . . gxviij (1 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.
H. S. A tabletas de gxviij (1 gr.).
I. Embarazo gástrico, calenturas biliosas, tisis. *D.* Una de estas pastillas, tomada en ayunas, basta comunmente, segun Magendie, para hacer vomitar á los niños. Tres ó cuatro excitan el vómito en los adultos.

4866. P. DE ÉNULA CAMPANA.

℞ Polvo de énula camp. ʒß (15 gr.).
Polvo de lirio de Florencia. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Mucil. de goma tragac. c. s.
I. Escorbuto, hidropesía y clorosis. *D.* ʒß (15 gr.) al dia.

4867. T. DE ESCAMONEA (*Bouriéres*).

℞ Resina blanca de escamonea. . . 15

Merc. dulce preparado al vapor.	15
Azúcar.	175
Goma tragacanto.	2
Tintura de vainilla.	3

H. S. A. pastillas de ℊxij (6 dec.).

D. Una á dos para purgar los niños, y dos á cuatro para los adultos.

4868. T. DE ESCAMONEA Y SEN ó *Tabletas purgantes.*

♀ Escamonea.	12
Sen.	17
Ruibarbo.	6
Clavo.	4
Cáscaras de limon confitadas.	32
Azúcar.	200
Mucílago de goma tragacanto preparado con agua de canela.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).

I. Se usan como purgantes. *D.* Media á una tableta segun la edad y el sexo. Se la deslíe en medio ó un vaso de agua por la noche, y se la deja hasta el dia siguiente. Se agita al tiempo de tomarla para que se suspendan los polvos no disueltos.

4869. T. DE ESPONJA QUEMADA (F. F.).

♀ Esponja quemada en polvo.	℥jv (125 gr.).
Azúcar blanca.	℥xij (375 gr.).
Mucílago de goma tragacanto hecho con agua de canela.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxij (6 dec.).

I. Bocio y escrófulas. *D.* De dos á cuatro ó mas al dia.

4870. P. DE DUBOIS MODIFICADAS.

♀ Esponja calcinada.	℥iß (30 gr.).
Bicarbonato de sosa.	℥vj (25 gr.).
Azúcar.	℥xjv (413 gr.).
Goma tragacanto.	℥j (4 gr.).
Goma arábiga.	℥ij (8 gr.).
Esencia de menta.	16 gotas.

H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).

I. Bocio.

4871. P. EFERVESCENTES.

Giradou ha inventado hacer unas pastillas de ácido tártrico y otras de bicarbonato de sosa; da color de rosa á una de ellas, y las reune una con otra por medio de mucílago. De este modo la reaccion se verifica en el estomago. Estas pastillas no han tenido éxito. Las *grageas minerales* de Megé son una cosa análoga, solo que se las deslíe en agua.

4872. P. ESCILÍTICAS (*Broussonnet*).

♀ Escila en polvo fino.	℥ß (2 gr.).
Azúcar.	℥ij (60 gr.).
Mucíl. de goma tragacanto.	c. s.

para ciento veinte pastillas, de las que cada una contiene un cuarto de grano de escila.

4873. P. ESTIBIO-ARSENICALES ALTERANTES.

♀ Ácido arsenioso.	ℊij (10 cent.)
Protóxido de antimon.	ℊx (50 cent.)
Pasta de chocolate con vainilla.	lbj (500 gr.).

Se puede reemplazar la pasta de chocolate por una masa de azúcar en polvo y mucílago de goma tragacanto con agua de flor de naranjo.

H. S. A. mil pastillas, que contienen cada una ℊ^1/$_{500}$ (^{1}/$_{10}$ de mil.) de ácido arsenioso y ℊ^1/$_{100}$ (^{1}/$_2$ mil.) de protóxido de antimonio.

I. Afecciones sifilíticas constitucionales rebeldes al mercurio y preparaciones del iodo, enfermedades rebeldes de la piel, soriasis, calenturas intermitentes y neuralgias. Obran como la tisana de Feltz. *D.* Una cada hora y pueden darse al fin dos.

4874. P. ESTIMULANTES.

♀ Gengibre.	℥ij (8 gr.).
Azafran oriental.	℥j (4 gr.
Almizcle,	
Clavo, ää.	℥ß (2 gr.)
Almáciga.	℥iij (12 gr.)
Ambar gris.	ȝß (6 dec.)
Azúcar.	lbß (250 gr.

H. S. A. pastillas de ʒj (4 gr.).

I. Anafrodisia. *D.* Dos ó tres al dia.

1875. P. ESTIMULANTES DE GENGIBRE.

℞ Gengibre,	
Canela,	
Nuez moscada,	
Clavo, ãã.	ʒj (4 gr.).
Oleosácaro de alcaravea.	ʒjß (6 gr.).
Mucílago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. pastillas de ℊxviij (1 gr.).

I. Dispepsia, bronquitis, catarro pulmonar, afonia, enuresis. *D.* Dos á cinco al dia.

1876. T. ESTOMACALES (*Daubenton*).

℞ Ambar gris	ℊij (10 cent.
Ipecacuana.	ʒß (2 gr.).
Catecú.	ʒj (4 gr.).
Azúcar.	ʒß (15 gr.).
Mucílago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. treinta tabletas.

I. Dispepsia, diarrea y disentería crónicas, escrófulas, sarampion. *D.* Una á tres al dia.

1877. T. DE ETIOPE MARCIAL.

℞ Oxido negro de hierro.	4
Canela en polvo.	4
Azúcar.	20
Mucílago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxij (6 dec.).

Cada una contiene ℊij (1 dec.) de etiope marcial.

1878. P. FERRUGINOSAS (*Bailly*).

℞ Limaduras de hierro por-	
firizadas.	ʒj (30 gr.).
Pasta de chocolate. . . .	ʒij (60 gr.).
Azafran en polvo fino.	ʒij (8 gr.).
Mucíl. de goma tragac.	c. s.

H. S. A. pastillas de ℊxij (6 dec.).

I. Clorosis, leucorrea, amenorrea, catarro útero-vaginal, caquexia. *D.* Tres ó cuatro al dia.

1879. P. DE FOSBROKE.

℞ Pimiento de España. .	ʒiij (12 gr.).
Gengibre.	
Rábano, ãã.	ʒij (8 gr.).
Azúcar.	ʒj (30 gr.).
Conserva de rosas. . .	ʒj (4 gr.).

H. S. A. nuevo pastillas.

I. Sordera catarral. *D.* Se toma una.

1880. P. DE GELATINA DE CUERNO DE CIERVO (*Mouchon*).

℞ Sacarolado de cuerno	
de ciervo.	ʒß (2 gr.).
Azúcar.	ℊxjv (3 gr.).
Mucílago.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxvj (8 dec.).

Una onza (30 gr.) corresponde á ʒß (15 gr.) de cuerno de ciervo.

1881. T. DE GELATINA DE LIQUEN (*Beral*).

℞ Sacarolado de liquen en polvo.	300
Azúcar en polvo.	540
Sacaruro de vainilla en polvo.	60
Mucílago de goma arábiga re-	
ducido á la cuarta parte, cer-	
ca de.	125

H. S. A. tabletas de figura orbicular y de á ℊxviij (1 gr.) de peso. Cada onza (30 gr.) de estas tabletas contiene ℊxviij (1 gr.) de gelatina seca, que corresponden á ʒij (8 gr.) de gelatina blanda.

I. Bronquitis, catarro y neumonía crónica, caquexia, tisis pulmonar, escrófulas, bulimia. *D.* ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) y mas en el espacio del dia.

1882. T. DE GENGIBRE.

℞ Gengibre en polvo.	1
Azúcar blanco.	7
Mucílago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxvj (8 dec.). Cada pastilla contiene ℊij (1 dec.) de gengibre.

4883. T. DE GINGSENG *ó Pastillas de Richelieu.*

℞ Azúcar. . . . . lbij (1000 gr.).
Vainilla. . . . . ℥ij (60 gr.).
Gingseng en polvo. ℥j (30 gr.).
Tint. de cantáridas. ʒj (4 gr.).
Aceite de canela. . . 40 gotas.
Esencia de ambar. . 2 gotas.
Mucilago. . . . . c. s.

H. S. A. pastillas de gxviij (1 gr.), en cada una de las cuales se hallará una décima parte de grano de tintura de cantáridas. Algunas formulas no contienen las cantáridas.

I. Anafrodisia. *D.* Cuatro ó cinco al dia.

Nota. Estas pastillas pueden determinar accidentes sin reanimar ni aun momentáneamente facultades que no corresponden ya á impotentes deseos.

4884. P. DE GOMA.

℞ Polvos de goma arábiga. 7
Goma arábiga en grano. 1
Azúcar molido. 24
Agua de azahar. 1

Se disuelve la goma en grano en el agua de azahar, se cuela la solucion, y con este mucilago, los polvos de goma y el azucar se hacen pastillas de gxvj (8 dec.).

4885. P. Ó TABLETAS DE GOMA ARÁBIGA (F. F.).

℞ Goma arab. en polv. lbj (500 gr.).
Azúcar en polvo. . lbij (1500 gr.).
Agua de azahar. . . ℥ij (64 gr.).

Se hace un mucilago con toda el agua y parte de la goma, se añade el resto de esta mezcla con el azúcar, y se hacen tabletas de gxvj (8 dec.).

Son demulcentes como la pasta de goma arábiga. *D.* De cuatro á ocho ó mas.

4886. P. DE GUARANA.

℞ Extracto alcohólico de guarana. . . . . lbß (250 gr.).
Azúcar aromatizada con vainilla. . . . . lbj (500 gr.
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de gxij (6 dec.).

D. Diez y seis á veinte al dia

4887. T. DE HIERRO *ó Tabletas marciales* (F. F.).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . ℥j (32 gr.
Azúcar blanca. . . . . ℥x (320 gr.
Canela en polvo. . . . ℥ij (8 gr.
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. tabletas de á gxij (6 dec.), y cada una contendrá gj (5 cent.) de hierro.

I. Amenorrea, escrófulas, clorosis, dispepsia, acidez de las primeras vias, etc. *D.* Tres ó cuatro al dia.

4888. P. INCISIVAS QUERMETIZADAS (*Jobert*).

℞ Quermes mineral,
Escila en polvo,
Opio gomoso, aa. . . gjx (50 cent.
Ipecacuana. . . . . gxviij (1 gr
Azúcar. . . . . ʒß (15 gr.
Mucilago de goma tragacanto. c. s.

para hacer cincuenta pastillas.

I. Coqueluche, bronquitis, catarro, los convulsiva, asma, ronquera. *D.* Una cada tres horas.

4889. P. DE IODOFORMO (*Bouchardat*).

℞ Iodoformo. . . . . ʒj (4 gr.
Azúcar blanca. . . . ʒxx (80 gr.
Esenc. de yerbabuena. gxviij (1 gr.
Mucil. de goma tragac. c. s.

H. S. A. pastillas de gxviij (1 gr.).

Se dan cinco ó seis al dia en las afecciones escrofulosas, bronquitis, catarro, calenturas intermitentes, escrófulas, estomacace.

4890. P. DE IODURO DE HIERRO

℞ Iodo . . . . . ʒjx 16 gr.

Hierro porfirizado. . ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . ʒv (150 gr.).

Se calienta en el baño maría hasta que se haya obtenido un líquido sin color. Por otra parte se mezcla con

Azúcar bl. granulad. ʒxxv (800 gr.).
Esencia de yerbab. ʒij (4 gr.).

Se añade á la solucion de ioduro de hierro c. s. de agua de yerbabuena.

H. S. A. pastillas de ɡjx (50 cent.).

I. Clorosis, afecciones escrofulosas y sifilíticas, afecciones tuberculosas. Es muy buena preparacion. *D.* Diez pastillas al dia, aumentando sucesivamente la dosis.

4891. P. DE IODURO DE HIERRO (*F. P.*).

℞ Ioduro de hierro. . . ʒj (4 gr.).
Azafran en polvo. . . ʒß (16 gr.).
Azúcar. . . . . ℔ß (250 gr.).
Goma tragacanto,
Agua de canela, ää. . c. s.

H. S. A. doscientas ochenta y ocho pastillas. Cada una contiene ɡ1/24 (12 mil.) de ioduro de hierro.

I. Leucorrea, escrófulas, amenorrea, catarro útero-vaginal, dispepsia, herpes, lepra, elefantiasis. *D.* Ocho á diez al dia. Cada tres ó cuatro dias se toma una pastilla mas.

4892. *Otras* (DUPASQUIER).

℞ Solucion oficinal de protoioduro de hierro. 100
Goma arábiga. 30
Azúcar. 300

H. S. A. pastillas de ɡxij (6 dec.). Cada una contiene ɡ1/24 (25 mil.) de ioduro.

D. Cinco á diez al dia.

4893. T. DE PROTOIODURO DE HIERRO (*Dupasquier*).

℞ Solucion normal de protoioduro de hierro. . ʒv (20 gr.).
Pasta de tabletas de malvabisco, c. s.

para hacer doscientas tabletas

Se echa la solucion en una cuchara de hierro y se añade:

Azúcar en polvo. . . . . ʒj (32 gr.).

Se pone al calor y cuando el jarabe haya adquirido casi la consistencia de azúcar, cocido á la pluma, se mezcla rápidamente con la pasta, y se divide en tabletas que cada una contiene casi una octava parte de grano de iodo.

D. Una ó á lo mas dos al dia, aumentando la dosis paulatinamente.

4894. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (*Corbel Lagneau*).

℞ Protoioduro de mercur. ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. . . ɡvj (3 dec.).
Pasta de chocolate con vainilla. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. setenta pastillas.

I. Síntomas consecutivos de la sífilis. *D.* Una á seis al dia.

4895. T. DE IODURO DE POTASIO CON CAFÉ.

℞ Ioduro de potasio. ɡxxvij (1.50 gr.)
Café de Moca en polvo. . . . . ɡxviij (1 gr.).
Azúcar en polvo. . ʒjß (50 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. . c. s.

H. S. A. cien tabletas.

I. Escrófulas, bocio, leucorrea, atrofia mesentérica, catarro útero vaginal. *D.* Dos, mañana y noche.

4896. P. DE IODURO DE POTASIO (*Giordano*).

℞ Ioduro de potasio. . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒiij (90 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. . . . . c. s.

H. S. A. tabletas de ɡxij (6 dec.).

Cada pastilla contiene ɡß (25 mil.) de ioduro.

D. Una á seis al dia.

4897. P. DE IPECACUANA.

℞ Ambar gris. . . . . ℊjv (2 dec.)
Ipecacuana. . . . . 5j (4 gr.).
Catecú. . . . . 3ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . 3j (30 gr.).
Mucilago. . . . . c. s.
H. S. A. sesenta pastillas.

I. Coqueluche, asma, catarro, pica. *D.* Una de hora en hora.

4898. *Otras* (L. C. CADET).

℞ Azúcar. . . . . 3xxx (940 gr.).
Ipecacuana. . . . . 3v (20 gr.).
Goma tragacanto. . 3ß (2 gr.).
Ag. de flor de naranj. 3ijß (75 gr.).
H. S. A. pastillas de ℊxij (6 dec.) de peso, de las cuales cada una contendrá un cuarto de grano de ipecacuana.

I. y *D.* Romadizos, coqueluche, asma, etc. Se toman ocho ó diez al dia con el intervalo de una hora.

4899. *Otras* (F. P.).

℞ Ipecacuana. 1
Azúcar. 4
Mucilago de goma tragacanto muy consistente, preparado con agua de flor de naranjo. . . . . c. s.

Se prepara con velocidad para que el polvo no se humedezca mucho y se disuelvan los principios extractivos, y se divide la masa en pastillas de 3ß (6 dec.).

I. Toses, catarros crónicos.

4900. P. DE IPECACUANA CON AZÚCAR (F. E.).

℞ Polvos de ipecacuan. 3j (4 gr.)
Azúcar blanca. . . . 3vß (165 gr.).
Goma tragacanto. . 5iij (12 gr.)
Agua, c. s. para que se disuelva la goma.

Se mezcla todo exactamente y se hacen ciento cuarenta y cuatro pastillas, que se dejan secar bien.

I. Producen muy buenos efectos en todas las enfermedades de los niños, que vienen acompañadas de embarazos en las primeras vias, y en las afecciones catarrales, coqueluche, etc.

Nota. Cada escrúpulo contiene ℊß (25 mil.) de ipecacuana.

D. Hasta 3j (12 dec.) ó una pastilla, que se repite por intervalos segun haya necesidad.

4901. T. DE IPECACUANA Y CHOCOLATE Ó DE DAUBENTON (F. P.).

℞ Ipecacuana en polvo. 3j (32 gr.).
Chocolate con vainilla. 3xij (375 gr.).

Se liquida el chocolate á un calor moderado, se le incorpora el polvo de ipecacuana y se divide en masas pequeñas de á ℊxiij (65 cent.), que se arrollarán en bolas, á las que se hará tomar una figura hemisférica, teniéndolas durante algunos instantes sobre una hoja de lata caliente.

I. Se dan como vomitivas á los niños, y bastan tres ó cuatro para producir este efecto. A menos dosis son útiles en las afecciones catarrales, coqueluche, etc.

4902. P. DEL JAPON.

℞ Extracto de cáñamo. . ℊxviij (1 gr.).
Extr. de estramonio. . ℊ½ (3 cent.).
Ambar,
Almizcle, ää. . . . . c. s.
H. S. A. pastillas de ℊjv (2 dec.).

4903. P. DE LACTATO DE HIERRO.

℞ Lactato de peróxido de hierro. . . . . 5vj (25 gr.).
Esenc. de yerbabuena. ℊxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . 3bj (300 gr.).
Agua destilada de yerbabuena. . . . . c. s.
H. S. A. pastillas de ℊx (5 dec.).

I. Clorosis y accidentes que de ella dependen. *D.* Seis á doce pastillas al dia.

4904. *Otras* (CAP.).

℞ Lactato de hierro. . 3j (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . 3xij (375 gr.).

Mucilago de goma arábiga. . . c. s.
H. S. A. pastillas de ℊxij (6 dec.). Cada una contendrá ℊj (5 cent.) de sal ferruginosa.

I. Dismenorrea, clorosis, escrófulas, pénfigo, dispepsia, congestion, catarro útero-vaginal. *D.* Cinco á seis pastillas al dia.

4905. P. DE LECHE (*Del Bue*).

℞ Leche reciente. . . lbij (1000 gr.).
Se cuece y se añade:
Vinagre. . . . . ʒß (15 gr.).
Se exprime fuertemente el coágulo y se contunde en un mortero de mármol con
Jarabe emulsivo. . . . . ʒij (60 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ʒj (4 gr.).
Despues se añade:
Azúcar bl. en polvo. lbij (1000 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒij (8 gr.).
Se hacen pastillas de ℊxviij (1 gr.).

4906. P. DE LIMON.

℞ Azúcar. 480
Zumo de limon. 75
Oleosácaro de limon. 120
Háganse pastillas.

4907. T. DE LIQUEN.

℞ Sacarolado de liquen. 1
Azúcar. 2
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.) con c. s. de agua.

4908. T. DE LIQUEN ISLANDICO (F. F.).

℞ Jalea seca de liquen. lbj (500 gr.).
Azúcar bl. en polvo. lbij (1000 gr.).
Polvos de goma aráb. ʒjß (48 gr.).
Agua comun. . . . . c. s.
Se hace un mucilago con la goma y el agua, se añade el azúcar y la jalea en polvo, y se bate todo en un mortero para formar una pasta homogénea que se divide en tabletas de ℊxvj (8 dec.).

D. Tiene las mismas propiedades que la jalea y pasta de liquen.

4909. T. DE LIQUEN *ó Pastillas de liquen* (*Robinet*).

℞ Polvo de liquen azucarado. . . . . lbß (250 gr.).
Azúcar en polvo. . . . lbj (500 gr.).
Agua. . . . . ʒij (60 gr.).
Se pone en un mortero el agua y una parte del polvo de liquen; se hace un mucilago, al cual se añade despues el resto del polvo y por último el azúcar. Entonces se forman S. A. tabletas de ℊxij (6 dec.) de peso.

D. La misma que las anteriores.

4910. T. DE LIRIO.

℞ Polvo de lirio. 4
Azúcar blanca. 17
Mucilago de goma tragacanto. c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).

I. Son expectorantes y muy útiles para disminuir el mal olor del aliento.

4911. T. DE MAGNESIA (F. F.).

℞ Magnesia calcinada. ʒij (96 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒxiij (416 gr.).
Mucilago de goma tragacanto. . c. s.
Se preparan tabletas de ℊxvj (8 dec.), de las que cada una contendrá ℊiij (45 cent.) de magnesia.

I. Agrios del estómago, atonia de los órganos digestivos y dispepsia. *D.* De seis á doce.

4912. T. DE MAGNESIA.

℞ Magnesia calcinada. . . ʒß (15 gr.).
Azúcar. . . . . ʒij (8 gr.).
Nuez moscada. . . . . ℊjv (2 dec.).
Mucilago de goma tragacanto. c. s.
H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.).

I. Acidez de las primeras vias, dispepsia, estafiloma, saranpion. *D.* Cinco á diez al dia.

4913. T. DE MAGNESIA Y CATECÚ (F. F.).

℞ Magnesia calcinada. ℥ij (64 gr.).
Catecú. . . . . ʒj (32 gr.).
Azúcar en polvo. . ʒxiij (407 gr.).
Mucilago de goma tragacanto, preparado con agua de canela, c. s.

Se preparan tabletas de ℊxvj (8 dec.), de las cuales cada una contiene ℊj (5 cent.) de catecú y ℊij (10 cent.) de magnesia.

I. Fetidez del aliento, reblandecimiento de las encías y dispepsia por aumento de secrecion del jugo gástrico ó por un estado de atonía de la mucosa del estómago. *D.* Seis ó siete tabletas.

4914. T. DE MAGNESIA Y CHOCOLATE (*Chevallier*).

℞ Azúcar en polvo. . . lbjß (750 gr.).
Chocolate en polvo. . ℥xij (375 gr.).
Magnesia en polvo. . ℥jv (125 gr.).
Se mezcla y se añade:
Mucilago de goma tragacanto, c. s.
H. S. A. tabletas de ʒj (12 dec.).

4915. P. Ó TABLETAS DE MALVABISCO (F. F.).

℞ Polvo de raiz de malvabisco. . . . . ℥ij (64 gr.).
Azúcar. . . . . ℥xjv (436 gr.).
Mucilago de goma tragacanto con agua de flores de naranjo, c. s.
H. S. A. pastillas de ℊxvj (8 dec.).

I. Se usan como expectorantes demulcentes en los romadizos ligeros con tos y sequedad de la garganta.

4916. P. DE MALVABISCO GOMOSAS (F. E.).

Su composicion es muy análoga a la de la pasta de goma, y se preparan haciendo un cocimiento de ℥jv (125 gr.) de raiz reciente de malvabisco limpia y partida en pedazos, en lbjvß (2250 gr.) de agua. Se disuelve á fuego lento en el líquido colado, agitando continuamente con una espátula de madera, ℥xxx (940 gr.) de goma arábiga muy blanca y en polvo, y despues se mezclan ℥xxx (940 gr.) de azúcar muy blanca. Se cuela y se evapora hasta solidificar medianamente la masa, no dejando de agitar. Se añaden cuatro claras de huevo disueltas en ℥jv (125 gr.) de agua de azahar. Se agita fuertemente sobre el fuego hasta consumir la humedad. Se echa la masa en un papel muy blanco cubierto de almidon y colocado sobre un cedazo de crin. Se aparta el papel, se separa el almidon restante, y luego que está medio fria la masa se la corta en tabletas y se las conserva en una vasija á propósito, cubriéndolas con almidon. Se usan del mismo modo que las anteriores.

I. Catarros pulmonares, neumonía crónica, tos.

4917. P. DE MANÁ.

℞ Maná escogido. . . . ℥iij (90 gr.).
Agua de tusilago. . . . ℥vj (180 gr.).
Se disuelve el maná, se cuela y con ℥xviij (560 gr.) de azúcar blanca en polvo se hacen pastillas S. A.

I. Son ligeramente purgantes y convienen especialmente á los niños, que las toman facilmente creyendo que son confites. *D.* ʒj (4 gr.).

4918. T. DE MANÁ (F. F.).

℞ Maná en lágrima. . ℥ij (64 gr.).
Azúcar en polvo. . . ℥xjv (339 gr.).
Goma tragacanto. . ʒß (2 gr.).
Agua de azahar. . . . ʒj (32 gr.).
Se divide el maná triturándole por algun tiempo con el azúcar, y añadiéndole el mucilago se reduce la mezcla á tabletas de ℊxvj (8 dec.), de las que cada una contendrá ℊij (1 dec.) de maná.

I. Se administran como expectorantes en las afecciones semiagudas de las vias aéreas, y en el periodo creciente de los catarros especialmente de los niños. *D.* Cuatro á ocho pastillas.

4919. P. DE MANÁ (*Boudet*).

℞ Maná en lágrima.	125
Azúcar en polvo.	850
Goma arábiga en polvo.	50
Agua de flor de naranjo.	60

Se funde á fuego lento el maná en el agua de flores de naranjo, se cuela por un lienzo, se añade la goma mezclada antes con dos veces su peso de azúcar, se incorpora S. A. el resto del azúcar y se hacen pastillas de ɡxvj (8 dec.)

Este método es mas pronto que el de la *F. F.* y no hay necesidad de pulverizar el maná, lo que es muy pesado.

4920. T. DE MANÁ *ó Pastillas de Calabria* (*Manfredi*).

℞ Maná en lágrima. . ℥vj	(180 gr.)
Raiz de malvabisco. ℥iij	(90 gr.).
Azúcar blanca. . . . lbvj	(3000 gr.)
Ext. acuoso de opio. ɡxij	(6 dec.).
Ag. de flor de naran. ℥iij	(90 gr.).
Esencia de bergam. 4 gotas.	
Esencia de limon. . 4 gotas.	
Agua de fuente. . . lbjv	(2000 gr.).

Se hierve la raiz de malvabisco con el agua durante cinco á seis minutos, se añade el maná, se le disuelve en caliente y se cuela; se añade el azucar y el extracto disuelto en un poco de agua; se le evapora hasta la consistencia de extracto sólido; se añade entonces el agua de flores de naranjo y las esencias disgregadas por medio de azucar. Se menea mucho con una espatula de boj hasta que se haya esposado la masa; se echa despues en un cajoncito de papel dado de aceite, y antes que sea completo el enfriamiento se corta en pedacitos cuadrados de dos líneas de espesor por seis líneas de anchura.

I. Neumonía, toses pertinaces, coqueluche, bronquitis, catarro pulmonar crónico y tisis, caquexia, escrófulas, estomacace y dispepsia. *D.* De ɔj á ɔij (4 á 8 gr.) y mas en las veinticuatro horas.

4921. P. DE MANÁ TARTARIZADAS (H. DE AL.).

℞ Crémor de tártaro. . . ɔß	(15 gr.).
Maná. . . . . ɔjv	(125 gr.).
Agua. . . . . ɔx	(300 gr.).

Se cuece hasta la consistencia conveniente y se hacen pastillas de diez á doce granos.

Es un laxante muy cómodo para los niños.

4922. T. Ó PASTILLAS DE MANTECA DE CACAO.

℞ Manteca de cacao. . . ɔj	(30 gr.).
Azúcar. . . . . ɔvij	(210 gr.).
Goma tragacanto. . . ɔj	(4 gr.).
Agua de rosas. . . . ɔj	(30 gr.).

Se tritura la manteca con el azúcar, y por medio del mucilago se hacen pastillas de ɡxviij (1 gr.).

4923. T. MARCIALES (*Sydenham*).

℞ Oxido negro de hierro. ɔj	(30 gr.).
Canela. . . . . ɔij	(8 gr.).
Azúcar. . . . . ɔv	(150 gr.).
Mucilago de gomatragacanto, c. s.	

H. S. A. tabletas de ɡxij (6 dec.).

I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrofulas, dispepsia, acidez de las primeras vias. *D.* De dos á seis al dia.

4924. *Otras* (H. DE IT.).

℞ Oxido negro de hierro. ɔiß	(15 gr.).
Chocolate. . . . . ɔxv	(470 gr.).

H. S. A. setenta y dos pastillas.

I. Son muy útiles para los niños.

4925. P. MASTICATORIAS.

℞ Raiz de imperatoria en polvo. . . . . ɔij	(8 gr.).

Almáciga. . . . . ʒß (15 gr.).

Se contunden en un mortero caliente y se hacen diez pastillas que se usan como sialagogas.

1926. P. DE MECHOACAN (F. M.).

℞ Mechoacan en polvo. ʒij (90 gr.).
Jalapa en polvo. . . . ʒj (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . lbjß (730 gr.).

H. S. A. pastillas con c. s. de mucílago de goma tragacanto.

I. Son purgantes, y se usan en las enfermedades de los niños.

1927. T. DE MENTA INGLESAS.

℞ Azúcar blanca. . . . . lbj (500 gr.).
Esencia de yerbabuena de sabor de pimienta. ʒj (4 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒij (8 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒij (60 gr.).

H. S. A. tabletas de á gxij (6 dec.).

I. Son estomacales y carminativas.

1928. P. DE MENTA PIPERITA (F. F.).

℞ Esenc. de yerbabuena de sabor de pimienta. ʒj (4 gr.).
Azúcar muy blanca. ʒxij (375 gr.).
Agua de yerbabuena de sabor de pimienta, c. s.

Se machaca el azúcar en un mortero de mármol y se pasa por un tamiz de cerda; se vuelve á tamizar el producto por otro de seda, y se reserva para hacer las pastillas el azúcar que no puede pasar por él. Se echa parte de este azúcar en un cacito de pico con la cantidad necesaria de agua de yerbabuena para hacer una pasta, se pone á calentar y cuando empiece á hervir se añade el resto del azúcar apartado y la esencia de yerbabuena; se agita por medio de una varilla de metal y se echa la masa en gotas separadas sobre hojas de lata, y se concluye la desecacion en la estufa á fuego lento.

I. Se usan como tónicas, estomacales y antiespasmódicas. *D.* De seis á doce.

Del mismo modo se preparan las PASTILLAS AROMÁTICAS DE ROSA, LIMON Y FLOR DE NARANJO.

1929. P. Ó TABLETAS MERCURIALES.

℞ Mercurio. . . . . ʒij 64 gr.
Goma arábiga. . . . ʒj (32 gr.).
Azúcar. . . . . ʒjx 280 gr.).
Vainilla. . . . . ʒß 2 gr.).

Se hace un mucílago con la goma arábiga y ʒj (32 gr.) de agua, y se tritura el mercurio con el mucílago hasta que no se perciba el menor glóbulo; se añade el azúcar en el cual se ha dividido la vainilla por trituracion y se forman pastillas de gxij (6 dec.); cada pastilla contiene gij (1 dec.) de mercurio.

1930. P. MERCURIALES ALTERANTES.

℞ Calomel. bien lavados. gxvij (1 gr.).
Pasta de chocolate con vainilla. . . . . lbj (500 gr.).

H. S. A. mil pastillas.

Se puede reemplazar el chocolate por lbj (500 gr.) de pasta hecha con azúcar en polvo y mucílago preparado con agua de rosas. Cada pastilla contendrá g¼ (1 mil.) de calomelanos.

I. Infeccion sifilítica. *D.* Diez al dia, tomando una cada hora ó cada dos horas. Diariamente se aumentan dos. Cuando se llegue á tomar veinte pastillas (2 cent.) será prudente no aumentar mas, y se administrarán durante tres meses cuando menos ó seis meses cuando mas.

1931. P. MERCURIALES (*Corbel Lagneau*).

℞ Mercurio metálico,
Manteca de cacao, ãã. ʒijß (10 gr.).

Se tritura hasta que se extinga

el mercurio con c. s. de aceite de huevo, y se añade:

Chocol. con vainilla. . 3x (40 gr.

H. S. A. cien pastillas.

I. Sintomas primitivos de la sífilis. *D.* Dos á doce al dia.

4932. T. DE MERCURIO DULCE ó *Pastillas vermífugas* (F. F.).

℞ Mercurio dulce preparado al vapor. . . ʒij (32 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒxj (350 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

Se hacen S. A. tabletas de gxij (6 dec.), y cada una contendrá gj (5 cent.) de mercurio dulce.

D. Una á dos pastillas para los niños.

4933. P. DE MERCURIO SACARINO (*Lagneau*).

℞ Azúcar. . . . . ʒijx (270 gr.).
Mercurio. . . . . ʒij (60 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒv (20 gr.).
Vainilla. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. quinientas setenta y seis pastillas; cada una contiene gij (1 dec.) de mercurio.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Una á cuatro al dia.

4934. P. MOOÓLICAS.

℞ Azúcar. . . . . ʒiijß (105 gr.).
Goma arábiga . . . ʒj (30 gr.).
Extr. seco de opio. g̃xc (5 gr.).
Clavo,
Macis,
Nuez moscada, ää. . ʒijß (10 gr.).
Almizcle. . . . . gv (25 cent.).
Agua dest. de rosas. c. s.

H. S. A. pastillas ó píldoras de gxj (3 dec.).

I. y *D.* Se aconsejan dos ó tres al acostarse para excitar las fuerzas y facilitar la digestion.

4935. T. DE MUSGO DE CÓRCEGA (*Deleschamps*).

℞ Azúcar de musgo de Córcega. . . . . ʒxv (450 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒj (30 gr.).
Mucílago de goma tragacanto poco espeso y aromatizado con esencia de limon, c. s.

H. S. A. pastillas de á g̃xij (6 dec.).

I. Lombrices intestinales, particularmente en los niños. *D.* Seis á doce y aun mas al dia.

4936. T. DE MUSGO MARINO PERLADO.

℞ Jar. de musgo marino. lbj (500 gr.).
Goma tragacanto. . . . ʒj (4 gr.).
Agua comun. . . . . ʒiß (45 gr.).

H. S. A. tabletas de 5ß (2 gr.) que se aromatizarán con el aroma que se quiera.

4937. T. DE MUSGO MARINO PERLADO.

℞ Sacarolado de musgo marino. . . . . ʒiv (125 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒxj (330 gr.).

H. S. A. pastillas, que se aromatizarán segun se quiera.

4938. T. DE NAFTALINA (*Dupasquier*).

℞ Naftalina. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒxij (375 gr.).
Mucílago de goma tragacanto,
Esencia de anis, ää. c. s.

H. S. A. tabletas de g̃xviij (1 gr.). Cada una contiene g̃½ (1 cent.) de naftalina.

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Una á veinte y aun treinta al dia.

4939. T. NITRADAS.

℞ Nitrato de potasa. . . ʒj (30 gr.).
Azúcar pulverizado. . ʒxj (345 gr.).
Goma tragacanto. . . gLjv (3 gr.).
Agua. . . . . ʒvj (24 gr.).

Háganse tabletas de á gxij (6 dec.).

4940. T. DE SUBNITRATO DE BISMUTO.

℞ Subnitrato de bismuto. 50

Azúcar.	438
Goma tragacanto.	4
Goma arábiga.	8
Tintura de vainilla.	8
Agua.	c. s.

para hacer tabletas de ℊxviij (1 gr.). Cada una representa ℊij (10 cent.) de subnitrato.

4941. *Otras* (TROUSSEAU).

℞ Subnitrato de bismuto.	℥j (30 gr.).
Azúcar.	lbj (500 gr.)
Mucilago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊxviij (1 gr.) y cada una contiene ℊj (5 cent.) de subnitrato.

I. Gastralgia, diarrea. *D.* Cuatro á ocho al dia. Convienen á los niños.

4942. T. DE OJOS DE CANGREJOS.

℞ Ojos de cangrejos lavados y porfirizad.	℥ij (64 gr.).
Azúcar en polvo. . .	℥xjv (448 gr.).
Goma y agua de azahar,	c. s.

Del mismo modo se preparan las PASTILLAS DE CARBONATO DE CAL.

4943. PASTILLAS OLOROSAS DE ALEMANIA.

℞ Estoraque calamita,	
Benjui, ãã.	℥jv (125 gr.).
Ládano.	℥ij (8 gr.).
Sándalo cetrino. . . .	℥j (30 gr.).
Carbon de tilo. . . .	lbjß (750 gr.).

Sirven, quemándolas, para perfumar las habitaciones.

4944. TABLETAS DE OPIO.

℞ Extracto de opio.	4
Azúcar.	60
Mucilago de goma tragacanto,	c. s.

H. S. A. tabletas de ℊvj (30 cent.). Cada una contiene ℊ1/8 (8 mil.) de opio.

4945. PASTILLAS DE SOBREOXALATO DE POTASA *ó Pastillas para la sed* (F. F.).

℞ Sobreoxalato de potasa porfirizado. .	℥iij (12 gr.)
Azúcar bl. en polvo.	lbij (1000 gr. .
Mucil. de goma trag.	c. s.
Esencia de limon. .	16 got. (0.6 gr.).

H. S. A. tabletas de ℊxij (6 dec.), y se guardarán en un frasco bien tapado.

I. Son atemperantes y refrigerantes como las sustancias que forman su base; pero en general se prefiere las limonadas secas preparadas con los ácidos cítrico ó tártrico. *D.* Tres á cuatro al dia.

Del mismo modo se preparan las tabletas de ÁCIDO CÍTRICO Y DE ÁCIDO TÁRTRICO.

4946. T. DE ÓXIDO DE ORO.

℞ Azúc. blanca en polvo.	℥j (30 gr. .
Peróxido de oro. . .	ℊvj (3 dec.).

Se mezclan exactamente, y con mucilago de goma tragacanto se forma una masa que se divide en sesenta tabletas.

D. Se toma una en ayunas cada dia, aumentando otra cada tres ó cuatro dias hasta llegar á diez.

4947. P. PARA DESINFECTAR EL ALIENTO (*Magendie*).

℞ Cloruro de cal seco. .	℥ij (8 gr.).
Azúcar.	lbß (250 gr.).
Almidon	℥j (30 gr.).
Goma tragacanto. . .	℥j (4 gr.).
Carmin.	ℊiij (45 cent.).

H. S. A. pastillas de ℊiij (15 cent.).

I. Sirven para quitar el olor desagradable que el humo del tabaco comunica al aliento. *D.* Tres á seis pastillas de dos en dos horas.

4948. P. PARA PERFUMAR EL ALIENTO *ó Pastillas de ambar.*

℞ Ambar	ℊxij (6 dec.).
Gengibre,	
Lirio de Florencia,	
Catecú, ãã.	℥j (4 gr..
Azúcar.	℥j (30 gr..
Mucilago de goma tragacanto.	c. s.

H. S. A. cien píldoras.

1949. T. PECTORALES INCISIVAS.

℞ Azúcar en polvo. . . .	lbj (500 gr.).
Maná en lágrimas. . .	℥jv (125 gr.).
Tridacio.	ʒij (8 gr.).
Ipecacuana en polvo.	ʒß (15 gr.).
Cebolla alb. en polvo.	ʒj (4 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.	

H. S. A. tabletas de gxviij (1 gr.).

D. Se dan cinco ó seis al dia contra los romadizos y catarros crónicos.

1950. T. PECTORALES, INCISIVAS Y CALMANTES (*Jobard*).

℞ Azúcar blanca. . .	℥iij (90 gr.).
Ipecacuana. . . .	ʒij (8 gr.).
Opio gomoso. . . .	ʒj (4 gr.).
Escamas secas de cebolla albarran.	ℊ Ljv (32 dec.).
Quermes mineral. .	gLxij (31 dec.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.	

H. S. A. cuatrocientas pastillas.

I. Romadizos, catarros pulmonares crónicos y coqueluche. *D.* Una cada dos horas.

Nota. Se hacen mas pequeñas para los niños.

1951. P. PECTORALES (*Tissot*).

En lbß (250 gr.) de agua hirviendo se vierte ℥jv (125 gr.) de flores de naranjo mondadas, ℥ij (60 gr.) de tusílago y ℥ij (60 gr.) de violetas. Se infunde durante veinticuatro horas y se cuela. Se añaden lbvj (3000 gr.) de azúcar y se hace jarabe y luego pastillas.

1952. T. PECTORALES (*Boubel*).

℞ Ricinos sin cáscara. .	℥jv (125 gr.).
Manito en polvo. . . .	℥ij (64 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . .	ʒiij (12 gr.).
Goma aráb. en polvo.	ʒß (16 gr.).
Azúcar en polvo. . . .	lbj (500 gr.).
Laca carminada. . . .	ℊviij (4 dec.).

H. S. A. tabletas de ʒß (2 gr.).

D. Tres á diez al dia.

1953. T. DE PELITRE (*Lacombe*).

℞ Azúcar pulverizada. .	℥x (300 gr.).
Tint. alcohól. de pelitr.	℥j (30 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.	

H. S. A. una masa blanda y homogénea, que se divide en ciento cincuenta pastillas redondas.

I. Angina gutural, angina laríngea, catarro pulmonar, perineumonía crónica, asma, coqueluche, disposicion á la tisis, y por último casos en que la falta de expectoracion depende de la atonía de las membranas mucosas, sin fiebre y sin lesion orgánica de los pulmones. *D.* Cuatro á nueve pastillas al dia.

1954. T. DE PIPEROIDE DE GENGIBRE (*Beral*).

℞ Extracto etéreo de gengibre.	gxviij (1 gr.).
Alcohol de 90° c. . . .	ʒijß (10 gr.).
Azúcar en polvo. . . .	℥jx (288 gr.).
Goma arábiga.	ʒiij (12 gr.).
Agua.	ʒvj (24 gr.).

Se disuelve el extracto etéreo de gengibre en el alcohol, se mezcla disuelto con el azúcar, y se deja que se evapore el alcohol al aire ó en una estufa. Por otra parte se prepara el mucílago de goma arábiga, se incorpora con el polvo y se hacen tabletas de ℊxviij (1 gr.).

Cada una contiene el principio activo de ℊj (5 cent. de gengibre.

1955. P. DE PIMIENTA COMPUESTAS.

℞ Canela.	ʒß (15 gr.).
Pimienta,	
Cálamo aromático.	
Macis,	
Nuez moscada, ää. .	ʒij (24 dec.).
Cubebas.	gxv (75 cent.).
Clavo,	
Galanga, ää.	ʒß (2 gr.).
Cardamomo menor. .	gxv (75 cent.).

Cásc. reciente de nar. ʒß (2 gr.).
Cáscara reciente de limon. . . . . ʒj (4 gr.).

Se hace una pasta homogénea y se añade:

Alm. dulc. mondadas. ℥v (150 gr.).
Cásc. de limon confitad. ℥j (30 gr.).
Azúcar disuelta en agua de menta. . . . . ℔j (500 gr.).

Se cuece y se hacen pastillas S. A.

I. Son carminativas, estomacales y sialagogas.

4956. P. PURGANTES.

℞ Calomelanos. . . . . gvj (3 dec.).
Chocolate. . . . . ʒj (12 dec.).

H. S. A. seis pastillas.

I. Afecciones verminosas, disenteria, hemacelinosis, iritis. Son muy cómodas para purgar á los niños muy pequeñitos. *D.* Una ó dos para los niños.

4957. T. PURGANTES DE CHOCOLATE *ó Chocolate purgante de Charles.*

℞ Raiz de jalapa en polv. ʒvj (24 gr.).
Calomelanos porfiriz. ʒß (16 gr.).

Mézclese é incorpórese en

Chocol. aun caliente. ℔ß (250 gr.).

H. S. A. tabletas de gxij (6 dec.).

D. Una á dos á los niños; tres ó cuatro á los adultos.

Seis tabletas contienen ḡvj (3 dec.) de jalapa y gjv (2 dec.) de protocloruro de mercurio.

4958. T. PURGANTES PARA LOS NIÑOS.

℞ Chocolate de salud. . ℔j (500 gr.).
Jalapa. . . . . ʒvj (24 gr.).
Mercurio dulce. . . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. tabletas de ʒj (4 gr.).

D. Una para un niño de uno ó dos años, y dos para los de tres á seis años.

4959. T. DE QUERMES MINERAL (F. F.).

℞ Quermes mineral. . ʒj 8 gr.
Azúcar. . . . . ℥xvij (532 gr.).
Goma arábiga,
Agua de flores de naranjo, ää. . . . . ʒj (32 gr.).

Se hacen tabletas de gxij (6 dec.), que se conservan en vasijas bien tapadas.

Cada una contiene un sesto de grano de quermes.

I. Favorecen la expectoracion en el asma húmedo y catarros pulmonares crónicos. *D.* De una á doce y aun mas.

4960. T. DE QUINA (F. F.).

℞ Quina en polvo. . . . ʒij 64 gr.
Canela. . . . . ʒij (8 gr.).
Azúcar blanca. . . . ℥xjv (429 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

Se preparan tabletas de gxvj (8 dec.), de las cuales cada una contiene ḡij (1 dec.) de quina.

I. Son tónicas y se emplean como las de catecú para corregir el mal olor del aliento, relajamiento de las encías, etc. *D.* De dos á seis al dia.

4961. T. DE RATANIA.

℞ Sacaruro de ratania. 8
Mucílago. 1

H. S. A. tabletas de á gvj (3 dec.).

4962. P. REFRIGERANTES Y LAXANTES DE CITRATO DE MAGNESIA.

Se preparan con el citrato de magnesia y cada una contiene ḡxviij (1 gr.). Como se necesita de ʒj á ʒjß (30 á 44 gr.) de citrato para purgar, se prescribirá el número que parezca suficiente.

4963. P. DE REGALIZ CON OPIO (F. P.).

℞ Extracto de regaliz. 960
Goma arábiga. 15000
Azúcar blanca. 10000
Extracto gomoso de opio. . . 1

Se disuelve el extracto de re-

galiz en parte del agua, se cuela el líquido y se disuelve la goma y el azúcar; se cuela por una manga, se añade el opio á la solucion filtrada, se evapora despues á la lumbre y se vierte en una losa de mármol untada de aceite de almendras dulces.

I. Son emolientes y expectorantes. Cada una contiene un cuarto de grano de extracto de opio.

1961. T. DE RUIBARBO (F. F.).

℞ Ruibarbo en polvo. .	ʒj (32 gr.).
Azúcar.	ʒxj (340 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.	

Se preparan S. A. pastillas de gxij (6 dec.), y cada una contendrá gj (5 cent.) de ruibarbo.

I. Se usan como estomacales y tónicas. *D.* Tres á cuatro al dia.

1965. P. DE SALUD (*Delvincourt*).

℞ Resina de escamonea de Alepo.	gvj (3 dec.).
Tint. alcohólica de sen.	40 gotas.
Carbonato de magnes.	ʒjß (6 gr.).
Azúcar blanca. . . .	ʒijß (40 gr.).
Regaliz en polvo. . . .	gviij (4 dec.).
Goma tragac. en polvo.	gv (25 cent.).
Esencia de anís. . . .	una gota.
Jarabe de violetas. . .	c. s.

H. S. A. pastillas muy iguales.

I. Estas pastillas están destinadas particularmente para purgar á las mujeres ó á los niños: una infusion ligera de flores de tilo puede reemplazar á los caldos de yerbas, de vaca ó de pollo. Convienen principalmente á las personas sujetas á regurgitaciones ácidas y á las que están molestadas frecuentemente por flatuosidades. *D.* Si se quiere solamente mantener el vientre libre, se tomarán una ó dos por la mañana en ayunas. Si se quiere purgar, se tomarán las ocho, del mismo modo que las pastillas acídulas purgantes. V. n. 4806.

1966. T. DE SANTONINA ó *Tabletas antihelmínticas de santonina (Miathe, Gallond).*

℞ Santonina.	ʒj (4 gr.).
Azúcar.	℥v (150 gr.).
Goma tragacanto. . . .	ʒß (2 gr.).

H. S. A. ciento cuarenta y cuatro pastillas.

I. Son vermífugas. *D.* Dos á diez al dia á los niños. Cada una contiene gv (25 cent.) de santonina.

1967. P. DEL SERRALLO.

℞ Vainilla.	ʒij (8 gr.).
Almizcle.	gviij (4 dec.).
Canela.	ʒj (4 gr.).
Azafran.	ʒiij (12 gr.).
Ambar gris.	ʒj (4 gr.).
Clavo.	ʒj (4 gr.).
Cubebas.	ʒj (30 gr.).
Gengibre.	ʒvij (12 gr.).
Macis.	ʒvj (24 gr.).
Azúcar,	
Mucil. de goma tragacanto,	ãã. c. s.

H. S. A. grageas.

1968. T. DE SPITZLAY.

℞ Anís en polvo. . . .	gxjv (3 gr.).
Azúcar.	lbj (500 gr.).
Extr. gomoso de opio.	gjx (50 cent.).
Goma arábiga. . . .	ʒij (60 gr.).
Goma tragacanto,	
Zumo de regaliz,	ãã. ʒij (8 gr.).

H. S. A. tabletas de gxviij (1 gr.).

1969. T. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. .	gxxxvj (2 gr.).
Azúcar en polvo. . .	lbj (500 gr.).
Mucílago de goma tragacanto, c. s.	

H. S. A. pastillas de á gxviij (1 gr.). *D.* De una á veinticuatro.

1970. T. DE TARTRATO BÓRICO-POTÁSICO *ó de crémor de tártaro soluble.*

℞ Crémor de tártaro soluble.	ʒij (64 gr.).
Azúcar.	℥xjv (429 gr.).

Goma tragacanto. . . 5j (4 gr.).
Agua destilada de corteza de cidra. . . . 5j (30 gr.).

Estas pastillas tienen un sabor ácido bastante agradable.

1971. P. DE TARTRATO DE HIERRO.

℞ Tartrato de hierro. . . ʒxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . 5j (32 gr.).
Esencia de menta. . . 2 gotas.
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. treinta y seis tabletas.

I. Dismenorrea, clorosis, escrófulas, pénfigo, dispepsia, catarro uiero-vaginal. *D.* Cinco á seis al dia.

1972. P. DE TRIDACIO.

℞ Tridacio. 10
Azúcar. 176
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. tabletas de á ʒxviij (1 gr.) *D.* Se toma de seis á ocho al dia.

1973. T. DE VAINILLA.

℞ Vainilla. . . . . 5j (30 gr.).
Azúcar. . . . . 5vij (210 gr.).
Goma tragacanto. . . 5ß (2 gr.).
Agua comun. . . . . c. s.

H. S. A. pastillas de ℥viij (4 dec.). Cada pastilla contiene ℈j (5 cent.) de vainilla.

I. Son excitantes y estomacales y se usan para aromatizar el chocolate, á cuyo fin se pone una ó muchas en una jícara para que se deshagan al momento de tomarle.

1974. P. VERMÍFUGAS.

℞ Santónico,
Chocolate, ää. . . . . 5j (30 gr.).
Azúcar. . . . . 5ij (60 gr.).
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. tabletas.

1975. *Otras* (BARTHEZ).

℞ Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Protocloruro de merc. 5ij (8 gr.).
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. pastillas de ℈xx (10 dec.).

D. Una ó dos al dia á los niños atormentados de lombrices. Los adultos pueden tomar de seis á ocho.

1976. T. VERMÍFUGAS PURGANTES (F. DE BRUNSWICK).

℞ Mercurio dulce,
Jalapa, ää. . . . . 5ij (24 dec.).
Santónico. . . . . 5ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . 5jv (125 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas de ℥vij (35 cent.).

1977. T. VERMÍFUGAS DE SANTÓNICO.

℞ Sulfato de hierr. en polv. 5j (4 gr.).
Santónico en polvo. . . 5ij (12 gr.).
Azúcar bl. en polvo. . . 5ij (60 gr.).

Se mezclan y se añade:

Mucílago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. sesenta y cuatro tabletas. Se dan de seis á ocho al dia.

1978. T. DE VIDA.

℞ Confeccion alquermes. 5j (30 gr.).
Ambar gris,
Almizcle, ää. . . . . 5ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
Mucílago de goma tragacanto. c. s.

H. S. A. tabletas.

I. Convienen para restaurar las fuerzas en los ancianos y en los convalecientes. *D.* Se da 5j á 5ij (4 á 8 gr.) al dia.

1979. T. VOMITIVAS.

℞ Tártaro emético. . . . ℥jx 50 cent.).
Ipecacuana. . . . . 5ß (2 gr.).
Azúcar. . . . . 5vj 25 gr.).
Mucílago de goma tragacanto,
Agua de flor de naranjo, ää. c. s.

I. Embarazo gástrico, calentura biliosa. *D.* Una de cuarto en cuarto de hora.

PEDILUVIOS.

1980. PEDILUVIOS ALCALINOS.

℞ Carbonato de potasa. ℥jv á ℔ß (125 á 250 gr.).
Agua caliente. c. s.

I. Se usan como revulsivos en las congestiones sanguíneas hácia el cerebro, meningitis, hemicránea, poligalaccia, cardialgia, cianosis.

1981. *Otro*, n. 2.

℞ Subcarbonato de sosa. ℥jv (125 gr.).
Agua caliente. . . . . c. s.

I. Se usa principalmente para reblandecer los callos cuando impiden la progresion.

1982. P. AMONIACAL (*Ruelle*).

Consiste en espolvorear las medias al tiempo de acostarse con una cucharadita de una mezcla de dos cucharadas de cal apagada y una de sal amoniaco, y conservarlas puestas toda la noche.

I. Pleuresía, neumonía, pleurodinia, sarampion, escarlatina, clorosis, amenorrea. Sirve para llamar la transpiracion á los piés. En los casos mas ligeros basta hacer esto algunas noches seguidas para conseguir el objeto que se desea.

1983. P. CON ÁCIDO CLORHÍDRICO (H. DE M.).

℞ Acido clorh. de 20°. ℥ij (60 gr.).
Agua caliente. . . . ℔jv (1500 gr.).

Se mezcla el ácido con el agua al tiempo de tomar el pediluvio.

Se usa como resolutivo.

1984. P. HIDROCLÓRICOS.

℞ Acido clorhídrico del comercio. ℥jv á ℔ß (125 á 250 gr.).
Agua c. s.

M. Se usan como un buen derivativo en los casos de congestiones sanguíneas hácia las partes superiores del cuerpo.

I. Poligalaccia, pleurodinia, clorosis, gastrorragia, palpitaciones, cardiopalmía, astenia, cistitis, meningitis, hemicránea, congestion, epistaxis, cólera, crup. *D.* Para un pediluvio de veinte á treinta minutos como revulsivo.

1985. P. IRRITANTES.

℞ Rábano machacado. ℥jv (125 gr.).
Agua caliente. . . . ℔jv (2000 gr.).

I. Sirven para llamar la traspiracion á los piés, y como revulsivo en los mismos casos que los sinapizados.

1986. P. MERCURIAL.

℞ Dentocloruro de mercurio. ℊj á ℊjv (5 á 20 cent.).
Agua pura. . . . . 2 cuart. (1 lit.).

Disuélvase. *I.* Se usa contra las exóstosis, tumores sifilíticos, ulceraciones de las glándulas del velo del paladar, dolores osteocopos, etc. A veces se necesitan doce, quince ó veinte baños para obtener la curacion.

1987. P. NITRO-MURIÁTICOS (*Scott*).

℞ Acido clorhídrico. ℥iij (90 gr.).
Acido nítrico . . . ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . ℥vj (180 gr.).

Mézclese y viértase esta mezcla en

Agua caliente. . 40 cuart. 20 lit.

Se usan en los infartos del hígado y del bazo. Se deben tomar estos pediluvios antes de acostarse, y cada uno puede durar veinte á cuarenta y cinco minutos, pudiendo servir el mismo líquido cuatro ó cinco veces.

Se los administra en una vasija

tapada, sumergiendo las piernas hasta las rodillas. Se toman todos los dias durante las dos primeras semanas, pero mas tarde se da uno cada dos dias.

I. Pleurodinia, angina, sarampion, escarlatina, palpitaciones, infartos del hígado y del bazo, acne, aftas y otras afecciones en que convienen los baños sinapizados.

4988. P. NITRO-MURIÁTICOS (H. DE M.).

2° Acido nítrico de 34°.
Acido clorhídrico de 20°. ℥. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua caliente. . . . lbjx (4500 gr.).
Mézclese al tiempo de hacer uso de ellos. V. n. 438.

4989. P. CON SAL COMUN.

2° Sal comun. . . . . ʒjv (125 gr.).
Agua . . . . . c. s.

4990. P. SINAPIZADOS.

2° Harina de mostaza. ʒij á ʒjv (60 á 125 gr.).
Agua tibia. c. s.

Si el agua estuviese muy caliente, la accion estimulante seria viva pero pasajera; mas si se administran tibios, este pediluvio produce una excitacion permanente de las extremidades inferiores y determina por consiguiente una derivacion mas enérgica.

I. Congestiones sanguíneas hacia las partes superiores del cuerpo, hidroftalmia, amaurosis, conjuntivitis, miliriasis, fiebres, fluxion, coqueluche, asma, angina, afonia, tisis, acne, sudor inglés, sarampion, escarlatina, coriza, ronquera, tialismo, cistitis, poligalaccia, aftas, laringitis, esofagitis, irritacion, embriaguez, melena, asfixia, aturdimiento, apoplejía, vértigos, meningitis, epistaxis, hemicránea, insolacion, pleuresía, pleurodinia, cardialgia, carditis, conmocion, cianosis, erisipela, gastrorragia, isquidrosis, otalgia, odontalgia, otitis, mammitis.

Los ácidos y los álcalis se oponen al desarrollo de la esencia de la mostaza, por lo que no se mezclarán con estos baños.

LOS PEDILUVIOS SINAPIZADOS DE LOS H. M. solo contienen ʒij (60 gr.) de mostaza molida.

4991. P. SINAPIZADO.

2° Harina de mostaza. . . ʒij (64 gr.).
Potasa del comercio. . ʒvß (22 gr.).
Se diluyen en el agua y se vierte en el baño.

PESARIOS.

4992. PESARIOS MEDICINALES.

Sympson ha propuesto varias formulas para preparar pesarios medicinales, y poner de este modo en contacto de la parte enferma la sustancia medicinal apropiada á la naturaleza de la enfermedad. Estos pesarios tienen el volúmen de una nuez y pueden ser introducidos por las mismas enfermas. Se usa uno ó dos diariamente. Se preparan combinando el medicamento que forma su base con la manteca, de modo que se forme una pomada á que se da la forma conveniente mezclándola con ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) de cera amarilla por ʒj (30 gr.) de la pomada. Para que se los pueda manejar se los cubre de una mezcla fundida de cera y resina, liquidada por el calor.

4993. P. DE ÓXIDO DE ZINC.

2° Óxido de zinc.
Cera blanca. ℥. . . . . ʒj (4 gr.

Manteca. . . . . 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4994. P. DE ACETATO DE PLOMO.

℞ Acetato de plomo. . . . 3ß (2 gr.).
Cera blanca. . . . . 3jß (6 gr.)
Manteca. . . . . 3vj (24 gr.).
Mezclese y divídase en cuatro pesarios.

4995. P. MERCURIALES.

℞ Ungüento mercurial doble.
Cera blanca. ℥. . . . 3ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 3ß (16 gr.).
Mezclese y divídase en cuatro pesarios.

4996. P. DE IODURO DE PLOMO.

℞ Ioduro de plomo. . . . 3ij (12 dec.).
Cera amarilla. . . . . 3jß (6 gr.).
Manteca. . . . . 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4997. P. DE TANINO.

℞ Tanino. . . . . 3ij (24 dec.
Cera amarilla. . . . . 3jß (6 gr.).
Manteca. . . . . 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

4998. P. ASTRINGENTES.

℞ Sulfato de alúmina.
Catecú en polvo.
Cera amarilla. ℥. . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3vß (22 gr.).
Mezclese y divídase en cuatro pesarios.

4999. P. ANODINOS.

℞ Extr. de beilasona. . 3ij (24 dec.).
Cera amarilla. . . . . 3jß (6 gr.).
Manteca. . . . . 3vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro pesarios.

Antiguamente se habian propuesto otros varios pesarios, y los distinguian en emolientes, astringentes, y los que provocan la menstruacion. Preparaban los primeros con cera, grasa de oso, manteca fresca, resina seca, sebo de ciervo, fenogreco y otras sustancias análogas, y los últimos con miel, artemisa, dictamo blanco, zumo de berza, regaliz, zumo de puerro, ruda, escamonea, etc. Los de la segunda especie servian para detener los flujos por la matriz y prevenir su caida, y tenian una consistencia un poco espesa. Antes de introducir los pesarios se les ataba un cordon para sacarlos cuando se juzgase á propósito.

Dorvault ha propuesto preparar pesarios medicinales como los antiguos farmacólogos, para lo que propone la siguiente fórmula de vehículo plástico:

Gelatina fina.	2
Goma.	2
Azúcar.	1
Agua comun y mejor aun agua destilada de rosas y flor de naranjo, de laurel real, etc. . .	2

Se funde en el baño maria. Para preparar pesarios medicinales se tritura con agua el agente medicinal soluble ó no, se añade la gelatina, la goma y el azúcar y se liquida todo. Se cortan pedazos de corcho de cuatro cent. de largo por uno y medio de diámetro, redondeados por las dos extremidades de modo que se les dé la fórmula de un ovoide prolongado. Al rededor de este ovoide, todo á lo largo, se fija una cintita que se ata en la base, de modo que deje libres los dos extremos de doce á quince cent. de largo. Finalmente en la misma base del ovoide de corcho se fija una horquilla larga y gruesa de las que usan las señoras para el pelo.

Fundida la materia plástica se sumerge en ella el corcho, sosteniéndole por la horquilla y dándole vueltas en el aire para que se seque la materia plástica. Se sumergirá distintas veces el corcho has-

ta que la masa tenga dos á cuatro milímetros de grueso. Se procurará no manchar los extremos de la cinta para lo que se la cubrirá con un papel. Estos sirven para poder extraer el pesario de la vagina y aun para fijarle.

Luego que los pesarios están frios, se los cubre ligeramente de aceite para que no se peguen, se quita la horquilla y se desdoblan las puntas de la cinta y pueden usarse.

Se impide que se salgan de la vagina sosteniéndoles con un cinturon.

Casi todos los agentes medicinales pueden usarse de este modo bajo la forma de pesarios, y en particular los calomelanos, los ioduros de mercurio, de potasio ó de plomo, el borax, el óxido de zinc, las sales de morfina, de quinina, los extractos de belladona y de opio. Pero cuando se usan sustancias astringentes, tales como el tanino, el sulfato de alúmina, el sublimado corrosivo y otras sales metálicas que forman compuestos insolubles con la gelatina, se recurrirá á la mezcla soluble siguiente:

Goma.	1
Azúcar.	2
Agua.	1 á 2

Se funde en el baño maria. Esta mezcla debe ser muy espesa, pues de otra manera tardarian mucho en secarse los pesarios.

Del mismo modo se podrian preparar supositorios ó candelillas, pero entonces no se pondrá el corcho central. Se podrian preparar con guta percha reblandecida en agua caliente, y arrolladas de modo que tomasen la forma del objeto que se necesitara.

PIEDRAS MEDICINALES.

5000. PIEDRA DIVINA, PIEDRA OFTÁLMICA *ó Sulfato de cobre aluminoso.*

℞ Sulfato de cobre cristalizado, Nitrato de potasa, Alumbre, ää.	℥iij	(96 gr.
Alcanfor.	℥j	(4 gr.

Se pulverizan las tres sales, se ponen al fuego en un crisol hasta que experimenten la fusion acuosa, se añade el alcanfor en polvo, se vierte la materia sobre un mármol untado con aceite, y despues de fria se guarda para el uso en frascos bien tapados.

Se usa bajo la forma de colirio. V. n. 1246.

La piedra divina entra en la composicion de las aguas vulnerarias, ungüentos y emplastos.

5001. P. MEDICINAL.

℞ Alumbre.	℥j	(30 gr.
Albayalde, Bol arménico, ää. . .	℥j	(30 gr.
Sulfato de zinc.	℥jv	(125 gr.
Sal amoniaco.	℥ß	(15 gr.
Vinagre.	℥j	(30 gr.

Se seca al fuego.

Se usaba disuelta en las úlceras sórdidas y contra las fístulas rebeldes.

5002. P. MEDICINAL *ó de sulfato de alúmina acetado* (F. E.).

℞ Oxido rojo de hierro.	℥ij	(60 gr.
Litargirio, Bol arménico, Sulfato de alúm.. ää.	℥jv	(125 gr.

Se pulverizan y se ponen en una olla de barro, se echa encima c. s. de vinagre fuerte hasta que cubra á los sólidos una capa de líquido de dos dedos.

Tapada la olla se la deja en maceracion por dos ó tres dias, agitando la mezcla de cuando en cuando: despues se añade:

Nitrato de potasa. . . . Ibß (250 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ℥ij (60 gr.).

Se evapora hasta la sequedad y se deja á fuego fuerte por una hora. Se usa disuelta en agua contra las úlceras antiguas, etc.

5003. P. ESTÍPTICA DE HESSELBACH *ó Polvo cáustico de Ammon.*

℞ Alumbre. . . . . ℥ij (60 gr.).
Sulfato de hierro. . . . ℥j (30 gr.).
Sulfato de cobre. . . . ʒß (15 gr.).
Verde gris. . . . . ʒj (4 gr.).
Clorhidrato de amoniac. ʒß (2 gr.).

Se funde en un crisol y se echa la mezcla sobre una losa de mármol.

I. Hemorragias traumáticas, caries inveterada, cáncer, lupus, ulceraciones. *D.* Una parte disuelta en veinticuatro de agua; se usa al exterior.

5004. P. DE SALUD.

℞ Sal amoniaco. . . . . ℥j (30 gr.).
Bol arménico,
Alumbre, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).
Nitro. . . . . ℥iij (90 gr.).
Sulfato de hierro. . . ℥vj (180 gr.).
Albayalde. . . . . ℥ij (60 gr.).
Vinagre. . . . . c. s.

para hacer una pasta que se seca al fuego.

D. Se disuelve ℥j (30 gr.) en Ibj (500 gr.) de agua, y se usa en la curacion de las úlceras, flujos de diversa naturaleza, y contra la sarna, tiña, erisipela, etc.

5005. P. VULNERARIA.

℞ Alumbre,
Sulfato de zinc, ãã. . ℥vj (180 gr.).
Acetato de cobre,
Sal amoniaco, ãã. . . . ℥j (4 gr.).

Se funde en un crisol, y cuando sea completa la fusion se añade:

Azafran. . . . . ʒß (2 gr.).

Se usa para deterger, secar y consolidar las úlceras.

PIELES.

5006. PIEL DIVINA.

℞ Pez resina. . . . . ℥xij (375 gr.).
Pez de Borgoña. . . . ℥iv (125 gr.).
Cera amarilla,
Sebo de carnero,
Trem. de Venecia, ãã. ℥ij (60 gr.).
Aceite de olivas. . . . ℥j (30 gr.).

Se funde, se cuela y se extiende sobre una piel.

I. Se aplica contra las neuralgias reumáticas.

5007. P. DE GOULARD.

℞ Aceite comun. . . . . Ibj (500 gr.).
Cera vírgen. . . . . Ibß (250 gr.).
Sal de Saturno. . . . ℥j (30 gr.).
Alcanfor,
Sal amoniaco, ãã. . . ʒj (4 gr.).

M. S. A. y extiéndase sobre una piel ó sobre una tela.

I. Reumatismos, anquilosis y úlceras atónicas.

PÍLDORAS.

5008. PÍLDORAS ABSORVENTES (*Chevallier*).

℞ Carbonato de sosa,
Ruibarbo en polvo,
Extr. de genciana, ãã. ℥j (42 dec.).
Calomelanos. . . . . ℈ij (15 cent.).

H. S. A. veinte píldoras.

I. Dispepsia. *D.* Dos cada dia.

5009. P. DE ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton. . . . una gota.

Conserva de rosas. . . . ǧij (1 dec.).
Malvabisco en polvo. . c. s.
H. S. A. una píldora.
D. Una ó dos para purgar.

5010. P. DE ACEITE DE CROTON CON MAGNESIA.

℞ Aceite de croton. . . . ℈ij (24 dec.).
Carbonato de magnes. ʒj (4 gr.).
D. ǧj (5 cent.) para los niños y ǧij (10 cent.) para los adultos.

5011. P. DE ACETATO DE COBRE.

℞ Acetato de cobre. . . ǧxviij (1 gr.).
Agua hirviendo. . . . c. s.
Se disuelve y se añade:
Opio. . . . . ǧvj (3 dec.).
Zumo de regaliz. . . . ʒj (4 gr.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.
H. S. A. ciento ochenta píldoras.
D. Tres á doce píldoras tres veces al dia.

5012. P. DE ACEITE DE HELECHO.

℞ Aceite de helecho macho. . . . . 24 gotas.
Raiz de malvabisco en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca reciente. . . ℈ij (24 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Ténia. *D.* Veinticuatro ó cuarenta y ocho píldoras en dos veces, la primera por la noche y la otra al dia siguiente por la mañana; una hora despues se purga con aceite de ricino.

5013. P. DE ACEITE DE LIGNITO *ó Remedio antigotoso* (*Thaer*).

℞ Aceite pirogenado de lignito, Sulfuro negro de antimonio, ãã. . . . . ʒj (32 gr.).
Incienso en polvo. . . . ʒij (8 gr.).
Dulcamara en polvo. . . ʒvj (24 gr.).
H. S. A. píldoras de ǧij (1 dec.) que se rodearán de polvo de regaliz.
I. Gota. *D.* Seis á diez, tres veces al dia.
Para que produzca un efecto durable se debe continuar su uso durante un mes.

5014. P. DE ACETATO DE MORFINA.

℞ Extracto de azafran ó conserva de flor de naranjo. . . . . ǧxvj (8 dec.).
Acetato de morfina. . ǧj (5 cent.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Casos en que está indicado el opio. *D.* Se puede dar una ó dos cada seis horas. Tambien se puede, observando sus efectos, dar hasta ǧiij (15 cent.) de acetato de morfina al dia en las neuralgias, cánceres y otras enfermedades.

5015. *Otras*. n 2.

℞ Acetato de morfina. . ǧj (5 cent.).
Polvo de malvabisco. ǧxviij (1 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. ocho píldoras.
D. Se toma una á dos cada seis horas.

5016. P. DE ACETATO DE MERCURIO.

℞ Acetato de mercurio, Opio, Alcanfor, ãã. . . . ǧxxx (15 dec.).
Jarabe de amapolas. c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Sífilis. *D.* Una ó dos al dia.

5017. P. DE ACETATO DE PLOMO (*Fouquier*).

℞ Acetato de plomo, Polvo de malvabisco, ãã. ʒj (4 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Sudores y diarreas de los tísicos. *D.* Cuatro á doce al dia. Se administran estas píldoras, cada una de las cuales contiene ǧj (5 cent.) de acetato de plomo, á la hora en que empiezan comunmente los sudores; generalmente bastan ocho ó diez.

LAS PÍLDORAS DE ACETATO DE PLOMO DE LOS H. DE M. contienen ʒß (2 gr.) de acetato de plomo, ʒß (2 gr.) de polvo de malvabisco y c. s. de jarabe para treinta y dos píldoras.

5018. P. DE ACETATO DE PLOMO.

℞ Acetato de plomo. . . ℊij (1 dec.).
Extracto de opio. . . . ℊjv (2 dec.).
Conserva de rosas. . . ℊvj (3 dec.).
Mézclense y háganse seis píldoras.
D. Una ó dos al dia.

5019. *Otras*, n. 2.

℞ Acetato de plomo. . . ℊxviij (1 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℊij (4 dec.).
Polvo de beleño. . . . ℊx (3 dec.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. diez píldoras.
I. Sudores y diarreas colicuativas de los tísicos, hidropesías, ascitis. *D.* Dos á cuatro al dia.

5020. P. DE ACETATO DE PLOMO É IPECACUANA (H. DE AL.).

℞ Acetato de plomo,
Ipecacuana, ãã. . . . ℥ß (2 gr.).
Opio. . . . . ℊv (25 cent.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Hemorragias uterinas pasivas. *D.* Una cada tres horas.

5021. P. DE ACETATO DE POTASA.

℞ Acetato de potasa,
Goma amoniaco,
Píldoras de Rufus, ãã. ℊxviij (1 gr.).
Jabon blanco. . . . . ℥ß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Hidropesías, obstruccion de las vísceras abdominales, hepatitis crónica, muermo, soriasis. *D.* Cuatro mañana y noche.

5022. P. DE ACIBAR Y ASA FÉTIDA.

℞ Acíbar sucotrino. . . . . ℥j (4 gr.).
Asa fétida. . . . . ℥ß (2 gr.).
Aceite de alcaravea. . . 15 gotas.
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Destete, acne, vómitos, histérico, hipocondría, encefalitis, hemorroides. *D.* Seis al dia. Despues de cada dosis se hace tomar una buena dosis de una infusion de melisa azucarada.

5023. P. DE ACIBAR COMPUESTAS (F. P.).

℞ Acíbar sucotrino. . . . . ℥j (32 gr.).
Jabon de sosa. . . . . ℥ij (8 gr.).
Extracto de genciana. . ℥ß (16 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. *I.* Son tónicas, catárticas, útiles en las obstrucciones del bajo vientre. *D.* Hasta ℈ij (24 dec.).

5024. *Otras* (F. DE L.).

℞ Acíbar en polvo. . . . . ℥j (30 gr.).
Extracto de genciana. . ℥ß (15 gr.).
Aceite de alcaravea. . 40 gotas.
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).

5025. P. DE ACIBAR CON MIRRA (F. DE L.).

℞ Acíbar. . . . . ℥j (60 gr.).
Azafran,
Mirra, ãã. . . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
Se pulveriza aparte el acíbar y la mirra, se tritura todo junto y se forma una masa bien homogénea. Se hacen píldoras de ℊiij (15 cent.).
I. Son purgantes. *D.* Dos á seis al dia.

5026. P. DE ACIBAR, GENCIANA Y JABON.

℞ Acíbar,
Ruibarbo, ãã. . . . . ℥ij ß (10 gr.).
Extracto de genciana. ℊxc (5 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℥ß (15 gr.).
Esencia de anis. . . . . 8 gotas.
H. S. A. píldoras de ℊiij á ℊv (15 á 25 cent.).
I. Infartos apiréticos de las vísceras abdominales, cefalalgia, dispepsia, histérico, dismenorrea, hidropesía, hepatitis. *D.* Una á ocho, aumentando progresivamente y continuando su uso durante mucho tiempo.

5027. P. DE ACIBAR Y HIERRO.

℞ Sulfato de hierro. . . . ℊ℔jv (3 gr.).
Acíbar de las Barbadas. ℥ß (2 gr.).
Polvo aromático. . . . . ℥jß (6 gr.).
Conserva de rosas. . . . ℥ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊv (25 cent.).

I. Es un tónico purgante muy excelente. *D.* Dos á tres píldoras.

5028. *Otras* (F. P.).

℞ Extracto de acíbar. 240
Goma amoniaco. 160
Hierro preparado. 200
Esencia de anis. 6
Jarabe de canela. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras.

I. Son tónicas y resolutivas, útiles en las obstrucciones. *D.* ℊxij á ℥j (6 dec. á ¼ gr.).

5029. P. DE ACIBAR Y JABON (F. F.).

℞ Acíbar. . . . . ℥jv (16 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℥vj (24 gr.).
Esencia de anis. . . . . 8 gotas.
Jarabe de espino serval. c. s.
H. S. A. píldoras de ℊv (2 dec.). Cada píldora contiene un grano y un tercio de acíbar.

I. Se administran como fundentes en los infartos de las vísceras del bajo vientre.

5030. P. DE ACIBAR MARCIALES, *Píldoras emenagogas*, *píldoras aperitivas*, *píldoras de hierro compuestas*.

℞ Acíbar sucotrino. . . . ß (2 gr.).
Limaduras de hierro. . . ℥j (4 gr.).
Canela. . . . . ß (2 gr.).
Jarabe de artemisa. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).

I. Clorosis, histérico, amenorrea, esplenitis, vértigos, cefalalgia, iritis, ataxia, hemorroides.

5031. P. DE ACIBAR Y TREMENTINA (*Bois de Lourg*).

℞ Trementina cocida. . . . ℥ij (8 gr.).
Acíbar en polvo. . . . . ß (2 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Uretritis-aguda. *D.* Diez á doce al dia.

5032. P. DE ÁCIDO ARSENIOSO.

℞ Acido arsenioso. . . . ℊj (5 cent.).
Almidon. . . . . ℊx (5 dec.).
Mézclese y divídase en veinte píldoras.

5033. P. DE ÁCIDO BENZÓICO (*Frême*).

℞ Acido benzóico. . . . . ℊxc (5 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Son muy útiles en la incontinencia de orina. *D.* Una mañana y noche, pero se puede aumentar la dosis hasta cuatro.

5034. P. DE ACONITINA (*Turnbull*).

℞ Aconitina. . . . . ℊj (5 cent.).
Polvo de regaliz. . . . ℊxviij (1 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Parálisis, tisis, escrófulas, reumatismo, gota, ciática, hidropesías, amaurosis, cáncer, cólicos, lepra, muermo y neuralgias. *D.* Una de hora en hora.

5035. P. DE ACÓNITO.

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . ℥j (4 gr.).
Extracto de guayaco. . . ℥ij (8 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Gota, reumatismos, sífilis, dolores osteocopos. *D.* Una á cuatro píldoras.

5036. P. DE ACÓNITO (*Biett*).

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . ß (2 gr.).
Polvo de malvabisco. . . c. s.
Mézclese y divídase en cuarenta y ocho píldoras.

I. Sifilides y dolores osteocopos. *D.* Una á dos, mañana y noche.

5037. P. DE ACÓNITO ANTIMONIALES, PÍLDORAS ANTIREUMÁTICAS DE STOLL (F. P.).

℞ Extracto de acónito. 4
Sulfuro de antimonio hidratado. 4
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

I. Reumatismo crónico. *D.* Dos píldoras, tres veces al dia, bebiendo despues un cocimiento apropiado.

5038. P. DE ACÓNITO MERCURIALES (*Duble*).

℞ Extracto de acónito. . . ℈j (12 dec.).
Sublimado corrosivo. . ℊij (1 dec.).
Acónito en polvo. . . . c. s.

Se hace una mezcla muy exacta y se divide en veinticuatro píldoras iguales. Cada una contiene ℊß (25 mil.) de sublimado y ℊj (5 cent.) de extracto de acónito.

I. Herpes inveterados, complicados con afecciones sóricas y venéreas, enfermedades venéreas antiguas, infartos linfáticos, escrófulas, eczema, amaurosis, sífilis, tisis, cáncer, cólico, gota, iritis. *D.* Se da una píldora, mañana y noche. Cada diez dias se aumenta una píldora.

5039. P. DE ACÓNITO OPIADAS (H. M.).*

℞ Extracto de acónito,
Extracto gomoso de opio, ãã. . . . . ℈j (12 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras iguales.

D. Una ó dos cada cuatro horas.

5040. P. AFRODISÍACAS.

℞ Almizcle. . . . . ℊvj (3 dec.).
Azúcar con vainilla. . . ℈j (12 dec.).
Jarabe de cáscara de naranja, c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una, mañana y noche.

5041. *Otras* (PIERQUIN).

℞ Cantáridas,
Estramonio, ãã. . . . ℊj (50 mil.).
Beleño negro,
Beleño blanco, ãã. . ℊß (25 mil.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.

D. Una ó dos al acostarse, bebiendo despues una taza de café frio. Estas píldoras excitan el predominio de ciertos órganos, tales como las partes sexuales y el cerebelo. En algunos casos se añade al café ℊ$^1/_8$ (6 mil.) de polvo de cantáridas.

5042. P. DE AGÁRICO BLANCO.

℞ Polvo de agárico blanc. ℈ß (2 gr.).
Iodo. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Goma tragacanto. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).

I. Escrófulas, tisis. *D.* Dos á cuatro mañana y noche.

5043. P. DE AGÁRICO BLANCO OPIADAS (*Rayer*).

℞ Agárico blanco. . . . ℊxviij (1 gr.).
Extr. gomoso de opio. ℊiij (15 cent.).
H. S. A. seis píldoras.

I. Tisis pulmonar acompañada de sudores abundantes. *D.* Una y luego dos por tarde.

5044. P. DE AGRIMONIA.

℞ Extracto de agrimonia,
Extracto de trébol de agua,
Extracto de taraxacon, ãã. ℈ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . . ℈j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).

I. Esplenitis, hepatitis, pleuresía, bronquitis. *D.* Dos á seis al dia.

5045. P. ALCANFORADAS (*Cullerier*).

℞ Alcanfor. . . . . ℈ß (15 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℊxviij (1 gr.).
Goma en polvo,
Jarabe simple, ãã. . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Inflamaciones de la uretra, erecciones dolorosas, irritacion del cuello de la vejiga. *D.* Cuatro ó cinco píldoras al dia.

5046. P. ALCANFORADAS (*Ricord*).

℞ Alcanfor,
Tridacio, ää. . . . . ᵍr.jv (3 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Se usan para prevenir las blenorragias y erecciones. *D.* Cinco ó seis al dia, principalmente por la noche. Si el enfermo no puede soportarlas tomará media lavativa con ᵍxij (60 cent.) de alcanfor.

5047. P. DE ALMENDRAS AMARGAS (*Kranischfeld*).

℞ Alm. amargas prepar. 5j (4 gr.).
Sulfato de sosa. . . . . 5ß (2 gr.).
Ipecacuana. . . . . ᵍij (10 cent.).
Extracto de rubia. . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Enfermedades cutáneas rebeldes que han debilitado el organismo y producido enflaquecimiento, amarillez de la cara, un estado caquéctico, dolores intestinales, insomnio, digestiones muy penosas, calenturas intermitentes, afecciones cancerosas, caquexia, catarros y afecciones catarrales. *D.* Tres mañana y noche.

5048. P. DE ALMIZCLE.

℞ Almizcle. . . . . 5j (4 gr.).
Oxido de zinc. . . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Enfermedades nerviosas, como epilepsia, histérico, convulsiones y neuralgias. *D.* Ocho á diez al dia.

5049. P. ALOÉTICAS (*Requin*).

℞ Acíbar sucotrino,
Regaliz en polvo, ää. . ᵍxviij (1 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Se acousejan para provocar ó producir el flujo hemorroidal, y para hacer una revulsion hácia el intestino recto. *D.* Cinco á diez antes de acostarse.

5050. P. ALOÉTICAS FUNDENTES (*Buchan*).

℞ Acíbar en polvo,
Ruibarbo en polvo,
Jabon medicinal, ää. . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de á ᵍvj (3 dec.).
I. Ictericia ó infarto del hígado. *D.* Tres ó cuatro al dia.

5051. P. ALTERANTES.

℞ Sulfuro de potasio,
Res. de guayaco, ää. ᵍxx (10 dec.).
Bicarbon. de potasa. ᵍv (25 cent.).
Carbon preparado. . ᵍx (50 cent.).
Extracto de opio. . . ᵍiij (15 cent.).
Extr. de dulcamara. . c. s.
H. S. A. quince píldoras.
I. Coqueluche, crup, catarro sofocante, bronquitis, tisis, sociasis, herpes, cáncer. *D.* Tres mañana y noche.

5052. *Otras*, n. 2.

℞ Resina de guayaco. . . ᵍxc (3 gr.).
Extr. de dulcamara. . 5ijß (10 gr.).
Azufre dorado de antimonio. . . . . 5ß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Flores de azufre. . . . 5j (4 gr.).
ó Extracto de acónito. . 5ß (2 gr.).
Jarabe de fumaria. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Gota, reumatismo crónico, lepra elefantiasis, exantema, herpes crónicos, tisis. *D.* Cinco mañana y noche.

5053. *Otras* (ALIBERT).

℞ Jabon medicinal. . . . . 5ij (8 gr.).
Acíbar sucotrino,
Crémor de tártaro, ää. . 5j (4 gr.).
Jarabe de las cinco raices. c. s.
H. S. A. noventa y seis píldoras.
D. Dos á cuatro al dia.

5054. *Otras* (HILDEMBRAND).

℞ Resina de guayaco,
Azufre dorado de antimonio, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . Dß (6 dec.).
Extracto de taraxacon. c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Dolores articulares gotosos. *D.* Tres á cuatro píldoras, tres veces al dia.

5055. P. ALTERANTES (*Sandrock*).

℞ Bicloruro de merc. ᵍiij (15 cent.).
Opio. . . . . ᵍx (50 cent.).
Extracto de cicuta. ᵍxxx (150 cent.).
Ruibarbo en polvo. ᵍlx (30 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Escirros y particularmente los del pecho. *D.* Una píldora tres veces al dia.

5056. P. ALTERANTES ó *Píldoras para la tos* (F. M.).

℞ Zumo de regaliz,
Incienso, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Mirra,
Azafran,
Opio, ãã. . . . . ʒjv (48 dec.).
Jarabe de amapolas. . c. s.
H. S. A. una masa para píldoras.
I. Catarros, coqueluche, toses rebeldes. Se pueden usar en lugar de las píldoras de cinoglosa. *D.* ᵍvj á ᵍxij (3 á 6 dec.).

5057. P. DE ALUMBRE (*Helvecio*).

℞ Alumbre. 2
Sangre de drago. 1
Miel rosada. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍvj (3 dec.).
I. Cuatro á doce píldoras en las hemorragias pasivas, y en los flujos mucosos crónicos.

5058. P. DE ALUMBRE (*Formey*).

℞ Alumbre en polvo,
Cloruro de hierro y amoniaco,
Polvo aromático,
Extracto de quina preparado en frio, ãã. . . . ʒß (2 gr.).
Aceite de canela. . . . . 12 gotas.
H. S. A. píldoras de ᵍij (1 dec.) que se cubrirán con polvo de canela.

5059. P. DE ALUMBRE Y TRIDACIO (*Recamier*).

℞ Alumbre,
Tridacio, ãã. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Dispepsias, gastralgias muy rebeldes. *D.* Una á seis al dia.

5060. P. ALUMINOSAS.

℞ Bálsamo de copaiba. 1
Cubebas en polvo. 1
Alumbre en polvo. 1
Magnesia calcinada. 1
H. S. A. píldoras de ᵍvj (3 dec.).
I. Blenorragia. *D.* Cinco á seis píldoras al dia.

5061. P. ALUMINOSAS OPIADAS.

℞ Alumbre. . . . . ᵍvj (30 cent.).
Opio. . . . . ᵍij (10 cent.).
Catecú. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Jarabe de rosas rojas. c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Ulceras atónicas, catarro útero-vaginal, leucorrea, blenorrea, hemorragias pasivas, metritis, miliar, disenteria. *D.* Dos á tres al dia.

5062. P. AMARGAS (*Gall*).

℞ Extracto de trébol de agua,
Extr. de ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
Polvo de acíbar. . . . ʒij (24 dec.).
Polvo de ruibarbo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍiij (15 cent.).
I. Embarazo intestinal, acompañado de pesadez de cabeza y entorpecimiento de los miembros. *D.* Tres píldoras al dia.

5063. P. AMARGAS Y ESTOMACALES.

℞ Acíbar sucotrino. . . . ᵍxviij (1 gr.).
Extracto de ruibarbo,
Extracto de quina, ãã. ᵍj.jv (3 gr.).
Extracto de genciana. ʒjß (6 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍv (25 cent.).
I. Convalecencias, calenturas intermitentes, ictericia, hidropesías. *D.* Tres á seis píldoras.

5064. P. AMARGAS FUNDENTES (*Riecke*).

℞ Goma amoniaco,
Gengibre en polvo,
Extracto de centaura menor,
Jabon medicinal,
Bilis de buey, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. ciento ochenta píldoras.
I. Inflamacion crónica é indura-

cion del hígado, del páncreas ó del bazo. *D.* Diez píldoras tres veces al dia.

5065. P. DE AMBAR (H. DE AL.).

℞ Ambar gris,
Conserva de cáscara de naranja,
Extracto de quina, ãã. . 3j (4 gr.).
Opio. . . . . 3ij (8 gr.).

H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Anafrodisia, escrófulas, sifílides, histérico, tétanos, lupus. Son un escelente afrodisiaco. *D.* Cinco á diez cada tres horas.

5066. P. AMONIACALES ANTIARRÍTICAS (*Bories*).

℞ Carbon. de amon. gr.jv (3 gr.).
Jabon medicinal. ʒß (15 gr.).
Extracto de opio. gij (50 cent.).
Escita en polvo. . gxxvij (1,50 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Gota, artritis crónica, artrocace. *D.* Dos á cuatro al dia.

5067. P. DE AMONIACO (F. M.).

℞ Acíbar rosado. . . . . ʒjv (125 gr.).
Goma amoniaco pura. 3vj (24 gr.).
Mirra escogida. . . . ʒß (16 gr.).
Almáciga,
Polvo de los tres sándalos, ãã. . . . . 3ij (8 gr.).
Azafran. . . . . 9ij (24 dec.).
Tártaro soluble,
Sal de ajenjos, ãã. . . ʒj (4 gr.).

Se reducen á polvos sutiles, y con jarabe de cantueso se hace una masa para píldoras.

I. Son útiles en la hipocondría, asma, tos, caquexia y en general en todas las calenturas lentas y obstrucciones de las vísceras. *D.* Desde 9j (12 dec.) á 3j (4 gr.).

5068. P. DE ANDERSON *ó Píldoras escocesas* (F. F.).

℞ Gutagamba,
Acíbar sucotrino, ãã. . 3vj (24 gr.).
Esencia de anis. . . . 3j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Embarazos intestinales sin irritacion. *D.* Se usan como purgantes á la dosis de tres á cuatro. Se usan principalmente cuando se quiere obtener una derivacion lenta y continua. Solo se toma una al tiempo de acostarse, cuando se quiere tener el vientre libre.

LAS PÍLDORAS ESCOCESAS DE LOS H. DE M. se diferencian solo en que contienen polvos de anis en lugar de su aceite esencial.

5069. *Otras*, n. 2.

℞ Acíbar en polvo,
Gutagamba,
Jalapa, ãã. . . . . 3v (20 gr.).
Esencia de anis. . . . 3j (4 gr.).
Jarabe de espino serval. c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vías, anorexia, dispepsia, hipocondría, calenturas biliosas, galactirrea. *D.* Tres á seis como purgantes, y una á tres como tónicas digestivas.

5070. P. ANODINAS (*Recamier*).

℞ Extracto de opio. . . gij (15 cent.).
Alcanfor. . . . . gvj (30 cent.).
Jarabe simple. . . . c. s.

H. S. A. seis píldoras.

I. Casos en que los dolores vivos ocasionan insomnio. *D.* Una á tres al dia.

5071. P. ANTECIBUM, PÍLDORAS GLOTONAS *ó Granos de viuda* (F. F.).

℞ Acíbar. . . . . 3vj (24 gr.).
Extracto de quina. . . 3ij (12 gr.).
Canela. . . . . 3j (4 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Dispepsia, anorexia, hidropesía. Se usan como tónicas y digestivas. Se usan antes de comer para excitar el apetito. *D.* gvj á gxij (3 á 6 dec.).

5072. P. ANTIÁCIDAS.

℞ Carbon. de amoniaco. ℊv (25 cent.).
Extr. de ruibarbo. . ℊviij (40 cent.).
H. S. A. dos píldoras.
I. Acidez de las primeras vias, dispepsia, fetidez del aliento, vómitos.

5073. P. ANTIAMAURÓTICAS (*Jaeger*).

℞ Tártaro emético. . . . ℊvj (3 dec.).
Sen en polvo,
Ruibarbo en polvo,
Castóreo en polvo, ää. ℈j (12 dec.).
Extracto de taraxacon. c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Amaurosis ocasionada ó complicada con una afeccion de las vísceras abdominales.

5074. *Otras* (RUST).

℞ Valeriana en polvo,
Flores de árnica en polvo,
Asa fétida en polvo, ää. ʒij (8 gr.).
Tártaro emético. . . . ℈ij (6 dec.).
Extracto de polsatila. ʒß (2 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
D. Ocho á quince por la mañana, al medio dia y por la noche.

5075. P. ANTIARTRÍTICAS.

℞ Jabon medicinal. . . . ʒjv (125 gr.).
Carbon. de amoniaco. ʒvj (24 gr.).
Extracto de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Cebolla albarrana en polvo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Se toman en los intervalos de los ataques de gota. *D.* Dos á cuatro todos los dias.

5076. *Otras* (GALL).

℞ Extracto acuoso de guayaco. . . . . ʒijß (10 gr.).
Antimonio crudo. . . . ʒß (2 gr.).
Opio gomoso. . . . . ℊv (25 cent.).
H. S. A. sesenta píldoras.
Se dan tres por la mañana, tres al medio dia y tres por la noche.

5077. *Otras* (GRAEFFE).

℞ Quermes mineral,
Extracto de acónito, ää. ʒj (4 gr.).
Extracto de dulcamara,
Resina de guayaco, ää. ʒij (8 gr.).
Bálsamo negro del Perú. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Gota regular. *D.* Cuatro á ocho mañana y noche.

5078. *Otras* (VICQ DE AZIR).

℞ Jabon medicinal. . . . . ʒß (16 gr.).
Extr. de hiel de buey. ʒij (8 gr.).
Resina de guayaco,
Mercurio dulce, ää. . ʒj (4 gr.).
Guayaco en polvo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Una ó dos mañana y tarde.

5079. *Otras* (RADIUS).

℞ Brea de hulla,
Antimonio crudo, ää. ʒj (32 gr.).
Incienso. . . . . ʒij (8 gr.).
Dulcamara en polvo. ʒvj (24 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
D. Seis á diez al dia.

5080. P. ANTIARTRÍTICAS *ó Píldoras de asa fétida estibiadas.*

℞ Asa fétida,
Antimonio crudo,
Jabon de jalapa,
Res. de guayaco, ää. ʒj (4 gr.).
Opio. . . . . ℊviij (4 dec.).
Ruibarbo. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊiv (2 dec.).
I. Gota crónica. *D.* Cinco píldoras dos veces al dia.

5081. P. ANTIARTRÍTICAS ESTIBIADAS (F. DE LOS POBRES DE HAMBURGO).

℞ Tártaro emético. . . . ℊiij (15 cent.).
Extracto de acónito. . ℊxviij (1 gr.).
Resina de guayaco. . . ʒß (2 gr.).
Jabon. . . . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
I. Artrocace, tétanos, gota,

reumatismo crónico. *D.* Dos mañana y noche.

5082. P. ANTIARTRÍTICAS DE SULFURO DE CAL.

℞ Sulfuro de cal,
Res. de guayaco, ãã. 3j (4 gr.).
Extracto de acónito. ℊxv (75 cent.).
Extr. de dulcamara. 3j (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Gota, artritis, reumatismo crónico. *D.* Cuatro píldoras tres veces al dia.

5083. P. ANTIASMÁTICAS (*Heim*).

℞ Extracto de acíbar. . . 3j (4 gr.).
Ipecacuana en polvo. . ℊxij (6 dec.).
Esencia de menta pip. 6 gotas.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Asma nervioso. *D.* Una píldora mañana y noche.

5084. *Otras* (RICHTER).

℞ Asa fétida. . . . . 3jß (6 gr.).
Extracto de valeriana. 3j (4 gr.).
Extracto de acónito. . ℊvj (3 dec.).
Extr. de ceb. albarran. ℊvj (3 dec.).
Castóreo. . . . . 3ß (2 gr.).
Sal volátil de cuerno de ciervo. . . . . ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Asma nervioso. *D.* Diez por la mañana, al medio dia y por la noche.

5085. P. ANTIBILIOSAS (*Barclay*).

℞ Extracto de coloquintida compuesto. . . 3ij (8 gr.).
Resina de jalapa. . . . 3j (4 gr.).
Jabon amigdalino. . . 3jß (6 gr.).
Guayaco. . . . . 3iij (12 gr.).
Emético. . . . . ℊviij (4 dec.)
Esencia de enebro,
Esencia de alcaravea,
Esencia de romero, ãã. 4 gotas.
Jar. de espino serval. c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Cinco á seis al dia como purgante hidragogo.

5086. *Otras* (HARBEY).

℞ Acíbar,
Resina de jalapa,
Ruibarbo,
Extr. de coloquíntida, ãã. 5ij (8 gr.).
Jarabe de espino serval. c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Son purgantes. *D.* Una á cuatro al dia.

5087. *Otras* (DIXON).

℞ Acíbar,
Escamonea,
Ruibarbo, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Emético. . . . . ℊxij (6 dec.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
I. Son purgantes. *D.* Una á tres al dia.

5088. P. ANTIBLENORRÁGICAS.

℞ Bálsamo de copaiba. . 5ij (8 gr.).
Calomelanos. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Sangre de drago. . . . 5j (4 gr.).
Cons. de rosas rojas. 3j (30 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).
D. Una por la mañana y otra por la tarde, y despues dos ó tres.

5089. *Otras* (DROSTE).

℞ Cera amarilla. . . . . 3ß (15 gr.).
Miel comun. . . . . 5ij (8 gr.).
Se funden, se mezclan, se dejan enfriar y se incorpora
Alcanfor en polvo. . . 9ß (6 dec.).
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
I. Segundo periodo de la blenorragia. *D.* Cinco á diez píldoras cada dos horas.

5090. *Otras* (GALL).

℞ Copaiba solidificado por la magnesia. . . . . 3j (32 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . . 3ij (8 gr.).
Mézclense y háganse píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Se dan seis por la mañana, seis al medio dia y otras seis por la noche. Se aumenta progresivamente la dosis hasta diez ó doce, tres veces al dia.

5091. P. ANTIBLENORRÁGICAS (*Most*).

℞ Trementina de Venecia,
Extracto de genciana,
Goma quino,
Sulfato de hierro, ãã. . 3ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Blenorragias atónicas inveteradas, sostenidas por un estado atónico ó por el abuso del plan antiflogístico continuado durante mucho tiempo. *D.* Cuatro á ocho al dia.

5092. P. ANTICALCULOSAS (*Behrends*).

℞ Carbonato de sosa seco,
Jabon medicinal, ãã. . . 3ij (8 gr.).
Extr. de trébol de agua, c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Cálculos urinarios formados de ácido úrico. *D.* Tres á diez por la mañana, al medio dia y á la tarde.

5093. P. ANTICANCEROSAS (*Rust*).

℞ Extracto de caléndula,
Extracto de cicuta,
Carbonato de hierro, ãã. 3ij (8 gr.).
Polvo de caléndula . . . 3jß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.)
D. Cinco ó seis por la mañana, al medio dia y por la noche.

5094. P. ANTICAQUÉCTICAS (*Dehaen*).

℞ Jabon medicinal. . . . . 3ß (13 gr.).
Goma amoniaco. . . . . 3iij (12 gr.).
Masa de píld. de Rufus. 5ß (2 gr.).
Tintura de mirra. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Clorosis, amenorrea y dismenorrea. *D.* Cuatro píldoras todos los dias.

5095. P. ANTICARDIÁLGICAS.

℞ Píldoras de Vallet. . . 5ijß (10 gr.).
Píldoras de cinoglosa. 5ß (2 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . 5ijß (10 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
I. Son muy útiles en las cardialgias de las cloróticas. *D.* Una á diez al dia.

5096. *Otras* (ALBERS).

℞ Asa fétida. . . . . 3j (32 gr.).
Oxido de bismuto,
Esencia de valeriana, ãã. 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Cardialgia histérica acompañada ó no de acedías en las primeras vias. *D.* Cinco á diez gotas cada dos ó tres horas.

5097. *Otras* (SCHMITZ).

℞ Extracto de trébol. . . 5ij (8 gr.).
Extr. de bilis de buey. 5j (4 gr.).
Extracto de acíbar . 9ß (6 dec.).
Castóreo. . . . . 9ß (6 dec.).
Jabon medicinal. . . . 9j (12 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Cardialgia dependiente de causa atónica. *D.* Cinco píldoras, cuatro veces al dia.

5098. P. ANTICATARRALES.

℞ Escila en polvo. . . . gxviij (1 gr.).
Nitro. . . . . gx (5 dec.).
Raiz de malvabisco en polvo. . . . . gxviij (1 gr.).
Goma tragacanto. . . gx (5 dec.).
Jarabe de artemisa. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Una mañana y noche.

5099. *Otras*, n. 2.

℞ Quermes mineral. . . gxvj (8 dec.).
Azúcar blanca. . . . 3ß (46 gr.).
Goma tragacanto. . . gxvj (8 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos mañana y noche.

5100. *Otras* (H. CIVIL DE ESTRASBURGO).

℞ Extracto de acónito. . . . 3ij (8 gr.).
Azufre dorado de antimon. 3j (4 gr.).
Zumo de regaliz. . . . . 3ij (8 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.

5101. *Otras* (PARISET).

℞ Goma tragacanto. . . gx (5 dec.).
Tártaro emético.

Extracto gomoso de opio, āā. . . . . gij (15 cent.).
Conserva de rosas. . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Catarros antiguos con exceso de irritacion y expectoracion difícil, escrófulas, bronquitis. *D.* Dos, mañana y noche.

5102. P. ANTICATARRALES (*Wedekind*).

℞ Amoniaco purificado,
Extracto de marrubio blanco,
Poligala de Virginia en polvo, āā. . . . . 3jß (6 gr.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, āā. . . . 9j (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Catarro pulmonar crónico rebelde. *D.* Seis píldoras, dos ó tres veces al dia.

5103. *Otras* (TROUSSEAU).

℞ Trementina. . . . . 3ß (15 gr.).
Amoniaco. . . . . 3j (4 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de opio. . . . gviij (4 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Catarro bronquial y de la vejiga. *D.* Cinco píldoras al dia.

5104. P. ANTICATARRALES Y CALMANTES (*Petit*).

℞ Manteca de cacao. 3
Goma arábiga. 3
Extracto acuoso de opio. 1
Jarabe de ipecacuana. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.), que se cubrirán con polvos de raiz de malvabisco.
I. Afecciones catarrales que perturban el sueño. *D.* Una todas las noches al acostarse.

5105. P. ANTICEFÁLICAS (*Broussais*).

℞ Extracto de beleño,
Extr. de bellad., āā. gv (25 cent.).
Extracto de lechuga. gx (50 cent.).
Extr. gom. de opio. gij (15 cent.).
Manteca de cacao. . 3j (4 gr.).
H. S. A. treinta píldoras muy iguales.
I. Cefalalgia inveterada. *D.* Una por la mañana y otra por la tarde.

5106. P. ANTICLORÓTICAS DE BLAUD *ó Píldoras de Blaud* (F. P.).

℞ Sulfato de hierro cristalizado,
Carbonato de potasa seco, āā. . . . . 3ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . gxviij (1 gr.).
Se trituran las dos sales en un mortero de hierro hasta que no se perciba ningun punto blanco; se añade la goma arábiga y se divide en noventa y seis píldoras.
I. Clorosis, leucorrea atónica. *D.* El primero, segundo y tercer dia se da una píldora por la mañana en ayunas, una al medio dia y otra por la noche al acostarse; el cuarto, quinto y sesto dia, dos píldoras por la mañana y dos por la tarde; el séptimo, octavo y noveno dia, dos por la mañana, dos al medio dia y una por la tarde; el décimo, undécimo y duodécimo dia, dos píldoras por la mañana, dos al medio dia y dos por la tarde; el décimotercio, décimocuarto, décimoquinto y los siguientes, hasta la completa curacion, tres píldoras por la mañana, tres al medio dia y otras tres por la tarde.
En los casos de clorosis crónicas y rebeldes aconseja Blaud que se continúe usando las píldoras por espacio de quince á veinte dias, disminuyendo gradualmente la dosis.

5107. P. DE BLAUD MODIFICADAS.

℞ Sulfato de hierro puro y cristalizado. . . . . 5ij (8 gr.).
Se pulveriza, se deja secar en la estufa á la temperatura de 40° y entonces se mezcla con
Carbon. de potasa seco. 5ij (8 gr.).
Miel. . . . . 5j (4 gr.).
Malvabisco en polvo. . . c. s.

H. S. A. una masa que se distribuirá en ochenta píldoras.

D. Una á diez al dia. Es una de las preparaciones ferruginosas mas simples, mejores y mas económicas.

5108. P. DE BLAUD MODIFICADAS POR ADORNE.

℞ Sulfato de hierro puro,
Carbonato de potasa,
Malvabisco en polvo, ãã. ʒij (8 gr.).
Mucílago hecho con partes iguales de goma y azúcar. . . . . c. s.

H. S. A. cuarenta píldoras, que se cubren con una capa muy fina de goma y azúcar aromatizada con limon.

5109. P. ANTICLORÓTICAS DE BLAUD (B. DE M.).

℞ Sulfato de hierro,
Carbon. de potasa, ãã. ʒß (15 gr.).
Polvos de regaliz,
Goma tragacanto, ãã. c. s.

H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

D. En los tres primeros dias se toma una por la mañana, otra al medio dia y otra por la tarde, y despues se aumenta sucesivamente.

5110. P. ANTICLORÓTICAS (*Hamilton*).

℞ Escamonea en polvo. ʒij (24 dec.).
Calomelanos en polvo. ʒj (12 dec.).
Extracto de coloquintida compuesto. . . ʒj (12 dec.).
Jarabe de gengibre. . c. s.

H. S. A. doce píldoras.

D. Tres ó cuatro al dia.

5111. *Otras* (NEUMANN Y RADIUS).

℞ Hojas de digital. . . . ʒß (2 gr.).
Hojas de tejo. . . . . ʒj (4 gr.).
Carbonato de hierro. . . ʒj (4 gr.).
Cornezuelo de centeno. . ʒij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. cincuenta píldoras.

D. Dos á ocho al dia con una infusion de sabina.

5112. P. ANTICLORÓTICAS DE RAYER.

℞ Subcarbonato de hierro. ʒj (4 gr.).
Quina en polvo,
Canela en polvo, ãã. . . ʒß (2 gr.).

H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

D. Cuatro á doce al dia.

5113. P. ANTICLORÓTICAS (*Sundelin*).

℞ Azafran de Marte apetitivo. . . . . ʒj (4 gr.).
Cascarilla,
Extracto de palo de Campeche, ãã. . . . . ʒjß (6 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.

H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

D. Cinco á diez, tres veces al dia.

5114. P. ANTICORÍTICAS (*Josat*).

℞ Cianuro de potasio. . ℊjv (2 dec.).
Valeriana en polvo. . ℊxviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. ocho píldoras, que se guardarán en una caja con carbon en polvo.

D. Dos píldoras en las veinticuatro horas.

5115. *Otras* (RASORI).

℞ Extracto de jalapa,
Escamonea, ãã. . . . ℊiij (15 cent.).

H. S. A. dos píldoras.

D. Una al dia hasta conseguir la curacion.

5116. *Otras* (SCHNEIDER).

℞ Asa fétida,
Valeriana en polvo, ãã. ʒiij (12 gr.).
Oxido de zinc sublim. ʒj (12 dec.).
Castóreo. . . . . ʒij (24 dec.).
Extracto de belladona. ℊv (25 cent.).
Extr. de manzanilla. c. s.

H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

D. Seis píldoras al dia.

Se debe beber despues una taza de infusion teiforme de anserina de valeriana ó de manzanilla.

5117. P. ANTIDIABÉTICAS.

℞ Sulfato de hierro,
Sulfato de zinc, ãã. . . . 3j (4 gr.).
Extracto de manzanilla. 3ß (2 gr.).
H. S. A. treinta pildoras.
I. Diabetes, astenia. *D.* Tres pildoras al dia.

5118. *Otras* (BERNDT).

℞ Sulfato de cobre amoniacal,
Opio puro, ãã. . . . . gx (50 cent.).
Malvabisco en polvo,
Extr. de taraxacon, ãã. 3ij (24 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Cinco mañana y noche.

5119. P. ANTIDIARRÉICAS.

℞ Cascarilla,
Colombo, ãã. . . . . gxc (5 gr.).
Láudano líquido,
Eter sulfúrico, ãã. . gxviij (1 gr.).
Jarabe de membrillo. c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Diarrea crónica, disenteria. *D.* Una de hora en hora.

5120. *Otras* (VOGEL).

℞ Extracto alcohólico de cascarilla,
Oxido negro de hierro, ãã. 3ij (8 gr.).
Jarabe de canela. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Diarrea crónica. *D.* Tres mañana y tarde.

5121. P. ANTIDISENTÉRICAS.

℞ Extracto de cáscara verde de nuez,
Alúmina pura, ãã. . . . . p. ig.
H. S. A. píldoras de giij á gv (15 á 25 cent.).

5122. *Otras* (BOUDIN).

℞ Ipecacuana. . . . . gvj (3 dec.).
Calomelanos. . . . gß (3 cent.).
Extracto de opio. . gj (6 cent.).
H. S. A. tres píldoras.
I. Diarrea, disenteria, principalmente en los paises cálidos.

5123. *Otras* (WILLIS).

℞ Cera amarilla. . . . . 3ß (15 gr.).
Esperma de ballena,
Cateeú, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Esencia de canela. . . . 12 gotas.
Se hacen píldoras de gvj (3 dec.).
I. Disenterias crónicas. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5124. P. ANTIEMÉTICAS (*Fuller*).

℞ Polvo fino de yerbab. 3ij (8 gr.).
Diascordio. . . . . 3j (4 gr.).
Ajenjos. . . . . 3ij (24 dec.).
Balaustras. . . . . 3j (12 dec.).
Esencia de canela. . . 2 gotas.
Jarabe de membrillos. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se toman dos, tres veces al dia, bebiendo despues un vaso de agua acidulada gaseosa simple.

5125. *Otras* (H. M.).

℞ Oxido blanco de bismuto. gjv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras iguales.
I. Cardialgia, vómitos nerviosos, etc. *D.* Una cada tres horas.

5126. P. ANTIEPILÉPTICAS (H. DE M.).

℞ Oxido de zinc. . . . . 3j (12 dec.).
Extracto de beleño. . 3ij (24 dec.)
Polvos de regaliz. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Epilepsia que no reconoce por causa alteraciones orgánicas. *D.* De tres á cuatro píldoras.

5127. *Otras* (BOURGE DE ROLLOT).

℞ Azul de Prusia,
Oxido de zinc, ãã. . . 3ijß (10 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
D. Una por la mañana en ayunas durante la primera semana.

5128. *Otras* (LLURET).

℞ Extracto de estramonio. 2
Extracto de belladona. 2
Alcanfor. 1
Opio. 1
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Una al dia y se aumenta su-

cesivamente la dosis hasta veinte.

5129. P. ANTIEPILÉPTICAS (*Podrecа*).

℞ Añil. . . . . ℊxc (5 gr.).
Asa fétida. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Castóreo. . . . . ℊx (5 dec.).
H. S. A. veinte píldoras que se platearán.
I. Epilepsia. *D.* Una de hora en hora.

5130. *Otras* (QUARIN).

℞ Valeriana. . . . . ℥j (30 gr.).
Limaduras de hierro. . ℥iij (12 gr.).
Mirra,
Incienso,
Extr. de tormentila, ää. ℥jß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
I. Epilepsia determinada por el onanismo. *D.* Cinco á diez píldoras, tres veces al día.

5131. *Otras* (RECAMIER).

℞ Extr. de nuez vómica. ℊij (6 mil.).
Acetato de plomo crist. ℊß (25 mil.).
Polvo de beleño negro. ℊj (50 mil.).
Para una píldora.
Perturban la vuelta de los accesos de la epilepsia, produciendo en la superficie mucosa una serie de movimientos preternaturales, que se sienten en todo el organismo.
D. Se da una por la mañana y otra por la tarde, despues de haber puesto en uso los medios revulsivos á propósito para disminuir los movimientos hácia el cerebro. Se aumenta gradualmente la dosis del extracto de nuez vómica hasta el punto de llegar en ocho dias á la dosis de ℊj (5 cent.).

5132. P. ANTIEPILÉPTICAS INGLESAS.

℞ Miga de pan. . . . . ℥j (4 gr.).
Nitrato de plata. . . . ℊj (5 cent.).
Se mezclan exactamente y se dividen en veinte píldoras, de modo que cada una solo contenga una vigésima parte de grano de nitrato de plata.
D. Solo se da una cada vez.

5133. P. ANTIEPSÓRICAS.

℞ Azufre sublimado y lav. ℥j (4 gr.).
Guayaco en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de borraja. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).
D. Tres ó cuatro al dia.

5134. P. ANTIESCORBÚTICAS (F. N. P.).

℞ Extracto de rubia,
Extracto de quina, ää. ʒij (24 dec.).
Extracto de colombo. . ʒj (12 dec.).
Alcanfor disuelto por el alcohol. . . . . ʒß (6 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Afecciones escorbúticas. *D.* Dos píldoras, dos veces al dia.

5135. P. ANTIESCIRROSAS (*Boyer*).

℞ Polvo de arnica. . . . ℥ij (8 gr.).
Extracto de cicuta. . . ℥j (4 gr.).
Extracto de acónito. . ʒß (2 gr.).
Cloruro de bario. . . . ℊxvij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (10 cent.).
I. Exóstosis, escirros, tumores. *D.* Cuatro á ocho mañana y noche.

5136. P. ANTIESCROFULOSAS (*Baudelocque*).

℞ Sulfuro negro de merc. ℊij (10 cent.).
Magnesia. . . . . ℊj (5 cent.).
Cicuta en polvo. . . . ℊij (10 cent.).
Se prepara una píldora.
Se da una por la mañana y otra por la tarde, y se aumenta progresivamente hasta diez al dia.

5137. *Otras* (HENRY Y GUIBOURT).

℞ Escamonea. . . . . ℥jv (16 gr.).
Etíope mineral. . . . ℥jv (16 gr.).
Antimonio diaforético. ℥j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℥vij (28 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.), y cada una contiene un grano de etíope mineral y otro de escamonea.

5138. P. ANTIESCROFULOSAS (*Jungken*).

℞ Sublimado corrosivo. . ᵍj̈v (2 dec.).
Agua destilada. . . . . c. s.
Extracto de quasia. . . 5ß (2 gr.).
Zumo de regaliz. . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Corneitis escrofulosa. *D.* Una al dia; cada tres ó cuatro dias se aumenta poco á poco la dosis hasta cinco.

5139. *Otras* (SAUNDERS).

℞ Esponja tostada. . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de cáscara de naranja. . . . . ℈j (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
D. En tres tomas en el dia.

5140. *Otras* (WERNECK).

℞ Ioduro de hierro. . . ᵍxviij (1 gr.).
Bromuro de sodio. . . 5ß (2 gr.).
Extracto de regaliz. . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍij (1 dec.).
D. Una á tres mañana y noche.

5141. *Otras* (VOGT).

℞ Ioduro de potasio. . . ᵍxviij (1 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.
Esponja tostada,
Extr. de dulcam., ãã. 5v (20 gr.).
H. S. A. ciento ochenta píldoras.
I. Escrófulas, bocio. *D.* Seis píldoras dos veces al dia.

5142. P. ANTIESCROFULOSAS Y TÓNICAS.

℞ Cloruro de bario. . . . ᵍx (5 dec.).
Extracto de genciana. ᵍc (5 gr.).
Genciana en polvo. . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
D. Dos por la mañana y dos por la tarde.

5143. P. ANTIESPASMÓDICAS.

℞ Almizcle. . . . . ℈ij (24 dec.).
Oxido blanco de zinc. ℈j (12 dec.).
Goma arábiga. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍiij (15 cent.).
I. Afecciones espasmódicas. *D.* Tres á cuatro píldoras al dia.

5144. *Otras*, n. 2.

℞ Oxido de zinc. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Gastralgia, calambres de estómago, neurosis abdominales histeriformes.

5145. *Otras*, n. 3.

℞ Castóreo en polvo. . . ᵍxc (5 gr.).
Alcanfor en polvo. . . ᵍxviij (1 gr.).
Extracto de opio. . . . gj (5 cent.).
Arrope de saüco. . . . c. s.
H. S. A. doce bolos. *D.* Dos cada seis horas.

5146. *Otras* (ANT. DUBOIS).

℞ Extracto de quina,
Catecú,
Alcanfor, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Asa fétida. . . . . ℈j (12 dec.).
Extracto de enebro. . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
I. Epilepsia, histérico. *D.* Tres píldoras al dia.

5147. *Otras* (BEHRENDS).

℞ Cloruro de hierro amoniacal,
Gálbano, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Asa fétida. . . . . 5ij (8 gr.).
Castóreo. . . . . ℈j (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍiij (15 cent.).
I. Afecciones nerviosas del corazon acompañadas de cardialgia, bastante frecuentes en las clorótica. *D.* Tres ó cuatro mañana y tarde.

5148. *Otras* (CLOQUET).

℞ Extracto de valeriana. 5j (4 gr.).
Extracto de opio. . . . gij (10 cent.).
Asa fétida,
Castóreo, ãã. . . . . ᵍxx (10 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.
D. Tres ó cuatro mañana y noche.

5149. P. ANTIESPASMÓDICAS (*Conradi*).

℞ Asa fétida. . . . . ʒß (15 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Opio purificado,
Esencia de menta pipe-
rita, ãã. . . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Iscuria y estrangurria espasmódicas. *D.* Diez píldoras tres veces al dia.

5150. *Otras* (DUMERIL).

℞ Extr. de regaliz anis. gxviij (4 gr.).
Extracto teliáico. . . . gj (5 cent.).
Extracto de beleño,
Extr. de belladona, ãã. gviij (4 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

5151. *Otras* (HAEN).

℞ Almizcle. . . . . ʒß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . ʒj (12 dec.).
Goma amoniaco. . . . ʒij (24 dec.).
Opio purificado. . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Espasmos histéricos ó hipocondriacos. *D.* Tres á cuatro píldoras en las veinticuatro horas.

5152. *Otras* (REIM).

℞ Ipecacuana,
Digital, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Opio. . . . . gvj (3 dec.).
Extr. de cúmla campana. c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Asma convulsivo. *D.* Una píldora cada tres horas.

5153. *Otras* (HENNING).

℞ Cianuro de zinc. . . . gxij (6 dec.).
Castóreo en polvo. . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia.

5154. *Otras* (HONORÉ).

℞ Extracto de valeriana.
Extracto de quina, ãã. . ʒj (4 gr.).
Valeriana en polvo. . . . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Histérico clorótico. *D.* Cuatro á diez píldoras.

5155. P. ANTIESPASMÓDICAS MERCURIALES (*Jahn*).

℞ Extracto de acónito. . ʒß (2 gr.).
Extracto de cicuta,
Resina de guayaco,
Asa fétida, ãã. . . . ʒj (4 gr.).
Calomelanos. . . . . gxviij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Neuralgia, principalmente la facial. *D.* Cinco á diez píldoras, tres veces al dia.

5156. P. ANTIESPASMÓDICAS (*Jahn*).

℞ Asa fétida,
Resina de guayaco,
Extr. de valeriana, ãã. ʒj (4 gr.).
Sal volátil de asta de ciervo,
Almizcle, ãã. . . . . gxij (6 dec.).
Quermes mineral,
Opio purificado, ãã. . gvj (3 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Angina de pecho en los gotosos, histérico, espasmos. *D.* Tres ó cuatro píldoras cada dos horas.

5157. *Otras* (LOMBART).

℞ Subnitrato de bismuto. gj (5 cent.).
Magnesia. . . . . ʒß (2 gr.).
Polvos de Dower. . . . ʒx (5 dec.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Gastralgias y neuroses intermitentes. *D.* Una cada dos horas.

5158. *Otras* (MAUNOIR).

℞ Oxido de zinc. . . . ʒß (2 gr.).
Conserva de rosas. . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Epilepsia, histérico, etc. *D.* Una píldora mañana y tarde.

5159. *Otras* (MONTAIGU).

℞ Almizcle. . . . . gj (5 cent.).
Asa fétida. . . . . gij (10 cent.).
Goma amoniaco. . . gij (10 cent.).
Polvo de valeriana. gviij (40 cent.).
Jarabe. . . . . c. s.
para una píldora.
I. Afecciones nerviosas.
Nota. A esta preparacion asocia

Mantaigu un tratamiento dirigido segun las indicaciones.

5160. P. ANTIESPASMÓDICAS (*Petit*).

℞ Extracto de opio. . . . ℊij (5 cent.).
Alcanfor. . . . . ℊvj (3 dec.).
Nitrato de potasa. . . . ℊjv (2 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Afecciones nerviosas acompañadas de convulsiones, como el histérico, epilepsia, corea, y calenturas graves acompañadas de delirio y movimientos convulsivos. *D.* Una de hora en hora.

5161. *Otras* (PIDERIT).

℞ Asa fétida,
Castóreo, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Ácido succínico concreto. 3ß (2 gr.).
Aceite animal de Dippel. 20 gotas.
Tintura de mirra. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊv (25 cent.).
I. Afecciones nerviosas, histérico, convulsiones y neuralgias. *D.* Se dan de tres á seis píldoras.
Nota. Algunas veces añade el médico á estas píldoras cierta cantidad de opio.

5162. *Otras* (PIERQUIN).

℞ Asa fétida. . . . . ℊij (1 dec.).
Digital. . . . . ℊß (25 mil.).
Óxido de hierro. . . . ℊij (1 dec.).
Conserva de cinosbastos ó de tilo, c. s. para una píldora.
I. Aberracion del flujo menstrual.

5163. *Otras* (PLENCIZ).

℞ Asa fétida. . . . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizcle, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Ámbar. . . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
I. Angina de pecho. *D.* Seis píldoras al dia en tres tomas, dos por la mañana, dos al medio dia y dos por la noche.

5164. *Otras* (TROUSSEAU).

℞ Asa fétida,
Extracto de valeriana, ãã. 3j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
I. Afecciones nerviosas que siguen á las hemorragias. *D.* Ocho píldoras al dia.
Nota. Se puede añadir á la masa algunos granos de extracto acuoso de opio.

5165. *Otras* (ZIPP).

℞ Nitrato de plata fundido. ℊx (5 dec.).
Opio purificado. . . . . ℊvj (3 dec.).
Resina de guayaco. . . 5iij (12 gr.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Angina de pecho puramente nerviosa. *D.* Una píldora mañana y noche, y se aumenta gradualmente la dosis segun los efectos producidos.

5166. P. ANTIFLEMÁTICAS.

℞ Ajo,
Jabon de Alicante, ãã. . . . . p. ig.
Milpiés preparado. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Catarro crónico, hidropesía pasiva, bronquitis. *D.* Cuatro píldoras al dia en dos tomas.

5167. P. ANTIGALACTOPOYÉTICAS (*Behrends*).

℞ Sulfato de hierro cristalizado. . . . . 5iij (24 dec.).
Mirra. . . . . 3j (4 gr.).
Polvo de quasia amarg. 3v (5,30 gr.).
Extr. blando de quina. c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Galactirrea, sobre todo cuando está acompañada de atonía de los órganos digestivos. *D.* Cuatro á ocho píldoras, tres veces al dia.

5168. P. ANTIGASTRÁLGICAS.

℞ Subcarbon. de hierro. 5ij (8 gr.).
Acíbar. . . . . ℊjv (2 dec.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
I. Enfermedades de estómago

que acompañan á la leucorrea, jaqueca, palpitaciones de corazon y palidez general. *D.* Dos á doce píldoras al dia.

5169. P. ANTIGASTRÁLGICAS (*La Rue*).

℞ Extracto de opio. . . . gvj (3 dec.).
Sesquicarbon. de hierr. ʒxij (6 dec.).
Magnesia. . . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro ó cuarenta y ocho píldoras, segun la edad y la susceptibilidad del individuo.

D. Una por la mañana dos horas antes del desayuno, y otra tres horas despues de cenar. Se asociarán á su uso los medicamentos auxiliares que exija el estado del enfermo, y se suspenderá por algun tiempo su uso si hubiere necesidad. El tratamiento dura un mes á mes y medio.

5170. *Otras* (TROUSSEAU).

℞ Subcarbonato de hierro. ℥j (30 gr.).
Extracto de regaliz. . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.

I. Gastralgia, sobre todo la que ataca á las mujeres que padecen flores blancas, amenorrea, etc. *D.* Una á dos al dia, mañana y noche, aumentando una ó dos cada dia, hasta veinte ó veinticinco.

5171. P. ANTIGONORRÉICAS.

℞ Bálsamo de copaiba,
Magnesia calcinada, ää. . . . p. ig.
H. S. A. píldoras de gx (5 dec.).

D. Dos á cuatro píldoras, tres veces al dia.

5172. P. ANTIGOTOSAS (*Bouchardat*).

℞ Extracto de coloquintida compuesto. . . ʒv (20 gr.).
Extracto de cólchico. ʒv (20 gr.).
Extracto de opio. . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).

I. Son purgantes. *D.* Una á seis píldoras hasta promover deposiciones de vientre.

Bouchardat ha propuesto estas píldoras para reemplazar las de Lartigue.

5173. *Otras* (HALFORD).

℞ Extracto acético de cólchico. . . . . gvij (35 cent.).
Extracto de coloquintida compuesto. . gjv (20 cent.).
Polvos de Dower. . . gjv (20 cent.).
H. S. A. dos píldoras.

Halford las administra despues de haber hecho tomar durante algunos dias treinta á cuarenta gotas de vino de cólchico mañana y noche.

I. Neuralgias, reumatismo, gota, ciática. *D.* Una píldora mañana y noche.

5174. *Otras* (HENROTAY).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de opio. . . . gv (25 cent.).
Regaliz. . . . . ʒj (4 gr.).
Mucíl. de goma aráb. c. s.
H. S. H. treinta píldoras.

D. Una mañana y tarde durante quince dias, despues de haber tomado la pocion del mismo autor.

5175. *Otras* (LEMAZURIER).

℞ Sulfato de quinina. . gx (50 cent.).
Digital purpúrea en polvo. . . . . gv (25 cent.).
Raiz de belladona en polvo,
Acet. de morfina, ää. gij (10 cent.).
Extracto de lechuga virosa,
Polvo atemperante de Sthal, ää. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

D. En dos dias, de dos en dos píldoras cuando los accesos son violentos, y en cuatro dias cuando son menos fuertes los dolores.

5176. P. ANTIGOTOSAS, LLAMADAS DE LARTIGUE.

℞ Extracto acético de cólchico,
Extracto alcohólico de coloquintida, ää. . . ʒv (20 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).

5177. P. ANTIHELMÍNTICAS.

℞ Mercurio dulce,
Azufre dorado de antimonio,
Extracto de ruibarbo,
Asa fétida, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Cuatro píldoras por la mañana, aumentando dos al dia.

5178. P. ANTIHELMÍNTICAS.

℞ Extracto de santónico. gxviij (4 gr.).
Santónico en polvo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

5179. *Otras*, n. 2.

℞ Amalgama de estaño. . . . . c. s. q.
Extracto de ajenjos. . . . . c. s.
Se ponen á la ceniza caliente los dos metales hasta que se oxiden y se añade el extracto.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
D. Cuatro á ocho por la mañana.

5180. *Otras*, n. 3.

℞ Acíbar. . . . . 3j (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3jß (6 gr.).
Calomelanos. . . . . gxviij (1 gr.).
Jalapa. . . . . 3ß (2 gr.).
Jabon blanco. . . . . 3j (4 gr.).
Extracto de enebro. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Agrios, afecciones verminosas. *D.* Dos á seis píldoras por la mañana.

5181. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Trementina. . . . . 3j (4 gr.).
Jabon de jalapa. . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de beleño. . gjv (2 dec.).
Calomelanos. . . . . gviij (4 dec.).
H. S. A. píldoras de gxij (6 dec.).
I. Tenia. *D.* Cuatro píldoras cada tres horas.

5182. *Otras* (SCHMUCKER).

℞ Semillas de cebadilla,
Miel, ãã. . . . . 3ß (15 gr.).
Aceite volátil de hinojo. 20 gotas.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
D. Seis por mañana y noche á los adultos; una ó dos á los niños.

5183. P. ANTIHELMÍNTICAS FÉTIDAS.

℞ Asa fétida,
Calomelanos,
Extracto de ruibarbo,
Extracto de cáscara de nuez,
Extr. de ajenjos, ãã. gxviij (4 gr.).
Aceite de tanaceto. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).
I. Helmintiasis, ascárides, ténia. *D.* Seis píldoras al dia.

5184. P. ANTIHELMÍNTICAS Y PURGANTES.

℞ Calomelanos,
Escamonea, ãã. . . . . gx (5 dec.).
Gutagamba. . . . . gvj (3 dec.).
Confeccion de jacintos. c. s.
H. S. A. dos ó tres bolos.
I. Ténia. *D.* Una de cuarto en cuarto de hora, despues de haber tomado 3ij (12 gr.) de raiz de helecho macho en 3vj (180 gr.) de infusion de tilo, bebiendo despues una ó dos tazas de té.

5185. P. ANTIHEMICRÁNICAS.

℞ Láudano líquido. . . . gxviij (4 gr.).
Tintura de ipecacuana. 3ß (2 gr.).
Acetato de amoniaco. 3ß (15 gr.).
Polvo de acíbar,
Polvo de bellad., ãã. gxviij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Jaqueca, cefalalgia, hemotisis. *D.* Una de hora en hora.

5186. P. A[illegible]HEMOPTÓICAS (*Colt, reau*).

℞ Tanino puro. . . . . 3ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras muy iguales.
D. Se toma una cada hora en hora y se van dando con mayor intervalo á medida que disminuyen los accidentes.
Nota. Estas píldoras producen

igualmente buenos efectos en los casos de metrorragia y de flujos mucosos crónicos. Se usan ventajosamente contra la espermatorrea: pero en este último caso solo se toman seis en las veinticuatro horas, y á cada una se añade una sesta parte de grano de extracto hidroalcohólico de lechuga virosa.

Charvet de Grenoble dice que ha observado que producen buenos efectos contra los sudores que fatigan en ciertas enfermedades y particularmente en los de los tísicos.

5187. P. ANTIHEMORROIDALES (*Gall*).

℞ Copaiba solidificado con magnesia. . . . . ʒjß (45 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Seis, ocho y después diez ó doce píldoras, tres veces al día.

5188. P. ANTIHERPÉTICAS.

℞ Ruibarbo. . . . . 5ß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . gvj (3 dec.).
Etiope mineral. . . . . ʒjß (6 gr.).
Jabon de Alicante. . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.). *D.* Dos píldoras al dia, que se aumentarán hasta seis.

5189. *Otras*, n. 2.

℞ Guayaco,
Etiope antimonial, ää. . . ʒj (4 gr.).
Tallos de dulcamara. . . . ʒiij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (4 dec.), que se cubrirán con polvo de licopodio.

5190. *Otras* (BARTHEZ).

℞ Mercurio . . . . ʒij (64 gr.).
Flores de . . . re,
Sulfato de potasa, ää. ʒß (16 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ß 2 gr.).
Se trituran en un mortero hasta extinguir el mercurio. Entonces se añade:
Resina de guayaco en polvo. . . . . ʒj (32 gr.).
Bálsamo del Perú. . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de claveles. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Herpes y otras enfermedades de la piel. *D.* Tres píldoras por la mañana en ayunas.

5191. *Otras* (DUBLE).

℞ Sublimado corrosivo. . gij (1 dec.).
Extracto de acónito. . . ʒj (12 dec.).
Polvo de acónito. . . . . c. s.
Se trituran por mucho tiempo en un mortero de vidrio y se hacen veinticuatro píldoras.
I. Afecciones venéreas antiguas, sarna, herpes sifilíticos, infartos del sistema linfático, etc. *D.* Una por la mañana y otra por la tarde, aumentando progresivamente la dosis. Cada una de estas píldoras contiene una duodécima parte de grano de sublimado y gj (5 cent.) de extracto de acónito.

5192. *Otras* (DUBOIS).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de cicuta. . . ʒß (16 gr.).
Polvo de cicuta. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Herpes. *Nota.* Al mismo tiempo se hace uso de baños, bebidas y se aplican los remedios que se emplean en semejantes casos.

5193. *Otras* (DUMAS).

℞ Goma amoniaco. . . . . ʒß (15 gr.).
Extracto de dulcamara. ʒj (30 gr.).
Azufre dorado de antim. ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de fumaria. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Cuatro mañana y noche; se aumentan dos cada tres ó cuatro dias.

5194. P. ANTIHERPÉTICAS (*Fouquet*).

℞ Etiope mineral. . . . ℊxl (20 dec.).
Mercurio dulce. . . . ℊx (5 dec.).
Azufre dor. de antim. ℊv (25 cent.).
Extr. de escabiosa. ℊxxx (15 dec.).
Jarabe de fumaria. . c. s.
H. S. A. pildoras de ℊjv (2 dec.).

I. Afecciones cutáneas, para remediar los vicios de la linfa é infartos glandulosos que de ella dependen. *D.* Tres por la mañana en ayunas, y se aumenta gradualmente la dosis hasta seis al dia, en dos tomas.

5195. *Otras* (GOLFIN).

℞ Deutoclorur. de merc. ℊviij (4 dec.).
Jabon. . . . . 5ij (8 gr.).
Extracto de cicuta. . . 5ij (8 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . 5j (4 gr.).
H. S. A. sesenta pildoras.

D. Se toma primero una mañana y tarde y se aumenta una pildora cada dos ó tres dias, hasta llegar á seis ó siete solamente, á causa de la salivacion.

5196. *Otras* (KOPP).

℞ Deutoclor. de merc. ℊiij (15 cent.).
Se disuelve en c. s. de alcohol rectificado y despues se añade:
Extracto de cicuta. . ℊlx (30 dec.).
H. S. A. sesenta pildoras. Cada pildora contiene una vigésima parte de grano de sublimado, y ℊj (5 cent.) de extracto de cicuta.

I. Afecciones escrofulosas, enfermedades cutáneas crónicas, sífilis constitucional. *D.* Una á seis pildoras al dia, aumentando progresivamente hasta doce.

5197. *Otras* (KUNKEL).

℞ Extracto de dulcamara. 5jv (16 gr.).
Sulfuro de antimonio. . 5ij (8 gr.).
H. S. A. pildoras de ℊjv (2 dec.).

I. Se usan con buen éxito contra las enfermedades crónicas de la piel.

5198. P. ANTIHERPÉTICAS Y ANTISIFILÍTICAS (*Bally*).

℞ Jabon blanco,
Extr. de dulcamara, ãã. 5j (4 gr.).
Extracto de chrysanthemum crysanthus. 5ß (2 gr.).
Extracto de cicuta,
Extr. de coloquint., ãã. ℊxviij (1 gr.).
Deutoclorur. de merc. ℊiij (15 cent.).
H. S. A. setenta y dos pildoras, cada una de ellas contendrá una vigésimacuarta parte de grano de sublimado.

D. Se da una, mañana y noche, aumentando con precaucion una cada seis ú ocho dias.

5199. P. ANTIHERPÉTICAS INGLESAS.

℞ Protocloruro de mercurio preparado al vapor. . . 5j (4 gr.).
Resina de guayaco. . . . 5ij (8 gr.).
Jarabe de espino serval. . c. s.
H. S. A. setenta y dos pildoras.

D. Dos mañana y noche: se bebe despues un vaso de una infusion fuerte de lúpulo, y se toma la *pocion purgante inglesa* cada quince dias.

5200. P. ANTIHIDRÓPICAS (*Dupuy*).

℞ Extracto de trébol,
Escila en polvo, ãã. . . . 5jß (6 gr.).
Digital en polvo,
Asa fétida, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. cien pildoras.

I. Hidropesía, especialmente el hidrotorax, con asma y palpitaciones. *D.* Cuatro pildoras mañana y noche, bebiendo detras de cada dosis una taza de infusion de parietaria nitrada.

5201. *Otras* (GRAEFFE).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . ℊv (15 dec.).
Acíbar sucotrino. . 5jß (12 gr.).

Cebolla albarrana,
Digital purpúrea, āā. ḡxv (75 cent.).
Extr. de cardo santo, c. s.
H. S. A. cien píldoras iguales.
I. Anasarca, todas las hidropesías, y principalmente los infartos edematosos de las extremidades. *D.* Una píldora, mañana y noche, aumentando progresivamente hasta que tome el enfermo cinco cada vez; se bebe despues una taza de tisana apropiada.

5202. P. ANTIHIDRÓPICAS (*Ronander*).

℞ Sulfato de cobre amon. ḡx (5 dec.).
Disuélvase la menor cantidad de agua posible y añádase:
Raiz de bellad. en polvo. ḡx (5 dec.).
Gengibre en polvo. . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de ajenjos. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Hidropesía pasiva con gran debilidad y fiebre cuando no existe ninguna lesion de las vísceras abdominales. *D.* Dos por la mañana, al medio dia y por la noche, aumentando una cada hora hasta que empiecen á manifestarse los efectos del sulfato ó de la belladona.

5203. P. ANTIHISTÉRICAS.

℞ Almizcle. . . . . ʒß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . ʒj (12 dec.).
Goma arábiga. . . . ʒij (24 dec.).
Extracto de opio. . . . gjv (2 dec.).
Alcohol de 880 c. . . 2 gotas.
Malvabisco en polvo, c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
Algunos las prescriben del modo siguiente:
Almizcle. . . . . ʒß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . ʒj (12 dec.).
Goma amoniaco. . . . ʒij (24 dec.).
Extracto de opio. . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

5204. *Otras*, n. 2.

℞ Castóreo,
Extr. de valeriana, āā. ʒß 2 gr.
Asa fétida,
Gálbano, āā. . . . . ḡxviij (1 gr.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
D. Una, dos y despues tres píldoras al dia.

5205. *Otras*, n. 3.

℞ Almizcle,
Extr. de valeriana, āā. ʒj (12 dec.).
Extracto de opio. . . . ʒß (6 dec.).
H. S. A. diez y seis píldoras. Cada una contiene tres cuartas partes de grano de opio y uno y medio de almizcle.
D. Una á dos al dia, aumentando progresivamente.

5206. *Otras*, n. 4.

℞ Gálbano,
Asa fétida,
Mirra, āā. . . . . ʒij (8 gr.).
Castóreo,
Valeriana, āā. . . . . ʒj (12 dec.).
Bálsamo líquido del Perú, c. s.
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.). *D.* Dos píldoras, aumentando gradualmente hasta llegar á seis al dia.

5207. *Otras* (MEZA).

℞ Asa fétida,
Extracto de acíbar gomoso,
Goma amoniaco, āā. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡiij (15 cent.).
D. Cuatro al medio dia, por mañana y tarde. Se bebe despues una infusion concentrada de melisa azucarada convenientemente, y aromatizada con una cucharadita de agua de flor de naranjo.

5208. *Otras* (PIDERIT).

℞ Asa fétida. . . . . ḡiij (3 gr.).
Castóreo. . . . . ḡiij (3 gr.).
Acido sucínico sublim. ḡxviij (1 gr.).
Aceite animal de Dippel. . . . . ḡiv (50 cent.).
Se forma una masa con c. c. de tintura alcohólica de mirra.

5209. P. ANTIHISTÉRICAS (*Rosenstein*).

℞ Asa fétida. . . . . 3ij (8 gr.).
Sal de cuerno de ciervo. 3ß (2 gr.).
Castóreo. . . . . 3ß (2 gr.).
Opio. . . . . gv (25 cent.).
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
D. Una píldora dos ó tres veces al dia.

5210. *Otras* (SELLE).

℞ Gálbano,
Asa fétida,
Extracto de angélica, ãã. 3ß (15 gr.).
Castóreo,
Azafran, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Opio. . . . . 3ß (2 gr.).
Tintura alcohólica de castóreo, c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Espasmos histéricos. *D.* Cinco á ocho, dos veces al dia.

5211. *Otras* (SYDENHAM).

℞ Castóreo. . . . . gxv (75 cent.).
Mirra,
Goma gálbano, ãã. . 3ß (2 gr.).
Asa fétida. . . . . 3j (4 gr.).
Tintura de valeriana, c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.) que se cubren con licopodio.
I. Histérico. *D.* Tres á ocho píldoras.

5212. P. ANTIICTÉRICAS (*Buchan*).

℞ Acibar sucotrino,
Ruibarbo,
Jabon medicinal, ãã. . . . 5j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Ictericia, cuando la enfermedad se prolonga, é infartos del hígado. *D.* Cinco á seis píldoras al dia.

5213. *Otras* (COEROLY).

℞ Extracto de saponaria. . 3ij (8 gr.).
Protocloruro de mercur. 5j (4 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Tres ó cuatro al dia.

5214. *Otras* (MACGREGOR).

℞ Extracto de cicuta,
Extracto de quina, ãã. . . 3j (4 gr.).
Gengibre en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos ó tres al dia.

5215. *Otras* (STORCK).

℞ Extracto de cicuta. . 5j (4 gr.).
Píldoras de Belloste. gxv (75 cent.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia.

5216. P. ANTILÁCTEAS (H. DE M.).

℞ Sulfato de potasa. . . . 3v (20 gr.).
Alcanfor,
Nitrato de potasa, ãã. 3ij (8 gr.).
Arrope de sauco y almidon. . . c. s.
Hágánse ciento veinte píldoras.
D. Dos por la mañana en ayunas y dos antes de comer, con una taza de cocimiento de grama ó de caña.

5217. P. ANTILECHOSAS.

℞ Calomelanos. . . . . gjx (50 cent.).
Etiope mineral. . . . gxviij (4 gr.).
Sulfato de potasa. . . 5j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . gv (25 cent.).
Resina de jalapa. . . gjx (50 cent.).
Goma en polvo. . . . gxviij (4 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Infartos lechosos de las mamas, enuresis. *D.* Cuatro píldoras, mañana y noche.

5218. *Otras* (MASSAU).

℞ Acetato de sosa. . . . . 3v (20 gr.).
Alcanfor,
Nitro, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Rob de saúco. . . . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.
D. Dos por la mañana en ayunas y dos antes de comer, y se bebe

despues una taza de infusion de escolopendra.

I. Destete, infarto lechoso de las mamas, marco.

5219. P. ANTILEUCORRÉJICAS (*Ritto*).

℞ Cólchico en polvo. . . gxviij (1 gr.).
Jabon medicinal. . . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una píldora tres veces al dia, y se aumenta cada dia una píldora hasta nueve en las veinticuatro horas, á menos que no lo contraindique su efecto purgante.

5220. P. ANTIMONIADAS (*Ammon*).

℞ Tártaro emético,
Castóreo, ää . . . . . gvj (3 dec.).
Hojas de sen,
Ruibarbo, ää. . . . . gxviij (4 gr.).
Jabon. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de taraxacon. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Amaurosis, conjuntivitis, tétanos, reumatismo, sífilides. *D.* Cuatro píldoras, tres veces al dia.

5221. *Otras* (HILDENBRAND).

℞ Antimonio crudo. . . . . 5ß (2 gr.).
Goma de guayaco,
Extr. de dulcamara, ää. 5j (4 gr.).
Extracto de taraxacon. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Reumatismo articular. *D.* Dos píldoras cada dos horas.

5222. P. ANTINEURÁLGICAS.

℞ Extracto de acónito,
Extracto de beleño, ää. gxviij (1 gr.).
Subnitr. de bismuto. gxij (6 dec.).
Valeriana en polvo. . 5ß (2 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Corea, reumatismo, clidrosis, epilepsia, neuralgia. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5223. *Otras* (CORBEL LAGNEAU).

℞ Extracto de valeriana,
Asa fétida,
Tridacio, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto tebáico. . . . gv (25 cent.).
Sulfato de quinina. . . gxij (6 dec.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Cefalalgias con tipo intermitente muy oscuro, gastralgias de curso periódico.

5224. *Otras* (MARCHAL DE CALVI).

℞ Sulfato de quinina. . . gxvj (8 dec.).
Extracto de valeriana. gxx (10 dec.).
Extr. acuoso de opio. gjv (2 dec.).
Polvo de hojas de naranjo,
Polvo de canela, ää. . gxx (1 gr.).
Jarabe de belladona. . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Una de hora en hora. A la tercera se duerme el enfermo cesando el dolor.

5225. *Otras* (RECAMIER).

℞ Ipecacuana en polvo,
Opio purificado, ää. giij (15 cent.).
Carbonato de amoniaco,
Alcanfor, ää. . . . . gxij (6 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Una cada tres horas.

5226. P. ANTINEURÁLGICAS DE MEGLIN *ó Píldoras de Meglin* (F. F.).

℞ Extracto de beleño negro,
Extracto de valeriana,
Oxido blanco de zinc, ää. ℥j (32 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Son antiespasmódicas y muy eficaces en un gran número de afecciones nerviosas, y en particular en las neurosis con dolores, calambre doloroso de la cara, corea, amenorrea, gastralgia, hemicránea y neuralgias. Se pueden reemplazar los extractos de beleño y valeriana por el de acónito y mejor aun por el de estramonio.
D. Se empieza por una píldora,

y se aumenta progresivamente hasta seis u ocho.

La misma composicion tienen las PILDORAS ANTINEURÁLGICAS DE LOS H. M., solo que contienen extracto de belladona en lugar del de beleño.

5227. P. ANTINEURALGICAS DE MEGLIN (H. DE M.).

℞ Extracto de valeriana,
Extracto de fumaria,
Extracto de beleño,
Oxido de zinc, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

I. Epilepsia y neuralgias. *D.* Una píldora varias veces al dia.

5228. P. ANTINEURÁLGICAS (*Trousseau*).

℞ Extracto de estramonio,
Extracto de opio, ãã. . . gx (5 dec.).
Oxido de zinc. . . . . 3ij (8 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.

D. Se administran de una á ocho en las veinticuatro horas Se aumentará la dosis hasta que el enfermo empiece á experimentar una turbacion notable de la vista, y se continuará así á lo menos quince dias despues de haber cesado los dolores.

La fórmula de los H. DE M. contiene gij (1 dec.) de extracto de estramonio, gij (1 dec.) de extracto de opio y 3ij (8 gr.) de óxido de zinc.

5229. P. ANTIODONTÁLGICAS.

℞ Opio puro,
Extracto de beleño,
Extr. de belladona, ãã. ℈ß (6 dec.).
Aceite de clavo. . . . . 3 gotas.
Raiz de pelitre. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras, que se cubrirán con polvo de pelitre.

5230. *Otras*, n. 2.

℞ Opio puro,
Alcanfor, ãã. . . . . gj (5 cent.).
Aceite de clavo,
Tint. de pimienta, ãã. gij (10 cent.).
H. S. A. cuatro píldoras.

5231. *Otras*, n. 3.

℞ Creosota. . . . . gjv (20 cent.).
Opio en polvo. . . . gij (10 cent.).
Goma arábiga. . . . gv (25 cent.).
H. S. A. diez píldoras.

5232. *Otras*, n. 4.

℞ Catecú,
Sangre de drago,
Mirra, ãã. . . . . gxxjv (12 dec.).
Extracto de belladona,
Opio puro, ãã. . . . gxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de gj (5 cent.).

5233. *Otras* (MOST).

℞ Asa fétida. . . . . 3j (4 gr.).
Trementina de Venecia. gxij (6 dec.).
Alcanfor. . . . . gvj (3 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.

I. Odontalgia nerviosa. *D.* Una píldora cubierta de algodon, que se introduce en la oreja.

5234. P. ANTIPERIÓDICAS.

℞ Sulfato de quinina. . . 3j (12 dec.).
Extracto de quina. . . . 3ß (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja, c. s.
H. S. A. doce ó veinticuatro píldoras.

5235. *Otras*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina,
Extracto de genciana, ãã. 3ß (2 gr.).
Sal de ajenjos. . . . . c. s.
Mezclese y dividase en doce píldoras.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes, neuralgias, hemorragias periódicas, etc. *D.* Una píldora cada dos ó tres horas en la apirexia.

5236. P. ANTIRAQUÍTICAS (*Neumann*).

℞ Asa fétida,
Peróxido de hierro, ãã. 3ij (12 gr.).

Ruibarbo en polvo,
Gengibre en polvo, ãã. 3jß (6 gr.).
Extracto de taraxacon, c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, raquitis, tumores blancos. *D.* Cuatro á seis píldoras tres veces al dia.

5237. P. ANTIREUMATICAS.

℞ Extracto de alcachofa,
Polvo de regaliz, ãã. . . 3jß (6 gr.)
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
H. S. A. noventa píldoras.
I. Reumatismo crónico. *D.* Tres ó cuatro píldoras, cuatro veces al dia.

5238. *Otras* (HILDENBRAND).

℞ Extracto de acónito,
Azufre dorado de antimonio,
Asa fétida, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de taraxacon, c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Dolores articulares reumáticos. *D.* Tres píldoras, tres veces al dia.

5239. P. ANTIREUMÁTICAS (*Lombard*).

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . 9j (12 dec.).
Raiz de regaliz. . . . . 3j (4 gr.).
Rob de saúco. . . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Reumatismo articular. *D.* Una píldora cada dos horas, aumentando poco á poco hasta seis ó nueve.

5240. *Otras* (RICHTER).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos,
Extr. de acónito, ãã. gxviij (4 gr.).
Extracto de regaliz,
Resina de guayaco, ãã. 5jß (6 gr.).
Extr. de dulcamara. . 5ijß (10 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Ocho píldoras, cuatro veces al dia.

5241. *Otras* (VOGT).

℞ Semillas de estramonio. 9j (12 dec.).
Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
Sabina. . . . . 5jß (6 gr.).
Extracto de poligala virginiana. . . . . gxc (5 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Seis píldoras, tres ó cuatro veces al dia.

5242. P. ANTISÉPTICAS (*Dupuytren*).

℞ Alcanfor en polvo. . . 9j (12 dec.).
Almizcle en polvo. . . gviij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . gij (1 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Afecciones gangrenosas, calenturas adinámicas, gangrena de hospital. *D.* Cinco ó seis al dia.

5243. *Otras* (KAPELER).

℞ Alcanfor,
Nitrato de potasa,
Goma arábiga en polvo, ãã. . . . . 9j (12 dec.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Afecciones gangrenosas, casos en que se manifiesta tendencia á la gangrena ó se ha declarado ya. *D.* Cuatro á ocho píldoras.

5244. P. ANTISIFILÍTICAS.

℞ Deutocloruro de merc. gvj (3 dec.).
Tridacio. . . . . gxviij (1 gr.).
Extr. de zarzaparrilla. gxviij (1 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro píldoras.
I. Sífilis constitucional, y se puede secundar el efecto del sublimado por la tisana ó jarabe de zarzaparrilla ó guayaco, y si hay infartos ganglionicos se reemplaza el sublimado por los ioduros de mercurio.

5245. *Otras* (ALIBERT).

℞ Malvabisco en polvo. 3iv (125 gr. .

Protocloruro de mercurio,
Resina de guayaco, ãã. ʒij (60 gr.).
Jarabe de membrillo, c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Cuatro á seis píldoras al dia. Cada una contiene gj (5 cent.) de calomelanos.

5246. P. ANTISIFILÍTICAS (*Dupuytren*).

℞ Dentocloruro de merc. gviij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . gx (5 dec.).
Extracto de quina. . . gcviij (5 gr.).
Quina en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Afecciones sifilíticas.
Nota. Cada píldora contiene la quinta parte de grano de sublimado. *D.* De una á tres al dia.

5247. *Otras* (DUPUYTREN).

℞ Sublimado corrosivo. gviij (4 dec.).
Extracto de opio. . . gx (5 dec.).
Extracto de guayaco. ʒiß (6 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
Mialhe propone en lugar de estas las píldoras cloro-mercúricas, para los casos en que está contraindicado el opio.
I. Afecciones sifilíticas constitucionales. Cada una contiene g$^1/_4$ (1 cent.) de sublimado y g$^1/_4$ (12 mil.) de extracto acuoso de opio. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5248. *Otras* (REGAMIER).

℞ Sublimado corrosivo,
Extr. gom. de opio, ãã. gvj (3 dec.).
Etiope mineral,
Quermes mineral, ãã. . ʒß (2 gr.).
Miga de pan. . . . . c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
D. Una píldora el primer dia, dos en los dias siguientes, tres en los otros tres y así sucesivamente hasta ocho.

5249. *Otras* (SARRASIN).

℞ Oxido negro de merc. ʒij (8 gr.).
Extracto de saponaria. ʒiv (16 gr.).
Extracto de opio. . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. cien píldoras iguales.
D. Una por la mañana y dos por la tarde; al mismo tiempo se bebe un vaso de un cocimiento fuerte de saponaria, hecho con ʒij (60 gr.) de esta raiz y seis cuartillos (3 lit.) de agua, que se reducirán á cuatro por la ebullicion.

5250. P. ANTISUDORÍFICAS (H. M.).

℞ Acetato de plomo cristalizado,
Polvos de malvab. ãã. ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
para hacer una masa, que se dividirá en doce píldoras iguales.
D. Una cada cuatro horas; esta dosis se aumentará ó disminuirá segun los efectos y los dolores cólicos que produzca.

5251. P. ANTITETÁNICAS.

℞ Arnica en polvo. . . . ʒiß (10 gr.).
Agua de Luce. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor,
Almizcle, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
Se puede añadir gxviij á ʒj (1 á 4 gr.) de nitrato de potasa segun el estado del aparato urinario.
I. Tétanos, mordeduras de animales venenosos. *D.* Una píldora de hora en hora.

5252. P. ANTITÍPICAS (H. M.).

℞ Sulfato de quinina. . . gxij (6 dec.).
H. S. A. doce píldoras iguales.
I. Calenturas intermitentes. *D.* Dos píldoras cada tres cuatro horas durante la apirexia.

5253. P. ANTITÍSICAS (*A. Latour*).

℞ Sal marina,
Tanino, ãã. . . . . ʒiiß (10 gr.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
D. Una cada hora durante un mes. Al mismo tiempo hace tomar una infusion de quina, de hierro y buenos alimentos.

5254. P. ANTITISICAS (*Farmacopea de Palacios*).

℞ Azúcar de Saturno. . . . 5j (4 gr.).
Sal de Marte. . . . . 5ß (2 gr.).
Sangre de drago. . . . . 5jß (6 gr.).
Bálsamo de copaiba. . . . c. s.
H. S. A. *I.* Tisis y catarro pulmonar crónico. *D.* De 3ß á 3j (6 á 12 dec.).

5255. P. ANTITUBERCULOSAS (*Righini*).

℞ Mirra. . . . . 3ij (24 dec.).
Opio puro. . . . . gjv (2 dec.).
Ioduro de potasio. . . . 5ß (2 gr.).
Rob de sauco. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos píldoras tres veces al dia.

5256. P. ANTIVENÉREAS.

℞ Cloruro de oro y sodio. gß (25 mil.).
Extracto de saponaria. 5j (4 gr.).
Goma arábiga en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Una á ocho píldoras al dia; cada una contiene una sexagésima parte de grano de cloruro.

5257. *Otras* (SERRE).

℞ Cloruro de plata y amoniaco. . . . . gj (5 cent.).
Licio en polvo. . . . . gij (4 dec.).
Conserva de tilo. . . . c. s.
H. S. A. catorce píldoras.
I. Enfermedades sifilíticas, diarrea. *D.* Una mañana y tarde.

5258. P. APERITIVAS.

℞ Aribar,
Sulfato de potasa,
Ruibarbo,
Jabon blanco, , ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Extracto de genciana,
Extracto de taraxacon, ãã. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Hidropesía, ascitis, anasarca.
D. Cinco mañana y tarde.

5259. P. DE ARMENIA.

℞ Bálsamo de copaiba . . . c. s. q.
Se evapora en el baño maria hasta la consistencia emplástica, y se añade despues para 5j (32 gr.) de residuo
Magnesia calcinada. . 5ß (2 gr.).
Cuando la masa esté casi solidificada se la agrega
Cubebas en polvo,
Bol de Armenia en polvo, ãã. . . . . 5jß (10 gr.).
H. S. A. una masa para píldoras que se divide en bolos de gviij (4 dec.) que se rodean de tierra de bolo de Armenia. Para ocultar mejor el olor seria mas conveniente cubrirlas de gelatina ó convertirlas en grajea.
I. Blenorragias. Estas píldoras recuerdan los bolos de Armenia del doctor Cárlos Albert, de charlatanesca memoria.

5260. P. DE ARSENIATO DE HIERRO (*Biett*).

℞ Arseniato de hierro. giij (15 cent.).
Extracto de lúpulo. . 5j (4 gr.).
Polvo de malvabisco. 5ß (2 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . c. s.
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras iguales.
I. Afecciones cancerosas, eczema, liquen crónico, afecciones escamosas de la piel, como la lepra, soriasis, lupus, neuralgias rebeldes, heridas envenenadas, escrófulas, sífilis, herpes ulcerados y corrosivos, úlceras, lepra, elefantiasis, pian. *D.* Una al dia.
Nota. Cada píldora contiene una decimasesta parte de grano de arseniato.

5261. P. DE ARSENIATO DE SOSA (*Biett*).

℞ Extracto hidroalcohólico de cicuta. . . . 9j (12 dec.).
Arseniato de sosa. . . . gij (1 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Eczema, liquen crónico, afecciones escamosas, lepra, soriasis, lupus, pian, pitiriasis, lepra, herpes. *D.* Una á dos píldoras al dia.

5262. P. ARSENICALES (*Boudin*).

℞ Arseniato de sosa. . . gr½ (1 cent.).
Se disuelve en algunas gotas de agua destilada, y con c. s. de un polvo inerte se hacen veinte píldoras.
D. Una á dos píldoras en las veinticuatro horas.

5263. P. ARSENICALES CONTRA EL CATARRO PULMONAR CRÓNICO (*Garrin*).

℞ Acido arsenioso. . . . gj (5 cent.).
Extracto de opio. . . . gx (50 cent.).
H. S. A. veinticinco píldoras.
I. Se refiere un caso de curacion del catarro pulmonar crónico con el uso del ácido arsenioso. *D.* Una píldora mañana y noche.

5264. P. DE ARSÉNICO AMERICANAS.

℞ Acido arsenioso. . . . gij (1 dec.).
Opio en polvo. . . . . gviij (4 dec.).
Jabon en polvo. . . . 9j (12 dec.).
H. S. A. una masa que se divide en treinta y dos píldoras iguales.
I. Calenturas intermitentes pertinaces, que resisten á las preparaciones de quina. *D.* Una píldora, y se aumenta gradualmente la dosis hasta tres. Se debe observar sus efectos.

5265. P. DE ASA FÉTIDA.

℞ Asa fétida,
Extracto de quina, ãã. . 5ß (2 gr.).
Belladona en polvo. . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Coqueluche, vómitos, esplenitis, polidipsia, asma, hipocondría, hipertrofia, histérico, esofagismo, parálisis, neuralgias. *D.* Una píldora de dos en dos horas.

5266. *Otras*, n. 2.

℞ Asa fétida. . . . . 5ijß (10 gr.).
Extracto de lechuga. . gtjv (3 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
D. Una píldora cada dos horas.

5267. P. DE ASA FÉTIDA Y ALCANFOR.

℞ Asa fétida. . . . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Afecciones espasmódicas. *D.* Se dan cinco á seis al dia.

5268. P. DE ASA FÉTIDA *ó Píldoras de jabon compuestas* (H. DE AL.).

℞ Asa fétida. . . . . 3ij (8 gr.).
Jabon amigdalino. . . . 5j (4 gr.).
Aceite esencial de hinojo, 6 gotas.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Dos á seis píldoras al dia.

5269. P. DE ASA FÉTIDA COBREOSAS (*Feiler*).

℞ Asa fétida. . . . . gix (30 dec.).
Verde gris. . . . . gvij (6 dec.).
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, ciertos casos de tisis incipiente, raquitis, tumores blancos, tumores glandulares. *D.* Dos á tres píldoras al dia.

5270. P. DE ASA FÉTIDA CON BELEÑO.

℞ Asa fétida. . . . . gtjv (3 gr.).
Extracto de beleño. . gjx (50 cent.).
Bálsamo del Perú. . c. s.
Aceite de sucino rect. 20 gotas.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Amenorrea, tétanos, vómitos, histérico, hipocondría, tisis, polidipsia, asma, corea, esofagismo, parálisis, neuralgias. *D.* Seis píldoras al dia.

5271. P. DE ASA FÉTIDA COMPUESTAS (H. DE ING.).

℞ Asa fétida. . . . . gxx (10 dec.).
Ipecacuana,
Cebolla albarrana, ãã. gij (1 dec.).
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una á dos píldoras, tres ó cuatro veces al dia.

5272. P. DE ASA FÉTIDA ESCILÍTICAS.

℞ Asa fétida. . . . . 3ß (2 gr.).
Digital. . . . . gxviij (1 gr.).
Escila. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de enebro,
Extr. de coloquint., ää. gxviij (1 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Hipertrofia, hidropesías pasivas, anasarca, hidrotorax, vómitos, coqueluche, neuralgias. *D.* Una píldora cada dos horas.

5273. P. DE ASA FÉTIDA É IODURO DE HIERRO.

℞ Asa fétida,
Valeriana en polvo,
Ioduro de hierro, ää. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Se toman cinco á seis al dia en la clorosis complicada con accidentes histéricos.

5274. P. DE ASA FÉTIDA Y MANZANILLA (*Laferla*).

℞ Asa fétida,
Extr. de manzanilla, ää. 3j (4 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Previene la muerte del feto en las mujeres que ya han tenido síntomas de aborto. *D.* Dos píldoras, una mañana y noche. Se bebe despues una taza de café. Se aumenta la dosis cada cuatro ó cinco dias.

5275. P. DE ASA FÉTIDA MOSCADAS.

℞ Asa fétida,
Nitro, ää. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de quina,
Extr. de catecú, ää. 3j (4 gr.).
Almizcle. . . . . gxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Neuralgias, amenorrea, histérico, hipocondría, neumatosis, asma, ataxia, íleo. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia y aun mas.

5276. *Otras*, n. 2.

℞ Asa fétida. . . . . 3ß (6 dec.).
Almizcle. . . . . gvj (3 dec.).
H. S. A. seis píldoras.
D. Una á dos al dia.

5277. P. DE ASA FÉTIDA Y VALERIANA.

℞ Asa fétida,
Valeriana en polvo, ää. 3ijß (10 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
D. Cinco á seis al dia.

5278. P. DE ASCLEPIAS.

℞ Asclepias,
Extracto de taraxacon,
Alcanfor, ää. . . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Lepra, elefantiasis, herpes. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5279. P. ASIÁTICAS (F. F.).

℞ Acido arsenioso pulverizado. . . . . gj (5 cent.).
Pimienta negra en p. gvij (60 cent.).
Goma arab. en polv. gij (10 cent.).
Agua comun. . . . c. s.
Se trituran por mucho tiempo el ácido arsenioso y la pimienta negra en un almirez de hierro hasta obtener una mezcla íntima, se añade la goma y el agua, y se hacen doce píldoras.

Es muy importante triturar mucho tiempo el ácido y la pimienta para que aquel se reparta con uniformidad en la masa, y cuando se hagan cantidades de alguna consideracion se debe triturar por algunas horas.

I. Afecciones nerviosas, epilepsia, calenturas intermitentes y algunas formas secas y rebeldes de la piel, soriasis, eczema, liquen, lupus. Antiguamente se usaban en la India contra la lepra tuberculosa. Son uno de los agentes mas enérgicos y preciosos de la terapéutica. *D.* Se empieza dando una, y rara vez se pasa de dos.

5280. *Otras* (H. DE M.).

℞ Acido arsenioso. . . gvij (35 cent.

Pimienta negra en polvo. 5j (4 gr.).

H. S. A. cien pildoras iguales. Cada una contiene un décimocuarto de grano de ácido arsenioso.

I. Lepra tuberculosa, herpes liquenoides inveterados y algunas erupciones escamosas. *D.* Una píldora al dia, y rara vez se puede pasar de dos.

5281. P. ASTRINGENTES.

℞ Alumbre. . . . . 5j (4 gr.).
Catecú,
Sangre de drago, ãã. . . 5ß (2 gr.).
Jarabe diacodion. . . . . c. s.

H. S. A. pildoras de giij (15 cent.).

I. Hemotisis, lienteria, blenorragia, disenteria crónica, neurosis. *D.* Tres á diez pildoras al dia.

5282. *Otras*, n. 2.

℞ Mercurio dulce. . . . . 9j (12 dec.).
Bálsamo de copaiba. . . 5iij (12 gr.).
Catecú. . . . . 5iij (12 gr.).
Jarabe de consuelda mayor. . . c. s.

H. S. A. ciento cincuenta pildoras.

I. Leucorrea y blenorragias crónicas. *D.* Doce al dia, á saber: cuatro por la mañana, cuatro al medio dia y cuatro por la noche.

5283. *Otras*, n. 3.

℞ Acetato de plomo,
Ipecacuana. ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Opio. . . . . 9ß (6 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. cuarenta pildoras.

I. Hemorragias internas pasivas.

5284. *Otras* (CAPURON).

℞ Catecú en polvo. . . . gvij (6 dec.).
Alumbre en polvo. . . gvj (3 dec.).
Opio en polvo. . . . . gij (1 dec.).
Jarabe de rosas rojas. c. s.

H. S. A. pildoras de gv (25 cent.).

I. Blenorrea, diarrea y disenteria crónicas, hemorragias pasivas, bronquitis, catarro crónico, neurosis. *D.* Una ó dos pildoras al dia.

5285. *Otras* (CAVARRA).

℞ Tanino en polvo. . . . gvj (3 dec.).
Goma aráb. en polvo. gxij (6 dec.).
Azúcar en polvo. . . . gLxxij (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. pildoras de gjv (2 dec.).

Se administran á la dosis de una á cuatro por la mañana é igual número por la tarde, para combatir varios flujos que dependen de relajacion.

5286. *Otras* (CULLEN).

℞ Sangre de drago en polv. 5j (4 gr.).
Alumbre en polvo. . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.

H. S. A. veinte pildoras.

I. Menorragias, hematemesis, hematuria. *D.* En el dia.

5287. *Otras* (CULLERIER).

℞ Cubebas,
Catecú,
Sangre de drago,
Alumbre, ãã. . . . . 3ß (16 gr.).
Carbonato de hierro. . 5vj (24 gr.).
Goma en polvo,
Jarabe diacodion, ãã. . . . . c. s.

H. S. A. ciento noventa y ocho pildoras

I. Blenorragias crónicas. *D.* Siete á ocho pildoras al dia.

5288. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Sulfato de zinc. . . . . gx (5 dec.).
Mirra en polvo. . . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.

H. S. A. veinte pildoras.

I. Leucorreas y catarros crónicos, blenorragias, hemorragias pasivas. *D.* Dos pildoras al dia.

5289. *Otras* (H. DE M.).

℞ Alumbre en polvo. 1
Catecú pulverizado. 1
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.

H. S. A. pildoras de gij (1 dec.).

I. Diarrea é irritaciones intesti-

nales, hemorragias pasivas, leucorrea y blenorragia crónicas. *D.* De cuatro á ocho píldoras.

5290. P. ASTRINGENTES (*Hufeland*).

℞ Alumbre,
Catecú, ãã. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de genciana. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Soriasis, diarrea, disenteria, hemotisis, hemorragias pasivas, leucorrea, catarro útero-vaginal, blenorrea, neurosis. *D.* Cuatro píldoras cada tres horas.

5291. *Otras* (QUARIN).

℞ Limaduras de hierro. gxviij (1 gr.).
Alumbre,
Trementina,
Extracto de quina, ãã. gr.jv (3 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Leucorrea, blenorrea, neurosis, diarrea, disenteria. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5292. *Otras* (RECAMIER).

℞ Alumbre. . . . . gvj (3 dec.).
Extracto de opio. . . . gij (1 dec.).
Catecú. . . . . 9j (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Blenorrea inveterada, hemorragias pasivas, flujos mucosos crónicos, etc. *D.* Una píldora cada cuatro horas.

5293. *Otras* (RADIUS).

℞ Sulfato de zinc. . . . 9j (4 gr.).
Trement. de Venecia. gxviij (1 gr.).
Tormentila. . . . . 9ß (6 dec.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Gonorrea. *D.* Una píldora tres veces al dia.

5294. *Otras* (SCHUBART).

℞ Bálsamo del Perú. . . . . 9j (4 gr.).
Extr. de poligala amarga. 9ij (8 gr.).
Malvabisco. . . . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.
I. Flujos mucosos crónicos. *D.* Diez píldoras, cuatro veces al dia.

5295. *Otras* (SWEDIAUR).

℞ Goma quino. . . . . 3ß (15 gr.).
Bálsamo del Canadá. . 3ij (60 gr.).
Raiz de tormentila en polvo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
I. Blenorragias rebeldes y en algunas hemorragias. *D.* Cuatro píldoras mañana y tarde.

5296. *Otras* (WALCH).

℞ Sulfato de hierro cristalizado en polvo,
Goma quino en polvo, ãã. 9j (4 gr.).
Trementina cocida,
Extracto de genciana, ãã. 9ij (8 gr.).
Polvo de régaliz. . . . . c. s.
H. S. A. ciento ochenta píldoras.
I. Blenorreas rebeldes. *D.* Ocho á diez píldoras, cuatro veces al dia.

5297. P. ASTRINGENTES Y CALMANTES (*Dupuytren*).

℞ Extracto de opio. . . . gij (1 dec.).
Sulfato de zinc. . . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. dos píldoras.
Se dan dos al dia en el tratamiento de los flujos mucosos y dolorosos de la uretra y de la vagina, en las diarreas que sobrevienen á consecuencia de una operacion cualquiera, sobre todo cuando proviene de reabsorcion purulenta.

5298. P. ASTRINGENTES FERRUGINOSAS (SUNDELIN).

℞ Extracto seco de palo de Campeche, Cascarilla en polvo, ãã. 3jß (6 gr.).
Oxido negro de hierro. . 9j (4 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Leucorrea asténica. *D.* Cinco á diez píldoras, tres veces al dia.

5299. P. ASTRINGENTES VITRIOLADAS.

℞ Extracto de ratania pulverizado,
Catecú en polvo, ãã. gr.jv (3 gr.).
Almáciga en polvo. . gxxxvj (2 gr.).

Sulf. de hierro purif. ℊxviij (1 gr.).
Trementina fina. . . . ℊj.jv (3 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras. Cada una contiene cerca de ℊß (25 mil.) de sulfato de hierro ó dos tercios.

5300. P. ASTRINGENTES (*Santa María*).

℞ Conserva de rosas. . . ℥ij (60 gr.).
Copaiba. . . . . ℥ß (15 gr.).
Sangre de drago. . . . ʒij (8 gr.).
Calomelanos. . . . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).
I. Gonorrea.

5301. P. ATEMPERANTES.

℞ Nitro,
Alcanfor, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de opio. . . . ℊxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
I. Blenorragia en el período agudo. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5302. P. DE ATROPINA.

℞ Atropina. . . . . ℊij (10 cent.).
Miel,
Malvabisco en polvo, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras. Cada una contiene una quincuagésima parte de grano de atropina.
I. Epilepsia, corea y otras neurosis. *D.* Una á diez píldoras al dia.

5303. P. AURÍFERAS (*Chrestien*).

℞ Cloruro de oro,
ó Cianuro de oro,
ó Cloruro de oro y sodio,
ú Oxido de oro. . . . . ℊj (5 cent.).
Extracto de torbisco. ℊxv á ℊxx (75 á 100 cent.).
Jarabe simple . . . . . c. s.
H. S. A. píldoras.
I. Afecciones escrofulosas y sobre todo afecciones sifilíticas. *D.* Una píldora, y despues dos, tres ó mas al dia.

5304. P. DE AZUFRE.

℞ Azufre. . . . . ʒj (4 gr.).
Trementina,
Guayaco, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de borraja. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Cistitis, prurigo, helmintiasis, asma, escarlatina, eczema, pian, iritis, estafiloma. *D.* Una píldora cada media hora.

5305. P. AZULES ó *Píldoras mercuriales simples.*

℞ Mercurio. . . . . ʒj (4 gr.).
Conserva de rosas. . . ʒjß (6 gr.).
Se trituran hasta que se extinga completamente el mercurio y se añade:
Regaliz en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
I. Esta preparacion se usa en Inglaterra como laxante suave y alterante. *D.* ℊiij á ℊvj (15 á 30 cent.) al dia. Tres granos (15 cent.) de esta masa contienen ℊj (5 cent.) de mercurio.

5306. P. BALSÁMICAS.

℞ Bálsamo líquido del Perú. . . . 1
Polvo de regaliz. . . . . c. s.
Bálsamo de azufre anis. algunas got.
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).

5307. *Otras*, n. 2.

℞ Acíbar. . . . . ʒß (2 gr.).
Bálsamo del Perú,
Benjuí, ãã. . . . . ℊjx (50 cent.).
Azafran,
Mirra, ãã. . . . . ℊv (25 cent.).
Extracto de ruibarbo. ℊxviij (1 gr.).
Extracto de opio. . . ℊjv (20 cent.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Hemorroides, leucorrea, diabetes, iritis. *D.* Seis píldoras al dia.

5308. *Otras*, n. 3.

℞ Mirra,
Extracto de saponaria,
Jabon, ãã. . . . . ℊxv (15 gr.

Bálsamo de copaiba. . ʒß (2 gr.).
Acido benzóico. . . . . gxviij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Blenorrea y leucorrea. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5309. P. BALSÁMICAS.

℞ Bálsamo del Canadá. . ʒij (60 gr.).
Goma quino. . . . . ʒß (15 gr.).
Tormentila. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Diarrea crónica y diabetes. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5310. *Otras* (BOERHAAVE).

℞ Esperma de ballena,
Trementina, ää. . . . ʒß (16 gr.).
Mirra. . . . . ʒij (8 gr.).
Se machaca y se mezcla exactamente la mirra con la esperma de ballena; despues se añade la trementina y cantidad suficiente de polvo de incienso para hacer píldoras de gij (15 cent.).
I. Tisis, catarros pulmonares, etc. *D.* Una cada tres horas.

5311. *Otras* (CHABERLY).

℞ Bálsamo de Tolú. . . . . ʒij (8 gr.).
Bálsamo de estoraque. . ʒjß (6 gr.).
Carbonato de magnesia. c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. incontinencia de orina. *D.* Seis píldoras al dia.

5312. *Otras* (GALBIUS).

℞ Trementina. . . . . ʒj (30 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒß (15 gr.).
Regaliz en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Gonorrea virulenta. *D.* Una píldora de hora en hora.

5313. *Otras* (H. DE M.).

℞ Goma amoniaco. . . . . ʒiij (12 gr.).
Mirra,
Acido benzóico, ää. . . ʒß (2 gr.).
Bálsamo peruano sólido. ʒj (4 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Asma, tos pertinaz y tisis pulmonar. *D.* ʒß á ʒj (6 á 12 dec.).

5314. P. BALSÁMICAS (*Hoffmann*).

℞ Mirra,
Acíbar,
Ext. de cléb. negro, ää. ʒv (20 gr.).
Extracto de cardo santo,
Extracto de ajenjos,
Extracto de fumaria,
Extracto de centaura menor,
Extr. de milenrama, ää. ʒj (30 gr.).
Trementina,
Benjui,
Extracto de enebro,
Extracto de yedra terrestre, ää. . . . . ʒß (15 gr.).
Azafran. . . . . ʒj (4 gr.).
Mézclese con cuidado y evapórese en el baño maría hasta obtener una masa á propósito para hacer píldoras.
D. De gjv á gxij (2 á 6 dec.) á la vez.

5315. P. BALSÁMICAS (*J. Juncker*).

℞ Mirra escogida,
Goma de enebro, ää. . ʒj (4 gr.).
Trementina ligeramente cocida,
Sucino amarillo, ää. . . ʒjß (6 gr.).
Raiz de jalapa. . . . . ʒiij (12 gr.).
Extracto vinoso de fumaria,
Extracto vinoso de cardo santo,
Extracto vinoso de ajenjos,
Extracto acuoso de celedria, ää. . . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Asma, hipocondría, vértigos, etc.

5316. P. BALSÁMICAS ASTRINGENTES CON CUBEBAS.

℞ Bálsamo de Tolú. . . . ʒij (8 gr.).
Bálsamo de copaiba. . . ʒj (4 gr.).
Cubebas en polvo. . . . ʒiij (12 gr.).
H. S. A. ciento veinte píldoras.
I. Blenorragias, leucorreas, blenorreas. *D.* Diez píldoras, tres veces al dia.

5317. P. BALSÁMICAS DE MARCUS.

℞ Mirra. . . . . 3iij (12 gr.).
Bálsamo del Canadá. . 3jß (6 gr.).
Extracto de opio. . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ǧijß (12 cent.).

I. Tisis ulcerosa. *D.* Dos á cuatro píldoras de hora en hora.

5318. P. BALSÁMICAS DE MORTON (F. F.).

℞ Polvo de milpiés. . 3xviij (72 gr.).
Polvo de goma amon. 3jx (36 gr.).
Flores de benjuí. . . 3vj (24 gr.).
Polvo de azafran. . . 3j (4 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . 3j (4 gr.).
Báls. de azufre anis. 3vj (24 gr.).
Se mezclan estas sustancias, y se pistan mucho tiempo para obtener una masa bien unida y homogénea.

I. Enfermedades crónicas del pecho y singularmente la tisis. Pueden ser útiles como expectorantes y resolutivas en los catarros antiguos. *D.* Dos á sesenta píldoras al dia.

No se debe platear estas píldoras por el azufre que contienen.

5319. *Otras* (F. E.).

℞ Milpiés preparados. . 3vj (24 gr.).
Goma amoniaco. . . . 3iij (12 gr.).
Acido benzóico. . . . 3jx (48 dec.).
Azafran,
Báls. neg. del Perú, ãã. 3j (12 dec.).
Aceite de trementina sulfurado. c. s.
H. S. A. píldoras.

I. Asma, tisis, neumonía y catarros crónicos. *D.* ǧvj á gxx (3 á 10 dec.).

5320. P. DE BÁLSAMO DEL CANADÁ.

℞ Bálsamo del Canadá. . 3ß (15 gr.).
Goma quino. . . . . 3j (4 gr.).
Tormentila. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ǧv (25 cent.).

I. Blenorrea, diabetes. *D.* Cuatro mañana y noche. V. n. 5311.

5321. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA.

℞ Bálsamo de copaiba. . 3ijß (10 gr.).
Calomelanos. . . . . gxviij (1 gr.).
Ruibarbo,
Catecú, ãã. . . . . ǧxc (5 gr.).
Cons. de rosas rojas. 3j (30 gr.).
H. S. A. píldoras de ǧvj (3 dec.).

I. Blenorragia, blenorrea. *D.* Una píldora mañana y noche, aumentando progresivamente la dosis.

5322. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA MAGISTRALES.

℞ Bálsamo de copaiba. . . 3j (32 gr.).
Magnesia calcinada. 3vj á 3viij (24 á 28 gr.).

Si se usa la magnesia blanca sería preciso aumentar un poco la dosis. Comunmente se necesita un peso igual al de la materia resinosa.

5323. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA OFICINALES (F. P.).

℞ Bálsamo de copaiba. 16
Magnesia calcinada. 1
Se mezcla íntimamente la magnesia con el bálsamo de copaiba y se menea de cuando en cuando. Se necesitan ocho ó diez dias para que se verifique la solidificacion.

5324. P. DE BARBA ROJA.

℞ Mercurio,
Acíbar, ãã. . . . . 3vj (24 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3ij (8 gr.).
Agárico. . . . . 3jv (16 gr.).
Aromas. . . . . 3iij (12 gr.).
Son una modificacion de las píldoras mercuriales de Belloste.

5325. P. DE BARCLAY *ó Píldoras antibiliosas de Barclay.*

℞ Extracto de coloquíntida compuesto. . . 3ij (8 gr.).
Resina de jalapa. . . . 3j (4 gr.).
Jabon amigdalino. . . 3jß (6 gr.).
Guayaco. . . . . 3iij (12 gr.).
Eméticо. . . . . ǧviij (4 dec.).

Esencia de enebro,
Esencia de alcaravea,
Esencia de romero, ãã. 4 gotas.
Jarabe de espino serval. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Se toman cinco ó seis al dia como purgante hidragogo.

5326. P. DE BARTON.

℞ Arsénico bl. porfiriz. gij (1 dec.).
Opio en bruto. . . . gviij (4 dec.).
Jabon medicinal, . gxxjv (12 dec.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Calenturas intermitentes rebeldes. *Cada* una contiene una décimaoctava parte de grano arsenioso.

5327. P. DE BELLADONA.

℞ Extracto de zumo depurado de belladon. gxviij (1 gr.).
Polvo de mirra,
Polvo de ipecac., ãã. ʒß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Asma. *D.* Se toma una por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

5328. *Otras*, n. 2.

℞ Raiz de belladona. . . gviij (4 dec.).
Sabina. . . . . ʒß (2 gr.).
Extr. de milenrama. . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Coqueluche, escarlatina, ictericia, oftalmia, amaurosis, tisis, asma, priapismo, bronquitis, corea, disenteria, hepatitis, metritis, muermo. *D.* Dos á seis al dia.

5329. *Otras* (FROUSSEAU).

℞ Extr. de zumo depurado de belladona,
Extracto de opio, ãã. . gjv (2 dec.).
Extracto de valeriana. ʒß (2 gr.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Coqueluche. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5330. P. DE BELLADONA FERRUGINOSAS (*C. Le Blas*).

℞ Extracto de belladona. gij (1 dec.).
Carbonato de hierro. . gx (5 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
I. Hipo convulsivo complicado con gastralgia. *D.* Una píldora de hora en hora.

5331. P. DE BELLADONA IODURADAS.

℞ Extracto de zumo depurado de belladon. gxviij (1 gr.).
Protoioduro de hierro. ʒß (2 gr.).
Polvo de regaliz. . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Afecciones escrofulosas ó cancerosas, hipertrofia del bazo. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5332. P. DE BELEÑO Y CICUTA.

℞ Extracto de zumo depurado de beleño,
Extracto de cicuta, ãã. ʒj (12 dec.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
I. Sirven para calmar los dolores de los cánceres. *D.* Una ó dos píldoras al dia.

5333. P. DE BELEÑO IODURADAS (*Cintrac*).

℞ Extracto de beleño. . gLjv (3 gr.).
Hierro porfirizado. . . gxxxvj (2 gr.).
Iodo. . . . . gjx (50 cent.).
Ioduro de potasio. . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Hipertrofia del bazo. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5334. P. BENEDICTAS DE FULLER (F. P.).

℞ Acíbar. . . . . ʒj (32 gr.).
Sen. . . . . ʒjv (16 gr.).
Asa fétida,
Gálbano, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Mirra. . . . . ʒß (16 gr.).
Azafran,
Macis, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Sulfato de hierro. . . . ʒjß (48 gr.).
Aceite de sucino rect. ʒj (4 gr.).
Jarabe de artemisa compuesto. . . . . ʒij (64 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Clorosis. Se usan como anti-

histéricas y ligeramente purgantes. Cada píldora contiene gj (5 cent.) de sulfato de hierro y dos tercios de grano (36 mil.) de acibar.

5335. P. BENEDICTAS DE FULLER ó *Píldoras de acibar marciales* (F. E.).

℞ Acibar sucotrino. . . . ʒß (15 gr.).
Sen de España. . . . . ʒij (8 gr.).
Sulfato de hierro. . . . ʒvj (24 gr.).
Mirra,
Gálbano,
Asa fétida, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Azafran,
Macis, ää. . . . . ʒß (2 gr.).

Se pulverizan, se mezclan S. A. añadiendo:

Aceite de succino. . . . . 40 gotas.
Jarabe de artemisa. . . . . c. s.

H. S. A. una masa que se dividirá en ciento sesenta píldoras.

I. Son antihistéricas, ligeramente purgantes y emenagogas. *D.* Cuatro píldoras para cada dosis.

LAS PILDORAS BENEDICTAS DE FULLER DE LOS H. DE M. solo se diferencian en que contienen ʒjß (45 gr.) de acibar.

5336. P. DE BIETT.

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . gvj (3 dec.).
Sublimado corrosivo. gij (1 dec.).
Polvo de malvabisco. gviij (4 dec.).

H. S. A. ocho píldoras que se administran desde una hasta cuatro contra la sífilis.

5337. P. DE BISMUTO.

℞ Subnitr. de bismuto. ʒß (2 gr.).
Almizcle. . . . . gvj (3 dec.).
Extracto de beleño. . gjx (50 cent.).
Extracto de valeriana. ʒß (2 gr.).

H. S. A. treinta píldoras.

I. Hipocondría, histérico, dispepsia, gastrodinia, gastralgia. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5338. P. DE BISTORTA.

℞ Raiz de bistorta,
Tintura de catecú. ää. gxviij (1 gr.).
Jarabe de membrillos. gtjv (3 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Hemorragias pasivas, diarrea crónica. *D.* Una ó dos píldoras, de hora en hora.

5339. P. BLANCAS (*Barthez*).

℞ Jalapa. . . . . ʒß (16 gr.).
Carbonato de hierro. ʒij (8 gr.).
Protocloruro de merc. ʒß (2 gr.).
Milpiés. . . . . ʒij (24 dec.).
Jar. de las cinco raíc. c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Enfermedades escrofulosas. *D.* Dos píldoras al dia.

5340. P. DE BREA (H. DE IT.).

℞ Brea,
Bálsamo del Perú, ää. ʒß (15 gr.).
Regaliz en polvo. . . ʒj (30 gr.).
Raiz de lirio en polvo. ʒiij (12 gr.).

H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).

I. Tisis pulmonar, catarro pulmonar y vesical crónicos, cistitis, ictiosis, lepra. *D.* Una píldora dos veces al dia.

5341. *Offas* (MIGNOT).

℞ Brea,
Anis en polvo, ää. . . ʒijß (10 gr.).
Magnesia. . . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.

I. Broncorrea, cistorrea, leucorrea, gonorrea. *D.* Una á diez píldoras al dia.

5342. P. DE BROMURO DE HIERRO (*Magendie*).

℞ Bromuro de hierro. gxij (6 dec.).
Conserva de rosas. . gxviij (9 dec.).
Goma arábiga. . . . gxij (6 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Hipertrofia del corazon, escrófulas, nefritis, pénfigo, lepra, elefantiasis. *D.* Dos píldoras por la mañana y dos por la noche. Cada una contiene gß (25 mil.) de bromuro.

5343. P. DE BRUCINA (*Magendie*).

℞ Brucina pura. . . . . gxij (6 dec.).
Conserva de rosas. . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras que se platearán.
I. Parálisis. *D.* Una á diez píldoras al dia, aumentando gradualmente la dosis.

5344. P. DE BUCHAN.

℞ Acíbar,
Ruibarbo, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Ictericia, hidropesías. *D.* Cinco á seis píldoras al dia.

5345. P. DE CAINCA.

℞ Extracto de cainca. . . . 3j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 3ij (8 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se toman de dos á cuatro al dia.

5346. P. CALIBEADAS.

℞ Limaduras de hierro
porfirizadas. . . . . 3j (30 gr.).
Canela en polvo. . . . 3ij (24 dec.).
Acíbar sucotrino. . . . 3j (4 gr.).
Jar. de artemisa ó de azafran. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Se usan como emenagogas, tónicas y estomacales contra la clorosis y caquexia serosa, etc. *D.* De dos á seis píldoras al dia.

5347. P. CALMANTES.

℞ Extracto de opio,
Quermes mineral, ãã. gij (4 dec.).
Nitrato de potasa. . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. ocho píldoras.
I. Ciertas afecciones reumáticas. *D.* De dos á cuatro píldoras al dia.

5348. *Otras*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . 3ß 6 dec.
Calomelanos. . . . . gvj (3 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una de hora en hora.

5349. *Otras*, n. 3.

℞ Acetato de morfina. . . gj (5 cent.).
Cons. de flor de naranj. gxvj (8 dec.).
H. S. A. ocho píldoras.
I. Neuralgias, afecciones cancerosas. *D.* Una ó dos píldoras cada seis horas.

5350. *Otras*, n. 4.

℞ Extracto de belladona. gjv (2 dec.).
Rob de saúco. . . . . c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Neuralgia facial, neuralgias, tisis, coqueluche, escarlatina, asma, bronquitis, neumonía, cardialgia. *D.* Una píldora cada dos horas.

5351. *Otras* (BELL).

℞ Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
Extracto de beleño. . . 5ij (8 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Ardor de orina. *D.* Tres á cuatro píldoras al dia.

5352. *Otras* (BERNDT).

℞ Acetato de morfina. . gviij (4 dec.).
Sulfato de cobre y amoniaco. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de quina,
Palo de quasia, ãã. . . 3ij (24 dec.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Diabetes sacarina, íleo, tisis, histérico, nefritis. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5353. *Otras* (BROUSSAIS).

℞ Extracto de lechuga. gx (50 cent.).
Extracto de opio. . . . giij (15 cent.).
Extracto de belladona,
Extr. de beleño, ãã. gvj (30 cent.).
Manteca de cacao. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

5354. P. CALMANTES (H. DE AMÉR.).

℞ Digital purpúrea,
Opio, ãã. . . . . gvj (3 dec.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Asma. *D.* Una píldora de hora en hora.

5355. *Otras* (H. DE IT.).

℞ Sulfato de morfina. . ʒj (5 cent.).
Aceite comun. . . . . c. s.
Se disuelve y se añade:
Ipecacuana. . . . . ʒiij (15 cent.).
Haba de San Ignacio. ʒij (10 cent.).
Miga de pan,
Miel, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una píldora cada tres horas.

5356. *Otras* (KOOP).

℞ Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de lechuga. . 9ij (24 dec.).
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Coqueluche. *D.* Dos ó tres píldoras cada dos horas hasta que disminuya la violencia de la tos. Segun calme la violencia de los síntomas se disminuirá la dosis del medicamento.

5357. *Otras* (VOGT).

℞ Cianuro de zinc. . . . . 9ß (6 dec.).
Magnesia. . . . . 9ij (24 dec.).
Aceite de valeriana. . . 20 gotas.
Jarabe de manzanilla. 5ij (8 gr.).
Valeriana. . . . . 5iij (12 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Corea. *D.* Seis píldoras tres veces al dia, aumentando poco á poco la dosis.

5358. P. CALMANTES DE DIGITAL.

℞ Digital en polvo,
Opio,
Extracto de beleño, ãã. ʒvj (3 dec.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Asma, angina, pleuresía, polidipsia, bronquitis aguda, catarro, palpitaciones, cardialgia, glositis, flebitis, reumatismo, pica, disnea, hemorroides, lepra. *D.* Una píldora cada hora.

5359. P. CALMANTES Y NARCÓTICAS.

℞ Extracto de beleño,
Extracto de belladona,
Extracto de cicuta,
Extracto de opio,
Extracto de digital, ãã. gxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
I. Neuralgia facial, enfisema, íleo, iritis, dolores osteocopos ó cancerosos, pleuresía, pleurodinia, bronquitis, cardialgia, tisis, dismenorrea, dispepsia, histérico, nefritis, neuralgias. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5360. P. CALMANTES RESOLUTIVAS (*Hauff*).

℞ Polvo de raiz de bellad. ʒvj (3 dec.).
Oxido de bismuto. . . . 5ß (2 gr.).
Ruib. en polvo. 5ij y gxviij (9 gr.).
Extracto de regaliz,
Extracto de taraxacon, ãã. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Cardialgias rebeldes, induraciones incipientes del píloro y del páncreas. *D.* Tres píldoras al dia. Al mismo tiempo se debe aplicar un pedazo de hule ó de espadrapo simple en el epigastrio para que no se enfrie.

5361. P. CALMANTES Y TÓNICAS.

℞ Extracto de opio. . . ʒiij (15 cent.).
Canela. . . . . ʒvj (30 cent.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una á tres al dia.

5362. P. DE CALOMELANOS.

℞ Calomelanos,
Jabon medicinal, ãã. . . 5j (4 gr.).
Jalapa en polvo. . . . . ʒß (16 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Cuatro á seis al dia.

Se deben preparar al tiempo de usarlas, porque se descomponen y se forma sublimado corrosivo.

5363. P. DE CALOMELANOS *ó de protocloruro de mercurio.*

℞ Calomelanos,
Malvabisco, ää. . . . ℊxviij (1 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Son purgantes, alterantes y contraestimulantes.

5364. P. DE CALOMELANOS Y ASCLEPIAS.

℞ Calomelanos. . . . . ʒß (6 dec.).
Asclepias agigantada. ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. doce píldoras.
I. Albuminuria, ictericia, hepatitis, pleuresía, escarlatina, sífilis constitucional, sifílides, escrófulas, flebitis, conjuntivitis, lepra, soriasis, bocio, impétigo. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5365. P. DE CALOMELANOS COMPUESTAS (*Ricord*).

℞ Calomelanos preparados
al vapor. . . . . ℊxx (1 gr.).
Polvo de hojas de cicuta,
Jabon medicinal, ää. . ℊxl (2 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Infartos del testículo á consecuencia de la epididimitis blenorrágica. *D.* Una píldora diariamente durante cinco dias, despues dos, tres, cuatro, cinco y seis, si no se presentan accidentes mercuriales.

5366. P. DE CALOMELANOS FERRUGINOSAS.

℞ Cloruro de hierro amoniacal,
Calomelanos, ää. . . . ℊxc (3 gr.).
Extracto de lúpulo. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.)
I. Escrófulas, sífilis, sifílides, hepatitis, afecciones verminosas, pica, soriasis, escarlatina, nefritis, amenorrea, lupus, conjuntivitis, hepatitis, oftalmia, oftalmitis. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5367. P. DE CALOMELANOS Y POLÍGALA.

℞ Calomelanos. . . . . ℊx (50 cent.).
Poligala en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Mucílago. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Oftalmia. *D.* Dos á ocho píldoras al dia.

5368. P. DE CALOMELANOS Y SAPONARIA.

℞ Saponaria en polvo. . ʒß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . ℊx (50 cent.).
Jarabe de genciana, c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Escrófulas, raquitis, lepra, elefantiasis, lupus, liquen, oftalmias, nefritis. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5369. P. DE CANTÁRIDAS.

℞ Cantáridas en polvo. . ℊv (25 cent.).
Limaduras de hierro. ʒß (2 gr.).
Sabina. . . . . ℊxjv (3 gr.).
Jarabe de ruda. . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Amenorrea, anafrodisia, enuresis, soriasis. *D.* Una píldora tres veces al dia.

5370. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Cantáridas en polvo. . ℊvj (3 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (24 dec.).
Canela en polvo. . . . ℊvij (6 dec.).
Jarabe de rosas solutivo. . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Hidropesías. *D.* De dos á seis píldoras cada dos horas. Cada una contiene un quinto de grano de cantáridas.

5371. P. DE CANTÁRIDAS ALCANFORADAS (*Porta*).

℞ Cantáridas en polvo. ℊiij (15 cent.).
Alcanfor. . . . . ℊx (50 cent.).
Jabon amigdalino. . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Incontinencia de orina. Cada

píldora contiene un decimotercio de grano de cantáridas.

5372. P. DE CANTÁRIDAS OPIADAS (H. DE AMER.).

℞ Cantáridas en polvo. . ℊxviij (1 gr.).
Opio,
Alcanfor, ää. . . . . ʒß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras. Cada una contiene ℊß (25 mil.) de cantáridas y ℊj (5 cent.) de opio.

I. Impotencia; pero es menester examinar en tales casos si es la imaginacion la alterada ó los órganos de la generacion. Para los últimos será muy útil el discreto uso de estas píldoras, tomando una ó dos cada noche.

5373. P. DE CAOUTCHU.

Se le parte en pedacitos y se los cubre de una pasta de harina y agua. Pero es mejor evaporar hasta la consistencia de extracto blando la solucion de caoutchu en esencia de trementina y hacer píldoras con c. s. de polvos de malvabisco.

5374. P. CÁPRICO-FERRUGINOSAS (*Schneider*).

℞ Etíope mineral. . . . ʒß (15 gr.).
Pimiento. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Colombo. . . . . ʒj (4 gr.).
Canela. . . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de manzanilla. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

I. Clorosis. *D.* Diez píldoras tres veces al dia.

5375. P. DE CARBONATO DE COBRE Y AMONIACO (F. DE FERRARA).

℞ Carbonato de cobre y amoniaco. . . . ℊijß (12 cent.).
Regaliz en polvo. . ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. . . . c. s.

H. S. A. ocho píldoras.

I. Calenturas intermitentes rebeldes. *D.* Tres á cuatro píldoras al dia.

5376. P. DE PROTO-CARBONATO DE HIERRO *ó Píldoras de Vallet* (F. P.).

℞ Sulfato de hierro cristaliz. puro. 250
Carbonato puro de sosa. 298
Miel blanca muy pura. 153
Jarabe simple. . . . . c. s.

Se disuelve al calor el sulfato de hierro en cantidad suficiente de agua privada de aire por la ebullicion, y azucarada antes con cerca de ʒj (30 gr.) de jarabe simple por lbj (500 gr.) de agua; se disuelve tambien el carbonato de sosa en agua hervida y tambien azucarada; se filtran separadamente los dos líquidos; se los mezcla en un frasco con tapon esmerilado de tal capacidad que casi se llene con la mezcla; inmediatamente se pone el tapon de vidrio, se agita y despues se deja aposar tranquilamente el carbonato de hierro que resulta de la descomposicion recíproca del sulfato de hierro y del carbonato de sosa. Cuando se ha depositado bien el precipitado, se decanta el líquido que le sobrenada y se le reemplaza por nueva agua tibia, hervida y azucarada; se vuelve á agitar de nuevo, se le deja aposar aun, se le decanta y se continúan de este modo las lociones en vasijas tapadas, hasta que el líquido últimamente decantado no tenga sabor salino y no retenga ya sulfato ni carbonato de sosa; entonces se echa el precipitado en un lienzo bien apretado é impregnado antes de jarabe simple, se le exprime fuertemente y despues se le mezcla inmediatamente con la miel concentrada antes en el baño maría. Entonces se vuelve flúida la mezcla, porque la miel, al disolverse en el agua retenida por el carbonato de hierro, forma un melito líquido; se le concentra siempre en el baño maría hasta la consistencia de píldoras con la

mayor prontitud posible; por último se guarda el producto en vasijas que se taparán con cuidado. Este es el melito simple de Vallet. Se hacen píldoras de gij (15 cent.) añadiendo un polvo inerte.

Esta fórmula es muy buena: el azúcar y la miel tienen la propiedad de oponerse á la transformacion del carbonato de hierro en peróxido, que es poco soluble en los ácidos del estómago.

I. Se administran con excelente éxito contra la clorosis y los accidentes que de ella dependen. *D.* De dos á diez píldoras al dia, dosis que puede aumentarse sin inconveniente.

Nota. Las píldoras de Vallet son preferibles á las de Blaud, porque se conservan sin alterarse, representan dosis constantes del medicamento principal y se administra el carbonato de protóxido y no el peróxido de este metal.

5377. P. DE CARBONATO DE HIERRO (*Neumann*).

℞ Hojas de digital. . . . gx (5 dec.).
Carbonato de hierro. gxviij (1 gr.).
Cornez. de centeno. 3ß (2 gr.).
Jarabe de artemisa. . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Escrófulas, clorosis, amenorrea, anemia, esplenitis, caquexia, cáncer, soriasis, lupus, neuralgias. *D.* Dos á cuatro píldoras, mañana y noche.

5378. P. DE CARBONATO DE HIERRO Y POTASA.

℞ Sulfato de hierro. . . . 3jv (16 gr.).
Bicarbonato de potasa. 3jv (16 gr.).
Goma arábiga pulver. 3j (4 gr.).
Malvabisco. . . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. noventa y seis píldoras.

Se trituran juntas las dos sales en un almirez de hierro con lo que se descomponen mutuamente, se humedecen ligeramente pero se desecan muy pronto. Si entonces se añade azucar ó goma se líquida la mezcla, y es menester despues una cantidad bastante grande de goma para dar á la masa la consistencia pilular.

En esta fórmula la dosis del bicarbonato de potasa es mas que suficiente para descomponer el sulfato de hierro, pues se hallan sesenta y cinco granos en exceso ó trescuartos de grano por píldora. V. *Píldoras de Blaud.*

5379. P. DE CARBON ALCALINAS (H. DE AL.).

℞ Sulfuro de potasa. . . . . 3j (4 gr.).
Extracto de cardo santo,
Carbon vegetal en p., ää. 3ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.), de las cuales cada una contiene un tercio de grano de sulfuro.

I. Tisis pulmonar. *D.* Quince á veinte píldoras, cuatro veces al dia.

5380. P. DE CÁRLOS BELL.

℞ Alcanfor. . . . . gvj (3 dec.).
Extracto de beleño. . . gjv (2 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. dos píldoras.

I. Ardor de orina. *D.* De tres á cuatro píldoras al dia.

5381. P. CARMINATIVAS (*Barthez*).

℞ Asa fétida. . . . . 3ij (8 gr.).
Acíbar sucotrino,
Sulfato de hierro cristalizado,
Gengibre en polvo, ää. . 3j (4 gr.).
Elixir de propiedad. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Neumatoses, timpanitis, cólico ventoso, esplenitis, hepatitis, ictericia, hipocondria, dispepsia. *D.* Cuatro ó cinco píldoras todas las noches al tiempo de acostarse.

5382. P. DE CASTÓREO (H. DE AMER.).

℞ Castóreo. . . . . 3j (4 gr.).

Ácido succínico. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de genciana. . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Dos á seis píldoras al dia y aun mas.

5383. P. DE CATECÚ COMPUESTAS (F. N. P.).

℞ Alumbre. . . . . 3ß (6 dec.).
Catecú. . . . . 3ß (2 gr.).
Opio. . . . . ℥vj (3 dec.).
Extracto de tormentila. 3j (4 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Son astringentes, útiles en las hemorragias pulmonares ó uterinas, diarreas, disenteria, lienteria, último período de la gonorrea. *D.* Una á dos píldoras dos veces al dia.

5384. P. CATÓLICAS (F. M.).

℞ Mirabolanos cetrinos. . 3j (32 gr.)
Acíbar sucotrino,
Raiz de jalapa,
Escamonea,
Ruibarbo, ää. . . . . 3vj (24 gr.).
Agárico,
Trocisc. de Alhandal, ää. 3ij (8 gr.).
Sal catártica. . . . . 3vj (24 gr.).
Se pulverizan sutilmente, y con jarabe de rosas de Alejandría se forma masa para píldoras.
I. Son purgantes y muy útiles en las enfermedades de cabeza. *D.* De 9j á 9ij y hasta 3j (12 á 24 dec. ó 1 gr.).

5385. P. DE CEBADILLA (*Turnbull*).

℞ Extracto alcohólico de cebadilla. . . . . ℥ij (1 dec.).
Regaliz en polvo. . . . ℥xv (10 dec.).
H. S. A. diez píldoras.
I. Blenorragia, cistitis, diabetes, catarro útero-vaginal. *D.* Se toman en dos dias.

5386. P. DE CEBOLLA ALBARRANA, DIGITAL Y HIERRO (*Chomel*).

℞ Escila en polvo,
Digital en polvo, ää. . . . 3ß (2 gr.).
Hierro porfirizado. . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Albuminuria complicada con clorosis. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5387. P. DE CELEDONIA PURGANTES (*Bath*).

℞ Extracto de celedonia,
Extr. de ruibarbo, ää. ℥xv (75 cent.).
Calomelanos al vapor. ℥ij (15 cent.).
Resina de jalapa. . . ℥viij (10 cent.).
Ruibarbo en polvo. . c. s.
H. S. A. una masa muy homogénea, y divídase en quince píldoras iguales que se rodearán de polvo de lirio de Florencia.
I. Afecciones biliosas. *D.* Cinco píldoras cada dos horas, hasta obtener el efecto que se desea. Segun dicen es pronto y suave.

5388. P. DE CETRARINO.

℞ Cetrarino. . . . . ℥iij (15 cent.).
Extracto de quina. . ℥xviij (1 gr.).
Extracto de opio. . . ℥j (5 cent.).
Mucílago de goma tragacanto. . c. s.
H. S. A. ocho píldoras.
I. Calenturas intermitentes en la apirexia, tisis, caquexia. *D.* Una píldora cada dos horas.

5389. P. CIANURADAS (*Parent y Boutigni*).

℞ Cianuro de mercurio porfirizado. . . . ℥vj (3 dec.).
Miga de pan. . . . . 3j (4 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. noventa y seis píldoras.
I. Sífilis. *D.* Una á dos píldoras al dia, aumentando progresivamente.

5390. P. DE CIANURO DE HIERRO COMPUESTAS (*Jolly*).

℞ Cianuro de hierro. . ℥xx (1 gr.).
Sulfato de quinina. . ℥xij (60 cent.).

Extracto de opio. . . ǧj (5 cent.).
Conserva de rosas. . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Neuralgias y especialmente las del estómago y la cara. *D.* Una píldora cada tres horas.

5391. P. DE CIANURO DE MERCURIO OPIADAS (P. P., *Parent*).

℞ Cianuro de mercurio. ǧvj (3 dec.).
Opio en bruto. . . . . ǧxij (6 dec.).
Miga de pan. . . . . 5j (4 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. noventa y seis píldoras, de las cuales cada una contendrá una décimasesta parte de grano de cianuro y una octava parte de grano de opio.
I. Sífilis. *D.* Una píldora por la mañana y otra por la noche.

5392. P. DE OXICIANURO DE MERCURIO COMPUESTAS ó *Píldoras cianuradas* (*Parent*).

℞ Oxicianuro de merc. ǧxviij (1 gr.).
Extracto de hoj . . . 5jß (50 gr.).
Extracto de acónito. 5ijß (10 gr.).
Hidrocl. de amoniaco. 5ijß (10 gr.).
Esencia de anís ó de sasafrás. . . . . 24 gotas.
H. S. A. una masa, que se divide en cuatrocientas píldoras.
I. La misma que las anteriores. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5393. P. DE CIANURO DE ORO Y EXTRACTO DE TORBISCO.

℞ Cianuro de oro. . . . ǧj (5 cent.).
Extracto de torbisco. . ǧij (10 cent.).
Polvo de malvabisco. . c. s.
H. S. A diez y seis píldoras.
I. Sífilis, escrófulas, amenorreas. *D.* Se da una píldora diariamente y se aumenta una cada ocho dias hasta tomar diez ó doce.
Chrestien aumenta la dosis del extracto hasta ǧxvj (8 dec.).

5394. P. DE CIANURO DE ORO OPIADAS.

℞ Extracto de guayaco. ǧiij (15 cent.).
Extracto de opio. . . ǧ$\frac{1}{2}$ (42 mil.).
Cianuro de oro. . . . ǧ$\frac{1}{2}$ (1 cent.).
H. S. A. una píldora.

5395. P. DE CIANURO DE POTASIO (*Bally*).

℞ Cianuro de potasio,
Almidon ligado por el jarabe de goma, ãã. ǧij (1 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Disnea, asma, ortofnea y afecciones convulsivas, dispepsia, reumatismo, tisis, palpitaciones, cardiopalmía, cardialgia, pleuresía, bronquitis. *D.* Una por la mañana y otra por la noche, aumentando progresivamente la dosis con mucha prudencia.

5396. P. DE CICUTA DE STORCK (H. DE M.).

℞ Extracto de cicuta. . . . 5j (4 gr.).
Polvos de cicuta. . . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Afecciones cancerosas. *D.* De una á cuatro píldoras, aumentando progresivamente.

5397. P. DE CICUTA Y CALOMELANOS (*Cullerier*).

℞ Extracto de cicuta,
Calomelanos, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Goma arábiga,
Jarabe simple, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Infartos sifilíticos. *D.* De tres á cuatro píldoras al dia.

5398. P. DE CICUTA Y CALOMELANOS (*Gama*).

℞ Extracto de cicuta. . 5j (32 gr.).
Protocloruro de merc. 5ij (8 gr.).
H. S. A. trescientas píldoras.
I. Producen muy buenos efectos contra la inflamacion crónica del

testículo. *D.* Una á seis píldoras al dia.

5399. P. DE CICUTA Y CORNEZUELO DE CENTENO (*Arnal*).

℞ Extracto acuoso de cornezuelo de centeno. ℊvj (3 dec.).
Extracto de cicuta. . . ℊiv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Enteralgias que acompañan algunas veces al uso del cornezuelo de centeno. *D.* En dos dias y despues en uno.

5400. P. DE CICUTA COMPUESTAS.

℞ Extracto de cicuta. . . 5j (4 gr.).
Extracto de opio. . . . ℊxviij (1 gr.).
Calomelanos. . . . . 5ß (2 gr.).
Jarabe de valeriana. . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Dolores osteocopos, cáncer, neuralgias, enteralgias, metritis, hepatitis, reumatismo, queratitis, conjuntivitis, muermo, tisis. *D.* Dos á cuatro al dia, aumentando progresivamente.

5401. P. DE CICUTA COMPUESTAS (*Bernstein*).

℞ Extracto de cicuta,
Polvo de cicuta,
Goma amoniaco,
Resina de guayaco, ãã. . 5ij (8 gr.).
Resina de jalapa. . . . . 5ß (2 gr.).
Azufre dorado de antim. 5j (4 gr.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

I. Escirros. *D.* Ocho á diez y seis píldoras, tres veces al dia.

5402. *Otras* (F. DE L.).

℞ Extracto de cicuta. . . 3v (20 gr.).
Ipecacuana en polvo. . 5j (4 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . c. s.
H. S. A. píldoras de á ℊjv (2 dec.).

5403. P. DE CICUTA IODURADAS.

℞ Extracto de zumo no depurado de bellad. 5j (4 gr.).
Protoioduro de hierro. . 5jv (16 gr.).
Polvo de malvabisco. . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.

Se toma una por la mañana y otra por la tarde para combatir los tumores escirrosos y escrofulosos, y la tisis pulmonar.

5404. P. DE CICUTA Y QUINA.

℞ Extracto de cicuta. ℊxxx (15 dec.).
Extracto de quina. 5j (4 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.

D. Se dan tres al dia en el tratamiento de los escirros flemenosos.

5405. P. DE CICUTA, QUININA Y HIERRO (*Rognetta*).

℞ Extracto de cicuta. . . . 5ij (8 gr.).
Sulfato de quinina. . . . 5j (4 gr.).
Carbonato de hierro. . . 5ij (8 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras plateadas.

I. Catarro uterino. *D.* Una, dos, tres ó cuatro píldoras al dia segun las tolere el estómago.

5406. P. DE CINCONINA.

℞ Cinconina pura. . . . . 3j (12 dec. .
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras muy iguales y plateadas.

I. Calenturas intermitentes, sudor inglés, celalalgia, convulsiones, lepra. *D.* Dos á ocho píldoras las veinticuatro horas.

5407. P. DE CINOGLOSA *ó Píldoras de cinoglosa opiadas* (F. E. y H. DE M.).

℞ Corteza de raiz de cinoglosa en polvo. . . 5ij (64 gr.).
Extr. acuoso de opio. . 5iij (12 gr.).
Azafran en polvo. . . . 5v (20 gr.).
Castóreo. . . . . 5vj (24 gr.).
Jarabe simple. . . . . 5jx (36 gr.).
H. S. A. una masa, que se expone al aire para que se seque; despues de lo cual se hacen píldoras de uno, dos ó mas granos.

D. De ℊvj á ℊxviij (6 á 9 dec.).

5408. P. DE CINOGLOSA (F. F.).

℞ Corteza seca de raiz de cinoglosa,
Simiente de beleño,
Extracto acuoso de opio, ãã. . . . . 5jv (16 gr.).
Mirra. . . . . 5vj (24 gr.).
Incienso. . . . . 5v (20 gr.).
Azafran. . . . . 5jß (6 gr.).
Castóreo. . . . . 5jß (6 gr.).
Jarabe de opio. . . . . c. s.

Se pulverizan las cortezas de cinoglosa y la simiente de beleño, y por separado cada una de las demás sustancias; se reblandece el extracto de opio con un poco de jarabe, y se incorpora en un almirez de hierro con los polvos; se hace una masa de consistencia regular y se guarda en un bote tapado. Contienen la octava parte de su peso de extracto de opio.

I. Tos catarral, tisis, diarrea, disenteria, catarro agudo, bronquitis aguda, neumonia, tisis, neumatosis, enfisema. *D.* Una ó dos píldoras de ğiij ó ğjv (15 á 20 cent.).

5409. P. DE CITRATO DE HIERRO.

℞ Protocitrato de hierro. ğxc (5 gr.).
Miel. . . . . ğxviij (1 gr.).
Malvabisco en polvo. c. s.

H. S. A. cien píldoras.

D. Una á diez al dia.

5410. P. DE CITRATO DE HIERRO Y AMONIACO (*Beral*).

℞ Azúcar en polvo. . . . . 5iij (12 gr.).
Citrato de hierro y amoniaco. . . . . 5j (4 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ğjv (20 cent.) que se platearán.

5411. P. DE CLORHIDRATO DE MORFINA.

℞ Clorhidr. de morfina. ğij (1 dec.).
Tridacio. . . . . ğviij (4 dec.).
Polvo de malvabisco, c. s.

H. S. A. ocho píldoras. Se toma una por la tarde.

5412. P. DE CLORURO DE BARIO (*Swediaur*).

℞ Cloruro de bario. . . . 5j 4 gr.).
Extracto de dulcamara,
Extracto de zumaque venenoso,
Extracto de énula, ãã. ℥ß (15 gr.).

H. S. A. píldoras de ğv (25 cent.).

I. Sífilides, lepra, herpes, escrófulas, dismenorrea. *D.* Dos píldoras cuatro veces al dia.

5413. P. DE CLORURO DE BARIO (*Walsh*).

℞ Cloruro de bario. . . ğxviij (1 gr.).
Mucílago de goma tragacanto,
Malvabisco en polvo, ãã. . . . . c. s.

H. S. A. doscientas píldoras.

I. Afecciones escrofulosas. *D.* Tres al dia, aumentando progresivamente hasta seis, diez, doce ó veinte, pero en muchas tomas. Walsh recomienda que se tome estas píldoras despues de comer, para que su accion sobre el estómago no sea tan pronta ni tan enérgica.

5414. P. DE CLORURO DE HIERRO (*Biett*).

℞ Cloruro de hierro. . . ğxij (6 dec.).
Polvo de genciana. . . ʒj (12 dec.).

H. S. A. doce píldoras. Se administran cuatro al dia en el tratamiento de las erupciones escrofulosas.

5415. P. DE CLORURO DE HIERRO ALOÉTICAS (*Cunier*).

℞ Protoclor. de hierro. 5j (4 gr.).
Acíbar. . . . . ğjx (50 cent.).
Jabon medicinal. . . ğxviij (1 gr.).

H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Amaurosis crónica. *D.* Diez al dia, cuatro por la mañana, tres al medio dia y tres por la noche, dos á cuatro horas despues de cada comida.

5116. P. DE CLORURO DE MERCURIO.

℞ Sublimado corrosivo en polvo,
Salamon. en polvo, ãã. gviij (4 dec.).
Jarabe de albúmina. . 45 gotas.
Se tritura y se añade:
Almidon en polvo. . . 5ij (8 gr.).
Goma arábiga. . . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras. Cada una representa $g\frac{1}{5000}$ (5 mil.) de cloruro.

5117. P. CLORO-MERCÚRICAS (*Mialhe*).

℞ Bicloruro de mercur. gx (5 dec.).
Cloruro de sodio. . . . 5ß (2 gr.).
Almidon. . . . . gojv (3 gr.).
Goma arábiga. . . . . gxviij (1 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras, que se toman en las mismas dosis y en los mismos casos que las de Dupuytren.

5118. P. DE PROTOCLORURO DE MERCURIO COMPUESTAS (F. P.).

℞ Protocloruro de mercurio. . . . 10
Opio purificado. 3
Alcanfor. 4
Extracto de guayaco. 10
Conserva de rosas. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Afecciones herpéticas, sífilis. *D.* Dos píldoras, dos ó tres veces al dia.

5119. P. DE CLORURO DE MERCURIO COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Cloruro de mercurio,
Oxisulfuro de antim., ãã. 5ij (8 gr.).
Resina de guayaco. . . 5ß (16 gr.).
Melaza. . . . . 5ij (8 gr.).
H. S. A.

5120. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO *ó Píldoras de sublimado corrosivo de Bogler* (F. P.).

℞ Zumo de regaliz depurado. . . . . 5j (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . 9ij (24 dec.).
Deutocloruro de merc. gj (5 cent.).
H. S. A. cien píldoras.

5121. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO (H. DE AL.).

℞ Sublimado corrosivo. . gvj (3 dec.).
Agua destilada. . . . . c. s.
Se disuelve la sal y se añade:
Azúcar blanca,
Miga de pan blanco, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. ciento ochenta píldoras. Cada una contiene una trigésima parte de grano de sublimado. *D.* Cuatro á seis al dia, aumentando progresivamente.

5122. P. DE DEUTOCLORURO DE MERCURIO DE DUPUYTREN.

℞ Deutocloruro de mercurio,
Extracto de opio, ãã. gv (25 cent.).
Extracto de guayaco. gvjv (3 gr.).
Polvo de quina. . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Sífilis, sifilides, albuminuria, soriasis, lupus, lepra, oftálmia. *D.* Una á dos al dia. V. números 5246 y 47.

5123. P. DE CLORURO DE MERCURIO Y MORFINA (*Bouchardat*).

℞ Cloruro de mercurio y morfina. . . . . gxviij (1 gr.).
Polvo de regaliz. . . . 5ß (2 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Sífilis confirmada, dolores osteocopos. Cada una contendrá la cuarta parte de grano de sal mercurial. *D.* Se tomará primero una por la mañana y otra por la noche, y se aumentará sucesivamente la dosis.

5124. P. DE CLORURO DE ORO (H. DE AL.).

℞ Cloruro de oro. . . . . gx (5 dec.).
Regaliz en polvo. . . . 5iij (12 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. doscientas píldoras.
I. Enfermedades venéreas rebeldes al mercurio, escrófulas, herpes, etc. *D.* Una ó dos al dia, aumentando progresivamente la dosis. Cada una contiene una vigésima parte de grano de cloruro.

5425. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO *ó Píldoras de Chrestien* (F. P.).

℞ Clor. de oro y sodio. . ᵍx (50 cent.).
Fécula de patatas. . . ᵍjv (20 cent.).
Goma arábiga. . . . . 5j (4 gr.).
Agua destilada. . . . c. s.

H. S. A. ciento veinte píldoras. Se dan de una á quince al dia.

5426. P. DE PERCLORURO DE PLATINO (*Hoefer*).

℞ Percloruro de platino. . ᵍj (5 cent.).
Extracto de guayaco. . 5j (4 gr.).
Regaliz en polvo. . . . . c. s.

H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. *D.* Una, dos, tres y aun cuatro píldoras mañana y noche.

5427. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Groetzner*).

℞ Cloruro de oro y sodio. ᵍv (25 cent.).
Agua. . . . . c. s.
Extr. de dulcamara. ᵍxx (1 gr.).
Extracto de acónito. ᵍxv (75 cent.).
Goma. . . . . c. s.

H. S. A. ochenta píldoras.

I. Hidropesía, herpes corrosivos, amaurosis, incontinencia de orina, sífilis, sifílides, helmintiasis. *D.* Dos cada dos horas.

5428. P. DE CLORURO DE PLATA.

℞ Cloruro de plata. . . . 5jß (10 gr.).
Conserva de rosas. . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.

I. Epilepsia. Estas píldoras irritan menos que el nitrato de plata, no dan color á la piel y obran lo mismo que el nitrato. *D.* Una píldora al dia aumentando sucesivamente hasta diez.

5429. P. CLORO-ARGÉNTICAS (*Mialhe*).

℞ Nitrato de plata. . . . ᵍxviij (1 gr.).
Cloruro de sodio. . . . 5j (4 gr.).
Almidon. . . . . ᵍjv (3 gr.).
Goma arábiga. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras plateadas.

Segun Mialhe es la preparacion que conviene administrar cuando se quieren usar las preparaciones de plata en su mayor grado de fuerza.

5430. P. DE CLORURO DE PLATA (*Trousseau*).

℞ Cloruro de plata. . . . 5j (4 gr.).
Extracto de beleño. . ᵍxviij (1 gr.).

H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Epilepsia. *D.* Una mañana y noche, aumentando sucesivamente hasta diez y doce durante muchos meses.

5431. P. CLORO-PLÓMBICAS (*Mialhe*).

℞ Acetato de plomo. . . ᵍxviij (1 gr.).
Cloruro de sodio. . . . 5j (4 gr.).
Raiz de malvabisco. . ᵍxc (5 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.

5432. P. DE COBRE, *Píldoras cobrecosas, píldoras antiepilépticas, píldoras azules.*

℞ Miga de pan. . . . . ᵍLjv (3 gr.).
Sulfato de cobre amoniacal. . . . . ᵍviij (1 dec.).
Carbon. de amoniaco. c. s.

H. S. A. cuarenta y ocho píldoras. Cada una contiene cerca de una décimasesta parte de grano de la sal de cobre.

I. Epilepsia y hemorragias rebeldes. *D.* Dos ó tres píldoras al dia.

5433. P. DE COBRE AMONIACALES.

℞ Sulfato de cobre y amoniaco. . . . . ᵍx (50 cent.).
Raiz de belladona. . ᵍjv (20 cent.).
Extracto de genciana. 5jß (6 gr.).
Quina en polvo. . . . c. s.

H. S. A. sesenta píldoras.

I. Calenturas intermitentes, co-

rea, epilepsia, polidipsia. *D.* Cuatro á seis píldoras al dia.

5434. P. DE COBRE AMONIACAL (H. DE AL.).

℞ Sulfato de cobre amoniacal. . . . . ℊxvj (8 dec.).
Extracto de beleño. . 5j (4 gr.).
Valeriana en polvo. . c. s.

H. S. A. ochenta y dos píldoras.

I. Epilepsia. *D.* Una á dos píldoras al dia.

Nota. Cada píldora contiene ℊß (25 mil.) de sulfato de cobre amoniacal.

5435. P. DE COBRE AMONIACALES GLICIRRIZADAS.

℞ Sulfato de cobre y amoniaco. . . . . ℊijß (12 cent.).
Zumo de regaliz. . . 9j (12 dec.).
Jarabe simple. . . . c. s.

H. S. A. ocho píldoras.

I. Calenturas intermitentes rebeldes y regulares. *D.* Una píldora cada cuatro horas.

5436. P. DE CODEINA.

℞ Codeina,
Tridacio, ää. . . . . ℊiv (2 dec.).
Polvo de malvabisco. . c. s.

H. S. A. cuatro píldoras.

D. Se toma una diariamente.

5437. *Otras* (MAGENDIE).

℞ Codeina. . . . ℊij á ℊiv (1 á 2 dec.).
Conserva de rosas. . . . . c. s.

H. S. A. cuatro píldoras.

D. Una por la mañana y otra por la tarde.

5438. P. CÓCHIAS *ó Píldoras de acíbar compuestas* (F. E.).

℞ Acíbar sucotrino. . . . ℥ij (64 gr.).
Frutos de coloquintida preparados. . . . . ℥vjß (26 gr.).
Escamonea de Alepo. ℥ß (16 gr.).
Raiz de jalapa,
Sulfato de magnesia, ää. ℥x (40 gr.).

Háganse polvos muy sutiles, y con c. s. de jarabe se forma una masa de la que se hacen píldoras.

I. Es un excelente purgante en las enfermedades de cabeza y de nervios. *D.* De 9ß á 9ij (6 á 24 dec.).

5439. P. COLAGOGAS.

℞ Ruibarbo. . . . . 5ß (2 gr.).
Sulfato de potasa,
Escamonea, ää. . . . ℊjx (50 cent.).
Aceite de hinojo. . . ℊiij (15 cent.).
Goma amoniaco. . . . c. s.

H. S. A. *píldoras de* ℊjx (2 *dec.*).

I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, atrofia mesentérica, ictericia, hepatitis crónica, hipocondría. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5440. P. COLCHÍTICAS.

℞ Acíbar. . . . . 5j (4 gr.).
Cólchico. . . . . 5ß (2 gr.).
Regaliz. . . . . 5ß (2 gr.).
Canela. . . . . 5ß (2 gr.).
Escamonea. . . . . 9ß (6 dec.).
Alcohol. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).

I. Gota, reumatismo, anafrodisia. *D.* Tres á seis píldoras al dia, aumentando segun haya necesidad.

5441. P. DE CÓLCHICO (*Rilton*).

℞ Cólchico en polvo. . ℊiij (15 cent.).
Jabon medicinal. . . ℊij (10 cent.).

H. S. A. una píldora.

I. Leucorrea. *D.* Dos ó tres tomas al dia.

5442. P. DE COLOMBO.

℞ Colombo. . . . . 5ß (2 gr.).
Opio. . . . . ℊij (10 cent.).
Aceite de menta piper. 5 gotas.
Jarabe de claveles. . . . c. s.

I. Vómitos espasmódicos, diarrea. *D.* Una píldora cada dos horas.

5443. P. DE COLOQUÍNTIDA Y MERCURIO (H. DE ING.).

℞ Extr. de coloquintida. 3j (4 gr.).
Calomelanos. . . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una á cuatro píldoras al dia.

5444. P. DE CONRADI *ó Píldoras contra la disuria de los ancianos.*

℞ Asa fétida. . . . . 3ß (15 gr.).
Ipecacuana en polvo. . gij (1 dec.).
Opio en polvo. . . . . gij (1 dec.).
Esencia de menta pip. gij (1 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.) que se cubren con licopodio.
I. Iscuria, disuria en los ancianos. *D.* Diez píldoras al dia en tres tomas.

5445. P. CONTRA EL ACNE ROSACEO (*Biett*).

℞ Calomelanos. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de taraxacon. . 3j (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5446. P. CONTRA LAS AFECCIONES CANCEROSAS (*Boinet*).

℞ Jabon medicinal. . . . 3ij (8 gr.).
Goma amoniaco. . . . 3j (4 gr.).
Ioduro de hierro. . . . 5ß (2 gr.).
Bromuro de hierro. . . gxviij (1 gr.).
Cicuta en polvo, *
Acónito en polvo, ãã. 5ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Dos píldoras mañana y noche.

5447. P. CONTRA LA AMAUROSIS (H. DE M.).

℞ Goma amoniaco,
Raiz de valeriana en polvo,
Flor de arnica en p., ãã. 3ij (12 dec.).
Tártaro emético. . . . gß (25 mil.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Toda la fórmula en tres veces al dia.

5448. P. CONTRA LA AMAUROSIS *ó Píldoras de Richter.*

℞ Goma amoniaco,
Asa fetida,
Jabon de Venecia,
Raiz de valeriana,
Sumid. de arnica, ãã. 3iij (12 gr.).
Tártaro emético. . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Quince, repartidas en tres veces al dia; despues veinticuatro en tres veces al dia.

Al principio del uso de estas píldoras se nota calor, ansiedad, sueño, inquietud, dolor de cabeza, sensibilidad en el ojo, etc. En este caso se tomará 5ß (2 gr.) de tártaro soluble con extracto de grama ó yerba de taraxacon, y un purgante todas las veces que este indicado. Despues de algun tiempo se vuelve de nuevo al uso de las píldoras y se continúa si el enfermo las puede tolerar. Por lo regular las sufre bien despues de haber tomado el tártaro soluble por algun tiempo.

Se previene esto por si acaso alguna vez el enfermo tuviese ó sintiese en el ojo tension, calor frecuente, dolor de cabeza ó vértigos, amargor de boca, alteracion del pulso, orina encendida, inquietud y escalofrios continuos, pues en este caso se debe tomar inmediatamente 5ß (2 gr.) de tártaro soluble, y se continúa tomándolo hasta que todos los síntomas hayan cesado.

La primera señal de mejoría que se puede esperar y del buen éxito de la curacion es cuando ya no aparecen las chispas ígneas delante del ojo, y cede el sentimiento de tension en el globo del ojo.

5449. P. CONTRA LA AMAUROSIS *ó Píldoras de Schmucker.*

℞ Sagapeno,

Gálbano,
Jabon de Venecia,
Zumo de regaliz, aã. . 3j (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3jß (6 gr.).
Tártaro emético. . . . gxvj (8 dec.).
H. S. A. píldoras de gj (5 cent.).

D. Quince por la mañana y quince por la tarde, y asi se continúa durante un mes ó seis semanas. En la primera caja de píldoras conviene reducir á la mitad la dosis del tártaro emético, y que solo tome el enfermo doce píldoras mañana y noche.

5450. P. CONTRA LA ANGINA TONSILAR (*Mondezert*).

℞ Calomelanos. . . . . gvj (3 dec.).
Jabon amigdalino. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. doce píldoras.

Se pretende que estas píldoras hacen que la angina tonsilar termine por reabsorcion.

D. Dos píldoras mañana y noche.

5451. P. CONTRA EL ASMA (*Quarin*).

℞ Esponja calcinada. . . . 3ß (15 gr.).
Extracto de fumaria,
Goma amoniaco,
Flores de azufre, aã. . 3ij (8 gr.).
Sulfuro de antimonio. 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).

I. Asma ocasionado por escrófulas y asma húmedo. *D.* Se toman seis píldoras, tres veces al dia, y se aumenta por grados hasta diez ó doce.

5452. P. CONTRA LA BLENORRAGIA (*Sandras*).

℞ Acíbar. . . . . gxc (5 gr.).
Tridacio. . . . . 5ß (2 gr.).
Polvos de malvabisco, c. s.
H. S. A. setenta píldoras.

I. Son muy útiles en la blenorragia aguda, y comunmente en la blenorragia crónica.

5453. P. CONTRA EL BOCIO (*Villie*).

℞ Esponja calcinada. . . 3j (30 gr.).
Goma arab. en polvo. 5j (4 gr.).
Canela en polvo. . . . gxvj (8 dec.).
Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Una por la mañana.

5454. P. CONTRA LOS CÁLCULOS BILIARIOS (*Tronchin*).

℞ Jabon blanco. . . . . 3jv (16 gr.).
Extracto de regaliz. . 3ij (8 gr.).
Trementina. . . . . gxx (10 dec.).
Jar. de las cinco raices aperitiv. c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

D. Tres píldoras, tres veces al dia, y se bebe despues un vaso de suero.

5455. P. CONTRA LA CARIES (*Rust*).

℞ Asa fétida,
Acido fosfórico conc., aã. 5ij (8 gr.).
Malvabisco en polvo,
Cálamo arom. en polvo, aã. 3j (4 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de á gij (1 dec.).

D. Diez á treinta por la mañana, al medio dia y por la noche.

5456. P. CONTRA EL CATARRO CRÓNICO (*Recamier*).

℞ Sulfuro de potasa. . . 9j (12 dec.).
Ipecacuana. . . . . gjv (2 dec.).
Extr. gomoso de opio. gij (15 cent.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Tres á seis píldoras al dia.

5457. P. CONTRA EL CATARRO CRÓNICO.

℞ Mirra. . . . . 5ß (2 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . . gxviij (1 gr.).
Extr. gomoso de opio. gvj (3 dec.).
Bálsamo del Perú. . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Tres á seis píldoras al dia.

5458. P. CONTRA EL CATARRO VESICAL (*Gall*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Trem. de Burdeos, ãã. ʒijß (10 gr.).
Magnesia. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Tres ó cuatro por la mañana, al medio dia y por la noche.

5459. P. CONTRA LA CISTITIS.

℞ Flores de azufre. . . . . ʒj (4 gr.).
Trement. de Venecia. ʒij (21 dec.).
Yema de huevo. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
D. De cuatro á ocho al dia.

5460. P. CONTRA LA CLOROSIS (*Marchall-Hall*).

℞ Acíbar,
Sulfato de hierro, ãã. . gij (1 dec.).
H. S. A. una píldora.
D. Dos á seis píldoras al dia.

5461. *Otras* (CHOMEL).

℞ Escila en polvo,
Digital en polvo, ãã. . . ʒß (2 gr.).
Hierro porfirizado. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Albuminuria complicada con clorosis. *D.* Dos á seis al dia.

5462. P. CONTRA LA CLOROSIS SIFILÍTICA (*Ricord*).

℞ Protoioduro de merc. gLX (3 gr.).
Tridacio. . . . . gLX (3 gr.).
Extracto tebáico. . gxx (1 gr.).
Extracto de cicuta. . gxxx (15 dec.).
Mézclese S. A. y hágase sesenta píldoras.

M. Ricord principia administrando una sola píldora, y aunque llega á la dosis de seis por dia jamás se excede de este número.

Este mismo práctico asocia una tisana de lúpulo ó de hojas de saponaria al uso de estas píldoras.

5463. P. CONTRA LA COQUELUCHE.

℞ Extracto de opio . . . . gj (5 cent.).
Subcárbonato de hierro. gij á giij (10 á 15 cent.).
H. S. A. seis píldoras.
I. Primer período de la coqueluche. *D.* Tres píldoras al dia, por la mañana, al medio dia y por la noche.

5464. *Otras* (THORNSTEN).

℞ Sulfato de quinina. . . gxviij (1 gr.).
Acetato de morfina. . gij (1 dec.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una á tres al dia.

5465. *Otras* (LOEWENHART).

℞ Oxido de zinc,
Extr. de beleño. ãã. gxviij (1 gr.).
Flores de azufre,
Raiz de hinojo en p., ãã. ʒß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una á tres al dia.

5466. *Otras* (TROUSSEAU).

℞ Extracto de zumo de belladona,
Extracto de opio, ãã. . gjv (2 dec.).
Extracto de valeriana. ʒß (2 gr.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Coqueluche, bronquitis, asma, calentura. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5467. P. CONTRA LA DIARREA.

℞ Triaca. . . . . ʒij (24 dec.).
Polvo de colombo. . . ʒß (6 dec.).
Extracto de opio. . . . gvj (3 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5468. P. CONTRA LA DISMENORREA (*Pigeaux*).

℞ Opio en bruto. . . . . gj (5 cent.).
Alcanfor. . . . . gvj (30 cent.).
H. S. A. dos píldoras. *D.* Una por la mañana y otra por la noche.

5469. P. CONTRA LA DISPEPSIA (H. DE AL.).

℞ Subnitrato de bismuto. ℊxij (6 dec.).
Extracto de valeriana. ʒj (4 gr.).
Esencia de valeriana. . 10 gotas.
Raiz de valeriana en polvo. . . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras. *D.* Seis píldoras, tres veces al dia.

5470. P. CONTRA EL ECZEMA (*Biett*).

℞ Masa de Belloste. . . . ʒij (24 dec.).
Jabon medicinal. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras. *D.* Se dan dos al dia contra el eczema crónico.

5471. P. CONTRA LA EPILEPSIA (*Biett*).

℞ Sulfato de cobre y amoniaco. . . . . ʒj (12 dec.).
Extracto de valeriana. . ʒjß (6 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras. *D.* Una, despues dos y hasta cuatro píldoras al dia.

5472. *Otras* (DUPUYTREN).

℞ Oxido de zinc. . . . ℊxxij (11 dec.).
Valeriana en polvo. ℊviij (4 dec.).
Castóreo pulverizad. ℊjv (2 dec.).
Jarabe simple. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras que se toman en el dia. Se continuará usando estas píldoras por mucho tiempo.

5473. *Otras* (DEBREYNE).

℞ Extracto acuoso de belladona por decoccion. ʒij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo. ʒß (2 gr.).
Polvo inerte. . . . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras. *D.* Una el primer dia, dos el segundo, tres el tercero por la mañana, al medio dia y por la noche, una ó dos horas antes de comer. Se continúa así hasta que produzca una alteracion en la vision; si se presenta, se disminuye la dosis y se cesa al cabo de pocos dias. Si no se experimenta alteracion alguna de la vista se aumenta la dosis hasta cinco píldoras ó ℊvj (3 dec.) de belladona al dia.

Se puede usar á veces el cocimiento de valeriana solo ó con belladona.

5474. *Otras* (DUPUYTREN).

℞ Valeriana en polvo. ℊxl (2 gr.).
Oxido de zinc. . . . . ℊxx (1 gr.).
Castóreo. . . . . ℊjv (2 dec.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras, que se toman en tres tomas en el dia.

Dupuytren aconsejaba que se continuase el uso de estas píldoras durante mucho tiempo, un año por ejemplo, en algunos casos de epilepsia. En general usaba los baños y un cauterio en el brazo.

5475. *Otras* (QUARIN).

℞ Raiz de valer. silvestre. ʒij (8 gr.).
Gálbano,
Sagapeno, ãã. . . . . ʒjß (6 gr.).
Asa fétida. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
D. Se dan de dos á cuatro á las mujeres histéricas, que padecen accesos de epilepsia.

5476. *Otras* (RECAMIER).

℞ Oxido de zinc. . . . . ℊj (5 cent.).
Alcanfor,
Extr. de belladona, ãã. ℊ⅘ (3 cent.).
H. S. A. una píldora.

Al mismo tiempo se prescriben vejigatorios volantes sobre los diversos puntos afectados de parálisis ó de hormigueo, y este tratamiento ha producido buenos efectos.

5477. *Otras* (RECAMIER).

℞ Acetato de plomo. . . ℊvj (3 dec.).
Oxido de zinc,
Asa fétida, ãã. . . . . ʒß (6 dec.).

Extr. de estramonio. gvj (3 dec.).
Extracto de beleño. . gviij (4 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Una mañana y noche al principio del tratamiento; pero despues se aumenta la dosis.

5478. P. CONTRA LA EPILEPSIA (*Vallerand*).

℞ Subnitr. de bismuto. gxviij (1 gr.).
Extracto de quina. . gxxxvj (2 gr.).
Extracto de beleño. . gjx (50 cent.).
H. S. A. doce píldoras.
D. Dos píldoras al dia.

5479. P. CONTRA ESTIMULANTES (*Uberti*).

℞ Extracto de cornezuelo de centeno. . . . . gxc (5 gr.).
Malvabisco en polvo. . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
D. Una cada dos horas.
Uberti las considera muy útiles para combatir algunas inflamaciones.

5480. P. CONTRA LAS FLORES BLANCAS.

℞ Sucino preparado. . . . 3ij (8 gr.).
Almáciga,
Coral, ää. . . . . 3j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . gx (5 dec.).
H. S. A. píldoras con c. s. de bálsamo de copaiba.
I. Gonorrea, flores blancas. *D.* Cinco píldoras todas las mañanas, bebiendo encima un vaso de cocimiento de zarzaparrilla ó de raiz de bardana.

5481. *Otras*, n. 2.

℞ Trementina cocida. . . 3jß (45 gr.).
Bolo arménico,
Hueso de jibia, ää. . . 3ß (15 gr.).
Sucino,
Almáciga, ää. . . . . 3ij (8 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3jß (6 gr.).
H. S. A. píldoras con c. s. de bálsamo de copaiba.
I. Gonorrea y flores blancas. *D.* 3j (12 dec.) dos ó tres veces al dia, bebiendo un vaso de cocimiento de zarzaparrilla ó de bardana.

5482. P. CONTRA LA GANGRENA DE HOSPITAL (*Dupuytren*).

℞ Alcanfor. . . . . 3j (12 dec.).
Almizcle. . . . . gviij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . gij (1 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. ocho píldoras, de las cuales cada una contiene gij (15 cent.) de alcanfor.
D. Una píldora cada dos horas.

5483. P. CONTRA LA GALACTIRREA (*Behrends*).

℞ Sulfato de hierro crist. 3ij (24 dec.).
Mirra. . . . . 3j (4 gr.).
Quasia amarga en polv. 3jv (5 gr.).
Extracto blando de quina. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de á gij (1 dec.).
I. Galactirrea, principalmente si está acompañada de atonía de los órganos digestivos. *D.* De cuatro á ocho píldoras tres veces al dia.

5484. P. CONTRA LAS GASTRALGIAS (*Boudin*).

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica recien preparado. . gviij (4 dec.).
H. S. A. diez y seis píldoras plateadas.
I. Gastralgia rebelde. *D.* Cuatro, ocho y aun diez y seis píldoras al dia, pero gradualmente y empezando siempre por las dosis mas débiles y evitando el tomar muchas á la vez. A veces se notan efectos afrodisiacos muy marcados.

5485. *Otras* (JADIOUX).

℞ Subnitrato de bismuto,
Extracto de valeriana, ää. 3ß (2 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Una á dos píldoras al dia.

5486. *Otras* (LOMBARD).

℞ Subnitr. de bismuto. gij (5 cent.).
Magnesia . . . . . 3ß (2 gr.).

Polvos de Dower. . . . ℊx (50 cent.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Gastralgias, neurosis intermitentes. *D.* Una píldora cada dos horas.

5487. P. CONTRA LA GASTRALGIA.

℞ Masa de Vallet. . . . ʒj (4 gr.).
Masa de cinoglosa. . . ℊxviij (1 gr.).
Subnitr. de bismuto. . ʒß (2 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Gastralgia clorótica. *D.* Una á cinco píldoras al dia.

5488. P. CONTRA LA GONORREA (*Quarin*).

℞ Goma arábiga. . . . . ʒß (16 gr.).
Almáciga en lágrimas. ʒij (8 gr.).
Extr. de tormentila. . ʒj (4 gr.).
Trementina cocida. . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Cinco ó seis píldoras mañana y noche.

5489. *Otras* (BERTON).

℞ Brea,
Alumbre, ää. . . . . ʒv (20 gr.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).
D. Seis á diez píldoras al dia.

5490. P. CONTRA LA HEMOTISIS CRÓNICA (*Righini*).

℞ Protocarbonato de hierro,
Acibar sucotrino. ää. . ℊj.jv (3 gr.).
Extracto de belladona. ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos ó tres al dia.

5491. P. CONTRA LOS HERPES (*Gall*).

℞ Extracto de trébol de agua,
Extracto acuoso de guayaco, ää. . . . ʒj (4 gr.).
Sulfuro de antimonio,
Calomelanos, ää. . . ℊxviij (1 gr.).
Ruibarbo en polvo. c. s.
H. S. A. píldoras de á ℊiij (15 cent.).
I. Herpes é infartos de las vísceras abdominales. Estas píldoras son una imitacion de las de Plummer.

5492. P. CONTRA LA HIDROPESIA (*Lerminier*).

℞ Calomelanos. . . . . ℊviij (4 dec.).
Cebolla albarrana,
Ruibarbo, ää. . . . . ℊjv (2 dec.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
Háganse cuatro píldoras, que se toman en veinticuatro horas.
I. Son diuréticas y purgantes.

5493. P. CONTRA LAS HIDROPESIAS.

℞ Tridacio. . . . . ʒj (4 gr.).
Escila en polvo,
Digital en polvo,
Nitro, ää. . . . . ʒij (24 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Una mañana y noche.

5494. P. CONTRA LA HIDROPESIA (*Pierquin*).

℞ Mercurio dulce.
Escila en polvo, ää. . ʒij ß (10 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
I. Son fundentes, purgantes y diuréticas. *D.* Dos píldoras mañana y noche. Se bebe despues un vaso de infusion de acebo endulzada con ojimiel escilítico, y despues se aumenta progresivamente.

5495. P. CONTRA EL HIDROTORAX (*Dupuy*).

℞ Extracto de trébol de agua,
Polvo de cebolla albar., ää. ʒij ß (6 gr.).
Polvo de digital purpúrea,
Polvo de asa fétida, ää. . . ʒj (4 gr.).
Se mezcla exactamente, y se hacen ochenta píldoras.
I. Hidrotorax, ascitis con asma y palpitaciones, hidroraquis y cardítis. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche y detrás de cada dosis se da una bebida de parietaria nitrada, á la cual se añade algunas veces ʒß (15 gr.) de ojimiel escilítico.

5496. P. CONTRA EL HISTÉRICO (*Debreyne*).

℞ Alcanfor,
Asa fétida, ää. . . . . 5iij (12 gr.).
Extr. de belladona. . . gr.jv (3 gr.).
Extr. acuoso tebáico. . gxviij (1 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.

I. Ataques histéricos. *D.* Una el primer dia, dos al segundo, y se aumenta una píldora cada dia hasta seis en las veinticuatro horas, dos por la mañana, al medio dia y por la noche, y dos horas antes de comer. Segun Debreyne esta dosis basta para suspender y prevenir los ataques de histérico.

5497. P. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA (*Berengier*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Hidrato de peróxido de hierro, ää. . . . 5ijß (10 gr.).
Carbonato de magnesia. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

D. Dos á diez al dia. Al mismo tiempo se usará la tisana de hojas de nogal para bebida usual.

5498. *Otras* (H. DE M.).

℞ Bálsam. peruano sólido. 5j (4 gr.).
Estoraque. . . . . 9ij (24 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

D. gviij (4 dec.) repetidos cuatro ó cinco veces al dia.

5499. P. CONTRA LA INCONTINENCIA DE ORINA DE LOS NIÑOS (*Ribes*).

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica. . . . . gviij (4 dec.).
Etiope marcial. . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Se administra una al dia y se aumenta progresivamente la dosis.

5500. P. CONTRA LA INDIGESTION DE LAS BEBIDAS VINOSAS.

℞ Antimonio diaforético.
Goma amoniaco.
Masa de píldoras de Rufus, ää. . . . . 5j (4 gr.).
Jabon de Castilla. . . 9j (12 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras muy iguales.

D. De seis á doce en las veinticuatro horas.

5501. P. CONTRA LOS INFARTOS ESCROFULOSOS Y ESCIRROSOS (*Stoerck*).

℞ Extracto de cicuta,
Jabon de Venecia, ää. . 5jß (6 gr.).
Goma amoniaco,
Masa de píldoras de Rufus, ää. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de á giij (15 cent.).

I. Infartos escrofulosos en las personas débiles, delicadas ó histéricas. *D.* Dos píldoras, cuatro veces al dia.

5502. P. CONTRA LA ICTERICIA (*Greding*).

℞ Extr. de belladona. gxxjv (12 dec.).
Polvo de hojas de la misma planta. . . gxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de gß (25 mil.).

D. Se da una píldora mañana y noche. Los enfermos experimentan un calor considerable en todo el cuerpo, latidos mas frecuentes de las arterias, una especie de embriaguez y sudores. A estos síntomas suceden deposiciones verdosas y orinas copiosas; se termina la curacion por el ruibarbo y el sulfato de magnesia.

5503. P. CONTRA LOS INFARTOS GLANDULOSOS CRÓNICOS.

℞ Jabon medicinal. . . . 5jv (16 gr.).
Goma amoniaco. . . . . 5ij (8 gr.).
Ioduro de hierro,
Extracto de cicuta,
Extracto de acónito, ää. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).

I. Infartos glandulares crónicos. *D.* Dos á diez píldoras al dia.

5504. P. CONTRA LAS LOMBRICES Y LAS ASCÁRIDES (*Pilschaff*).

℞ Santónico en polvo,
Extracto de ajenjos, ãã. ℈xc (5 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.) que se rodean de magnesia. *D.* Cuatro píldoras cada dos horas.

5505. P. CONTRA LA METRORRAGIA CRÓNICA.

℞ Sabina en polvo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Extracto de sabina. . . ʒij (8 gr.).
Aceite de sabina. . . . 24 gotas.
H. S. A. píldoras de ℈iij (15 cent.).
D. De cinco á diez al dia.

5506. P. CONTRA LA NEURALGIA DEL HÍGADO Ó HEPATALGIA.

℞ Extracto de belladona. ℈ij (1 dec.).
Extracto de diente de leon. . . . . ℈xij (6 dec.).
Polvos de regaliz. . . . . c. s.
H. S. A. ocho píldoras.
D. Una cada dos horas por la mañana.

5507. P. CONTRA LAS PALPITACIONES (*Andral*).

℞ Digital en polvo. . . ℈xviij (1 gr.).
Extracto de beleño. . ℈xxxvj (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una á ocho píldoras aumentando progresivamente.

5508. P. CONTRA LAS POLUCIONES (*Hufeland*).

℞ Alumbre en polvo,
Catecú en polvo,
Quina calis. en p., ãã. ℈vij (6 dec.).
Extracto de quasia amarga. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.)
D. Diez píldoras mañana y noche, cuya dosis se aumenta sucesivamente.

5509. P. CONTRA LA SIFILIS (*José Frank*).

℞ Sublimado corrosivo. . ℈jv (2 dec.).
Extr. gomoso de opio. ℈vij (6 dec.).
Extracto de quina. . . ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.
D. Una al dia y despues dos. Se toman tres y rara vez cuatro. Despues se bebe un vaso de agua de goma ó de tisana gelatinosa ó mucilaginosa. Si producen cardialgia se tomarán despues de comer, ó se beberá en seguida una emulsion de goma arábiga con un poco de opio, y algunas dosis de un polvo con sulfuro de potasa.

5510. P. CONTRA LA SIFILIDES.

℞ Extracto de acónito. . ℈vij (6 dec.).
Opio en polvo.
Sublim. corrosivo, ãã. ℈ij (1 dec.).
H. S. A. ocho píldoras.
D. Una por la mañana en ayunas.

5511. P. CONTRA LA SORDERA.

℞ Carbonato de amoniaco piroacetoso. . . . ℈xviij (1 gr.).
Castóreo en polvo. . . ℈vj (3 dec.).
Aceite de sucino. . . . 2 gotas.
H. S. A. veinte píldoras iguales.
D. Se introduce mañana y noche una de estas píldoras en el oido enfermo.

5512. P. CONTRA LOS SUDORES DE LOS TÍSICOS (*Burdach*).

℞ Agárico blanco. . . ℈xvj (8 dec.).
Muc. de goma aráb. ℈xxjv (12 dec.).
Extracto de genciana. . . . . c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.
D. Cuatro por la noche antes de acostarse.

5513. P. CONTRA LA TÉNIA *ó de trementina mercuriales de Wilde*. (F. P.).

℞ Trementina de Venecia. 18
Jabon de jalapa. 9
Extracto de adelfa. 1
Protocloruro de mercurio. . . . 2
H. S. A. píldoras de ℈vj (3 dec.).
D. Una de tres en tres horas, hasta cuatro ó seis al dia, y se

aumenta la dosis en los siguientes.

5514. P. CONTRA EL VÓMITO DE LAS PREÑADAS (*Pitschaff*).

℞ Creosota. . . . . gij (15 cent.).
Beleño en polvo,
Agua destilada, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. nueve píldoras, que deberán pesar gij (1 dec.) y platéense.
D. Tres píldoras al dia, mañana, noche y al medio dia.

5515. P. CONTRA LAS ULCERACIONES HERPÉTICAS (*Arnal*).

℞ Extracto acuoso de cornezuelo de centeno. gvj (3 dec.).
Ioduro de azufre. . . . gjv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Ulceraciones de la matriz de naturaleza herpética.

5516. P. DE COOPER.

℞ Extracto de cicuta. . . 3iij (12 gr.).
Protocloruro de merc. 3j (4 gr.).
Azufre dorado de antimonio. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
D. Una píldora mañana y noche.

5517. P. DE COPAIBA FERRUGINOSAS (*Berengier*).

℞ Bálsamo de copaiba,
Hidrato de peróxido de hierro, ãã. . . . . 3ijß (10 gr.).
Carbonato de magnesia. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Incontinencia de orina. *D.* Dos á diez píldoras al dia.

5518. P. DE COPAIBA MERCURIALES (*H. M.*).

℞ Resina de copaiba. . . . 3iij (12 gr.).
Calomelanos. . . . . 9j (12 dec.).
Tierra japónica. . . . . c. s.
H. S. A. una masa que se dividirá en ciento cincuenta píldoras iguales.
D. Una cada cuatro horas, aumentando progresivamente.

5519. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO.

℞ Polvo reciente de cornezuelo de centeno. 3ß (2 gr.).
Extracto de opio. . . gß (25 mil.).
Jarabe de goma. . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Leucorrea. *D.* Se dan dos píldoras al dia.

5520. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO ALCANFORADAS (*Robert*).

℞ Cornezuelo de centeno. gij (10 cent.).
Alcanfor. . . . . gj (5 cent.)
H. S. A. una píldora.
I. Son muy eficaces en las poluciones nocturnas. *D.* Una píldora mañana y noche.

5521. P. DE CREOSOTA.

℞ Creosota. . . . . 3j (4 gr.).
Malvabisco,
Zumo de regaliz, ãã. . 3jß (6 gr.).
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Tisis pulmonar y laringea. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5522. *Otras* (LAVERAN).

℞ Creosota. . . . . 3 gotas.
Cicuta . . . . . gjv (2 dec.).
Magnesia,
Mucílago, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. nueve píldoras plateadas.
I. Vómitos de las mujeres preñadas. *D.* Tres píldoras al dia.

5523. P. DE CROTON.

℞ Aceite de croton tiglio,
Jabon medicinal, ãã. . . gij (1 dec.).
Goma arábiga. . . . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Cólicos, helmintiasis, estreñimiento, hidropesía, reuma-

tismo. *D.* Una píldora por la mañana.

5524. P. DE CROTON COMPUESTAS.

℞ Aceite de croton tiglio. gjv (2 dec.).
Gutagamba,
Escamonea,
Jalapa, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Rob de saúco. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Cólico saturnino, hidropesía, reumatismo, helmintiasis, tenia y como purgante. *D.* Una píldora para los niños y dos ó tres para los adultos.

5525. P. DE CUBEBAS.

℞ Cubebas,
Trementina de Venecia,
Polvo de malvabisco, ãã. ʒß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Blenorragia. *D.* Dos ó tres píldoras mañana y noche.

5526. P., BOLOS Ó CÁPSULAS DE CUBEBAS.

Se hacen del peso de gxviij (1 gr.) ovoideas y cubiertas de gelatina.
D. Cinco á veinte píldoras.

5527. P. DE DELFINA.

℞ Delfina. . . . . gij (1 dec.).
Extracto de beleño. . . gjv (2 dec.).
Polvo de goma. . . . . gr.jv (3 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Reumatismo, gota, ciática, lumbago, neuralgias. *D.* Una píldora cada dos horas.

5528. P. DEPURATIVAS (*Althof*).

℞ Extracto de dulcamara. ʒj (30 gr.).
Antimonio crudo. . . . . ʒß (15 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Herpes. *D.* Quince á veinte píldoras al dia.

5529. *Otras* (RIGHINI).

℞ Extracto alcohólico de zarzaparrilla. . . . . ʒß (2 gr.).
Resina de guayaco artificial. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de enebro. . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Dos píldoras al dia.

5530. P. DEPURATIVAS ANTIMONIADAS.

℞ Azufre dor. de antim. gxviij (1 gr.).
Extracto de cáscara de nuez,
Extracto de cicuta,
Resina de guayaco, ãã. ʒß (2 gr.).
Alcanfor,
Opio, ãã. . . . . gjv (50 cent.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Dolores osteocopos, reumatismo crónico, herpes, lepra, sífilis. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5531. P. DEPURATIVAS COMPUESTAS.

℞ Extracto de dulcamara,
Extracto de cicuta,
Antimonio crudo,
Resina de guayaco, ãã. . ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Reumatismo crónico, herpes, lepra, sífilis, dolores osteocopos. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5532. P. DESINFECTANTES.

℞ Cloruro de cal seco. ʒij (8 gr.).
Azúcar. . . . . ℔ß (250 gr.).
Almidon. . . . . ʒj (30 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒj (4 gr.).
Carmin. . . . . giij (15 cent.).
Mézclese y hágase píldoras de giij (15 cent.).
I. Mal olor del aliento. *D.* Cinco ó seis píldoras de dos en dos horas.

5533. P. DE DESLANDES.

℞ Extr. gom. de opio. gjv (20 cent.).

Alcanfor,
Res. de guayaco, ãã. gviij (60 cent.).
Extracto de cnebro. gxv (75 cent.).
H. S. A. ocho píldoras.

I. Reumatismo. *D.* Una píldora cada media hora, y se bebe despues una infusion caliente de escordio, buglosa, te ó amapola.

5534. P. DESOBSTRUENTES.

℞ Limaduras de hierro. gxviij (1 gr.).
Gálbano. . . . . 3ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . 9j (12 dec.).
Extracto de genciana. 3jß (6 gr.).
Sal volátil de asta de ciervo. . . . . gviij (6 dec.).
Aceite de menta. . . 6 gotas.
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).

I. Hipocondría. *D.* Cinco píldoras tres veces al dia, ó una á menudo.

5535. *Otras* (H. M.).

℞ Jabon medicinal. . . . 3iij (12 gr.)
Acíbar sucotrino. . . . 3ß (16 gr.).
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).

D. Una cada cuatro horas, aumentando ó disminuyendo la dosis segun sea necesario.

5536. *Otras* (H. DE M.).

℞ Extracto de taraxacon,
Extracto de ajenjos,
Jabon medicinal, ãã. . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Infartos de las vísceras abdominales. *D.* 9ß á 9j (6 á 12 dec.).

5537. P. DESOBSTRUENTES MERCURIALES (H. DE M.).

℞ Protocloruro de merc. 5ß (2 gr.).
Goma amon. en polvo. 3ij (8 gr.).
Polvos de ruibarbo. . . 3j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 3ß (15 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Como las anteriores. *D.* gjv á gviij (2 á 4 dec.).

5538. P. DE LOS TRES DIABLOS (*Maetzius*).

℞ Protocloruro de merc. gviij (4 dec.).
Trociscos de coloquintida,
Escamon. de Alepo, ãã. gjv (2 dec.).
Jarabe de cantueso. . c. s.

Maetzius dividia esta masa en cuatro píldoras, que consideraba como la dosis mayor que se podia dar al hombre mas fuerte. Las prescribia en las gonorreas para purgar y disminuir la inflamacion del conducto de la uretra.

5539. P. DIAFORÉTICAS.

℞ Extracto de dulcamara,
Azufre sublim. y lav., ãã. 3ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).

D. Se toman de cuatro á doce al dia en las afecciones epsóricas ó reumáticas.

5540. *Otras* (ROUCHER).

℞ Jabon blanco. . . . . 3j (30 gr.).
Goma de guayaco,
Etiope antimonial, ãã. 3ß (15 gr.).
Extracto de dulcamara. 3j (30 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Reumatismo crónico y todas las enfermedades en que es necesario excitar un movimiento saludable hácia la piel. *D.* Una píldora mañana y noche, y se aumenta una cada tres dias hasta llegar á tres ó cuatro mañana y noche.

5541. P. DE DIGITAL FÉTIDAS DE WITHERING (F. P.).

℞ Digital en polvo,
Asa fétida, ãã . . . . . 3j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Catarro pulmonar crónico, tisis, enfermedades del corazon, asma, hidropesías. *D.* Una ó dos píldoras al dia al principio, au-

mentando progresivamente segun los efectos que produzcan.

5542. P. DE DIGITALINA.

℞ Digitalina. . . . . ℊj (5 cent.).
Mucílago y polvo de malvabisco, c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Hipertrofia del corazon. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5543. P. DE DIGITALINA, ESCILA Y ESCAMONEA.

℞ Digitalina de Homolle y Quevenne. . . . . ℊj (5 cent.).
Escila en polvo,
Escamonea de Alepo en polvo, ãã. . . . . ℊc (5 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras iguales y plateadas.
I. Hidropesía por lesion del corazon ó alteracion de la circulacion. *D.* Dos, cuatro y despues seis ú ocho píldoras cada dia. Es buena fórmula.

5544. P. DICRÉTICAS.

℞ Escila en polvo. . . . ℊxviij (1 gr.).
Digital,
Calomelanos, ãã. . . . ℊx (5 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
D. Dos á cuatro píldoras al dia.

5545. *Otras*, n. 2.

℞ Digital en polvo,
Cebolla albarrana en polvo, ãã. . . . . ℊxij (6 dec.).
Extracto de beleño. . ℊvj (3 dec.).
H. S. A. seis píldoras.
I. Angina de pecho. *D.* Una píldora cada dos horas.

5546. *Otras*, n. 3.

℞ Escila. . . . . ℊiv (2 dec.).
Digital. . . . . ℊx (5 dec.).
Calomelanos. . . . . ℊvj (3 dec.).
Escamonea. . . . . ℈j (12 dec.).
Asa fétida. . . . . ℈j (12 dec.).
Extracto de trébol. . . . c. s.
H. S. A. quince píldoras.
I. Hidropesías serosas. *D.* Tres á cuatro píldoras al dia.

5547. *Otras*, n. 4.

℞ Digital en polvo,
Asa fétida en polvo, ãã. . 5j (4 gr.).
Jarabe de las cinco raices, c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Hidropesías. *D.* Una píldora mañana y noche.

5548. *Otras* (DEHAEN).

℞ Trementina. . . . . 5v (20 gr.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Una píldora cada hora en una taza de infusion de regaliz con vino blanco.
Es el *diurético de Dehaen.*

5549. *Otras* (DEBREYNE).

℞ Digital. . . . . 5iij (12 gr.).
Escamonea. . . . . 5jß (6 gr.).
Escila. . . . . 5jß (6 gr.).
Extracto de enebro. . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.

5550. *Otras* (DUPUYTREN).

℞ Jabon medicinal. . . . 5iij (12 gr.).
Calomelanos. . . . . 5ij (8 gr.).
Digital purpúrea. . . . 5j (4 gr.).
Jar. de las cinco raices aperitivas, c. s.
I. Hidropesías pasivas del tegido celular. *D.* Una píldora, mañana y noche.

5551. *Otras* (H. DE IT.).

℞ Cebolla albarrana en polvo. . . . . ℊxx (10 dec.).
Digital purpúrea en polvo. . . . . ℊxviij (9 dec.).
Arrope de enebro. . . c. s.
H. S. A. diez píldoras.
D. Una píldora de hora en hora. Cada una contiene ℊij (1 dec.) de cebolla albarrana.

5552. P. DIURÉTICAS ALCANFORADAS.

℞ Nitrato de potasa,
Alcanfor, ãã. . . . . ʒß (6 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. dos píldoras.
I. Ardores de orina.

5553. P. DIURÉTICAS Y ALTERANTES.

℞ Escila en polvo,
Calomelanos, ãã. . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de lúpulo. . ʒß (2 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Hidropesías, anasarca, infartos glandulares. *D.* Dos píldoras al dia.

5554. P. DIURÉTICAS HIDRAGOGAS DE BOUCHARDAT (H. DE M.).

℞ Cebolla albarrana,
Digital,
Escamonea, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Producen excelentes efectos en las hidropesías pasivas, pleuresías y cardítis. *D.* Se toman de diez á doce al dia hasta producir el efecto diurético y purgante.

5555. *Otras* (H. M.).

℞ Jabon medicinal. . . . . ʒß (15 gr.).
Goma amoniaco,
Nitrato de potasa,
Escila en polvo, ãã. . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (24 dec.).
D. Una cada cuatro horas.

5556. P. DIURÉTICAS MERCURIALES (*Cruveilhier*).

℞ Calomelanos. . . . . ʒj (12 dec.).
Cebolla albarrana en polvo. . . . . ʒß (6 dec.).
Digital en polvo. . . giij (15 cent.).
Jarabe de espino cerval. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Pleuresía crónica cuando se observe con lentitud el líquido derramado. *D.* Una á dos píldoras al dia. Se auxilia su accion aplicando un vejigatorio en el costado.

5557. P. DORADAS.

℞ Acíbar sucotrino. 10
Diagridio sulfurado. 10
Pétalos de rosas. 3
Semillas de apio. 3
Semillas de hinojo. 3
Semillas de anis. 3
Almáciga. 2
Azafran. 2
Trociscos de Alhandal. 2
Alcohol. . . . . c. s.
I. Es un purgante aconsejado en otro tiempo para conservar y fortificar la vista. *D.* gxij á gxxjv (6 á 12 dec.).

5558. P. DRASTICAS.

℞ Aceite de croton tiglio. gj (5 cent.).
Polvo de malvabisco. . ʒß (2 gr.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. cuatro bolos.
D. Se administra uno cada cuarto de hora hasta producir el efecto purgante.

5559. *Otras* (BURDACH).

℞ Agárico blanco,
Mucílago de goma arábiga, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de genciana, c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Sudores nocturnos y colicuativos de los tísicos. *D.* Cuatro píldoras al dia.

5560. *Otras* (H. DE IT.).

℞ Gutagamba. . . . . gxij (6 dec.).
Rob de saúco,
Regaliz en polvo, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una píldora cada tres horas.

5561. *Otras* (RAYER).

℞ Jalapa en polvo,
Escamonea, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras, que se

usan para combatir el estreñimiento en el cólico de plomo, á la dosis de dos á cuatro al dia hasta que hayan producido una evacuacion abundante.

5562. P. DRÁSTICAS OPIADAS (*Langley*).

℞ Extracto de elaterio,
Opio purificado, ãã. . . gr̄xx (1 gr.).
H. S. H. veinte píldoras.
I. Cólico saturnino. *D.* Una píldora cada hora.

5563. P. DE DUCHESNE.

℞ Goma amoniaco. . . . . 5ij (8 gr.).
Acíbar. . . . . ʒj (30 gr.).
Ruibarbo. . . . . 5ij (8 gr.).
Subcarbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
Jar. de rosas solutivo, c. s.
H. S. A. píldoras de gr̄jv (2 dec.).
I. Infartos de las vísceras del bajo vientre, que suceden á las calenturas intermitentes, hepatitis crónica, atrofia mesentérica. *D.* Cinco á seis píldoras.

5564. P. DE DULCAMARA IODURADAS (*Vogt*).

℞ Ioduro de potasio. . . . ℈ (6 dec.).
Extracto de dulcamara,
Espuoja calcinada, ãã. 5iij (12 gr.).
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
I. Afecciones escrofulosas, coxalgia, bocio, tisis incipiente, sífilis constitucional, tiña, tumores blancos, tumores glandulosos, etc. *D.* Seis píldoras tres veces al dia.

5565. P. DE DULCAMARA Y SULFURO DE ANTIMONIO.

℞ Extracto de dulcamara. ʒß (16 gr.).
Sulfuro de antimonio. . 5ij (8 gr.).
Polvo de dulcamara. . c. s.
H. S. A. píldoras de gr̄jv (2 dec.).
I. Afecciones cutáneas rebeldes. *D.* Cuatro, seis, ocho ó doce píldoras al dia.

5566. P. DULCIFICANTES.

℞ Goma arábiga,
Goma tragacanto. ãã. ʒß (15 gr.
Bálsamo del Perú. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gr̄jv (2 dec.).
I. Irritaciones crónicas del estómago y degeneraciones escirrosas de esta víscera. *D.* Cuatro á cinco píldoras por la mañana, al medio dia y por la noche, bebiendo un vaso de caldo de ternera en que se ha cocido una cabeza de adormidera.

5567. P. ECOPRÓTICAS (*Pitschaff*).

℞ Extracto de acíbar,
Sulfato de quinina, ãã. gr̄xx (1 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Pereza de los intestinos gruesos, estreñimiento por atonía, dispepsia, calenturas intermitentes. *D.* Cinco á seis píldoras.

5568. P. DE ELATERIO.

℞ Elaterio,
Acíbar,
Gutagamba, ãã. . . gr̄xviij (1 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒß (15 gr.).
Ojimiel cólchico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gr̄jv (2 dec.).
I. Ascitis, hidropesías pasivas, estreñimiento, hemorroides. *D.* Cuatro á seis píldoras al dia.

5569. P. DE ELÉBORO COMPUESTAS.

℞ Extracto de eléboro negro,
Acíbar,
Sal amon. marcial, ãã. 5j (4 gr.).
Azafran. . . . . ʒß (2 gr.).
Opio. . . . . gr̄v (25 cent.).
Tintura de ruibarbo, c. s.
H. S. A. píldoras de gr̄jv (2 dec.).
I. Amenorrea. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5570. P. EMENAGOGAS.

℞ Píldoras de granos de vida,
Píldoras de Vallet, ãã. 5ijß (10 gr.)

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Se usan como emenagogas. *D.* Dos á diez píldoras al dia.

5571. P. EMENAGOGAS (*Barthez*).

℞ Goma amoniaco. . . . . ʒj (30 gr.).
Sagapeno. . . . . ʒij (60 gr.).
Elixir de propiedad. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Supresion de las reglas por atonía y cuando conviene excitar los movimientos de la matriz. *D.* Primero dos píldoras, y despues cuatro, todas las noches al acostarse.

5572. *Otras* (BARTHEZ).

℞ Almizcle. . . . . gxviij (1 gr.).
Alcanfor. . . . . gjx (50 cent.).
Mirra. . . . . ʒj (4 gr.).
Acíbar. . . . . ʒß (2 gr.).
Bálsamo del Perú. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Dismenorrea, amenorrea, clorosis. *D.* Seis píldoras al dia en tres veces.

5573. *Otras* (CHAMET).

℞ Extracto de genciana. giij (15 cent.).
Acíbar sucotrino,
Calom. al vapor, ää. gj (5 cent.).
D. Una píldora mañana y noche.
Se auxilia la accion de estas píldoras con los pediluvios sinapizados, las ventosas secas en el hipogastrio y en la parte interna de los muslos.

5574. *Otras* (FOUQUIER).

℞ Polvo de azafran. . . . ʒj (12 dec.).
Óxido negro de hierro. ʒß (6 dec.).
Polvo de valeriana. . . . ʒj (12 dec.).
Jarabe de artemisa. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Amenorrea por debilidad. *D.* Cuatro á ocho al dia. Fouquier auxilia su accion con la aplicacion diaria ó cada dos dias de cuatro á seis sanguijuelas á la vulva, para ocasionar una congestion sanguínea del sistema vascular uterino.

5575. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Sabina en polvo,
Extr. de manzan., ää. ʒjß (6 gr.).
Óxido negro de hierro,
Acíbar, ää. . . . . gxv (75 cent.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
Cada píldora contiene menos de gj (5 cent.) de sabina.
I. Clorosis. *D.* Seis píldoras á la vez.

5576. *Otras* (H. DE LYON).

℞ Limaduras de hierro. . ʒj (4 gr.).
Eléboro negro. . . . . ʒj (12 dec.).
Extracto de genciana. ʒij (8 gr.).
Jarabe de azafran. . . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Dos píldoras tres veces al dia; se beberá despues una taza de infusion caliente de melisa, artemisa, etc.

5577. *Otras* (JAHN).

℞ Limaduras de hierro. . ʒß (16 gr.).
Goma amoniaco,
Jabon antimonial, ää. ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Amenorrea. *D.* Tres á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5578. *Otras* (NEUMANN).

℞ Hojas de tejo en polvo,
Carbonato de hierro, ää. ʒj (4 gr.).
Cornezuelo de centeno. . ʒij (8 gr.).
Digital en polvo. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de naranja. . . . c. s.
H. S. A. doscientas cincuenta píldoras.
I. Amenorrea complicada con clorosis. *D.* Ocho píldoras, mañana y noche, en una taza de infusion muy ligera de sabina.

5579. *Otras* (TRONCHON).

℞ Asa fetida
Succino, ää. . . . . ʒß (2 gr.).
Almáciga . . . . . ʒjß (6 gr.).

Mirra . . . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).

D. Cuatro á ocho píldoras mañana y noche, y despues se bebe un vaso de infusion de azafran endulzada.

5580. P. EMENAGOGAS ALOÉTICAS.

℞ Acíbar sucotrino,
Extracto de sabina,
Genciana en polvo,
Carbonato de hierro, ãã. 5ß (2 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Clorosis, vértigos, amenorrea, esplenitis, ataxia, histérico. *D.* Una á cuatro píldoras.

5581. P. EMENAGOGAS FÉTIDAS.

℞ Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Subcarbon. de hierro. gxc (5 gr.).
Extracto de sabina,
Extr. de artemisa, ãã. gxviij (1 gr.).
Jarabe de azafran. . . c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.)

I. Amenorrea, clorosis, dismenorrea. *D.* Seis á diez píldoras al dia.

5582. P. EMÉTICAS (*Swediaur*).

℞ Sulfato de cobre,
Ipecacuana, ãã. . . . . ℈j (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.

H. S. A. doce píldoras. Cada una contiene gij (1 dec.) de sulfato de cobre.

I. Tisis pulmonar. *D.* Dos ó tres píldoras cada tres ó cuatro dias.

5583. P. DE EMÉTICO *ó Píldoras de tártaro estibiado* (*Boudet*).

℞ Emético. . . . . gLxjv (32 dec.).
Extracto de opio. . . gij (15 cent.).
Extracto de lechuga. 5j (4 gr.).
Goma arábiga,
Malvabisco, ãã. . . . gxxx (15 dec.).

H. S. A. treinta y dos píldoras: cada una contendrá gij (1 dec.) de emético.

Boudet las ha propuesto para reemplazar las soluciones de emético empleadas en el tratamiento de las inflamaciones agudas del pulmon por el método de Rasori.

5584. P. DE EMÉTICO, CALOMELANOS Y OPIO (*Fearnley*).

℞ Emético. . . . . gviij (4 dec.).
Calomelanos. . . . . gxv (1 gr.).
Opio. . . . . ℈ß (6 dec.).

H. S. A. ocho píldoras.

I. Cólera espasmódico y delirio trémulo. *D.* Una píldora cada hora.

5585. P. DE ÉNULA CAMPANA COMPUESTAS (*Heim*).

℞ Extracto de énula. . . 5j (4 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Digital en polvo, ãã. . ℈j (12 dec.).
Opio puro. . . . . gvj (3 dec.).

H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Tos seca, tos espasmódica. *D.* Una píldora cada tres horas.

5586. P. DE ÉNULA Y ESCILA.

℞ Extracto de énula. . 5ijß (10 gr.).
Escila en polvo. . . . gxviij (1 gr.).

H. S. A. diez píldoras.

I. Se usan como expectorantes. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5587. P. DE ERGOTINA.

℞ Ergotina. . . . . gxc (5 gr.).
Regaliz en polvo. . . . . c. s.

H. S. A. sesenta píldoras que se pueden platear.

I. Afecciones crónicas de la matriz. *D.* Seis á diez píldoras al dia.

5588. P. DE ERGOTINA Y CICUTA (*Arnal*).

℞ Extracto acuoso de cornezuelo de centeno. . gvj (3 dec.).
Extracto de cicuta. . . gjv (2 dec.).

H. S. A. cuatro píldoras.

I. Enteralgias que acompañan á veces al uso del cornezuelo de centeno. *D.* En dos dias y despues en uno.

5589. P. DE ERGOTINA É IODURO DE HIERRO (*Arnal*).

℞ Ioduro de hierro,
Extracto de cornezuelo de centeno, ãã. . . . ʒjv (2 dec.).
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Son útiles á las mujeres cloróticas, linfáticas ó debilitadas por el catarro uterino. *D.* En el dia.

5590. P. DE ESCILA AMONIACALES *ó Píldoras escilíticas* (F. E.).

℞ Jabon blanco. 9
Goma amoniaco pulverizada. . . 4
Escila pulverizada. 3
Bálsamo de copaiba. 3
H. S. A. Cada escrúpulo contiene ʒij (1 dec.) de escila.
D. Hasta ʒjx (45 cent.).

5591. P. DE ESCILA COMPUESTAS.

℞ Calomelanos. . . . ʒviij (4 dec.).
Escila,
Ruibarbo, ãã. . . . ʒjv (2 dec.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Son diuréticas y purgantes en las hidropesías.

5592. *Otras* (F. DE L.).

℞ Cebolla albarrana desecada. . . . . 3j (4 gr.).
Gengibre en polvo. . 3ij (8 gr.).
Jabon medicinal. . . . 3iij (12 gr.).
Goma amoniaco. . . . 3ij (8 gr.).
Se mezclan los polvos, se los incorpora el jabon con c. s. de jarabe, y despues se divide la masa S. A. en píldoras de ʒiij (15 cent.).
I. Se usan como diuréticas y expectorantes en las afecciones catarrales crónicas de las vias aereas, etc. *D.* Doce, quince, diez y ocho á veinticuatro granos al dia y aun mas segun el estado del enfermo.

5593. P. DE ESCILA, DIGITAL Y HIERRO (*Chomel*).

℞ Escila en polvo,
Digital en polvo, ãã. . . 3ß (2 gr.).
Hierro porfirizado. . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Albuminuria complicada con clorosis. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5594. P. DE ESCILA É IPECACUANA.

℞ Escila. . . . . ʒjx (50 cent.).
Ipecacuana. . . . . ʒjv (25 cent.).
Sucino. . . . . ʒxv (75 cent.).
Extr. gomoso de opio. ʒij (10 cent.).
Conserva de énula. . c. s
H. S. A. diez píldoras.
I. Catarro crónico, coqueluche, hácia el fin de la pulmonía, tos, pleuresía, asma, beriberi, hidropesías, ascitis. *D.* Dos píldoras tres veces al dia.

5595. P. ESCILÍTICAS.

℞ Escila en polvo. 3
Goma amoniaco. 4
Ojimiel escilítico. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Catarros bronquiales y como diuréticas.

5596. *Otras*, n. 2.

℞ Polvo de escila,
Polvo de digital,
Calomelanos, ãã. . . . ʒxij (6 dec.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras, de las que se toman de dos á cuatro al dia.

5597. *Otras* (F. ED.).

℞ Jabon medicinal. . . . 3j (4 gr.).
Escila en polvo,
Nitrato de potasa, ãã. . . 3ß (2 gr.).
Bálsamo de copaiba. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Hidropesía y retencion de orina no inflamatoria. *D.* Tres ó cuatro por la mañana en ayunas.

5598. *Otras* (CHRESTIEN).

℞ Cebolla albarrana en polvo. . . . . ʒvj (30 cent.).
Sucino. . . . . ʒxv (75 cent.).

Ipecacuana. . . . . ʒij (10 cent.).
Conserva de énula campana. . . c. s.
H. S. A. nueve píldoras.
I. Afecciones flatulentas, hidropesías, timpanitis. *D.* Se toman en tres dosis al dia.

5599. P. ESCILÍTICAS (H. DE M.).

℞ Goma amoniaco pulver. ʒj (4 gr.).
Polvo de escila. . . . . ʒß (2 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ʒij (8 gr.).
Bálsamo de copaiba. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Hidropesías. *D.* ʒß á ʒj (6 á 12 dec.).

5600. *Otras* (F. P.).

℞ Goma amoniaco. 2
Escila preparada en polvo. 2
Cardamomo menor. 1
H. S. A. *I.* Son expectorantes y diuréticas. *D.* ʒß (6 dec.).

5601. *Otras* (PARMENTIER).

℞ Jabon medicinal. . . . . ʒß (16 gr.).
Goma amoniaco,
Nitro,
Cebolla albarrana en polvo, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.). Cada una contiene gr. ½ (4 cent.) de cebolla albarrana.
I. Hidropesías pasivas. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5602. P. EXCITANTES (*Lesecure*).

℞ Extracto resinoso de nuez vómica,
Conserva de tilo, ãã. . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Parálisis. *D.* Una píldora por la mañana en ayunas, y se aumenta otra todas las semanas hasta que el enfermo sienta una verdadera rigidez tetánica. Entonces se moderan sus efectos demasiado excitantes con los baños, bebidas diluentes, lavativas y antiespasmódicos.

5603. P. ESCOCESAS.

℞ Jabon medicinal. . . . . ʒij (8 gr.).
Gutagamba,
Acíbar sucotrino,
Polvo de canela comp., ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).

5604. P. ESCOCESAS O DE ANDERSON.

℞ Acíbar. . . . . lbj (500 gr.).
Jalapa,
Azufre,
Marfil quemado,
Regaliz, ãã. . . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de anis. . . . . ʒj (4 gr.).
Gutagamba. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jabon. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de espino cerval. . . . . c. s.
I. Son tónicas y purgantes. *D.* Tres ó cuatro píldoras.
La fórmula de la F. P. es mas racional. V. núm. 5068.

5605. P. EXPECTORANTES

℞ Cebolla albarrana. . . ʒß (2 gr.).
Mirra. . . . . ʒiß (6 gr.).
Extracto de beleño. . . ʒij (24 gr.).
Agua. . . . . c. s.
Háganse treinta y seis píldoras. Cada una contiene ʒj (3 cent.) de cebolla albarrana.
I. Catarros pulmonares crónicos, etc. *D.* Dos al dia.

5606. *Otras* (PARIS).

℞ Sulfato de zinc,
Mirra, ãã. . . . . ʒß (6 dec.).
Confeccion de rosas. . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Coqueluche. *D.* Una píldora tres veces al dia.

5607. P. ESPLÉNICAS.

℞ Goma amoniaco,
Extr. de acíbar, ãã. . ʒß (48 gr.).
Mirra escogida,
Polvo de raiz de brionia, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒjv (2 dec.).
I. Se usan como purgantes en la hipocondría, hepatitis, esplenitis y en la amenorrea. *D.* Tres á seis píldoras al dia.

5608. P. ESTÉNICAS (*Brown*).

℞ Quermes mineral. . ℈xv (75 cent.).
Óxido de antim. hidrosulfurado pardo,
Opio puro,
Protocloruro de mercurio, ãã. . . . . gx (5 dec.).
Bálsamo del Perú. . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈j (5 cent.).
I. Tisis pulmonar, hidropesías, espasmos. *D.* Una píldora mañana y noche.

5609. P. ESTIBIADAS (*Broussonet*).

℞ Tártaro emético. . . . ℈xij (6 dec.)
Opio. . . . . gx (5 dec.).
Goma arábiga,
Miga de pan, ãã. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈j (5 cent.).
I. Reumatismo crónico, gota, ifilides. *D.* Una á tres píldoras aumentando progresivamente.

5610. P. ESTIMULANTES.

℞ Pimienta de Indias. . . . ℥j (4 gr.).
Miga de pan,
Agua, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Calentura amarilla. *D.* Una píldora cada dos horas.

5611. *Otras*, n. 2.

℞ Pimiento de España. . ℈j (12 dec.).
Extracto de genciana. . ℥j (4 gr.).
Genciana. . . . . c. s.
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Dispepsia crónica.

5612. P. ESTIMULANTES DE CANTÁRIDAS *ó Píldoras estimulantes de Sundelin.*

℞ Cantáridas. . . . . ℈v (25 cent.).
Estricnina. . . . . ℈ij (10 cent.).
Resina de guayaco. . ℥j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈viij (1 gr.).
Extracto de canela. . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Amenorrea, parálisis de la vejiga, paraplegia, incontinencia de orina por atonía, enuresis. *D.* Una píldora mañana y noche.

5613. P. ESTIMULANTES (*Ribes*).

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica. . . . ℈viij (4 dec.).
Óxido negro de hierro. ℥j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈jv (2 dec.).
I. Enuresis, incontinencia de orina, catarro útero-vaginal. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5614. P. ESTÍPTICAS (*Dumeril*).

℞ Acetato de plomo. . . . ℈jv (2 dec.).
Opio. . . . . ℈j (5 cent.).
Extracto de regaliz. . . ℥j (12 dec.).
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Diarreas crónicas y colicuativas. *D.* De dos á cuatro píldoras.

5615. P. ESTOMACALES.

℞ Ipecacuana,
Extracto de centaura menor, ãã. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Ruibarbo. . . . . ℥ß (2 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Debilidad de estómago. *D.* Una píldora mañana y noche.

5616. *Otras*, n. 2.

℞ Acíbar sucotrino. . . . ℈xc (5 gr.).
Resina de guayaco. . . ℈ij (3 gr.).
Serpentaria de Virginia. ℈xviij (1 gr.).
Extracto de genciana. . ℥ß (2 gr.).
Jar. de cásc. de naranja, c. s.
H. S. A. píldoras de ℈jv (2 dec.).
I. Dispepsia, anorexia, embarazo gástrico, calenturas intermitentes. *D.* Cuatro á seis píldoras mañana y noche.

5617. *Otras* (F. DE PLENCK).

℞ Extracto de genciana. ℥ß (16 gr.).
Ruibarbo en polvo,
Tártaro vitriolado, ãã. ℥ij (8 gr.).
Aceite de yerbabuena. ℥j (4 gr.).
Mézclese, y con c. s. de jarabe simple háganse píldoras de á ℈vj (3 dec.).
I. Dispepsia y atonía del conducto digestivo.

5618. P. ESTOMACALES (F. DE PLENCK).

℞ Cáscara de naranja confitada,
Cáscara de limon confitada, ãã. . . . . ʒij (60 gr.).
Clavo,
Canela, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Nuez moscada. . . . . ʒj (4 gr.).
Triaca. . . . . ʒiij (12 gr.).
Ojos de cangrejos. . . . ʒj (30 gr.).

Se reducen á polvo y se mezclan; se añaden ʒiij (12 gr.) de ruibarbo pulverizado, se continúa mezclando bien, y con c. s. de jarabe de membrillo se forman píldoras ó se deja bajo la forma de opiata.

I. Leucorrea y atonía del estómago. *D.* De ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) dos veces al dia.

5619. P. ESTOMACALES.

℞ Extracto de quina,
Extracto de cardo santo,
Extracto de genciana,
Extracto de ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ℈v (2 dec.).

I. Debilidad de estómago, dispepsia, lepra, anorexia, consuncion; convalecencia. *D.* Una ó dos píldoras por la mañana, al medio dia y por la tarde. Se bebe despues una taza de infusion de menta piperita convenientemente azucarada.

5620. P. ESTOMACALES (*Cadet*).

℞ Jabon medicinal. . . . ʒj (12 dec.).
Acíbar,
Extr. seco de quina de Lagaraye,
Resina de guayaco, ãã. ℈viij (4 dec.).
Goma amoniaco. . . . ℈vj (3 dec.).
Deutóxido de hierro. . ℈v (2 dec.).

H. S. A. doce píldoras.

D. Se toman dos al tiempo de comer.

5621. P. ESTOMACALES ó *Píldoras de acíbar y quina* (H. M. F.).

℞ Acíbar sucotrino. . . . ʒß (6 dec.).
Extr. blando de quina. ℈vj (3 dec.).
Canela en polvo. . . . ℈ij (1 dec.).

H. S. A. doce píldoras.

I. Calenturas remitentes mucosas, calenturas intermitentes, raquitis, heridas atónicas. *D.* Tres á cuatro píldoras al dia.

5622. *Otras* (SMITH).

℞ Acíbar sucotrino,
Sagapeno,
Ruibarbo en polvo,
Polvo diaromaton, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Aceite esencial de yerbabuena,
Aceite esenc. de clavo, ãã. 10 gotas.
Bálsamo líquido del Perú, c. s.

H. S. A. píldoras de ℈v (2 dec.).

I. Dispepsia é indigestiones. *D.* De tres á seis todas las noches.

5623. P. ESTOMACALES (*Tronchin*).

℞ Mirra. . . . . ʒij (60 gr.).
Extr. de cent. menor. ʒj (4 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . ʒj (12 dec.).

H. S. A. píldoras de ℈iij (15 cent.).

I. Debilidades del estómago. *D.* Ocho á doce píldoras al dia.

5624. *Otras* (WEDEKIND).

℞ Hiel espesada reciente,
Extracto de genciana,
Ruibarbo en polvo, ãã. ʒiij (12 gr.).
Limaduras de hierro. . ʒj (4 gr.).

H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.).

I. Acidez de las primeras vías en los hipocondriacos, histéricas, cloróticas y gotosos. *D.* Ocho á doce píldoras, tres horas antes de comer.

5625. P. ESTOMACALES ó *Granos de vida de Mezue.*

℞ Acíbar sucotrino. . . . ʒvj (24 gr.).
Rosas rojas,
Almáciga, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ℈v (2 dec.).

I. Se usan como estomacales, fortificantes y laxantes. *D.* Dos ó tres píldoras al tiempo de comer.

5626. P. DE ESTORAQUE COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Estoraque purificado. . 3iij (12 gr.).
Opio duro en polvo,
Azafran, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A.

5627. P. DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE NUEZ VÓMICA (H. DE M.).

℞ Extracto alcohólico de
nuez vómica. . . . ℈ij (1 dec.).
Carbonato de hierro. . 3j (12 dec.).
H. S. A. veinticinco píldoras.
I. Incontinencia de orina producida por atonía de la vejiga. *D.* Una píldora cada tres horas.

5628. P. DE EXTRACTO DE BELLADONA.

℞ Extracto de belladona. . ℈x (5 dec.).
Regaliz en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Neuralgias. *D.* Se empieza por una píldora.

5629. P. DE EXTRACTO DE CICUTA Y QUINA.

℞ Extracto de quina. . . ℈j.v (3 gr.).
Extracto de cicuta,
Ext. de taraxac., ãã. ℈xxvij (1,5 gr.).
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Infartos glandulares, atrofia mesentérica, escirro, ictericia, escirro del hígado ó de las mamas, marco, conjuntivitis, queratitis, metritis, muermo, tisis, calenturas intermitentes, reumatismo, lepra. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5630. P. DE EXTRACTO DE CICUTA MERCURIALES (H. DE M.).

℞ Extracto de cicuta. . . 3ij (24 dec.).
Protoclor. de mercurio. ℈xvj (8 dec.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Escirros é infartos glandulosos. *D.* gjv (2 dec.) una ó dos veces al dia.

5631. P. DE EXTRACTO DE CÓLCHICO (*Scudamore*).

℞ Extracto acético de cólchico. . . . . 3ijß (10 gr.).
Malvabisco en polvo. . c. s.
H. S. A. cien píldoras.
I. Gota y como purgantes. *D.* Una á cinco píldoras al dia.

5632. P. DE EXTRACTO ETÉREO DE CUBEBAS (*Hausmann*).

℞ Extr. etéreo de cubebas. 3j (4 gr.).
Goma arábiga en polvo. 3ß (2 gr.).
Magnesia calcinada. . . 3jß (6 gr.).
Mézclese y con c. s. de agua destilada se hacen noventa píldoras.
D. Tres píldoras al dia.

5633. P. DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE NUEZ VÓMICA (*Fouquier*).

℞ Extracto alcohólico de
nuez vómica. . . . . 3j (4 gr.).
Polvo de malvabisco. . c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.
D. Se dan una ó dos al dia, aumentando progresivamente hasta nueve ó mas en los casos de parálisis.

5634. P. DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA DEL DOCTOR FABRE.

℞ Extr. de zarzaparrilla. ℥jv (125 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3v (20 gr.).
Extracto de enebro. . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
Se las recomienda para reemplazar los cocimientos de zarzaparrilla, á la dosis de diez píldoras al dia.

5635. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Semillas de estramon. ℈vj (3 dec.).
Alcanfor. . . . . ℈xvij (1 gr.).
Sabina,
Extracto de poligala de
Virginia, ãã. . . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈jv (2 dec.).
I. Reumatismo crónico, corea,

histórico, neuralgias. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5636. P. ESTRÍCNICAS.

℞ Sulfato de morfina. . . ʒj (5 cent.).
Extracto de acónito. . ʒvj (3 dec.).
Haba de San Ignacio. . ʒij (1 dec.).
Polvo de regaliz,
Miel, ää. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Amenorrea, tisis, corea, pleuresía, muermo, neuralgias, epilepsia, amaurosis, calenturas dolorosas, proctosis, enuresis, reumatismo. *D.* Una píldora cada dos ó tres horas.

5637. P. DE ESTRICNINA (*Magendie*).

℞ Estricnina muy pura. . ʒij (1 dec.).
Conserva de cinosbastos. ʒß (2 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras iguales y plateadas, para evitar que se peguen unas con otras.

D. Una píldora al dia. Se puede aumentar la dosis hasta dos ó tres en las veinticuatro horas, pero debe hacerse este aumento con la mayor prudencia.

5638. P. DE ESTRICNINA (H. DE M.).

℞ Estricnina. . . . . ʒij (5 cent.).
Conserva de rosas. . . ʒjv (2 dec.).
Almidon. . . . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.

I. Incontinencia de orina producida por atonia de la vejiga. *D.* Una píldora dos veces al dia.

5639. P. DE ESTRICNINA (*Furnari*).

℞ Estricnina. . . . . ʒij (1 dec.).
Extracto de valeriana. c. s.
H. S. A. treinta y dos píldoras.

I. Amaurosis tórpida. *D.* Una píldora por la mañana en ayunas durante cinco dias, y despues una mañana y noche.

5640. P. DE ESTRICNINA MARCIALES.

℞ Estricnina. . . . . ʒij (1 dec.).
Oxido negro de hierro.
Azúcar, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Mucílago de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras plateadas.

I. Tisis, parálisis, amaurosis, corea, epilepsia, impétigo, enuresis, reumatismo, neuralgias. *D.* Una píldora mañana y noche.

5641. P. ETIÓPICAS (F. M.).

℞ Etiope mineral. . . . . ʒij (60 gr.).
Antimonio diaforético. . ʒj (30 gr.).
Goma de guayaco. . . . ʒß (15 gr.).
Extracto de zarzaparrilla. . . . . c. s.
H. S. A.

I. Enfermedades que traen origen del vicio sifilítico, hidropesía, escorbuto y otras enfermedades. *D.* ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

5642. P. ETIÓPICAS COMPUESTAS.

℞ Etiope antimonial,
Etiope mineral, ää. ʒxviij (1 gr.).
Extracto de cicuta. ʒxxvij (1,5 gr.).
Resina de guayaco. ʒxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).

I. Herpes, tiña, úlceras sifilíticas. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5643. P. FEBRÍFUGAS.

℞ Quinoidina,
Quina, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcohol. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.

D. Tres á cinco cada dos horas.

5644. *Otras*, n. 2.

℞ Polvo de cálamo arom. ʒxviij (1 gr.).
Sulfato de quinina. . . ʒvj (3 dec.).
Extracto de enebro. . ʒjv (2 dec.).
H. S. A. ocho á diez píldoras.

I. Calenturas intermitentes, reumatismo, neuralgias. *D.* Se toman durante la apirexia, de hora en hora.

5645. *Otras* (ANDONART).

℞ Opio. . . . . ʒj (4 gr.

Á (anfor).
Azúcar sacarino, ãã. . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras. *D.* Una píldora de dos en dos horas, entre los paroxismos.

5646. P. FEBRÍFUGAS ó *Febrífugo de Metzinger.*

℞ Quina calisaya. . . . . 3ß (16 gr.).
Carbonato de potasa. . 5j (4 gr.).
Carbonato de amoniaco. 5ß (2 gr.).
Sal vegetal. . . . . 5j (4 gr.).
Azufre dorado de antim. 5ß (2 gr.).
Extr. de trébol de agua. 5j (4 gr.).
Extracto de ajenjos. . . 5j (4 gr.).
Extracto de perejil. . . c. s.
H. S. A. una masa que se dividirá en píldoras de gij (15 cent.).
I. Calenturas intermitentes. *D.* Seis píldoras inmediatamente despues del acceso, seis á las tres horas y otras seis tres ó cuatro horas antes del nuevo acceso. Cortada la fiebre toma el enfermo dos tomas al dia de cuatro píldoras, una por la mañana y otra por la noche, por espacio de tres ó cuatro dias, despues tres píldoras en cada toma y luego dos.

5647. P. FEBRÍFUGAS (*Henschel*).

℞ Sulfato de quinina. ℈xv (75 cent.).
Canela en polvo. . ℈xxx (15 dec.).
Extracto de quina. c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Calenturas intermitentes. *D.* Dos á cuatro píldoras cada dos ó tres horas.

5648. *Otras* (ISENSEE).

℞ Sulfato de quinina. . . . 3ß (2 gr.).
Extracto hidroalcohólico de belladona. . . . . gij (1 dec.).
Extr. de trébol de agua. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Segun el autor son muy eficaces en las calenturas intermitentes, pues de diez calenturas curan nueve. *D.* Una píldora cada tres horas durante la apirexia.

5649. *Otras* (JAHN).

℞ Limaduras de hierro. 3ß (15 gr.).
Extracto de milenrama.
Extracto de manzanilla, ãã. . . . . 3ij (8 gr.).
Extr. de nuez vómica. gxviij (1 gr.).
Goma tragacanto. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Intermitentes cuartanas. *D.* Tres á cinco píldoras cada tres horas.

5650. *Otras* (LIPPICH).

℞ Carbonato de hierro,
Sulfato de quinina, ãã. gxviij (1 gr.).
Extr. de taraxacon. . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos píldoras cada dos horas. Se puede aumentar gradualmente la dosis del carbonato de hierro hasta 3ß (2 gr.).

5651. *Otras* (LOCHSTAEDT).

℞ Esencia de almendras amargas. . . . . una gota.
Sulfato de quinina. . . . gij (4 dec.).
Polvo aromático. . . . . gx (5 dec.).
Extracto de centaura menor. . . . . c. s.
H. S. A. diez píldoras.
I. Calenturas intermitentes, cefalalgia. *D.* Una píldora de hora en hora durante la apirexia.

5652. *Otras* (RONANDER).

℞ Quinato de quinina,
Pimienta negra,
Extr. de ajenjos, ãã. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Tres píldoras cada dos ó tres horas.

5653. *Otras* (SACHS).

℞ Cianuro de hierro. . . gxviij (1 gr.).
Goma amoniaco,
Extracto de taraxacon,
Ruibarbo, ãã. . . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Calenturas intermitentes, esplenitis crónica, hepatitis, dispepsia. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5654. P. FEBRÍFUGAS (*Tissot*).

℞ Serpentaria virginiana en polvo. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Alcanfor en polvo. . ℊxxxvj (2 gr.).
Conserva de rosas. . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Calenturas malignas. *D.* En el dia.

5655. P. FEBRÍFUGAS AMARGAS (*Luciano Pieste*).

℞ Acíbar sucotrino. . . ℊxxx (15 dec.).
Bisulfato de quinina, ℊxv (75 cent.).
Sulfato de hierro. . . ℊxij (60 cent.).
Extracto de menta piperita. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Intermitentes rebeldes. *D.* Una píldora cada tres horas.

5656. P. FEBRÍFUGAS ANTISÉPTICAS (*Levacher*).

℞ Sulfato de quinina. . . ℥ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊx (5 dec.).
Calomelanos. . . . . ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
I. Calentura amarilla y calenturas intermitentes graves.

5657. P. FEBRÍFUGAS INGLESAS.

℞ Quina. . . . . ℥j (32 gr.).
Sal de ajenjos,
Hidroclorato de amoniaco, ää. . . . . ℥j (4 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Jarabe de quina. . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras ó mas, si se desea.
D. Se toma la tercera parte de esta dosis en una toma en la época mas distante del acceso que debe presentarse. Es indiferente el grosor de las píldoras. Creemos que podria dividirse esta masa en treinta y seis.

5658. P. DE FERROCIANATO DE QUININA.

℞ Ferrocianato de quinina. . . . . ℊx (50 cent.).
Polvo de peonía,
Ext. de valeriana, ää. ℊxx (1 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Tisis, reumatismo, sudor inglés, ataxia, caquexia, anemia, efidrosis, hepatalgia, esplenitis, calenturas intermitentes, epilepsia, corea, corea periódica, geroftalmia, bulimia, neuralgias. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5659. P. FERRUGINOSAS.

℞ Etiope marcial. . . . ℥j (30 gr.).
Azafran oriental,
Canela, ää. . . . . ℨij (24 dec.).
Extr. de ajenjos. . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).
D. Se dan tres ó doce al dia en la clorosis, escrófulas, amenorrea, etc.

5660. *Otras* (ANDRAL).

℞ Digital en polvo. . . ℊxij (6 dec.).
Limaduras de hierro,
Tridacio, ää. . . . . ℊxxxvj (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Clorosis. *D.* Dos ó tres píldoras al dia, aumentando la dosis.

5661. P. FERRUGINOSAS CON CANELA (*Weikard*).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Colombo en polvo. . . ℊjv (3 gr.).
Ruibarbo en polvo,
Canela en polvo, ää. . ℥ß (2 gr.).
Extracto de ajenjos. . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
I. Metrorragia asténica, poluciones nocturnas, espermatorrea. *D.* Diez á quince píldoras, tres veces al dia.

5662. P. DE IODURO DE PLOMO CRISTALIZADO (*Colterean*).

℞ Ioduro de plomo. . . . ℥ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras muy iguales.
I. Escrófulas, atrofia mesentérica, tumores escirrosos, tisis y

cánceres. *D.* Se empieza por una píldora mañana y noche, y se eleva gradualmente la dosis hasta hacer tomar de ǧxij á gxxjv (6 á 12 dec.) de ioduro al dia, teniendo cuidado durante este tiempo de mantener constantemente el vientre libre por medio de remedios apropiados, si sobreviene constipacion.

Nota. Se debe auxiliar la accion de estas píldoras con el uso tópico de la pomada crisocroma. (Véase esta palabra.)

5663. P. FERRUGINOSAS IODADAS (*Bouchardat*).

℞ Protoioduro de hierro. . 3ij (8 gr.).
Carbonato de potasa seco,
Miel. ãã. . . . . 3j (4 gr.)
Malvabisco en polvo,
Goma en polvo. ãã. . . . c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.

I. Clorosis escrofulosa. *D.* Una á diez píldoras al dia.

5664. P. FERRUGINOSAS DE TARTRATO FÉRRICO POTÁSICO (*Mialhe*).

℞ Tartrato férrico potásico. . . . . 3vj (24 gr.).
Jarabe de goma c. s.
cerca de. . . . . ǧxc (5 gr.).

Se tritura exactamente el tartrato en un mortero de hierro, se añade poco á poco el jarabe de goma, se bate hasta que se haya obtenido una masa pilular muy homogénea que deberá estar un poco dura para evitar que las píldoras pierdan su forma algun tiempo despues de preparadas. Hecho esto se harán cien píldoras, que pesarán ǧvj (3 dec.) y contendrán ǧv (25 cent.) de tartrato de potasa y hierro, es decir, mas que el doble de la cantidad de principio activo que las de Blaud y las de Vallet.

5665. P. FÉTIDAS MENORES (*Hoffmann*).

℞ Mirra,
Cáñamo, ãã. . . . . 3ijß (6 gr.).
Castóreo. . . . . ǧxv (75 cent.).
Asa fétida. . . . . ǧxij (60 cent.).
Bálsamo del Perú. . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

D. Tres por la tarde en una dosis, y despues se toma una infusion conveniente.

5666. P. FORTIFICANTES.

℞ Flores de sal amoniaco marciales,
Gálbano, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Asa fétida. . . . . 3ij (8 gr.).
Castóreo. . . . . 3j (12 dec.).
Tintura de valeriana. c. s.
H. S. A. píldoras de ǧjv (2 dec.).

I. Enfermedades nerviosas atónicas. *D.* Dos á tres píldoras mañana y noche.

5667. P. DE FOTHERGILL.

℞ Acíbar,
Escamonea,
Extr. de coloquíntida. ãã. 3j (30 gr.).
Antim. diaforét. lavado. 3j (12 dec.).
H. S. A. píldoras de ǧij (1 dec.).

I. Son purgantes y se usan en las afecciones cutáneas. *D.* Cinco á diez píldoras al dia.

5668. P. DE FOY.

℞ Asa fétida. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de lechuga. . 3ij (24 dec.).
H. S. A. ochenta píldoras.

I. Coqueluche, asma, nefritis, oftalmia, pedionalgia, histérico. *D.* Una ó dos píldoras cada hora.

5669. P. DE FULIGOCALI SULFURADO (*Deschamps*).

℞ Fuligocali sulfurado. 3v (20 gr.).
Almidon. . . . . 3ijß (10 gr.).
Goma tragacanto. . . ǧjx (50 cent.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. cien píldoras, que se cubrirán con dos ó tres capas de goma tragacanto y se guardarán en frascos.

Del mismo modo se preparan las PILDORAS DE FULIGOCALI, pero no se cubrirán con goma.

5670. P. FUNDENTES.

℞ Tártaro emético. . . gvij (35 cent.).
Castóreo,
Hojas de sen,
Ruibarbo, ãã. . . . ʒj (12 dec.).
Extr. de taraxacon. . c. s.
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Amaurosis. *D.* Cuatro á ocho píldoras dos veces al dia.

5671. *Otras* (AMMOM.).

℞ Polígala de Virginia. ƷvßÌ (22 gr.).
Extr. de taraxacon. . c. s.
H. S. A. píldoras de gijß á gjv (12 cent. á 2 dec.).
I. Hipopion, pannus, úlceras de la córnea. *D.* Seis á doce píldoras dos ó tres veces al dia.

5672. *Otras* (BURDACH).

℞ Extracto de acibar,
Protocloruro de mercurio,
Jabon medicinal, ãã. . . ƷÌj (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Afecciones escrofulosas, adenitis crónica, hepatitis, esplenitis, ictericia, prostatitis, prúrigo, beriberi, lepra, cistitis, nefritis, neuritis, neuralgias. *D.* Dos á tres píldoras por la noche.

5673. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Goma amoniaco. . . . . ƷÌj (8 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ʒj (4 gr.).
Esencia de enebro. . . . . 20 gotas.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Doce á quince píldoras al dia.

5674. *Otras* (H. DE M.).

℞ Acibar en polvo,
Sulfato de potasa pulverizado,
Ruibarbo en polvo,
Extracto de genciana,
Jabon medicinal, ãã. . . ƷÌj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Infartos crónicos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes. *D.* Tres á cuatro píldoras dos veces al dia.

5675. *Otras* (LEMONIER).

℞ Subcarbon. de hierro. ƷÌj (24 dec.).
Mirra escogida,
Goma amoniaco,
Gálbano,
Acibar sucotrino, ãã. ʒj (12 dec.).
Protocloruro de mercurio,
Oxido de antimonio hidrosulf. anar., ãã. ƷÌß (6 dec.).
Jarabe de las cinco raices. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).
I. Obstrucciones, infartos crónicos de las vísceras abdominales, esplenitis, prostatitis, hepatitis, ictericia, nefritis. *D.* Tres píldoras, mañana y noche.

5676. *Otras* (PIERQUIN).

℞ Oxido de oro. . . . . gvj (3 dec.).
Extracto de torbisco. . ƷÌij (8 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.

5677. *Otras* (PEZOLE).

℞ Etiope antimonial. 1
Extracto de cicuta. 7
Jabon de Venecia. 15
Gálbano. 2
Hiel de vaca espesada. 3
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Escirro del píloro. *D.* Ocho á diez píldoras tres veces al dia.

5678. *Otras* (RADIUS).

℞ Tártaro emético disuelto en agua. gvij á gxjv (35 á 70 cent.).
Goma amoniaco,
Ruibarbo,
Jabon medicinal,
Extracto de Valeriana, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gijß (12 cent.).
I. Amaurosis. *D.* Cuatro á ocho píldoras al dia.

5679. *Otras* (RICHTER).

℞ Goma amoniaco,
Asa fétida,

Jabon medicinal,
Raiz de valeriana,
Flores de arnica, ãã. . . 5ij (8 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado disuelto en agua, gviij á gx (4 á 5 dec.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Histérico, hepatitis crónica, esplenitis, nefritis. *D.* Cuatro píldoras cada tres ó cuatro dias.

5680. P. FUNDENTES (*Righini*).

℞ Masa de Vallet. . . . . 5jß (6 gr.).
Cloruro de bario. . . . gxviij (1 gr.).
Resina de jalapa. . . . gr jv (3 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

5681. *Otras* (ROUCHER).

℞ Goma amoniaco disuelta en vinagre escilítico. 5ß (16 gr.).
Jabon medicinal,
Extr. de saponaria, ãã. 5j (32 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . . 5ij (8 gr.).
Mercurio dulce. . . . . 5j (4 gr.).
Conserva de ênula campana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Obstruccion de las vísceras del bajo vientre, atonía del sistema general y caquexia producida por las fiebres intermitentes rebeldes. *D.* Tres ó cuatro píldoras, aumentando cada tres dias dos, hasta llegar á veinte al dia en dos ó tres tomas. Se bebe despues un vaso de suero clarificado con 5j (4 gr.) de bayas de enebro y 5j (4 gr.) de encinilla.

5682. *Otras* (SMITH).

℞ Goma amoniaco,
Jabon medicinal, ãã. . . 5jß (6 gr.).
Raiz de cebolla albarrana,
Polvo diaromaton, ãã. . 5ß (2 gr.).
Esencia de enebro. . . . 20 gotas.
Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
I. Histérico y hepatitis crónicas, esplenitis, prostatitis, nefritis, ictericias. *D.* Cuatro píldoras cada tres ó cuatro dias.
Nota. Se bebe despues 5jv (125 gr.) de cocimiento de rubia.

5683. *Otras* (VICQ D'AZIR).

℞ Extracto de bilis de buey desecado,
Extracto de centaura menor, ãã. . . . . 5iij (12 gr.).
Corteza de Winter,
Oxido negro de hierro, ãã. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.)
I. Obstrucciones. *D.* Cuatro ó seis píldoras al dia.

5684. P. FUNDENTES ALOÉTICAS (*Recamier*).

℞ Acíbar. . . . . gjx (50 cent.).
Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Azafran. . . . . 5ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . 5j (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . 5j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . 5iij (12 gr.).
H. S. A. píldoras de giij ó gjv (15 ó 20 cent.).
I. Hidropesía, ictericia, hepatitis crónica, esplenitis. *D.* Cuatro á cinco píldoras tres veces al dia, y puede aumentarse la dosis segun los casos.

5685. P. FUNDENTES AMONIACALES.

℞ Sal amoniaco. . . . . 5ß (2 gr.).
Asa fétida. . . . . gxviij (1 gr.).
Acíbar. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de cicuta. . . 9ij (24 dec.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Infartos de las vísceras abdominales, clorosis, hepatitis crónica, hipertrofia del hígado, esplenitis crónica, nefritis. *D.* Cuatro á seis píldoras al dia.

5686. P. FUNDENTES DE DIGITAL.

℞ Hojas de digital. . . . 5j (4 gr.).
Extracto de cicuta,
Extracto de ruibarbo,
Extracto de acíbar,
Goma amoniaco, ãã. . . 5ß (2 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
I. Hipertrofia del hígado, ascitis, hidrotorax, hidropericardias,

hidroraquis, flebitis, tétanos, neumonía, hepatitis, coqueluche, pica. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5687. P. FUNDENTES GOMOSAS.

℞ Goma amoniaco,
Escila . ãã. . . . . 3ß (2 gr.).
Asa fétida,
Azafran, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Acíbar. . . . . gjx (50 cent.).
Jabon medicinal. . . gxc (5 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

I. Obstrucciones de las vísceras abdominales. esplenitis, hepatitis, clorosis, catarro pulmonar. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5688. P. FUNDENTES OPIADAS (*Dupuytren*).

℞ Bicloruro de mercur. gj (5 cent.).
Extracto de opio. . . . gvj (30 cent.).
Extracto de guayaco. 9j (12 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

I. Orquítis crónica, tumores glandulares. *D.* Una píldora, tres veces al dia.

5689. P. FUNDENTES DE TREMENTINA.

℞ Trementina. . . . . 3ß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de taraxacon. gxc (5 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Cálculos biliarios, obstrucciones de las vísceras abdominales, reumatismo, cálculos, catarro úlero vaginal, cistitis, nefritis crónica, hepatitis crónica. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5690. P. DE GÁLBANO COMPUESTAS, DE MURRAY (F. DE L.).

℞ Gálbano. . . . . 3j (30 gr.).
Mirra,
Sagapeno, ãã. . . . . 3jß (15 gr.).
Asa fétida. . . . . 3ß (7 5 gr.).

Se tritura estas sustancias con cantidad suficiente de jarabe simple y se hacen píldoras de gjv (2 dec.).

I. Histérico complicado con amenorrea. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5691. *Otras* (FOY).

℞ Asa fétida,
Gálbano,
Valeriana, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Mirra. . . . . 3ß (2 gr.).
Jarabe de artemisa. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Histérico, amenorrea, iritis. *D.* Seis píldoras al dia.

5692. P. DE GENCIANINO.

℞ Gencianino. . . . . giij (15 cent.).
Ferrocian. de quinina. gjv (20 cent.).
Conserva de rosas,
Polvo de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras.

I. Calenturas intermitentes, beriberi. *D.* Una píldora cada hora.

5693. *Otras*, n. 2.

℞ Gencianino. . . . . giij (15 cent.).
Conserva de rosas,
Polvo de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras. *D.* Una de hora en hora.

5694. P. DE GOMA AMONIACO.

℞ Goma amoniaco en polvo. 3j (4 gr.).
Jarabe de goma. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.

Comunmente se añade á estas píldoras azúcar, azufre, azufre dorado de antimonio, jabon, cicuta y opio.

5695. *Otras*, n. 2.

℞ Goma amoniaco. . . . . 3j (4 gr.).
Cebolla albar. en polvo. 9j (12 dec.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Facilitan la expectoracion en los catarros pulmonares crónicos. A grandes dosis obran como purgantes. *D.* Cuatro á cinco píldoras al dia.

5696. P. DE GOMA AMONIACO BALSAMICAS *ó Píldoras balsámicas* (F. E.).

℞ Milpiés preparados. . . 5vj (24 gr.).
Goma amoniaco. . . . . 5iij (12 gr.).
Acido benzóico. . . . . 9jv (5 gr.).
Azafran,
Bals. negro del Perú, ää. 9j (12 dec.).
Aceite de trementina sulforado, c. s.
H. S. A. píldoras.

5697. P. DE GOMA AMONIACO JABONOSAS.

℞ Amoniaco. 1
Ruibarbo. 1
Jabon medicinal. 1
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

5698. P. DE GOMA AMONIACO Y MIRRA.

℞ Goma amoniaco,
Mirra, ää. . . . . 5ij (8 gr.).
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras,
D. Dos á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5699. P. DE GOMA FÉTIDAS (F. P.).

℞ Asa fétida. 8
Gálbano. 8
Mirra. 8
Aceite de sucino. 1
Jarabe simple. . . . . c. s.
I. Son desobstruentes, y se las ha aconsejado en la amenorrea. *D.* 9j (12 dec.) dos veces al dia.

5700. P. DE GOMA QUINO.

℞ Goma quino. . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gjx (50 cent.).
Opio. . . . . gxvij (1,20 gr.).
Oxido de zinc. . . . gjx (50 cent.).
Tormentila en polvo. gxviij (1 gr.).
Bálsamo del Canadá, c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Diabetes, cardialgia, disentería, diarrea crónica, gastrorragia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5701. P. DE GOMA QUINO FERRUGINOSAS (*Most*).

℞ Sulfato de hierro,
Mirra,
Goma quino, ää. . . . . 5ij (8 gr.).
Extracto de marrubio blanco. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Leucorrea inveterada. *D.* Cuatro á ocho píldoras, tres veces al dia.

5702. P. GOMO-RESINOSAS.

℞ Gálbano. . . . . 5j (4 gr.).
Mirra . . . . . 5jß (6 gr.).
Sagapeno. . . . . 5jß (6 gr.).
Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Tres ó cuatro píldoras al dia.

5703. P. GOMOSAS DE PLENCK (F. P.)

℞ Mercurio purificado. . . 5j (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . 5iij (12 gr.).
Jar. de achicorias comp. c. s.
Miga de pan. . . . . 5j (32 gr.).
H. S. A. píldoras.
D. 9ß á 9j (6 á 12 dec.).

5704. P. DE GRAHAM.

℞ Sulfato de zinc,
Trementina, ää. . . . gtjv (3 gr.).
Magnesia. . . . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Blenorragia y leucorrea rebeldes. *D.* Tres píldoras al dia.

5705. P. DE GRIFFITH *ó Píldoras de hierro compuestas.*

℞ Mirra. . . . . 5ij (8 gr.).
Carbonato de sosa,
Sulfato de hierro,
Melote, ää. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Los ingleses las elogian en la tisis tuberculosa. Son análogas á las de Blaud y Vallet.

5706. P. DE GROETZNER.

℞ Cloruro de oro y sodio. gjv (2 dec.).

Agua. . . . . c. s.
Se disuelve y se añade:
Extracto de dulcamara. 3j (4 gr.).
Extracto de acónito. . . 3ß (6 dec.)
Malvabisco. . . . . c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Sífilis, incontinencia de orina, herpes corrosivos, enuresis, hipocondría. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5707. P. DE GUTAGAMBA.

℞ Gutagamba. . . . . ℈v (5 dec.).
Canela,
Gengibre, ää. . . . . ℈jv (2 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una cada cuarto de hora hasta promover deposiciones de vientre.

5708. P. DE GUTAGAMBA COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Gutagamba. . . . . 3j (4 gr.).
Acíbar en polvo. . . . 3jß (6 gr.)
Gengibre en polvo. . . . 3ß (2 gr.)
Jabon. . . . . 3ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Dos á seis píldoras al dia como purgantes.

5709. P. DE HAHNEMANN *ó Píldoras mercuriales de Hahnemann.*

℞ Merc. de Hahnemann. gviij (4 dec.).
Extracto de regaliz. . 3ij (8 gr.).
H. S. A. sesenta y cuatro píldoras, de las cuales cada una contiene un octavo de grano de mercurio soluble.
I. Enfermedades sifilíticas. *D.* De una á ocho píldoras al dia.

5710. P. DE HELMENSTREIT.

℞ Iodo. . . . . ℈vij (35 cent.).
Extracto de genciana. 3j (4 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Salivacion escorbútica ó mercurial. *D.* Tres píldoras cuatro veces al dia.

5711. P. DE HESSER.

℞ Extracto de acónito.
Polvo de acónito,
Sulfuro de cal, ää. . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Enfermedades de la piel. *D.* Tres, seis, nueve y doce píldoras al dia, segun los efectos narcóticos.

5712. P. HIDRAGOGAS.

℞ Asa fétida.
Cebolla albarrana en polvo, ää. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de coloquintida compuesto.
Polvo de digital, ää. . gxviij (1 gr.).
H. S. A. veinte píldoras. Se dan dos cada tres horas en los infartos linfáticos y en las hidropesías sintomáticas. Es un remedio enérgico y muy eficaz.

5713. P. HIDRAGOGAS *ó Píldoras de Boncio* (F. F.).

℞ Acíbar,
Gutagamba,
Goma amoniaco, ää. 3j (32 gr.).
Vinagre blanco. . . . 3vj (192 gr.).
Se interpone al fuego las gomo-resinas y el acíbar en la mitad del vinagre, se cuela con expresion, se echa el resto del vinagre sobre el residuo, se vuelve á calentar y se cuela; se reunen los líquidos colados y se los evapora en el baño maría hasta la consistencia de píldoras.
I. Se usan como purgantes ó hidragogas en el tratamiento de la hidropesía. Se hacen píldoras de gjv (2 dec.). *D.* Tres á seis píldoras al dia.

5714. P. HIDRAGOGAS (F. DE L.).

℞ Cebolla albarrana en polvo,
Extr. de coloquint., ää. 5ijß (10 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
I. Son purgantes y diuréticas. *D.* Una mañana y noche, aumentando progresivamente

P. **5715.** HIDRAGOGAS (*Hein*).

℞ Gutagamba,
Digital,
Escila,
Azufre dorado de antimonio,
Extr. de saxifraga, ää. gr xviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Hidropesías, ascitis, metrorragia. *D.* Una píldora cada dos horas.

5716. *Otras* (JANIN DE LION).

℞ Agua comun. . . . . lbvj (3000 gr.).
Jalapa,
Ámbar sucotrino,
Sen, ää. . . . . lbj (500 gr.).
Carbonato de hierro,
Nitrato de potasa, ää. lbß (250 gr.).
Agárico,
Mechoacan,
Ruibarbo,
Escamonea,
Raices de brionia,
Hermodáctilos, ää. . ℥vj (192 gr.).
Sulf. negro de merc. ℥v (160 gr.).
Acido tartárico. . . . ℥ij (64 gr.).
Turbit gomoso,
Gutagamba,
Trociscos de Alhandal,
Protocloruro de mercurio,
Tártaro emético, ää. ℥ij (64 gr.).

Se hierve el sen y el ácido tartárico en las lbvj (3000 gr.) de agua durante un cuarto de hora, se cuela despues con fuerte expresion, se pone el líquido en una olla de hierro que se coloca sobre el fuego, se añaden poco á poco las demás sustancias, que deberán estar porfirizadas, y se mezclan exactamente; se agita esta mezcla sin interrupcion y se la deja á fuego lento hasta que haya adquirido la consistencia de píldoras, se aparta la olla de encima del fuego y se divide la masa en píldoras del peso de gjv (2 dec.). Se las hace rodar en polvos de jalapa y se las deja secar.

D. Estas píldoras muy purgantes se dan primero en número de cuatro, y se aumentan despues hasta que produzcan el efecto. Por otra parte, la dosis debe ser relativa á la edad y al temperamento del enfermo.

5717. *Otras* (SPIELMANN).

℞ Semillas de Tilly,
Gutagamba,
Escamonea, ää. . . . . ℥ß (16 gr.).
Jalapa,
Ruibarbo, ää . . . . . ℥ij (8 gr.).
Macis. . . . . ℥j (4 gr.).
Arrope de saúco. . . . . ℥ß (2 gr.).
Háganse píldoras S. A.
D. gxviij (1 gr.).

5718. P. HIDRAGOGAS CONTRA LA ASCITIS.

℞ Escamonea de Alepo. . . ℥ß (6 gr.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . . ℥j (4 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
D. Una á dos píldoras, dos veces al dia.

5719. P. HIDRAGOGO-FERRUGINOSAS (*Collier*).

℞ Mercurio. . . . . gxxxvj (2 gr.).
Sexquióxido de hierr. gxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . gtjv (3 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Afecciones sifilíticas en individuos cloróticos, anémicos ó escrofulosos.

5720. P. HIDRAGOGAS *ó Píldoras escilíticas compuestas* (F. P.).

℞ Escila en polvo. 4
Sulfuro amarillo de antimonio. . 2
Acido sucínico. 2
Extr. de coloquíntida compuesto. 3
Esencia de anís. . . . . c. s.
Háganse píldoras S. A.
I. Hidropesías pasivas. *D.* gv á gx (25 á 50 cent.).

5721. P. DE HIEL DE VACA.

℞ Hiel de vaca espesada,
Extracto de genciana,
Ruibarbo, ää. . . . . gxc (3 gr.).

Subcarbon. de hierro. 5ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).
I. Dispepsia, hipocondria, helmintiasis. *D.* Tres á seis píldoras mañana y noche.

5722. P. DE HIERRO (SWEDIAUR).

℞ Oxido negro de hierro. . . . c. s. q.
Extracto de ajenjos. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).

5723. P. DE HIERRO ALOÉTICAS.

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . 5jv (16 gr.).
Canela en polvo. . . . 5ij (8 gr.).
Acíbar sucotrino. . . 5j (4 gr.).
Jarabe de artemisa. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
D. Dos á diez píldoras al dia.

5724. P. DE HIERRO COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Sulfato de hierro,
Subcarbonato de sosa,
Azúcar, ää. . . . . 5j (4 gr.).
Mirra en polvo. . . . . 5ij (8 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Amenorrea, clorosis. *D.* Se dan de dos á seis al dia.

5725. *Otras* (F. P.).

℞ Hierro preparado. 4
Mirra en polvo. 2
Polvos aromáticos. 1
Jarabe simple. . . . . c. s.
Háganse píldoras S. A.
I. Clorosis. *D.* 5ß (2 gr.).

5726. P. DE HINOJO ACUÁTICO (*Rhothe*).

℞ Semillas de hinojo. . . 5iij (12 gr.).
Extracto de cardo santo. 5ij (8 gr.).
Sal amoniaco. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Se usan como calmantes en la tos catarral, histérico. *D.* Seis á ocho píldoras, cuatro veces al dia.

5727. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO (*Boudet*).

℞ Iodo. 5
Limaduras de hierro. 15
Agua destilada. 25
Se prepara como la solucion oficinal, despues se filtra y se vierte en una cuchara de hierro sin estañar; se añade despues:
Miel de Narbona. 20
Se evapora rápidamente hasta la consistencia de jarabe claro y entonces se añade:
Goma tragacanto en polvo. . . . 12
Se divide la masa en píldoras de cuatro y medio granos.
Como es muy difícil dividir en píldoras esta masa, se prefiere la fórmula siguiente:
Solucion oficinal de protoioduro de hierro. . . 5j 30 gr.
Se reduce á la mitad por la evaporacion en una cuchara de hierro y se añade:
Miel. . . . . 5jß (10 gr.).
Se mezcla, se vierte todo en un mortero y se añade:
Malvabisco en polvo. . . . . c. s.
para obtener una masa firme que se dividirá en cien píldoras, que se cubrirán como á la grajea y se guardarán en un frasco. Cada píldora contendrá gij (1 dec.) de protoioduro de hierro.
I. Son eficaces en la sífilis constitucional, afecciones escrofulosas, tuberculosas ó cloróticas. *D.* Cuatro píldoras y se puede elevar la dosis hasta veinte al dia.

5728. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO DE DUPASQUIER (F. P.).

℞ Iodo. . . . . 5ij (8 gr.).
Limaduras de hierro. . 5jv (16 gr.).
Agua destilada. . . . . 5vj (24 gr.).
Se prepara como la solucion normal, despues se filtra, se echa en una cuchara de hierro y se añade:
Miel hirviendo. . . . . 5v 20 gr.

Se evapora rápidamente hasta que se disipe gran parte del agua del protoioduro, es decir, hasta que la mezcla adquiera la densidad de un jarabe algo claro; se añade despues poco á poco, y agitando continuamente el jarabe con una espátula,

Goma tragac. en polvo. 5iij (12 gr.).

Se procede como se acaba de indicar y se obtiene una masa de consistencia conveniente que se divide en doscientas píldoras, pesando cada una gjv (2 dec.) poco mas ó menos.

I. Clorosis. *D.* Una píldora, aumentando diariamente hasta llegar á ocho ó diez, en cuyo caso se acostumbra disminuir en la misma proporcion que se aumentó.

Estas píldoras suelen producir dolores de vientre, en cuyo caso no se aumentará la dosis.

5729. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO (*Calloud*).

℞ Sulfato de hierro cristalizado. . .	16
Ioduro de potasio.	21
Goma tragacanto.	3
Azúcar.	10
Jarabe,	
Malvabisco en polvo, ää.	c. s.

H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).

Se reduce á polvo fino el sulfato de hierro, despues el ioduro de potasio, se tritura la mezcla para facilitar la reaccion de las dos sales, se añade la goma, el azúcar, el jarabe y c. s. de polvo de malvabisco.

5730. P. DE PROTOIODURO DE HIERRO Y GUAYACO (*Biett*).

℞ Protoioduro de mercurio. 5B (2 gr.).	
Extracto de guayaco. . 5j (4 gr.).	
Tridacio. . . . . gij (3 gr.).	
Jarabe ó polvo de zarzaparrilla, c. s.	

H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Sifílides. *D.* Una píldora y despues dos al dia.

5731. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (*Magendie*).

℞ Deutoioduro de merc. gj (5 cent.).	
Extracto de enebro. gxij (60 cent.).	
Polvo de regaliz. . . c. s.	

H. S. A. ocho píldoras.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Dos píldoras mañana y noche, al principio, y despues se duplica la dosis. Cada píldora contiene ½ de grano de ioduro.

5732. *Otras* (BIETT).

℞ Protoioduro de merc. 9B (6 dec.).	
Tridacio. . . . . 9ij (24 dec.).	

H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

D. Se dan de una á cuatro píldoras en la sifílides.

5733. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO.

℞ Protoioduro de merc. gx (5 dec.).	
Tridacio. . . . . gxxx (15 dec.).	

H. S. A. veinte píldoras.

D. Se da primero una y despues dos cada veinticuatro horas.

5734. *Otras*, n. 2.

℞ Protoioduro de merc. gjv (50 cent.).	
Rob de saúco. . . . gxxxvj (2 gr.).	
Regaliz en polvo. . . c. s.	

H. S. A. cincuenta píldoras.

D. Una por la mañana y otra por la noche.

5735. *Otras* (MAGENDIE).

℞ Protoioduro de merc. gj (5 cent.).	
Extracto de regaliz. gxij (60 cent.).	
Polvo de regaliz. . . c. s.	

H. S. A. doce píldoras.

I. Afecciones escrofulosas complicadas con sífilis ó infartos de los ganglios. *D.* Una píldora al dia.

5736. P. DE DEUTOIODURO IODURADO DE MERCURIO (*Gibert*).

℞ Bioduro de mercurio. gij (1 dec.).	

Ioduro de potasio. . . ǧvc (5 gr.)
Goma aráb. en polvo. ǧjx (50 cent.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

D. Dos píldoras, tomadas por la mañana en ayunas, representan las dosis medicinales contenidas en ʒvj (24 gr.) del jarabe de deutoioduro iodurado de mercurio de Gibert y de Boutigni.

5737. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO.

℞ Deutoioduro de merc. ǧvj (3 dec.).
Almidon. . . . . ℈j (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Una ó dos al dia.

5738. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (H. DE M.).

℞ Protoioduro de merc. ǧj (5 cent.).
Extracto de bayas de enebro. . . . . ǧxij (60 cent.).
H. S. A. ocho píldoras.

I. Enfermedades sifilíticas complicadas con escrófulas. *D.* Dos píldoras mañana y noche; mas adelante se puede duplicar la dosis.

5739. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (*Biett*).

℞ Protoioduro de mercurio,
Malvabisco en polvo, ää. ʒj (4 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.

Cada una contiene ǧj (5 cent.) de protoioduro.

I. Sifílides. *D.* Una píldora al dia.

5740. *Otras* (LUGOL).

℞ Protoioduro de merc. ǧvj (3 dec.).
Almidon en polvo. . . ℈j (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Sífilis constitucional, sifílides, escrófulas. *D.* Una á dos píldoras al dia.

5741. *Otras* (RICORD).

℞ Protoioduro de merc. ǧvj (3 dec.).
Tridacio. . . . . ǧvj (3 dec.).
Extracto de opio. . . . ǧj'ʒ (6 cent.).
Extracto de cicuta. . ℈ß (6 dec.).
H. S. A. seis ó doce píldoras.

Se administran á la dosis de una píldora, que se aumenta ó disminuye segun los efectos que se observan, la susceptibilidad del enfermo, etc.

5742. *Otras* (RICORD).

℞ Protoioduro de mercurio,
Tridacio, ää. . . . . ʒß (2 gr.).
Extr. gomoso de opio. ǧjx (50 cent.).
Extracto de guayaco. ʒj (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

D. Una, cinco horas despues de comer.

5743. *Otras* (RICORD).

℞ Protoioduro de mercurio,
Tridacio,
Polvo de hojas de belladona, ää. . . . . ǧLjv (3 gr.).
Extracto tebáico. . . . ǧxviij (1 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Iritis sifilítica.

5744. *Otras* (VELPEAU).

℞ Protoioduro de mercur. ǧjv (2 dec.).
Tridacio. . . . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. veinte píldoras iguales.

D. Una, mañana y noche. El tratamiento dura dos meses.

5745. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO OPIADAS (*Velpeau*).

℞ Protoioduro de mercurio,
Extracto de opio, ää. ǧviij (1 gr.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.

Cada una contiene ǧ'/₇₂ (12 mil.) de ioduro é igual cantidad de extracto tebáico.

I. Sífilis. *D.* Una píldora y despues dos al dia durante un mes.

5746. P. DE PROTONITRATO DE MERCÚRIO (*Santa María*).

℞ Protonitrato de mercurio cristalizado. . ᵍx (5 dec.).
Extracto de regaliz. ᵍxl (2 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Sífilides y ciertas afecciones cutáneas. *D.* Cuatro á cinco píldoras al dia.

5747. P. HISTÉRICAS (F. M.).

℞ Goma opoponaco. . . . ℥j (32 gr.).
Goma amoniaco,
Goma gálbano,
Goma sagapeno, ãã. . ʒß (16 gr.).
Mirra. . . . . ʒij (8 gr.).
Asa fétida,
Castóreo, ãã. . . . . ʒiij (12 gr.).
Aceite de sucino. . . . ℨj (12 dec.).
Triaca. . . . . c. s.
H. S. A. masa de píldoras.
I. Histérico y amenorrea. *D.* De ℨß á ℨij (6 á 24 dec.).

5748. P. DE HOOPER.

℞ Sulfato de hierro,
Agua, ãã. . . . . lbß (250 gr.).
Se disuelve y se añade:
Acíbar. . . . . lbij (1000 gr.).
Canela blanca. . . . . ℥vj (180 gr.).
Mirra. . . . . ℥ij (60 gr.).
Opoponaco. . . . . ʒß (15 gr.).
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Son muy útiles en la clorosis y en la amenorrea.

5749. P. INCISIVAS (*Cadet*).

℞ Manteca de cacao. . ℥j (32 gr.).
Escila en polvo. . . . ℥ß (16 gr.).
Ipecacuana. . . . . ʒij (8 gr.).
Extr. acuoso de opio. ᵍxv (75 cent.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Asma, romadizos y catarro pulmonar crónico, los seca y repelede, los espasmodica. *D.* Dos píldoras, tres veces al dia.

5750. *Otras* (J. J. LEROUX).

℞ Cebolla alb. en polvo. ʒj 4 gr.).
Quermes mineral. . . ᵍviij (4 dec.).
Extr. acuoso de opio. ᵍvj (3 dec.).
Manteca de cacao. . . c. s
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Afecciones catarrales. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5751. P. INCISIVAS EXPECTORANTES.

℞ Escila en polvo,
Ipecacuana, ãã. . . . . ʒijß (10 gr.).
Extracto de belladona. ʒß (2 gr.).
Manteca de cacao. . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de á ᵍiij (15 cent.).
I. Catarros crónicos. *D.* Una píldora mañana y noche.

5752. P. INCISIVAS PECTORALES (*Buchan*).

℞ Cebolla de escila fresca,
Goma amoniaco,
Sem. de cardamomo, ãã. ʒij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).
I. Tisis incipiente. *D.* Tres ó cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5753. P. INMORTALES.

℞ Acíbar. . . . . ʒj (4 gr.).
Jalapa. . . . . ʒij (8 gr.).
Emético. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Una á dos al dia.

5754. P. IODADAS.

℞ Iodo. . . . . ᵍvj (3 dec.).
Extracto de genciana. ʒj (4 gr.).
Rob de saúco. . . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Caquexia, amenorrea, sífilides, blenorrea, esplenitis, catarro útero-vaginal, glositis, metritis, lupus. *D.* Seis píldoras, mañana y noche.

5755. P. DE IODURO DE HIERRO Y QUININA (*Bouchardat*).

℞ Protoioduro de hierro. ʒjß (6 gr.)

Sulfato de quinina. . . gxviij (1 gr.).
Miel. . . . . 5j (4 gr.).
Regaliz en polvo. . . . c. s.

H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Clorosis, escrófulas, efidrosis, lepra, lupus, amenorrea, anemia, esplenitis, convulsiones, calenturas intermitentes rebeldes, pénfigo, sudor inglés, bulimia, cefalalgia, congestiones, geroftalmia. *D.* Se toman de dos á seis al dia en la clorosis, y de doce á diez y ocho en tres tomas con una hora de intervalo en las fiebres intermitentes.

5756. P. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO (*Mialhe*).

℞ Ioduro de potasio,
Protoiod. de merc., ãã. gvj (3 dec.).
Se tritura y se añade:
Extracto de opio. . . . gxij (6 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras que se cubrirán con gelatina.

I. Herpes rebeldes, infartos escrofulosos, sifílides, sífilis, úlcera venérea. *D.* Dos ó tres píldoras aumentando dos todos los dias.

5757. P. DE IODHIDRATO DE POTASA (P. P.).

℞ Iodhidrato de potasa. 5
Agua destilada. 6
Pan. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras que contengan gj (5 cent.) de la sal.

I. Escrófulas, leucorrea, tumores blancos, bocio.

5758. P. DE IODURO DE HIERRO (*Bouchardat*).

℞ Iodo. . . . . 5xx (80 gr.).
Hierro, un exceso,
cerca de. . . . . 5x (40 gr.).
Agua. . . . . 5xxv (100 gr.).

Se deja digerir á una temperatura de 60° hasta que los líquidos no tengan color, se decanta y entonces se evapora rápidamente en un mortero de hierro. Cuando casi se haya disipado el agua se añade:

Miel. . . . . 5xijß (50 gr.).
Goma en polvo,
Malvabisco en polvo, ãã. . . . c. s.

H. S. A. mil píldoras. Cada una contendrá cerca de gij (1 dec.) de protoioduro de hierro.

D. Cuatro píldoras al dia, aumentando progresivamente hasta veinte ó treinta.

5759. P. DE IODO (H. DE M.).

℞ Iodo. . . . . gj (5 cent.
Regaliz en polvo. . . . 9j (12 dec.
Arrope de saúco. . . . c. s.

H. S. A. doce píldoras.

I. Escrófulas, bocio, leucorrea crónica, infartos de los testículos, amenorrea. *D.* Se principia por una y se aumenta progresivamente.

5760. P. DE IODURO DE HIERRO (*Piedagnel*).

℞ Ioduro de hierro. . . . . c. s. q.
Extracto de genciana. . . . . c. s.

para hacer píldoras de gjv (2 dec.) que deben conservarse en un frasco bien tapado.

I. Exóstosis, perióstosis, etc. *D.* Dos píldoras, aumentando progresivamente de dos hasta treinta al dia. Despues se suspende la administracion durante quince dias, y se vuelve á empezar por dos, cuatro, seis, etc., hasta treinta. Ordinariamente bastan estos dos tratamientos.

Piedagnel administra al mismo tiempo el agua iodada para bebida, y se hacen fricciones con pomada hidriodatada.

5761. P. IODO-ARGÉNTICAS (*Mialhe*).

℞ Nitrato de plata crist. gxviij (1 gr.).
Ioduro de potasio. . . 5ß (2 gr.).
Almidon. . . . . gxjv (3 gr.).
Goma aráb. en polvo. gxviij (1 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras plateadas.

5762. P. DE IODURO DE HIERRO *ó Píldoras emenagogas de Lugol.*

℞ Protoioduro de hierro. gvj (3 dec.).
Almidon. . . . . ʒj (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
Se guardarán en un frasco bien tapado, porque se descomponen.

5763. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE ESTRICNINA.

℞ Ioduro de iodhidrato de estricnina. . . . . gvj (3 dec.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Una píldora al dia, aumentando sucesivamente la dosis.

5764. P. DE IODOFORMO (*Bouchardat*).

℞ Iodoformo. . . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de ajenjos. . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
I. Afecciones escrofulosas, infartos linfáticos, bocio y amenorrea. *D.* Tres píldoras al dia.

5765. P. DE IODHIDRARGIRATO DE MERCURIO Y POTASIO (*Puche, Mialhe*).

℞ Bíioduro de mercurio.
Ioduro de potasio, ää. gviij (4 dec.).
Azúcar de leche. . . . gr.jv (3 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. treinta y dos píldoras.
D. Se usan de una á ocho al dia en el tratamiento de las afecciones sifilíticas constitucionales, simples ó complicadas con escrófulas, sífilides, corea, coqueluche, flebitis, úlceras venéreas.

5766. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE QUININA (*Bouchardat*).

℞ Ioduro de iodhidrato de quinina. . . . . gxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. nueve píldoras.
I. Escrófulas, anemia, sudor inglés, cefalalgia, calenturas intermitentes rebeldes, convulsiones, amenorrea, clorosis, efidrosis, bocio, flebitis. *D.* Tres píldoras al dia con media hora de intervalo.

5767. P. DE IODURO DE ARSÉNICO (*Thompson*).

℞ Ioduro de arsénico. . gj (5 cent.).
Extracto de cicuta. . gxviij (1 gr.).
H. S. A. diez píldoras.
I. Cáncer de los pechos, lepra, impétigo, úlceras corrosivas, liquen, soriasis. *D.* Una píldora cada ocho horas.

5768. P. DE IODURO DE MERCURIO (F. P.).

℞ Protoioduro de mercurio. 12
Tridacio. 16
Extracto de guayaco. 24
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
I. Albuminuria, sífilis, sífilides, infartos escrofulosos. *D.* Se empieza por una píldora.

5769. P. DE IODURO DE CLORURO MERCURIOSO (*Boutigny*).

℞ Ioduro de cloruro mercurioso. . . . . gv (25 cent.
Goma arábiga. . . . gxviij (1 gr.).
Miga de pan. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua de flor de nar. c. s.
H. S. A. cien píldoras.
I. Afecciones escrofulosas.

5770. P. DE IODURO DE MERCURIO (F. DE L.).

℞ Ioduro de mercurio. . ʒj (4 gr.)
Confeccion de cinosb. ʒiij (12 gr.).
Gengibre en polvo. . . ʒj (4 gr.).
Se machacan todos hasta que se incorporen.

5771. P. DE IODURO DE MERCURIO Y QUININA.

℞ Ioduro de mercurio y quinina. . . . . gvj (15 cent.).

Opio en polvo. . . . ᵹ½ (2 cent.).
H. S. A. sesenta píldoras.
I. Lupus. *D.* Se toman en seis dosis en dos dias.

5772. P. DE IODURO DE MERCURIO Y MORFINA (*Bouchardat*).

℞ Ioduro de mercurio y morfina. . . . . ᵹxviij (1 gr.).
Polvo de regaliz. . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
D. Se toma una por la tarde en la sífilis constitucional. Se elevará sucesivamente la dosis para combatir los dolores nocturnos y la sifílides.

5773. P. DE IODURO DE HIERRO.

℞ Ioduro de hierro. . . ᵹjx (50 cent.).
Conserva de rosas. . ᵹxviij (1 gr.).
Goma arábiga. . . . ᵹxij (6 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Escrófulas, lepra, elefantiasis, hipertrofia, pica, lupus, pénfigo. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5774. P. DE IODURO DE PLATA (*Patterson*).

℞ Ioduro de plata. . . . . ᵹjv (2 dec.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
I. Gastralgia y sifílides.
El ioduro de plata no tiene el inconveniente de dar color á la piel como el nitrato de plata.

5775. P. DE IODURO DE POTASIO.

℞ Ioduro de potasio. . ᵹjx (50 cent.).
Agua destilada. . . . c. s.
Esponja tostada,
Extr. de dulcam., ãã. ʒijß (10 gr.).
H. S. A. cien píldoras.
I. Tétanos, escrófulas, bocio, histérico, neuralgias, artrocace, tumor blanco, leucorrea, sifílides, reumatismo, bulimia, dolores osteocopos, lepra. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

5776. *Otras* (PIERQUIN).

℞ Ioduro de potasio. . . ʒijß (10 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒiij (12 gr.).
Miga de pan. . . . . c. s.
H. S. A. ciento cincuenta píldoras.
I. Bocio y tumores blancos *D.* Dos píldoras, mañana y noche.

5777. P. DE IODURO DE ZINC Y ESTRICNINA (*Bouchardat*).

℞ Ioduro de zinc y estricnina. . . . . ᵹij (1 dec.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
D. Se toma una al día y se aumenta progresivamente la dosis.

5778. P. DE IODURO DE ZINC Y AMONIACO CON BELLADONA.

℞ Ioduro de zinc y amoniaco,
Extracto de belladona, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. ochenta píldoras.
I. Corea, epilepsia. *D.* Una por la mañana, despues una por la noche, despues dos mañana y noche, y finalmente tres mañana y noche.

5779. P. DE IODURO DE ZINC Y MORFINA.

℞ Ioduro de zinc y morfina. . . . . ᵹij (1 dec.).
Polvo de malvabisco. ᵹxx (10 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. ocho píldoras.
D. Se toman una ó dos al dia contra las gastralgias y demás afecciones nerviosas.

5780. P. DE IPECACUANA, CALOMELANOS Y OPIO (*Ellis*).

℞ Calomelanos. . . . ᵹxviij (1 gr.).
Opio. . . . . ᵹv (25 cent.).
Ipecacuana. . . . . ᵹjx (50 cent.).
H. S. A. ocho píldoras.
I. Disenteria. *D.* Una píldora cada hora ó cada dos horas.

5781. P. DE IPECACUANA COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Polvo de ipecacuana compuesto. . . . . ʒiij (96 gr.).
Escila recien seca.
Goma amoniaco, ãã. . ʒj (4 gr.).
Mistura de goma arábiga . . . . c. s.
Se machaca hasta que se incorporen.

5782. P. DE IPECACUANA Y OPIO.

℞ Polvos de Dower. . . ℊ.jv (3 gr.).
Conserva de rosas. . . gxviij (4 gr.).
H. S. A. *pildoras* de gjv (2 dec.).

5783. P. DE JABON (F. F.).

℞ Jabon medicinal. . . . ʒjv (125 gr.).
Polvo de malvabisco. ʒß (16 gr.).
Nitrato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Se contunde el jabon en un mortero de mármol, se añade las demás sustancias y se continúa contundiendo todo hasta que resulte una masa homogénea, de la cual se hacen pildoras de gjv (2 dec.) que se envuelven en polvo de almidon.

I. Se considera á estas pildoras como fundentes, y por consiguiente se usan contra los infartos abdominales. Tambien se emplean como diuréticas en las afecciones de los riñones y sobre todo en la nefritis calculosa. *D.* Se empieza por dos pildoras al dia y se aumenta sucesivamente.

5784. P. DE JABON ALOÉTICAS (H. M. F.).

℞ Jabon amigdalino. . . . ʒj (4 gr.).
Acíbar sucorino en p. ℊv (5 dec.).
Aceite. . . . . c. s.
H. S. A. diez pildoras iguales.
I. Son fundentes y resolutivas.

5785. P. DE JABON COMPUESTAS.

℞ Calomelanos,
Resina de jalapa,
Jabon medicinal, ãã. . ʒj (4 gr.).
H. S. A. pildoras de gjv (2 dec.).
D. Dos pildoras cada media hora hasta producir deposiciones de vientre.

5786. P. DE JABON COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Opio puro en polvo. . ʒß (15 gr.).
Jabon. . . . . ʒij (60 gr.).
H. S. A.

5787. P. DE JABON ESTIBIADAS.

℞ Jabon estibiado,
Res. de guayaco, ãã. ʒj (4 gr.).
Extracto de acónito. gjx (50 cent.).
H. S. A. pildoras de giij (15 cent.).
I. Gota, reumatismo, albuminuria, cáncer. *D.* Seis pildoras, dos veces al dia.

5788. P. JABONOSAS (*Buchan*).

℞ Jabon blanco. . . . . ʒjß (6 gr.).
Sagapeno. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de taraxacon. ʒij (8 gr.).
Acíbar. . . . . ℊxviij (4 gr.).
H. S. A. pildoras de gij (1 dec.).
I. Estreñimiento, embarazo de las primeras vias, gastralgia, neumatosis, ictericia. *D.* Dos á cinco pildoras mañana y noche.

5789. *Otras* (H. DE M.).

℞ Jabon medicinal. . . . . ʒij (8 gr.).
Polvos de acíbar,
Polvos de ruibarbo, ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. pildoras de gij (1 dec.).
I. Infartos crónicos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes. *D.* ℊviij á ℊxvj (1 á 8 dec.).

5790. P. DE JAMES.

℞ Polvo de James,
Resina de guayaco,
Masa de pildoras de Rufus, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de genciana. . . . c. s.
H. S. A. pildoras de ℊv (25 cent.).

I. Dispepsia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5791. P. DE KEISSER *ó Confites de Keisser.*

℞ Acetato de protóxido de mercurio. . . . . gvj (3 dec.).
Maná en lágrimas. . . . 5jß (6 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras que se cubrirán de almidon.
Nota. Cada una contiene gʲ/₆ (5 mil.) de acetato de mercurio.
I. Sífilis, blenorrea y leucorrea. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5792. P. DE KOOPP.

℞ Acetato de plomo en polvo. . . . . gjv (2 dec.).
Sem. de hinojo acuático pulverizadas. . 5ß (2 gr.).
Extr. de milenrama. 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
Algunas veces se añade á la formula anterior:
Extr. gomoso de opio. gv (25 cent.).
I. Histérico y epilepsia. *D.* Se empieza por una píldora, y no se aumenta la dosis sino con la mayor precaucion.

5793. P. DE LACTATO DE HIERRO (*Gap*).

℞ Lactato de hierro,
Malvab. en polvo, ãã. gxviij (1 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
Se platearán ó se cubrirán con gelatina fundida segun el procedimiento de Garot.

5794. P. DE LACTATO DE HIERRO Y QUINA (*Cap*).

℞ Lactato de hierro,
Quina en polvo, ãã. . gxviij (1 gr.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras que se deben platear ó cubrir con gelatina.
I. Clorosis y enfermedades esténicas.

5795. P. DE LACTUCARIO.

℞ Lactucario. . . . . 5j (4 gr.).
Malvabisco en polvo. . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
Se usan como hinópticas por la noche.

5796. P. LAXANTES (*Blassius*).

℞ Aloes. . . . . 3ß (2 gr.).
Jalapa. . . . . gʳjv (3 gr.).
Jabon blanco. . . . gxviij (1 gr.).
Anis. . . . . gix (50 cent.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Cólico ventoso, amaurosis. *D.* Tres á diez píldoras.

5797. *Otras* (BUCHAN).

℞ Asa fétida. . . . . 5ij (8 gr.).
Acíbar,
Cloruro de hierro,
Gengibre en polvo, ãã. . 5j (4 gr.).
Elixir de propiedad. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Neumatosis, estreñimiento, gastralgia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5798. *Otras* (HUFELAND).

℞ Extracto de hiel de buey,
Jabon medicinal,
Ruibarbo en polvo, ãã. . . 5j (4 gr.).
Extracto de taraxacon. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Estreñimiento por falta de secrecion de la bilis. *D.* Cinco á diez píldoras mañana y noche.

5799. P. LAXANTES Y FUNDENTES (*Sánchez*).

℞ Raiz de gengibre,
Azúcar, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizcle, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Mercurio sublimado dos veces. . . . . gvij (6 dec.).
Deutocloruro de mercurio,
Subdeutosulfato de mercurio, ãã. . . gviij (4 dec.).

Se trituran en un mortero de vidrio y se añade:

Extracto de jalapa,
Extracto catártico de la F. de L., ãã. . . 5ij (8 gr.).
Protosulfato de potasa,
Asa fétida, ãã. . . . . 5jß (6 gr.).
Píldoras de Rufus,
Gálbano,
Extr. de regaliz, ãã. 5j (4 gr.).
Bálsamo del Perú. . . 5ß (2 gr.).
Elixir no ácido de propiedad. . c. s.

H. S. A. una masa, que después se divide en píldoras de gjv (2 dec.), cada una de las cuales contiene una undécima parte de sal mercurial. *D.* Cuatro píldoras al dia, aumentando gradualmente la dosis hasta quince.

5800. P. DE LEIGER.

2ª Caniáridas en polvo. . gjx (50 cent.).
Extracto de borraja, 5ijß (40 gr.).

H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Incontinencia de orina. *D.* Una píldora por la noche. Es remedio muy peligroso.

5801. P. DE LOCKSTAEDT.

2ª Sulfato de quinina. . . gijß á gijß (12 á 18 cent.).
Polvo aromático. . . . gxij (6 dec.).
Esenc. de alm. amarg. una gota.
Extr. de cent. menor. c. s.

H. S. A. píldoras.

D. Se toman de una vez antes del acceso de las calenturas intermitentes.

5802. P. DE LUPULINA.

2ª Lupulina. . . . . 5ijß (10 gr.).
Goma arábiga. . . . 5j (4 gr.).
Extracto de achicorias, c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Escrófulas. *D.* De dos á cuatro al dia.

5803. P. DE MAGNESIA.

2ª Crémor de tártaro en polvo. . . . gi.jv (3 gr.).
Magnesia calcinad. gxxvij (1.5 gr.).
Jarabe de achicorias. . . . . c. s.

H. S. A. un bolo.

D. Dos píldoras por la mañana y dos por la tarde.

5804. P. DE MAGNESIA COMPUESTAS.

2ª Magnesia comun. . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gvj (3 dec.).
Opio puro. . . . . gvj (3 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.

H. S. A. doce píldoras.

I. Son antiácidas y convienen en las acedías y ardor de estómago. *D.* Una píldora cada seis horas.

5805. P. DE MALATO DE HIERRO.

2ª Gálbano. . . . . 5j (4 gr.).
Malato de hierro. . . gi.jv (3 gr.).
Aceite de sabina. . . gjx (50 cent.).
Valeriana en polvo. . c. s.

I. Amenorrea, convalecencia, escrófulas, caquexia, histérico, úlceras atónicas, raquítis. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5806. P. DE MANTECA DE CACAO.

2ª Manteca de cacao. . . 5j (32 gr.).
Polvo de malvabisco. . 5j (4 gr.).

H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).

D. Doce píldoras.

5807. P. DE MAQUIAVELO.

2ª Acíbar. . . . . 5jß (6 gr.).
Cardamomo. . . . . 5j (4 gr.).
Azafran,
Mirra,
Anis,
Betónica,
Bol arménico, ãã. . . . 5ß (2 gr.).

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Son tónico-purgantes, útiles para restablecer las fuerzas digestivas.

5808. P. MARCIALES (*Koempf*).

2ª Vinagre escilítico. . lbjß (750 gr.).
Gálbano,
Hidroclorato de amoniaco,
Asa fétida, ãã. . . . 5i (30 gr.).

Sulfato de potasa,
Sulfato de hierro, āā. ʒß (45 gr.).
Se pone todo al fuego y se agita hasta la consistencia de extracto. A la masa enfriada se añade:
Aceite de sucino. . . . . 48 gotas.
Se divide la masa en píldoras de ǧjv (2 dec.).
I. Caquexia, clorosis, histérico, etc. *D.* De tres á ocho ó diez píldoras al dia.

5809. P. MARCIALES (F. E.).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . ʒij (60 gr.).
Extracto blando de ajenjos. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ǧvj (3 dec.).
Son las píldoras marciales de Sydenham de la F. M.
Nota. Algunas veces se añade ʒj (4 gr.) de canela en polvo ó ʒß (2 gr.) de acíbar.
I. Clorosis, histérico, hipocondría, dispepsia y leucorrea. *D.* Tres ó cuatro píldoras, mañana y noche.

5810. *Otras* (H. DE M.).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . ʒij (60 gr.).
Raiz de genciana pulv. ʒj (30 gr.).
Mucílago de goma aráb., c. s.
H. S. A. píldoras.
I. Clorosis. *D.* De ǧviij á ǧxvj (4 á 8 dec.).

5811. P. MERCURIALES DE SEDILLOT *ó Píldoras de Sedillot.*

℞ Ungüento mercurial. . ʒiij (12 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒij (8 gr.).
Polvo de regaliz. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ǧjv (2 dec.).
I. Se usan como antisifilíticas.

5812. P. MARCIALES CON MIRRA (F. N. P.).

℞ Hierro preparado,
Mirra,
Extracto de aristoloquia redonda, āā . . . . . ʒß (2 gr.).
Azafran en polvo. . . . ʒj (12 dec.).
Jarabe balsámico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ǧvj (3 dec.).
I. Atonía de las vísceras abdominales, obstrucciones, inercia del sistema nervioso.

5813. P. DE MATEO STARK.

℞ Láudano,
Regaliz muy pulverizado,
Eléboro blanco,
Eléboro negro, āā. . ʒij (60 gr.).
Jabon tartáreo. . . . ʒvj (180 gr.).
Esencia de trementina. c. s.
H. S. A. una masa de píldoras, que siempre que se saque debe humedecerse con el mismo aceite de trementina.
I. Son purgantes sin causar dolor ni alteracion alguna en la caquexia, obstrucciones del bazo, cuartanas, ictericia y otras muchas enfermedades crónicas y rebeldes.

5814. P. MAYORES DE HOFFMANN *ó Píldoras mercuriales de Hoffmann.*

℞ Sublimado corrosivo porfirizado. . . . ǧxviij (1 gr.).
Miga de pan. . . . . ʒvj (24 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.
H. S. A. doscientas diez y seis píldoras. Se da una por la mañana y otra por la tarde en las afecciones sifilíticas. Cada píldora contiene un doceavo de sublimado corrosivo, que segun Guibourt existe en parte libre, y otra porcion hace parte de un compuesto insoluble.

5815. P. MENORES DE HOFFMANN.

℞ Calomelanos,
Miga de pan, āā. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.
I. Afecciones sifilíticas.

5816. P. DE MERAT.

℞ Extracto acuoso de opio. ʒj (4 gr.).

Alcanfor. . . . . 5jß (6 gr.).
Almizcle. . . . . 3ß (2 gr.).
Nitrato de plata fundido. gvj (3 dec.).
H. S. A. noventa y seis píldoras.

Nota. Cada píldora contiene una décimasesta parte de grano de nitrato de plata, tres cuartas partes de grano de opio, gß (25 mil.) de almizcle y gj (5 cent.) de alcanfor.

I. Baile de S. Vito, epilepsia, blenorragias. *D.* Se da una mañana y noche al empezar el tratamiento; despues se pueden dar tres y aun cuatro. Se bebe al mismo tiempo una tisana antiespasmodica. Se administran dos ó tres píldoras, mañana y noche, en las enfermedades sifilíticas y en las de la piel. Detrás de cada dosis se bebe una taza de cocimiento de leños sudoríficos ó simplemente de zarzaparrilla.

5817. P. DE MERAT.

℞ Nitrato de plata. . . . . gj (5 cent.).
Miga de pan. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. quince píldoras.

I. Baile de san Vito, epilepsia, blenorragia. *D.* Dos á seis píldoras al dia.

5818. P. MERCURIALES.

℞ Deutocloruro de merc. 9j (12 dec.).
Alcohol. . . . . 5ij (8 gr.).
Harina de trigo. . . . . 5iij (12 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.

Háganse ciento cuarenta y cuatro píldoras. Cada una contiene ½ de grano (6 mil.) de sublimado.

I. Se emplean contra las enfermedades venéreas. *D.* Se da primero una píldora por la mañana y otra por la noche, y despues se duplica la dosis.

5819. *Otras*, n. 2.

℞ Jabon medicinal. . . . 5ß (15 gr.).
Ruibarbo. . . . . 5ij (8 gr.).
Deutocloruro de merc. 9j (12 dec.).
Polvo de regaliz.
Jarabe de flores de naranjo, ää. c. s.

Háganse ciento cuarenta y cuatro píldoras.

I. y *D.* Las mismas que las anteriores.

5820. *Otras*, n. 3.

℞ Ungüento mercurial doble. . . . . 3iij (90 gr.).
Jabon medicinal . . . 3ij (60 gr.).
Almidon. . . . . 5jß (75 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Las mismas que las anteriores.

5821. *Otras* (BIETT).

℞ Fosfato de mercurio. . . 3ß (2 gr.).
Extracto de fumaria. . . 3j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

D. Una ó dos al dia en las sifílides.

5822. *Otras* (BIETT).

℞ Ungüento mercurial,
Polvo de zarzaparrilla, ää. 3j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras. Cada una contiene gjß (7 cent.) de ungüento mercurial ó tres cuartos de grano de mercurio.

5823. P. MERCURIALES, *Píldoras de Belloste*, *Píldoras mercuriales purgantes*, *Píldoras mercuriales de escamonea aloéticas* (F. F.).

℞ Mercurio,
Polvo de acibar, ää. . 3vj (24 gr.).
Polvo de ruibarbo. . . 5iij (12 gr.).
Polvo de escamonea. . 3ij (8 gr.).
Polvo de pim. negra. 3j (4 gr.).
Miel blanca. . . . . c. s.

Se tritura el mercurio con la miel hasta que se extinga perfectamente, se añaden los polvos, y se hace una masa que se conserva en un bote, y de la que segun se necesite se hacen píldoras de gjv (2 dec.). Cada una contiene gj (5 cent.) de mercurio, otro de acíbar y un tercio de grano de escamonea.

Estas píldoras, que son casi iguales á las de Belloste, son un antisifilítico muy malo, porque predominan en ellas los principios purgantes, y en la medicacion antisifilítica y en la contraestimulante el buen resultado depende entre otras cosas de que se establezca la tolerancia del medicamento.

I. Sífilides, sífilis constitucional, afecciones herpéticas y escrofulosas, herpes, oftalmias, y comunmente como purgantes. *D.* Dos á tres píldoras al dia.

5824. P. MERCURIALES (*Lagneau*).

℞ Ungüento mercurial de manteca de cacao. . . 3ij (8 gr.).
Azúcar en polvo. . . . . 3j (4 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.
H. S. A. cincuenta y cuatro píldoras.

I. Sífilis constitucional, sífilides, oftalmias. *D.* Dos á cuatro píldoras mañana y noche.

5825. P. MERCURIALES (*Brugnatelly*).

℞ Almidon. . . . . 3ij (60 gr.).
Mercurio purificado,
Conserva de rosas, ãã. . 3j (30 gr.).
Se extingue el mercurio en la conserva y se añade si es necesario un poco de mucílago, se la une al almidon y se divide la masa en cuatrocientas ochenta píldoras iguales.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* Una ó dos píldoras al dia.

5826. *Otras* (CADET).

℞ Jalapa en polvo. . . . 3jv (125 gr.).
Mercurio purificado. 3ij (60 gr.).
Maná en lágrimas. . . 3j (30 gr.).
Trementina,
Flores de azufre,
Guttagamba, ãã. . . . 3ij (8 gr.).
Jar. de espino servat. c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Afecciones sifilíticas ó herpéticas. *D.* De tres á seis píldoras al dia.

5827. *Otras* (CHOMEL).

℞ Sublimado corrosivo. . gij (1 dec.)
Extr. gomoso de opio. gij (1 dec.).
H. S. A. veinte píldoras. Cada una contiene $^1/_{10}$ de grano (5 mil.).

D. Una píldora mañana y noche. A los quince dias se aumenta hasta tres píldoras al dia; á los quince dias cuatro píldoras, en todo g^{ij} (2 cent.) al dia, cuando mas, de sublimado.

Chomel ha obtenido buenos resultados con este tratamiento, y jamás ha visto que se presenten fenómenos secundarios.

5828. *Otras* (DOCTOR ESTOR).

℞ Mercurio purificado. 3jv (16 gr.).
Trementina fina. . . . 3vj (192 gr.).
Sucino en polvo. . . 3j (32 gr.).
Polvo de regaliz. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).

I. Gonorrea, cuando han desaparecido los síntomas de irritacion. *D.* Una píldora y despues dos, todas las mañanas.

5829. *Otras* (DOUBLE).

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . gxviij (1 gr.).
Sublimado corrosivo. gij (1 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Herpes venéreos ó escrofulosos. *D.* Una píldora mañana y noche.

5830. P. MERCURIALES DE CULLERIER (H. M.).

℞ Deutocloruro de merc. gxviij (1 gr.).
Harina de trigo. . . . 3ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . . 3ß (2 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.). Cada una contiene una octava parte de grano de sublimado corrosivo.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* Una píldora dos veces al dia, aumentando segun los efectos.

5831. P. MERCURIALES (H. M. F.).

℞ Mercurio. . . . . 3x (40 gr.).
Aciba.
Agárico blanco, ãã. . 3xx (80 gr.).
Macis,
Canela, ãã. . . . . 3ijß (10 gr.).
Miel. . . . . 3c (400 gr.).

Se extingue el mercurio en la miel en un mortero de mármol, se añade sin cesar las demás sustancias, se bate mucho tiempo y luego que este bien unida la masa se hacen píldoras de gij (15 cent.).

D. 9j á 9ij (12 á 24 dec.).

5832. *Otras* (PLENCK).

℞ Mercurio gomoso. . . gr.jv (3 gr.).
Extracto de cicuta,
Extr. de guayaco, ãã. gxvij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Oftalmias, conjuntivitis, ictericia, sífilis constitucional, sífilides, flebitis, bocio. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

5833. P. MERCURIALES CON CICUTA (*Kopp*).

℞ Bicloruro de mercur. gij (15 cent.).
Alcohol rectificado. . c. s.

Se disuelve y se añade:

Extracto de cicuta. . gix (3 gr.).

H. S. A. sesenta píldoras.

I. Afecciones escrofulosas, enfermedades cutáneas crónicas, artritis crónica, sífilis, tumores glandulares. *D.* Una á seis píldoras al dia, aumentando progresivamente hasta doce.

5834. P. MERCURIALES (*Lagneau*).

℞ Ungüento mercurial. . 5jv (16 gr.).
Polvos de malvabisco. . 5ij (12 gr.).

Se mezclan y se dividen en ciento cuarenta y cuatro píldoras.

Cada píldora contiene gj (5 cent.) de mercurio.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* De una á cuatro píldoras, mañana y noche.

5835. *Otras* (MOSCATI).

℞ Extr. blando de quina. 5ij (8 gr.).
Mercurio soluble de Moscati. . . . . 9ij (24 dec.).
Extr. acuoso de opio. 9ß (6 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Una píldora por la mañana y otra por la noche.

Es el mercurio soluble de Hanemann modificado por Moscati.

Nota. Si el enfermo es de buena constitucion, que no ha experimentado salivacion durante el uso de los demás mercuriales, el doctor Moscati prescribe 9jv (48 dec.) de óxido de mercurio, 3j (12 dec.) de opio, 5ß (15 gr.) de extracto de quina, y hace dividir la masa en veinte bolos, de los cuales se toma uno mañana y noche. Por el contrario, si el sugeto es débil y ha sufrido tialismo, Moscati reduce la dosis á 9j (12 dec.) de óxido de mercurio, gxij (6 dec.) de opio y 5ß (15 gr.) de extracto de corteza del Perú.

5836. P. MERCURIALES Y DIURÉTICAS (*Cruveilhier*).

℞ Calomelanos. . . . . 9j (12 dec.).
Escila en polvo. . . . gx (5 dec.).
Digital en polvo. . . gij (15 cent.).
Jar. de espino servat. c. s.

H. S. A. doce píldoras.

I. Pleuresía crónica con derrame seroso. *D.* Una á dos píldoras al dia.

5837. P. MERCURIALES FUNDENTES.

℞ Calomelanos. . . . . gxij (6 dec.).
Extracto de saponaria,
Extr. de taraxacon. ãã. gx (5 dec.).
H. S. A. doce píldoras.

I. Hepatitis, albuminuria, bocio crónico, ictericia, obstruccion de las vísceras abdominales. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5838. P. MERCURIALES DE GLUTEN (*M. V. Nivet*).

℞ Deutocloruro de merc.	gjv (2 dec.).
Harina fina de trigo.	gxviij (1 gr.)
Tridacio.	gxviij (1 gr.).
Extracto de opio. . . .	gvj (3 dec.).

Se disuelve el sublimado con un poco de alcohol, se añade la harina de trigo y las demás sustancias. Si la masa sale blanda se añade un poco de polvo inerte y se hacen treinta y seis píldoras.

D. Dos á tres píldoras al dia.

5839. P MERCURIALES OPIADAS (H. M.).

℞ Calomelanos.	ʒj (12 dec.).
Extr. gomoso de opio.	ʒß (6 dec.).

H. S. A. veinticuatro píldoras iguales.

I. Enfermedades sifilíticas. *D.* Una píldora dos veces al dia.

5840. P. MERCURIALES DE PLENCK *reformadas por Planche.*

℞ Miel purificada.	2
Polvo muy fino de regaliz.	2
Mercurio puro.	1
Extracto de cicuta.	1
Malvabisco en polvo.	c. s.

Se trituran en un mortero de mármol ó de porcelana con una mano de superficie ancha hasta que se extinga el mercurio; entonces se añade el extracto de cicuta, despues el polvo de malvabisco y se divide la masa en píldoras de gij (1 dec.). Cada píldora contiene un tercio de grano de mercurio.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Cuatro á seis píldoras en las veinticuatro horas.

Preparacion suave y fácil de manejar, que se puede aplicar al tratamiento de las enfermedades sifilíticas recientes, principalmente en los sugetos delicados é irritables. Se empieza por una píldora por la mañana y otra por la noche, que gradualmente pueden irse aumentando hasta cuatro por dosis, y aun mas.

5841. P. MERCURIALES (*Renou*).

℞ Mercurio destilado. . .	ʒvj (24 gr.).
Acíbar sucotrino. . . .	ʒv (20 gr.
Ruibarbo.	ʒiij (12 gr.
Escamonea.	ʒij (8 gr.
Agárico blanco.	ʒj (4 gr.).
Sasafrás,	
Canela,	
Macis, ää.	ʒj (12 dec.).
Miel.	c. s.

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Enfermedades de la piel. *D.* De tres á ocho píldoras al dia.

Nota. Son un poco purgantes.

5842. P. MERCURIALES GLIZIRRIZADAS *ó Píldoras mercuriales* (F. E.).

℞ Mercurio purificado. .	ʒij (60 gr.).
Miel.	ʒijß (75 gr.).

Se extingue el mercurio con la miel en un mortero de mármol y despues se añade:

Polvos de regaliz. . .	ʒß (45 gr.).

H. S. A. masa para píldoras. Cada ʒj (12 dec.) contiene gviij (4 dec.) de mercurio.

I. Enfermedades venéreas. *D.* De giij (15 cent.) á ʒj (12 dec.).

5843. P. MERCURIALES LLAMADAS DEL NUMERO TRES (*Sedillot*).

℞ Ungüento mercurial. .	ʒiij (90 gr.).
Jabon medicinal. . . .	ʒij (60 gr.).
Almidon,	
ó Polvo de regaliz. . . .	ʒj (30 gr.).

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.). Cada una una contiene gj (5 cent.) de mercurio.

I. Enfermedades sifilíticas graves, sifílides, oftalmias. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5844. P. DE MERCURIO (F. DE L.).

℞ Mercurio.	ʒij (8 gr.

Confecc. de rosas rojas. 5ij (12 gr.).
Regaliz en polvo. . . . . 5j (4 gr.).

Se tritura el mercurio con la confeccion, y despues de bien extinguido se añade el regaliz y se mezcla todo bien. Se hacen píldoras de gij (15 cent.).

5845. P. DE MERCURIO ALBUMINOSO.

℞ Mercurio albuminoso. . 5jß (6 gr.).
Extracto gomoso de opio,
Acibar en polvo, ãã. . . gx (5 dec.).
Extracto de zarzaparrilla. 5ß (2 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* Una píldora por la mañana durante ocho dias, y despues dos por la mañana y dos por la noche.

5846. P. DE MERCURIO ANIMALIZADO.

℞ Mercurio animalizado,
Malvabisco, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. ochenta píldoras.

D. Una píldora al dia. Se eleva sucesivamente la dosis.

5847. P. DE MERCURIO EDIMBURGENSES (F. E.) (H. DE M.).

℞ Mercurio puro,
Miel buena, ãã. . . . . 5j (30 gr.).

Se trituran juntos en mortero de mármol hasta que se extinga el mercurio; despues se añade:

Miga de pan blanco y tierno. . . . . 5ij (60 gr.).

Se vuelve á machacar y se hace S. A. masa para píldoras.

I. Enfermedades venéreas. *D.* Hasta 9ß (6 dec.).

5848. P. DE MERCURIO SOLUBLE DE HAHNEMANN (*Cazenave*).

℞ Mercurio soluble de Hahnemann. . . . . 9j (12 dec.).
Tridacio. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.

I. Síntomas primitivos de la sífilis. Dice Cazenave que nunca ha observado salivacion. *D.* Una píldora y despues dos al dia.

5849. P. DE MIRRA Y BELEÑO.

℞ Extracto de mirra. . . . 5jß (6 gr.).
Extracto de beleño,
Cebolla albarrana desecada, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. treinta píldoras.

I. Algunos médicos ingleses usan estas píldoras para facilitar la expectoracion en los catarros pulmonares crónicos y bronquitis. *D.* Dos ó tres píldoras al dia.

5850. P. DE MIRRA FERRUGINOSAS (*Meyer*).

℞ Limaduras de hierro,
Ruibarbo en polvo,
Mirra escogida, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Extracto de milenrama. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Clorosis y leucorrea. *D.* Cuatro á ocho píldoras, tres veces al dia.

5851. P. DE MONESIA.

℞ Extracto de monesia. gxviij (1 gr.).
Almizcle,
Alcanfor, ãã. . . . . gjx (50 cent.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Cistitis, catarro utero-vaginal. *D.* Dos á cuatro píldoras mañana y noche.

5852. P. DE MORFINA.

℞ Morfina. . . . . gij (1 dec.).
Regaliz en polvo. . . gxviij (1 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. diez píldoras.

D. Una píldora por la noche.

5853. *Otras* (*Magendie*).

℞ Morfina. . . gj á gij (5 á 10 cent.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.

D. Una píldora mañana y noche.

5854. P. DE MORFINA Y CIANURO DE POTASIO (*Rougier*).

℞ Sulfato de morfina. . ℈ij (15 cent.).
Cianuro de potasio. . ℈vj (30 cent.).
Mucílago. . . . . c. s.
para hacer veinticuatro píldoras.

I. Neuralgias. *D.* Cuatro píldoras al dia, una cada seis horas, y despues se puede aumentar sucesivamente la dosis hasta doce.

5855. P. DE MORISSON.

Son de dos especies: las del número primero y segundo. La análisis ha descubierto en las del número primero gutagamba en pequeña cantidad, una sustancia soluble en el éter, muy acre (principio del espino cerval), acíbar en gran cantidad, un polvo inerte y cremor de tártaro.

Las del número segundo contienen gran cantidad de gutagamba, menor cantidad de acíbar que las precedentes, un polvo inerte, crémor de tártaro y quizás escamonea.

Bouchardat ha dado la fórmula siguiente:

℞ Acíbar,
Resina de jalapa,
Extracto de coloquíntida,
Gutagamba,
Ruibarbo en polvo, ãã. ℥j (12 dec.).
Mirra. . . . . ℥ij (24 dec.).
H. S. A. sesenta y ocho píldoras.
D. Una á cuatro píldoras al dia.

5856. *Otras*, n. 2.

℞ Acíbar,
Gutagamba,
Resina de jalapa,
Ruibarbo,
Extracto de coloquíntida,
Crémor de tártaro,
Escamonea, ãã. . . . ℈xviij (1 gr.).
Mirra. . . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. cincuenta píldoras.
I. Embarazo de las primeras vias, estreñimiento, hidropesía. *D.* Una á cuatro píldoras al dia como drásticas.

5857. P. MOSCADAS COMPUESTAS (*Hunter*).

℞ Almizcle. . . . . ℈xv (75 cent.).
Alcanfor. . . . . ℈v (25 cent.).
Espíritu de vino. . . 2 gotas.
Conserva de rosas. . c. s.
H. S. A. doce píldoras, que se dan al dia como antiespasmódicas.

5858. P. DE MOSCOU, PÍLDORAS DE HULM *ó Píldoras tónicas de Hulm.*

℞ Extracto de colombo,
Extracto de genciana,
Extracto de quasia,
Hiel de vaca, ãã. . . . . ʒij 8 gr.
Genciana en polvo. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈iij (15 cent.).

I. Debilidad de estómago y digestiones perezosas. *D.* Una ó dos píldoras inmediatamente despues de comer; se bebe despues una taza de infusion fria de quasia.

5859. P. DE MOSELLY.

℞ Ruibarbo de la China,
Gengibre, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de canela. . . . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
D. Una píldora al dia.

5860. P. NAPOLITANAS.

℞ Mercurio,
Miel blanca,
Acíbar, ãã. . . . . 5jß (6 gr.).
Ruibarbo. . . . . ℈j.iv (3 gr.).
Escamonea. . . . . 5ß (2 gr.).
Pimienta negra. . . . ℈viij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈v (2 dec.).

I. Sífilis, sifílides, iritis, conjuntivitis, enfermedades de la piel, afecciones escrofulosas. *D.* Seis á ocho al dia.

5861. *Otras* (MARTIN SOLON).

℞ Ungüento mercurial. . . ℈c (5 gr.).
Extracto de cicuta. . . . ℈j.x (3 gr.).

Extracto de opio. . . . . gxl (2 gr.).
Jalon y polvo de cicuta, c. s.
H. S. A. cien píldoras.

I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. *D.* Dos á ocho píldoras al dia.

Nota. Son las píldoras de Sedillot adicionadas.

5862. P. NARCÓTICAS (*Barthez y Rilliet*).

℞ Extracto de opio,
Extr. de belladona, ãã. ℊjv (2 dec.).
Tridacio. . . . . ℊvj (3 dec.).
Malvabisco en polvo, c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Corea grave en los niños de diez años. *D.* Tres píldoras al dia, aumentando sucesivamente la dosis.

5863. P. NARCÓTICAS ASTRINGENTES (*Damars*).

℞ Tanino. . . . . ℊxxxvj (2 gr.).
Extracto de opio. . . ℊj (5 cent.).
Conserva de rosas. c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Producen buenos efectos en las hemorragias uterinas. *D.* Una píldora cada hora hasta que cese la hemorragia.

5864. P. NAUSEOSAS.

℞ Ipecacuana en polvo. . ℊvj (3 dec.).
Arrope de saúco. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
D. Una píldora cada dos horas.

5865. P. NERVINAS (*Krause*).

℞ Vitriolo verde,
Subcarb. de potasa, ãã. ʒj (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℊxij (6 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Dolores nerviosos crónicos. *D.* Tres á seis píldoras al dia.

5866. P. DE NITRATO DE PLATA.

℞ Nitrato de plata. . . . . ℊx (5 dec.).
Extracto de diente de leon,
Polvo de lirio, ãã. . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
Se toma una píldora por la mañana y otra por la noche en la gastralgia idiopática.

5867. P. DE NITRATO DE PLATA ó *Píldoras antiepilépticas* (F. P.).

℞ Nitrato de plata cristal. ℊj (5 cent.).
Miga de pan. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Epilepsia, temblor nervioso y parálisis. *D.* Una píldora mañana y noche.

Nota. Segun la F. P. se puede asociar almizcle, opio ó alcanfor.

5868. P. DE NITRATO DE PLATA (*Merat*).

℞ Extr. acuoso de opio. ʒß (2 gr.).
Alcanfor en polvo. . ℈ij (24 dec.).
Almizcle en polvo. . ℈j (12 dec.).
Nitrato de plata crist. ℊiij (15 cent.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.

I. Epilepsia, baile de S. Vito, neurosis, convulsiones, temblor nervioso y parálisis. *D.* Una píldora mañana y noche, aumentando progresivamente.

5869. *Otras* (RUEF).

℞ Nitrato de plata. . . . ℊjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . c. s.
Se disuelve y se espesa la solucion con
Goma tragacanto. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Gastritis crónica, gastralgia, epilepsia. *D.* Una píldora cada media hora hasta llegar á cuatro ú ocho, etc.

Se debe renovar estas píldoras á menudo.

5870. P. DE NITRATO DE PLATA OPIADAS.

℞ Nitrato de plata. . . . ℊj (5 cent.).
Extracto de opio. . . ℊjv (20 cent.).
H. S. A. píldoras.
D. Una por la mañana y otra por la noche.

5871. P. NITRO-ALCANFORADAS (*C. Bell*).

℞ Nitro,
Alcanfor, ãã. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
I. Blenorragia aguda. *D.* Una píldora por la mañana y otra por la noche. Comunmente se añade ℈j (5 cent.) de opio.

5872. P. DE NOGAL (*Sandras*).

℞ Extr. de hojas de nogal. ℈c (3 gr.).
Polvo de malvabisco. . . c. s.
H. S. A. cincuenta píldoras.
D. Cuatro píldoras al dia, con veinte á cuarenta gotas de tintura de iodo, y á veces sin ella á los escrofulosos.

5873. P. DE NUEZ VÓMICA.

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica. . . . . ℥ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una píldora al dia, aumentando progresivamente la dosis.

5874. *Otras*, n. 2.

℞ Extracto de nuez vómica,
Extracto de coloquintida,
Extr. de pelitre, ãã. ℈jx (50 cent.).
Jarabe de arnica. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈iij (15 cent.).
I. Parálisis, protoptosis, disentería, reumatismo, enuresis, neuralgias. *D.* Una á seis píldoras al dia, aumentando progresivamente.

5875. P. DE NUEZ VÓMICA FERRUGINOSAS (*Mondière*).

℞ Extr. de nuez vómica. ℈viij (4 dec.).
Oxido negro de hierro. ʒj (4 gr.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Incontinencia de orina por atonía. *D.* Tres píldoras al dia.

5876. P. DE OBRIEN CONTRA LOS TUMORES BLANCOS.

℞ Calomelanos. . . . . ℈xx (1 gr.).
Opio. . . . . ℈vj (3 dec.).
H. S. A. seis píldoras.
Cuando sobreviene la salivacion se suspende el uso de las píldoras, teniendo cuidado de no combatir el tialismo con ningun medicamento inoportuno. Cuando la salivacion es muy intensa se la combate con gargarismos emolientes. *D.* Seis píldoras cada tres horas.

5877. P. ODONTÁLGICAS (*Rust*).

℞ Extracto de belladona,
Extracto de beleño,
Opio purificado, ãã. . ℈viij (6 dec.).
Pelitre en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Esencia de clavo. . . . 24 gotas.
H. S. A. píldoras de ℈j (5 cent.).
I. Odontalgia por caries. *D.* Una píldora en la cavidad del diente.

5878. P. OPIADAS ALCANFORADAS (*Ricord*).

℞ Alcanfor. . . . . ℈iv (3 gr.).
Extracto de opio. . . . ℈viij (4 dec.).
Mucilago. . . . . c. s.
H. S. A. diez y seis píldoras.
I. Erecciones ó irritaciones del cuello de la vejiga. *D.* Dos ó tres píldoras por las tardes.

5879. P. DE OPIO ANTIMONIALES.

℞ Opio. . . . . ℈ij (10 cent.).
Tártaro emético. . . ℈j (5 cent.).
Triaca. . . . . c. s.
H. S. A. cuatro píldoras.
D. Una á dos píldoras al dia.

5880. P. DE OPIO Y BELEÑO.

℞ Extr. acuoso de opio. ℈ij (10 cent.).
Extracto de lechuga. ℈v (25 cent.).
Extr. de belladona. . ℈iij (15 cent.).
Extracto de beleño. . ℈iij (15 cent.).
Manteca de cacao. . ʒß (2 gr.).
H. S. A. quince píldoras.
I. Sudor inglés, tisis, pleuresia, enfisema, hepatalgia, diar-

rea crónica, disenteria crónica, parálisis, pedionalgia, reumatismo, panarizo, muermo, orquitis, cólico nervioso, neumatoses, íleo, sifílides, polidipsia, convulsiones, disnea, iritis, catarro agudo, bronquitis, cardialgias, histérico, metritis, neuralgias. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5881. P. DE OPIO GLICIRRIZADAS.

℞ Opio. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Extracto de regaliz. . 5ij (8 gr.).
Pim. de la Jamáica. ℊxc (5 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊv (25 cent.).

5882. P. DE OPIO É IPECACUANA.

℞ Opio en polvo,
Ipecacuana en polvo, ää. ℊj (5 cent.).
Conserva de cinosbastos. c. s.
H. S. A. dos píldoras.

5883. P. DE ORO.

℞ Oro dividido. . . . . ℊxij (6 dec.).
Extracto de saponaria. 5j (4 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Una á doce ó quince al dia.

5884. P. ORIENTALES.

℞ Opio purificado. 1
Azafran. 1
Canela. 1
Nuez moscada. 1
Cardamomo. 1
Jarabe de flores de naranjo. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
I. Se emplean para conseguir un sueño tranquilo. *D.* Dos ó tres píldoras antes de acostarse.

5885. P. DE ÓXIDO NEGRO DE HIERRO.

℞ Oxido negro de hierro,
Azafran,
Valeriana, ää. . . . . ℊjx (50 cent.).
Jarabe de artemisa. . c. s.
H. S. A. ocho píldoras.
I. Catarro-ulcro vaginal, amenorrea, clorosis, diabetes, raquitis, enuresis, neuralgias. *D.* Cuatro píldoras al dia.

5886. P. DE OXICIANURO DE MERCURIO OPIADAS.

℞ Oxicianuro de mercur. ℊvj (3 dec.).
Opio en bruto. . . . . ℊxij (6 dec.).
Miga de pan. . . . . ʒß (15 gr.).
H. S. A. noventa y seis píldoras.

5887. P. DE ÓXIDO DE ORO (*Chrestien*).

℞ Extracto de corteza de raiz de torbisco. . . . 5ij (8 gr.).
Oxido de oro preparado por la potasa. . . . . ℊvj (3 dec.).
H. S. A. sesenta píldoras iguales.
I. Escrófulas é infartos linfáticos. *D.* Primero una píldora al dia, y despues dos, tres ó cuatro hasta siete ú ocho.

5888. P. PARA DESINFECTAR EL ALIENTO.

℞ Cloruro de cal seco. 5ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . ℔ß (250 gr.).
Almidon. . . . . 5j (32 gr.).
Goma tragacanto. . . 5j (4 gr.).
Carmin. . . . . ℊiij (15 cent.).
H. S. A. píldoras de ℊiij (15 cent.).
D. Cinco ó seis píldoras cada dos horas.

5889. P. PARA PROVOCAR EL PARTO PREMATURO ARTIFICIAL (*Van Wageninge*).

℞ Ergotina,
Cornez. de centeno, ää. 5ij (8 gr.).
Acíbar sucotrino. . . . 9j (12 dec.).
H. S. A. sesenta píldoras.
D. Cuatro píldoras tres veces al dia.

5890. P. PARA RESTABLECER LAS HEMORROIDES.

℞ Acíbar en polvo. . . . ℊij (1 dec.).
Azufre sublimado y lavado. ℊvj á ℊx (3 á 5 dec.).
H. S. A. dos píldoras.
D. Cuatro ó seis píldoras al dia durante una semana.

5891. P. PARA RESTABLECER LAS REGLAS.

℞ Polvo ó extracto de sabina,
Polvo de acibar, ãã. . gij (1 dec.).
H. S. A. una píldora.
I. Amenorrea, dismenorrea, hemorroides. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia durante una semana.

5892. P. DE PARISET (F. P.).

℞ Goma tragacanto. . . 9ß (6 dec.).
Tártaro emético. . . . giij (15 cent.).
Opio gomoso. . . . . giij (15 cent.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Se usan como expectorantes en los catarros crónicos. *D.* Una píldora, dos ó tres veces al dia.

5893. P. PECTORALES (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado. . . . . 3ß (2 gr.).
Goma amoniaco,
Extracto de regaliz, ãã. 3ß (15 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. Cinco á diez píldoras al dia.

5894. P. PECTORALES DE ÉNULA.

℞ Extracto de énula. . 3ß (2 gr.).
Digital en polvo,
Ipecacuana en p., ãã. gv (25 cent.).
Azufre. . . . . 3ß (2 gr.).
Opio. . . . . gvj (30 cent.).
Goma amoniaco. . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Catarro crónico, asma, coqueluche. *D.* Una píldora de hora en hora.

5895. P. DE PELITRE.

℞ Raiz de pelitre. . . . . 3j (4 gr.).
Aceite de menta pip. gv (25 cent.).
Conserva de cochearia. c. s.
H. S. A. quince píldoras.
I. Calenturas intermitentes, parálisis. *D.* Cinco píldoras mañana y noche.

5896. *Otras* (H. DE AL.).

℞ Pelitre. . . . . 5j (4 gr.).
Mucilago de goma arábiga. c. s.
H. S. A. treinta píldoras.
I. Calenturas intermitentes. *D.* Seis píldoras cada cuatro horas.

5897. P. DE PETER.

℞ Acíbar,
Jalapa,
Escamonea.
Gutagamba, ãã. . . . . 3ij (60 gr.).
Calomelanos. . . . . 3j (30 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Purgante drástico. *D.* Una á cuatro píldoras.

5898. P. DE PIPERINO.

℞ Piperino. . . . . gxviij (4 gr.).
Polvo de malvabisco. 3ß (2 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. diez y ocho píldoras.
D. Se toman dos de hora en hora contra las fiebres intermitentes.

5899. P. PLATÍNICAS.

℞ Percloruro de platino. . gx (5 dec.).
Extracto de guayaco. . . 3j (4 gr.).
Regaliz en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
D. Una, dos, tres y aun cuatro píldoras mañana y noche.

5900. P. DE PLOMBAGINA.

℞ Plombagina,
Extr. de dulcamara, ãã. . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Enfermedades de la piel, afecciones reumáticas. *D.* Quince píldoras al dia.

5901. P. DE PLOMBAGINA MERCURIALES (*Veinhold*).

℞ Deutocloruro de merc. gij (1 dec.).
Plombagina. . . . . 5v (20 gr.).
Jarabe de malvabisco. . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
I. Afecciones escrofulosas, formas secundarias de la sífilis, enfermedades cutáneas crónicas. *D.* Cuatro á cinco píldoras cinco veces al dia.

5902. P. DE PLUMMER *ó Píldoras alterantes simples de Plummer.*

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . 1

Protocloruro de mercurio. 1
Extracto de fumaria. 1
H. S. A. píldoras de ǧiij (15 cent.

I. Enfermedades herpéticas. *D.* Una á tres píldoras por dia.

Muchas farmacopeas ponen extracto de regaliz en lugar del extracto de fumaria, pero este es mas á propósito para el uso de las píldoras.

5903. P. DE PLUMMER COMPUESTAS *ó Píldoras alterantes compuestas* (F. DE EDIMBURGO).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Resina de guayaco. . . . 5j (4 gr.).
Mucílago de goma aráb. c. s.
H. S. A. píldoras de ǧjv (2 dec.).

I. Herpes, impétigo, sífilis, sifílides, hepatitis. *D.* Dos á seis píldoras mañana y noche.

5904. P. DE PLUMMER COMPUESTAS *ó Píldoras alterantes de Plummer* (F. P.).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . 6
Protocloruro de mercurio. . . . 6
Zumo depurado de regaliz. 4
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ǧvj (3 dec.).

I. Convalecencia de las fiebres intermitentes é infartos de las vísceras abdominales acompañados de infiltracion de los miembros inferiores, afecciones venéreas, afecciones cutáneas, afecciones sifilíticas y como alterantes. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia, bebiendo despues una tisana de achicorias.

5905. P. DE POLÍGALA.

℞ Poligala en polvo. . . . . 5j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 5ij (8 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

D. Una cada dos horas.

5906. P. DE POLVO DE DIGITAL.

℞ Polvo de hojas de digital. . . . . ǧxx (1 gr.).
Miel blanca. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Son sedantes del sistema nervioso. *D.* Una píldora, aumentando sucesivamente hasta diez ó doce.

5907. P. Ó POLVOS PROFILÁCTICOS DE LAS VIRUELAS (*Rosen*).

℞ Calomelanos. . . . . 9ß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . ǧviij (4 dec.).
Extracto de acibar. . 9ß (6 dec.).
Resina de guayaco. . . ǧviij (4 dec.).
H. S. A. píldoras de ǧij (1 dec.) plateadas ó veinte papeles.

Se administran á la dosis necesaria para producir dos á cuatro deposiciones alvinas al dia.

5908. P. DE PROTOTARTRATO ANTIMONIADO DE POTASA (*Waller*).

℞ Etíope antimonial,
Prototartrato de potasa, ãã. . . . . ǧxviij (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ǧjv (2 dec.).

I. Pannus, conjuntivitis. *D.* Una ó dos píldoras cada dos horas.

5909. P. DE PULSATILA.

℞ Raiz de valeriana,
Flores de árnica,
Asa fétida, ãã. . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de pulsatila. ǧjx (50 cent.).
Tártaro emético. . . ǧiij (15 cent.).
H. S. A. píldoras de ǧjv (2 dec.).

I. Amaurosis, hemorroides, herpes crónicos, sifílides, parálisis. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5910. P. PURGANTES (*Vandanme*).

℞ Escamonea de Alepo,
Acibar sucotrino ãã. . 5ij (64 gr.).
Aceite de croton tigl. ǧ.jv (3 gr.).
Alcohol de 32°. . . . . 5iijß (14 gr.).

Se disuelve el aceite en el alcohol; por otra parte se echa en un mortero de hierro el acíbar y la escamonea en polvo y se mezclan bien con el pilon; se añade la solucion alcohólica y se hace una masa muy homogénea, que se

divide en píldoras de gv (25 cent.).

D. Una á tres píldoras á los adolescentes y tres á cinco á los adultos.

5911. P. PURGANTES.

℞ Raiz de jalapa en polvo,
Azúcar, ãã. . . . . ℈j (12 dec.).
Ruibarbo en polvo. . ℊxxx (15 dec.).
Jarabe de achicorias compuesto, c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. De cuatro á ocho píldoras al dia.

5912. *Otras*, n. 2.

℞ Resina de jalapa,
Gutagamba,
Jabon, ãã. . . . . ℊvj (3 dec.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. tres píldoras.
I. Estreñimiento rebelde ó hidropesías. *D.* Se toman por la mañana en ayunas, y en la apoplejía despues del uso de las sangrías; como alterantes se hacen seis píldoras y se dan dos ó tres al dia.

5913. *Otras*, n. 3.

℞ Acíbar,
Escamonea,
Gutagamba, ãã. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Jabon medicinal. . . . ℊ.jv (3 gr.).
H. S. A. veinte píldoras.
D. Dos á cuatro píldoras.

5914. *Otras*, n. 4.

℞ Escamonea. 2
Gutagamba. 2
Coloquintida. 2
Acíbar. 1
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.) que se platearán.
D. Dos ó tres píldoras al tiempo de comer, ó cantidad suficiente para obtener cuatro ó cinco deposiciones.

5915. *Otras* (ALIBERT).

℞ Resina de jalapa,
Mercurio dulce,
Jabon blanco, ãã. . . . . ℈j (4 gr.).
Escucia de cáscara de nar. 6 gotas.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).
D. Una píldora cada media hora hasta producir deposiciones alvinas.

5916. *Otras* (ALTHOF).

℞ Resina de jalapa. . . . . ℈j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ℈j (4 gr.).
Alcohol de 22 á 32°. . . . ℈ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
D. Dos por la mañana y dos por la noche al acostarse.

5917. *Otras* (DEHAEN).

℞ Resina de jalapa,
Escamonea, ãã. . . . ℈jv (125 gr.)
Extracto católico. . . ℈j (30 gr.).
Alcohol para ablandar las sustancias. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Hidropesías, enfermedades asténicas, etc. *D.* De dos á cinco píldoras en las veinticuatro horas.

NOTA. El extracto purgante drástico, llamado vulgarmente CATÓLICO, se prepara segun la F. DE VIENA con ℈jv (125 gr.) de acíbar, ℈iij (90 gr.) de coloquintida despojada de su corteza, ℈ij (60 gr.) de agárico blanco, ℈ij (60 gr.) de escamonea y ℈j (60 gr.) de raiz de eléboro negro. Se trata estas sustancias por el alcohol y despues por el agua; se mezclan los líquidos colados y se los evapora en el baño maría para tener un extracto seco. Era necesario que Dehaen no conociese la composicion del extracto católico, porque es supérfluo añadir escamonea á escamonea.

5918. P. PURGANTES (*Pitschaff*).

℞ Extracto de coloquintida compuesto. . . ℊxviij (1 gr.).
Acetato de morfina. . ℊj (5 cent.).
H. S. A. veinte píldoras.
I. Se usan principalmente en los ancianos. *D.* Una píldora por la noche y segun las circunstancias una al despertar.

5919. P. PURGANTES DE FRANK *ó granos de salud.*

℞ Limaduras de hierro. . . ℈ij (8 gr.).

Acíbar sucotrino.
Jalapa,
Pulpa de tamarindos, ãã. ʒj (4 gr.).
Jarabe de achicorias. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).
D. De seis á ocho píldoras.

5920. P. PURGANTES (*Bayer*).

℞ Jalapa en polvo,
Escam. en polvo, ãã. ʒij (24 dec.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Cólico de plomo. *D.* Dos á seis píldoras al dia hasta producir evacuaciones abundantes.

5921. P. PURGANTES CON ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton. . . . . 1 gota.
Miga de pan blanco. . . . . c. s.
H. S. A. una píldora.

5922. P. PURGANTES ANTIESPASMÓDICAS (*Guepratte*).

℞ Asa fétida,
Extracto de valeriana,
Tridacio, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Limaduras de hierro, ʒß (2 gr.).
Jabon de croton. . . . gxjv (3 gr.).
H. S. A. cuarenta y ocho píldoras.
I. Produjo buenos resultados en un caso de gastralgia. *D.* Tres píldoras al dia.

5923. P. PURGANTES DE LA HORSE.

℞ Acíbar. . . . . lbj (500 gr.).
Gutagamba. . . . . ʒij (64 gr.).
Jabon. . . . . ʒiv (125 gr.).
Aceite de anis. . . . ʒß (16 gr.).
H. S. A. Una masa que se dividirá en píldoras de gjv (2 dec.).

5924. P. PURGANTES *ó Granos de salud* (*Bally y Cadet*).

℞ Acíbar sucotrino,
Jalapa, ãã. . . . . ʒj (32 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . c. s.
Se hace una masa y se la divide en píldoras de gij (15 cent.); se las platea.
I. Se usan en todos los casos en que hay que tomar las que se han atribuido á Frank. Digestiones difíciles, embarazo de las primeras vias, estreñimiento, dispepsia, vértigos, ablactacion, lepra. *D.* Una á cuatro píldoras y aun mas en todo el dia.

5925. P. PURGANTES Y DIURÉTICAS (*Frank*).

℞ Extracto de coloquíntida compuesto,
Polvo de gutag., ãã. gxv (75 cent.).
Calomelanos en polv. gx (50 cent.).
Jarabe de gengibre, c. s.
H. S. A. doce píldoras.
Se dan seis por la mañana y seis por la noche en el tratamiento de las hidropesías.

5926. P. PURGANTES DIURÉTICAS (*Gall*).

℞ Cebolla albarrana en polvo,
Asa fétida, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de coloquíntida compuesto,
Digital purpúrea, ãã. . gxviij (1 gr.).
H. S. A. diez y ocho píldoras.
I. Hidropesías pasivas, tumores glandulosos, etc. *D.* Dos píldoras cada tres horas hasta producir deposiciones.

5927. P. PURGANTES Y FUNDENTES (*Saiffert*).

℞ Extracto de genciana. . ʒß (16 gr.).
Hiel de buey. . . . . ʒiij (12 gr.).
Escamonea. . . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. ciento setenta y dos píldoras iguales.
D. De cuatro á seis píldoras cada dia en ayunas ó antes de comer.

5928. P. PURGANTES DE RESINA DE JALAPA (*Mialhe*).

℞ Resina de jalapa pura. gx (5 dec.).
Potasa cáustica. . . . gij (1 dec.).
Agua. . . . . 2 gotas.
Jabon amigdalino. . . gviij (4 dec.).
Magnesia calcinada. . glvj (2,8 gr.).

H. S. A. diez píldoras plateadas.

D. Cuatro ó cinco, y las diez píldoras constituyen un purgante de los mas eficaces. Se bebe uno ó dos vasos grandes de agua, y no se vuelve á tomar mas píldoras hasta que produzcan su efecto purgante.

5929. P. PURGANTES VERMÍFUGAS (*Meased*).

℞ Aceite de croton. . . . 4 gotas.
Jabon medicinal. . . . 5ß (2 gr.).
Jalapa. . . . . 5ß (2 gr.).
Extr. etéreode helecho. 9j (12 dec.).
Extracto de regaliz. . . c. s.
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Ténia.

5930. P. DE QUASIA.

℞ Extracto de quasia. . . . 5jß (6 gr.).
Genciana. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Dispepsia, acrodinia, acidez de las primeras vias, sudor inglés. *D.* Cinco píldoras, mañana y noche.

5931. P. DE QUINA ALCANFORADAS (*Dupuytren*).

℞ Extracto de quina. . 5j (4 gr.).
Extracto de opio. . . . gj (5 cent.).
Alcanfor. . . . . gxij (6 dec.).
Quina en polvo. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Se usan como tónicas y estimulantes en las fiebres aláxico-adinámicas. *D.* Una píldora cada tres horas.

5932. P. DE QUERMES.

℞ Quermes mineral. . . gviij (4 dec.).
Polvos de Dower. . . . gxij (6 dec.).
Arrope de saúco. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Gota, reumatismo, para provocar la diaforesis y calmar los dolores. *D.* Una píldora cada dos horas.

5933. P. DE QUINA ALCANFORADAS.

℞ Extracto de quina. . . 5j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . 9ß (6 dec.).
Extracto de opio. . . . gj (5 cent.).
Quina en polvo. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Calenturas intermitentes, calenturas aláxico-adinámicas, astenia, ataxia, coqueluche, esplenitis, sudor inglés, pica, convulsiones, hepatalgia, anorexia, tétanos, priapismo, diarrea, gereftalmia, cefalalgia, convalecencia. *D.* Una píldora cada tres horas.

5934. P. DE QUINA COMPUESTAS.

℞ Quina. . . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor,
Ipecacuana,
Nitro, ãã. . . . . gvj (3 dec.).
Conserva de rosas,
Jarabe de limon, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Amenorrea, anorexia, pica, caquexia, calenturas intermitentes, diarrea, disenteria, sudor inglés, bulimia, cefalalgia, convulsiones, catarro crónico, esplenitis, coqueluche, dispepsia, lepra, úlceras atónicas, ataxia, convalecencia. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5935. P. DE QUINOIDINA.

℞ Quinoidina. . . . . 5j (4 gr.).
Quina. . . . . 5j (4 gr.).
Opio. . . . . gjv (2 dec.).
Oleosácaro de alcarav. c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Esplenitis, cefalalgia, calenturas intermitentes ó remitentes perniciosas, tisis, convulsiones, amenorrea. *D.* Dos píldoras cada dos horas.

5936. P. DE RAIZ DE TONDIN.

℞ Raiz de tondin en polv. 5ß (2 gr.).
Extracto de genciana. gxviij (1 gr.).
Jarabe de alcanfor. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Lepra, elefantiasis, herpes, soriasis, escrófulas. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

5937. P. DE RASORI *ó Píldoras anticoréicas de Rasori.*

℞ Extracto de jalapa,
Escamonea, ãã. . . . ℈iij (15 cent.).
H. S. A. dos píldoras.
D. Se da una píldora todos los dias hasta obtener la curacion.

5938. P. DE RATANIA.

℞ Extracto de ratania. . ℥j (4 gr.)
Alumbre. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Cálamo aromático. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja. . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Diarrea y disenteria crónicas, gastrorragia, metrorragia, hemorragias pasivas, leucorrea, catarro útero-vaginal, sífilis. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

5939. P. RELAJANTES (*Buchan*).

℞ Jabon blanco. . . . . ʒjß (6 gr.).
Extr. de diente de leon. ℥ij (24 dec.).
Sagapeno,
Acíbar sucotrino, ãã. ℥j (12 dec.).
H. S. A. píldoras de ℈iij (15 cent.).
I. Estreñimiento. *D.* Cuatro ó cinco píldoras mañana y noche.

5940. P. DE RENOU.

℞ Mercurio. . . . . ʒiij (12 gr.).
Acíbar. . . . . ʒijß (10 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒjß (6 gr.).
Escamonea. . . . . ʒj (4 gr.).
Agárico blanco. . . . ʒß (2 gr.).
Sasafrás,
Canela,
Macis, ãã. . . . . ℈xij (6 dec.).
Miel. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Herpes, enfermedades de la piel. *D.* Tres á ocho píldoras al dia.

5941. P. RESINOSAS DEPURATIVAS (*Jahn*).

℞ Resina de guayaco.
Mirra,
Almáciga, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de dulcamara,
Extr. de saponaria, ãã. ʒjß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈j (5 cent.).
I. Leucorrea y otros flujos mucosos crónicos. *D.* Ocho píldoras, tres veces al dia.

5942. P. RESOLUTIVAS (*Rust*).

℞ Calomelanos. . . . . ℈xij (6 dec.).
Azufre dor. de antim. ℥j (12 dec.).
Extracto de cicuta,
Extr. de caléndula, ãã. ʒij (8 gr.).
Canela en polvo. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.).
I. Induraciones crónicas. *D.* Cinco píldoras al dia.

5943. *Otras* (SCHUBARTH).

℞ Extracto de celedonia,
Goma amoniaco, ãã. . . ʒjß (6 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.).
I. Hepatitis crónica. *D.* Ocho á doce píldoras por la mañana, al medio dia y por la noche.

5944. P. DE RITTMANN.

℞ Resina de jalapa. . . . . ʒß (15 gr.).
Protocloruro de merc. ʒß (2 gr.).
Divídase en setenta y dos píldoras.
D. Seis píldoras al dia.

5945. P. DE RUDA.

℞ Azafran en polvo,
Ruda en polvo,
Extr. de achicorias, ãã. ℥j (12 dec.).
Goma tragac. en polvo. ʒß (6 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
D. Una píldora por la mañana y otra por la tarde, despues dos y luego tres.

5946. P. DE RUIBARBO (F. M.).

℞ Ruibarbo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Acíbar sucotrino. . . . ʒx (40 gr.).
Mirabolanos cetrinos,
Polvo diarrodon, ãã. . . ʒiij (12 gr.).
Zumo de regaliz,
Zumo de ajenjos, ãã. . ʒj (4 gr.).
Sal catártica. . . . . ʒij (8 gr.).
Jar. de achicorias comp. c. s.
H. S. A. masa para píldoras.
I. Son purgantes y se han usado

mucho contra las tercianas y cuartanas. *D.* De ℈j á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

5947. P. DE RUFUS (H. DE M.).

℞ Acibar. . . . . ʒij (60 gr.).
Mirra. . . . . ʒj (30 gr.).
Azafran. . . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).

Cada una contiene un grano y un tercio de acibar.

I. Son purgantes, estomacales y emenagogas, útiles en las obstrucciones de las vísceras abdominales. *D.* Una á catorce píldoras como emenagogas, y cinco á diez como purgantes.

5948. P. DE RUIBARBO COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Ruibarbo en polvo. . . ʒj (32 gr.).
Acibar en polvo. . . . . ʒvj (24 gr.).
Mirra en polvo. . . . . ʒj (32 gr.).
Jabon. . . . . ʒj (4 gr.).
Aceite de alcaravea. . . ʒß (16 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras.

5949. P. DE RUIBARBO MAGNESIANAS.

℞ Ruibarbo. . . . . ʒij (8 gr.).
Magnesia calcinada. . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊv (25 cent.).

5950. P. DE SABINA.

℞ Sabina en polvo,
Extr. de manzanilla, ãã. ʒjß (6 gr.).
Oxido negro de hierro,
Acibar sucotrino, ãã. ℊxvj (8 dec.).
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

I. Clorosis. *D.* Dos á cuatro píldoras al dia.

5951. P. DE SABINA FERRUGINOSAS (*Radius*).

℞ Polvo de sabina. . . . ʒij (8 gr.).
Polvo de hierro. . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de acibar. . . ℈j (12 dec.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℊij (1 dec.).

I. Leucorrea asténica. *D.* Dos á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5952. P. DE SAGAPENO COMPUESTAS (F. DE L.).

℞ Sagapeno. . . . . ʒj (32 gr.).
Acibar. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de gengibre. . . c. s.
Macháquese hasta que se incorporen.

5953. P. DE SAINTE MARIE *para terminar la gonorrea.*

℞ Cons. de rosas rojas. ʒjv (128 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ʒj (32 gr.).
Sangre de drago. . . . ʒß (16 gr.).
Protocloruro de merc. ʒj (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).

I. Blenorragia, blenorrea, leucorrea, sífilis. *D.* Se dan hasta ʒß (2 gr.) dos veces al dia; se puede aumentar la dosis hasta ℈ij (24 dec.) para las personas robustas. El uso del agua de hierro mezclada con vino, en las principales comidas, contribuye á los buenos efectos de este remedio.

5954. P. DE SALICINA.

℞ Salicina,
Extr. de genciana, ãã. ℈ß (6 dec.).
Polvo de regaliz. . . . c. s.
H. S. A. seis píldoras.

D. Dos, cada dos horas.

5955. *Otras*, n. 2.

℞ Salicina. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Extracto de ajenjos,
ó Extr. de regaliz, ãã. c. s.
H. S. A. seis píldoras.

D. Se toman en tres veces con media hora de intervalo.

5956. P. SEDANTES.

℞ Alcanfor,
Nitro,
Extracto de beleño,
Polvo de digital, ãã. . ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).

I. Blenorragia, disuria, cisti-

tis aguda, cardiopalmia. *D.* Tres ó cuatro píldoras al dia.

5957. P. SEDANTES.

℞ Digital. . . . . 5j (4 gr.).
Hidroclor. de morfina. ℈vj (3 dec.).
Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se toman dos al dia y se aumenta sucesivamente la dósis.

5958. *Otras*, n. 3.

℞ Digital en polvo,
Píldoras de cinoglosa, ãã. 5j (4 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.
I. Tisis pulmonar, palpitaciones del corazon. *D.* Una á tres píldoras al dia.

5959. *Otras* (GUNTHER).

℞ Asa fétida,
Extr. de valerian., ãã. ℈xc (5 gr.).
Extr. de belladona. ℈vj (3 dec.).
Oxido de zinc sublim. ℈xviij (1 gr.).
Castóreo. . . . . ℈xxxvj (2 gr.).
H. S. A. una masa bien homogénea que se dividirá en píldoras de ℈ij (1 dec.).
I. Corea. *D.* Cinco píldoras por la mañana, al medio dia y por la noche.

5960. *Otras* (ROUGIER).

℞ Sulfato de morfina . ℈iij (15 cent.)
Cianuro de potasio. . ℈vj (30 cent.).
Mucílago. . . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
D. Cuatro píldoras al dia una cada seis horas, y despues se aumenta sucesivamente la dósis hasta llegar á doce.

5961. P. SEDANTES Y ASTRINGENTES.

℞ Acetato de plomo crist. ℈viij (4 dec.).
Extracto de opio. . . . ℈ij (1 dec.).
Mezclese y divídase en ocho píldoras.
I. Disminuyen la tos y la diarrea de los tísicos, salivacion mercurial antigua, hemorragias, cuando el pulso es pequeño y nervioso. *D.* Dos á tres píldoras al dia.

5962. P. DE SEGOND.

℞ Ipecacuana en polvo. . ℈viij (4 dec.).
Calomelanos. . . . . ℈iv (2 dec.).
Extr. acuoso de opio. ℈j (5 cent.).
Jar. de espino serval. c. s.
H. S. A. seis píldoras.
I. Disenteria de los paises cálidos. *D.* Seis píldoras cada dos horas. Si es necesario se toma esta preparacion tres ó cuatro dias.

5963. P. SOLUTIVAS (F. DE FERRARA).

℞ Orin de hierro. . . . . 5iij (12 gr.).
Acíbar,
Escamonea,
Goma amoniaco, ãã. . 5ij (8 gr.).
Azafran,
Sulfato de potasa, ãã. ℈ij,v (3 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈jv (2 dec.).
I. Hepatitis y esplenitis crónicas, afecciones escrofulosas. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

5964. P. DE SOSA (H. DE ING.).

℞ Carbonato de sosa. . . 5iij (12 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 5j (4 gr.).
Esencia de alcaravea. . 40 gotas.
Agua. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ℈ij (1 dec.).
I. Afecciones calculosas. *D.* Una á tres píldoras, dos ó tres veces al dia.

5965. P. DE SPEEDIMANN.

℞ Acíbar,
Mirra,
Ruibarbo,
Extr. de manzanilla. ãã. 5j (4 gr.).
Esencia de manzanilla. . 40 gotas.
H. S. A. píldoras de ℈jv (2 dec.).
I. Son purgantes y tónicas. *D.* Una á seis píldoras al dia.

5966. P. DE SUBLIMADO.

℞ Deutocloruro de merc. ℈v (25 cent.).

Almidon. . . . . 5j (4 gr.).
Goma arábiga. . . . 5ß (2 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras. Cada una contiene gr. 1/8 (6 mil.) de sublimado.

D. Una á tres píldoras al dia.

5967. P. DE SUBLIMADO Y ACÓNITO (*Biett*).

℞ Extracto alcohólico de acónito. . . . . gvj (3 dec.).
Sublimado corrosivo. gij (1 dec.).
Malvabisco en polvo. . gviij (4 dec.).

H. S. A. ocho píldoras.

I. Sifílides. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5968. P. DE SUBLIMADO CORROSIVO.

℞ Deutocloruro de merc. 9ß (6 dec.).
Extracto de guayaco. . 5j (4 gr.).
Extr. gomoso de opio. . 9ß (6 dec.).
Tridacio. . . . . 5ß (2 gr.).

H. S. A. treinta y seis píldoras.

D. Una píldora mañana y noche durante los seis primeros dias, y despues una por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

Se guardarán en un frasquito bien tapado, porque se funden cuando se las expone al aire.

5969. *Otras*, n. 2.

℞ Sublimado corrosivo. . 9j (12 dec.).
Alcohol. . . . . 5ij (8 gr.).
Harina de trigo. . . . . 5iij (12 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.

H. S. A. ciento sesenta píldoras, que contiene cada una gj 1/8 (6 cent.) de sublimado corrosivo.

5970. P. DE SUBLIMADO CORROSIVO CON GLÚTEN.

℞ Sublimado corrosivo porfirizado. . . . gij (1 dec.).
Glúten fresco. . . . gxxvij (16 dec.).
Goma arábiga en p. gviij (4 dec.).
Malvabisco en polv. gxvj (8 dec.).

Se tritura el sublimado corrosivo con el glúten en un mortero de porcelana durante diez minutos, se añade la goma y se tritura aun; despues se incorpora el polvo de malvabisco y se divide la masa en diez y seis píldoras. Cada una contiene una octava parte de grano de sublimado corrosivo.

I. Sífilis.

5971. P. DE SUCINO CROTON (F. M.).

℞ Sucino preparado,
Almáciga, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Acíbar sucotrino. . . . . 5v (20 gr.).
Agárico. . . . . 5jß (6 gr.).
Aristoloquia. . . . . 5ß (2 gr.).
Jarabe de betónica. . . . c. s.

H. S. A. masa para píldoras.

I. Se han alabado mucho en las enfermedades catarrales y nerviosas. *D.* 9j á 5j (12 dec. á 4 gr.).

5972. P. SUDORÍFICAS CALMANTES (*Dumeril*).

℞ Extracto de beleño. . 5ij (8 gr.).
Oxido de antim. hidrosulfur. anaranjado,
Oxido hidrosulfurado pardo, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Extr. acuoso de opio. gxij (6 dec.).

H. S. A. sesenta y dos píldoras iguales.

I. Tos nerviosa pertinaz. *D.* De dos á cuatro al dia, segun la edad y estado del enfermo.

5973. P. SUECAS.

℞ Protocloruro de mercur. 5jß (6 gr.).
Sulfuro negro de mercurio,
Quermes mineral, ãã. . 5j (4 gr.).
Miga de pan. . . . . c. s.

H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras iguales.

I. Afecciones sifilíticas. *D.* De dos á cuatro en las veinticuatro horas.

5974. P. DE SULFATO DE CINCONINA.

℞ Sulfato de cinconina. . . 5ß (2 gr.).

Conserva de rosas. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras muy iguales y platcadas.
D. De dos á diez y ocho píldoras en las veinticuatro horas.

5975. P. DE SULFATO DE HIERRO.

℞ Sulfato de hierro puro. . ʒj (4 gr.).
Extracto de genciana. . . . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.

5976. P. DE SULFATO DE HIERRO COMPUESTAS.

℞ Sulfato de hierro. . . . ℊxviij (1 gr.).
Extracto de ratania,
Catecu,
Trementina, ää. . . . ℊij,v (3 gr.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Leucorrea, blenorrea, disenteria crónica, raquitis, escrófulas, corea, lupus, pénfigo. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5977. P. DE SULFATO DE HIERRO COMPUESTAS (F. P.).

℞ Ruibarbo en polvo. 4
Sulfato de hierro. 9
Jabon amigdalino. 4
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Amenorrea y como tónicas. *D.* Una á cuatro píldoras, dos ó tres veces al dia.

5978. P. DE SULFATO DE HIERRO Y DIGITAL.

℞ Sulfato de hierro,
Digital en polvo, ää ℊij (15 cent.).
Mirra. . . . . ℊij (10 cent.).
Mucílago de goma arábiga. . . . c. s.
H. S. A. píldoras.
I. Amenorrea complicada con epilepsia. *D.* En tres dias.

5979. P. DE SULFATO DE MORFINA.

℞ Sulfato de morfina. . ℊxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . . ʒj (4 gr.).
Polvo de malvabisco, c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.
D. Se da una por la noche.

5980. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . . ℊxv (10 dec.).
Extracto de genciana,
Polvo de regaliz, ää. . . . . c. s.
H. S. A. diez píldoras muy iguales.
D. De dos á ocho y aun mas durante la apirexia de las calenturas intermitentes.

5981. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . ʒj (12 dec.).
Extracto de opio. . . ℊiij (15 cent.).
Extracto de taraxacon. . . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.
I. Neuralgia. *D.* Una á cuatro píldoras en el intervalo del acceso.

5982. *Otras*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina. ℊxxx (15 dec.).
Etiope marcial. . . ℊxv (10 dec.).
Extracto de genciana,
Extracto de marrubio, ää. . . . . ℊxl. (20 dec.).
H. S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).
I. Apirexia de las calenturas intermitentes, amenorrea, reumatismo, oftalmia, clorosis, sudor inglés, tisis, convulsiones, eliidrosis, hemicránea. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

5983. *Otras*, n. 3.

℞ Sulfato de quinina. . . ʒv (20 gr.).
Goma tragacanto. . . ℊxviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒij (8 gr.).
Se pistan y se divide la masa en diez y seis partes, se las guarda en un pucherito, se cubre á éste con una tela mojada, y cada masita se divide en veinticinco píldoras.

5984. *Otras* (MIALHE).

℞ Sulfato de quinina. . . ℊxviij (1 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . . 3 gotas.
Miel blanca. . . . . c. s.
H. S. A. una masa que se divi-

dirá en el número de píldoras que se prescriba.

5985. P. DE SULFATO DE QUININA OPIADAS.

℞ Sulfato de quinina. . . 9j (12 dec.).
Extracto gomoso de opio. gj (5 cent.).
Jarabe de goma,
Polvo de regaliz, ãã. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

I. Han curado muy bien las calenturas intermitentes y han sido muy raras las recidivas. *D.* Cuatro píldoras cada hora en el primer dia, lo mas distante posible del acceso que ha de presentarse; en el segundo y tercer dia tres píldoras, y el cuarto dia las dos últimas. Durante el tratamiento, que dura quince dias ó un mes, se usa por bebida habitual una infusion de centaura.

5986. P. DE SULFATO DE QUININA SOLUBLE (*Miathe*).

℞ Sulfato ácido de quinina. . . . . 5j (4 gr.).
Conserva de rosas, c. s.
cerca de. . . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. veinte píldoras plateadas.

5987. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO.

℞ Polvo de sulfuro de antimonio. . . 1
Extracto de dulcamara. 1
H. S. A. píldoras de gij (1 dec.).

I. Enfermedades de la piel. *D.* Desde diez á treinta píldoras, aumentando progresivamente.

5988. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO Y CALCIO (*Radius*).

℞ Sulfuro de antimonio y calcio. . . . . 5ß (2 gr.).
Mucílago de goma tragac. 5j (4 gr.).
H. S. A. sesenta píldoras.

I. Escrófulas, obstrucciones de las vísceras, visceralgias, reumatismo, gota, hepatitis, lepra, pénfigo, pitiriasis, escarlatina. *D.* Cinco píldoras, tres veces al dia.

5989. P. SULFURO ALCALINAS (*Miathe*).

℞ Azufre lavado. . . . . 5j (4 gr.).
Carbonato de magnesia. 5j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . 5ß (2 gr.).
Agua, c. s. cerca de. . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. cuatro píldoras.

I. Eczema, soriasis, flujo hemorroidal.

5990. P. DE SULFURO DE HIERRO (*Biett*).

℞ Sulfuro de hierro,
Jabon medicinal, ãã. . . 5j (30 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Liquen agrius. *D.* Diez píldoras al dia.

5991. *Otras*, n. 2.

℞ Sulfuro de hierro. . gxxxvj (2 gr.).
Malvabisco en polvo. gxviij (1 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.

I. Erupciones escrofulosas. *D.* Una á cuatro píldoras al dia.

5992. P. DE SULFURO DE POTASIO (F. P.)

℞ Sulfuro de potasio. 4
Jabon medicinal. 12
Bálsamo del Perú. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

I. Catarros crónico y senil, tialismo mercurial, afecciones cutáneas, etc. *D.* Una ó dos píldoras cada cuatro horas. Comunmente se manda que se beba una taza caliente de infusion de bayas de enebro, un cuarto de hora despues de cada toma.

5993. P. DE TABACO (*Augustin*).

℞ Tabaco en polvo. . . . 9j (12 dec.).
Conserva de rosas. . . . c. s.
H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Hidropesías generales. *D.*

Una, dos ó tres píldoras, dos ó cuatro veces al dia hasta que sobrevengan náuseas.

5991. P. DE TANINO COMPUESTAS (*Jourdain*).

℞ Tanino. . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Acetato de morfina,
Emético, ää. . . . . ᵍij (1 dec.).
H. S. A. veinte píldoras.

I. Hemorragias, diarrea. *D.* Una á dos píldoras al dia.

5995. P. DE TANINO CONTRA LOS SUDORES NOCTURNOS (*Chareef*).

℞ Tanino puro . . . . . ᵍxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Sudores nocturnos de los tísicos. *D.* Una á cuatro píldoras por la noche.

5996. P. TARTÁREAS DE BONCIO *ó Píldoras alcálicas de sulfato de potasa* (F. E.).

℞ Acíbar sucotrino. . . . ʒvj (24 gr.).
Goma amoniaco. . . . ʒiij (12 gr.).
Sulfato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).
Se mezclan y con miel depurada se hace una masa S. A.

I. Son purgantes y aperitivas. *D.* Desde ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

5997. P. TARTÁREAS (*Schroedrer*).

℞ Extracto seco de acíbar
preparado con el á-
cido tartaroso. . . . ʒjv (125 gr.).
Goma ara. en lágrimas. ʒiß (18 gr.).
Acetato de potasa. . . ʒj (32 gr.).
Extracto de genciana. ʒvj (24 gr.).
Sulfato de hierro,
Tart. de azufras, ää. ʒß (16 gr.).
Tint. de hierro tartar. c. s.
H. S. A. píldoras de ᵍvj (3 dec.).

I. Estas píldoras, que purgan ligeramente, se usan en las fiebres intermitentes, ictericia, clorosis, obstrucciones, esplenitis y hepatitis. *D.* De seis á ocho píldoras al dia.

5998. P. DE TÁRTARO EMÉTICO (*Boudet*).

℞ Emético. 16
Goma tragacanto. 16
Malvabisco en polvo. 40
H. S. A. píldoras de ᵍjv (2 dec.).

Boudet las prefiere á las de tártaro emético á grandes dosis, porque tienen el inconveniente de irritar las primeras vias.

5999. P. DE TARTRATO VITRIOLADO DE HIERRO (*Volpelière*).

℞ Subcarbonato de potasa,
Sulfato de hierro, ää. . ʒß (15 gr.).

Se mezclan, y luego que está líquida la mezcla se la extrae del mortero, se la coloca en una cazuela de hierro al fuego, y se menea hasta que adquiera la consistencia de píldoras. Entonces se aparta del fuego y se deja enfriar.

Este producto que llama tartrato vitriolado de hierro, sirve para las píldoras siguientes:

Tartr. vitriolado de hier. ʒj (30 gr.).
Malvabisco en polvo. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . c. s.
H. S. A. ciento veinte píldoras.

I. Son muy eficaces, se conservan bien y no se endurecen. V. *Píldoras de Blaud y Vallet.*

6000. P. TEBÁICAS.

℞ Opio . . . . . ʒj (4 gr.).
Pimiento. . . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de regaliz. . . ʒvij (28 gr.).

Se ablanda el opio y el extracto de regaliz con un poco de alcohol y se añade el pimiento en polvo. Cada ᵍx (5 dec.) contienen ᵍj (5 cent.) de opio.

6001. P. TENÍFUGAS.

℞ Aceite etéreo de helecho . . . . . ᵍxxxvj (2 gr.).

Mucilago y polvo de helecho. . . . . c. s.

H. S. A. diez bolos.

D. Se toman por la mañana con una hora de intervalo. Se bebe despues una taza de cocimiento de helecho macho, y por el dia se administra aceite de ricino.

6002. P. TENÍFUGAS DE ACEITE DE HELECHO.

℞ Grasa de puerco. . . . 3ß (2 gr.).
Raiz de malvab. en polv. gj,v (3 gr.).
Aceite de helec. macho. 20 gotas.

H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

D. Veinticuatro á cuarenta y ocho en dos tomas, segun la edad y temperamento: la primera dosis por la noche y la segunda al dia siguiente por la mañana, y una hora despues se da aceite de ricino.

6003. P. TÓNICAS.

℞ Cloruro de bario. . ℈j (12 dec.).
Genciana en polvo. ʒß (16 gr.).
Goma arábiga. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. . . . c. s.

Se disuelve el muriato de barita en un poco de agua destilada, y se hacen noventa y seis píldoras que cada una contiene una octava parte de grano de muriato de barita.

I. Escrófulas. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

6004. *Otras*, n. 2.

℞ Extracto de genciana,
Extracto de centaura menor, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Jarabe de genciana. . c. s.

H. S. A. veinte píldoras.

6005. *Otras* (BARBIER).

℞ Extr. de trébol de agua. ʒj (4 gr.).
Acibar sucotrino en polvo,
Ruibarbo en polvo, ãã. . ʒß (2 gr.).

H. S. A. veinticuatro píldoras.

I. Son purgantes y convienen en la jaqueca, disnea, tos, palpitaciones, vómitos espasmódicos, estreñimiento senil. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

6006. P. TÓNICAS (H. DE AMER.).

℞ Sulfato de cobre. . gjv (2 dec.).
Extr. de genciana. gxxvij (16 dec.).
Jarabe simple. . . . c. s.

H. S. A. diez y seis píldoras.

I. Calenturas intermitentes.

Nota. Cada píldora contiene g$\frac{1}{12}$ (12 mil.) de sulfato de cobre.

6007. P. TÓNICAS (*Formey*).

℞ Cloruro de hierro y amoniaco,
Ruibarbo,
Extracto de quina,
Alumbre. ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Aceite de canela. . . . gxij (6 dec.).

H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Raquitis, calenturas intermitentes, hemorragia pasiva. *D.* Tres á cinco píldoras mañana y noche.

6008. *Otras* (GALL).

℞ Quina en polvo. 1
Alumbre en polvo. 5
Mucílago. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

I. Afecciones cancerosas de la matriz. *D.* Cinco píldoras al dia.

6009. P. TÓNICAS DE BACHER (F. F.).

℞ Raiz seca de eléboro negro. . . . . lbj (500 gr.).
Carbonato de potasa purificado. . . . ℥jv (125 gr.).
Alcohol de 21°. . . . lbjv (2000 gr.).
Vino blanco. . . . . lbjv (2000 gr.).

Se quebranta el eléboro, se le pone en digestion durante doce horas en un matraz con el carbonato de potasa y el alcohol, y se cuela con expresion; se echa sobre el residuo el vino blanco, se

deja en maceracion por veinticuatro horas, se hierve y se cuela; se reunen los dos líquidos, se los clarifica por el reposo, se filtran y se evaporan hasta la consistencia de extracto líquido. Entonces se toma de

Extracto líquido. . . . ℥ij (64 gr.).
Extracto de mirra. . . . ℥ij (64 gr.).
Polvo de cardo santo. . ℥j (32 gr.).

Se hace masa S. A. y se forman píldoras de ℊjv (2 dec.) que se guardan en un frasco bien tapado.

I. Hidropesía, ascitis, otitis, úlceras indolentes, raquitis, dispepsia. *D.* Una á dos píldoras al dia.

6010. P. TÓNICAS DE BACHER (H. DE M.).

℞ Polvos de raiz de eléboro negro. ℥jv (125 gr.)
Carbonato de potasa. . . . . ℥j (30 gr.).
Alcohol de 48° Baumé. . . . ℥jx (270 gr.).
Vino bl. gener. . ℥xxxvj (1125 gr.).

Hágase extracto S. A. Se toma

De este extracto. 2
Mirra. 2
Polvo de cardo santo. 1

H. S. A. píldoras de ℊj (5 cent.).

I. V. las anteriores. *D.* Una ó dos píldoras al dia.

6011. *Otras* (STOLL).

℞ Limaduras de hierro,
Extracto de centaura menor,
Goma amoniaco, ãã. . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe de fumaria. . . . . c. s.

H. S. A. píldoras de ℊvj (3 dec.).

D. Se da una ó dos píldoras antes de comer para favorecer la digestion, y en mayor número en la clorosis y en la amenorrea.

6012. P. TÓNICAS Y ANTIESCROFULOSAS.

℞ Cloruro de bario. . . . ℊx (5 dec.).
Extracto de genciana. ℊxc (5 gr.).
Genciana en polvo. . . . c. s.

H. S. A. cien píldoras.

D. Dos, mañana y noche.

6013. P. TÓNICAS Y ANTIESPASMÓDICAS (*Dumas*).

℞ Antimonio diaforético lavado,
Azafran de Marte aperitivo, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Escila en polvo. . . . gxviij (4 gr.).
Goma amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
Extr. de dulcamara. . ʒß (15 gr.).
Extracto de enebro. . c. s.

H. S. A. píldoras de ℊv (25 cent.).

I. Hidropesía, ascitis, pica, asma. *D.* Cuatro píldoras mañana y noche.

6014. *Otras*, n. 2.

℞ Extracto de valeriana,
Protosulfato de hierro,
Carbonato de potasa, ãã. ℥j (4 gr.).
Sulfato de quinina. . . . ʒß (2 gr.).
Valeriana en polvo. . . . c. s.

H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Son muy eficaces en la clorosis complicada con algunos síntomas nerviosos.

6015. P. TÓNICAS Y CALMANTES (*Courti*).

℞ Quina roja,
Sucino blanco, ãã. . ℥j (4 gr.).
Canela fina,
Flores de azufre, ãã. ʒß (2 gr.).
Ipecacuana. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Extracto de cabezas de adormidera roja. ʒß (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja amarga. . c. s.

Se hacen S. A. píldoras de ℊjv (2 dec.).

I. Casos de debilidad acompañada de irritabilidad, en el coqueluche pertinaz y en ciertos casos de asma y de tisis pulmonar. *D.* Una ó dos píldoras cada cuatro horas, y se aumenta gradualmente hasta doce y aun quince al dia.

6016. P. TÓNICAS Y ESTOMACALES.

℞ Extr. acuoso de quina. 9j (12 dec.).
Subcarbonato de hierro. 9ß (6 dec.).
Jar. de cásc. de naranja. c. s.
H. S. A doce píldoras de ʒiv (2 dec.).
I. Anemia, clorosis, infiltraciones, amenorrea, dismenorrea con astenia. *D.* Dos píldoras antes de comer.

6017. P. TÓNICAS ASTRINGENTES (*Valch*).

℞ Trementina de Venecia,
Extr. de genciana, ää. . 5ij (8 gr.).
Sulfato de hierro,
Goma quino, ää. . . . . 5jß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Blenorrea y leucorrea crónicas. *D.* Cuatro píldoras, tres ó cuatro veces al dia.

6018. P. TÓNICAS (H. DE AL.).

℞ Oxido negro de hierro. . 5j (1 gr.).
Extracto de ajenjos. . . . c. s.
H. S. A. píldoras de gvj (3 dec.).
I. Clorosis, hidropesía, calenturas intermitentes. *D.* Cinco á nueve píldoras tres veces al dia.

6019. P. TÓNICAS Y LAXANTES (*Swediaur*).

℞ Oxido negro de hierro,
Acíbar sucotrino, ää. . . 3ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
I. Estreñimiento é infartos de las glándulas mesentéricas de los niños, afecciones cutáneas, escrófulas, dispepsia, úlceras atónicas. *D.* De dos á cuatro píldoras una ó dos veces al dia.

6020. P. TÓNICAS (*Ockel*).

℞ Hollin brillante,
Extracto de quasia, ää. 5ij (8 gr.).
Extracto de taravacon. 3ß (15 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
I. Descenso de la matriz por relajacion de los ligamentos anchos. *D.* Seis píldoras por la mañana, seis al medio dia y seis por la noche.

6021. *Otras* (STEMBERGER).

℞ Extracto de genciana,
Extr. de ajenjos, ää. . 5jß (6 gr.).
Cascarilla en polvo,
Ajenjos en polvo, ää. c. s.
H. S. A. píldoras de ʒiij (15 cent.).
I. Leucorrea asténica, escrófulas. *D.* Tres á seis píldoras al dia.

6022. *Otras* (WHYTT).

℞ Cloruro de hierro,
Acíbar,
Extr. de marrubio, ää. 3ß (2 gr.).
Asa fétida. . . . . 5jß (6 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Catarro uterо-vaginal, leucorrea, raquitis, sífilis, dispepsia, histérico con estreñimiento. *D.* Cuatro ó cinco píldoras tres veces al dia.

6023. P. TÓNICAS Y ESTIMULANTES.

℞ Extracto de genciana,
Ajos en polvo, ää. . . . . 5j (4 gr.).
Jarabe de menta. . . . . c. s.
H. S. A. veinticuatro píldoras.
I. Son tónicas, estomacales y convienen en las digestiones lentas con ventosidades. Se dan antes de comer.

6024. P. TÓNICAS FUNDENTES (*Clarus*).

℞ Cloruro de hierro y amoniaco,
Acíbar, ää. . . . . gxviij (1 gr.).
Extracto de celedonia. 5j (4 gr.).
Gálbano,
Jabon medicinal, ää. 5ij (8 gr.).
H. S. A. píldoras de ʒij (1 dec.).
I. Infartos de las vísceras del bajo vientre consecutivas á las

calenturas intermitentes, esplenitis, hepatitis, ictericia, nefritis. *D.* Seis píldoras mañana y noche.

6025. P. TÓNICAS DE LIMADURAS DE HIERRO.

℞ Limaduras de hierro. . 3jß (6 gr.).
Extracto de genciana. gr.jv (3 gr.).
Canela en polvo. . . . gxviij (4 gr.).
Jar. de cáse. de naranj. c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Dispepsia, pica, raquitis, caquexia, clorosis. *D.* Tres ó cuatro píldoras mañana y noche.

6026. P. DE TREMENTINA.

℞ Trementina. . . . . 3j (4 gr.).
Extracto de ruibarbo. 3ß (2 gr.).
Catecú.
Ratania, ää. . . . . gxviij (1 gr.).
H. S. A. cuarenta píldoras.

I. Reumatismo, catarro utero-vaginal, cistitis, blenorrea, leucorrea, prurigo, neuritis, parálisis y neuralgias. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

6027. *Otras*, n. 2.

℞ Trementina. . . . . 3j (32 gr.).
Extracto de ruibarbo. . 3jß (6 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Leucorrea y blenorragia. *D.* Nueve píldoras al dia en tres tomas.

6028. P. DE TREMENTINA *ó Trementina cocida* (F. F.).

Se toma trementina de Venecia, se la pone en un perol con agua que se mantiene hirviendo hasta que vertiendo un poco de esta resina en agua fria se solidifique en ella; entonces se la divide en píldoras de gjv (2 dec.), conservándolas blandas en agua tibia ó envueltas en almidon. V. *Trementina cocida*, tomo I, p. 348.

El objeto de la decoccion es desprender la esencia; parece tambien, segun Unverdorben, que se cambia la naturaleza de la resina, la cual se transforma en una resina muy ácida llamada colónica.

I. Se usan en las inflamaciones catarrales crónicas de la vejiga, y aun de las del pecho y de la uretra. *D.* Tres ó cuatro píldoras, que se aumentan progresivamente.

6029. P. DE TREMENTINA (*Trousseau*).

℞ Trementina cocida. . . 3ß (16 gr.).
Bálsamo de Tolú. . . . 3ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . . 3j (4 gr.).
Extr. gomoso de opio. gviij (1 dec.).
H. S. A. setenta y dos píldoras.

I. Catarros crónicos de los bronquios ó de la vejiga. *D.* Una á diez píldoras al dia.

6030. P. DE TREMENTINA MAGISTRALES.

℞ Trementina de Venecia,
Magnesia blanca, ää. . 3j (32 gr.).
H. S. A. píldoras.

Mouchon ha dado esta fórmula, y ha reconocido que la magnesia blanca daba instantáneamente mas solidez á la trementina que la magnesia calcinada. Se necesitaria tres veces otro tanto de esta última para producir el mismo efecto.

Si se usa la trementina de Burdeos, bastan para solidificarla 3vj ó 3vjß (26 gr.).

Soubeiran previene que no pueden determinarse con rigorosa exactitud estas dosis, porque las trementinas, aun las que provienen del mismo árbol, no son absolutamente semejantes á sí mismas, y cambian tambien con el tiempo; pero que las proporciones anteriores bastan casi constantemente.

I. Enfermedades de las vias urinarias. *D.* Cuatro á veinte píldoras de gjv (2 dec.).

6031. P. DE TREMENTINA OFICINALES (*Faure*) (F. P.).

℞ Trement. de Burdeos. ʒxjv (36 gr.).
Magnesia calcinada. . ʒß (2 gr.).

Se hace la mezcla y al cabo de doce horas la masa ha adquirido la consistencia de píldoras. Se hacen las píldoras de ḡvj (3 dec.) interin la masa tiene aun bastante blandura y se las conserva en licopodio. Si se tarda en hacer las píldoras, es necesario ablandar la masa en agua caliente para dividirla, y entonces las píldoras tienen menos trasparencia.

I. La misma que las anteriores. *D.* De cuatro á veinte píldoras de ḡjv (2 dec.). Es el mejor modo de administrar la trementina.

6032. P. DE LOS TRES EXTRACTOS (*Double*).

℞ Extr. de dulcamara. . ʒiij (12 gr.).
Extr. de zarzaparrilla. ʒijß (10 gr.).
Extracto de acónito. . ʒß (2 gr.).
H. S. A. cien píldoras.

I. Reumatismos crónicos, afecciones sifilíticas antiguas. *D.* Dos á ocho píldoras al día.

6033. P. DE TRIBUS CON RUIBARBO (F. M.).

℞ Ruibarbo escogido,
Agárico trociscado,
Acíbar sucotrino, ãã. . ʒj (32 gr.).
Sal catártica. . . . . ʒiij (12 gr.).

Se trituran sutilmente, y con jarabe de rosas se hace S. A. masa para píldoras.

I. Son purgantes y tónicas y promueven la menstruacion. *D.* De ʒj á ʒj (12 dec. á 4 gr.).

6034. P. DE TRIBUS (H. DE SAN JUAN DE DIOS DE MADRID).

℞ Azufre sublimado. . . . ʒj (32 gr.).
Antimonio crudo. . . . . ʒß (16 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ʒj (32 gr.).
Mercurio vivo. . . . . ʒvj (24 gr.).

Se tritura el azufre con el mercurio hasta que se extinga completamente, se mezclan el antimonio y el jabon, y con c. s. de agua se forman píldoras de gj (5 cent.).

I. Son antisifilíticas.

6035. P. DE TRONCHIN.

℞ Jabon blanco. . . . . ʒß (16 gr.).
Extracto de regaliz. . . ʒij (8 gr.).
Trementina. . . . . ḡxx (4 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Cálculos biliarios. *D.* Se toman tres píldoras tres veces al dia, y se bebe despues un vaso de suero.

6036. P. DE TURNER.

℞ Azufre dorado de antimonio,
Protocloruro de mercurio, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de fumaria,
Extracto de cicuta, ãã. gr.jv (3 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).

I. Sifílides, herpes impetiginosos. *D.* Cuatro píldoras, mañana y noche.

6037. P. DE VALERIANA.

℞ Extracto de valeriana. ʒj (4 gr.).
Castóreo. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ḡxviij (1 gr.).
Tridacio . . . . . ʒß (2 gr.).
H. S. A. treinta y seis píldoras.

I. Afecciones nerviosas. *D.* Se dan de una á seis píldoras al dia.

6038. P. DE VALERIANA, AÑIL Y OPIO (*Michel*).

℞ Extr. gomoso de opio. ḡij (1 dec.).
Añil en polvo. . . . . ḡxvj (8 dec.).
Extracto de valeriana,
Extracto de quina, ãã. ʒj (12 dec.).
H. S. A. veinticuatro píldoras.

D. Cuatro píldoras al dia, y se bebe mañana y noche una infusion de arnica.

Se ha observado que disminuyen y desaparecen despues los ataques de epilepsia traumática

6039. P. DE VALERIANATO DE HIERRO.

℞ Valerianato de hierro. ḡxviij (1 gr.).
Miel,
Malvabisco en polvo, ãã. . . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras de ḡjv (2 dec.).
I. Accidentes histéricos complicados con clorosis.

6040. P. DE VALERIANATO DE QUININA.

℞ Valerianato de quinina. . 5ß (2 gr.).
Extracto de enebro. . . . c. s.
H. S. A. veinte píldoras.
D. Dos á cinco al dia contra las calenturas intermitentes; cinco á diez contra las neurosis de tipo intermitente.

6041. P. DE VALERIANATO DE ZINC (*Devay*).

℞ Valerianato de zinc. . ḡxij (6 dec.).
Goma tragacanto. . . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. doce píldoras.
I. Son antiespasmódicas. *D.* Una píldora mañana y noche. Es malo el excipiente.

6042. P. DE VALETT CON CUBEBAS (*Puche*).

℞ Masa de píld. de Valett. ḡj (5 cent.).
Cubebas en polvo. ḡjv á ḡvj (2 á 3 dec.).
H. S. A. una píldora.
I. Blenorragias crónicas. *D.* Veinte á cincuenta píldoras al dia.

6043. P. VERMÍFUGAS.

℞ Ruibarbo en polvo. . . . 5j (4 gr.).
Mercurio dulce. . . . . 5ß (2 gr.)
Extracto de ajenjos. . . . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
D. Una á seis píldoras al dia, á los niños de dos á seis años; diez á quince á los adultos.

6044. *Otras*, n. 2.

℞ Aceite etéreo de helecho macho. . . . . gxviij (1 gr.).
Polvo de santónico. . ḡjx (50 cent.).
Extracto de ajenjos. . c. s.
H. S. A. diez píldoras.
I. Afecciones verminosas, helmintiasis. *D.* Se toma una píldora cada media hora, y se administra despues 5j á 5jß (30 á 50 gr.) de aceite de ricino.

6045. *Otras*, n. 3.

℞ Santónico. . . . . 5j (4 gr.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . . 5ß (2 gr.).
Extracto de ajenjos. . . c. s.
H. S. A. píldoras de ḡjv (2 dec.).
D. Dos píldoras para los niños de cuatro años y diez para los adultos.

6046. *Otras* (MELLIN).

℞ Asa fétida,
Hiel de vaca, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Jalapa. . . . . 5j (4 gr.).
H. S. A. píldoras de ḡijß (12 cent.).
I. Ténia. *D.* Primero diez píldoras, dos ó tres veces al dia.

6047. *Otras* (PESCHIER).

℞ Tintura etérea de renuevos de helecho. . . . . 30 gotas.
Extracto de taraxacon. . 5j (4 gr.).
H. S. A. treinta píldoras.
D. Dos, mañana y noche. Para expulsar la ténia se debe aumentar la dosis hasta treinta. Estas píldoras no fatigan el estómago.

6048. *Otras* (PESCHIER).

℞ Extracto etéreo de helecho macho. . . . . 5j (12 dec.).
Helecho macho en polv. 9ß (6 dec.).
Conserva de rosas. . . c. s.
H. S. A. doce píldoras.

6049. P. VERMÍFUGAS DE CORTEZA DE GRANADO.

℞ Polvo de corteza de raiz de granado. . . . . 5j (4 gr.).
Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).

Aceite de croton. . . . gjv (2 dec.).
Jarabe de éter. . . . . c. s.
H. S. A. quince píldoras.
I. Tenia. *D.* Cinco píldoras al dia.

6050. P. DE VIDA (*Belzeri*).

℞ Acíbar. . . . . 3viij (32 gr.).
Mirra . . . . . 3jv (16 gr.).
Almáciga. . . . . 3ij (8 gr.).
Azafran. . . . . 3j (4 gr.).
Ruibarbo,
Cubebas,
Clavo, ãã. . . . . 3ß (2 gr.).
Vinagre destilado. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
Esta fórmula es el tipo de todas las recetas de granos de vida.

6051. *Otras* (FORM. ALEM.).

℞ Acíbar. 80
Jalapa. 40
Ruibarbo. 8
Azafran. 8
Almáciga. 8
Jabon blanco. 8
H. S. A. píldoras de gv (25 cent.).
I. Se usan como tónico-purgantes. *D.* Dos á ocho píldoras al dia.

6052. P. VISCERALES.

℞ Extracto de taraxacon,
Extracto de cicuta, ãã. gxc (5 gr.).
Jabon blanco. . . . . 5ijß (10 gr.).
Acetato de potasa. . . . c. s.
Calomelanos. . . . . 3ß (2 gr.).
H. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).
I. Ictericia, hepatitis, esplenitis crónica, infartos del hígado y de las vísceras abdominales. *D.* Cuatro á seis píldoras al dia.

6053. P. DE WERNECK.

℞ Ioduro de hierro. . . . . 3j 4 gr.).
Bromuro de sodio. . . . . 3ß (2 gr.).
Extracto de genciana. . . c. s.
H. S. A. píldoras de gij (15 cent.).
I. Escrófulas, caquexia, afecciones cancerosas, amenorrea, clorosis. *D.* Dos píldoras mañana y noche.

6054. P. DE UNGUENTO NAPOLITANO (*Fouquier*).

℞ Ungüento napolitano. . . 3ij (8 gr.).
Polvo de regaliz. . . . . c. s.
H. S. A. ciento cuarenta y cuatro píldoras.
I. Fouquier empleaba comunmente estas píldoras en el tratamiento de la sífilis, y las consideraba como menos irritantes para el estómago que cualquiera otra preparacion mercurial. *D.* Pueden administrarse hasta seis píldoras al dia; se suspende su uso cuando sobreviene irritacion en la boca, para darlas de nuevo despues. Fouquier usaba con estas píldoras una tisana sudorífica y algunos baños.

6055. P. DE VERATRINA (*Simonds*).

℞ Veratrina. . . . . gj (5 cent.)
Goma aráb. en polvo. gjv (3 gr.).
Jarabe de goma. . . . c. s.
H. S. A. doce píldoras de gj (5 cent.).
I. Las mismas que el alcohol de veratrina.
Nota. Reemplazan ventajosamente á las píldoras de Bacher. *D.* Una al principio. Se puede elevar gradualmente la dosis hasta tres píldoras en el espacio del dia.

6056. *Otras* (TURNBULL).

℞ Veratrina. . . . . gj (5 cent.).
Extracto de beleño,
Polvo de regaliz, ãã. . gxij (6 dec.).
H. S. A. doce píldoras.
I. Anasarca, reumatismo crónico, neuralgia facial, gota, parálisis, amaurosis, enuresis y neuralgias. *D.* Las mismas que las anteriores.

6057. P. DE ZELLER.

℞ Protonitrato de
mercurio. . . . gx (5 dec.).

Zumo de regaliz. . gxxxvj (18 dec.).
Mézclense y háganse sesenta píldoras.

D. Una ó dos píldoras en las veinticuatro horas, aumentando la dosis hasta seis. Se emplea muy rara vez en razon de ser esta sal muy descomponible por las sustancias orgánicas.

6058. P. ZINCADAS (RADIUS).

℞ Sulfato de zinc. . . . 5j (4 gr.).
Fermentina. . . . . gxv (75 cent.).
Tormentila. . . . . gx (5 dec.).
M. S. A. treinta píldoras.

I. Catarro útero-vaginal, histérico, blenorrea, leucorrea, parálisis, corea, disenteria, epilepsia, neuralgia. *D.* Tres píldoras mañana y noche.

6059. P., DE ZUMAQUE.

℞ Extracto de zumaque,
Rob de enebro, ää. . gjx (50 cent.).
Extracto de arnica,
Extr. de valeriana, ää. 5ß (2 gr.).
Cálamo aromático. . c. s.
M. S. A. píldoras de gjv (2 dec.).

I. Hemiplegia, herpes, lepra, elefantiasis, soriasis. *D.* Una ó dos píldoras mañana y noche.

6060. P. DE ZUMAQUE AROMATIZADAS.

℞ Alcanfor.
Extracto de zumaque venenoso, ää. . . gxv (75 cent.).
Extracto de arnica,
Extracto de valeriana, ää. . . . gvx (1 gr.).
Polvo aromático. . . c. s.
M. S. A. píldoras de giij (15 cent.).

I. Hemiplegia, parálisis. *D.* Dos á tres píldoras mañana y noche.

6061. P. DE ZUMAQUE VENENOSO.

℞ Zumaque veneno. en p. gj (5 cent.).
Hoja sáliz en polvo. . . . 3j (12 dec.).
Arrope de saúco. . . . . c. s.
M. S. A. cuatro píldoras.

I. Herpes rebeldes, reumatismos crónicos, parálisis, etc. *D.* Se toman en el dia.

POCIONES.

6062. POCION ABSORVENTE Ó ANTIACIDA (H. M.).

℞ Magnesia calcinada. . 5j (4 gr.).
Agua comun. . . . . 5jv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . . 5j (30 gr.).
M. I. Acidos en el estómago, pirosis, flatuosidades y cardialgia. *D.* Una cucharada cada media hora.

6063. P. ABSORVENTE (*Ellis*).

℞ Amoniaco líquido,
Subcarbonato de potasa, ää. . . . . 5j (4 gr.).
Agua de canela. . . . 5jv (125 gr.).
M. Se puede reemplazar el subcarbonato de potasa por la magnesia calcinada.

I. Agrios, neumatoses, cólicos ventosos, eructos ácidos, escarlatina, dispepsia, meteorismo, calenturas tifoideas, nefritis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6064. *Otra* (SWEDIAUR).

℞ Ruibarbo en polvo. . 3ij (8 gr.).
Carbonato de sosa. . 3ij (24 dec.).
Jarabe simple. . . . . 3j (30 gr.).
Agua de yerbabuena. Ibß (250 gr.).
M. I. Agrios, pirosis, cardialgias. *D.* Dos cucharadas tres veces al dia. Se agita al tiempo de usarla.

6065. P. DE ACEITE DE CROTON.

℞ Aceite de croton. . . gj (5 cent.).

Aceite de alm. dulces. ʒiij (15 cent.).
Hágase una emulsion con
Goma arábiga. . . . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
Alcoholato de limon. ʒß (2 gr.).

I. Albuminuria, cólicos, hidropesía, amaurosis, estreñimiento, helmintiasis, metritis. *D.* A cucharadas de media en media hora hasta producir el efecto purgante.

6066. P. DE ACEITE DE CROTON TIGLIO, *Pocion del doctor Cory ó Pocion purgante.*

℞ Aceite de croton tiglio. 2 gotas.
Azúcar. . . . . ʒij (8 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua. . . . . ʒj (30 gr.).
Tintura de cardamomo menor. . . . . ʒß (2 gr.).

I. y *D.* Se da esta pocion á cucharadas de café hasta producir suficientes deposiciones alvinas. Los enfermos toman esta pocion sin repugnancia.

6067. P. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ʒß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . . c. s.

Se hace S. A. una emulsion con
Agua de hinojo . . . . . ʒj (30 gr.)
y se añade:
Jar. de cásc. de naranja. ʒß (15 gr.).

D. Dos cucharadas mañana y noche.

6068. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ʒj (30 gr.).
Licor de carbonato de potasa. . . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de cálamo aromát. 3 gotas.
Jar. de cásc. de naranja. ʒj (30 gr.).

D. Una cucharada mañana y noche.

6069. P. DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO Ó DE RAYA.

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ʒj (30 gr.)
Agua de laurel real. . ʒij (8 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de flor. de naranjo. ʒjß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Escrófulas, raquitis, etc. *D.* Se toma á cucharadas de hora en hora.

6070. P. DE ACEITE DE RICINO (*Righini*).

℞ Aceite de ricino puro. ʒij (60 gr.).
Yema de huevo. . . . núm. 1.
Infusion de café bueno. ʒjv (125 gr.).
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A.

6071. P. DE ACEITE DE RICINO.

℞ Loor blanco. . . . . ʒiij (90 gr.).
Agua de tilo. . . . . ʒij (60 gr.).
Aceite de ricino. ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).
Jarabe de limones. . . ʒj (30 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒjß (6 gr.).

Produce buenos efectos y está muy enmascarado el sabor del aceite de ricino.

6072. P. DE ACEITE DE RICINO EMULSIONADA.

℞ Aceite de ricino. . . . ʒjß (45 gr.).
Jar. de flor de melocot. ʒj (30 gr.).
Agua de azahar. . . . ʒß (15 gr.).
Agua comun. . . . . ʒj (30 gr.).
Yema de huevo. . . . . núm. 1.

Se mezcla en un mortero la yema de huevo con el jarabe y un poco de agua, se añade poco á poco el aceite de ricino y el resto del agua y se incorpora exactamente.

6073. P. DE ACEITE DE RICINO PARA LOS NIÑOS (*Thompson*).

℞ Agua destilada de hinojo. . . 32
Agua destilada de eneldo. . . 32

Aceite de ricino. . . . . 4 á 6
Yema de huevo. 50

H. S. A. una pocion emulsiva.

D. Una cucharadita de café dos veces al dia. Se puede añadir si hay necesidad dos gotas de láudano.

6074. P. CON ACEITE DE SABINA.

℞ Esencia de sabina. . . 1 á 6 gotas.
Jarabe de artemisa. . ℥j (30 gr.).
Agua de fl. de naranjo. ℥jv (125 gr.).

Se pesa el jarabe en una redomita y se añade el aceite esencial, se mezcla agitando y se añade poco á poco el agua destilada.

6075. P. CON EL ACEITE DE TÁRTAGO (*Martin Solon*).

℞ Aceite de tártago. . . . gtx (3 gr.).
Jarabe de báls. de Tolú. ℥j (32 gr.).
Agua de tilo. . . . ℥iij y ℥j (100 gr.).

M. D. Una cucharada de hora en hora hasta promover deposiciones de vientre.

6076. P. ACEITOSA.

℞ Infusion béquica,
Aceite de alm. dulc., ää. ℥ij (60 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Se usa en las inflamaciones de pecho para calmar la tos; es ligeramente laxante.

6077. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de alm. dulces. ℥jß (45 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥jß (45 gr.).
Goma tragacanto. . . gxv (75 cent.).
Agua de fl. de naranj. ℥jv (15 gr.).
Agua de lechuga. . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Irritacion de la membrana mucosa de los intestinos, flegmasías catarrales ó parenquimatosas de pecho, como medio á propósito para disminuir la tos. En este último caso para hacer mas fácil la expectoracion, se añade:

Quermes mineral. . . . gj (5 cent.).

Fouquier para producir una derivacion saludable hácia el conducto intestinal, sustituye el aceite de ricino al de almendras dulces.

D. A cucharadas.

6078. *Otra*, n. 3.

℞ Aceite de alm. dulces. ℥ij (60 gr.).
Goma arábiga. . . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Estreñimiento, metritis, destete, envenenamiento, cólico verminoso. *D.* En dos tomas con una hora de intervalo.

6079. *Otra*, n. 4.

℞ Goma tragac. en polvo. gx (5 dec.).
Jarabe de culantrillo. . ℥j (30 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol, se añade poco á poco y alternativamente:

Aceite de alm. dulces. ℥ß (15 gr.).
Agua de hisopo. . . . ℥iij (90 gr.).

I. Catarros y romadizos. *D.* A cucharadas. Se agita la botella al tiempo de tomar la pocion.

6080. *Otra*, n. 5.

℞ Aceite comun. . . . ℥ij (60 gr.)
Solucion de goma aráb. ℥v (150 gr.).
Jarabe de culantrillo. ℥ij (60 gr.).

M. I. Para calmar la tos y facilitar la expectoracion. *D.* A cucharadas. A veces se añade gj á gviij (5 á 40 cent.) de ipecacuana en polvo, ℥ij (60 gr.) de miel escilítica ó ℥ß á ℥j (15 á 30 gr.) de ojimiel escilítico.

6081. *Otra*, n. 6.

℞ Pocion gomosa. . . . . núm. 1.
Aceite de alm. dulces. . ℥ij (30 gr.).

M. I. Calma la tos en las inflamaciones de pecho.

6082. P. ACEITOSA PURGANTE *ó Purgante de maná.*

℞ Maná. . . . . ℥ij (60 gr.).

Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Aceite de almendras dulces. ʒij (60 gr.).

Es un purgante muy suave, que conviene en las afecciones de pecho, en las enfermedades de las recien paridas y en las enfermedades de la vejiga.

6083. P. CON EL ACETATO DE AMONIACO.

℞ Acetato de amoniaco. ʒij (8 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒß (15 gr.).
Infusion de flores de saúco,
Inf. de flor de tilo, ää. ʒjv (125 gr.).
Jarabe. . . . . ʒj (30 gr.).

I. Conviene para excitar y sostener la transpiracion.

D. Dos cucharadas cada dos horas.

6084. P. DE ACETATO DE MORFINA.

℞ Jarabe de acetato de morfina,
Agua de flor de naranjo,
Agua de laurel real, ää. ʒjß (30 gr.).

I. Flegmasías, peritonitis, metritis, neumonía, pleuresía, cardialgia, histerico, ninfomanía, sarampion, disenteria, disuria, enuresis, hemicránea, plétora, beriberi, corea, dismenorrea, dispepsia, zona, prurito, calentura bética, hemotisis, insomnio, ceática, nefritis, asma, panarizo, grietas, pedionalgia, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6085. P. CON ACETATO DE POTASA.

℞ Acetato de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de vinagre. . . ʒj (30 gr.).
Agua de canela. . . . . ʒj (4 gr.).
Infusion de tilo. . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Diurético que se usa en algunas afecciones orgánicas de las vísceras abdominales. *D.* A cucharadas.

6086. P. ÁCIDA ASTRINGENTE (H. DE M.).

℞ Acido sulfúr. alcoholiz. ʒjß (6 gr.).
Infusion de rosas rojas. ʒjv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒjß (45 gr.).

M. I. Hemorragias uterinas. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6087. P. DE ÁCIDO PRÚSICO.

℞ Pocion gomosa. . . . . ʒv (150 gr.).
Acido prúsico medicinal. 12 gotas.

Mézclese en un frasco bien tapado.

D. A cucharadas.

6088. *Otra* (MAGENDIE).

℞ Inf. de yedra terrestre. ʒij (60 gr.).
Acido prúsico medicin. 15 gotas.
Jarabe de malvabisco. . ʒj (30 gr.).

I. Tos espasmódica, coqueluche, asma, etc. *D.* Una cucharada de tres en tres horas.

6089. P. DE ACÓNITO.

℞ Alcoholaturo de acónit. gxviij (1 gr.).
Infusion de toronjil. . ʒjv (125 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Amaurosis, ceática, parálisis, cólico, efidrosis, pasmo. *D.* Se toma á cucharadas.

6090. P. AERÓFORA Ó POCION ANTIEMÉTICA (H. DE M.).

℞ Acido tártrico en polvo,
Bicarbon. de sosa. ää. gxviij (1 gr.).

Se mezclan al lado del enfermo, y al usarlos se echan en una mezcla de ʒij (60 gr.) de agua comun ó infusion de menta y ʒj (30 gr.) de jarabe simple, se agitan y se hace tomar todo.

I. Vómitos idiopáticos y simpáticos. Se repite varias veces al dia y reemplaza la pocion de Riverio.

6091. P. DE AGUA DESTILADA DE ALMENDRAS AMARGAS (*Sandelin*).

℞ Agua destilada de almendras amargas. . ʒij (8 gr.).
Tartrato de sosa. . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de grama. . . ʒij (60 gr.).

Agua destilada. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. D. A cucharadas.

6092. P. CON EL AGUA DE YERBABUENA.

℞ Eter sulfúrico. . . . ʒß (2 gr.).
Agua de yerbabuena. ℥jv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒß (15 gr.).
M. D. A cucharadas.

6093. P. ALCALINA.

℞ Bicarbonato de sosa. ʒij (8 gr.).
Agua de melisa. . . . ℥iij (100 gr.).
Jarabe de canela. . . ℥jß (50 gr.).
M. I. Tifo, cólera. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6094. P. ALCALINA GOMOSA.

℞ Carbonato de potasa. ℈xij (6 dec.).
Pocion gomosa. . . . . ℥ß (250 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒß (15 gr.).
Se usa á cucharadas de hora en hora en el tratamiento de la peritonitis puerperal.

6095. P. ALCANFORADA.

℞ Alcanfor,
Nitrato de potasa, ää. ʒj (12 dec.).
Goma arábiga. . . . ʒj (4 gr.).
Infusion pectoral. . . . ℥v (150 gr.).
Jarabe de culantrillo. ʒi (30 gr.).
I. Erecciones dolorosas en las uretritis agudas. *D.* De una vez.

6096. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . ℈xv (75 cent.).
Yema de huevo. . . . c. s.
Emulsion simple. . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe diacodion. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Blenorragia inflamatoria muy dolorosa. *D.* En cuatro dosis.

6097. P. ALUMINOSA.

℞ Alumbre. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . ℥jv (125 gr.).
Jar. simple ó de goma. ℥j (60 gr.).
H. S. A. *I.* Hemorragias uterinas pasivas, disenterias, tifo, metrorragia, pénfigo, cólico de plomo. *D.* En este último caso se da ʒij (60 gr.) cada seis horas.

6098. *Otra*, n. 2.

℞ Alumbre. . . . . ʒijß (10 gr.).
Miel rosada. . . . . c. s.
M. I. Crup. *D.* Se recorre toda la boca posterior con un pincel empapado en la pocion.

6099. *Otra* (BOUCHARDAT).

℞ Alumbre. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de rosas. . . . ℥jv (125 gr.).
Jarabe simple,
Jarabe diacodion. ää. ʒß (15 gr.).
M. I. Hemorragias uterinas pasivas. *D.* A cucharadas.

6100. *Otra* (GENDRIN).

℞ Alumbre. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . 10 gotas.
Esencia de limon. . . . 6 gotas.
Jarabe de limon. . . . ʒij (60 gr.).
H. S. A. *I.* Hemorragias uterinas pasivas, disenterias, tifo, metrorragia, pénfigo, cólico de plomo. *D.* Una cucharada cada dos horas.
Nota. No debe tomarse este remedio sino mucho tiempo despues de haber comido, y es necesario estar algun tiempo sin comer despues de haberlo tomado.

6101. P. ALUMINOSA EXCITANTE (*Rust*).

℞ Alumbre. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de menta piperita. ℥ij (60 gr.).
Tintura de canela. . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).
I. Metrorragia con atonía, anorexia, cólicos. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6102. P. ALUMINOSA TÓNICA (*Schroeder y Jahn*).

℞ Alumbre. . . . . ʒij (8 gr.).
Extracto de quina. . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de limon . . . . ʒj (30 gr.).

Agua de canela. . . . ℥vj (180 gr.).

M. S. A. I. Tifo, crup, dispepsia, calentura hética, nosocomial ó tifoidea no inflamatoria, cólicos, metrorragia, conjuntivitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6103. P. ALTERANTE (*Hagen*).

℞ Sulfuro de potasa. . ℊ̄vііj (1 gr.).
Quermes mineral. . ℊ̄jx (50 cent.).
Jarabe de poligala. . ℥ij (60 gr.).
Amoniaco anisado. . ℊ̄vііj (1 gr.).

M. I. Crup, coqueluche. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6104. P. AMARGA.

℞ Infusion ligera de centaura menor. . . . ℥jv (125 gr.).
Tintura de genciana. ʒj (4 gr.).
Jarabe de canela, Jarabe simple, ää. . ʒß (15 gr.).

M. I. Dispepsia y atonía de los órganos digestivos. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6105. P. AMONIACAL.

℞ Raiz de angélica. . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbß (250 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Extracto de genciana. ʒij (8 gr.).
Extracto de escila. . . ʒß (2 gr.).
Alcohol amoniac. anis. ʒj (4 gr.).

M. I. Embriaguez, ascitis, anasarca, hidropesias pasivas, bidroraquis, flegmasias, bronquitis, catarro crónico, pleuresía, ceática, lumbago, hemicránea, histérico, herpes, blenorragia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6106. *Otra* (CHEVALLIER).

℞ Agua destilada. . . . . ℥v (150 gr.).
Agua de menta. . . . . ʒß (15 gr.).
Amoniaco líquido. . . . 3 gotas.

M. I. Eructos ácidos. *D.* En dos tomas.

6107. P. ANALÉPTICA Y SEDANTE.

℞ Liquen islándico lavado. ℥ij (60 gr.).
Rasuras de cuerno de ciervo. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . c. s.

Se cuece y se añade:

Láudano de Sydenham. 15 gotas.

I. Tisis pulmonar acompañada de grandes dolores. *D.* Se toma poco á poco en el dia.

6108. P. DE ANGÉLICA.

℞ Agua de angélica. . . ℥iij (100 gr.).
Jarabe de menta. . . ʒiß (50 gr.).
Quermes mineral. . . ℊ̄iij (15 cent.).

I. Catarro crónico, neumonía, bronquitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6109. P. DE ANGUSTURA.

℞ Cocim. de angustura. ℥iij (96 gr.).
Agua de canela. . . . ℥v (20 gr.).
Tintura de opio. . . . ʒß (2 gr.).
Extracto de quina. . . ʒij (8 gr.).
Jar. de cásc. de naranj. ʒjß (48 gr.).

I. Astenia, calenturas intermitentes, calenturas atáxico-adinámicas, neuralgías. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6110. P. ANISADA.

℞ Esencia de anís. . . . . 12 gotas.
Alcohol. . . . . ʒijß (10 gr.).

Se disuelve y se añade:

Pocion gomosa. . . . . ℥v (150 gr.).

M. I. Flatuosidades.

6111. P. ANODINA.

℞ Agua destilada de flor de naranjo. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua dest. de toronjil. ʒiij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒjß (45 gr.).

M. D. A cucharadas.

6112. *Otra* (H. M.).

℞ Triaca magna. . . . . ʒij (8 gr.).
Infusion de tilo. . . . lbß (250 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ʒij (60 gr.).

M. I. Afecciones espasmódicas. *D.* Una cucharada cada hora.

6113. P. DE ANSERINA.

℞ Aceite de anserina. . . . 5j (4 gr.).
Azúcar,
Goma arábiga, ãã. . . . 5jß (6 gr.).
Agua de menta. . . . . 3ij (60 gr.).
M. I. Afecciones verminosas, helmintiasis. *D.* Una cucharadita de café, dos veces al dia.

6114. P. ANTIÁCIDA (*Andry*).

℞ Jarabe de malvabisco. 3j (30 gr.).
Jabon medicinal. . . . 3iij (12 gr.).
Magnesia calcinada. . 3j (4 gr.).
Agua. . . . . 3iv (125 gr.).
M. I. Envenenamiento por los ácidos concentrados. *D.* Tres cucharadas cada cinco ó seis minutos. Es muy eficaz.

6115. *Otra* (CHEVALHIER).

℞ Amoniaco líquido. . . 3 gotas.
Agua destilada. . . . 3v (150 gr.).
Agua dest. de yerbab. 3ß (15 gr.).
M. I. Eructos ácidos. *D.* En dos veces.

Añadiendo doce gotas de amoniaco en lugar de tres, se tiene la pocion contra la embriaguez.

6116. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Carbonato de potasa. . 3j (4 gr.).
Agua de menta. . . . . 3v (150 gr.).
Jar. de ráse. de naranj. 3jß (45 gr.).
M. I. Acidez de las primeras vias y calambres de estómago, cardialgias y vómitos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6117. P. ANTIJARTRÍTICA (*Perard*).

℞ Semillas de cardo santo,
Semilla de cártamo, ãã. 5x (40 gr.).
Sobretartrato de potasa,
Sen mondado, ãã. . . . 3ß (16 gr.).
Escamonea,
Raiz de zarzaparrilla,
Raiz de china,
Palo de guayaco, ãã. . 5ij (8 gr.).
Canela fina. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. *D.* 3j (4 gr.) todos los meses para prevenir los accesos de gota.

6118. P. ANTIAPOPLÉCTICA (*Most*).

℞ Pulpa de tamarindos. 3iij (90 gr.).
Se hierve en c. s. de agua para obtener lbß (250 gr.) de líquido colado, y se añade:
Nitrato de potasa. . . 5ij (8 gr.).
Sulfato de sosa. . . . 3j (30 gr.).
Tártaro emético. . . . gjß (75 mil.).
M. I. Apoplejía sanguínea, despues del uso conveniente de las sangrías. *D.* Una cucharada cada media hora.

6119. P. ANTIARTRÍTICA (*Behrends*).

℞ Flor de arnica. . . . 5ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . 3vj (180 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade S. A.:
Extracto de acónito. gvj (3 dec.).
Tintura de guayaco amoniacal. . . . 5j (4 gr.).
Jarabe de poligala virginiana. . . . . 3ß (15 gr.).
I. Gota acompañada de fiebre. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6120. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Vino de cólchico. . . . 5ij (8 gr.).
Carbonato de magnesia. 3j (4 gr.).
Agua destilada de canela,
Agua comun, ãã. . . . 3iij (90 gr.).
M. D. Una cucharada de tres en tres horas.

6121. P. ANTIASMÁTICA.

℞ Asa fétida. . . . . 5ij (8 gr.).
Espíritu de Minderero. 3j (30 gr.).
Infusion de menta pip. 3v (150 gr.).
M. D. Una cucharadita de café á los niños, y una cucharada comun para los adultos, de hora en hora.

6122. P. ANTIASMÁTICA AMONIACAL (*Van Swieten*).

℞ Carbon. de amoniaco. 5j (4 gr.).

Agua de ruda. . . . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Asma convulsivo, espasmos, astenia, envenenamientos. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6123. P. ANTICALCULOSA (*Quarin*).

℞ Gayuba. . . . . ℥ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒij (8 gr.).
Jalapa. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ℥ß (15 gr.).
Esencia de naranja. . . . 6 gotas.

M. I. Cólico nefrítico, cistitis. *D.* ʒj (4 gr.) al dia.

6124. P. ANTICATARRAL *ó Pocion espectorante.*

℞ Ojimiel escilítico. . . . ℥ß (48 gr.).
Elixir paregorico. . . . ʒiij (12 gr.).
Espíritu de espl. comp. ʒiij (12 gr.).
Agua dest. de menta. . ℥ß (48 gr.).

I. Es un excelente incisivo. *D.* Tres á cinco cucharadas al dia.

6125. P. ANTICATARRAL (*Kortum*).

℞ Alcanfor. . . . . ʒß (6 dec.).
Clorhidrato de amon. ʒij (8 gr.).
Agua dest. de saúco. ℥vij (375 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Catarros recientes sin complicacion gástrica. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6126. P. ANTICATALÉPTICA (*Schroeder*).

℞ Asa fétida. . . . . ℥ß (6 gr.).
Agua dest. de valeriana.
Ag. dest. de manz., ää. ℥iij (90 gr.).
Licor de cuerno de ciervo sucinado. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de canela. . . . ℥j (30 gr.).
Yema de huevo. . . . . c. s.

I. Catalepsia histérica. *D.* Una cucharada cada hora.

El autor aconseja al mismo tiempo el POLVO ANTICATALÉPTICO.

6127. P. ANTICOLÉRICA.

℞ Esencia real. 1
Tintura de macis. 1
Tintura de opio azafranada. 1
Éter sulfúrico. 1

M. I. Combate los vómitos. *D.* Veinte gotas cada cuarto de hora.

6128. *Otra* (AMMAN).

℞ Tint. de ámbar y almizcle comp. 4
Tintura de macis. 4
Tintura de opio azafranada. . . . 4
Éter sulfúrico. 4

M. I. Cólera. *D.* Veinte gotas cada cuarto de hora para quitar y corregir los vómitos.

6129. P. ANTICOLÉRICA ESTIMIADA.

℞ Tártaro emético. . . gvj (3 dec.).
Alcanfor,
Láudano líquido, ää. gxviij (1 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥vj (180 gr.).

M. I. Cólera, tétanos. *D.* A cucharadas de café de cuarto en cuarto de hora.

6130. P. ANTICOLÉRICA (*Radius*).

℞ Extracto de beleño. 2
Alcanfor. 2
Goma arábiga. 15
Emulsion de adormideras. . . 180
Licor de sucinato de amon. . 7 á 11
Azúcar. 30

I. Cólera, vómitos. *D.* Una cucharada cada hora al principio.

6131. *Otra* (VOGEL).

℞ Goma aráb. en polvo. ʒj (4 gr.).
Yema de huevo. . . . ʒjß (6 gr.).
Agua dest. de hinojo. ℥jß (48 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒß (16 gr.).
Jarabe de horchata. . . ℥vj (24 gr.).
Alcoholado de opio. . . 15 gotas.

H. S. A. *I.* Cólera esporádico de los niños. *D.* Una cucharadita de café cada media hora.

6132. P. ANTICRUPAL (*Albers*).

℞ Alcanfor. . . . . gr. ½ (2 cent.).
Tártaro emético. . . . gj (5 cent.).
ó Quermes mineral. . . gr. 1½ (7 cent.).
Vino de ipecacuana. ʒiij (24 dec.).
Mucil. de goma aráb. ʒij (8 gr.).

Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
I. Crup, escarlatina. *D.* A cucharaditas de café cada diez minutos.

6133. P. ANTIDIARREICA.

℞ Raiz de consuelda mayor. . . . . ℥j (30 gr.).
Raiz de serpentaria virginiana. . . . . ʒß (15 gr.).
Canela. . . . . ℥ijß (10 gr.)
Agua. . . . . c. s.
para ℥jv (125 gr.) de cocimiento, al que se añade:
Acetato de amoniaco. ℥ijß (10 gr.).
Elxir de Garus. . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe de quina. . . . ℥ijß (10 gr.).
M. I. Diarrea, disenteria crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6134. *Otra* (BERENDS).

℞ Raiz de arnica,
Colombo, ãã. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Cascarilla. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.
para obtener ℥vj (180 gr.); se cuela y se añade:
Jarabe de cáscaras de naranja. . . . . ℥jß (45 gr.).
I. Diarrea, metrorragia, histérico. *D.* Una cucharada cada hora.

1635. *Otra* (GOELIS).

℞ Colombo. . . . . ℥j (4 gr.).
Salep. . . . . ℈ß (6 dec.).
Agua. . . . . c. s.
para ℥iij (90 gr.) de cocimiento, al que se añade:
Jarabe de manzanilla. ʒß (15 gr.).
I. Diarrea de los niños. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6136. *Otra* (JAHN).

℞ Corteza de cascarilla. ℥ij (8 gr.)
Agua comun. . . . . ℥vj (180 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, se cuela y se añade S. A.
Acido nítrico alcoholiz. ℥jv (5 gr.).
Jar. de cásc. de naranj. ʒß (15 gr.).
I. Diarrea crónica. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6137. P. ANTIDISENTÉRICA (*Spielmann*).

℞ Ipecacuana. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥vij (375 gr.).
Se divide en tres partes y cada una de ellas sirve para hacer un cocimiento. La cantidad total del producto debe ser de ℥vj (180 gr.). Se añade:
Jarabe de goma. . . . . ℥ij (60 gr.).
Se administra en tres veces con tres horas de intervalo en las disenterias y en las diarreas crónicas. Es un medicamento enérgico y muy eficaz. V. *Pocion contra la disenteria, de Helvetius.*

6138. P. ANTIDISENTÉRICA (*Richter*).

℞ Extracto alcohólico de nuez vómica. . . . . ℊiv (2 dec.).
Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).
Se disuelve y se añade:
Mucilago,
Jarabe de altea, ãã. . ℥jß (50 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6139. *Otra* (REMER).

℞ Raiz de arnica. . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade S. A.:
Salep en polvo. . . . . ℥j (4 gr.).
Láud. de Sydenham. ℈j (12 dec.).
Jarabe de claveles. . ℥j (30 gr.).
I. Disenteria crónica. *D.* Una ó dos cucharadas cada hora.

6140. P. ANTIEMÉTICA.

℞ Bicarbonato de potasa. ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Disuélvase S. A.
I. Estafiloma, cólera, gastritis, gastralgia, vómitos espasmódicos, acidez de las primeras vias.

D. Una cucharada cada diez minutos, y despues otra cucharadita de café de zumo de limon.

6141. P. ANTIEMÉTICA (*Chaussier*).

℞ Agua pura. . . . . un vaso.
Azúcar blanca en polvo. ℥j (30 gr.).
Bicarbonato de potasa. . ʒij (8 gr.).
Acido tartárico en polvo. ʒj (4 gr.).

H. S. A. Se puede emplear los ácidos cítrico y oxálico concretos, y mezclarlos con los diferentes carbonatos alcalinos ó térreos, segun el objeto que se propone el médico.

I. Cólera morbo, vómitos espasmódicos rebeldes. *D.* Se toma de una sola vez, inmediatamente despues de haber hecho la mezcla.

Nota. A veces se hace tomar separadamente la sal alcalina y el ácido, para que hagan la efervescencia en el estomago.

6142. P. ANTIEMÉTICA Y ASTRINGENTE (*Barthe*).

℞ Raiz de colombo. . . ℈xxx (15 dec.).
Catecú preparado. . ʒj (4 gr.).
Corteza de Winter quebrantada. . . ℈xx (10 dec.).

Se infunde durante ocho horas en ceniza caliente con

Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se cuela y se añade:

Jar. de rosas rojas. ℥j (30 gr.).

I. Diarreas asténicas con vómitos, cólera morbo, etc. *D.* A cucharadas.

6143. P. ANTIEMÉTICA (*Dubois*).

℞ Carbonato de sosa. . . ʒj (4 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (90 gr.).
Vinagre muy fuerte. . ℥ij (60 gr.).
Ojimiel. . . . . ℥j (30 gr.).

D. De una vez, inmediatamente despues de la mezcla.

6144. *Otra* (GALLEREUX).

℞ Infusion de flor de amapolas. . . . . ℥v (150 gr.).
Agua de azahar. . . . ℥j (30 gr.).
Ipecacuana. . . . . ℈xv (75 cent.).
Jarabe diacodion. . . ℥ß (15 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 40 gotas.

M. D. Una cucharada cada media hora.

6145. P. ANTIEMÉTICA DE RIVERIO *ó Pocion gaseosa* (F. F.).

℞ Jarabe de limones. . . ℥j (32 gr.).
Zumo de limon. . . . . ℥ß (16 gr.).
Agua comun. . . . . ℥iij (96 gr.).
Bicarbonato de potasa. ʒß (2 gr.).

Se mezclan en una botella, que se tapa inmediatamente.

Es mas ventajoso que el enfermo tome separadamente la sal alcalina y los ácidos, á fin de que se haga la efervescencia en el estómago mismo; entonces es necesario preparar la pocion del modo siguiente:

Bicarbonato de potasa. ʒß (2 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ℥ß (16 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (64 gr.).

Se mezclan en una botella. Por separado se toman:

Zumo de limon. . . . ℥ß (16 gr.).
Jarabe de limon. . . . ℥j (32 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (64 gr.).

Se mezclan en otra botella.

I. Es útil para combatir el vómito, ya sea producido por una gastralgia ó por cualquiera otra afeccion del estómago, en el histerismo, en las enfermedades de las vias digestivas, en los casos de lentitud en la digestion, etc. *D.* Se hacen tomar sucesivamente al enfermo partes iguales de estas pociones.

6146. P. ANTIEPILÉPTICA (*Pii*).

℞ Zumo exprimido de galio. . . . . ℥v (150 gr.).
Vinagre de ruda. . . . ℥ijß (40 gr.).
Tintura de castóreo. . ℈xviij (4 gr.).
Jarabe de cantueso. . ℥j (30 gr.).

M. I. Epilepsia. *D.* En dos veces antes del acceso.

6147. P. ANTIEPILÉPTICA AMONIACAL.

℞ Agua de peonia. . . . ℥ij (60 gr.).

Jarabe de valeriana. . ʒiß (45 gr.).
Cloruro de plata y amoniaco. . . . . 10 gotas.
I. Epilepsia. *D.* A cucharadas.

6148. P. ANTIEPILÉPTICA OPIADA.

℞ Nitrato de plata cristalizado. gr½ (2 cent.).
Agua destilada. . . . . ʒij (60 gr.).
Tintura de opio. . . . . 9ß (6 dec.).
Muc. de goma arábiga. ʒj (30 gr.).
M. Nota. Se puede aumentar sucesivamente la dosis del extracto hasta griij (15 cent.). *I.* Epilepsia, enfermedades convulsivas, parafimosis. *D.* Una cucharada tres veces al dia.

6149. P. ANTIESCORBÚTICA.

℞ Jarabe de quina. . . . ʒj (30 gr.).
Agua de fumaria ó de menta. . . . . ʒjv (125 gr.).
Alcoholato de cochear. ʒij (8 gr.).
Zumo de limon. . . . ʒj (30 gr.).
I. Es antiescorbútica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6150. *Otra*, n. 2.

℞ Berro,
Cochearia,
Rábano rusticano, ää. ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . . lbj (500 gr.).
Se infunde durante una hora, se cuela y se añade:
Jarabe de genciana. . ʒj (30 gr.).
Carbonato de potasa. . gr̄xc (5 gr.).
I. Escorbuto, estomacace, liquen, lupus, lepra. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6151. *Otra* (*Frank*).

℞ Cocimiento de quina. . ʒv (160 gr.).
Agua espirit. de canela. ʒij (64 gr.).
Jarabe de adormideras. ʒj (32 gr.).
Extracto de quina. . . ʒvj (24 gr.).
H. S. A. *I.* Escorbuto que ha llegado á su mayor grado. *D.* Una cucharada cada media hora.

6152. P. ANTIESCROFULOSA.

℞ Carbonato de sosa. . . ʒj (4 gr.).
Agua de manzanilla. . ʒiij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de genciana. . ʒj (30 gr.).
Tint. de quina amar. ʒj (4 gr.).
Se da á cucharadas.

6153. *Otra*, n. 2.

℞ Cloruro de bario. . . . gr̄ij (1 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒvj (180 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒjß (45 gr.).
M. D. A cucharadas, tres ó cuatro veces al dia.

6154. *Otra*, n. 3.

℞ Carbonato de sosa. . . . ʒß (2 gr.).
Tintura de genciana. . . ʒj (30 gr.).
M. A veces se sustituye el carbonato de amoniaco al de sosa. *D.* A cucharadas.

6155. *Otra* (CIMA).

℞ Cloruro de calcio fundido. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . ʒvij (210 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒi (30 gr.).
H. S. A. *I.* Afecciones escrofulosas, coxalgia, bocio, al principio de ciertos casos de tisis, raquitis, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6156. *Otra* (HENN).

℞ Acetato de potasa. . . gr̄xc (5 gr.).
Extracto de cicuta. . . gr̄jv (2 dec.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe de adormider. ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Atrofia mesentérica. *D.* Una cucharada de café cuatro veces al dia.

6157. P. ANTIFEBRIL (H. DE AL.).

℞ Acido clorhídrico,
Eter sulfúrico, ää. . . ʒij (60 gr.).
Agua de canela. . . . lbß (250 gr.).
Jarabe de frambuesas. ʒiij (90 gr.).
M. I. Calenturas graves. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6158. P. ANTIGALACTOPOYÉTICA (*P. Frank*).

℞ Mirra. . . . . 3j (4 gr.).
Infusion ligera de manzanilla. . . . . 3vj (180 gr.).
Agua dest. de canela. 3j (30 gr.).

Se disuelve triturando en un mortero, se cuela y se añade:

Tart. de hierro soluble. 9j (12 dec.).
Jarabe de corteza de naranja. . . . . 3j (30 gr.).

I. Galactirrea. *D.* Una cucharada cada tres horas.

6159. P. ANTIGONORRÉICA (*Handel*).

℞ Extr. de nuez vómica. 3ß (2 gr.).
Agua de pepinos. . . . 3vj (180 gr.)
Aceite de linaza. . . . 3j (30 gr.).
Miel blanca. . . . . 3ß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.

M. D. Una cucharada cada dos horas.

6160. *Otra* (PIERQUIN).

℞ Cubebas en polvo. . . . 3ij (8 gr.).
Vino. . . . . 3ij (60 gr.).
Esencia de bergamota. . una gota.

M. D. Se da esta pocion cada dos horas hasta que cese el flujo. Se administra despues algunas píldoras mercuriales con un medio profiláctico.

6161. P. ANTIESPASMÓDICA.

℞ Acido nítrico alcoholizado,
ó Acido sulfúrico alcoholizado. . . . . 3ij (8 gr.).
Infusion de tilo. . . . 3iv (125 gr.).
Agua de flores de nar. 3ß (15 gr.)
Jarabe de claveles. . . 3j (30 gr.).

M. I. Afecciones histéricas. *D.* A cucharadas.

6162. *Otra*, n. 2.

℞ Jar. de flor de naranjo. 3j (30 gr.).
Agua destilada de lechuga,
Agua dest. de tilo, ää. 3ij (60 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 30 gotas.
Láudano de Sydenham. 10 gotas.

D. A cucharadas de hora en hora, ó cada dos horas; se agitará la botella al tiempo de tomar la pocion.

6163. *Otra*, n. 3.

℞ Eter sulfúrico. . . . 3ß (2 gr.).
Jar. de flor de naranjo. 3j (30 gr.)
Agua destil. de tilo. 3iv (125 gr.)

H. S. A. *I.* Hipo, tos convulsiva incipiente, tos sufocante, cólicos, histéricos, síncopes, lipotimias, estupor y delirio de las calenturas graves, etc. En este último caso se puede reemplazar el éter por la tintura de almizcle.

6164. *Otra*, n. 4.

℞ Tintura de castóreo. . 3j (4 gr.).
Infusion de toronjil. . 3v (150 gr.).
Jarabe de cantueso. . 3j (30 gr.).

Mézclese.

6165. *Otra*, n. 5.

℞ Agua destilada de tilo,
Agua destilada de melisa,
Agua destilada de lechuga, ää. . . . . 3ijß (45 gr.).
Agua dest. de azahar. 3ß (15 gr.)
Eter sulfúrico. . . . 20 gotas.
Jar. de flor de naranjo. 3j (30 gr.).

M. S. A. *D.* A cucharadas.

6166. *Otra*, n. 6.

℞ Amoniaco líquido. . . 3j (4 gr.).
Tintura de castóreo,
Tint. de asa fétida, ää. 3ß (16 gr.).
Ag. de menta piperita. 3vj (192 gr.).
Jar. de cásc. de nar. 3x (40 gr.).

I. Asma, ataxia, caquexia, esofagismo, amenorrea, polidipsia, escarlatina, histérico, dismenorrea, ninfomanía, neurosis, angina, espasmo, sudor inglés, síncopes, tétanos, caquexia serosa, tifo, beriberi, crup, hematocele, neuralgia. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6167. *Otra* (*V. F.*).

℞ Jarabe de azahar. . . 3ij (32 gr.)

Agua destilada de tila. ℥ij (64 gr.).
Agua destil. de azahar. ℥ij (64 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 5ß (2 gr.).

Se mezclan en una botellita y se tapan perfectamente.

I. Afecciones espasmódicas de los órganos pulmonares ó gástricos, corea, histérico, etc., y en las flegmasías que se presentan desde el principio con síntomas atáxicos. *D.* A cucharadas.

6168. P. ANTIESPASMÓDICA.

℞ Agua de hinojo. . . . . ℥vj (180 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. . . . . 5ij (8 gr.).
Tintura de castóreo. . 5j (4 gr.).
Láudano líquido. . . . 5ß (2 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ℥j (30 gr.).

M. I. D. A cucharadas de hora en hora.

6169. *Otra* (FORGET).

℞ Agua dest. de melisa. ℥jv (125 gr.).
Licor de Hoffmann. . 20 gotas.
Tintura de castóreo. 5ß (2 gr.).
Jar. de cásc. de naranja. ℥j (30 gr.).

M. D. A cucharadas de hora en hora.

6170. P. ANTIESPASMÓDICA AMONIACAL.

℞ Almizcle. . . . . ĝjx (50 cent.).
Jar. de báls. del Perú. ℥j (30 gr.).
Oleosacaro de melisa. ℥ij (60 gr.).
Carbonato de amoniaco,
Conserva de rosas rojas, ãã. . . . . 5ijß (10 gr.).

M. I. Dismenorrea, histérico, amenorrea, gastritis, peritonitis, sarampion, ninfomanía, diarrea crónica, escarlatina (retroceso), angina, espasmo, síncopes, tétanos, crup, sudor inglés, tifo, neuroses, polidipsia, embriaguez, neuralgias. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6171. P. ANTIESPASMÓDICA ANISADA.

℞ Esencia de anís. . . . . 40 gotas.
Eter sulfúrico. . . . . 24 gotas.
Láudano de Sydenham. 20 gotas.
Jarabe simple. . . . . ℥iß (45 gr.).
Agua. . . . . ℥v (150 gr.).

Se usa en los cólicos ventosos espasmódicos.

6172. P. ANTIESPASMÓDICA (*Wendt*).

℞ Asa fétida. . . . . 5ß (2 gr.).
Almizcle. . . . . ĝviij (4 dec.).
Mucíl. de goma aráb. ℥j (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.).

Se tritura en un mortero de mármol, y despues se añade poco á poco:

Agua destilada. . . . . ℥ijß (75 gr.).

M. I. Crup, laringitis espasmódica. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6173. *Otra* (WENDT).

℞ Valeriana quebrantad. ĝxc (5 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (96 gr.).

Se infunde y se añade:

Almizcle. . . . . ĝviij (4 dec.).
Tintura de ambar. . ℥ijß (10 gr.).
Jar. de flor de naranj. ℥v (20 gr.).

H. S. A. *I.* Laringitis espasmódica. *D.* Una cucharada de media en media hora. Al mismo tiempo se prescriben las lavativas de asa fétida.

6174. P. ANTIESPASMÓDICA EMULSIVA (*Richter*).

℞ Aceite de beleño. . . ℥ß (16 gr.).
Goma aráb. en polvo. ℥vj (24 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (32 gr.).
Agua destilada de cerezas negras. . . . ℥vj (192 gr.).

I. Hemotísis, cuando es espasmódica ó los enfermos muy irritables. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6175. P. ANTIESPASMÓDICA MOSCADA.

℞ Agua de tilo,
Agua de azahar, ãã. . . ℥ij (60 gr.).
Tintura de almizcle. . 20 gotas.

Jarabe de éter,
Jarabe de azahar, ãã. . 5jv (15 gr.).
Mézclese.

6176. P. ANTIESPASMÓDICA ETÉREA.

℞ Jarabe de extr. de opio. ℥j (30 gr.).
Agua destilada de tilo,
Ag. dest. de azahar, ãã. ℥ij (60 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ℥ß (2 gr.).

Se pesan en una botella de vidrio de cuello vuelto, primeramente los jarabes, despues las aguas destiladas y por último el éter sulfúrico, y se tapa al instante.

6177. P. ANTIFLOGÍSTICA Y SUDORÍFICA.

℞ Emético. . . . . ℔vj (3 dec.).
Miel blanca. . . . . ℥ß (15 gr.).
Inf. de flor de saúco. Ibij (1000 gr.).

M. I. Afecciones reumáticas y gotosas. *D.* A tazas pequeñas.

6178. P. ANTIGONORRÉICA (*Delpech*).

℞ Agua de yerbabuena,
Agua de flores de naranjo,
Jarabe de limon,
Bálsamo de copaiba, ãã. ℥j (30 gr.).
Acido sulfúrico. . . . . ℥j (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . c. s.

M. S. A. *D.* Una cucharada, mañana y noche; cuando es difícil la digestion del bálsamo de copaiba, se añade á esta pocion de ocho á quince gotas de láudano líquido de Sydenham.

6179. P. ANTIHELMÍNTICA.

℞ Santónico en polvo. . ʒß (2 gr.).
Jarabe de flores de melocoton . . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de lechuga. . . . ℥v (150 gr.).

H. S. A.

6180. *Otra* (H. DE M.).

℞ Ruibarbo quebrantado. ℥ij (24 dec.).
Santónico. . . . . ʒij (8 gr.).

Se infunde en cantidad suficiente de agua para obtener ℥xij (375 gr.) de líquido, se cuela y se añade:

Jarabe de achicorias con ruibarbo. . . . . ℥j (30 gr.).

D. En dos tomas.

6181. *Otra* (SCHWART).

℞ Petroleo. . . . . ʒß (16 gr.).
Tintura de asa fétida. . ʒvß (22 gr.).

I. Ténia. *D.* Cuarenta gotas tres veces al dia.

6182. P. ANTIHEMICRÁNICA.

℞ Carbonato de amon. ℔xviij (1 gr.).
Tintura de pimiento. . ʒß (2 gr.).
Jarabe de azafran,
Jarabe de flores de naranjo, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Agua de laurel real,
Agua de menta piperita, ãã. . . . . ℥jß (45 gr.).

I. Hemicránea, insomnio, pesadilla, escarlatina. *D.* Dos cucharadas mañana y noche.

6183. P. ANTIHEMICRÁNICA OPIADA.

℞ Láudano líquido. . . . ℔xviij (1 gr.).
Tintura de ipecacuana. ʒß (2 gr.).
Acetato de amoniaco líquido. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de menta piper. ℥jß (45 gr.).
Jarabe de belladona. . ℥j (30 gr.).

I. Jaqueca, hemicránea, cefalalgia, hemotisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6184. P. ANTIHEMORRÁGICA (*Laidlamo*).

℞ Acetato de plomo. . ℔xvj (8 dec.).
Tintura de opio. . . . ℥j (4 gr.).
Vinagre comun. . . . ℥jß (45 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Hemorragias pasivas, principalmente en los casos de hematemesis ó cuando una metrorragia hace temer un aborto. *D.* Una cucharada cada cuatro horas.

6185. P. ANTIHIDRÓPICA (*Leake*).

℞ Carbonato de potasa purificado. . . . . 3ij (8 gr.).
Vinagre escilítico. . . . . c. s.

Se tritura para saturarle completamente, y despues se añade S. A.

Agua destilada de canela. ℥ij (60 gr.).
Alcoholado de opio. . . . 30 gotas.

I. Ascitis, especialmente la que sigue á las pirexias intermitentes. *D.* En tres dosis iguales, por la mañana, al medio dia y por la noche.

6186. *Otra* (SCHMIDT).

℞ Digital en polvo. . . . 9j (12 dec.).
Genciana quebrantad. 5j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (480 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).

I. Ascitis esencial. *D.* Una cucharada de hora en hora. Se auxilia la accion de este remedio con el linimento estimulante del mismo autor, y despues con los ferruginosos asociados á los amargos aromáticos especialmente el ruibarbo, y se continúa usando estos últimos medios hasta que las orinas salgan claras.

6187. P. ANTIHISTÉRICA *ó Pocion con sustancias fétidas* (F. F.).

℞ Tintura de castóreo. . . 5ß (2 gr.).
Agua destilada de valeriana,
Agua destilada de flor de naranjo, ãã. . . . . ℥ij (64 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 5j (4 gr.)
Jarabe de artemisa compuesto. . . . . ℥j (32 gr.).

Se mezcla la tintura alcohólica y el jarabe, se añade despues las aguas destiladas, en seguida el éter y se tapa exactamente.

I. Histérico, neurosis. Produce tambien buenos efectos en la amenorrea y dismenorrea de las cloróticas y aun de las mujeres de constitucion fuerte, cuando dependa de un estado espasmódico de la matriz. *D.* Se toma á cucharadas.

6188. P. ANTIHISTÉRICA (*Josat*).

℞ Cianuro de potasio. . . ℊj (5 cent.).
Agua destilada de lechuga virosa. . . . . ℥ij (64 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . . . ℥j (32 gr.).

M. D. A cucharadas.

6189. P. ANTICTÉRICA (*Baldinger*).

℞ Ipecac. quebrantada. 3jß (6 gr.).
Cáscara de naranja. . 3ij (8 gr.).
Bitartrato de potasa. . 3j (4 gr.).
Agua comun. . . . . ℥v (150 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la quinta parte, se cuela y se añade:

Jarabe de manzanilla. ℥j (30 gr.).

I. Ictericia espasmódica. *D.* Una cucharada cada tres horas.

6190. P. ANTILÍSICA (*Selle*).

℞ Acetato de amoniaco líquido. . . . . ℔ß (250 gr.).
Triaca de Venecia. . . ʒß (15 gr.).
Subcarb. de amoniaco. 3ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
Carralejas. . . . . número 8.

H. S. A. *I.* Hidrofobia y casos que exigen una fuerte evacuacion por los sudores y las orinas.

D. Una cucharada de hora en hora ó cada media hora.

6191. P. ANTIMETRORRAGICA (*Osiander*).

℞ Extr. de cort. de sauce. 5jß (6 gr.).
Alumbre. . . . . 5ß (2 gr.).
Hidrolato de canela. . ℥v (150 gr.).
Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).

I. Metrorragia asténica. *D.* Dos cucharadas cada veinte á treinta minutos.

6192. P. ANTIMONIAL.

℞ Antimonio diaforético lavado,
ó Acido antimónico. . . 3j (4 gr.).
Goma tragacanto. . . ℊxvj (8 dec.).

℞ Ag. de flor de naranjo. ℥j (30 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

I. Pleuroneumonía. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6193. P. ANTIMONIAL (H. M.).

℞ Tártaro emético. . . ℊj (5 cent.).
Agua comun. . . . . ℥xij (375 gr.).

Disuélvase. *D.* En tres dosis al dia.

6194. P. DE ANTIMONIO DIAFORÉTICO.

℞ Antimonio diafor. lavado. ʒj (4 gr.).
Pocion gomosa de la F. F. núm. 1.

M. I. Reumatismo articular agudo. *D.* A cucharadas.

6195. P. ANTINEFRÍTICA (*Williams de Norford*).

℞ Cocimiento de cebada perlada. . . . . Jbij (1000 gr.).
Goma arábiga. . . . ℥iij (90 gr.).
Agua de bayas de enebro compuesta. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de altea. . . . ℥jß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Cólico nefrítico. *D.* La mitad de la dosis indicada al dia.

6196. P. ANTIPERIÓDICA.

℞ Sulfato de quinina. . . ℊviij (4 dec.).
Ácido sulfúrico. . . . . una gota.
Jarabe de goma. . . . ℥ij (60 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iv (125 gr.).

Disuélvase. *I.* Apirexia de las calenturas intermitentes. *D.* En tres ó cuatro dosis, y la última dos horas antes del acceso venidero.

6197. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina. . ℊxij (6 dec.).
Sulfato de morfina. . ℊiij (15 cent.)
Agua de Rabel. . . . ℊx (5 dec.).
Oleosácaro de menta. ℊxc (5 gr.).
Jarabe de quina,
Jar. de genciana, ää. ℥j (30 gr.).
Agua de laurel real. . ℥iij (90 gr.).

I. Calenturas intermitentes ó remitentes perniciosas, neuralgias intermitentes y periódicas. *D.* En cuatro tomas de dos en dos horas.

6198. P. ANTIRAQUÍTICA (*Freiler*).

℞ Raiz de rubia. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua comun. . . . . ℥vj (192 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la sesta parte, se cuela y se añade:

Agua destilada de canela vinosa. . . . . ℥j (32 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . ℥vj (24 gr.).

D. Una cucharada cada dos horas.

6199. P. ANTIREUMATICA (*Wardelevorth*).

℞ Ioduro de potasio. . . ℥ß (2 gr.).
Agua de menta. . . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe de azafran. . . ℥ß (15 gr.).

M. I. Reumatismo articular agudo. *D.* ℥j (30 gr.) tres veces al dia.

6200. P. ANTISÉPTICA.

℞ Serpentaria virginiana,
Quina calisaya, ää. . ʒij (8 gr.).

Se infunde en

Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).

Se cuela y se añade:

Jarabe simple. . . . . ℥jß (45 gr.).
Acetato de amoniaco. ℥ß (15 gr.).

D. A cucharadas de hora en hora.

6201. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . ℊjx (50 cent.).
Tintura de canela. . ʒijß (10 gr.).
Jarabe. . . . . ℥j (30 gr.).

Se trituran en un mortero de vidrio y se añade:

Cocimiento de quina. ℥iv (125 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒij (8 gr.).

I. Calentura tifoidea ó atáxica, gangrena de hospital, adinamia con disposicion gangrenosa, orlin, escorbuto, cólera, sudor inglés, bronquitis, hemotisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6202. *Otra*, n. 3.

℞ Alcanfor. . . . . ℊx 5 dec.

Cocimiento de quina. ℥jv (125 gr.).
Tintura de canela,
Acet. de amoniaco, ãã. ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Calenturas graves con adinamia, amenorrea, sudor inglés, tétanos, calentura tifoidea, calentura atáxica, gangrena, astenia, efidrosis, gangrena de hospital, hemicránea, cólera, crup, orlin, neuralgias. *D.* A cucharadas.

6203. P. ANTISÉPTICA.

℞ Quina amarilla. . . . ℥ß (15 gr.).
Serpentar. virginiana. ℥ij (8 gr.).
Se hierve en
Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Se cuela y se añade:
Jar. de báls. de Tolú. ℥jß (45 gr.).
Alcanfor diluido en
la cuarta parte de
una yema de huevo. ℊxviij (1 gr.).

Se toma á cucharadas en el período de putridez de las afecciones tifoideas.

6204. P. ANTISÉPTICA ALCANFORADA.

℞ Infusion de ℥ij (8 gr.)
de serpentaria virginiana. . . . . ℥jv (125 gr.).
Tintura de quina. . . ℥ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxij (6 dec.).
Acetato de amoniaco,
Jarabe de qüina, ãã. ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Período de putridez de las calenturas tifoideas, fiebres adinámicas con disposicion á la gangrena. *D.* A cucharadas.

6205. P. ANTISÉPTICA TÓNICA.

℞ Quina gris. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de adormideras. ℥ij (60 gr.).
Acetato de amoniaco,
Tintura de canela, ãã. ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥iv (125 gr.).
ó Agua de menta rizada,
Agua de flor de naranjo, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Calenturas graves con postracion de fuerzas, escorbuto, gangrena de hospital, astenia, calenturas atáxico-adinámicas ó tifoideas, cólera, efidrosis, neuralgias. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

6206. P. ANTISIFILÍTICA.

℞ Sublimado corrosivo. ℊij (10 cent.).
Agua destilada. . . . ℥vj (24 gr.).
Alcoholato de canela,
Jarabe simple, ãã. . ℥j (32 gr.).

M. Cada cucharada que pesa ℥v (20 gr.), contiene ℊ$^1_{10}$ (18 mil.) de sublimado.

D. Una ó dos cucharadas, dos ó tres veces al dia.

6207. *Otra* (H. M.).

℞ Sublimado corrosivo. ℊiij (15 cent.).
Alcohol comun. . . . ℥vj (180 gr.).

M. D. Media cucharada en un vaso de cocimiento sudorífico.

6208. *Otra* (H. M. F.).

℞ Solucion de deutocloruro de mercurio. . ℥ijß (10 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Agua dest. ó de lluvia. ℥ij (96 gr.).

H. S. A. Dos dracmas y media (10 gr.) de la solucion, contienen ℊ$^1_{10}$ (1 cent.) de deutocloruro.

6209. *Otra* (MENDAGA).

℞ Cianuro de mercurio. ℊvj (3 dec.).
Agua destilada. . . . ℥vj (180 gr.).
Láudano líquido. . . . ℥ß (2 gr.).

D. Una cucharada mañana y noche en un cocimiento de zarzaparrilla.

6210. *Otra* (PARENT).

℞ Agua destilada. . . . . ℥v (100 gr.).
Alcohol rectificado. . . ℥v (150 gr.).
Extracto alcohólico de
boj. . . . . ℥vj (24 gr.).
Extracto de acónito. . ℥ij (8 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ℥iij (12 gr.).
Cianuro de mercurio. . ℊxvj (8 dec.).
Esencia de sasafrás. . 15 gotas.
Jarabe simple. . . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *D.* Dos cucharaditas de café al dia, que se aumenta gradualmente hasta dos cucharadas grandes.

6211. P. ANTITETÁNICA (*Fournier*).

℞ Infusion muy fuerte de flores de arnica. . . ℥jv (125 gr.).
Agua de Luce. . . . . ℥ij (8 gr.).
Alcanfor,
Almizcle puro, ää. . . ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Mordedura de animales venenosos, hidrofobia, tétanos. *D.* Una cucharada de hora en hora.

Nota. Se pueden añadir ℥ij ó ℥jv (8 á 16 gr.) de nitrato de potasa, segun el estado del aparato urinario.

6212. P. ANTITENÁNICA ESTIBIADA (*Foy*).

℞ Tártaro emético. ℊviij á ℊxij (4 á 6 dec.).
Infusion de arnica. . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de valeriana. ℥j (30 gr.).

M. I. Tétanos, ceática, corea, conjuntivitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6213. P. ANTITETANICA DE FOUQUIER (H. DE M.).

℞ Almizcle,
Alcanfor, ää. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua destil. de melisa. ℥ij (60 gr.).
Infusion muy fuerte de flor de arnica. . . ℥jv (125 gr.).

Se pulveriza el alcanfor con unas gotas de alcohol, se interpone juntamente el almizcle por medio de un poco de mucílago de goma arábiga, y se deslie en el líquido.

I. Mordeduras de animales venenosos, hidrofobia, tétanos. *D.* A cucharadas de hora en hora. Se puede añadir dos, tres y hasta ℈jv (5 gr.) de nitro, segun el estado del aparato urinario.

6214. P. ANTITÍSICA (*Amelung*).

℞ Acetato de plomo. . . ℊij (1 dec.).
Extracto de beleño. . ℊj (5 cent.).
Agua destilada. . . . . ℥vj (180 gr.).

Disuélvase. *D.* Se da una cucharada cada dos horas.

6215. *Otra* (EBENS).

℞ Creosota. . . . . 2 á 4 gotas.
Mucíl. de goma arábiga. ℥j (30 gr.).
Infusion de salep. . . . ℥v (150 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (4 gr.).

I. Diarreas colicuativas de los tísicos. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6216. P. ANTIVOMITIVA.

℞ Raiz de colombo. . . . ℥j (4 gr.).

Se hierve en ℥x (320 gr.) de agua hasta que se reduzca un tercio, se cuela y se añade:

Carbonato de potasa. . ℈j (12 dec.).
Zumo de limon. . . . . ℥vj (24 gr.).
Láudano líquido. . . . 24 gotas.

D. Una cucharada cada tres cuartos de hora. Se tendrá en una botellita muy bien tapada.

6217. P. APERITIVA.

℞ Cocimiento de las cinco raices. . . . . ℥v (150 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . ℈j (12 dec.).
Acetato de amoniaco. ℥ß (15 gr.).

H. S. A. una pocion.

I. Hidropesías. *D.* Una cucharada.

6218. *Otra*, n. 2.

℞ Extr. de milenrama. . ℥ß (15 gr.).
Infus. ligera de manzanilla. . . . . ℥vj (180 gr.).
Tierra foliada de tártaro. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de canela hordeada. . . . . ℥ij (60 gr.).

I. Infartos de las vísceras abdominales á consecuencia de las calenturas intermitentes, inercia de los órganos digestivos que acompaña á la hipocondría. *D.* Una cucharada tres veces al dia. Se bebe despues una taza de caldo de ℥jv (125 gr.) de pescuezo de carnero, un puñado de hojas de achicorias amargas, diente de leon y berros.

6219. P. AROMÁTICA.

℞ Esencia de naranjo. . gvj (3 dec.).

Esencia de romero. . ℈jv (2 dec.).
Alcohol. . . . . ʒij (8 gr.).
Se disuelve y se mezcla con
Jarabe de goma. . . . ʒij (64 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
D. Se toma á cucharadas.

6220. P. AROMÁTICA *ó Pocion cordial* (F. F.).

℞ Jarabe de claveles. . . ʒj (32 gr.).
Alcoholato de canela. . ʒjv (16 gr.).
Confeccion de jacintos. ʒij (8 gr.).
Agua de menta piperita,
Agua de azahar, ää. . . ʒij (64 gr.).
Se mezclan las aguas destiladas, el alcoholato y el jarabe, y se desliе la confeccion de jacintos en el líquido.
I. Es estimulante y tónica y conviene á los individuos debilitados por enfermedades largas, y en la atonía del estómago. *D.* Una cucharada cada hora.

6221. P. DE ARNICA (*Rener*).

℞ Raiz de arnica. . . . . ʒß (16 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ʒvj (192 gr.).
Se infunde y se añade:
Salep en polvo. . . . . ℈xc (5 gr.).
Láudano líquido de Sydenham. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe aromático. . . . ʒjß (48 gr.).
I. Disenteria, diarrea crónica, infartos abdominales, parálisis. *D.* Dos cucharadas de hora en hora.

6222. P. DE ARSENIATO DE AMONIACO.

℞ Arseniato de amoniac. ℈viij (4 dec.).
Agua de saúco. . . . . ℔ß (250 gr.).
Espíritu de angélica. . ʒß (15 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes, herpes, afecciones cutáneas, escrófulas. *D.* ℈xviij á ℈xxxvj (1 á 2 gr.) al dia.

6223. *Otra*, n. 2.

℞ Agua de tilo,
Agua de hinojo, ää. . ʒjß 48 gr.).
Jarabe de amapola,
Jarabe de flor de naranjo, ää. . . . . ʒv (20 gr.).
Almizcle. . . . . ℈v (25 cent.).
Arseniat. de amoniac. ℈jv (20 cent.).
I. Coqueluche, asma, histérico, calenturas intermitentes, catarro. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6224. P. ARSENICAL.

℞ Solucion de Fowler. . . 60 gotas.
Tintura de opio. . . . . 30 gotas.
Alcoholato de espliego. ℈xc (5 gr.).
Agua de canela. . . . . ʒß (15 gr.).
Jar. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
I. Sifílides, apirexia de las calenturas intermitentes. *D.* Una cucharadita de café, cada tres horas.
Nota. Cada cucharadita contiene ⅛ de grano (8 mil.) de arsenito de potasa.

6225. P. DE ASA FÉTIDA (*Millar*).

℞ Asa fétida. . . . . ʒij (8 gr.).
Acetato de amoniaco. . ʒj (30 gr.).
Agua de poleo. . . . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Crup, histérico. *D.* Se toma á cucharadas.

6226. P. ASTRINGENTE.

℞ Carbonato de potasa. ʒj (4 gr.).
Agua de flor de saúco. ʒvj (180 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
I. Angina tonsilar acompañada de aftas, fiebres catarrales violentas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6227. *Otra*, n. 2.

℞ Extracto de ratania. . ʒij (8 gr.).
Jarabe de vinagre con frambuesas. . . . . ʒj (32 gr.).
Infusion de rosas rojas. ʒiij (96 gr.).
M. Se puede poner el extracto de catecú en lugar del de ratania.
I. Hemorragias, diarreas, flujos atónicos. *D.* A cucharadas en el dia.

6228. P. ASTRINGENTE.

℞ Cocim. de tormentila. ℥jv (125 gr.).
Jarabe de arándano. . ℥j (30 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ℥jß (6 gr.).
Goma quino. . . . . ℈j (12 dec.).
Agua de Rabel. . . . . 15 gotas.

Se diluye el bálsamo de copaiba en un poco de yema de huevo y del mismo modo la goma quino.

I. Hemorragias, lienteria y gonorrea crónica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6229. *Otra* (CLARUS).

℞ Acido sulfúr. debilit. ℥j (4 gr.).
Ag. de cerezas negras. ℥jv (125 gr.).
Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).

M. I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6230. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Agua destil. de rosas. ℥jv (125 gr.).
Extracto de ratania. . ℈ij (24 dec.).
Jarabe de vinagre ó diacodion. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Disenteria crónica, cuando ha cesado la inflamacion, y hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6231. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Extracto de quina,
Tintura de canela, ää. ßß (2 gr.).
Jarabe de membrillo. . ℥j (30 gr.).
Agua de flor de naranjo. ℥iij (90 gr.).

M. I. Tónico que se usa en las hemorragias pasivas, diarreas crónicas, etc. *D.* A cucharadas.

6232. *Otra* (GAMBA).

℞ Tanino. . . . . ℈j (12 dec.).
Agua dest. de ajenjos. ℥jv (125 gr.).
Jarabe vinoso de azafran,
Vino de Málaga, ää. . ℥j (30 gr.).

M. I. Hemorragias pasivas por inercia de la matriz y leucorrea. *D.* De tres á seis cucharadas al dia, que se toman en muchas veces.

6233. *Otra* (H. DE AM.).

℞ Inf. de nuez de agalla. ℥jv (125 gr.).
Creta preparada. . . . ℥ß (15 gr.).
Tintura de opio,
Goma arábiga, ää. . . ℥j (4 gr.).

M. I. Diarrea. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6234. *Otra* (H. DE SAN ANT.).

℞ Raiz de bistorta en polvo. . . . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe de membrillo. ℥j (32 gr.).
Tintura de catecú. . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Hemorragias, diarreas, leucorreas, etc. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6235. *Otra* (H. DE AM.).

℞ Tintura de catecú. . . ℥j (30 gr.).
Tintura de opio. . . . 60 gotas.
Goma arábiga. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de canela. . . . ℥vj (180 gr.).

M. I. Diarrea. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6236. *Otra* (H. DE IT.).

℞ Corteza de simaruba. ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . Ibj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á Ibß (250 gr.), se cuela y se añade:

Mucil. de goma aráb. ℥ij (60 gr.).
Tintura de opio. . . . . 12 gotas.

M. I. Diarrea crónica. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6237. *Otra* (H. DE M.).

℞ Raiz de sinfito. . . . . ℥ij (8 gr.).

Se hierve en c. s. de agua para obtener ℥xij (375 gr.) de cocimiento, y se añade:

Catecú. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de canela. . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe de cidra. . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Diarreas. *D.* A cucharadas para los niños.

6238. *Otra* (JAUN).

℞ Láudano de Sydenham. ℥j (4 gr.

Tintura de canela. . . ʒiij (12 gr.).
Agua de Rabel. . . . . ʒj (12 dec.).

I. Metrorragia. *D.* Treinta á cuarenta gotas cada media hora en agua de avena.

6239. P. ASTRINGENTE (*Osiander*).

℞ Extracto de sáuce.
Extracto de rátania, ää. ʒj (4 gr.).
Alumbre. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua de canela. . . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe de frambuesas. . ʒj (30 gr.).

I. Metrorragia, sudor inglés, cólera. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6240. *Otra* (PRADEL).

℞ Tanino. . . . . gxij (6 dec.).
Agua alcanforada. . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe de extracto de ratania,
Jar. de goma aráb., ää. ʒj (30 gr.).

I. Ciertas diarreas y al fin de las blenorragias, cuando lo permite el estado del estómago y de los intestinos. *D.* De una á doce cucharadas en las veinticuatro horas en muchas veces.

6241. *Otra* (SUNDELIN).

℞ Ratania. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . Ibj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:

Elixir ácido de Haller. ʒj (4 gr.).
Jarabe de canela. . . . ʒjß (45 gr.).

M. I. Hemorragias pasivas, flujos mucosos crónicos. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6242. P. ASTRINGENTE CON TANINO (*Bouchardat*).

℞ Agua comun. . . . . ʒiij (90 gr.).
Agua de flor de naranj. ʒj (30 gr.).
Tanino. . . . . ℈ß (6 dec.).
Tintura de canela. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de clavel. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6243. P. ASTRINGENTE DE CATECÚ.

℞ Tintura de catecú. . . ʒj (30 gr.).
Tintura de opio. . . . gtjv (3 gr.).
Jar. de cáse. de granad. ʒij (60 gr.).
Infusion de bistorta. . ʒiij (90 gr.).
Esencia de canela. . . gxviij (1 gr.).

M. I. Diarrea crónica, cólera metrorragia. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6244. P. ASTRINGENTE DE GAYUBA (*Radius*).

℞ Hojas de gayuba. . ʒiß (45 gr.).
Milenrama. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . Ibiij (1500 gr.).

Se reduce á Ibj (1000 gr.) por la coccion y se añade:

Regaliz. . . . . ʒj (30 gr.).

Se cuela y se añade:

Jarabe de canela. . ʒij (60 gr.).

I. Hematuria crónica, hemotisis, blenorrea, diarrea crónica. *D.* A medias tazas de media en media hora.

6245. P. ASTRINGENTE ACETOSA (H. DE M.).

℞ Catecú en polvo. . . . ʒj (4 gr.).
Goma quino en polvo. ℈j (12 dec.).
Agua rosada. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe de vinagre. . ʒi (30 gr.).

Mézclese S. A.

I. Hemorragias pasivas. *D.* A cucharadas.

6246. P. ATEMPERANTE.

℞ Agua destilada de almendr. amargas, Agua de amoniaco anisada, ää. . . . . ʒß (15 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒvj (180 gr.).
Mucil. de goma aráb. ʒj (30 gr.).

M. I. Cólera. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6247. *Otra* (CHOULANT).

℞ Hojas de digital. . . . ʒß (2 gr.).
Ipecacuana. . . . . gxviij (1 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.

para obtener ʒjv (125 gr.) de infusion; se cuela y se añade:

Jarabe de malvabisco. ʒvß (22 gr.).
Amoniaco anisado. . . ℈ij (24 dec.).

I. Afecciones espasmódicas del par vago. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6248. P. ATEMPERANTE (H. M.).

℞ Tisana comun. . . . ℥xij (375 gr.).
Nitrato de potasa. . . ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Se da como bebida habitual á los que padecen calenturas inflamatorias, biliosas, etc. *D.* Un cortadillo cada tres horas.

6249. P. ATEMPERANTE (*Sydenham*).

℞ Agua de lechuga,
Agua de verdolaga, ãã. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de limon. . . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de violetas. . . ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ℈ß (6 dec.).
Agua de flor de naranj. ℥ß (15 gr.).

D. Se usa en el dia á cucharadas en las enfermedades inflamatorias ó enfermedades agudas.

6250. P. ATEMPERANTE AMONIACAL.

℞ Agua de frambuesas,
Agua de almendras amargas, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ℥ß (2 gr.).
Nitro. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de flor de naranj. ℥j (30 gr.).

I. Cistitis, nefritis, gastroenteritis, calenturas inflamatorias, neumonías. *D.* Una cucharada cada hora.

6251. P. ATRÓFICA.

℞ Ioduro de potasio. . . ℥j (4 gr.).
Agua de lechuga,
Ag. de laurel real, ãã. ℥jß (45 gr.).
Tintura de digital. . . gxviij (1 gr.).
Jarabe de amapolas. . ℥j (30 gr.).

I. Hipertrofia del corazon ó del bazo, esplenitis, viruelas. *D.* Una cucharada mañana y noche.

6252. P. ATRÓFICA DE MAGENDIE (H. DE M.).

℞ Ag. dest. de lechuga. ℥iv (125 gr.).
Agua dest. de menta. ℥j (30 gr.).
Ioduro de potasio. . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de altea. . . . ℥ß (15 gr.).

M. I. Hipertrofia de los vent rículos. *D.* Una cucharada por la mañana y otra por la noche. Puede duplicarse la dosis.

6253. P. AZUFRADA (*Kopp*).

℞ Azúcar blanca. . . . . ℥ß (16 gr.).
Se disuelve en
Mucil. de goma aráb. ʒvij (28 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥j (4 gr.).
Se añade:
Flores de azufre. . . . ℥j (12 dec.).

M. I. Salivacion mercurial. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora. Se debe agitar la mezcla al tiempo de usarla.

6254. P. BALSÁMICA (*Chopart*).

℞ Agua destilada de yerbabuena,
Alcohol rectificado,
Bálsamo de copaiba,
Jar. de culantrillo, ãã. ℥ij (60 gr.).
Agua de flores de naranjo,
Ácido nitr. alcohol., ãã. ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Blenorragias, leucorrea y gonorrea sifilíticas, aun en el período agudo; hemotisis rebeldes. *D.* Dos cucharadas por la mañana, al medio dia y otra por la noche durante doce dias.

Nota. Se debe agitar la botella cada vez que el enfermo toma la pocion.

6255. *Otra* (MIALHE).

℞ Bálsamo de copaiba. 50
Alcoholato de menta. 30
Leche de magnesia. 20

M. I. Gonorrea y flujos mucosos análogos. *D.* Tres cucharadas de café al dia, en ayunas, por la mañana y al acostarse. Es bueno beber un vaso de agua detrás de cada cucharada de esta pocion, pero es conveniente suprimir cualquiera bebida fuera de las horas de comer.

6256. P. BALSÁMICA DE COPAIBA.

℞ Agua de menta,
Agua de flor de naranjo,
Jarabe de limones, ãã. ℥jß (45 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ℥j (30 gr.).

Agua de Rabel. . . . . 5j (4 gr.).

I. Blenorrea crónica. *D.* Dos á cinco cucharadas al dia. Si produce deposiciones ventrales se añade dos ó tres gotas de láudano á cada cucharada.

6257. P. DE BÁLSAMO DE COPAIBA EMULSIONADA.

℞ Bálsamo de copaiba,
Agua destilada,
Jarabe de sinfito mayor, ãã. . . . . ʒij (60 gr.).
Goma aráb. pulverizada. ʒj (30 gr.).

Se mezclan en un mortero la goma, el jarabe y ʒß (15 gr.) de agua, poco mas ó menos; se añade poco á poco el bálsamo de copaiba y despues el resto del agua, triturándolos continuamente para formar una mezcla exacta.

D. Se toma muchas veces al dia una cucharada de café, dilatada en un poco de agua azucarada.

6258. P. DEL DOCTOR BAYLE.

℞ Tintura de digital. . . ℊxviij (1 gr.).
Ag. destilada de tilo. . ʒjß (48 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒijß (10 gr.).

I. Muchos médicos han pretendido que la digital usada de este modo era un medio curativo de la tisis pulmonar en todos grados. *D.* En el dia.

Nota. Se aumenta cada dia diez gotas y se puede llegar hasta trescientas.

6259. P. BÉQUICA EXPECTORANTE.

℞ Infusion de melisa. . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe de hisopo. . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Catarros crónicos, al fin de las bronquitis y perineumonia, cuando es difícil la expectoracion. Si los esputos son viscosos se puede reemplazar la melisa por ʒj (4 gr.) de poligala de Virginia.

6260. P. BÉQUICA (*Recamier*).

℞ Pocion béquica. . . . ʒjv (125 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒij (8 gr.).
ó Agua destilada de laurel. ʒß á ʒj (2 á 30 gr.).

I. Facilita la expectoracion y calma la tos; romadizos crónicos. *D.* A cucharadas.

6261. *Otra* (JOHN).

℞ Extracto de énula. . . . ʒij (8 gr.).
Vino estibiado. . . . . ʒj (30 gr.).
Jar. de flor de naranjo. ʒß (15 gr.).

I. Asma y catarros crónicos. *D.* Veinte á treinta gotas cada tres horas.

6262. *Otra* (RIEL).

℞ Tintura de saxífraga. . ʒij (8 gr.).
Ojimiel escilítico,
Jar. de malvabisco, ãã. ʒj (30 gr.).

M. I. Ronquera crónica. *D.* A cucharadas.

6263. P. DE BELEÑO.

℞ Raiz de malvabisco,
Gatuña, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . lbß (250 gr.).

Se reduce á ℥vj (180 gr.) por la coccion, y se añade:

Yerba de beleño. . . ʒj (4 gr.).

Se hierve, se cuela y se añade:

Jarabe de opio. . . . ʒj (30 gr.).

I. Tos violenta, coqueluche, asma, neumonía, pleuresía, bronquitis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6264. P. DE BELLADONA.

℞ Extracto de belladona. ℊx (5 dec.).
Agua de laurel real,
Jarabe de amapola, ãã. ʒj (30 gr.).

M. S. A. *I.* Espasmos rebeldes, tos convulsiva, asma, coqueluche, neumonía, pleuresía, disenteria, amaurosis, hemicránea, ninfomanía, polidipsia, esplenitis, cólicos nerviosos, pasmo, ileo, esofagismo, muermo. *D.* Una cucharada de café cada dos horas.

6265. P. BENZÓICA.

℞ Acido benzóico. . . . 5j (4 gr.).
Pocion gomosa. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Catarros crónicos y cálculos de ácido úrico. *D.* A cucharadas.

6266. P. BORATADA.

℞ Borato de sosa,
Ag. de alm. am., ãã. ʒj (4 gr.).
Agua de melisa. . . . ʒiij (90 gr.).
Láudano líquido. . . . gxviij (1 gr.).
M. I. Dismenorrea. *D.* A cucharadas.

6267. P. DE BROMURO DE POTASIO (*Magendie*).

℞ Bromuro de potasio. gxij (6 dec.).
Agua de lechuga. . . ʒiij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de altea. . . . ʒj (30 gr.).
I. Bócio y escrófulas, calentura tifoidea, hipertrofia del corazon, del hígado y del bazo, corea, aneurisma, esplenitis, sífilides, congestion, hematocele, hepatitis, mareo. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

6268. P. CALMANTE.

℞ Narcotina. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de limon. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. A cucharadas.

6269. *Otra*, n. 2.

℞ Jarabe diacodion. . . . ʒj (30 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ʒij (8 gr.).
Solucion de goma arábiga,
Infusion béquica, ãã. . ʒj (30 gr.).
Infusion de tilo. . . . ʒvj (60 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Dolores violentos, convulsiones, etc. *D.* A cucharadas.

6270. *Otra*, n. 3.

℞ Jarabe de opio,
Jarabe simple, ãã. . ʒß (15 gr.).
Flor de tilo. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒiij (90 gr.).
Se vierte el agua sobre la flor de tilo, y á la media hora se cuela y se añaden los jarabes.
Esta pocion contiene gß (25 mil.) de opio.

6271. *Otra*, n. 4.

℞ Jarabe de opio. . . . ʒi (30 gr.).
Tridacio. . . . . gvj (3 dec.).
Agua de lechuga. . . . ʒiij (90 gr.).
M. D. A cucharadas.

6272. *Otra*, n. 5.

℞ Agua de lechuga,
Agua de tilo, ãã. . . . ʒjß (48 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (32 gr.).
Agua de flor de naranj. ʒijß (10 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6273. *Otra*, n. 6.

℞ Ag. dest. de lechuga. ʒiij (100 gr.).
Agua destilada de laurel real. . . . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe diacodion. . . ʒj (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6274. *Otra*, n. 7.

℞ Alcoholado de ambar y almizcle compuesto. gxc (5 gr.).
Jarabe de acetato de morfina,
Agua de flores de naranjo,
Ag. de laurel real, ãã. ʒjß (45 gr.).
I. Trismo de los recien nacidos, plétora, pleuresía, neumonía, histérico, hipocondría, ninfomanía, delirio, temblor, disenteria, hemicránea, insomnio, neurosis, espasmos, esplenalgia, tétanos, vómitos, íleo, ascitis, asma, bronquitis, coqueluche, peritonitis, fisis, polidipsia, dispepsia, zona, prurito, sarampion, enuresis, hematuria, pasmo, diabetes, enfisema, envenenamiento, hidroraquis, hidropesía, muermo, nefralgia, pedionalgia, nefritis; pero principalmente en las flegmasías, los, coqueluche, bronquitis y asma. *D.* Una cucharadita de las de café de media en media hora.

6275. *Otra*, n. 8.

℞ Sulfato de morfina. . . gß (25 mil.).
Ag. de flor de naranjo. ʒj (30 gr.).
Agua de lechuga. . . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6276. P. CALMANTE, n. 9.

℞ Infusion de flor de tilo. ℥iij (90 gr.).
Infusion béquica,
Solucion de goma arábiga, ãã. . . . . ℥j (30 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ℥ij (8 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Se usa en todos los casos de dolores violentos, en las convulsiones, en los accesos histéricos y en los de epilepsia. *D.* A cucharadas.

6277. *Otra*, n. 10.

℞ Jarabe de malva,
Jarabe diacodion, ãã. ℥vj (24 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ℥jv (16 gr.).
Agua de lechuga. . . . ℥j (32 gr.).
Comunmente se añade:
Eter sulfúrico. . . . . 5 á 10 gotas.
I. Afecciones espasmódicas y dolores nerviosos. *D.* Se toma en dos, tres ó cuatro veces con mayores ó menores intervalos.

6278. *Otra*, n. 11.

℞ Solucion de acetato de morfina. . . . 20 gotas.
Extracto de lechuga virosa. . . . . ɡx (5 dec.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Inf. de manzanilla. . ℥xv (470 gr.).
M. D. A cucharadas.

6279. *Otra* (BUTTNER).

℞ Ipecacuana. . . . . ℥vj (24 gr.
Sen. . . . . ℥j (4 gr.).
Ledo palustre. . . . . ℥j (32 gr.)
Agua hirviendo. . . . . c. s.
para obtener ℥jv (125 gr.) de infusion, á la que se añade:
Azúcar. . . . . ℥j (32 gr.).
Amoniaco anisado. . . . ℥j (4 gr.).
I. Coqueluche. *D.* Media cucharada cada dos horas.

6280. *Otra* (CHAUSSIER).

℞ Acido bórico. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥ß (15 gr.).
Infusion de tilo. . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Afecciones cerebrales de los niños, pleuresía, neumonia, meningitis, histérico, íleo, vómitos, asma, coqueluche, grippe, zona, sarampion, pasmo, encantis, muermo, nefralgia. *D.* A cucharadas.

6281. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Extracto de cicuta. . . ℈j (12 dec.).
Agua de canela,
Jarabe de cáscara de naranja, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
M. D. A cucharaditas de café al dia.

6282. *Otra* (MILIAR).

℞ Ag. de menta piper. ℥iij (90 gr.).
Asa fétida. . . . . ɡxc (5 gr.).
Almizcle. . . . . ɡvj (3 dec.).
Jarabe de azafran,
Acetato de amon., ãã. ℥j (30 gr.).
M. I. Asma, coqueluche, vómitos, pleuresía, neumonia, pasmo, enfisema. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6283. *Otra* (PITSCHAFF).

℞ Hojas secas de tabaco. ℈j (12 dec.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Jar. de alm. dulces. ℥j (30 gr.).
Se infunde durante cinco ó seis minutos, se cuela y se añade el jarabe.
I. Segundo periodo de la coqueluche. *D.* Una cucharada de café de hora en hora para los niños de uno á tres años, y una cucharada grande á los niños de mas edad.

6284. P. CALMANTE DE SCHMIDTMANN (*Radius*).

℞ Extracto de belladona,
Extr. de beleño, ãã. ɡvj (3 dec.).
Tintura de estramonio. ℥ijß (10 gr.).
Agua destilada de almendras amargas. . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de digital. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Histérico, neuralgia facial, zona, ciática, neurosis, tétanos. *D.* Una cucharada de café tres veces al dia.

6285. P. CALMANTE DE SCHNEIDER (*Radius*).

℞ Extr. de lechuga viros. ʒß (2 gr.).
Tintura de digital. . . . ℥ß (15 gr.).
Agua de canela virosa. ℈xc (5 gr.).
M. I. Vómitos, asma, hidrotorax, coqueluche, grippe, ileo, metritis, hidropesía, ascitis, enuresis, angina, pleuresía, neumonía, histérico, zona, ceática, pasmo, hidroraquis, nefralgia, neurosis. *D.* ℈xviij á ℈ljv (1 á 3 gr.) cada dos horas.

6286. P. CALMANTE (*Schneider*).

℞ Alcoholado de ambar y almizcle compuesto. ʒß (2 gr.).
Ag. de flor de naranjo. ℈ljv (3 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒß (2 gr.).
M. I. Trismo de los recien nacidos, plétora, pleuresía, neumonía, histérico, hipocondría, ninfomanía, delirio tremulo, disenteria, hemicránea, insomnio, neurosis, espasmos, esplenalgia, tétanos, vómitos, ileo, ascitis, asma, bronquitis, coqueluche, peritonitis, tisis, polidipsia, dispepsia, zona, prurito, sarampion, enuresis, hematuria, pasmo, diabetes, enfisema, envenenamiento, hidroraquis, hidropesía, muermo, nefralgia, pedionalgia, nefritis. *D.* Una cucharada de café de media en media hora.

6287. P. CALMANTE, *Julepe calmante ó pocion anodina* (F. F.).

℞ Jarabe de opio. . . . . ʒij (8 gr.).
Jar. de flor de naranj. ʒvj (24 gr.).
Ag. destil. de lechuga. ℥jv (125 gr.).
M. I. Es una fórmula opiada poco activa, que se usa como sedante en las flegmasías de las vias aéreas, angina de pecho y en las enfermedades en que hay que calmar al enfermo, no pudiendo hacerse otra cosa, como en el último período de la tisis pulmonar, en las diarreas colicuativas, etc. *D.* En una ó dos tomas por la noche, para procurar el sueño.

6288. P. CALMANTE Y ANTIESPASMÓDICA.

℞ Tintura de castóreo. . 20 gotas.
Agua de valeriana,
Agua de peonía, ãã. . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de cantueso. . . ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6289. *Otra*, n. 2.

℞ Jarabe de sulfato de morfina. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua destilada de yerbabuena. . . . . ℥jv (125 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ʒß (2 gr.).
D. Se toma á cucharadas.

6290. *Otra*, n. 3.

℞ Agua destilada de laurel real. . . . . ʒijß (10 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).
Jar. de flor de naranj. ℥j (30 gr.).
Extracto de zumo depurado de bellad. ℈j (5 cent.).
Eter sulfúrico. . . . ʒß (2 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6291. *Otra*, n. 4.

℞ Jarabe diacodion. . . ℥j (30 gr.).
Infusion de tilo. . . . ℥jv (125 gr.
Eter sulfúrico. . . . ℈xviij (1 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6292. *Otra* (SPIELMANN).

℞ Agua de menta rizada,
Agua de manzanilla, ãã. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de amapola,
Jar. de manzanilla, ãã. ʒß (15 gr.).
H. S. A. *I.* Dolores de vientre de los niños. *D.* Una cucharada de café cada quince ó veinte minutos.

6293. P. CALMANTE ETÉREA.

℞ Agua de tilo

Agua de flor de naranjo, ãã. . . . . ʒjß (45 gr.).
Jarabe de extracto de opio,
Jarabe de ninfea, ãã. ʒj (30 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒß (2 gr.).

M. I. Plétora, gastralgia, vómitos espasmódicos, hipo, cólicos nerviosos, espasmos, nefralgia, neurosis, histérico, tétanos, síncopes, pasmo, dispepsia, envenenamiento, muermo, neumonia, pleuresía, pedionalgia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6294. P. CALMANTE Y LAXANTE (*Kopp*).

℞ Aceite de ricino muy fresco. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua destilada. . . . ʒjv (125 gr.).
Acido prúsico de Vauquelin. . . . . 7 gotas.

M. I. Cólicos con estreñimiento en las personas muy irritables, cuyos intestinos están atacados de una inflamacion ligera. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6295. P. CAPIVI (*Willis*).

℞ Agua comun. . . . . ʒvj (180 gr.).
Bálsamo de copaiba. . ʒiij (90 gr.).
Alcohol,
Jar. de malvab., ãã. ʒj (30 gr.).
Aceite de enebro. . . 30 gotas.
Mucil. de goma aráb. c. s.

H. S. A. *I.* Gonorrea que ha llegado á su declinacion; dificultad de orinar, sobre todo cuando es difícil la secrecion de las orinas á consecuencia de la inflamacion de los riñones, y ulceracion del conducto de la uretra. *D.* Dos cucharadas dos veces al dia.

6296. P. DE CARBONATO DE AMONIACO (*Guerard*).

℞ Agua alcanforada. . . . ʒiij (96 gr.).
Carbonato de amoniaco. ɡxviij á ʒß (1 á 2 gr.).
Jarabe de poligala,
ó Jarabe de Tolú. . . . . ʒß (16 gr.).

H. S. A. *I.* Flógosis crónica de los bronquios ó catarro pulmonar con ó sin enfisema; favorece la expectoracion y facilita la respiracion. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6297. P. CON EL CARBONATO DE AMONIACO (*Hamilton*).

℞ Carbonato de amon. ɡxviij (1 gr.).
Agua de menta pip. ʒiij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de rosas. . . . ʒijß (10 gr.).

M. I. Diarrea crónica. *D.* En dos tomas.

6298. P. DE CARBONATO DE POTASA.

℞ Carbonato de potasa. ɡxviij (1 gr.).
Agua de hisopo,
Agua de flor de naranjo, ãã. . . . . ʒjß (45 gr.).
Jarabe diacodion,
Jarabe de Tolú,
Jarabe de ipecac., ãã. ʒß (15 gr.).

M. I. Coqueluche, tétanos, vómitos, disnea, crup, asma, plétora, arenillas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6299. P. DE CARIOFILEA.

℞ Extracto de cariofilea. ʒij (8 gr.).
Jarabe de cascarilla,
Jarabe de cáscara de naranja, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Tintura acuosa de ruibarbo. . . . . ʒß (15 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua de canela. . . . ʒiij (90 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6300. P. DE CARMICHAEL.

℞ Esencia de trementin. ʒß (15 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Se mezcla y se añade á
Emulsion comun. . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de cásc. de nar. ʒij (60 gr.).
Esencia de canela. . . 3 gotas.

M. I. Iritis y coroiditis crónicas. *D.* Una cucharada comun.

6301. P. CARMINATIVA (*Dehaen*).

℞ Láudano de Sydenham. 10 gotas.
Agua de canela. . . . . ℥j (30 gr.).
Emulsion azucarada. . ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada cada cuarto de hora.

6302. P. DE CASTÓREO.

℞ Tintura de castóreo,
Tintura de asa fétida,
Licor de Hoffmann, ää. ʒß (2 gr.).
Agua de flor de naranjo,
Infusion de valeriana,
Jar. de artemisa compuesto, ää. . . . . ℥jß (45 gr.).
M. I. Histérico, hipocondría, parálisis, amenorrea. *D.* A cucharadas.

6303. P. CATÁRTICA.

℞ Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
Cocim. de ciruelas. . ℥jv (125 gr.).
M. D. En dos tomas.

6304. P. OLEOSO-CATÁRTICA (H. M.).

℞ Aceite de ricino,
Jarabe simple,
Agua comun, ää. . . . . ℥ij (60 gr.).
Mézclese exactamente. *D.* Se da la tercera parte cada tres horas.

6305. P. CATÁRTICA (*Hufeland*).

℞ Maná en suerte,
Tamarindos,
Sulfato de magn., ää. ℥j (30 gr.).
Agua comun. . . . . ℥xij (375 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca la tercera parte, y se vierte al fin:
Sen. . . . . ℥ij (8 gr.).
Se cuela y se añade:
Extracto de beleño. . ℈viij (4 dec.).
Jarabe de amapola. . ℥j (30 gr.).
I. Ileo no inflamatorio ó despues del uso de los antiflogísticos. *D.* Dos cucharadas de hora en hora, alternando con una cucharada de aceite de ricino. En los intermedios se puede dar una pocion antiemética para prevenir los vómitos.

6306. *Otra* (MENDE).

℞ Sulfato de sosa,
Maná en lágrimas, ää. ʒß (15 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. . . . . ℈ij (1 dec.).
Se disuelve en:
Agua destilada. . . . . ℥iv (125 gr.).
Se añade despues:
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
D. Una cucharada cada dos horas.

6307. *Otra* (RICHTER).

℞ Aceite de manzanilla. ℥vj (180 gr.).
Ac. de linaza reciente. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de amapola,
Sulfato de magn., ää. ℥j (30 gr.).
Extr. acuoso de opio. ℈ij (1 dec.).
H. S. A. *I.* Cólico saturnino, íleo. *D.* Una cucharada cada media hora, hasta que produzca deposiciones alvinas.

6308. P. DE CERA (*Noll*).

℞ Cera blanca. . . . . ℈xxx (15 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.).
Goma aráb. en polv. ʒj (4 gr.).
Infusion de manzan. ℥iij (90 gr.).
Extr. acuoso de opio. gj (5 cent.).
H. S. A. una pocion.
I. Disenteria, enteritis aguda y crónica, y particularmente en las diarreas agudas ó crónicas acompañadas de dolores vivos.

6309. P. DE CIANURO DE POTASIO (*Bally*).

℞ Agua destilada. . . . . ℥ij (64 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒiij 12 gr.).
Cianuro de potasio. . . gjv 2 dec.).
H. S. A. *I.* Asma, orfonea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6310. P. DE CIANURO DE POTASIO (*Magendie*).

℞ Cianuro de potasio. gß a gij (25 á 100 mil.).

Agua dest. de lechuga. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (4 gr.).
M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

6311. P. DE CIANURO DE ZINC.

℞ Cianuro de zinc. . . . . ℊx (5 dec.).
Jarabe de valeriana,
Agua de manzanilla,
Agua de flor de nar., ãã. ℥j (30 gr.).
M. I. Cardialgia, corea, histérico, disenteria. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6312. P. DE CICUTA.

℞ Extracto de cicuta. . ℥j (4 gr.).
Tintura de opio alcanforada,
Jarabe de bálsamo de
Tolú, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua de lechuga. . . . ℥iv (125 gr.).
M. I. Bronquitis, coqueluche, tos convulsiva, ronquera, escirro, cáncer, corea, conjuntivitis, disenteria. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6313. P. DE CINCONINA.

℞ Sulfato de cinconina. ℊxviij (1 gr.).
Agua de menta. . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de quina. . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe diacodion. . . ℥ß (15 gr.).
Disuélvase. *I.* Apirexia de las calenturas intermitentes, tifo. *D.* En tres veces al dia.

6314. *Otra* (MARIANI).

℞ Sulfato de cinconina. ℊxviij (1 gr.).
Agua destilada de menta piperita. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de cuantrillo. ℥j (30 gr.).
H. S. A. *D.* Se toma en tres ó cuatro veces, en el espacio del dia.

6315. P. CON CLARA DE HUEVO (*Ricord*).

℞ Agua de lechuga. . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥j (30 gr.).
Clara de huevo. . . . . núm. 1.
M. I. Diarreas y disenterías subagudas. *D.* A cucharadas en el dia.

6316. P. CLÓRICA.

℞ Hidrocloro medicinal. ℥ij (60 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥vj (180 gr.).
M. I. Fiebres tifoideas. *D.* Una cucharada cada media hora.

6317. *Otra*, n. 2.

℞ Cloro líquido. . . . . ℥ß (15 gr.).
Jar. de cáse. de nar. ℥j (30 gr.).
Agua de sangüesas. . ℥iij (90 gr.).
M. I. Escorbuto, hemacelinosis, tifo, estomacace, escrófulas. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6318. P. DE CLORO.

℞ Cloro líquido. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua filtrada. . . . . ℥vj (192 gr.).
Jarabe simple blanco. ℥jß (48 gr.).
M. I. Calenturas pútridas. *D.* A cucharadas.

6319. P. DE CLORO-PLATINATO DE SODIO.

℞ Percloruro de platino. ℊvj (3 dec.).
Cloruro de sodio exento de sales de potasa. ℊx (5 dec.).
Pocion gom. de la F. F. ℥vj (180 gr.).
I. Sífilis reciente, reumatismo crónico. *D.* Se toma á cucharadas en las veinticuatro horas.

6320. P. DE CLORURO DE BARIO (*Luleroti*).

℞ Cloruro de bario. . . ℊxviij (1 gr.).
Agua dest. de manzan. ℥iij (90 gr.).
M. D. Diez gotas de dos en dos horas.
Luteroti dice que curó en diez dias una neuralgia facial en un niño escrofuloso.

6321. P. DE CLORURO DE BARIO.

℞ Cloruro de bario,
Cloruro de hierro, ãã. . ℥ß (2 gr.).
Agua de melisa,
Jar. de énula camp., ãã. ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas. *D.* Una cucharadita de café, dos veces al dia.

6322. P. DE CLORURO DE PLATINO.

℞ Percloruro de platino. gjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (96 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.).
M. I. Sífilis constitucional, herpes rebeldes. *D.* Tres ó cuatro cucharadas al dia.

6323. P. PLATÍNICA Ó DE PERCLORURO DE PLATINO (*Hoefer*, *Mialhe*).

℞ Percloruro de platino. gij (1 dec.).
Pocion gom. de la F. F. ℥vj (180 gr.).
H. S. A. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6324. P. DE COCLEARIA CÍTRICA (*Vogel*).

℞ Agua dest. de saúco. ℥vj (180 gr.).
Alcoholato de coclear. ℥ß (15 gr.).
Zumo de limon. . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de amapola. . ℥ij (60 gr.).
H. S. A. *I.* Afecciones escorbúticas. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6325. P. DE COCLEARIA COMPUESTA.

℞ Infusion de fumaria. . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de diacodion. . ℥jß (45 gr.).
Jarabe de quina. . . . . ℥j (30 gr.).
Zumo de limon,
Espir. de coclearia, ää. ℥ß (15 gr.).
M. I. Calenturas atáxico-adinámicas, escorbuto, escrófulas. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6326. P. DE COCHINILLA (*Wachil*).

℞ Cochinilla en polvo. . . gij (1 dec.).
Azúcar. . . . . gxc (5 gr.).
Agua. . . . . ℥v (20 gr.).
I. Alabada en la coqueluche. *D.* En las veinticuatro horas.

6327. P. DE CODEINA.

℞ Jarabe de codeina. . . ℥j (30 gr.).
Infusion béquica. . . . ℥jv (125 gr.).
D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6328. P. DE CÓLCHICO (*Forget*).

℞ Vino de cólchico. . . ℥j (30 gr.).
Infusion de manzan. ℥jv (125 gr.).
Agua de laurel real. . ℥j (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. una pocion.
I. Es muy eficaz en la gota. *D.* Una cucharada de dos en dos horas. Las primeras tomas producen comunmente vómitos y deposiciones repetidas que pueden tener mal resultado, por lo cual se tendrá mucho cuidado en la administracion de este medicamento.

6329. P. COLCHÍTICA.

℞ Tintura de semillas de cólchico,
Tintura de guayaco,
Tintura de digital, ää. gxc (5 gr.).
Eter nítrico. . . . . gxviij (1 gr.).
M. I. Hidropesía de pecho, gota, reumatismo, ascitis, hidrorraquis. *D.* Treinta gotas, mañana y noche, en un poco de agua azucarada.

6330. P. DE COLOMBO COMPUESTA.

℞ Cocimiento de *salep*. ℥iij (90 gr.).
Se infunde en él:
Colombo. . . . . gxc (5 gr.).
Se añade:
Jar. de cásc. de nar. ℥j (30 gr.).
Láudano líquido,
Eter sulfúrico, ää. . gxviij (1 gr.).
M. I. Dispepsia, diarrea crónica. *D* A cucharadas de hora en hora.

6331. P. CONTRA LA AFONÍA.

℞ Té,
Yedra terrestre, ää. . ℥ij (8 gr.).
Gordolobo. . . . . ℥j (4 gr.).
Lirio de Florencia. . . ℥ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se infunde y se añade:
Ron,
Jarabe de erisimo, ää. ℥j (30 gr.).
Jar. de báls. de Tolú. ℥ß (15 gr.).
Tintura de canela. . . gxviij (1 gr.).
I. Afonía. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6332. P. CONTRA LAS AFTAS.

℞ Jabon amigdalino. . . . 5ij (8 gr.).
Se disuelve en:
Agua de menta,
Agua de hinojo, ãã. . . ʒij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒß (15 gr.).
Carbonato de magnesia. 5ij (8 gr.).
I. Orlin gangrenoso, aftas. *D.* A cucharadas.

6333. P. CONTRA LAS AFTAS CONFLUENTES GANGRENOSAS.

℞ Jabon amigdalino. . . . 5ij (8 gr.).
Se disuelve en
Agua de yerbabuena,
Agua de hinojo, ãã. . . ʒij (60 gr.).
Se añade:
Jarabe de malvabisco. ʒß (15 gr.).
Carbonato de magnes. 5ij (8 gr.).
D. A cucharaditas de café al dia.

6334. P. CONTRA LA ANGINA PELICULOSA (*Billard*).

℞ Goma tragacanto. . . . gʒx (5 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒij (60 gr.).
Mercurio dulce. . . . . gx (5 dec.).
Agua de flores de nar. 5j (4 gr.).
Jarabe de achicorias,
Jar. de ipecacuana, ãã. ʒß (15 gr.).
Mézclese y agítese al tiempo de usarla.
D. Una cucharada de café cada media hora.

6335. P. CONTRA LAS BLENORRAGIAS CRÓNICAS (*E. Marchand*).

℞ Acetato de plomo cristalizado. . . . . gviij (4 dec.).
Morfina. . . . . gij (1 dec.).
Acido acético. . . . 5j (4 gr.).
Agua destilada. . . . ʒvj (180 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒij (60 gr.).
M. D. Tres cucharadas al dia, dos horas antes de comer.

6336. P. CONTRA LA CARDIALGIA (*Andry*).

℞ Agua destilada de flores de naranjo. . . . . ʒij (60 gr.).
Agua destilada de rosas,
Jarabe diacodion, ãã. . ʒj (30 gr.).
Mercurio. . . . . gvj (3 dec.).
Se extingue el mercurio en el jarabe y se mezclan despues con las aguas. *D.* Una cucharada mañana y noche.

6337. P. CONTRA LA CEFALALGIA.

℞ Alcoholaturo de raices de acónito. . . . . gxviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
Alcoholato de canela. 5ijß (10 gr.).
D. Una cucharada de hora en hora. Se puede aumentar sucesivamente la dosis del alcoholaturo.

6338. P. CONTRA LA CLOROSIS (*José Frank*).

℞ Agua comun. . . . . ʒx (300 gr.).
Agua de flor de naranj. ʒij (60 gr.).
Elixir ácido de Haller. 5ß (2 gr.).
Jarabe de violetas. . . ʒj (30 gr.).
M. D. ʒij (60 gr.) cada dos horas. Se consume en quince ó diez y ocho horas toda la pocion.

6339. P. CONTRA LOS CÓLICOS (*Cuffer*).

℞ Jarabe diacodion. . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe de membrillo. ʒv (20 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒx (40 gr.).
Agua comun. . . . . ʒxijß (50 gr.).
M. D. Se toma en dos ó tres tomas con un cuarto de hora de intervalo.

6340. P. CONTRA LA COQUELUCHE (*Buetlner*).

℞ Raiz de ipecacuana. . gjv (2 dec.).
Sen escogido. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒjv (125 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade S. A. al líquido colado:
Licor amoniacal anis. ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒj (30 gr.).
D. Media cucharada cada dos horas.

6341. *Otra* (ROBERTO TOMAS DE SALISBURY).

℞ Agua de rosas. . . . . ʒij (60 gr.).

Jarabe de violetas. . . 5ij (8 gr.).
Acetato de plomo cristalizado gij á gv (10 á 25 cent.).

H. S. A. *D.* Una cucharada de café cada cuatro horas.

6342. *Otra* (TROUSSEAU).

℞ Agua destilada. . . . . 5j (32 gr.).
Jarabe. . . . . 5v (20 gr.).
Nitrato de plata. . . . . gj (5 cent.).

D. A cucharaditas de café á los niños de uno á dos años, atacados de coqueluche muy intensa.

6343. *Otra* (PITZCHEFT).

℞ Tabaco. . . . . gxviij (1 gr.).
Se infunde en
Agua. . . . . 5vj (192 gr.).
Se añade:
Jarabe de horchata. . 5x (40 gr.).

D. Una cucharadita de café de hora en hora á los niños de un año, á los de mas edad dos cucharaditas, y una cucharada comun á los de ocho ó diez años.

6344. *Otra* (LEVRAT PERRETON).

℞ Ag. dest. de lechuga. 5jv (125 gr.).
Ag. de flor de naranj. 5ij (8 gr.).
Jarabe de peonía. . . 5j (30 gr.).
Jarabe de belladona. 5ij (8 gr.).
Amoniaco. . . . . 6 gotas.

M. I. Coqueluche rebelde en que segun el autor ha sido muy eficaz. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6345. P. CONTRA EL CRUP.

℞ Emético. . . . . gjß (75 mil.).
Jar. de ipecacuana. 5j (30 gr.).
Ojimiel escilítico. . . 5iij (12 gr.).
Infusion de poligala. 5jv (125 gr.).

D. Se toma á cucharadas para favorecer la expulsion de las falsas membranas; pero se usa al mismo tiempo las sangrías locales, las aplicaciones irritantes y los derivativos ligeros al conducto intestinal.

6346. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . gß (25 mil.).
Tártaro emético. . . . gij (1 dec.).
Vino de ipecacuana. . 5ij (24 dec.).
Mucílago. . . . . 5ij (8 gr.).
Jarabe de malvabisco. 5vj (24 gr.).
Agua destilada. . . . . 5ij (64 gr.).

D. Se da cada diez minutos una cucharada de esta pocion, y en el intervalo se hace tomar agua tibia.

6347. *Otra* (GODEFROY).

℞ Sulfato de cobre. . . gij (1 dec.).
Jar. de flor de naranj. 5vj (25 gr.).
Agua de tilo. . . . . 5iij (100 gr.).

D. A cucharadas cada diez minutos, para promover vómitos. Esta pocion es muy eficaz, principalmente cuando se emplea al principio del segundo periodo del crup.

6348. *Otra* (JADELOT).

℞ Sulfuro de potasa. . . 9ß (6 dec.).
Ag. de flor de naranjo. 5ij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . 5j (30 gr.).
Se prepara S. A. una pocion.

D. Una cucharada de media en media hora hasta que sobrevengan vómitos.

6349. *Otra* (JADELOT).

℞ Cocimiento de 5j (4 gr.)
de poligala virginiana. . . . . 5iv (125 gr.).
Tártaro emético. . . . gj (5 cent.).
Ojimiel escilítico. . . 5ß (15 gr.).

I. y *D.* Se usa del mismo modo y en los mismos casos que la anterior.

Nota. Al mismo tiempo se usan sangrías locales, aplicaciones irritantes y derivativos dirigidos al conducto intestinal.

6350. P. CONTRA LA DIARREA (*Dorvault*).

℞ Jarabe de membrillos. 5j (30 gr.).
Tintura de catecú. . . 5ijß (10 gr.).
Agua de canela. . . . 5j (30 gr.).
Agua comun. . . . . 5iij (90 gr.).
Agua de Rabel. . . . 5ß (2 gr.).
Láudano de Rousseau. 10 gotas.

H. S. A. *I.* Esta pocion es muy

eficaz contra la diarrea comun, y se administra á doble dosis contra la diarrea colérica. *D.* En dos ó tres tomas al dia.

6351. P. CONTRA LA DIARREA DE LOS TÍSICOS (*Cottereau*).

℞ Hidroclorо medicinal. ℥ß (15 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iv (125 gr.).
Jar. de cáse. de naranj. ℥j (30 gr.).
M. S. A. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6352. P. CONTRA LA DISMENORREA (*Raciborski*).

℞ Inf. de flor de saúco. ℥iv (125 gr.).
Acetato de amoniaco,
Jarabe de opio,
Jarabe de flor de naranjo, ãã. . . . . ℥ß (15 gr.).
D. A cucharadas de media en media hora.

6353. P. CONTRA LA DISENTERIA (*Helvetius*).

℞ Ipecacuana quebrantada. ʒij (8 gr.).
Se echa encima tres vasitos de agua caliente, se deja digerir por espacio de doce horas, se cuela y se decanta.

El primer dia se favorece el vómito con agua tibia, pero en los siguientes se vierte una nueva cantidad de agua hirviendo sobre el residuo. Se puede continuar asi durante cinco dias.

D. Un vasito cada cuarto de hora. V. n. 6137.

6354. *Otra* (REQUIN).

℞ Agua de tilo. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de opio. . . . . ℥j (30 gr.).
Clara de huevo. . . . . núm. 2.
M. S. A. *D.* A cucharadas en el dia.

6355. P. CONTRA LOS DOLORES NEFRÍTICOS.

℞ Aceite comun,
Jarabe de limon, ãã. . . . . p. ig.
M. D. Una ó dos cucharadas bastan algunas veces para calmar los dolores.

6356. P. CONTRA LA EPILEPSIA (*Sem*).

℞ Agua destilada de tilo. ℥ij (60 gr.).
Ag. dest. de laur. real. ℥ijß (40 gr.).
Jar. de flor de naranj. ℥j (30 gr.).
Amoniaco líquido. . . . 12 gotas.
I. Epilepsia. *D.* Tres cucharadas al dia.

6357. P. CONTRA LA EMBRIAGUEZ.

℞ Amoniaco líquido. . . . 8 gotas.
Agua azucarada. . . . . ℥iij (12 gr.).
M. D. En una sola vez, despues que el enfermo ha vomitado. Dicen que este medicamento es infalible.

6358. P. CONTRA LA ESCARLATINA (*Stahl*).

℞ Mist. de carb. de amon. de Bohemius,
Carb. de amoniaco, ãã. ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥vj (192 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥x (40 gr.).
I. Escarlatina nerviosa y atáxica.

6359. P. CONTRAESTIMULANTE.

℞ Pocion gomosa. . . . ℥iij (90 gr.).
Quermes. . . . . gxviij (1 gr.).
Se puede aumentar progresivamente la dosis del quermes hasta ʒj (4 gr.).
I. Pleuresía, neumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6360. P. CONTRAESTIMULANTE CON QUERMES.

℞ Inf. de hoj. de naranj. ℥vj (180 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒß (2 gr.).
Quermes mineral. . . ʒj (1 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe diacodion. . . ʒß (15 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6361. P. CONTRA LA GANGRENA (*Hunter*).

℞ Clorato de potasa. . . 5ß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . 5ijß (10 gr.).
Agua. . . . . 5jß (45 gr.).
H. S. A. *I.* Ulceras gangrenosas. *D.* A cucharaditas en las veinticuatro horas.

6362. P. CONTRA LAS GASTRALGIAS (*Boudin*).

℞ Estricnina. . . . . gr. ½ (3 cent.).
Agua. . . . . 5jv (125 gr.).
Acido clorhídrico. . . una gota.
Jar. de yerbabuena. 5j (30 gr.).
M. D. A cucharadas de dos en dos horas.

6363. *Otra* (SANDRAS).

℞ Agua. . . . . 5x (40 gr.).
Azúcar. . . . . ʒxc (5 gr.).
Clorhidrato de morfin. ʒij (10 cent.).
M. D. Una cucharada de café apenas se sienta el dolor. Se repite la dosis con mas ó menos frecuencia, segun la intensidad y tenacidad del dolor. Conviene auxiliar la accion de este remedio con un régimen apropiado.

6364. P. CONTRA LA GOTA (*Henrotay*).

℞ Goma arábiga. . . . . 5ij (60 gr.).
Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Tintura de colchico. . 5ij (8 gr.).
Jarabe de ruibarbo. . 5ij (60 gr.).
M. D. A cucharadas de dos en dos horas. Al dia siguiente se toman las píldoras del mismo autor.

6365. P. CONTRA LA HEMATURIA (*H. Linck*).

℞ Alumbre. . . . . ʒxviij (1 gr.).
Sulfato de magnesia. ʒxc (5 gr.).
Infusion de rosas rojas,
Agua, ãã. . . . . 5jß (45 gr.).
Acido sulfúrico. . . . 6 gotas.
M. D. Se toma en tres veces. Se puede aumentar la dosis del alumbre hasta ʒij (24 dec.).

6366. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS ATÓNICAS (*Gall*).

℞ Extr. de quina. 5ß á 5ij (2 á 8 gr.).
Agua de menta pip. 5jv (125 gr.).
Se disuelve y se añade:
Tintura de cantáridas. 5ß (15 gr.).
Tintura tebáica. . . . 20 gotas.
I. Flujos sanguíneos uterinos despues de la edad crítica. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6367. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS (*Martin Solon*).

℞ Extracto de cornezuelo de centeno. ʒjx (50 cent.).
Pocion gomosa. . . . 5jv (125 gr.).
M. I. Anemia que ha sucedido á las hemorragias. *D.* En cuatro tomas en las veinticuatro horas.

6368. *Otra* (TRUSEN).

℞ Licor estíptico de Loof. 5j (4 gr.).
Elixir ácido de Haller. 5ij (8 gr.).
Alcobolato de canela. . ʒxc (5 gr.).
Mézclese exactamente.
D. Quince gotas cada cuarto de hora en media taza de agua azucarada.
El *licor estíptico de Loof* se obtiene sublimando en tres veces una mezcla de sal amoniaco y lápiz encarnado, eflorescida al aire húmedo; por consiguiente es un clorhidrato de amoniaco y hierro.

6369. P. CONTRA LA HEMOTISIS (*Henriette*).

℞ Cornezuelo de centen. 5ß (2 gr.).
Tintura de digital. . . ʒxviij (1 gr.).
Agua destil. de tilo. 5iij (96 gr.).
Azúcar. . . . . 5v (20 gr.).
M. D. Una cucharada de café cada cuarto de hora.

6370. P. CONTRA EL MAREO (*Grepratte*).

℞ Agua dest. de valeriana. 5ij (60 gr.).

Agua destilada de flor de naranjo. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua dest. de lechuga. ℥j (30 gr.).
Tintura de canela. . . . ʒj (4 gr.).
Láudano. . . . . 20 gotas.
Jar. de cáse. de naranja. c. s.

D. Media cucharada de café de modo que se consuma en seis á ocho horas.

6371. P. CONTRA LA PARÁLISIS *ó Pocion drástica* (*Fischer*).

℞ Raiz de angélica. . . . ʒiij (12 gr.)
Hojas de tabaco. . . . ʒj (4 gr.).
Regaliz. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).

Se infunde.

D. Una cucharada cada media hora.

6372. P. CONTRA LA PARAPLEJIA *ó Pocion drástica* (*Tessier*).

℞ Agua de tilo. . . . . ℥jv (125 gr.).
Aguardiente aleman,
Vino de cólchico,
Jarabe de espino servat, ãã. . . . . ℥j (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ℈v (25 cent.).

D. En tres dosis de media en media hora. Tessier deja un dia de reposo, y repite la pocion drástica cada dos dias hasta la perfecta curacion.

6373. P. CONTRA EL REUMATISMO ARTICULAR CRÓNICO (*Bouvyer*).

℞ Ioduro de potasio. . . ℈v (25 cent.).
Jar. de adorm. blanc. ℥ß (15 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (90 gr.).

M. D. Se toma en tres tomas, por la mañana, al medio dia y por la noche.

6374. P. CONTRA LA TÉNIA.

℞ Esencia de trementina. ℥iij (96 gr.).
Miel. . . . . ʒvj (24 gr.).
Agua dest. de yerbab. ℥iij (96 gr.).

H. S. A. *D.* Se toma en tres veces, la primera dosis por la mañana y las demás con algun tiempo de intervalo.

6375. *Otra* (DESLANDES).

℞ Extracto alcohólico de raiz de granado. . . . ʒvj (24 gr.).
Zumo de limon,
Agua de tilo,
Agua de menta, ãã. . ℥ij (64 gr.).

I. Helmintiasis, ténia, botriocéfalo de anillos cortos. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6376. *Otra* (DESLANDES).

℞ Agua de menta,
Agua de tilo,
Zumo de limon, ãã. . . ℥ij (64 gr.).
Extracto alcohólico de granado. . . . . ʒvj (24 gr.).

H. S. A. *D.* Se toma á cucharadas.

6377. P. CONTRA LOS VÓMITOS (*Debreyne*).

℞ Agua de lechuga. . . . ℥vj (180 gr.).
Láudano de Sydenham. 40 gotas.
Goma arábiga. . . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥ij (60 gr.).
Bicarbonato de sosa. . ʒß (2 gr.).

H. S. A. *D.* Se toma en cuarenta y ocho horas, dando una cucharada cada dos horas.

6378. P. CONTRA LOS VÓMITOS DE LAS PREÑADAS (*Privat*).

POCION ALCALINA.

℞ Bicarbonato de sosa. . ℈ʒjv (3 gr.).
Extracto de beleño. . . ℈jv (2 dec.).
Jarabe. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de melisa. . . . . ℥ij (60 gr.).

POCION ACIDA.

℞ Acido cítrico. . . . . ℈ʒjv (3 gr.).
Jarabe. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (60 gr.).

M. D. Se administra una cucharada de cada una de estas pociones, de hora en hora.

Es la fórmula de Riverio sin efervescencia, dada por Hufeland y modificada por Pravat. Produce buenos efectos.

6379. P. CONTRA LA ÚLCERA GANGRENOSA DE LA BOCA EN LOS NIÑOS (*Hunt*).

℞ Clorato de potasa. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒijß (10 gr.).
Agua. . . . . ʒijß (48 gr.).
H. S. A. Se administra á cucharaditas en las veinticuatro horas.

6380. P. DE CONTRAYERBA.

℞ Contrayerba. . . . . gxc (5 gr.).
Serpentaria. . . . . ʒß (2 gr.).
Agua de menta. . . . ʒiij (96 gr.).
Jarabe de canela. . . ʒijß (48 gr.).
M. I. Dispepsia, calentura atáxico-adinámica. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6381. P. CORDIAL.

℞ Infusion de toronjil. ʒvij (210 gr.).
Tintura de canela. . . ʒij (8 gr.).
Triaca. . . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de claveles. . ʒj (30 gr.).
M. D. Se usa á cucharadas en los casos en que es necesario reanimar las fuerzas vitales debilitadas por una enfermedad larga, ó un tratamiento mercurial mal dirigido.

6382. *Otra*, n. 2.

℞ Confeccion de jacintos. ʒj (4 gr.).
Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de toronjil, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua destilada de canela,
Agua destilada de flores de naranjo, ãã. . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa en los mismos casos que la anterior. *D.* A cucharadas.

6383. *Otra*, n. 3.

℞ Infusion de melisa,
Inf. de menta pip., ãã. ʒijß (45 gr.).
Triaca. . . . . ʒj (4 gr.).
Extracto de quina. . . ʒß (2 gr.).
Tintura de canela. . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe de claveles. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Calentura tifoidea, adinamia, escorbuto, astenia, dispepsia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6384. *Otra* (H. DE PARÍS).

℞ Vino tinto. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Tintura de canela. . . ʒij (8 gr.).
M. I. Afecciones atónicas. *D.* A cucharadas en el dia.

6385. P. CORDIAL Y DIURÉTICA (*Fouquier*).

℞ Cocimiento de énula. ʒjv (125 gr.).
Alcohol de digital. . . ʒß (2 gr.).
Alcoholado de potasa. 24 gotas.
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
M. I. Hidropesías pasivas. *D.* A cucharadas.

6386. P. CORDIAL CON VAINILLA.

℞ Azúcar de quina,
Azúcar de vainilla, ãã. ʒijß (10 gr.).
Elixir de Garus. . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de ajenjos. . . ʒj (30 gr.).
Agua de canela. . . . ʒjv (125 gr.).
M. I. Dispepsia, anorexia, cardialgia, ataxia, escorbuto, úlceras atónicas, calenturas atáxicas. *D.* Una cucharada un momento antes de comer.

6387. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO.

℞ Polvo de cornezuelo de centeno. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒj (30 gr.).
M. I. Parto laborioso por inercia de la matriz y hemorragias uterinas. *D.* Se toma en tres veces con veinte á treinta minutos de intervalo.

6388. P. CON CORNEZUELO DE CENTENO OPIADA (*Schussmann*).

℞ Cornez. de centeno. ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒv (150 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Extr. de belladona. . gij (15 cent.).
Jarabe de opio. . . . ʒj (30 gr.).

I. Metrorragia, amenorrea, para facilitar el aborto, aborto, catarro utero-vaginal, enuresis, hematocele, hematuria. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6389. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO (*Boudin*).

℞ Cornez. de centeno. . 9j (12 dec.).
Agua. . . . . ʒiß (45 gr.).
M. I. Diarrea crónica con atonía del recto, parálisis ó pereza del recto, parálisis de la vejiga, debilidad y parálisis de los miembros inferiores y para expulsar los calculitos vexicales ó urretrales. *D.* En tres tomas.

Boudin prescribe tambien un cuarto de lavativa con la misma dosis de cornezuelo de centeno.

6390. P. DE CREOSOTA (*Pitschaff*).

℞ Creosota. . . . . 5 gotas.
Tintura de canela. . ʒj (30 gr.).
Tintura de opio. . . gjv (50 cent.).
Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒv (150 gr.).
M. I. Púrpura hemorrágica. *D.* Una cucharada de media en media hora. Al mismo tiempo se usan lociones con vinagre sobre toda la superficie del cuerpo, y se mantiene el vientre libre.

6391. P. DE CROTON.

℞ Aceite de croton. . . . 2 gotas.
Se tritura en un mortero con:
Azucar blanca. . . . . ʒv (20 gr.).
Goma arábiga en polv. ʒß (15 gr.).
Se añade poco á poco:
Tintura de canela. . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒiß (45 gr.).
M. D. A cucharaditas de café cada hora. V. ns. 6065 y 66.

6392. P. DE DEHAEN.

℞ Carbonato de cal. . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de limon. . . ʒj (30 gr.).
Licor de Hoffmann. 12 gotas.
Láud. de Sydenham. 18 gotas.
Agua de yerbabuena. ʒj (30 gr.).
Agua de toronjil. . . ʒiij (90 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas contra los vómitos espasmódicos.

6393. P. DE DELPECH.

℞ Bálsamo de copaiba,
Jarabe de limon,
Agua de menta,
Agua de flor de nar., ää. ʒj (30 gr.).
Acido sulfúrico. . . . . ʒj (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . c. s.
M. I. Blenorragia, blenorrea, sífilis. *D.* Una cucharada mañana y noche.

Si hay vómitos ó diarrea se añaden ocho á diez gotas de láudano.

Es buen medicamento, pero muy desagradable.

6394. P. DIAFORÉTICA.

℞ Acetato de amoniaco. ʒiij (12 gr.).
Vino blanco. . . . . ʒv (150 gr.).
Alcoholato de canela. . ʒij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒij (60 gr.).
M. D. Se da á cucharadas.

6395. *Otra* (BOUCHARDAT).

℞ Carbonato de amon. gxxxvj (2 gr.).
Ron. . . . . ʒv (20 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒv (20 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
M. S. A. *I.* Glucosuria. Es muy eficaz y puede aumentarse la dosis sucesivamente hasta noventa ó ciento ochenta granos. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas y una hora antes de comer.

6396. *Otra* (H. DE M.).

℞ Infusion de saúco. ʒxij (375 gr.).
Arrope de saúco. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Afecciones catarrales. *D.* ʒvj (180 gr.).

6397. P. DE DIGITAL (*Piedagnel*).

℞ Infus. de flor de tilo. ʒiv (125 gr.).
Jarabe diacodion. . . ʒß (15 gr.).
Agua de flor de nar. ʒß (15 gr.).

Digital en polvo. . . . ǧviij (4 dec.).
M. I. Dolores que siguen á los partos repentinos. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6398. P. DE DIGITAL ESTIBIADA (*Wendt*).

℞ Hojas de digital. . . . ℈ß (6 dec.).
Agua hirviendo. . . . . ℥iij (90 gr.).
Se infunde durante doce á quince minutos, se cuela y se añade:
Vino estibiado. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas. *D.* Media cucharada cada dos horas.

6399. P. DIGITALINA (*Homolle y Quevenne*).

℞ Digitalina. . . . . ǧ1/10 (5 mil.).
Agua dest. de lechuga. ℥ij (100 gr.).
Jar. de flor de naranj. ℥vj (25 gr.).
Se disuelve la digitalina en algunas gotas de alcohol y se añade al agua destilada. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6400. P. DIFUSIBLE.

℞ Cloro líquido,
Jarabe de frambuesas,
Agua destilada, ää. . . ℥j (60 gr.).
M. I. Tifo, calenturas tifoideas, dismenorrea, encefalitis, coqueluche. *D.* A cucharadas de hora en hora. V. n. 6316 y 17.

6401. P. DIURÉTICA.

℞ Acetato de potasa,
Ojimiel escilítico, ää. ℥j (4 gr.).
Cocimiento de grama. ℥jv (125 gr.).
Jar. de las cinco raic. ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6402. *Otra*, n. 2.

℞ Cocimiento de las cinco raices. . . . . ℥iij (90 gr.).
Agua de flores de nar. ℈ß (15 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Láudano líquido,
Tintura de castóreo,
Tint. de almízcle, ää. 4 gotas.
Alcohol nítrico,
Éter, ää. . . . . 10 gotas.
M. I. Ciertas hidropesías. *D.* A cucharadas.

6403. *Otra*, n. 3.

℞ Solucion de carbonato de amoniaco. . . . . ℥j (4 gr.).
Vinagre escilítico. . . . ℥jß (6 gr.).
Jarabe de maná. . . . . ℥ij (8 gr.).
Láudano líquido. . . . . ǧvj (3 dec.).
M. I. Retencion de orina en los niños, marco, neíralgia, ascitis, pleuresía, neumatosis, hidropesía, carditis. *D.* ǧxviij á ǧxxxvj (1 á 2 gr.) cada hora.

6404. *Otra*, n. 4.

℞ Tintura de cantáridas,
Éter nítrico, ää. . . . . 60 gotas.
Azúcar blanca. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua de yerbabuena. . ℥ij (60 gr.).
M. D. Una cucharada de café cada tres ó cuatro horas. Cada cucharadita contiene cerca de tres y medio granos de tintura, é igual cantidad de éter nítrico.

6405. *Otra*, n. 5.

℞ Vino blanco. . . . un cuart. (1/2 lit.).
Acetato de potasa líquido. ℥j (30 gr.).
M. I. Hidropesías, anasarca. *D.* A vasos.

6406. *Otra*, n. 6.

℞ Ojimiel cólchico. . . . ℥jß (45 gr.).
Acetato de amoniaco. ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6407. *Otra*, n. 7.

℞ Digital fresca. . . . ℥j (4 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Ojimiel escilítico. . . ℈ß (15 gr.).
Jarabe de éter. . . . ℥j (30 gr.).
Se toma á cucharadas.

6408. P. DIURÉTICA.

℞ Agua de perejil. . . . ℥vj (180 gr.).
Acetato de amoniaco,
Ojimiel cólchico. . . . ℔ß (250 gr.).
M. I. Hidropesías. *D.* A cucharadas al dia.

6409. *Otra* (BUCHARD).

℞ Cocimiento de cebada. ℔j (500 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥vj (180 gr.).
Aceite de alm. dulces. ℥iv (125 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ℥ß (15 gr.).
H. S. A. *I.* Disuria y estrangurria. *D.* Una taza cada cuatro horas.

6410. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Infusion de té. . . . . ℥iv (125 gr.).
Tintura de digital. . . ʒj (4 gr.).
Miel escilítica. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Anasarca dependiente de afecciones orgánicas del corazon. Fouquier desahoga antes el sistema sanguíneo.

6411. *Otra* (GUERSANT).

℞ Jarabe de espárragos,
Ojimiel escilítico, ää. ℥j (30 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ℈vj (3 dec.).
Cocimiento de grama. ℥ij (60 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6412. *Otra* (HALLE).

℞ Agua de las tres nueces. . . . . ℥iv (125 gr.).
Agua dest. de verbab. ℥j (30 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥ß (15 gr.).
H. S. A. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6413. *Otra* (H. M.).

℞ Tisana aperitiva. . . . ℥iv (125 gr.).
Alcohol de digital. . . ℥ß (15 gr.).
Acetato de potasa. . . ℈xviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres horas.

6414. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Acetato de amoniaco. . ℥ij (60 gr.).
Acetato de potasa. . . . ʒij (8 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres horas en un vaso de agua azucarada.

6415. *Otra* (SCHMITT).

℞ Hojas secas de digital. ℈xviij (1 gr.).
Raiz de genciana. . . ℈xc (5 gr.).
Se infunde en:
Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).
Se cuela y se añade:
Ojimiel escilítico. . . ℥ß (15 gr.).
I. Ascitis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6416. P. DIURÉTICA ACTIVA.

℞ Infusion de ráb. silv. ℥v (150 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
Tintura de digital. . . 25 gotas.
M. D. En dos ó tres veces al dia.

6417. P. DIURÉTICA AMARGA (*Meyer*).

℞ Sumidad. de ajenjos. ʒij (8 gr.).
Bayas de enebro. . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).
Se infunde durante doce á quince minutos, se cuela y se añade S. A.
Carbonato de potasa. ʒj (12 dec.).
Eter nítrico alcoholiz. ʒj (4 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
I. Hidroposías pasivas. *D.* A cucharadas en las veinticuatro horas.

6418. P. DIURÉTICA AMONIACAL.

℞ Acetato de amoniaco,
Solucion de acetato de potasa,
Ojimiel escilítico, ää. ℥ß (15 gr.).
M. I. Abscesos, ceática, anasarca, hidropesía, carditis aguda, histeroptosis, neumatoses, flegmasías, embriaguez. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6119. P. DIURÉTICA Y CALMANTE.

℞ Acetato de potasa,
Ojimiel escilítico, ãã. ʒj (4 gr.).
Láud. de Sydenham. 15 gotas.
Agua de tilo. . . . . ʒiv (125 gr.).
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
M. D. A cucharadas.

6120. *Otra* (JAHN).

℞ Aceite de almendras. . ʒjv (16 gr.).
Goma arábiga en polv. ʒij (8 gr.).
Yema de huevo. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒj (32 gr.).
Agua de cal. . . . . ʒiij (96 gr.).
M. S. A. *I.* Iscuria y estrangurria. *D.* Una cucharada cada hora.

6121. P. DIURÉTICA DE LA CARIDAD.

℞ Miel escilítica . . . . ʒjv (16 gr.).
Eter nítrico. . . . . ʒj (4 gr.).
Láudano líquido. . . . ʒß (2 gr.).
Agua destilada de valeriana,
Agua destilada de menta piperita, ãã. . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de las cinco raic. ʒj (32 gr.).
M. I. Anasarca dependiente de una enfermedad orgánica del corazon. *D.* Una cucharada cada dos ó tres horas.

6122. P. DIURÉTICA COLCHÍTICA.

℞ Infus. de parietaria. ʒjv (125 gr.).
Acetato de potasa,
Ojimiel colchico, ãã. ʒij (8 gr.).
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
Acido nítrico. . . . . ʒß (2 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas, obstrucciones de las vísceras abdominales, hidropesías, esplenitis, pleuresía, neumonía, sífilis, nefralgia, nefritis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6123. P. DIURÉTICA CON DIGITAL (H. DE M.).

℞ Tintura alcohólica de digital. . . . . ʒß (2 gr.).
Infus. de flor de malva. ʒiij (90 gr.).
Jarabe de las cinco raices aperitivas. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Hidropesías que reconocen por causa lesiones del corazon. *D.* A cucharadas pequeñas de hora en hora.

6124. P. DIURÉTICO-ESCILÍTICA (H. DE M.).

℞ Agua dest. de hisopo. ʒiij (90 gr.).
Agua destilada de menta piperita,
Ojimiel escilítico, ãã. ʒj (30 gr.).
Espir. de nitro dulce. ʒß (2 gr.).
M. S. A. *I.* Casos en que convenga aumentar la secrecion de la orina. *D.* A cucharadas.

6125. P. DIURÉTICA ETÉREA.

℞ Eter nítrico alcoholizado,
Vinagre escilítico, ãã. ʒj (30 gr.).
Agua de enebro. . . . ʒv (150 gr.).
Espíritu de cochearia compuesto,
Jar. de adormid., ãã. ʒij (60 gr.).
M. I. Escrófulas, neumatoses, astenia, ataxia, cólico nefrítico, hidropesía pasiva, síncope, pleuresía, asfixia, insomnio, envenenamiento. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6126. P. DIURÉTICA LAXANTE (*Martin*).

℞ Digital en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒx (300 gr.).
Se infunde durante cinco ó seis minutos, se cuela y se añade:
Sulfato de potasa,
Miel, ãã. . . . . ʒvj (24 gr.).
I. Hidropesías, flegmasía blanca dolorosa. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6127. P. DIURÉTICA Y SEDANTE (*Krause*).

℞ Digital en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvij (210 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Nitrato de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Agua de laurel real. ʒiij (12 gr.).
Jarabe de malvabisc. ʒj (30 gr.).
M. I. Carditis aguda idiopática,

despues de haber combatido los síntomas mas alarmantes, e iscuria espasmódica. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6128. P. DEL DOCTOR ANDRY CONTRA LOS ENVENENAMIENTOS POR LOS ÁCIDOS MINERALES.

℞ Agua comun. . . . . ℥iv (125 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Jabon medicinal. . . . ʒiij (12 gr.).
Magnesia. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. *D.* Tres cucharadas cada medio cuarto de hora.

Nota. Luego que han cesado los vómitos, se da un looc de aceite de almendras dulces, jarabe de malvabisco, goma arabiga, magnesia y agua destilada.

6129. P. DEL DOCTOR GOELIS.

℞ Infusion de hinojo,
Agua destilada de hinojo, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).
Magnesia calcinada. gr. xv (75 cent.).
Láud. de Sydenham. 5 gotas.
Jarabe. . . . . ʒiß (15 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora. Se usa contra los cólicos de los niños, indicados por deposiciones verdes.

6130. P. DEL DOCTOR MONGENOT CONTRA LA AFONÍA.

℞ Te beyswen,
Yedra terrestre, ãã. . ℥ij (8 gr.).
Hojas de gordolobo. . ℥j (4 gr.).
Lirio de Florencia. . ℥ij (24 dec.).
Se vierten ℥vj (180 gr.) de agua hirviendo sobre todas las sustancias y se infunde hasta que se enfria. Se cuela y se añade:
Ron,
Jarabe de erisimo, ãã. ℥j (30 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . ʒß (15 gr.).
Tintura de canela. . ℥j (12 dec.).
I. Catarro de los bronquios, asma y afonía, cuando estas enfermedades son crónicas ó están perfectamente caracterizadas por un estado de astenia; de otro modo sería dañosa la pocion *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6131. P. DEL DOCTOR WILLIANS KERR.

℞ Nitrato de peróxido de hierro. . . . . 8 gotas.
Agua de tilo. . . . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe. . . . . ℥ij (8 gr.).
M. D. Se da una cucharada al dia contra la diarrea crónica.

6132. P. DE DONOVAN.

℞ Solucion de ioduro de arsenico de mercurio. ℥j (4 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥jß (75 gr.).
Jarabe de gengibre. . ℥j (30 gr.).
M. I. Afecciones sifilíticas. *D.* Tres ó cuatro cucharadas al dia.

6133. P. DULCIFICANTE.

℞ Inf. de flor. de violet. ℥iv (125 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de manzanas. . ℥j (30 gr.).
M. I. Catarros pulmonares poco intensos. *D.* En tres ó cuatro tomas.

6134. *Otra* (H. DE IT.).

℞ Goma arábiga. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua dest. de enebro. ℥ß (15 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥jß (45 gr.).
Cocimiento de cebada. ℔jß (750 gr.).
M. I. Cólico nefrítico. *D.* A cortadillos.

6135. *Otra* (WENDT).

℞ Mucílago de goma arábiga,
Ag. destil. de tilo, ãã. ℥jß (45 gr.).
M. I. Diarrea de los niños en la época del destete. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6136. P. DULCIFICANTE AMONIACAL.

℞ Pocion gomosa. . . . ℥iij (90 gr.).
Sal amoniaco. . . . . gr. xv (5 gr.).
Alcanfor. . . . . gj (2 dec.).

Aceite de alm. amarg. ʒß (15 gr.).

M. I. Cistitis, nefritis, uretritis, blenorragia, embriaguez, parálisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6437. P. EFERVESCENTE (*Chaussier*).

℞ Azúcar blanca. . . . . ʒj (30 gr.).
Carb. de potasa cristal. ʒij (8 gr.).
Acido tartár. en polvo. ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
Se mezclan y se diluye en agua al tiempo de usarla.

I. Vómitos espasmódicos.

6438. P. EFERVESCENTE DE GAUBIUS (*Boerhaave*).

℞ Zumo reciente de limon. ʒß (15 gr.).
Vino tinto bueno. . . . . ʒj (30 gr.).
Carbonato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Se mezcla el polvo con el licor y se toma en el momento de la efervescencia.

6439. P. EFERVESCENTE PARA LIMONADA GASEOSA.

℞ Oleosácaro de limon. . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ʒvj (180 gr.).
Se disuelve y se añade:
Bicarbonato de sosa. gxc (5 gr.).
Se disuelve y se añade:
Acido tártrico. . . . . gxc (5 gr.).

I. Acidez de las primeras vias, gastritis crónica, vómitos espasmódicos, dispepsia, gastralgia, cálculos. Se bebe al tiempo de hacer la efervescencia.

6440. P. EMENAGOGA.

℞ Agua destilada de menta piperita,
Agua dest. de ruda, ãã. ʒij (60 gr.).
Tintura de azafran. . . 20 gotas.
Jarabe de artemisa. . . ʒj (30 gr.).

M. I. Amenorrea con debilidad general ó local. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6441. *Otra*, n. 2.

℞ Ioduro de potasio. . . gxviij (1 gr.).
Agua de yerbabuena. ʒjv (125 gr.).
Jarabe de azafran. . ʒij (60 gr.).

M. D. Se toma en dos veces, mañana y noche.

6442. *Otra*, n. 3.

℞ Zumo de ruda. . . . . ʒj (30 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ʒß (15 gr.).

M. I. Afecciones histéricas. *D.* A cucharadas cada dos ó tres horas.

6443. *Otra* (DESBOIS).

℞ Agua dest. de artemisa. ʒv (150 gr.).
Azúcar. . . . . ʒj (30 gr.).
Ag. dest. de flor de nar. ʒß (15 gr.).
Esencia de ruda,
Esencia de sabina, ãã. 6 gotas.

M. S. A. *I.* y *D.* Se toma á cucharadas de café, cuando se ha interrumpido el flujo menstrual ó se presenta con dificultad. Se favorece su accion con pediluvios, baños de asiento, sangrías locales, fricciones, ventosas.

6444. *Otra* (FURNARI).

℞ Cimuro de oro. . . . gij (15 cent.).
Alcohol á 18°. . . . ßß (250 gr.).

M. D. Se toma al principio una cucharada de café mañana y noche, y despues una cucharada comun. Se meneará al tiempo de tomarla.

6445. *Otra* (PITSCHAFF).

℞ Borax.
Ag. de almendras am., ãã. ʒj (4 gr.).
Agua de melisa. . . . ʒvj (180 gr.).

M. I. Cólico menstrual. *D.* A cucharadas.

6446. *Otra* (SUNDELIN).

℞ Sumidades de menta piperita,
Sum. de romero, ãã. ʒiij (12 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvij (210 gr.).
Se infunde durante veinte minutos, se cuela y se añade S. A.
Eter sulfúrico. . . . ʒij (8 gr.).
Jar. de cáse. de nar. ʒj (30 gr.).

I. Amenorrea dependiente de

causa asténica. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6447. P. EMENAGOGA CALIBEADA.

℞ Tintura de deutocloruro de hierro, Tint. de aciibar compuesta, ãã. . . . 3ijß (40 gr.).
Tintura de castóreo. . gxc (5 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja,
Agua destilada, ãã. . 3j (30 gr.).

M. I. Amenorrea, bulimia. *D.* Una cucharadita de café, tres veces al dia, en media taza de infusion de manzanilla.

6448. P. EMENAGOGA IODURADA.

℞ Ag. dest. de lechuga. 3jv (125 gr.).
Agua dest. de menta. 3j (30 gr.).
Ag. dest. de valeriana. 3ij (8 gr.).
Tintura de iodo. . . . 20 gotas.
Jarabe de Tolú. . . . 3ij (60 gr.).

M. D. A cucharadas cada media hora.

6449. P. EMENAGOGA CON IODURO DE POTASIO.

℞ Azafran. . . . . 3ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . . 3iij (90 gr.).
Ioduro de potasio. . . . gij (1 dec.).
Jarabe de artemisa. . . 3j (30 gr.).

Se infunde el azafran, se cuela, se disuelve el ioduro y se añade el jarabe. *D.* En cuatro dosis en el dia, en los dos ó tres dias que preceden á la época de la aparicion de las reglas.

6450. P. EMÉTICA (H. DE AL.).

℞ Emético. . . . . giij (15 cent.).
Agua. . . . . 3ijß (75 gr.).
Ojimiel escilítico. . . 3ß (15 gr.).

M. D. Se toma la mitad de una vez, y el resto á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

6451. *Otra* (H. DE M.).

℞ Tártaro emético. . . . gijß (75 mil.).
Agua destilada. . . . . 3vj (180 gr.).

Disuélvase. *I.* Saburras y embarazos gástricos. *D.* A cucharadas hasta producir vómitos.

6452. *Otra* (H. M.).

℞ Tártaro emético. . . giij (15 cent.).
Agua destilada. . . . 3vj (180 gr.).

M. D. Se da en tres tomas con tres cuartos de hora de intervalo.

6453. P. EMÉTICA CON IPECACUANA (H. DE M.).

℞ Ipecacuana pulveriz. gxviij (1 gr.).
Jarabe simple. . . . . 3j (30 gr.).
Agua comun. . . . . lbß (250 gr.).

M. D. En varias dosis hasta producir el vómito.

6454. P. CON EMÉTICO (*Cayol*).

℞ Emético. . . . . gij (1 dec.).
Agua de manzanilla. . 3jv (125 gr.).
Jarabe de ipecacuana. 3j (30 gr.).
Agua de flores de nar. 3iij (12 gr.).

M. D. En dos ó tres veces con media hora de intervalo.

6455. P. EMETIZADA.

℞ Emético. . . . . gviij (4 dec.).
Infusion de arnica. . . 3jv (125 gr.).
Jarabe diacodion. . . 3j (30 gr.).

M. D. Se da á cucharadas de hora en hora en el tratamiento del tétanos.

6456. *Otra*, n. 2.

℞ Emético. . . . . gjv (2 dec.).
Infusion de tila. . . . 3jv (125 gr.).
Jarabe diacodion. . . 3j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Neumonía y reumatismo. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6457. *Otra* (AUGUSTIN).

℞ Tártaro emético. . . . giij (15 cent.).
Agua de manzanilla. 3iij (90 gr.).
Ojimiel escilítico. . . 3ß (15 gr.).

H. S. A. *I.* Embarazo gástrico, cólico saturnino, angina, impétigo. *D.* La mitad de una vez, y el

resto á cucharadas de cuarto en cuarto de hora.

6158. P. EMETIZADA Y NITRADA (*Richter*).

℞ Tártaro emético. . . ℈iij (15 cent.).
Nitrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Inf. de flor de saúco. ʒjx (270 gr.).
Miel blanca. . . . . ʒiij (90 gr.).

M. I. Pleuresía, neumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora. Conviene esta pocion despues de haber usado las emisiones sanguíneas.

6159. P. DE EMETINA, REFORMADA (H. DE M.).

℞ Emetina parda. . . . . ℈jv (2 dec.).
Agua comun. . . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe de cidra. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Se usa como nauseabunda. *D.* Una cucharada cada cuarto de hora hasta que produzca efecto.

6160. P. EMETO-CATÁRTICA (H. DE M.).

℞ Tártaro emético. . ℈j (5 cent.).
Sulfato de sosa. . . ʒij (8 gr.).
Agua comun. . . . . ʒxviij (560 gr.).

H. S. A. *I.* Saburras gastro intestinales. *D.* ʒvj (180 gr.) repetidas cada seis horas.

6161. *Otra* (BOUDIN).

℞ Sulfato de magnesia. . ʒjß (45 gr.).
Agua destilada. . . . . ʒv (150 gr.).
Tártaro emético. . . . ℈ij (1 dec.).

M. I. Calenturas tifoideas. *D.* De una vez durante muchos dias.

6162. P. EMETO-ESCILÍTICA.

℞ Emético . . . . . ℈jß (75 mil.).
Jar. de ipecacuana. . ʒj (30 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ʒiij (12 gr.).
Infusion de poligala. . ʒjv (125 gr.).

M. I. Crup. *D.* A cucharadas para facilitar la expulsion de las falsas membranas.

6163. P. EMULSIVA (H. M. F.).

℞ Almendras dulces mondadas. ʒiij á ʒjv (12 á 15 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. una emulsion con c. s. de agua para ʒiij (90 gr.).

Añadiendo ʒij (8 gr.) de agua destilada de flor de naranjo y ℈vj (3 dec.) de nitro, se tiene la POCION EMULSIVA NITRADA. Con ♏ (6 dec.) de tintura de opio se prepara la POCION EMULSIVA OPIADA. Con ℈x (5 dec.) de alcanfor dividido en un mucílago de goma arábiga, se obtiene la POCION EMULSIVA ALCANFORADA, la que puede ser ALCANFORADA Y NITRADA añadiendo nitro. Finalmente se puede agregar ℈xviij (1 gr.) de jalapa en polvo, y se prepara la POCION EMULSIVA CON JALAPA Ó PURGANTE.

6164. P. EMULSIVA DE JALAPA.

℞ Emulsion de almendras azucarada. . . ʒjv (125 gr.)
Raiz de jalapa. . . . . ℈xviij (1 gr.)

M. D. Se toma de una vez como purgante.

6165. P. EMULSIVA DE MANÁ.

℞ Almendras dulces. . . ʒß (15 gr.).
Maná en lágrimas. . . ʒij (60 gr.).
Jarabe de flores de alhérchigo. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua de flor de nar. ʒß (15 gr.).
Infusion de regaliz. . ʒjv (125 gr.).

M. I. Mantiene suavemente el vientre libre en los niños y en las mujeres. *D.* A cucharadas cada cuarto de hora ó en tres dosis.

6166. P. DE ÉNULA CAMPANA COMPUESTA. *Pocion cordial diurética.*

℞ Cocimiento de énula campana. . . . . ʒjv (125 gr.).
Tintura de digital. . . ʒß (2 gr.).
Acetato de potasa. . . 18 gotas.
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).

M. I. Hidropesías pasivas que dependen de una afeccion del corazon, etc. *D.* A cucharadas.

6167. P. DE ERGOTINA.

℞ Ergotina. . . . . ℈xviij (1 gr.)

Agua comun. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de flores de naranjo. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. una pocion, que se toma á cucharadas en el dia en los casos de hemorragias, y de cuarto en cuarto de hora en un caso de inercia de la matriz hasta que los dolores expulsivos determinen el parto. Cuando hay hemorragias muy violentas despues del parto, la pocion deberá contener de noventa á ciento ochenta granos de ergotina, y administrarse á cucharadas con cortos intervalos.

6168. P. EXCITANTE (H. DE AL.).

℞ Cloro líquido.
Agua destilada,
Jar. de frambuesas, ää. ℥ij (60 gr.).

M. I. Fiebres tifoideas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6169. P. EXCITANTE ALCOHÓLICA.

℞ Agua de melisa. . . . ℥j (30 gr.).
Agua de menta piper. ℥j (30 gr.).
Jarabe de limon. . . . ℥ij (60 gr.).
Extracto de quina. . . ℈xviij (1 gr.).
Alcohol. . . . . ℥ß (15 gr.).

M. I. Tifo, afecciones tifoideas, dispepsia, atrofia, dismenorrea, anorexia, neumatosis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6170. P. EXCITANTE AMONIACAL (*Ammon*).

℞ Alcohol amoniacal. . . . ℥ß (15 gr.).
Esencia de sucino,
Esencia de anis,
Esencia de canela,
Esencia de clavo,
Esencia de macis, ää. . 3 gotas.

M. I. Anorexia, ventosidades, tifo, calenturas tifoideas, cólicos ventosos, pleuresía, hemicránea, dismenorrea, gota atónica, envenenamiento. *D.* Quince á treinta gotas en ℥jß (45 gr.) de agua de cebada.

6171. P. ESCILÍTICA *ó Pocion diurética* (F. F.).

℞ Ojimiel escilítico. . . . ℥j (32 gr.).
Agua dest. de hisopo. . ℥iij (96 gr.).
Ag. dest. de menta pip. ℥j (32 gr.).
Alcohol nítrico. . . . . ℥ß (2 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Infiltraciones é hidropesía por atonía y sin reaccion febril. Conviene en los mismos casos que las demás preparaciones de escila. *D.* A cucharadas.

6172. P. ESCILÍTICA (H. M.).

℞ Agua destilada. . . . . ℥vj (180 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
Alcohol nítrico etéreo. ℥j (4 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Hidropesías. *D.* En cuatro tomas.

6173. P. ESCILÍTICA DIURÉTICA.

℞ Extracto de escila. . . ℈xviij (1 gr.).
Acetato de potasa. . . ℥ß (15 gr.).
Agua de perejil. . . . ℥iv (125 gr.).
Jarabe de ruibarbo. . ℥j (30 gr.).

M. I. Leucoflegmasía, hidropesía, anasarca, pleuresía. *D.* A cucharadas.

6174. P. EXCITANTE (*Harless*).

℞ Hojas de digital. . . . ℥ß (2 gr.).
Cascarilla quebrantad. ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥iv (125 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Espíritu de Minderero,
Jarabe simple, ää. . . ℥ß (16 gr.).

M. I. Hidrotorax y ascitis á consecuencia de enfriamiento y de inflamaciones catarrales, y acompañados de eretismo vascular. *D.* Media á una cucharada, tres ó cuatro veces al dia.

6175. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Cálamo aromático. . ℥x (40 gr.).
Agua hirviendo. . . . lbß (250 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Agua de menta. . . . ℥ij (64 gr.).
Eter clorhídrico. . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe de goma. . . ℥j (32 gr.).

M. I. Tifo, calenturas tifoideas, anorexia, neumatosis, atrofia. *D.* A cucharadas cada dos horas ó mas á menudo.

6476. P. EXCITANTE (*Schubart*).

℞ Vinagre. . . . . ℥j (30 gr.).
Jarabe de cerezas. . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

6477. P. EXCITANTE ESTIBIADA (*Radius*).

℞ Infusion de manzanilla,
Infusion de menta
piperita, ãã. . . . ℥v (150 gr.).
Tártaro emético,
Opio, ãã. . . . . ℊiij (15 cent.).
H. S. A. *I.* Corea, anorexia, atrofia, conjuntivitis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6478. P. EXCITANTE IODADA (*Kluge*).

℞ Iodo puro. . . . . ℊvj (3 dec.).
Alcohol rectificado. . . ℥ij (8 gr.).
Disuélvase y añádase:
Agua de canela. . . . ℥ijß (75 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Salivacion mercurial. *D.* Media cucharada al principio y despues una cuatro veces al dia.

6479. P. EXPECTORANTE.

℞ Raiz de poligala del
Senegal. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Goma amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Catarros pulmonares no inflamatorios. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6480. *Otra*, n. 2.

℞ Pimienta larga ma-
chacada. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . Ibß (250 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Jarabe de Tolú. . . . ℥ij (60 gr.).
D. Se da á cucharadas de media en media hora en las afecciones catarrales de los ancianos, cuando se llena el pecho de mucosidades bronquiales que no pueden ser expectoradas y ocasionan la muerte por asfixia.

6481. *Otra*, n. 3.

℞ Infusion de hisopo. . ℥iv (125 gr.).
Extracto de enebro. . ℥ß (15 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas.

6482. *Otra*, n. 4.

℞ Acetato de amoniaco. ℥ij (8 gr.).
Acido succínico. . . . ℥ß (2 gr.).
Jarabe de ipecacuana. ℥j (30 gr.).
Agua de menta piperita,
Agua de rábano sil-
vestre, ãã. . . . . ℥jß (45 gr.).
I. Coqueluche, bronquitis, catarro y neumonia crónicas, beriberi. *D.* Una cucharada cuatro veces al dia.

6483. *Otra*, n. 5.

℞ Infusion de hisopo. . ℥v (150 gr.).
Extracto de enebro. . ℥ijß (40 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥jß (45 gr.).
M. I. Catarros pulmonares crónicos, asma. *D.* A cucharadas.

6484. *Otra*, n. 6.

℞ Agua de yedra terres-
tre. . . . . ℥iv (125 gr.).
Tintura de escila. . . ℥j (4 gr.).
Extracto de poligala
de Virginia. . . . . ʒj (12 dec.).
Jarabe de goma,
ó Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Catarro pulmonar crónico. *D.* A cucharadas.

6485. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Espíritu de Minderero,
Asa fétida, ãã. . . . ℥ß (2 gr.).
Agua de yerbabuena. . ℥ij (60 gr.).
M. I. Asma, catarros pulmonares crónicos. *D.* A cucharadas.

6486. P. EXPECTORANTE ANTIMONIADA.

℞ Agua de hinojo. . . . ℥ix (36 gr.).

Infusion de hojas de belladona. . . . . ℥ij (64 gr.).
Vino estibiado. . . . . ʒij (4 gr.).
Jarabe de poligala. . . ʒiß (48 gr.).

M. I. Coqueluche, tisis, sifilides, neumonia, disenteria. *D.* Una cucharada de café, cuatro veces al dia.

6487. P. EXPECTORANTE DE DIGITAL.

℞ Infusion de digital,
Emulsion gomosa, ää. ℥ij (60 gr.).
Quermes mineral. . . gvj (3 dec.).
Jarabe de escila. . . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Neumonía aguda y crónica, pleuresía, bronquitis, congestion, flebitis. *D.* A cucharadas.

6488. P. DE ESPINO SERVAL.

℞ Corim. de achicorias. ℥iij (90 gr.).
Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
Tintura de jalapa. . . ʒiß (15 gr.).

M. I. Hidropesías pasivas. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas y como purgante en la apoplejía.

6489. P. ESTIBIADA (*Louis*).

℞ Emético. . . . . gvj (3 dec.).
Infusion de tilo. . . . ℥v (150 gr.).
Jarabe diacodion. . . ℥j (30 gr.).

M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora en las neumonías. V. números 335 y 3429.

6490. P. ESTIBIADA (*Breschet*).

℞ Agua de tilo. . . . . ℥v (150 gr.).
Tártaro emético. . . . gvj (3 dec.).
Jarabe diacodion. . . ʒiß (15 gr.).
Esencia de anis. . . . 2 gotas.

H. S. A. *I.* Pústula maligna complicada con síntomas ataxicos graves. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6491. *Otra* (PREZIOZI).

℞ Emético. . . . . gj (5 cent.).
Goma arábiga. . . . ʒiß (2 gr.).
Jarabe de liquen. . . ʒx (40 gr.).
Agua. . . . . ℥v (160 gr.).

M. I. Tisis pulmonar. *D.* Una cucharada cada dia.

6492. *Otra* (RAYER).

℞ Solucion de goma. . ℥jv (125 gr.).
Tártaro emético. . . giij (15 cent.).
Jarabe diacodion. . . ʒiß (45 gr.).

M. I. Reumatismo articular agudo en union con las sangrías. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6493. P. ESTIBIO-OPIADA (*Seré*).

℞ Emético. . . . . gjv (2 dec.).
Jarabe diacodion. . . ℥j (30 gr.).
Agua de flores de nar. ʒijß (10 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes.

6494. P. ESTIBIO-OPIADA (*Peysson*).

℞ Tártaro emético,
Opio, ää. . . . . gj (5 cent.).
Goma tragacanto. . . ʒij (12 dec.).
Agua de flor de nar. ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes, tétanos, atrofia, angina. *D.* A cucharadas cada media hora.

6495. P. ESTIBIO-OPIADA DE PEYSSON (H. DE M.).

℞ Tártaro emético. . . . gj (5 cent.).
Jarabe de meconio,
Jarabe de cidra, ää. ʒiß (45 gr.).
Goma tragacanto. . . ʒj (12 dec.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Agua dest. de cidra. ʒij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes. *D.* A cucharadas durante la apirexia.

6496. P. ESTIBIO-OPIADA (*Collin*).

℞ Emético. . . . . gviij (4 dec.).
Tintura de opio. . . . 30 gotas.
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒiijß (10 gr.).

H. S. A. *I.* Se la ha elogiado en la eclampsia. *D.* A cucharadas cada media hora.

6497. P. ESTIMULANTE.

℞ Esencia de yerbab. ʒß (2 gr.).
Alcohol. . . . . ʒijß (10 gr.).
Se disuelve y se mezcla con
Jarabe de goma. . . ℥iij (96 gr.).
Agua de canela. . . . ℥iß (48 gr.).
M. D. A cucharadas.

6498. *Otra*, n. 2.

℞ Bicarbon. de potasa. ʒj (4 gr.).
Agua de menta rizada. ℥vj (180 gr.).
M. I. Recomendada en el cólera. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6499. *Otra*, n. 3.

℞ Aceite de cajeput. . . ℊxviij (1 gr.).
Eter sulfúrico alcoholizado. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de yerbabuena. ℥v (150 gr.).
Jarabe de flor de nar. ʒx (40 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6500. *Otra* (ALIBERT).

℞ Esencia de canela. . . 2 gotas
Esencia de yerbab. 3 gotas.
Alcoholato de yerbab. ʒj (30 gr.).
Jarabe de malvabisc. ℥iij (90 gr.).
Agua destilada de yerbabuena. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Hipo espasmódico. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6501. *Otra* (BERENDS).

℞ Flores de arnica. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.
Se hierve hasta que despues de colado resulten ℥vj (180 gr.) y se añade:
Goma arábiga. . . . . ʒij (8 gr.).
Jar. de cáscara de nar. ʒj (30 gr.).
I. Calenturas tifoideas. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6502. *Otra* (LENTIN).

℞ Raiz de valeriana,
Flor de manzanilla, ää. ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ℥x 300 gr.).
Se cuece y se añade:
Sal amoniaco. . . . . ʒij (8 gr.).
Castóreo. . . . . ʒj (4 gr.).
Jar. de cáscara de nar. ℥jß (45 gr.).
I. Apoplejía despues del uso de la sangría, asfixia, neumatosis, dispepsia, calenturas tifoideas. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6503. P. ESTIMULANTE AROMÁTICA.

℞ Tintura de vainilla,
Tintura de canela, ää. ʒij (8 gr.).
Vino blanco generoso. ℥iv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒij (60 gr.).
M. D. Se toma en una ó muchas veces.

6504. P. ESTIMULANTE DE ARNICA.

℞ Flores de arnica,
Melisa, ää. . . . . ℊxc (5 gr.).
Anis estrellado. . . . ℊxviij (1 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (192 gr.).
Se infunde y se añade:
Tintura de malato de hierro. . . . . ʒß (2 gr.).
Jarabe de artemisa. . ℥jß (48 gr.).
I. Asfixia, parálisis, amaurosis, calenturas tifoideas, neumonías. *D.* A cucharadas cada tres horas.

6505. P. ESTIMULANTE DE BRUCINA (*Magendie*).

℞ Brucina. . . . . ℊvj (3 dec.).
Agua destilada. . . . ℥ij (60 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Se usa en los mismos casos que la anterior. *D.* Una cucharada, mañana y noche.

6506. P. ESTIMULANTE DIAFORÉTICA.

℞ Acetato de amoniaco. ʒß (15 gr.).
Agua destilada de canela,
Agua destilada de menta pipérita,
Jarabe simple, ää. . . ℥jß (45 gr.).
H. S. A. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6507. P. ESTIMULANTE DIFUSIBLE.

℞ Amoniaco líquido. . . 24 gotas

Agua dest. de melisa. ℥iij (96 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥ij (64 gr.).
M. I. Para promover el sudor; en los casos de mordeduras de animales venenosos, y en los de colapsus, debilidad nerviosa y para combatir la embriaguez. *D.* En tres ó cuatro.

6508. P. ESTIMULANTE CON ESTRICNINA (*Magendie*).

℞ Estricnina pura. . . . . ǧj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.).
Acido acético. . . . . 2 gotas.
Agua destilada. . . . . ℥ii 60 gr.).
H. S. A. *D.* Una cucharada de café, mañana y noche.
Nota. Se puede aumentar progresivamente la dosis, pero con mucha circunspeccion, hasta tres ó cuatro cucharadas de café.

6509. P. ESTIMULANTE DE IPECACUANA.

℞ Ipecacuana. . . . . ʒß (2 gr.).
Folículos de sen. . . . ǧxc (5 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥iij (90 gr.).
Se infunde durante doce horas, se cuela y se añade:
Oximiel escilítico,
Jarabe de hisopo, ää. ℥j (30 gr.).
Licor amoniacal anis. ʒß (2 gr.)
I. Bronquitis, neumonia y catarros crónicos, calenturas biliosas ó tifoideas, embarazo de las primeras vias. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6510. P. ESTIMULANTE DE MENTA PIPERITA.

℞ Esencia de canela. . ǧij (4 dec.).
Esencia de menta. . . ǧiij (15 cent.).
Alcoholato de melisa. ℥j (30 gr.).
Jarabe diacodion. . . ℥j (30 gr.).
Agua de menta pip. ℥iij (90 gr.).
M. I. Apoplejía, hipo espasmódico, neumatosis, cólico venteso, asfixia, vomitos espasmódicos, neumonia, dispepsia, hipocondría. *D.* Una cucharada de café de cuarto en cuarto de hora.

6511. P. CON EL EXTRACTO DE QUINA (*Chomel*).

℞ Extr. blando de quina. ℥j (4 gr.).
Pocion gomosa. . . . ℥iv (125 gr.).
M. D. Se toma á cucharadas en el período adinámico de las fiebres tifoideas.

6512. P. DE ESTRICNINA.

℞ Acet. de estricnina. ǧiij (15 cent.).
Alcohol. . . . . ǧxc (5 gr.).
Agua de canela . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de valeriana. ℥j (30 gr.).
M. I. Epilepsia, corea, atrofia, parálisis, amaurosis, incontinencia de orina, enuresis, zona, ciática, disenteria, neuralgias. *D.* Una cucharada de café mañana y noche.

6513. P. ESTIPTICA.

℞ Infusion de rosas. . . . ℥v (150 gr.).
Jarabe de rosas,
Jarabe de catecú, ää. . ℥j (30 gr.).
Extracto de ratania. . ʒß (2 gr.).
Agua de Rabel. . . . . 15 gotas.
Alumbre. . . . . ǧx (5 dec.).
H. S. A. *I.* Hemorragias pasivas. *D.* Una cucharada cada media hora.

6514. P. ESTOMACAL.

℞ Sumidades de ajenjos. ℥j (30 gr.).
Cascaras de naranja. . ʒß (15 gr.).
Ruibarbo. . . . . ℈ij (24 dec.).
Genciana. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.
para obtener ℥vj (180 gr.) de líquido colado; se infunden durante algunos minutos, se cuela y se añade:
Jar. de cáscar. de nar. ℥j (30 gr.).
I. Dispepsia, anorexia, neumatosis, disnenorrea. *D.* Se toma en dos veces.

6515. *Otra*, n. 2.

℞ Bistorta en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Arrope de saúco. . . . ℥iij (12 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Es tónica. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6516. P. DE EXTRACTO DE CALÉNDULA (*Oekel*).

℞ Extracto de caléndula,
Sulfato de sosa, ää. . ℈ß (15 gr.).
Agua comun. . . . . ℥vj (180 gr.).
M. I. Hipertrofia de la matriz despues de haber calmado el estado inflamatorio y haber evacuado el conducto intestinal. *D.* Cuatro cucharadas al dia.

6517. P. DE EXTRACTO DE QUINA (*Chomel*).

℞ Extr. blando de quina. ℥j (4 gr.).
Pocion gomosa. . . . . ℥v (150 gr.).
M. I. Período adinámico de las calenturas tifoideas. *D.* A cucharadas.

6518. P. DE ESTRICNINA (H. DE M.).

℞ Estricnina pura. . . . ℊj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Parálisis. *D.* Una cucharadita de café por la mañana y otra por la tarde. Se agita al tiempo de usarla.

6519. P. ETÉREA (H. M.).

℞ Agua de hinojo. . . . ℥vj (180 gr.).
Alcoholato de melisa compuesto. . . . . ℥ij (8 gr.).
Eter sulfúrico. . . . ℥ij (24 dec.).
Jar. de cort. de cidra. ℥j (30 gr.).
M. I. Es excitante, difusiva, antiespasmódica, en las calenturas adinámicas, histérico, convulsiones, astenia, cólicos ventosos, síncope, letargo, cefalalgia. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6520. P. ETÉREA ALCANFORADA (H. DE AL.).

℞ Alcanfor. . . . . ℈ij (12 dec.).
Eter sulfúrico. . . . ℥ij (8 gr.).
Láud. de Sydenham. 20 gotas.
Agua de canela. . . . ℥vj (180 gr.).
M. D. Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

6521. P. FEBRÍFUGA.

℞ Sulfato de quinina. . . ℈ß (6 dec.).
Acido sulfúrico. . . . . 2 gotas.
Se trituran en un mortero de vidrio con:
Agua destilada. . . . . ℥ij (90 gr.).
Jarabe de genciana. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Fiebres intermitentes. *D.* En una ó dos tomas antes del acceso.

6522. *Otra*, n. 2.

℞ Sulfato de quinina. . ℈ß (6 dec.).
Agua de canela. . . . ℥ijß (75 gr.).
Acido sulfúrico débil. 10 gotas.
Jar. de cáscs. de nar. ℈ß (15 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes. *D.* A cucharadas de café de hora en hora.

6523. *Otra* (CHRESTIEN).

℞ Resina de quina. . . . ℥j (4 gr.).
Carbonato de potasa. . ℈ß (2 gr.).
Agua destilada. . . . ℥iij (90 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes, intermitentes biliosas, remitentes ó de mal carácter, y finalmente en las enfermedades con tipo periódico. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6524. *Otra* (FRANK).

℞ Almendras amargas. . . ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . c. s.
para obtener ℥j (30 gr.) de infusion, en la que se disuelve:
Extr. de centaura menor. ℥j (4 gr.).
I. Calenturas intermitentes, escorbuto. *D.* Se toma antes del acceso.

6525. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Café tostado. . . . . ℥vj (24 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (96 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Zumo de limon. . . . ℥ij (64 gr.).

D. Se toma caliente en ayunas durante la apirexia.

6526. P. FEBRÍFUGA (H. DE AMÉR.).

℞ Solucion de Fowler. . 60 gotas.
Tintura de opio. . . . . 30 gotas.
Alcoholato de espliego. 5j (4 gr.).
Agua de canela. . . . . 5iij (12 gr.).
M. D. Una cucharadita de café cada dos horas durante la apirexia. Cada cucharada contiene cerca de un sesto de grano de arsenito de potasa.

6527. *Otra* (H. M. F.).

℞ Quina en polvo. . . . . 5ij (8 gr.).
Agua de menta piper. 3iij (90 gr.).
Alcoholado de canela. ℊxc (5 gr.).
Se diluye la quina en el agua aromática, y se añade el alcoholado.

La POCION FEBRÍFUGA ALCANFORADA se prepara añadiendo ℊx (5 dec.) á la pocion anterior. A la POCION FEBRÍFUGA ETÉREA se añade 3ß (2 gr.) de licor de Hoffmann, y á la POCION FEBRÍFUGA OPIADA se añade 3ß (6 dec.) de alcoholado de opio.

6528. *Otra* (PLENCK).

℞ Flores de arnica. . . 3ß (2 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℔ß (250 gr.).
Se infunde durante diez minutos, se cuela y se añade:
Quina ralisaya en p. 5vj (24 gr.).
Jarabe de manzanilla. 3j (32 gr.).
M. D. Dos cucharadas cada dos horas durante la apirexia. Si esta pocion excita vómito se añade un poco de opio.

6529. *Otra* (RADIUS).

℞ Hidroclor. de quinina. 9j (12 dec.).
Agua de menta piper. 3ß (15 gr.).
M. D. Veinte á sesenta gotas cada dos horas.

6530. *Otra* (RADIUS).

℞ Hidroclor. de quinina. ℊviij (4 dec.).
Agua de hinojo. . . . 3v (150 gr.).
Eter clorhídrico. . . . 5j (4 gr.).
Azúcar. . . . . 3ß (15 gr.).
M. D. Una cucharada cada dos horas.

6531. P. FEBRÍFUGA AMONIACAL.

℞ Agua de menta pip. 5ij (60 gr.).
Extracto de ajenjos. 5j (4 gr.).
Cocimiento de quina. 5ij (60 gr.).
Tártaro emético. . . ℊxv (75 cent.).
Hidrocl. de amoniac. 5j (4 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes, cuartanas. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6532. P. FEBRÍFUGA ANTIESPASMÓDICA (*Chaberly*).

℞ Agua destilada de tilo,
Agua destilada de manzanilla,
Agua destilada de valeriana, ãã. . . . . 5x (40 gr.).
Sulfato de quinina. . ℊxviij (1 gr.).
Extr. blando de quina. 5ß (2 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja,
Jarabe de éter, ãã. . 5v (20 gr.).
H. S. A. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6533. P. FERRUGINOSA.

℞ Agua. . . . . 3jv (125 gr.).
Jarabe de valeriana. . 3ij (60 gr.).
Azafran,
Cloruro de hierro, ãã. 3ß (2 gr.).
Se infunde el azafran durante una hora, se cuela y se añaden la sal ferruginosa y el jarabe.
I. Hemorragias pasivas, clorosis y leucorrea. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6534. P. DE FERROCIANATO DE QUININA.

℞ Ferrocianato de quinina. . . . . ℊjx (50 cent.); pero como es insoluble, es mejor
Valerianato de quinina. . . . . ℊjx (50 cent.);
Jarabe de amapola,
Jarabe de flor de naranjo, ãã. . . . . 3j (30 gr.).
Agua. . . . . 3iij (90 gr.).
M. I. Calenturas intermitentes,

sudor ingles, gangrena de hospital, gangrena, escorbuto, corea, reumatismo, gota, ceática, neuralgias, hemicránea, hemotisis, muermo. *D.* A cucharadas.

6535. P. FOSFORADA.

℞ Fósforo. . . . . gjij (15 cent.).
Agua de canela. . . . ℥ij (90 gr.).
Extracto de quina. . gxc (5 gr.).
Jar. de cáse. de nar. ℥iij (90 gr.).
Eter sulfúrico. . . . gxviij (1 gr.).
M. I. Calenturas atáxico-adinámicas, calenturas tifoideas, intermitentes rebeldes, cólera, tisis, parálisis. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6536. P. OLEO-FOSFORADA DE SOUBEIRAN (*Miathe*).

℞ Aceite fosforado. . . . ℥ij (8 gr.).
Goma aráb. en polvo. ℥ij (8 gr.).
Agua de yerbabuena. . ℥iij (96 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥ij (64 gr.).
Se hace un mucílago con el polvo de goma y la mitad del agua de menta, se echa en una botella, se pesa en la misma botella el aceite fosforado, se agita durante algunos minutos, despues se añade por partes y sucesivamente el jarabe y el resto del agua destilada. *D.* Se da á cucharadas de hora en hora.

Esta fórmula es un excelente modo para administrar el fósforo, y preferible á la siguiente.

6537. P. FOSFORADA CON ÉTER (*Soubeiran*).

℞ Eter fosforado. . . . . ℥j (4 gr.).
Agua de menta piperita,
Jarabe de goma, ãã. . . ℥ij (64 gr.).
H. S. A. *D.* Se toma á cucharadas de hora en hora. Conviene agitar la botella al tiempo de tomar la pocion.

6538. P. FOSFORADA GOMOSA (*Wendt*).

℞ Acido fosfórico debilitado. . . . . ℥ij 8 gr.).
Cocimiento de salep. ℥vj (180 gr.).
Jarabe de frambuesas. ℥j (30 gr.).
H. S. A. *I.* Salivacion, salivacion mercurial. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6539. P. FUNDENTE.

℞ Cloruro de bario. . . . gjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . ℥ij (60 gr.).
Extracto de cicuta. . . gjv (2 dec.).
Emulsion comun. . . . lbj (500 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Escrófulas y tisis pulmonar escrofulosa.

6540. *Otra* (H. DE IT.).

℞ Sulfato de potasa. . . ℥iij (12 gr.).
Infusion de ruibarbo. ℥vj (180 gr.).
M. I. A cucharadas como antiflechosa.

6541. *Otra* (SCHAEFFER).

℞ Licor de tierra foliada de tártaro,
Jar. de achicorias, ãã. ℥j (30 gr.)
Extracto de grama. . . ℥iij (12 gr.).
Vino emético,
Jabon estibiado, ãã. . . ℥ij (8 gr.).
M. I. Atrofia mesentérica. *D.* Una á dos cucharadas cada tres horas.

6542. *Otra* (SELLE).

℞ Carbonato de potasa. . ℥j (4 gr.).
Vinagre. . . . . c. s.
para saturarle; se añade:
Infusion de ruibarbo. . ℥j (30 gr.).
Agua bendita de Ruland. ℥j (4 gr.).
I. Atrofia mesentérica. *D.* Quince á veinte gotas, tres veces al dia.

6543. P. FUNDENTE NERVINA.

℞ Flores de arnica. . . . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . . c. s.
para obtener lbj (500 gr.) de infusion. Se cuela y se añade:
Subcarbon. de potasa. ℥ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
I. Infartos del bajo vientre y afecciones escirrosas acompañadas de alteraciones nerviosas.

6544. P. DE GEOFREA.

℞ Corteza de geofrea. ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ʒvj (180 gr.).

Se hierve durante media hora, se cuela y se añade:

Tintura de geofrea. ʒj (30 gr.).
Jar. de cort. de nar. ʒjß (45 gr.).

I. Afecciones verminosas, helmintiasis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6545. P. DE GOELIS.

℞ Cocimiento de raiz de altea,
Infusion de raiz de regaliz, aã. . . . . ʒij (60 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ʒj (12 dec.).
Ojimiel simple. . . . ʒjß (45 gr.).

I. Se usa contra la neumonia de los niños.

D. Una cucharada de café de hora en hora á los niños de dos años. Cuando se ha verificado la resolucion, se reemplaza el nitrato de potasa por ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.) de acetato de amoniaco.

6546. P. CON GOMA AMONIACO.

℞ Raiz de poligala. . . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvj (180 gr.).

Se infunde y se añade:

Goma amoniaco. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . ʒij (30 gr.).

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6547. *Otra*, n. 2.

℞ Goma amon. en polvo. gxij (6 dec.).
Ojimiel escilítico. . . . ʒj (30 gr.).
Infusion de hisopo. . . ʒjv (125 gr.).
Yema de huevo. . . . c. s.

Se divide la goma amoniaco sobre un pórfido con yema de huevo; se la tritura por partes, y cada una de estas se echa en un mortero. Cuando se ha triturado toda la goma resina, se tritura y añade el jarabe y la infusion.

Del mismo modo se prepara la de ASA FÉTIDA.

No deberá usarse instrumento alguno de hierro.

6548. *Otra* (H. DE M.).

℞ Goma amon. en polv. ʒjß (6 gr.).
Inf. de yedra terrestr. lbß (250 gr.).
Agua lacticinosa de canela. . . . . ʒij (60 gr.).

Se tritura la gomo-resina con un poco de infusion, se diluye, se cuela y se añade el agua de canela.

6549. P. DE GOMA QUINO.

℞ Rosas rojas. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒjv (125 gr.).

Se infunde y se añade:

Goma quino. . . . . ʒvj (24 gr.).
Agua de Rabel. . . . gxc (5 gr.).
Jar. de cáse. de gran. ʒj (32 gr.).
Tintura de canela. . . ʒij (4 gr.).

M. I. Diarrea y disenteria crónicas, gastralgias, metrorragia. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6550. P. GOMOSA (H. M.).

℞ Goma arábiga. . . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . lbiij (1500 gr.).

Se disuelve la goma en el agua y se añade:

Jarabe simple. . . . ʒjv (125 gr.).

D. Un cortadillo cada dos horas.

6551. P. GOMOSA *ó Julepe gomoso* (F. F.).

℞ Goma aráb. en polvo. ʒij (8 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒj (32 gr.).
Agua de azahar. . . . ʒß (16 gr.).
Agua comun. . . . . ʒiij (96 gr.).

Se disuelve la goma en el agua comun en un mortero de mármol, y se añaden las demás sustancias.

I. Inflamaciones de las vías aéreas acompañadas de tos y de irritacion de la faringe, en otras flegmasías y en los casos en que convienen los mucilaginosos.

6552. P. GOMOSA O PECTORAL (H. M. F.).

℞ Goma arábiga entera. ʒij 8 gr.).

Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de flor de nar. ℥ij (8 gr.).
Infusion pectoral. . . ℥iij (90 gr.).

Se lava la goma en agua fria, se la disuelve en frio en la cantidad de infusion prescrita, se cuela, se añade el jarabe y el agua de flores de naranjo.

Si urge se reemplazará la goma arábiga entera por el polvo de goma.

Si se añade á esta pocion ℥j (30 gr.) de aceite de almendras dulces se tendrá la POCION ACEITOSA.

Para que la pocion pectoral sea OPIADA, NITRADA Ó ALCANFORADA, se añade: ♏ (6 dec.) de tintura de opio, gvj (3 dec.) de nitro ó gx (5 dec.) de alcanfor. Si se añade ʒj (5 cent.) de quermes se tendrá la POCION QUERMETIZADA, aunque en este caso se reemplaza la goma arábiga por la goma tragacanto.

6553. P. GOMOSA ESTIMULANTE (*Meyer*).

℞ Gayuba,
Yedra terrestre, ää. . ℥iij (12 gr.).
Agua comun. . . . . ℥x (300 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca la quinta parte y se añade entonces:

Cáscara de naranja. . ℥j (8 gr.).

Se deja infundir durante doce á quince minutos, se cuela y se añade S. A.

Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).

I. Catarro vesical crónico, hematuria pasiva, leucorrea. *D.* ℥ij (60 gr.) cuatro veces al dia.

6554. P. DE HELECHO MACHO.

℞ Raiz de helecho macho. ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥jx (280 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca una tercera parte, y se cuela. Despues de frio se añade:

Eter sulfúrico. . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de tanacето. . ℥j (30 gr.).

I. Lombrices. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6555. P. HEMOSTÁTICA.

℞ Extracto de ratania. ♏ 2 gr.).
Infus. de rosas rojas. ℥v (150 gr.).
Alumbre. . . . . gjx (50 cent.).
Agua de Rabel. . . . gxv (75 cent.).
Jarabe de catecú,
Jarabe de quina, ää. ℥j (30 gr.).

M. I. Gastralgia, metrorragias pasivas, hemotisis y otras hemorragias pasivas, parálisis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6556. *Otra*, n. 2.

℞ Extracto de cornezuelo de centeno. . . . ℥j (4 gr.).
Agua dest. de canela. ℥iij (96 gr.).
Jarabe diacodion. . . ♏ (10 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥v (20 gr.).

M. I. Hemorragias uterinas. *D.* A cucharadas de media en media hora.

6557. *Otra* (BROUSSONNET).

℞ Zumo de ortiga bl. ℥jv (125 gr.).
Sangre de drago. . . gxv (75 cent.).
Alumbre. . . . . gvj (3 dec.).

M. S. A. I. Hemotisis, hematemesis, etc. *D.* Una cucharada de hora en hora.

Nota. Se bebe al mismo tiempo una tisana de consuelda mayor acidulada con agua de Rabel.

6558. *Otra* (DUMAS).

℞ Sulfato de hierro. . . . gvj (3 dec.).
Sangre de drago,
Tintura de canela, ää. gx (5 dec.).
Agua de Rabel. . . . ♏ (2 gr.).
Cocim. de consuelda. ℥v (150 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Vómitos, gastralgia, hematemesis, hemotisis, hemorragias pasivas. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6559. P. HIDRAGOGA.

℞ Extr. de celedonia. gxc (5 gr.).
Extracto de beleño. gxviij (4 gr.).
Sulfato de potasa. . . ♏ (15 gr.).
Tártaro emético. . . gj (5 cent.).
Agua de saúco. . . . ℥iij (90 gr.).
Oximel escilítico. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Hidropesía, anasarca, as-

citis, infartos de las vísceras abdominales. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

6560. *Otra* (GAUBIUS).

℞ Zumo de corteza fresca de saúco. . . . . ʒj (30 gr.).
Jarabe de violetas. . . ʒß (15 gr.).
M. I. Hidropesía.

6561. *Otra* (LENTIN).

℞ Vino emético. . . . . ʒj (4 gr.).
Vino escilítico. . . . . ʒiij (12 gr.).
M. I. Hidropesía. *D.* Cincuenta á cien gotas cada dos ó tres horas.

6562. *Otra* (VOGT).

℞ Crémor de tártaro,
Vino emético,
Vinagre escilítico, ää. ʒß (2 gr.).
Agua de perejil. . . . ʒjß (45 gr.).
Jarabe de polígala. . . ʒj (30 gr.).
M. I. Anasarca, ascitis, hidropesía consecutiva á la escarlatina. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

6563. P. HIDRAGOGA EMETIZADA.

℞ Tártaro emético. . . . ℊj (5 cent.).
Tártaro boratado. . . ʒß (15 gr.).
Infusion de enebro. . ʒvj (180 gr.).
Licor de Hoffmann. . ʒiij (12 gr.).
Láud. de Sydenham. ʒß (2 gr.).
M. I. Hidropesías, ascitis, cólico, neumatoses, grippe. *D.* Una cucharada cada hora.

6564. P. DE HINOJO ACUÁTICO.

℞ Semillas de hinojo acuático. . . . . ʒijß (10 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvj (180 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Amoniaco anisado. . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . . ʒj (60 gr.).
I. Catarro crónico, calentura atáxica, tisis pulmonar. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6565. P. CON HOLLIN Ó CAFÉ (H. DE M.).

℞ Café tostado en polvo,
Hollin de leña, ää. . . . ʒj (30 gr.).
Se infunde en c. s. de agua para obtener ℔jß (750 gr.) de líquido.
I. Lombrices intestinales. *D.* ʒvj (180 gr.), dando pasada una hora de ʒß á ʒj (15 á 30 gr.) de aceite de ricino.

6566. P. DE HUFELAND CONTRA LA HIDROPESIA ESPASMÓDICA.

℞ Agua comun. . . . . ʒx (300 gr.).
Raiz de ceb. albarrana. ʒß (15 gr.).
Se hierve durante veinte minutos, y hácia el fin de la decoccion se añade:
Raiz de valeriana en p. ʒij (8 gr.).
Se cuela el cocimiento y se le mezcla con
Jar. de cáscara de nar. ʒj (30 gr.).
Mucílago de goma arábiga. . . . . ʒiij (12 gr.).
Goma-resina de guayaco en polvo,
Tintura acre de antimonio,
Ácido nítrico alcoholizado,
Espíritu de nitro dulcificado, ää. . . . . ʒij (8 gr.).
D. Una cucharada cada dos horas.

6567. P. INCINDENTE (H. M.).

℞ Polígala amarga. . ʒß (15 gr.).
Agua comun. . . . . ʒxviij (560 gr.).
Se cuece S. A. y se añade:
Quermes mineral. . ℊvj (3 dec.).
Jarabe de altea. . . ʒjß (45 gr.).
I. Catarros pulmonares. *D.* Un cortadillo cada cuatro horas.

6568. P. IODURADA (*Defermon*).

℞ Ácido prúsico medic. 10 á 12 gotas.
Solucion de ioduro de potasio. . . . . 10 gotas.
Agua de lechuga. . . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
M. I. Afecciones pulmonares, tisis. *D.* Una cucharada de café de hora en hora. Se puede reemplazar el ácido prúsico y el jarabe de malvabisco por ʒj (30 gr.) de jarabe cianico.

6569. P. INCISIVA (*Barbier*).

℞ Goma amoniaco. . . . ʒj (4 gr.).

Ojimiel escilítico,
ó Yedra terrestre. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua destilada de hisopo,
Agua destilada de menta ó rosas, ää. . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Edema del pulmon, fin de los catarros pulmonares crónicos, perineumonías falsas, asma húmedo. *D.* A cucharadas.

6570. P. INCISIVA (F. F. DE 1818).

℞ Goma amoniaco. . . . ʒxij (6 dec.).
Ojimiel escilítico. . . ℥j (30 gr.).
Infusion de hisopo. . . ℥jv (125 gr.).

Se tritura la goma amoniaco con el ojimiel, y se diluye poco á poco en la infusion. Se usa como diurético en los catarros crónicos. *D.* A cucharadas.

6571. P. IODURADA.

℞ Ioduro de potasio. . . ʒxviij (1 gr.).
Pocion gomosa. . . . . núm. 1.

M. I. Escrófulas, accidentes terciarios de la sífilis, como exóstosis, caries, úlceras del velo del paladar. *D.* A cucharadas.

6572. *Otra* (CULLERIER).

℞ Iodo,
Ioduro de potasio, ää. ʒij (1 dec.).
Julepe gomoso. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Enfermedades sifilíticas y escrofulosas. *D.* A cucharadas en el dia.

6573. P. CON IODURO DE HIERRO (*Cullerier*).

℞ Ioduro de hierro. ʒjv á ʒvj (2 á 3 dec.).
Julepe gomoso. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Afecciones escrofulosas ó sifilíticas, etc. *D.* A cucharadas.

6574. P. DE IODURO DE POTASIO.

℞ Ioduro de potasio. . ℥j (4 gr.).
Iodo. . . . . ʒiij (15 cent.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jar. de zarzaparrill. ℥j (30 gr.).

M. I. Escrófulas, reumatismo articular, sífilis, sifílides. *D.* Dos cucharadas mañana y noche.

6575. P. DE IODURO DE POTASIO (*Wardleworth*).

℞ Ioduro de potasio. . . ʒß (2 gr.).
Agua de yerbabuena. ℥vj (192 gr.).
Jarabe de azafran. . . ℥ß (16 gr.).

M. I. Reumatismo articular agudo. *D.* En tres tomas en las veinticuatro horas.

6576. P. DE IODURO DE POTASIO CONTRA LA NEUMONÍA CRÓNICA (*Upshur*).

℞ Ioduro de potasio. . . ℥j (12 dec.).
Infusion de lúpulo. . ℔ß (250 gr.).

Disuélvase. *I.* En tres tomas en las veinticuatro horas.

6577. P. DE IODURO DE POTASIO Y DIGITAL.

℞ Ioduro de potasio. . ʒiij (15 cent.).
Tintura de digital. . 15 gotas.
Pocion gomosa. . . . ℥jß (45 gr.).

M. I. Pericarditis y endocarditis que complica el reumatismo articular. *D.* En tres tomas en el dia.

6578. P. DE IODURO DE ZINC Y ESTRICNINA.

℞ Ioduro de zinc y estricnina. . . . . gß (25 mil.).
Agua destilada. . . . . ℥jv (125 gr.).
Jar. de flores de nar. ℥j (30 gr.).

M. D. Se toma en dos veces al dia.

6579. P. DE IODURO DE ZINC Y MORFINA (*Bouchardat*).

℞ Ioduro de zinc y morf. gß (25 mil.).
Infusion de toronjil. . ℥jv (125 gr.).
Jarabe de flor de nar. ℥j (30 gr.).

M. D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6580. P. DE IPECACUANA.

℞ Ipecacuana en polvo. ℈j (12 dec.).

Jarabe de goma. . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ʒvj (180 gr.).
M. D. En dos tomas con un cuarto de hora de intervalo como vomitivo.

6581. P. DE IPECACUANA (*Haller*).

℞ Cáscaras de naranja. . ʒij (8 gr.).
Ipecacuana en polvo. . ʒjß (6 gr.).
Crémor de tártaro. . . . ʒß (15 gr.).
Se hierven en ʒjv (125 gr.) de agua de fuente, se cuela y se añade ʒß (15 gr.) de ojimiel escilítico.
I. Se usa en los embarazos gástricos, ictericia, fiebres intermitentes, asma, los de estómago é hidropesía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6582. P. DE IPECACUANA VOMITIVA.

℞ Ipecacuana en polvo. ℊxviij (1 gr.).
Se diluye en
Agua tibia. . . . . ʒiij (90 gr.).
M. I. Pléthora biliosa, angina aguda incipiente, crup. *D.* En dos ó tres tomas con un cuarto de hora de intervalo.

LA POCION DE IPECACUANA ESTIBIADA se prepara añadiendo ℊj (5 cent.) de emético. Se usa del mismo modo.

6583. P. CON JABON MEDICINAL.

℞ Goma tragacanto. . . . ℊx (5 dec.).
Jarabe de fumaria. . . ʒj (30 gr.).
Se tritura en un mortero de mármol y se añade poco á poco:
Agua destilada. . . . . ʒiij (90 gr.)
en que se habrá disuelto antes
Jabon medicinal. . . . . ʒij (8 gr.).
I. Infartos de las vísceras abdominales. *D.* A cucharadas.

6584. P. DE JALAPA (*Velpeau*).

℞ Raiz de jalapa en polv. ℊxviij (1 gr.).
Escamonea. . . . . ℊvj (3 dec.).
Emulsion de almendr. ʒjv (125 gr.).
M. D. En dos veces. Se agitará al tiempo de usarla.

6585. P. DE JUAN ROY CONTRA LA COQUELUCHE ó *Pocion de ipecacuana compuesta.*

℞ Folículos de sen. . . . . ʒij (8 gr.).
Raiz de ipecacuana. . . ʒj (4 gr.).
Se infunden en un cuartillo de agua hirviendo, se cuela y se añade:
Ojimiel escilítico,
Jarabe de hisopo, ää. . ʒj (30 gr.).
D. Seis cucharadas de café á los niños en el espacio de una mañana.

6586. P. DE JUSSIEU CONTRA LOS ESPUTOS DE SANGRE.

℞ Agua de llanten,
Agua de buglosa, ää. ʒij (60 gr.).
Jarabe de consuelda mayor. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de flor de nar. ʒß (2 gr.).
Esencia de Rabel. . ℊiij (15 cent.).
H. S. A. *D.* Se toma de dos veces con una hora de intervalo.

6587. P. DE KERS.

℞ Nitrato de peróxido de hierro. . . . . 8 gotas.
Agua de tilo. . . . . ʒvj (192 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒijß (40 gr.).
I. Diarrea crónica. *D.* Una cucharada al dia.

6588. P. LAXANTE.

℞ Pulpa de tamarindos. ʒj á ʒij (30 á 60 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒvj (180 gr.).
Se cuela y se añade:
Jarabe de frambuesas. ʒj (30 gr.).
Mézclese.

6589. P. DE LACTATO DE QUININA.

℞ Lactato de quinina. . ℊx (5 dec.).
Agua dest. de yerbab. ʒv (20 gr.).
Agua. . . . . ʒiij (96 gr.).
Jarabe de claveles. . . ʒj (32 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas intermi-

tentes rebeldes. *D.* En tres tomas.

6590. P. LAXANTE.

℞ Aceite de ricino. . . . . ʒvj (24 gr.).
Ojimiel escilítico. . . . ʒß (16 gr.).
Jar. de espino serval. ʒj (32 gr.).
M. D. De una vez.

6591. *Otra* (FERNELIO).

℞ Maná en lágrimas. . . ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . ʒjv (125 gr.).
Se funde y se añade:
Cañafístula cocida,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Se mezclan exactamente en un mortero de mármol.
I. y *D.* Una cucharada de hora en hora por la mañana para obtener una suave evacuacion en los enfermos delicados, afectados de estreñimiento.

6592. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Fosfato de sosa,
Jar. de malvabisco, ãã. ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
M. D. En cuatro tomas, de hora en hora.

6593. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Pulpa de tamarindos. ʒiij (90 gr.).
Agua. . . . . ʒxij (375 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca á ʒx (300 gr.), se cuela y se añade:
Maná en lágrimas. . . ʒij (60 gr.).
D. En dos ó tres veces.

6594. P. LAXANTE DE VIENA.

℞ Agua comun. . . . . ʒx (320 gr.).
Maná en lágrimas. . . ʒij (64 gr.).
Folículos de sen. . . . . ʒvj (24 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒj (4 gr.).
Cilantro. . . . . ʒß (2 gr.).
Pasas de Corinto,
Polipodio, ãã . . . . . ʒij (24 dec.).
Se reduce el agua por la ebullicion á ʒvj (192 gr.).
I. y *D.* Se toma de una vez cuando se quiere que obre como laxante, y á cucharadas de hora en hora cuando sea necesario combatir la disposicion al estreñimiento.

6595. P. DE LAUREL REAL.

℞ Agua de laurel real. ʒiij (90 gr.
Jarabe de amapola. . ʒj (30 gr.).
Jarabe de éter. . . . . ʒß (15 gr.).
Tintura de digital. . . gxvij (1 gr.).
M. I. Angina, grippe, ronquera, gastritis, carditis, hipo, cardialgia, cardiopalmia, aortitis, asma, palpitaciones, coqueluche, gastralgias nerviosas, ninfomanía, corea, histérico, espasmos, síncopes, tétanos, peritonitis, neumonía, bronquitis, esplenitis, vómitos, cólicos, sudor inglés, tisis, cáncer, plétora, congestion, cálculos, cianosis, zona, hipertrofia, prurito, enuresis, ciática, hemicránea, beriberi, flebitis, diabetes, calentura héctica, muermo, hipocondría, insomnio, pedionalgia, esofagismo, neuralgias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6596. P. DE LICOPODIO (*Hufeland*).

℞ Licopodio en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒjß (48 gr.).
Agua de hinojo. . . . . ʒij (64 gr.).
M. I. Estrangurria, diarrea dolorosa de los niños, disuria ó iscuria espasmódica. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6597. P. LITONTRIPTICA.

℞ Carbonato de potasa. ʒij (8 gr.).
Agua de cal. . . . . ℔ij (1000 gr.).
M. I. Cálculos urinarios, nefritis, grippe. *D.* ʒj (30 gr.) en una taza de leche cuatro veces al dia.

6598. *Otra*, n. 2.

℞ Bicarbonato de sosa. ʒj (4 gr.).
Infusion de quasia. . . ʒjv (125 gr.).

Tintura de colombo. . 5j (4 gr.).
M. D. Una cucharada cuatro veces al dia.

6599. P. DE LOBELIA (*Leclerc*).

℞ Lobelia hinchada. . . 5ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥ij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. *I.* Asma. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6600. P. DE LOCKSTAEDT.

℞ Bálsamo de copaiba. . 5ijß (10 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒxc (5 gr.).
Vino blanco. . . . . ℥j (60 gr.).
Tint. de acet. de hier. ʒxc (5 gr.).
Jar. de báls. de Tolú. ℥j (30 gr.).
I. Blenorrea, blenorragia. *D.* Una cucharada tres veces al dia.

6601. P. DE MAGNESIA (*Gobley*).

℞ Magnesia calcinada. . 5ij (8 gr.).
Jar. de flores de nar. ℥j (30 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥iij (90 gr.).
H. S. A. Se ha propuesto esta fórmula en lugar de la medicina de magnesia, de Mialhe, porque esta se espesa á los tres dias, y aquella se conserva líquida indefinidamente.
I. Es un purgante agradable que se toma de una ó dos veces.

6602. P. DE MAGNESIA COMPUESTA.

℞ Magnesia calcinada. . . 5iij (12 gr.).
Tintura acuosa de ruibarbo.
Agua de menta pip., ää. ℥ij (60 gr.).
Láudano líquido. . . . . 5j (4 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . 5ij (8 gr.).
M. i. Cólera, arenillas, destemple, dispepsia y afonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6603. P. DE MANÁ.

℞ Maná. . . . . ℥iij (90 gr.).
Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).
Disuélvase. *D.* En dos tomas.

6604. P. DE MANÁ COMPUESTA.

℞ Maná. . . . . ℥ij (60 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
Se infunde y se cuela.
D. En dos tomas.

6605. P. DE MANITO.

℞ Hojas de sen. 5j á 5ij (4 á 8 gr.).
Se hacen ℥vj (180 gr.) de infusion y se disuelve ℥j (30 gr.) de manito.

6606. *Otra*, n. 2.

℞ Crémor de tártaro soluble. . . . . ʒß (15 gr.).
Manito. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥x (300 gr.).
Se disuelve.

6607. *Otra*, n. 3.

℞ Manito. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
Se disuelve y se añade:
Azúcar. . . . . 5v (20 gr.).
Alcoholato de limon. . 6 gotas.
Se filtra.
D. Se da de una vez á las personas delicadas.

6608. P. MINORATIVA (*Boerhaave*).

℞ Pulpa de cañafístula. . ℥j (12 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ℥ij (4 dec.).
Jarabe de flores de melocoton. . . . . c. s.
I. Se da c. s. á los niños recien nacidos para evacuar el meconio. *D.* Se toma un poco en la punta del dedo y se le introduce en la boca del niño.

6609. P. DE MONGENOT.

℞ Té hyswen,
Yedra terrestre, ää. . 5ij (8 gr.).
Flores de gordolobo. . 5j (4 gr.).
Lirio de Florencia. . . ʒß (2 gr.).

Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade de S. A.:
Jar. de báls. de Tolú. ℥ß (15 gr.).
Jarabe de erisimo,
Ron, ää. . . . . ℥j (30 gr.).
Tintura de canela. . . ɡxviij (1 gr.).
I. Asma, catarro bronquial, afonía crónica y caracterizada por un estado asténico. *D.* Dos cucharadas cada dos horas.

6610. P. MORFINOSA (H. M.).

℞ Acetato de morfina. . ɡj (5 cent.).
Agua destilada. . . . . ℥jv (125 gr.).
Vinagre. . . . . 8 gotas.
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
M. S. A. *D.* A cucharadas.

6611. P. MOSCADA (*Dubois*).

℞ Almizcle en polvo. . . ɡxij (6 dec.).
Azúcar. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua comun. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Epilepsia, histérico, baile de san Vito, calentura atáxica acompañada de delirio y convulsiones. *D.* A cucharadas de café.

6612. *Otra* (H. M.).

℞ Pocion etérea. . . . . ℥vj (180 gr.).
Almizcle. . . . . ɡx (5 dec.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6613. P. MOSCADA Y OPIADA (*Chesebien*).

℞ Almizcle. . . . . ɡij (1 dec.).
Agua de hinojo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se trituran y se añade:
Tintura de opio. . . . 10 gotas.
Jarabe de amapola. . ℥ij (8 gr.).
I. Tétanos. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6614. P. MUCILAGINOSA OPIADA (*Clarus*).

℞ Musgo marino mond. ℥ß (2 gr.).
Agua comun. . . . . lbß (250 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca la cuarta parte, se cuela y se añade:
Fosfato de sosa. . . . ℥jß (6 gr.).
Jarabe de opio. . . . ℥ij (12 gr.).
I. En los intervalos de los accesos de hemotisis. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6615. P. MUCILAGINOSA Y SEDANTE (*Hufeland*).

℞ Polvo de salep. . . . . ℥ß (3 gr.).
Agua comun. . . . . ℥iij (90 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca á ℥ij (60 gr.), se cuela y se añade:
Ag. de flor de naranjo. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
Extracto de beleño. . ɡv (25 cent.).
M. I. Tos espasmódica, tos seca. *D* Una cucharada de café cada veinte minutos.

6616. P. MURIÁTICA.

℞ Acido clorhídrico. . . ℥ijß (10 gr.).
Cocimiento de quina. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de frambuesas. ℥ß (15 gr.).
M. I. Escorbuto, hemacelinosis, estomacace, tifo. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6617. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA.

℞ Musgo de Córrega. . ℥j (4 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
M. D. A cucharadas ó de una vez segun la constitucion del enfermo.

6618. P. NERVINA CON VALERIANA.

℞ Valeriana,
Quina, ää. . . . . ℥j (30 gr.).
Se cuece en
Agua. . . . . ℥x (300 gr.)
que se reducen á ℥vj (180 gr.) y se añade:
Jarabe de manzanilla,
Jarabe de árnica,
Jarabe de acetato de morfina. ää. . . . ℥j (30 gr.).

Tintura de cálamo aromático,
Alcoh. alcanforado, ãã. ʒijß (40 gr.).

I. Tifo, período atáxico adinámico de las calenturas tifoideas, corea. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6619. P. DE NINFEA.

℞ Jarabe de ninfea. . . . ʒj (30 gr.).
Tártaro emético. . . . gvj (3 dec.).
Agua de valeriana,
Agua de flor de nar., ãã. ʒjß (45 gr.).

M. I. Neumonía, pleuresía, histerico, epilepsia, corea, zona. *D.* A cucharadas de hora en hora. A los dos ó tres días se duplica la cantidad del jarabe y del tártaro emético.

6620. P. NITRADA.

℞ Nitrato de potasa. . . ʒij (12 dec.).
Jar. de las cinco raic. ʒj (30 gr.).
Agua de hinojo. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Afecciones dolorosas de las vias urinarias. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6621. *Otra*, n. 2.

℞ Nitro. . . . . gxvij (4 gr.).
Cocimiento de cebada. ʒjv (125 gr.).
Jarabe de las cinco raices. . . . . ʒj (30 gr.).

M. D. A cucharadas de hora en hora. Algunas veces se eleva la dosis del nitro hasta ʒiij ó ʒjv (12 á 16 gr.) al dia.

6622. P. NITRADA ESTIBIADA (*Thilenius*).

℞ Nitro . . . . . ʒij (8 gr.).
Tártaro emético. . . . gij (1 dec.).
Agua dest. de saúco. . ʒv (150 gr.).
Ojimiel simple. . . . . ʒij (30 gr.).

M. I. Artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6623. P. DE NITRATO DE PLATA (*Trousseau*).

℞ Nitrato de plata. . . . gj (5 cent.).
Agua destilada. . . . . ʒxx (80 gr.).
Jarabe. . . . . ʒx (40 gr.).

M. I. Diarrea aguda, convulsiones, disenteria. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6624. P. OBSTÉTRIGA (*Dewes*).

℞ Polvo de cornezuelo de centeno. . . . . ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒijß (10 gr.).
Agua de canela endulz. ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Partos laboriosos por inercia de la matriz, hemorragias uterinas, expulsion retardada de la placenta, y retencion de orina por fuerza de la vejiga. *D.* Se toma en tres veces de veinte en veinte minutos.

6625. *Otra* (VELPEAU).

℞ Agua gomosa. . . . . ʒjv (125 gr.).
Agua destil. de azahar. ʒij (8 gr.).
Cornezuelo en polvo,
Jarabe de limon, ãã. ʒj (30 gr.).

M. D. Se usa como estimulante especial del útero, y se administra una cucharada cada media hora para promover las contracciones del útero en los partos laboriosos por inercia de la matriz.

6626. P. OCITICA (*Charles*).

℞ Jarabe simple. . . . . ʒiij (96 gr.).
Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Láudano de Sydenham. 20 gotas.
Esencia de bergamota. c. s.

El autor prescribe esta pocion en una ó dos dosis en los partos difíciles ó lentos, en las hemorragias uterinas y expulsion retardada de la placenta, y retencion de orina por inercia de la vejiga. Se puede dar á cucharadas en los casos de amenorrea.

6627. P. OPIADA (H. M.).

℞ Extr. acuoso de opio. gjv (2 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒjv (125 gr.).

Se disuelve y se añade:

Jarabe de altea. . . . . ʒj (30 gr.).

D. Una cucharada cada hora.

6628. *Otra* (H. DE INGL.).

℞ Tintura de opio. . . . 20 gotas.
Agua de menta piper. ℥v (20 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (96 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6629. P. PECTORAL.

℞ Infusion de especies béquicas. . . . . ℥iij (96 gr.).
Jarabe de Tolú. . . . ℥v (20 gr.).
Acido cianhídrico. . . 12 gotas.
Se mezcla en un frasquito bien tapado.
D. A cucharadas.

6630. P. PECTORAL *ó Julepe béquico.*

℞ Especies béquicas. . . ʒß (2 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℥ij (8 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥vj (24 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. I. Se usa en los mismos casos que el julepe gomoso; á saber, en los romadizos y catarros. *D.* A cucharadas.

6631. *Otra* (H. M.).

℞ Tisana pectoral. . . . ℥jv (125 gr.).
Goma amon. en polvo. ℔xij (6 dec.).
Ojimiel escilítico. . . . ℥j (30 gr.).
H. S. A. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6632. P. PECTORAL *ó Pocion hidrociánica* (*Magendie*).

℞ Inf. de yedra terrestre. ℥ij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. . ℥j (30 gr.).
Acido prúsico medicinal. 15 gotas.
H. S. A. *I.* Asma, ortofnea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada cada tres horas, teniendo cuidado de menear la botella siempre que se toma la pocion.
Nota. Es prudente, segun el doctor Bally, empezar por seis ú ocho gotas de ácido en una pocion.

6633. P. PECTORAL (F. P.).

℞ Cianuro de potasio. . . ℔ß (25 mil.).
Agua de lechuga. . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Asma, ortofnea, catarro pulmonar crónico y tisis. *D.* Una cucharada de café, y se aumenta poco á poco la dosis. V. n. 6310.

6634. *Otra* (RAYER).

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . . ℥iij (90 gr.).
Goma aráb. en polvo. ʒß (15 gr.).
Jarabe de opio,
Agua, ää. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Neumonía crónica, tisis. *D.* Dos cucharadas mañana y noche. Se añade cuatro ó cinco gotas de láudano si el estómago no soporta el aceite.

6635. P. PECTORAL ACEITOSA (*Virey*).

℞ Cocimiento de cebada,
Cocim. de azufaifas, ää. ℥iij (90 gr.).
Aceite de alm. dulces,
Jarabe de malvab., ää ℥j (30 gr.).
Esperma de ballena. . ʒj (4 gr.).
Goma tragacanto. . . . ℔xvj (8 dec.).
Quermes mineral. . . ℔ij (1 dec.).
Se tritura en un mortero la goma tragacanto y el quermes con una pequeña cantidad de azúcar; se mezcla despues con ellos el jarabe y la esperma de ballena fundida en caliente en el aceite de almendras dulces, y por último se añade lentamente los dos cocimientos.
I. Se usa para dulcificar la tos y facilitar la expectoracion en los catarros pulmonares y en la peripneumonía. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6636. P. PECTORAL AMARGA.

℞ Quina. . . . . ʒß (2 gr.).
Especies béquicas. . . ʒj (12 dec.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Se usa en los catarros pulmonares crónicos para facilitar la expectoracion, sobre todo en las personas avanzadas en edad. *D.* A cucharadas.

6637. P. PECTORAL AMONIACAL.

℞ Agua de hinojo. . . . ʒiij (90 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒv (20 gr.).
Carbonato de amon. . ℈xc (5 gr.).
Jarabe de menta. . . . ʒß (45 gr.).
Emuls. de goma aráb. ʒj (30 gr.).

M. I. Coqueluche, catarro crónico, bronquitis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6638. P. PECTORAL DE ÉNULA CAMPANA.

℞ Extr. de énula camp. ℈xc (5 gr.).
Se disuelve en
Agua de hisopo. . . . ʒiij (90 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ʒj (4 gr.).
Tintura de digital. . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de opio. . . . ʒj (30 gr.).
Jar. de las cinco raíc. ʒj (30 gr.).

I. Tétanos, asma, vómitos, pléthora, bronquitis, catarro crónico, coqueluche, calenturas intermitentes. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6639. P. PECTORAL TONICA.

℞ Liquen islándico lavado en agua fria (no privado del cetrarino) ʒj (30 gr.).
Quina. . . . . ʒß (15 gr.).
Serpentaria de Virginia. ℈xc (5 gr.).
Agua. . . . . ʒv (150 gr.).
Se cuela y se añade:
Emulsion gomosa. . . ʒjv (120 gr.).

M. I. Asma, bronquitis, coqueluche, catarro crónico, crup, tisis, calenturas intermitentes tifóideas. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6640. P. PIROACÉTICA (*Pitschaft*).

℞ Agua destilada de flor de naranjo. . . . . ʒij (60 gr.).
Acido pirolefioso. . . . ʒj (4 gr.).
Jarabe de almendras. . ʒj 30 gr.).

II. S. A. *I.* Reblandecimiento gelatiniforme del estómago. *D.* Una cucharadita cada veinte á treinta minutos.

6641. P. DE PITSCHAFT MODIFICADA.

℞ Aribar. . . . . ℊjx (50 cent.).
Extr. de taraxacon. ʒij (8 gr.).
Agua de almendras amargas. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de hinojo. . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe de puntas de espárragos. . . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Ictericia, amenorrea con palpitaciones de corazon. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6642. P. PIROLIGNICA.

℞ Acido pirolefioso rectificado. . . . . ʒij (8 gr.).
Tint. de cálamo arom. ʒiij (12 gr.).
Agua de menta. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe de horchata. . . ʒij (60 gr.).

II. S. A. *I.* Angina, gastromalacia. *D.* A cucharadas cada dos horas.

6643. P. DE POLÍGALA.

℞ Polígala de Virginia. . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ʒvj (180 gr.).
Se infunde y se añade:
Jarabe de Tolú. . . . . ʒj (30 gr.).
Goma amoniaco. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).

M. I. Facilita la expectoracion en los catarros pulmonares rebeldes. *D.* A cucharadas.

6644. P. PURGANTE.

℞ Tint. de jalapa comp. ʒj (30 gr.).
Jar. de espino cerval. ʒß (15 gr.).
Cocim. de achicorias. ʒjv (125 gr.).

M. I. Ciertas hidropesías. *D.* A cucharadas.

6645. *Otra*, n. 2.

℞ Raiz de jal. en polvo. ℊxxx (15 dec.).
Sulfato de sosa. . . . ʒv (20 gr.).

Jarabe de miel. . . . ℥j (30 gr.).
Cocimiento de achicorias hirviendo. ℥vj (180 gr.).
M. D. En muchas tomas.

6646. P. PURGANTE (n. 3.).

℞ Agua de cerezas. . . . . ℥ij (60 gr.).
Vino estibiado. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de maná. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Destete, albuminuria, afonía, cólico, neumatosis, hematuria, metritis. *D.* A cucharadas de hora en hora á los niños.

6647. *Otra*, n. 4.

℞ Pulpa de cañafístula,
Jarabe de achicorias con ruibarbo, ãã. . ℥j (30 gr.).
Cocimiento de cabezas de adormideras. lbß (250 gr.).
M. D. En tres ó cuatro tomas.

6648. *Otra*, n. 5.

℞ Crémor de tártaro,
Pulpa de tamar., ãã. ℥j (4 gr.).
Agua. . . . . lbß (250 gr.).
Disuélvase. *D.* En dos tomas.

6649. *Otra*, n. 6.

℞ Aguardiente aleman. . ℥ijß (10 gr.).
Jar. de espino serval. ℥v (20 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (96 gr.).
Alcoholato de limon. . ℥ß (2 gr.).
M. D. En una toma por la mañana en ayunas.

6650. *Otra*, n. 7.

℞ Sen. . . . . ℥ß (15 gr.).
Sulfato de magnesia. . ℥ß (15 gr.).
Cacao tostado. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥iij (90 gr.).
Se digiere durante media hora, se cuela y se añade:
Azúcar. . . . . ℥jß (45 gr.).
Es una pocion purgante tan eficaz como la medicina negra y aun mas agradable. *D.* De una vez.

6651. *Otra*, n. 8.

℞ Raiz de jalapa pulv. ℊxxx (15 dec.).
Sulfato de sosa. . . . ℥v (20 gr.).
Jarabe de miel. . . . ℥j (30 gr.).
Cocim. de achicorias hirviendo. . . . . ℥vj (180 gr.).
D. Se toma en diferentes veces.

6652. *Otra*, n. 9.

℞ Hojas de sen. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥jv (125 gr.).
Se infunde durante un cuarto de hora, se cuela y se disuelve en el líquido colado:
Sulfato de sosa. . . . ℥ß (15 gr.).
Se añade:
Jalapa en polvo. . . . ℊxviij (1 gr.).
D. Se toma en dos veces por la mañana en ayunas.

6653. P. PURGANTE *ó Medicina comun* (H. M. F.).

℞ Sen. . . . . ℥ij (8 gr.).
Sulfato de sosa. . . . ℥ß (15 gr.).
Jar. de espino serval. ℥j (30 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥v (150 gr.).
H. S. A. *D.* Se toma de una vez por la mañana en ayunas.

6654. *Otra* (ANDRY).

℞ Agua de flor de naranjo,
Jarabe de flores de alberchigo, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Espíritu de romero. . . ℥j (4 gr.).
Diagridio. . . . . ℈ß (6 dec.).
H. S. A. *I.* Este purgante conviene á las personas que tienen repugnancia á tomar las medicinas ordinarias. *D.* Se toma de una sola vez por la mañana en ayunas.

6655. *Otra* (BARATAUS).

℞ Alm. dulc. mondadas. núm. 8.
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
Se hace una emulsion. Por otra parte se toma:
Resina de jalapa. . . . ℊx (5 dec.).
Azúcar. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Almendras. . . . . núm. 1.
Goma en polvo. . . . ℊc (5 gr.).
Se tritura la resina con el azúcar, se pista con la almendra, se añade la goma y despues la emul-

sion poco á poco. De este modo la resina está muy dividida. *D.* De una vez.

6656. P. PURGANTE (*Cruveilhier*).

℞ Aceite de almendras dulces,
Aceite de ricino,
Jar. de malvabisco, ãã. ℥j (30 gr.).

M. D. Se toma de una ó dos veces en la peritonitis puerperal, despues de las sangrías, el baño y las inyecciones uterinas.

6657. *Otra* (F. F.).

℞ Hojas de sen mond. ℥ij (8 gr.).
Sulfato de sosa. . . . ℥iv (16 gr.).
Ruibarbo escogido. . ℥j (4 gr.).
Maná en suerte. . . ℥ij (64 gr.).
Agua hirviendo. . . ℥iijß (112 gr.).

Se echa el agua sobre el sen y el ruibarbo, y despues de media hora de digestion se cuela con expresion, se añade en seguida el sulfato de sosa y el maná, se disuelven á fuego lento, se cuela y se decanta.

6658. *Otra* (H. BEAUMONT).

℞ Aceite de ricino. . . . ℥ij (60 gr.).
Limon. . . . . número 1.

Se exprime el zumo, se le bate con el aceite y se añade:

Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).

M. D. En dos tomas.

6659. P. PURGANTE CON ACEITE DE RICINO.

℞ Aceite de ricino. ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).
Jarabe. . . . . ℥j (30 gr.).
Goma arábiga pulver. ℥ij (8 gr.).
Agua. . . . . ℥iv (125 gr.).

M. D. En dos ó tres veces.

6660. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de ricino,
Jarabe de espino serval,
Agua de menta pip., ãã. ℥ij (60 gr.).

Mézclese y trilúrese con una yema de huevo.

D. Se toma en dos ó tres veces por la mañana en ayunas.

6661. P. PURGANTE DE ACEITE DE RICINO Y MAGNESIA (*Miathe*).

℞ Aceite de ricino. . . . ℥v (20 gr.).
Alcohol de menta. . . ℥ß (16 gr.).
Leche de magnesia. . ℥ijß (40 gr.).

D. A vasos de una vez, y se bebe en seguida dos tazas de caldo con té, y despues de tomada no se prescribe ningun líquido hasta que produzca la purgacion.

6662. P. PURGANTE ACEITOSA (*Lentin*).

℞ Sulfato de magnesia. ℥j (30 gr.).
Aceite de linaza. . . ℥iij (90 gr.).
Agua comun. . . . . ℥viij (240 gr.).
Jarabe de diacodion. ℥j (30 gr.).
Tintura de opio. . . . 12 gotas.

M. I. Ileo. *D.* Una cucharada cada media hora. Si se llegase á vomitar se aumentará la dosis del opio.

6663. P. PURGANTE DE ACEITE DE TÁRTAGO.

℞ Aceite de tártagos,
Goma tragacanto, ãã. gjx (50 cent.).
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua destilada,
ó Agua de menta. . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe de cáscara de naranja. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Albuminuria, amaurosis, estreñimiento, apoplejía, metritis. *D.* En dos tomas por la mañana con un cuarto de hora de intervalo.

6664. P. PURGANTE ACÍDULA.

℞ Aceite de ricino. . . . ℥ijß (45 gr.).
Jarabe tártrico. . . . ℥j (30 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
Alcoholato de limon. . ℥ß (2 gr.).

Tambien se asocia ℥j (30 gr.) de jarabe de espino serval á ℥j (30 gr.) de aceite de ricino.

6665. P. PURGANTE AGRADABLE.

℞ Escamonea en polvo. gxv (75 cent.).

Jarabe de horchata. ℥j (30 gr.).
Agua de flor de naranjo,
Agua de melisa, ää. ℥jß (45 gr.).
Esencia de vainilla. . gij (4 dec.).

M. I. Albuminuria, ascitis, calenturas intermitentes ó tifoideas, estreñimiento, galactirrea, gripe, amaurosis, liquen, lepra, blenorragia, metritis, peritonitis, otitis. *D.* De una vez por la mañana.

6666. P. PURGANTE CON CAFÉ.

℞ Café tostado,
Sen, ää. . . . . ʒiij (12 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥jß (45 gr.).
Agua. . . . . ℥v (125 gr.).

H. S. A. Esta pocion es un buen purgante para los niños. *D.* De una vez.

6667. P. PURGANTE DE CITRATO DE MAGNESIA (*Eymael*).

℞ Acido cítrico cristalizado. 28
Agua hirviendo. 80

Se disuelve y se añade poco á poco

Subcarbonato de magnesia. . . . 47

Disuelto ya, se cuela por una manga de tela, y se añade:

Jarabe simple. 32
Agua de flor de naranjo. 4

Se tomará á las siete ú ocho horas de preparada, porque si no se espesa mucho. Cuando se haya de tomar en distintas veces, se pondrán doscientas veinte partes de agua en lugar de ochenta.

6668. P. PURGANTE Y DIURÉTICA (*Tessier*).

℞ Agua de tilo. . . . . ℥v (125 gr.).
Aguardiente aleman. ℥j (30 gr.).
Vino de cólchico. . . ℥j (30 gr.).
Jar. de espino cerval. ℥j (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ℔v (25 cent.).

H. S. A. *I.* Paraplegia. *D.* En tres tomas por la mañana en ayunas de media en media hora.

6669. P. PURGANTE CON JALAPA.

℞ Polvo de jalapa. ℈ß á ʒß (6 dec. á 2 gr.).
Jarabe de flor de melocoton.
Agua comun, ää. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de azahar,
ó Agua de yerbabuena,
ó Agua de cidra. . . . . ʒj (4 gr.).

Se tritura en un mortero el polvo de jalapa con el jarabe, y se añade el agua. Se agita la botella al tomar la pocion.

6670. P. PURGANTE DE MANÁ.

℞ Sen. . . . . ʒjß (6 gr.).
Sulfato de sosa. . . . ʒß (15 gr.).
Maná. . . . . ℥j (60 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥ij (90 gr.).

H. S. A. *D.* Se toma de una ó dos veces.

6671. P. PURGANTE PARA LOS NIÑOS.

℞ Magnesia calcinada. . ʒß (2 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . gvj (3 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒj (4 gr.).
Esencia de menta. . . 6 gotas.
Agua. . . . . ℥jß (45 gr.).

M. D. Una cucharadita de café cada dos horas.

6672. P. PURGANTE QUERMETIZADA.

℞ Quermes mineral. . giij (15 cent.).
Infusion de borraja. ʒx (300 gr.).
Semillas de anís. . . una pulgarada.
Maná. . . . . ℥ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Afecciones comatosas, apoplejía. *D.* A cucharadas con frecuencia.

6673. P. PURGANTE CON RESINA DE JALAPA *ó Looc purgante.*

℞ Emulsion azucarada. ℥iij (90 gr.).
Resina de jalapa. . . . gxij (6 dec.).
Aceite de alm. dulces. ℥j (12 dec.).
Goma tragacanto. . . gvj (3 dec.).

Se trituran en un mortero la resina de jalapa y el aceite, se añade la goma tragacanto y c. s. de emulsion para formar el mucílago, se mezclan exactamente, y se añade el resto de la emulsion.

6674. P. PURGANTE DE RUIBARBO.

℞ Ruibarbo. . . . . ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . ℥v (150 gr.)
Se infunde, se cuela y se añade:
Jarabe de achicorias compuesto. . . . . ℥j (30 gr.).
D. De una vez.

6675. P. PURGANTE DE TAMARINDOS.

℞ Tamarindos. . . . . ℥j (30 gr.).
Sen. . . . . ʒij (8 gr.).
Sulfato de sosa. . . . ℥ß (15 gr.)
Eleosácaro de limon. . c. s.
Agua. . . . . ℥v (150 gr.).
Se diluyen los tamarindos en el agua y despues de algunos hervores se añade el sen y el sulfato de sosa; se deja infundir de media á una hora, se cuela con ligera expresion y se aromatiza con el eleosácaro.

6676. P. PURGANTE Y TÓNICA (*Roucher*).

℞ Tamarindos. . . . . ℥j (30 gr.).
Sándalo cetrino. . . . ℥j (4 gr.).
Maná. . . . . ℥ijß (75 gr.).
Tintura acuosa de ipecacuana preparada con seis granos. ℥j (30 gr.).
U. S. A. *I.* Disenterías crónicas y biliosas, cuando hay atonía de los intestinos.

6677. P. PURGANTE Y VERMÍFUGA (*Macartan*).

℞ Agua de menta piper. ℥ij (90 gr.).
Aceite de ricino. . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de culantrillo. ℥ß (45 gr.).
Carbonato de potasa. . ℈j (12 dec.).
Se trituran en un mortero de vidrio la sal y el aceite, se añade el jarabe, se mezcla bien y se extiende en el agua de yerbabuena. *D.* Se toma en dos veces con media hora de intervalo.

6678. P. QUERMETIZADA.

℞ Quermes mineral. . . . ʒj (5 cent.).
Goma tragacanto. . . . ʒx (5 dec.).
Agua. . . . . ℥jv (16 gr.).
M. I. Se usa como expectorante. *D.* A cucharadas.

6679. *Otra*, n. 2.

℞ Goma trag. en polvo. ʒxviij (1 gr.).
Quermes mineral. . . ʒij (1 dec.).
Se tritura con
Jarabe de Tolú. . . . ℥ß (45 gr.).
Se añade:
Infusion de hisopo. . ℥vj (180 gr.).
I. Es expectorante. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6680. P. QUERMETIZADA CONTRAESTIMULANTE.

℞ Pocion gomosa. . . . ℥iv (125 gr.).
Quermes. . . . . ʒxviij (1 gr.).
M. I. Se usa como contraestimulante. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6681. *Otra*, n. 2.

℞ Infusion de hojas de naranjo. .	200
Goma tragacanto.	1
Quermes mineral.	2
Jarabe simple.	20
Jarabe diacodion.	20

M. D. A cucharadas de hora en hora.

6682. P. DE QUARIN CONTRA LA TOS SOFOCATIVA.

℞ Ojimiel escilítico,
Aceite de almendras dulces,
Jar. de malvab., ää. ʒx (40 gr.).
Goma amoniaco. . . . ℥j (4 gr.).
Yema de huevo. . . . c. s.
Despues de haber triturado bien estas sustancias se añade:
Agua de hisopo. . . . ℥vj (192 gr.).
D. ℥j (30 gr.) cada tres ó cuatro horas.

6683. P. DE QUASIA.

℞ Extracto de quasia. . ʒijß (10 gr.).
Colombo. . . . . gxc (5 gr.).
Carbonato de sosa. . . ʒß (2 gr.).
Vino de Málaga. . . . ℥vj (180 gr.).

Jarabe de canela. . . . ʒjß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Dispepsia, vómitos espasmódicos, escorbuto, diarrea atónica, disenteria. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6684. P. DE QUINA (H. M. F.).

℞ Quina. . . . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Alcoholado de canela. ℥xc (5 gr.).

Se hierve ligeramente la quina y se la infunde despues en c. s. de agua para obtener ʒiij (90 gr.) de líquido colado. Se cuela y se añade el jarabe.

I. Es tónica y estimulante en el período adinámico de las calenturas tifoideas.

LA POCION DE QUINA ALCANFORADA se prepara añadiendo á la anterior ℥xc (5 gr.) de alcanfor. *I.* Período pútrido de las calenturas tifoideas.

Para preparar la POCION DE QUINA ETÉREA se añade á la pocion de quina ʒß (2 gr.) de licor de Hoffmann. *I.* Es antiespasmódica y tónica.

LA POCION DE QUINA OPIADA se prepara añadiendo ʒjß (6 gr.) de alcoholado de opio. *I.* Tónica y calmante, que conviene en las afecciones intermitentes ligeras.

6685. P. DE QUINA Y CANELA (*Frank*).

℞ Extracto de quina. . . ʒiij (12 gr.).
Cocimiento de quina. ʒijß (75 gr.).

Se disuelve y se añade:

Alcoholato de canela. ʒj (30 gr.).
Jarabe de adormidera. ʒß (15 gr.).

M. I. Escorbuto. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6686. P. DE QUINA COMPUESTA.

℞ Infusion de quina. . . ʒjv (125 gr.).
Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de canela, ää. . . . . ʒß (15 gr.).
Jarabe de quina. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Calenturas adinámicas. Se puede añadir extracto de quina y acetato de amoniaco. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6687. P. DE QUININA CONTRA LAS NEURALGIAS (*Hermel*).

℞ Julepe gomoso. . . . . ʒiv (125 gr.).
Sulfato de quinina. . . ʒj (4 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . . 1 á 4 gotas.
Jarabe simple. . . . . c. s.

Se toma al fin del acceso, cuando son muy próximos, ó en su intervalo en cuatro tomas.

Si persisten algunos síntomas, se tomará una infusion de café tostado despues de comer.

Si esta pocion no bastase, se deberá añadir ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) de extracto de quina.

6688. P. DE QUININA ARSENICAL (*Boudin*).

℞ Sulfato de quinina. . . ℥xij (6 dec.).
Agua destilada. . . . . ʒj (30 gr.).
Ácido sulfúrico. . . . . 2 gotas.

Se añade;

Solue. arsenical de Boudin . . . . . ʒij (60 gr.).

que representa un octavo de grano de ácido arsenioso.

Se usa cuando el sulfato de quinina y el ácido arsenioso no han podido cortar una fiebre intermitente. *D.* De una vez, una á cinco horas antes del acceso.

6689. P. DE RAIZ DE ESPIGELIA.

℞ Raiz de espigelia. . . . ʒij (8 gr.).
Maná en lágrimas. . . ʒij (60 gr.).
Agua hirviendo. . . . . lbj (500 gr.).

Se infunde.

I. Lombrices. *D.* En tres tazas al dia. Conviene usar al mismo tiempo lavativas de cocimiento de almidon, hervido con el de espigelia.

6690. P. DE RATANIA.

℞ Ratania. . . . . ʒvj (21 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

que se reduce á la mitad y se añade:

Extracto de ratania. . ʒiij (12 gr.).

Jarabe de canela. . ʒj (32 gr.).
I. Diarrea crónica, disenteria, hemorragia, aborto. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6691. P. DE RESINEONA.

℞ Aceite de resineona,
Jarabe de Tolú,
Jarabe de violetas, ãã. ʒß (15 gr.).
Agua de amapola. . . ʒiij (90 gr.).
Goma tragacanto. . . . ℈ß (6 dec.).
H. S. A. *D.* ʒß (15 gr.) en una pocion de ʒjv á ʒvj (125 á 180 gr.).

6692. P. RESOLUTIVA.

℞ Acetato de potasa. . ℊxc (5 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ʒj (30 gr.).
Extracto de quina, ✱
Extr. de cicuta, ãã. ℊix (50 cent.).
Jar. de las cinco raic. ʒij (60 gr.).
Agua de hinojo,
Agua de enebro, ãã. ʒjß (45 gr.).
M. I. Atrofia mesentérica, obstrucciones de las vísceras abdominales, hidropesía. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6693. *Otra* (HEIN).

℞ Acetato de potasa. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Extracto de cicuta. . . ℊjv (2 dec.).
Agua. . . . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe de amapolas. . ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa con buen éxito en el principio de la atrofia mesentérica. *D.* Cuatro cucharaditas al dia.

6694. P. DE RIVERIO ETÉREA.

℞ Jarabe de limon. . . . ʒj (30 gr.).
Zumo de limon. . . . ʒß (15 gr.).
Agua de azahar. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de tila. . . . . ʒij (60 gr.).
Láudano líquido. . . . . 12 gotas.
Éter sulfúrico. . . . . 12 gotas.
Bicarbonato de potasa. ʒß (2 gr.).
Se pesan en la botella el jarabe de limon, el zumo, las aguas destiladas, el vino de opio y el éter; se añade el bicarbonato alcalino y se tapa al instante.

6695. P. DE ROBERTO TOMAS DE SALISBURY.

℞ Acet. de plomo crist. ℊiij (15 cent.).
Agua de rosas . . . ʒij (60 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe de violetas. . ʒij 8 gr.).
I. Coqueluche. *D.* Una cucharadita cada cuatro horas.

6696. P. DE SALEP.

℞ Cocimiento de salep. ʒiij (90 gr.).
Infusion de ruibarbo. ʒijß (10 gr.).
Jarabe de canela,
Jarabe diarodion,
Ag. de laurel real. ãã. ʒv (20 gr.).
M. I. Diarrea atónica, disenteria crónica. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6697. P. SALINA (H. M.).

℞ Sulfato de magnesia. ʒj (30 gr.).
Agua comun. . . . . ʒxij (375 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jarabe simple. . . . ʒij (60 gr.).
D. En tres tomas.

6698. P. SALINA PURGANTE.

℞ Tartrato de potasa y sosa. . . . . ʒvj (24 gr.).
Tártaro emético. . . . ℊj (5 cent.).
Agua de flores de nar. ʒij (8 gr.).
Jarabe de miel. . . . . ʒj (32 gr.).
Agua. . . . . ʒij (64 gr.).
M. D. A cucharadas con diferentes intervalos como purgante.

6699. P. SATURNINA OPIADA (*Rilliet*).

℞ Acetato de plomo. . ℊiij (15 cent.).
Láud. de Sydenham. ℨj (12 dec.).
Agua de cerezas negras. . . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒß (45 gr.).
M. I. Neumonías agudas. *D.* Una cucharada cada dos, cuatro ó cinco horas. Cuando es muy activa la circulacion conviene reemplazar el agua de cerezas negras por una infusion de digital, preparada

con ʒij (8 gr.) de hojas por ʒv (150 gr.) de agua.

6700. P. SEDANTE.

℞ Extracto de zumo depurado de belladon. gj (5 cent.).
Agua dest. de lechuga. ʒiij (90 gr.).
Jarabe de Tolu. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Coqueluche. *D.* Se toma á cucharadas de hora en hora.

6701. *Otra* (F. BA.).

℞ Semillas de beleño. . gxx (10 dec.).
Almendras dulces. . . ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
Se hace una emulsion y se cuela.
I. Asma y catarros. *D.* A cucharadas.

6702. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Polvo de digital. . . . gjv (2 dec.).
Extracto de Saturno. . 3 gotas.
Jar. de flor de naranj. ʒj (30 gr.).
Se tritura todo en un mortero de vidrio y se añade poco á poco:
Infusion de amapola. . ʒvj (180 gr.).
D. Se usa á cucharadas al dia en los casos de hipertrofia del corazon. Se agitará la botella al tiempo de tomar la pocion.

6703. *Otra* (HENKE).

℞ Extracto de quina. . . ʒj (4 gr.).
Agua dest. de hinojo. ʒjß (45 gr.).
Se disuelve y se añade:
Jar. de cáscara de nar. ʒj (30 gr.).
Láudan. de Sydenham. gxviij (1 gr.).
Eter sulfúr. alcohol. ʒj (4 gr.).
I. Ultimo periodo de la coqueluche, cuando predomina la debilidad. *D.* Una cucharada de café cada hora á los niños de cuatro á diez años.

6704. *Otra* (H. DE IT.).

℞ Extracto de beleño. . gv (25 cent.).
Agua de lechuga. . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒß (15 gr.).
M. D. A cucharadas en el dia.

6705. *Otra* (RICHTER).

℞ Acetato de amoniaco. ʒvj (24 gr.).
Extr. de cardo santo. ʒj (4 gr.).
Tintura de opio. . . . 8 gotas.
Agua de saúco. . . . . ʒjv (125 gr.).
M. I. Catarro pulmonar con tos seca. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6706. *Otra* (SINDELIN).

℞ Agua destilada de menta piperita. . . . . ʒv (150 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒjß (45 gr.).
Borato de sosa. . . . . ʒjß (6 gr.).
Láudano de Sydenham. ʒß (2 gr.).
H. S. A. *I.* Cólico saturnino. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6707. P. SEDANTE ACEITOSA (*Jahn*).

℞ Agua de cal. . . . . ʒiij (90 gr.).
Aceite de almendras dulces,
Jar. de adormider. . ää. ʒj (30 gr.).
Goma arábiga en polv. ʒij (8 gr.).
Alcoholado de opio,
Yema de huevo, ää. . ʒj (4 gr.).
M. I. Iscuria, estranguria, dolores provocados por los cálculos urinarios. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6708. P. SEDANTE AMONIACAL (*Hecker*).

℞ Maná en lágrimas. . . ʒj (30 gr.).
Agua de cerezas negr. ʒiij (90 gr.).
Tintura de amoniaco anisada. . . . . ʒß (2 gr.).
M. I. Tos, tos espasmódica. *D.* A cucharadas.

6709. P. SEDANTE DE DIGITAL.

℞ Infusion de digital. . ʒiij (90 gr.).
Extr. gomoso de opio. gij (1 dec.).
Nitro. . . . . gxviij (1 gr.).
Jarabe de valeriana. ʒjß (48 gr.).
Acido cianhídrico . . gjx (50 cent.).
Agua de menta piper. gjv (20 cent.).
M. I. Asma, aneurisma, cardiopalmia, palpitaciones de corazon,

esplenitis, plétora, carditis, neumonía aguda, enfisema, hemotisis, gastralgia. *D.* A cucharadas de café de hora en hora.

6710. P. SEDANTE EMULSIVA (*Rothamel*).

℞ Semillas de lechuga cultivada. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua destilada de cerezas negras. . . . ℥jv (125 gr.).

H. S. A. una emulsion, se cuela y se añade:

Tridacio. . . . . gr̃xv (75 cent.).
Jarabe de adormid. ʒiij (12 gr.).

I. Gastritis, cuando las arcadas y los vómitos persisten á pesar de las evacuaciones alvinas. *D.* Al principio una cucharada cada media hora, y mas tarde solo de hora en hora.

6711. P. DE SIMARUBA OPIADA (*Lemarchand*).

℞ Corteza de simaruba. ʒj (4 gr.).
Agua. . . . . ℥viij (375 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad y se añade:

Láud. de Sydenham. gr̃vij 35 cent.).

H. S. A. *I.* Disenteria de los países cálidos. El régimen debe constar de carne de pollo, huevos frescos y pescados. Se usará por bebida el agua ferruginosa y un poco de vino á las comidas. *D.* En dos tomas por la mañana en ayunas.

6712. P. DE SPIELMANN.

℞ Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de manzanilla, ãã. . . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe de flores de amapola.
Jar. de manzanilla, ãã. ʒß (15 gr.).

H. S. A. *D.* Una cucharada de café cada cuarto de hora.

6713. P. DE STHAL.

℞ Sal de amoniaco. . . ʒij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe de altea. . . . . ʒj (30 gr.).

D. Media cucharada cada dos horas contra la escarlatina nerviosa ó atáxica, escarlatina grave.

6714. P. DE STEARNS.

℞ Cornezuelo de centen. ʒß (2 gr.).
Agua. . . . . ℥vj (180 gr.).

Se infunde.

I. Partos laboriosos por inercia de la matriz. *D.* Una cucharada de café cada diez minutos.

6715. P. DE STUETZ CONTRA EL TÉTANOS.

℞ Carbonato de potasa. . ʒiij (12 gr.).
Agua de manzanilla. . ℥iij (96 gr.).
Agua de canela. . . . . ℥iij (96 gr.).
Jarabe de amapolas. . ʒj (32 gr.).

M. D. Una cucharada cada tres horas.

Nota. Media hora despues de tomar una cucharada se dan de cinco á quince gotas de tintura de opio.

Stuetz auxilia la accion de estos medios con lavativas de agua de jabon, á las cuales añade de ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) de carbonato de potasa, y hace tomar al enfermo dos baños diarios de agua caliente, en la cual disuelve de ℥j á ℥jß (30 á 45 gr.) de potasa cáustica. Se puede reemplazar los baños por aplicaciones continuas sobre el bajo vientre, de una franela empapada en una solucion de cerca de ʒß (2 gr.) de potasa cáustica en lbj (500 gr.) de agua de jabon.

6716. P. SUCINADA.

℞ Aceite de sucino. . . ʒj (4 gr.).
Tint. de bals. de Tolú. ʒij (8 gr.).
Jarabe de goma. . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . ℥jv (125 gr.).

H. S. A. *I.* Asma, bronquitis, catarro crónico, gota, parálisis, tétanos, histérico, íleo. *D.* Una cucharada de dos en dos horas.

6717. P. DE SUCINATO DE AMONIACO.

℞ Sucinato de amoniaco. ʒj (4 gr.).
Jarabe diacodion. . . . ʒij (60 gr.).
Agua de ruda,
Ag. de flor de nar., ãã. ʒiij (90 gr.).
M. I. Asma, coqueluche, tos, espasmos, envenenamiento, tétanos, histérico, parálisis, neumonía, pleuresía, muermo. *D.* A cucharadas.

6718. P. SUDORÍFICA (*Remer*).

℞ Amoniaco líquido,
Eter sulfúrico, ãã. . . ʒijß (10 gr.).
Agua de menta piper. ℥v (150 gr.).
Jarabe de canela. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Sífilis, sifílides, mordeduras de animales venenosos, hidrofobia, tétanos, reumatismo, parálisis. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6719. P. SUDORÍFICA AMONIACAL.

℞ Acetato de amoniaco. ʒß (15 gr.).
Vino tinto. . . . . ℥v (150 gr.).
Tintura de canela. . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe de quina. . . . ʒjß (45 gr.).
M. I. Flegmasías, neumonía, pleuresía crónica, catarro crónico con adinamia, blenorragia, absceso, reumatismo, sífilis, sífilides, neumatosis. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6720. *Otra*, n. 2.

℞ Agua de canela. . . . . ʒij (60 gr.).
Jarabe de azafran. . . . ʒj (30 gr.).
Carbonato de amoniaco. gxc (5 gr.).
Tintura de pimienta de la Jamáica. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Envenenamiento, sífilis, sífilides, catarro crónico, embriaguez, reumatismo, parálisis, pasmo, supresion de la traspiracion, atonía del conducto digestivo, úlceras atónicas, astenia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6721. P. SUDORÍFICA ANTIMONIADA.

℞ Cocimiento de zarzaparrilla. . . . . ʒiij (96 gr.).
Vino estibiado. . . . ʒijß (40 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒj (32 gr.).
Rob de saúco. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Parálisis, tétanos, reumatismo agudo y crónico, reperension ó erupcion difícil de los exantemas agudos, sífilis, sífilides. *D.* A cucharadas de dos en dos horas.

6722. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . gxij (6 dec.).
Agua. . . . . ʒjv (125 gr.).
Acido sulfúrico alcoholizado. . . . . algunas gotas
para disolver el sulfato de quinina.
Jarabe simple,
Jarabe diacodion, ãã. ʒß (15 gr.).
M. D. Se toma en dos veces con una hora de intervalo.

6723. *Otra*, n. 2.

℞ Agua destilada de lechuga. . . . . ʒiij (90 gr.)
Agua destilada de canela. . . . . ʒjv (15 gr.).
Sulfato de quinina. . gxij (6 dec.).
Jar. de cáse. de nar. ʒj (30 gr.).
H. S. A. *D.* De cuatro á ocho cucharadas al dia con dos horas de intervalo.
Nota. Se puede reemplazar ventajosamente el sulfato de quinina por ʒij á ʒjv (8 á 16 gr.) de alcohol de quinina.

6724. *Otra*, n. 3.

℞ Sulfato de quinina. . gx (50 cent.).
Jarabe de alcanfor,
Jarabe de acetato de morfina,
Agua de lechuga,
Agua de flor de naranjo,
Agua de melisa, ãã. ʒj (30 gr.).
M. I. Apirexia de las calenturas intermitentes, sudor inglés, gangrena, gangrena de hospital, escorbuto, esplenalgia, hemicránea,

hemotisis, hipo, reumatismo, ciática, gota, neuralgia, muermo.

6725. P. DE SULFATO DE QUININA (H. DE AMÉR.).

℞ Sulfato de quinina. . ℈xij (6 dec.).
Agua de canela. . . . ℥ijß (75 gr.).
Acido sulfúr. diluido. 10 gotas.
Jar. de cáscara de nar. ℥j (30 gr.).
M. I. V. la anterior. *D.* Una cucharadita de café de hora en hora.

6726. P. DE TANINO.

℞ Tanino. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Agua alcanforada. . . ℥iv (125 gr.).
Jarabe de extracto de ratania,
Jarabe vinoso de azafran, ãã. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Diarrea atónica, hemotisis, blenorrea, leucorrea, hemorragias, metrorragia, úlceras atónicas, envenenamiento.

6727. P. TÓNICA.

℞ Acetato de amoniaco. . ℥j (4 gr.).
Agua de goma. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe simple,
Miel escilítica, ãã. . . . ℥j (30 gr.).
Agua de flores de naranjo,
Extracto de quina, ãã. ℥ij (8 gr.).
M. D. A cucharadas.

6728. *Otra*, n. 2.

℞ Acetato de amoniaco. . ℥ß (15 gr.).
Agua de canela,
Agua etérea alcanf., ãã. ℥ij (60 gr.).
Tintura de quina. . . . ℥ij (8 gr.).
Eter. . . . . ℥ß (2 gr.).
Jarabe de claveles. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Calenturas graves complicadas con flegmasías del pulmon, calentura héctica, calentura atáxica, adinámica ó tifoidea, úlceras asténicas, tifo, diarrea, dispepsia. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6729. *Otra*, n. 3.

℞ Jarabe de genciana,
ó Jarabe de quina,
ó Jarabe de Tolú. . . . ℥j (30 gr.).
Tintura de quina,
ó Extracto de quina. . . ℥ij (8 gr.).
Agua de camedrios. . ℥iv (125 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6730. *Otra* (H. M.).

℞ Cocimiento de quina. ℔ß (250 gr.).
Tintura alcohólica de canela. . . . . ℥j (4 gr.).
Acetato de amoniaco líquido. . . . . ℥ij (8 gr.).
Jar. de cort. de cidra. ℥ij (60 gr.).
M. D. Una cucharada cada hora.

6731. *Otra* (H. DE NIÑOS).

℞ Jarabe de quina. . . . ℥j (30 gr.).
Alcohol de melisa. . . ℥ij (8 gr.).
Pocion gomosa. . . . . ℥iv (125 gr.).
M. D. A cucharadas de hora en hora.

6732. *Otra* (H. DE P.).

℞ Jarabe de quina. . . . ℥vj (24 gr.).
Alcohol de melisa compuesto. . . . . ℥ij (8 gr.).
Agua de menta piper. ℥j (32 gr.).
Agua comun. . . . . ℥iij (96 gr.).
M. D. Una cucharada de hora en hora.

6733. *Otra* (LERMINIER).

℞ Agua de valeriana. . . ℥vj (180 gr.).
Agua de menta,
Agua de canela, ãã. . ℥j (30 gr.).
Extr. seco de quina. ℥ij (8 gr.).
Eter sulfúrico. . . . . ℥j (4 gr.).
Jarabe de claveles. . . ℥j (30 gr.).
M. I. Calenturas tifoideas ó adinámicas, con gran postracion de fuerzas. *D.* A cucharadas.

6734. *Otra* (JAHN).

℞ Angustura,
Flores de arnica, ãã. ℥ijß (10 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥v (150 gr.).
Se cuece y se añade:
Vinagre,
Jarabe de naranja, ãã. ℥j (30 gr.).

Goma arábiga,
Tintura tebáica, ãã. . ʒj (4 gr.).

I. Diarreas crónicas, calenturas tifoideas, calenturas hécticas, tifo, úlceras atónicas, astenia, ataxia, dispepsia. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6735. P. TÓNICA (*Recamier*).

℞ Raiz de angustura. . ʒß (15 gr.).
Se hierve en
Agua. . . . . ʒxx (625 gr.).
Se toma de este
Cocimiento. . . . . ʒvj (180 gr.).
Se añade:
Agua de canela. . . . ʒß (15 gr.).
Tintura de opio. . . . 20 gotas.

I. Casos en que hay que dar tono en las enfermedades acompañadas de debilidad considerable de las funciones digestivas. Se la puede endulzar con un jarabe. *D.* Tres cucharadas al dia.

6736. *Otra* (VOGT).

℞ Infusion de ruibarbo. ʒjß (6 gr.).
Extracto de cuerno de ciervo. . . . . ʒij (24 dec.).
Agua de canela. . . . ʒfß (48 gr.).
Jarabe de opio. . . . ʒvß (22 gr.).

M. I. Diarrea de los niños. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

6737. P. TÓNICA Y ASTRINGENTE.

℞ Extracto de quina,
Tintura de canela. ãã. ʒß (2 gr.).
Jarabe de nenúfares. ʒß (15 gr.).
Infusion de rosas rojas. ʒiij (90 gr.).

M. I. Diarreas crónicas, hemorragias pasivas.

6738. *Otra* (WENDT).

℞ Quina roja quebrantada. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua hirviendo. . . . ʒjv (125 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade S. A.
Extracto de palo de Campeche. . . . . ʒj (4 gr.).
Agua de canela,
Jarabe de flores de naranjo, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Diarrea asténica, dispepsia de los niños. *D.* Una cucharada de café de hora en hora.

6739. P. TÓNICA Y ESTOMACAL.

℞ Colombo. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥ß (250 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Láud. de Sydenham. 24 gotas.
Eter sulfúrico. . . . 20 gotas.

M. I. Dispepsia y diarreas crónicas, etc. *D.* A cucharadas.

6740. P. TÓNICA Y EXCITANTE (*Fiard*).

℞ Infusion de café. . . . ʒjv (125 gr.).
Jarabe de quina. . . . ʒij (60 gr.).
Acetato de amoniaco. ʒß (15 gr.).

M. I. Narcotismo producido por el envenenamiento por el opio. *D.* Una cucharada cada media hora.

6741. P. TÓNICA Y OPIADA.

℞ Extracto de quina. . . ʒij (8 gr.).
Extracto de opio . . . . gij (1 dec.).
Agua destilada de yerbabuena,
Agua destilada de canela, ãã. . . . . ʒij (60 gr.).

M. D. Una cucharada cada dos horas.

6742. P. TÓNICA DE MALATO DE HIERRO.

℞ Extracto de quina,
Extracto de genciana, ãã. ʒj (4 gr.).
Malato de hierro. . . . ʒß (2 gr.).
Agua de menta piperita,
Agua de manzanilla, ãã. ʒj (30 gr.).
Jarabe de flor de naranj. ʒv (20 gr.).

M. I. Escrófulas, amenorrea, caquexia, úlceras atónicas, bulimia, calentura héctica. *D.* Una cucharada cada tres horas.

6743. P. TÓNICA VERMÍFUGA.

℞ Musgo de Córcega,
Canela, ãã. . . . . ʒij (8 gr.

Acibar. . . . . 5ß (2 gr.).
Jar. de ésc. de naranj. ℥i (30 gr.).
Agua de menta piper. ℥iij (90 gr.).
M. I. Atonia del conducto digestivo, lombrices. *D.* Una cucharada de hora en hora.

6744. P. DE TREMENTINA.

℞ Trementina. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Yema de huevo. . . . número 1.
Se tritura y se añade:
Extracto de ruibarbo,
Sal prunela, ää. . . . ℈xc (5 gr.).
Se vierte despues poco á poco:
Infusion de regaliz. . ℥x (300 gr.).
Jarabe de malvabisco. ℥j (30 gr.).
M. I. Blenorragia, leucorrea, reumatismo, ciática, beriberi. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6745. P. TREMENTINADA CONTRA LA TÉNIA *ó Remedio contra la ténia* (*Levacher*).

℞ Aceite de ricino. . . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de trementina. ℥ß (15 gr.).
Agua de menta. . . . . ℥ij (60 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
Goma arábiga. . . . . 5ijß (40 gr.)
M. D. De una vez por la mañana en ayunas.

6746. P. TREMENTINADA (*Debreyne*).

℞ Agua de lechuga. 180
Goma arábiga. 15
Esencia de trementina. . . . 25
Jarabe simple. 60
M. I. Ciática. *D.* Tres cucharadas al dia, en union de la pomada del mismo autor.

6747. P. DE TRIDACIO.

℞ Tridacio. . . . . ℈xij (6 dec.).
Infusion de amapola. ℥jv (125 gr.).
Jarabe simple. . . . ℥i (30 gr.).
D. Se toma á cucharadas de hora en hora.

6748. P. DE TRUSEN CONTRA LAS HIDROPESIAS.

℞ Elixir ácido de Haller. ℥ijß (40 gr.).
Agua comun. . . . . ℥vj (180 gr.).
Ojimiel escilítico. . . ℥ß (45 gr.).
M. S. A. *I.* Hidropesía no sostenida por lesion orgánica de los órganos de la respiracion ó desorganizacion considerable del hígado. *D.* Una cucharada cada dos horas.

6749. P. DE VAINILLA (*Hersokmann*).

℞ Vainilla. . . . . ℈xc (5 gr.).
Agua. . . . . ℥v (150 gr.).
Se infunde y se añade:
Jarabe de canela. . . . ℥i (30 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas nerviosas, en que está indicada la vainilla; calentura adinámica acompañada de síntomas histéricos, despues de haber combatido los síntomas de gastritis y congestion. Se administra la vainilla asociándola á cortas dosis de castóreo, en las calenturas adinámicas que agotan las fuerzas de las personas ancianas y delgadas; en las calenturas adinámicas que están acompañadas de evacuaciones colicuativas ó menos abundantes, y especialmente en la debilidad que se parece al síncope no interrumpido, que es la consecuencia de la sangría practicada sin suficiente indicacion, ó contraindicada, y en este último caso obra de un modo sorprendente, principalmente si se la asocia al opio. *D.* A cucharadas.

6750. P. DE VALERIANATO DE ZINC (*Devay*).

℞ Agua destilada. . . . ℥iv (125 gr.).
Valerianato de zinc. . ℈ij (4 dec.).
Jarabe simple. . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Es antiespasmódica. *D.* Una cucharada cada media hora.

6751. P. VERMÍFUGA.

℞ Santonico. . . . 5ijß (10 gr.).
Agua. . . . . ℥ij y ℥i (100 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:
Jarabe vermífugo de Boullay,
ó Jarabe de cáscara de naranja. . . ℥j (30 gr.).
D. Se toma de una vez por la mañana en ayunas.

6752. P. VERMÍFUGA (D. 2).

℞ Agua hirviendo. . . . ℥iv (125 gr.).
Zumo de limon. . . . . ℥j (30 gr.).
Agua de flor de nar. . ℥ß (15 gr.).
Musgo de Córcega. . ℥j (4 gr.).
Se hierve durante ocho minutos el musgo de Córcega, y se añaden las demás sustancias al líquido colado frio.
D. Se toma de una sola vez por la mañana en ayunas.
Nota. Se debe continuar el uso de esta pocion durante tres ó cuatro dias.

6753. *Otra*, n. 3.

℞ Ajenjo marino. . . . ℊxc (5 gr.).
Agua. . . . . ℥iij (90 gr.).
Jarabe vermífugo . . . ℥j (30 gr.).
D. En dos veces.

6754. *Otra*, n. 4.

℞ Coralina de Córcega. ℥iv (125 gr.).
Agua hirviendo. . . . . ℥vj (180 gr.).
Se infunde, se cuela y se añade:
Jarabe de miel. . . . . ℥j (30 gr.).
M. D. De una vez.

6755. *Otra* (STOLL).

℞ Extr. de cáse. de nuez. ℥ij (8 gr.).
Agua de canela. . . . . ℥ß (16 gr.).
M. D. Cincuenta gotas dos ó tres veces al dia, á los niños de tres á cuatro años.

6756. P. VERMÍFUGA DE ESENCIA DE TREMENTINA.

℞ Esencia de trementina,
Ag. dest. de menta, ää. ℥iij (90 gr.).
Jarabe de artemisa. . . ℥j (30 gr.).
Yema de huevo. . . . . núm. 1.
M. I. Ténia. *D.* En cuatro dosis de hora en hora.

6757. P. VERMÍFUGA PURGANTE.

℞ Sen. . . . . ℥ij (8 gr.).
Musgo de Corcega. . . ℥j (4 gr.).
Limon en rajas. . . . . núm. 1.
Maná. . . . . ℥ij (60 gr.).
Agua hirviendo. . . . ℥vj (180 gr.).
Se cuela á las doce horas de infusion.

6758. P. VINOSA DE ÉNULA CAMPANA (H. DE AL.).

℞ Tint. de énula camp. . ℥j (4 gr.).
Vino blanco. . . . . ℥vj (180 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Hidropesías. *D.* A cucharadas.

6759. P. VOMITIVA.

℞ Emético. . . . . ℊj (5 cent.).
Jarabe de flor de nar. ℥j (30 gr.).
Agua destilada de tilo. ℥v (150 gr.).
H. S. A. *D.* En dos dosis por la mañana en ayunas. Se puede reemplazar el emético por ℊxx (1 gr.) de ipecacuana ó ℊj (5 cent.) de emetina impura, ó bien si el enfermo vomita con dificultad se añadirá á esta pocion ℊvj á ℊx (3 á 5 dec.) de ipecacuana ó gß (25 mil.) de emetina impura.

6760. *Otra*, n. 2.

℞ Emético. . . ℊj á ℊiij (5 á 15 cent.),
ó Ipecacuana en polvo, ℊxx á ℊxxjv (10 á 12 dec.).
Se tritura en
Agua destilada,
ó Agua de manzanilla,
ó Agua de menta. . . . ℥xij (375 gr.).
D. En tres tomas con media hora de intervalo. Se facilitan los primeros vómitos haciendo beber mucha agua tibia, y se continúa dándola en los intervalos de los vómitos.

6761. *Otra*, n. 3.

℞ Ipecacuana en polvo. ℥ß (6 dec.

Agua. . . . . ʒlv (128 gr.).
M. D. Se toma de una vez.

6762. P. VOMITIVA.

℞ Emético. . . . . ℊij (1 dec.).
Agua destilada de yerbabuena. . . . . ʒjß (45 gr.).
Agua destilada. . . . ʒvj (180 gr.).
Jarabe de ipecacuana. ʒjß (45 gr.).
H. S. A. *D.* En tres tomas con media hora de intervalo.

6763. P. VOMITIVA DE MAGENDIE (F. P.).

℞ Inf. de flor de tilo. . . ʒiij (90 gr.).
Jarabe de malvabisco. ʒj (30 gr.).
Emetina pura, disuelta en c. s. de ácido acético ó nítrico. . . . ℊj (5 cent.).
H. S. A. *I.* Una cucharada de cuarto en cuarto de hora hasta producir el vómito.

6764. *Otra* (HUFELAND).

℞ Tártaro emético. . . ℊj (5 cent.).
Ipecacuana en polvo. ℊxv (75 cent.).
Ojimiel escilítico. . . ʒß (15 gr.).
Agua simple. . . . . ʒij (60 gr.).
M. D. Se toma en tres veces con diez minutos de intervalo.

6765. *Otra* (MAGENDIE).

℞ Emetina parda. . . . . ℊjv (2 dec.).
Inf. de hojas de nar. ʒiij (90 gr.).
Se disuelve y se endulza con
Jar. de flor. de naranjo. ʒv (20 gr.).
I. Catarros pulmonares, diarreas crónicas, coqueluche. *D.* Una cucharada cada media hora.

6766. P. VOMITIVA COMPUESTA.

℞ Tártaro emético. . . . . ℊj (5 cent.).
Jarabe escilítico. . . . ʒj (30 gr.).
Agua de manzanilla. . . ʒij (60 gr.).
Tintura de ipecacuana. ʒß (15 gr.).
M. I. Crup, grippe, calenturas mucosas, embarazo gástrico, acne, coqueluche. *D.* A cucharaditas de café de cuarto en cuarto de hora.

6767. P. VOMITIVA CON EMÉTICO.

℞ Tártaro emético. . . ℊij (1 dec.).
Agua. . . . . ʒvij (210 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
M. D. En dos ó tres tomas con un cuarto de hora de intervalo.

6768. P. VOMITIVA CON IPECACUANA.

℞ Polvo de ipecacuana. ʒj (13 dec.).
Agua. . . . . ʒvij (210 gr.).
Jarabe simple. . . . ʒj (30 gr.).
M. D Para tomar en dos veces con un cuarto de hora de intervalo.

6769. P. DE WENDT.

℞ Tartrato de potasa. . . ʒij (8 gr.).
Nitrato de potasa. . . ʒß (2 gr.).
Disuélvase en
Cocimiento de cebada. ʒjv (125 gr.).
Jarabe de moras. . . . ʒjß (45 gr.).
H. S. A. *I.* Calenturas tifoideas de los niños de cuatro á seis años. *D.* A cucharadas de hora en hora.

6770. P. DE ZINCATER.

℞ Eter cincado. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Jarabe de valeriana. . ʒj (30 gr.).
Agua de flor de naranjo,
Ag. de laurel real, ää. ʒjß (45 gr.).
M. I. Neurosis, convulsiones tétanos, epilepsia, corea. *D.* Una cucharada de hora en hora.

POLVOS.

6771. POLVO ABSORBENTE.

℞ Magnesia calcinada. . ℊvj (8 dec.).
Canela. . . . . ℊij (1 dec.).
Mézclese y divídase en dos papeles.

I. Diarreas en los niños por formacion de ácido en las primeras vías. *D.* En dos tomas al dia.

6772. P. ABSORBENTES.

℞ Harina de centeno. 1
Harina de altramuces. 2
M. I. Erisipela, eritema, cáncer. Se espolvorea la parte. *I.* Vómitos. Se aplica al epigastrio.

6773. *Otro* (BRERA).

℞ Carbonato de cal. . . ℊvj (3 dec.).
Magnesia. . . . . ʒß (15 gr.).
Colombo. . . . . ℊjx (50 cent.).
Ruibarbo. . . . . ℊiij (15 cent.).
Quina. . . . . ℊxviij (1 gr.).
M. I. Dispepsia, neumatosis, tialismo, pirosis, acidez de las primeras vías, vómitos. *D.* ʒß (2 gr.) tres veces al dia.

6774. *Otro* (TODE).

℞ Polvo de quasia. . . . . ℊxc (5 gr.).
Magnesia. . . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Neumatosis, vómitos, dispepsia, acidez de las primeras vías, gangrena de hospital, tialismo. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua.

6775. P. ABSORBENTE Y ESTOMACAL.

℞ Magnesia comun,
Azúcar de leche, ãã. . ʒij (60 gr.).
Cascarilla en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Oleosácaro de limon. . ʒjß (6 gr.).
M. I. Eructos agrios con debilidad de estómago. *D.* Una cucharada de café en medio vaso de agua azucarada, por la mañana, al mediodia y por la noche.

6776. P. ABSORBENTE MAGNESIANO.

℞ Magnesia calcinada. 1
Azúcar blanca pulverizada. 1
Se mezclan por trituracion en un mortero, y se guardan en una vasija bien tapada. Este polvo se debe preparar cuando se necesite. Se puede aumentar la cantidad del azúcar.
I. Acedías del estómago y envenenamiento por los ácidos. *D.* Contra las acedías de ℊxij á ℊxvj (6 á 8 dec.), y contra el envenenamiento la dósis que exijan.

6777. P. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar. . . . . ℊvij (35 cent.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
Hágase polvo fino.
I. Manchas en la córnea, cataratas. *D.* Se insufla en el ojo. *I.* Acne, amenorrea, clorosis, histérico, albuminuria. *D.* Se toma de una vez.

6778. P. DE ACÍBAR COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Acíbar. . . . . ʒjß (15 gr.).
Resina de guayaco. . . ʒj (30 gr.).
Polvo de canela comp. ʒß (15 gr.).
Se pulverizan por separado el acíbar y la resina de guayaco, y despues se mezcla con el polvo compuesto.

6779. P. DE ACÍBAR COMPUESTO.

℞ Acíbar sucotrino,
Mirra,
Sulfato de hierro, ãã. . . ʒj (4 gr.).
Esencia de sabina. . . . . 12 gotas.
Azúcar. . . . . c. s.
para incorporar el aceite.
Divídase en doce papeles.
I. Albuminuria, destete, catarata, amenorrea, clorosis, histérico. *D.* Un papel mañana y noche, incorporado con miel.

6780. P. DE ÁCIDO BENZÓICO ALCANFORADO.

℞ Alcanfor,
Ácido benzóico, ãã. . . ℊvj (3 dec.).
Opio. . . . . ℊij (1 dec.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Histérico, corea, cólera, dispepsia. *D.* En cuatro veces.

6781. P. DE ÁCIDO BENZÓICO (*Sundelin*).

℞ Acido benzóico. . . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor,
Azufre dorado de antimonio, ãã. . . . . gvj (3 dec.).
Oleosácaro de hinojo. . 5j (4 gr.).
M. Hágansе polvos y divídanse en seis partes iguales.

I. Catarros pulmonares crónicos, broncorreas, neumonía con síntomas tifoideos. *D.* Un papel cada hora con cocimiento de avena.

6782. P. DE ÁCIDO GÁLICO (*Stevenson*).

℞ Acido gálico. . . . . gviij (10 cent.).
Canela. . . . . gv (25 cent.).
Divídase en seis papeles.

I. Hematuria y hemorragia uterina. *D.* Un papel cada seis horas.

6783. P. DE ACÓNITO BORÁCICO (*Fritze*).

℞ Extracto de acónito. . 9j (12 dec.).
Acido bórico. . . . . 3ß (15 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.

I. Neuralgia, principalmente la ciática, reumatismo muscular y fibroso. *D.* Una toma mañana y noche.

6784. P. AERÓFOROS (*Hufeland*).

℞ Carbon. de magnes. 9j (12 dec.).
Si se desea obtener mas efervescencia se añade:
Bicarbonato de sosa. gxv (75 cent.).
Acido tártrico,
Azúcar en polvo, ãã. 9j (12 dec.).
Hágansе polvos que se toman en un vaso de agua en el momento de la efervescencia.

6785. P. AERÓFORO MARCIAL (*Hufeland*).

℞ Magnesia comun. . . . 3ij (8 gr.).
Tártaro depurado. . . . 5jv (16 gr.).
Tartrato de hierro. . . 9ij (24 dec.).
H. S. A. *D.* Dos á tres cucharadas de café desleídas en agua y se toma durante la efervescencia.

6786. P. DE AGÁRICO BLANCO (F. F.).

℞ Agárico blanco. . . . . c. s. q.
Se corta en pedazos, se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion sin dejar residuo, pasándolos por tamiz de seda.

I. y *D.* V. t. I, p. 69.

6787. P. DE AGÁRICO MERCURIAL.

℞ Agárico,
Oxido rojo de mercurio, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Azúcar blanca. . . . 5ß (15 gr.).
M. I. Engrosamiento de la córnea. *D.* Se insufla un poco en el ojo.

6788. P. DE AGÁRICO OPIADO.

℞ Agárico. gviij á gxxjv (4 á 12 dec.).
Extracto de opio. gijß á gjvß (12 á 22 cent.).
Goma arábiga. . . . . 5ij (8 gr.).
Hágase polvo y divídase en seis papeles.

I. Sudores colicuativos de los tísicos. *D.* Un papel por la noche.

6789. P. DE AILHAUT.

℞ Escamonea. . . . . 5j (1 gr.).
Hollin. . . . . 5jß (6 gr.).
Colofonia. . . . . 5ij (8 gr.).

I. Calenturas biliosas, embarazo gastro-intestinal, cólico metálico, hidropesía, ascitis. *D.* 5ß á gjv (2 á 15 gr.) en ayunas como purgante drástico.

6790. P. DE ALCANFOR (F. F.).

℞ Alcanfor. . . . . c. s. q.
Se pone en un mortero de mármol, se rocía con alcohol rectificado hasta penetrarle bien, y se pulveriza por trituracion.

I. y *D.* V. t. I, págs. 74 y 75.

6791. P. ALCANFORADO.

℞ Alcanf. en polvo. ℊß á ℊj (2 á 5 cent.).
Goma en polvo,
Azúcar blanca, ãã. . 5ß (2 gr.).
M. I. Síntomas adinámicos que se manifiestan en el curso de las calenturas eruptivas. *D.* Se da esta dosis cada dos horas en un vehículo.

6792. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Alcanfor,
Acido benzóico, ãã. . . ℊvij (3 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Un papel cada tres horas.

6793. P. ALCANFORADO ANTIMONIADO (*Mursinna*).

℞ Alcanfor en polvo. . . 5ß (2 gr.).
Ipecacuana en polvo,
Azufre dor. de ant., ãã. ℊxij (6 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 5vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.
I. Neumonía asténica. *D.* Un papel cada dos horas.

6794. P. ALIMENTICIO.

℞ Azúcar.	7500
Chocolate.	4000
Arrow root.	2000
Salep.	250
Café.	125
Canela.	180
Castañas tostadas.	1000
Manteca de cacao.	250

Hágase polvo.

6795. P. DE ALMIDON Y QUINA CON CANELA (*Recamier*).

℞ Alumbre. . . . . 5j (4 gr.).
Canela en polvo. . . . 3j (12 dec.).
Opio purificado. . . . ℊjv (2 dec.).
Hágase polvo S. A.
I. Metrorragia asténica. *D.* Una dosis cada cuatro horas.

6796. P. DE ALMIDON Y QUINA ALUMINOSO (*Recamier*).

℞ Almidon. . . . . 3x (40 gr.)
Quina en polvo. . . . 3xxv (100 gr.)
Alumbre en polvo. . 3jv (16 gr.).
M. I. Cáncer atrólico ulcerado. Retarda la marcha de la enfermedad aplicado tópicamente.

6797. P. DE ALMIZCLE ESTIBIO-MERCURIAL (*J. P. Frank*).

℞ Almizcle. . . . . ℊxx (10 dec.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . ℊx (5 dec.).
Divídase en veinte papeles.
I. Neuralgia, especialmente la facial. *D.* Un papel, mañana y noche.

6798. P. ALTERANTE *ó Polvos aromáticos rosados* (F. M.).

℞ Rosas rojas bien limp. 3xv (60 gr.).
Palo áloes,
Sándalo cetrino, ãã. . . 3iij (12 gr.).
Canela buena. . . . . 3xv (60 gr.).
Clavo de especia,
Macis, ãã. . . . . 3ijß (10 gr.).
Nuez moscada,
Cardamomo menor,
Raiz de galanga, ãã. . 3j (4 gr.).
Espinacardo. . . . . 3ij (26 dec.).
Háganse unos polvos muy sutiles.
I. Son muy corroborantes, muy digestivos, detienen los vómitos y diarreas, y excitan el apetito.

6799. P. ALTERANTE.

℞ Etiope antimonial,
Res. de guayaco, ãã. 3ß (6 dec.).
Magnesia,
Extracto de cicuta, ãã. ℊv (25 cent.).
Alcanfor. . . . . ℊij (1 dec.).
Azúcar. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Divídase en quince papeles.
I. Discrasia reumática. *D.* Un papel tres veces al dia.

6800. *Otro* (HUFELAND).

℞ Resina de guayaco. . . 5j (4 gr.).

Etiope antimonial,
Magnesia, ãã. . . . . ℈j (12 dec.).
M. I. Exantemas crónicos. *D.* Se toma en dos dias.

6801. P. ALTERANTE (*Sundelin*).

℞ Etiope antimonial. . ℊx (3 gr.).
Carbonato de sosa. ℊxlv (22 dec.).
Sasafrás,
Azúcar, ãã. . . . ℈ij (8 gr.).
Divídase en seis papeles.
D. Uno al dia en las afecciones crónicas de la piel.

6802. *Otro* (VOGT).

℞ Nitro. . . . . ℈ß (15 gr.).
Sal comun seca. . . . . ℈j (30 gr.).
Azúcar. . . . . ℈ij (60 gr.).
M. I. Gangrena á consecuencia de una contusion.

6803. P. DE ALUMBRE Y CANELA (*Jahn*).

℞ Alumbre. . . . . ℈j (4 gr.).
Canela en polvo. . . . ℥j (12 dec.).
Opio purificado. . . . ℊjv (20 cent.).
Divídase en cuatro dosis.
I. Metrorragia asténica. *D.* Un papel cada cuatro horas.

6804. P. DE ALUMBRE Y CATECÚ.

℞ Alumbre. 1
Catecú. 1
M. I. Hemorragias. Si se reemplaza el catecú por el sulfato de zinc, se obtiene un polvo estíptico que puede tener los mismos usos.

6805. P. DE ALUMBRE Y QUINA (*Schoeys*).

℞ Alumbre calc. en polvo. ℈ß (2 gr.).
Quina de Loja en polvo. ℈j (30 gr.).
M. I. Se le aconseja para combatir y prevenir el tialismo mercurial.

6806. P. ALUMINOSO DE VOGEL.

℞ Alumbre. . . . . ℈ij (8 gr.).
Quino. . . . . ℥j (12 dec.).
Opio. . . . . ℊiij (15 cent.).
Azúcar de leche. . . ℈j (4 gr.).
Divídase en seis papeles iguales.
I. Metrorragia atónica.

6807. P. ALUMINOSO (H. DE AL.).

℞ Alumbre. . . . . ℊij (4 dec.).
Azúcar blanca,
Goma arábiga, ãã. . . . ℊx (5 dec.).
M. I. Hemorragias pasivas, tialismo, diarrea rebelde, metrorragia, gangrena de hospital. *D.* Para una dosis.

6808. *Otro* (PERRIN).

℞ Alumbre en polvo,
Azúcar en polvo, ãã. . . ℈ij (8 gr.).
M. I. Se usa en insuflacion para combatir las anginas guturales.

6809. *Otro* (RECAMIER).

℞ Alumbre en polvo. . . . ℈ij (8 gr.).
Almidon. . . . . ℈iij (90 gr.).
M. I. Se usa para combatir las escoriaciones de la vagina.

6810. P. AMARGO (*Schlesier*).

℞ Nuez vómica en polvo. ℊj (5 cent.).
Azúcar de leche. . . . . ℊxc (5 gr.).
H. S. A. polvo y divídase en diez y seis papeles iguales.
I. Calentura tifoidea. *D.* Un papel cada tres horas, y al comer en la gastralgia.

6811. P. AMARGO ALCALINO (*Heim*).

℞ Carbon. . . . . ℈vj (24 gr.).
Carbonato de magnesia,
Quasia, ãã. . . . . ℈j (4 gr.).
Mézclese y hágase polvo.
I. Pirosis. *D.* Una cucharada de café dos ó tres veces al dia.

6812. P. DE AMBAR MOSCADO.

℞ Ambar gris. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Almizcle. . . . . ℊiij (15 cent.).
Esencia de canela. . . 2 gotas.

Azúcar blanca. . . . . 3iij (12 gr.).
M. D. 3ß á 3j (6 á 12 dec.) muchas veces al dia.

6813. P. DE AMBAR COMPUESTO.

℞ Canela fina,
Clavo,
Macis,
Nuez moscada,
Raiz de galanga,
Raiz de zedoaria,
Raiz de sasafr. rasp., ãã. 3iij (12 gr.).
Leño de áloes raspado,
Sándalo cetrino raspado,
Cáscaras de limon secas,
Sim. de cardamomo, ãã. 3ij (8 gr.).
Ambar gris. . . . . 3j (4 gr.).
H. S. A. *I.* Es estomacal y excitante. *D.* gxij (6 dec.) hasta 3ß (2 gr.).

6814. P. AMONIACAL ALCANFORADO

℞ Carbonato de amoniaco. ℈v (2 dec.).
Alcanfor. . . . . ℈ij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 3j (12 dec.).
M. I. Es diaforético y antiespasmódico. *D.* En una dosis.

6815. P. AMMONÍGENO (*Ruelle*).

℞ Cal apagada. . . . . 3ij (60 gr.).
Clorhidrato de amoniaco en polvo. . . . . 3j (30 gr.).
I. Se usa para llamar el sudor á los piés. *D.* Se espolvorean las medias, dia y noche, con una cucharadita de esta mezcla.

6816. P. ANODINO *ó de coral anodino* (*Helvetius*).

℞ Mirra. . . . . Ibjß (750 gr.).
Cascarilla,
Canela de olor de clavo, ãã. . . . . Ibj (500 gr.).
Opio,
Bol armónico, ãã. . . 3jv (125 gr.).
Coral rojo preparado. Ibß (250 gr.).
H. S. A. *I.* Disenterías, cólicos de estómago y pleuresía. *D.* De gxviij á 3ß (1 á 2 gr.).
Nota. Esta composicion es mas excitante que anodina. Es necesario no dejarse llevar del título y de la adicion del opio.

6817. P. HANNOVERIANOS (F. M.).

℞ Cinabrio nativo,
Azúcar piedra, ãã. . . . 3vj (24 gr.).
Aceite de canela. . . . 6 gotas.
Se reducen á polvo exactamente, se mezclan y guardan para el uso.
I. Enfermedades del celebro y de los nervios. *D.* gjv hasta gxx (2 á 10 dec.).

6818. P. ANTIÁCIDO.

℞ Magnesia calcinada. . . 3ß (15 gr.).
Cáscaras de naranja,
Azúcar blanca, ãã. . . . 3j (4 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
I. Agrios del estómago. *D.* Tres ó cuatro papeles al dia.

6819. P. ANTIARTRÍTICO.

℞ Extracto de acónito. . . ℈v (2 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 3ß (15 gr.).
Divídase en dos papeles.
I. Gota, reumatismo, otitis, sordera, cefalalgia, hemicránea, coriza, síncopes, histérico. *D.* Un papel mañana y noche.

6820. *Otro* (HARTMANN).

℞ Azúcar. . . . . 3ij (60 gr.).
Canela. . . . . 3iß (45 gr.).
Carbonato de hierro. . 3ß (15 gr.).
H. S. A. *D.* De 3ß á 3j (2 á 4 gr.).

6821. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Resina de guayaco,
Tártaro purific., ãã. ℈xv (75 cent.).
M. D. En una toma, tres ó cuatro veces al dia, en un poco de agua de malvabisco.

6822. *Otro* (MARC).

℞ Polvo de regaliz. . . . 3ij (8 gr.).
Rhododendrum chrysanthum. . . . . ℈x (5 dec.).

H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se divide en diez tomas iguales. *D.* Una toma mañana y noche.

Nota. Se aumenta una dosis cada dia hasta que se presente un abundante sudor ó aumento de la excrecion de la orina. Algunas veces hay que administrar hasta ℊxxx (15 dec.) al dia.

6823. P. ANTIARTRÍTICO (*Richter*).

℣ Azufre sublimado. . . .	5ß (2 gr.).
Cálamo aromo. en polvo.	5j (4 gr.).
Antimonio crudo.	
Azúcar blanca, ää. . . .	5ij (8 gr.).

H. S. A. I. Gota acompañada de atonía de los órganos abdominales. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6824. P. ANTIARTRÍTICO PURGANTE ó *Polvo de escamonea compuesto.*

℣ Escamonea.	2
Sen.	4
Bitartrato de potasa.	4
Cardo santo.	4
Zarzaparrilla.	4
China.	2
Guayaco.	2
Canela de Ceylan.	2

Redúzcanse á polvo S. A.

I. y *D.* Se usa como purgante suave para prevenir los ataques de gota, á la dosis de 5j (4 gr.) todos los meses.

Nota. 5j (4 gr.) de este polvo contiene gvj (3 dec.) de escamonea y gxij (6 dec.) de sen.

6825. P. ANTIASMÁTICO (*Urban*).

℣ Azufre dorado de antimonio.	ℊjv (2 dec.).
Extracto de beleño. . .	ℊxij (6 dec.).
Ojos de cangrejos preparados.	5jv (16 gr.).
Azúcar blanca.	5iij (12 gr.).

M. I. Asma húmedo. *D.* Una cucharadita de café cada dos ó tres horas.

6826. P. ANTIASMÁTICO Ó INCISIVO.

℣ Azúcar.	3
Azufre lavado.	2
Cebolla albarrana.	1

H. S. A. I. Romadizos, catarros. *D.* Diez y ocho á treinta granos.

6827. P. ANTIATRÓFICO (*Hufeland*).

℣ Hierro alcoholizado. .	ℊj (5 cent.).
Carbonato de magnes.	ℊv (25 cent.).
Canela.	ℊij (10 cent.).
Azúcar blanca.	5j (12 dec.).

H. S. A. I. Atrofia y raquitis de los niños.

6828. P. ANTIBLENORRÁGICO (*Eisermann*).

℣ Cloruro de hierro y amoniaco. .	33
Poligala de Virginia en polvo. .	33
Amoniaco en polvo.	29
Regaliz en polvo.	400

Divídase en papeles de 5ß (2 gr.).

I. Blenorragia en personas poco irritables y cuando el flujo es muy fluido. *D.* Una dosis cada tres ó cuatro horas.

6829. P. ANTICARDIÁLGICO (*Schubart*).

℣ Magnesia calcinada.	ℊxl (3,30 gr.).
Azúcar blanca. . . .	5ß (2 gr.).
Oxido de bismuto. .	5ß (6 dec.).
Esencia de cajeput. .	12 gotas.

Hágase polvo y divídase en seis papeles.

D. Un papel mañana y noche.

6830. P. ANTICARCINOMATOSO (*Fr. Cosme*).

℣ Sulfuro rojo de mercurio.	5ij (8 gr.).
Oxido blanco de arsénico.	5ij (24 dec.).
Sangre de drago. . .	ℊxiij (65 cent.).
Ceniza de suelas viejas.	ℊviij (40 cent.).

Se hace un polvo muy fino.

D. Se empapa c. s. de este polvo con un poco de agua, se le extiende con un pincel sobre la úlcera cancerosa, que se cubrirá despues con un lienzo. La escara cae al cabo de tres ó cuatro dias.

6831. P. ANTICATALÉPTICO (*Schroeder*).

℞ Oxido de zinc sublimado. . . . . gr. xv (75 cent.).
Castóreo. . . . . gr. xxx (15 dec.).
Valeriana en polvo. 3j (4 gr.).
Aceite animal de Dippel. . 10 gotas.

M. I. Catalepsia histérica, auxiliando su uso con la pocion anticataléptica. *D.* Un papel al dia.

6832. P. ANTICATARRAL (*Burchard*).

℞ Nitro. . . . . 3ß (15 gr.).
Azufre dorado de antimonio. . . . . gr. xjv (7 dec.).

Divídase en doce papeles.

I. Ronquera crónica. *D.* Uno ó dos papeles al dia.

6833. *Otro* (F. A.).

℞ Azúcar. . . . . 3iij (90 gr.).
Lirio de Florencia. . . 3iij (12 gr.).
Flores de azufre. . . . 3j (4 gr.).
Azafran. . . . . 3j (4 gr.).
Goma arábiga,
Almidon,
Regaliz, ãã. . . . . 3j (12 dec.).

M. S. A. *I.* Catarros pulmonares con expectoracion difícil. *D.* De 3j á 3ij (4 á 8 gr.) al dia.

6834. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Flores de azufre. . . 3ij (8 gr.).
Crémor de tártaro. . 3vj (24 gr.).
Azufre dorado de antimonio. . . . . gr. xv (75 cent.).

Mézclese y divídase en diez y seis papeles.

I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* Un papel cada cuatro horas.

6835. *Otro* (JAHN).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . gr. vj (30 cent.
Acido benzóico sublimado,
Opio, ãã. . . . . gr. x (45 cent
Oleosácaro de anís. . 3ij (24 dec.).

Divídase en seis partes iguales.

I. Catarro pulmonar crónico con tos intensa. *D.* Una dosis cada tres horas.

6836. *Otro* (P. FRANK).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . gr. viij (4 dec.).
Almizcle. . . . . gr. v (2 dec.).
Opio. . . . . gr. ij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en diez y seis partes iguales.

I. Catarro pulmonar crónico con tos intensa. *D.* Un papel cada tres horas.

6837. P. ANTICEFÁLICO (*Hufeland*).

℞ Resina de guayaco. gr. xxx (15 dec.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos,
Extr. de acónito, ãã. gr. ij (1 dec.).
Esencia de valerian. 2 gotas.
Azúcar blanca. . . . gr. x (1 gr.).

Mézclese y divídase en dos dosis.

I. Cefalalgias reumáticas rebeldes. *D.* Una toma mañana y noche.

6838. P. ANTICLORÓTICO (*Dubois*) (H. DE M.).

℞ Polvos de quina Loja. . 3j (4 gr.).
Polvos de canela. . . . 3ß (2 gr.).
Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . 3j (12 dec.)

Mézclese S. A. y divídase en doce papeles.

I. Clorosis. Se recomiendan para restablecer las reglas. *D.* Uno cada dos ó cuatro horas.

6839. P. ANTICLORÓTICO (*Richter*).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas. . . . . 5ij (8 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒß (15 gr.).
Cascarilla en polvo,
Canela en polvo, ää. . 5j (4 gr.).
M. S. A. *D.* Una cucharada de café, cuatro veces al dia.

6840. *Otro* (STA. MARIA).

℞ Hierro porfirizado,
Castoreo,
Anis, ää. . . . . 5ij (8 gr.).
Canela. . . . . 5j (4 gr.).
Nuez moscada. . . . . gjx (50 cent.).
Se mezclan y dividen en veinticuatro papeles. Cada uno contiene gvj (3 dec.) de hierro y gvj (3 dec.) de castóreo.

6841. P. ANTICOLÉRICO.

℞ Carbonato de amon. ḡxxx (15 dec.).
Quinina pura. . . . . gjv (20 cent.).
Opio. . . . . gj (5 cent.).
Azúcar. . . . . ʒß (2 gr.).
Divídase en treinta papeles.
I. Cólera. *D.* Un papel cada hora.

6842. P. ANTIGRUPAL (*Kopp*).

℞ Sulfato de cobre. . . . . ḡij (4 dec.).
Azúcar de leche. . . . . ʒß (2 gr.).
M. S. A. ocho papeles.
I. Crup. *D.* Un papel cada cuarto de hora hasta producir el vómito á los niños de uno á siete años. Si al dia siguiente está aun ronca la voz, se les da la misma dosis con hora y media de intervalo.

6843. P. ANTIDIARRÉICO.

℞ Ipecacuana en polvo,
Opio en polvo,
Alcanfor en polvo, ää. gj (5 cent.).
M. D. Cinco ó seis dosis al dia en un vehículo apropiado.

6844. *Otro* (BRERA).

℞ Cascarilla en polvo. ḡxxx (15 dec.).
Ipecacuana en polvo. ḡiij (15 cent.).
Opio puro. . . . . ḡiij (15 cent.).
Divídase en tres dosis iguales.
I. Diarrea crónica. *D.* Una dosis por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

6845. *Otro* (TROUSSEAU).

℞ Subnitrato de bismuto. ʒj (32 gr.).
Ojos de cangrejos en p. 5ij (8 gr.).
Mézclese y divídase en treinta y dos papeles.
I. Diarrea crónica. *D.* Tres papeles al dia al tiempo de comer.

6846. P. ANTIDOTARIO (*Taddei*).

℞ Gluten fresco. . . . ʒx (300 gr.).
Jabon medicinal. . ? . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . ʒxx (600 gr.).
Se disuelve, se deseca y pulveriza.
I. Envenenamiento. *D.* ʒvj (25 gr.) para descomponer ḡxviij (1 gr.) de sublimado. Se da este polvo en un vehículo apropiado.

6847. P. ANTIEMÉTICO PARA LOS NIÑOS (*Rosen*).

℞ Magnesia blanca. . ʒß (15 gr.).
Comino. . . . . 5iij (12 gr.).
Raiz de lirio. . . . . 5ij (8 gr.).
Azafran. . . . . ḡxxx (15 dec.).
*M. I.*ª Vómitos y flemas. *D.* Un puñadito en agua de hinojo.

6848. P. ANTIEPILÉPTICO (*Behrends*).

℞ Hidroclorato de amoniaco,
Carbon. de magnes., ää. ʒß (2 gr.).
Raiz de valeriana. . . . ʒv (20 gr.).
Aceite de cajeput. . . . ʒß (2 gr.).
M. S. A. un polvo fino.
I. Epilepsia, corea, cólera. *D.* Una cucharada de café, tres veces al dia.

6849. *Otro* (BRESLER).

℞ Raiz de artemisa en polvo. . . . . ʒiij (100 gr.).

Azúcar. . . . . ʒvj (200 gr.).
M. D. Una cucharada de café al dia.

6850. P. ANTIEPILÉPTICO (*Hildenbrant*).

℞ Sulfato de cobre y amoniaco. gij á gij (10 á 15 cent.).
Raiz de belladona. gj á gv (5 á 25 cent.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
D. Uno cada dos horas.

6851. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Oxido de zinc. . . gxvj (8 dec.).
Carbon. de magn. ʒij (24 dec.).
Oleosácaro de cajeput. . . . . ʒüj (12 gr.).
Mézclese exactamente y divídase en ocho papeles.
D. Uno cada tres horas.

6852. *Otro* (HUFELAND).

℞ Oxido de zinc. gj á gvj (5 á 30 cent.).
Extracto de beleño. . gj (5 cent.).
Aceite etéreo de valer. 1 gota.
Raiz de valeriana en p. ʒß (2 gr.).
H. S. A. *D.* Se toma en dos veces al dia. En los casos rebeldes se añadirá gß (25 mil.) de cobre amoniacal.

6853. *Otro* (REGOLO).

℞ Valeriana. . . . . ʒj (30 gr.).
Hojas de naranjo. . . . ʒß (15 gr.).
Hidroclorato de amoniaco,
Magnesia,
Aceite de cajeput, ää. ʒj (4 gr.).
I. Epilepsia, histérico, corea, calenturas ataxico-adinámicas, tifo. *D.* ʒijß (10 gr.) cuatro veces al dia en media taza de té caliente.

6854. *Otro* (KAHLEISS).

℞ Raiz de artemisa. . . ʒij (60 gr.).
Agua comun. . . . . ℔ß (250 gr.).
Se hierve hasta que se reduzca una cuarta parte, se cuela y se añade:
Nitrato de plata fundido en polvo. . . gx (5 dec.).
Se separa por el filtro el precipitado que se forma, se hace secar y se mezcla S. A. con
Azúcar blanca. . . . . ʒj (30 gr.).
Hágase polvo y divídase en sesenta dosis.
D. Una, mañana y noche.

6855. *Otro* (KIRCHKOFF).

℞ Cianuro de hierro. . . . ʒij (8 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒj (32 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis dosis iguales.
I. Epilepsia no sostenida por lesion orgánica. Si el enfermo tiene constitucion sanguínea, debe preceder á su administracion una larga sangría y algunas sanguijuelas en las sienes. *D.* Se da una dosis al dia, dividida en cuatro partes y con tres ó cuatro horas de intervalo.

6856. P. ANTIEPILÉPTICO *ó Tomas antiepilépticas* (*Losen*).

℞ Sulfato de cobre amoniacal. . . . . gj (5 cent.).
Azucar blanca en polv. gc (5 gr.).
Divídase en seis tomas.
D. Una tres veces al dia, y se bebe un vasito de vino de Málaga despues de cada toma. Se continúa este tratamiento durante algunos dias, y se aumentará la dosis de la sal de cobre, dividiendo la cantidad en cuatro ó cinco papeles.

6857. P. ANTIEPILÉPTICO (*Quincy*).

℞ Raiz de valeriana silvestre,
Raiz de peonia machacada, ää. . . . . ʒß (16 gr.).
Semillas de ruda,
Mirra,
Castóreo,
Succino blanco, ää. . . . ʒij (8 gr.).
Cinabrio natural. . . . . ʒj (32 gr.).

Se reducen á polvo y se los mezcla exactamente.

I. Afecciones nerviosas y convulsivas. *D.* De gx á gxx (5 á 10 gr.) á los niños, y de gxx á 5j (3 á 4 gr.) á los adultos.

6858. P. ANTIEPILÉPTICO (*Rosenthal*).

℞ Haba de S. Ignacio en polvo.	gx (50 cent.).
Ipecacuana en polvo.	gv (25 cent.).
Cáscara de naranja. .	5j (4 gr.).
Carbonato de magnes.	5j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . .	℥j (30 gr.).
Esencia de menta pip.	4 gotas.

H. S. A. *I.* Epilepsias que afectan una marcha casi periódica. *D.* Cuatro cucharadas de café al día, cuando se aproxima el acceso.

6859. *Otro* (TOTT).

℞ Sulfato de cobre. . . .	gv (25 cent.).
Castóreo.	5ß (2 gr.).
Azúcar.	5iij (12 gr.).

H. S. A. polvo y divídase en veinte dosis.

D. Una, mañana y noche.

6860. P. ANTIEPSÓRICO.

℞ Flores de azufre, Acetato de potasa, ää. .	5j (4 gr.).
Sulfato de zinc.	5ß (2 gr.).

M. Se dan fricciones mañana y noche con una pulgarada de este polvo dilnido en algunas gotas de aceite. Es muy cómodo para tratar la sarna, y de este modo se evita el mal olor y la suciedad consiguiente al uso de las pomadas.

6861. *Otro*, n. 2.

℞ Azufre sublim. y lav.	5xij (48 gr.).
Barúana en polvo. . . .	5vj (24 gr.).
Regaliz en polvo. . . .	5vj (24 gr.).
Alcanfor.	5j (4 gr.).

M. D. ℥ij (8 gr.) al dia en dos tomas.

6862. *Otro* (BALLY).

℞ Azufre sublimado.	1
Polvo fino de carbon de leña. . . .	1
Ladrillo machacado.	1

H. S. A. *D.* Un puñado grande, que se humedece con un poco de aceite y con el que se frota el hueco de la mano durante un cuarto de hora, mañana y noche.

Nota. Este remedio cura muy bien la sarna aun cuando sea inveterada.

6863. *Otro* (CHAUSSIER).

℞ Flores de azufre.	2
Acetato de plomo.	2
Sulfato de zinc.	1

I. Tiña, sarna, soriasis. *D.* Se usa en fricciones en las palmas de las manos, á la dosis de una pulgarada diluida en algunas gotas de aceite.

6864. *Otro* (RICHTER).

℞ Azufre.	5j (4 gr.).
Regaliz.	5iv (16 gr.).
Alcanfor.	5ij (8 gr.).

M. I. Sarna, soriasis, prurigo. *D.* Una cucharada de café dos veces al dia.

6865. P. ANTIESCROFULOSO (*Ammon*).

℞ Sulfato de quinina.	gj á gij (5 á 10 cent.).
Carbonato de sosa.	gv á gvj (25 á 30 cent.).
Azúcar.	℥j (12 dec.).

H. S. A. seis papeles.

I. Oftalmia escrofulosa. *D.* Un papel mañana y noche.

6866. *Otro* (RUST).

℞ Esponja calcinada. . . .	℥ß (15 gr.).
Digital en polvo. . . .	gvj (3 dec.).
Oleosácaro de hinojo. .	5ij (8 gr.).

Divídase en doce tomas.

I. Afecciones escrofulosas, bo-

cio, tumores blancos, etc. *D.* Dos ó tres tomas al dia.

6867. P. ANTIESCROFULOSO (*Sichel*).

℞ Etiope antimonial,
Ruibarbo, ãã. . . . . 5ij (8 gr.).
Magnesia. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.
D. Tres ó cuatro papeles al dia.
Para los niños se prescribe:
Etiope antimonial, ✱
Ruibarbo, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Magnesia. . . . . 3ß (2 gr.).
Para veinticuatro papeles.

6868. P. ANTIESPASMÓDICO.

℞ Flores de zinc. . . . ℊviij (4 dec.).
Almizcle. . . . . ℊjv (2 dec.).
Láudano de Sydenham. 60 gotas.
Azúcar. . . . . 5ij (8 gr.).
Divídase en ocho papeles.
I. Trismo, tétanos, convulsiones de los niños. *D.* Un papel cada dos horas en una cucharada de agua, de jarabe ó de tisana.

6869. *Otro*, n. 2.

℞ Castórco,
Valeriana,
Azúcar, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
D. Para tres dosis.

6870. *Otro*, n. 3.

℞ Valeriana. . . . . 5j (4 gr.).
Canela. . . . . ℊxij (6 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. En las veinticuatro horas.

6871. *Otro*, n. 4.

℞ Quina. . . . . 5ij (8 gr.).
Valeriana. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. En las veinticuatro horas.

6872. *Otro*, n. 5.

℞ Raiz de valeriana silvestre pulverizada. 5ij (4 gr.).
Almizcle,
ó Ambar gris. . . . . 9j (12 dec.).
Asa fétida. . . . . ℊvj (3 dec.).
Alcanfor. . . . . ℊxij (6 dec.).
M. S. A. y háganse polvos.
I. Enfermedades convulsivas, histéricas, epilépticas ó espasmódicas, manía, hidrofobia. *D.* ℊxij hasta ℊxx (6 á 10 dec.).

6873. *Otro*, n. 6.

℞ Castórco. . . . . 5j (4 gr.).
Canela. . . . . ℊxviij (4 gr.).
Azúcar. . . . . 5ij (8 gr.).
Mézclese y divídase en veinte papeles.
D. Se toma uno de hora en hora.

6874. *Otro* (BRACHET).

℞ Oxido de zinc. ℊvj á ℊsij (3 á 6 dec.).
Azúcar. ℊxx á ℊxxx (10 á 25 dec.).
Mézclese y divídase en seis tomas.
I. Convulsiones de los niños. *D.* Uno cada dos horas en un poco de agua azucarada. Se puede añadir de ℊvj á ℊx (3 á 5 dec.) de extracto de beleño.

6875. P. ANTIESPASMÓDICO ó *Polvo de valerianato de zinc* (*Devay*).

℞ Valerianato de zinc. ℊxij (6 dec.).
Azúcar. . . . . ℊlx (3 gr.).
Divídase en veinticuatro papeles.
D. Uno á cuatro al dia.

6876. *Otro* (DUBLE).

℞ Hoj. de naranjo en p. ℊjv (20 cent.).
Nitro. . . . . ℊiij (15 cent.).
Digital en polvo. . . ℊß (25 mil.)
M. I. Palpitaciones nerviosas idiopáticas. *D.* En una dosis al dia.

6877. *Otro* (H. DE ITAL.).

℞ Castórco. . . . . ℊij (1 dec.).

Magnesia calcinada. . 5j (4 gr.).
Goma arábiga. . . . . ℊxij (6 dec.).
M. D. En una dosis.

6878. P. ANTIESPASMÓDICO (H. DE ALEM.).

℞ Almizcle. . . . . ℊxxxij (16 dec.).
Opio. . . . . ℊjv (2 dec.).
Azúcar. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Uno de hora en hora.

6879. *Otro* (MAGENDIE).

℞ Cianuro de zinc. . . ℊß 25 mil.).
Magnesia calcinada. ℊjv (2 dec.).
Canela. . . . . ℊij (15 cent.).
M. I. Calambres del estómago y enfermedades verminosas de los niños. *D.* Se toma toda la dosis cada cuatro horas.

6880. *Otro* (RECAMIER).

℞ Subnitrato de bismuto. ℊjv (2 dec.).
Magnesia,
Azúcar, ãã. . . . . Dij (24 dec.).
Se dividen en cuatro papeles iguales y se toma uno á la vez.
I. Gastrodinia rebelde y no inflamatoria.

6881. *Otro* (TSELEPPE).

℞ Azuf. dorado de antim. ℊxviij (1 gr.).
Oxido de zinc sublim. 5ß (2 gr.).
Nitro. . . . . ℊvjv (3 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 5ij (60 gr.).
Divídase en diez y ocho papeles.
I. Hipo. *D.* Un papel cada dos ó tres horas.

6882. *Otro* (WEPFER).

℞ Raiz de valeriana. . . 3ß (16 gr.).
Raiz de peonía. . . . 3ß (2 gr.).
Rasuras de cuerno de ciervo. . . . . 5iij (12 gr.).
Aceite de nuez mosc. ℊiij (15 cent.).
Azúcar. . . . . 5iij (96 gr.).
Mézclese y divídase en papeles de 5j (4 gr.).

I. Enfermedades espasmódicas, en las que produce buenos efectos continuando mucho tiempo su uso. *D.* Una dosis por la mañana en ayunas, y otra por la tarde, bebiendo despues un vaso de infusion de flores de tilo.

6883. POLVO ANTIESPASMÓDICO AMONIACAL.

℞ Carbon. de amoniaco. ℊjv (2 dec.).
Extracto de beleño,
Almizcle, ãã. . . . . ℊj (5 cent.).
Oleosác. de valeriana. ℊxviij (1 gr.).
M. I. Epilepsia, histérico. *D.* En dos dosis en medio vaso de infusion de flores de naranjo.

6884. POLVO ANTIESPASMÓDICO MOSCADO CINABARINO.

℞ Almizcle. 1
Cinabrio. 7
Segun Jourdan este es el verdadero polvo de Tonquin, calcado por el que usan los chinos.
I. Histérico, convulsiones, epilepsia. *D.* ℊxij (6 dec.) dos ó tres veces al dia.

6885. P. ANTIESPASMÓDICOS PARA LOS NIÑOS (*Hufeland*).

℞ Ojos de cangrejos. 1
Raeduras de asta de ciervo. . . . 1
Visco ó muérdago. 1
Raiz de valeriana. 1
Mézclese y hágase polvo.
I. Diarrea, vómito, denticion difícil. *D.* 9ß (6 dec.) cada dos ó tres horas á los niños.

6886. P. ANTIESPASMÓDICO PURGANTE (*Hems*).

℞ Calomelanos al vapor. ℊxij (6 dec.).
Opio purificado. . . . ℊij (1 dec.).
Ipecacuana en polvo. . ℊjß (75 mil.).
Oleosácaro de menta. 5j (4 gr.).
Divídase en seis dosis.
I. Ileo nervioso. *D.* Una dosis cada dos ó tres horas.

6887. P. ANTIFEBRIL COMPUESTO (*Brera*).

℞ Corteza del Perú. . . . ℥j (30 gr.).
Valeriana en polvo. . . ℥ß (15 gr.).
Hágase polvo y divídase en ocho partes iguales.

6888. P. ANTIFLOGÍSTICO (*Rust*).

℞ Nitro,
Bitartrato de potasa,
Azúcar, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Divídase en doce papeles.
D. Un papel de hora en hora ó cada dos horas con cocimiento de harina de avena.

6889. P. ANTIGASTRÁLGICO.

℞ Oxido de hierro. . . . . ʒj (4 gr.).
Subnitrato de bismuto. . ℥j (30 gr.).
Raiz de valer. en polvo. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en treinta y dos papeles.
D. Un papel mañana y noche al tiempo de comer.

6890. *Otro*, n. 2.

℞ Magnesia. . . . . ʒj (4 gr.).
Canela. . . . . ʒß (2 gr.).
Opio en bruto. . . . . ℊj (5 cent.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Se toma uno ó dos al dia antes de comer.

6891. *Otro* (SCHROEDER).

℞ Oxido de bismuto. . ʒß (6 dec.).
Carbon. de amoniaco. ℊvj (3 dec.).
Opio purificado. . . . ℊiij (15 cent.).
Oleosácaro de valer. ʒj (4 gr.).
Divídase en seis dosis.
D. Tres ó cuatro al dia.

6892. P. ANTIHÉCTICO (*Goelis*).

℞ Cuerno de ciervo quemado. . . . 4
Nuez moscada. 4
Bayas de laurel tostadas. 4
Regaliz. 3
Hágase polvo.
D. Media cucharada de café dos veces al dia á los niños de un año, y una cucharada entera á los de dos ó cuatro.

6893. P. ANTIHELMINTICO.

℞ Coralina de Córcega,
Santónico, ãã. . . . . ʒiij (90 gr.).
Calomelanos. . . . . ʒj (12 dec.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.
I. Helmintiasis, ascárides lumbricoides. *D.* Se toma en el dia.

6894. *Otro*, n. 2.

℞ Estaño en polvo fino. . . ʒj (32 gr.).
Sulfuro negro de mercur. ʒij (8 gr.).
Divídase en seis tomas.
D. Una toma mañana y noche en un poco de triaca ó un extracto cualquiera.

6895. *Otro*, n. 3.

℞ Helecho macho. . . . . ʒj (12 dec.).
Gutagamba. . . . . ℊij (4 dec.).
M. D. De una vez.

6896. *Otro*, n. 4.

℞ Santónico. . . . . ʒß (2 gr.).
Tartrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
D. Uno cada dos ó tres horas.

6897. P. ANTIHELMINTICO *ó Polvo vermífugo* (H. M. F.).

℞ Polvo de musgo de Córcega,
Polvo de santónico, ãã. ʒj (32 gr.).
Polvo de ruibarbo. . . . ʒß (16 gr.).
Mézclese y consérvese en un frasco bien tapado.
D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).

6898. P. ANTIHELMINTICO *ó Polvo amargo ferruginoso.*

℞ Sulfato de hierro crist. ʒj (4 gr.).
Santónico. . . . . ʒiij (12 gr.).
Flores de tanaceto. . . ℈j (12 dec.).
Se mezcla y divide en papeles

de ℊxij (6 dec.), que cada uno contiene ℊij (1 dec.) de sulfato de hierro.

6899. P. ANTIHELMÍNTICO (*Dupuytren*).

℞ Calomelanos.. . . . ℊij (4 dec.).
Ruibarbo. . . . . ℊvj (3 dec.).
Jalapa. . . . . ℊxxx (15 dec.).

M. I. Es antihelmíntico, y se usa tambien como purgante suave. *D.* De una vez.

6900. P. ANTIHELMÍNTICO (H. DE M.).

℞ Coralina en polvo. 1
Helecho macho. 1

M. I. Lombrices intestinales. *D.* ʒß (2 gr.).

6901. P. ANTIHELMÍNTICOS DE PALACIOS (F. N. P.).

℞ Santónico. . . . . ʒij (8 gr.).
Mechoacan. . . . . ʒß (2 gr.).
Mercurio dulce. . . . ℊxl (2,2 gr.).
Coralina de Córcega. . ʒj (4 gr.).
Macis. . . . . ℊjx (45 cent.).

Se hace polvo S. A.

I. Lombrices, tenia. *D.* ʒß (6 dec.) dos veces al dia, suspendidos en c. s. de agua azucarada.

6902. P. ANTIHELMÍNTICOS (F. N. P.).

℞ Coralina,
Santónico,
Helecho macho, ãã. . . . ʒj (4 gr.).

Redúzcase á polvo muy fino.

I. Lombrices, tenia. *D.* ʒß (2 gr.) suspendidos en agua azucarada, dos veces al dia.

6903. P. ANTIHEMATEMÉSICO (*Denton*).

℞ Acetato de plomo. . . ʒß (18 dec.).
Extracto de cicuta. . ℊlx (30 dec.).

Mézclese y redúzcase á polvo que se divide en doce dosis.

D. Un papel cada dos horas.

6904. P. ANTIHEMORRÁGICO (*Hecker*).

℞ Opio. . . . . ℊiij (15 cent.).
Canela en polvo. . . ʒj (4 gr.).
Sulfato de hierro. . . ʒß (6 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).

Divídase en doce dosis.

I. Hemorragias pasivas. *D.* Una dosis cada 25 ó 30 minutos.

6905. *Otro* (KRIMER).

℞ Acetato de plomo. ℊxvj (8 dec.).
Opio puro. . . . . ℊij (1 dec.).
Azúcar de leche. . ℊxxxij (16 dec.).

Hágase polvo y divídase en ocho dosis.

I. Hemorragias pasivas, especialmente la hemotisis y epistaxis. *D.* Una dosis cada dos horas.

6906. P. ANTIHEMORROIDAL (H. DE AL.).

℞ Flores de azufre. . . . ʒß (16 gr.).
Tartrato de potasa. . . ʒj (32 gr.).
Oleosácaro de limon. . ʒvj (24 gr.).

M. D. Una cucharadita, dos ó tres veces al dia.

6907. P. ANTIHERPÉTICO (*Biett*).

℞ Azufre sublimado. . . . ʒj (30 gr.).
Cremor de tártaro. . . . ʒß (15 gr.).

Mézclese y divídase en diez y seis papeles.

D. Uno todas las mañanas.

6908. P. ANTICTÉRICO *ó Polvo de sen y guayaco* (*Schneider*).

℞ Hojas de sen. 1
Resina de guayaco. 1

D. Dos cucharadas de café dos ó tres veces al dia á los adultos, y ʒß (2 gr.) en ʒj (30 gr.) de jarabe de malvabisco á los niños, á cucharaditas.

6909. P. ANTIHISTÉRICO *ó Polvo de asa fétida y gálbano compuesto.*

℞ Asa fétida. 5

Gálbano.	5
Mirra.	4
Castóreo.	4
Raiz de ásaro.	2
Raiz de aristoloquia redonda. . . .	2
Hojas de sabina.	2
Hojas de yerba gatera.	2
Hojas de matricaria.	2
Hojas de dictamo de Creta.	2

Se eligen las gomoresinas en lágrimas, y lo mas secas que sea posible; se mezclan en un mortero por medio de la contusion con el castóreo, las raices y las hojas bien mondadas de tallos, y despues de algunos dias de exposicion en la estufa se concluye la pulverizacion y se pasa todo por un tamiz de seda.

D. De ɡviij á ɡxxx (¼ á 15 dec.).

6910. P. ANTILEUCORRÉICO (*Rust*).

℞ Bolo de Armenia,
Cloruro de magnesio,
Oleosác. de macis, ãã. ɜvj (24 gr.).
Ruibarbo en polvo. . . ɜj (12 dec.).
H. S. A. *D.* Una cucharada de café cinco veces al dia.

6911. P. ANTIMETRORRÁGICO (*Brera*).

℞ Digital en polvo. . . . ɜß (6 dec.).
Goma quino. . . . . ɜj (4 gr.).
Hágase polvo y dividase en seis dosis.

I. Metrorragia activa. *D.* Un papel cada hora.

6912. *Otro* (TROUSSEAU).

℞ Cornezuelo de centeno
en polvo. . . . . ɜj (4 gr.).
Tanino. . . . . ɜj (12 dec.).
H. S. A. seis papeles.

I. Metrorragias que siguen ó acompañan al parto natural ó al aborto, en las que se manifiestan en la edad crítica, y en las sintomáticas del cáncer uterino. *D.* Un papel de cuatro en cuatro horas.

6913. P. ANTIMONIAL.

℞ Calomelanos. . . . . ɡvj (3 dec.).
Azufre dorado de antim. ɡij (1 dec.).
Carbonato de magnesia. ɜß (2 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Un papel mañana y noche.

6914. P. ANTIMONIAL *ó Polvo de James* (F. F.).

℞ Sulfuro de antimonio en polvo. . 1
Cuerno de ciervo rasurado. 1
Se mezclan estas dos sustancias y se tuestan en una cazuela de barro, meneándolas sin cesar hasta que se hayan reducido á un polvo de color agrisado; se pulveriza perfectamente este polvo, y se expone á un calor rojo por dos horas en un crisol.

I. Se puede usar como excitante y diaforético en la neuralgia facial y en las escrófulas. *D* ɡiij á ɡviij (15 á 40 cent.) en polvo ó en píldoras, tres ó cuatro veces en el transcurso del dia.

6915. P. DE ANTIMONIO MARCIAL DIAFORÉTICO (*Keup*).

℞ Limaduras de hierro,
Sulfuro de antimonio
nativo, ãã. . . . . ℔ß (250 gr.).
Se trituran y se mezclan estas sustancias, se ponen en un crisol enrojecido al fuego y se las menea con una varilla de hierro hasta que parezcan reducidas á escorias; se las saca y cuando la masa está fria, se la tritura de nuevo con tres veces su peso de nitro seco; despues se echa el polvo á cucharadas en un crisol hecho ascua; cuando han terminado la deflagracion y la calcinacion, se echa la materia en cantidad suficiente de agua para disolver la potasa que contiene. Se precipitará el antimoniato de potasa y hierro bajo la forma de un polvo amarillo; se

procederá á la levigacion y se secará muy bien el polvo que ha quedado sobre el filtro.

I. Caquexia, ictericia y debilidad de los intestinos. *D.* ǧv á ǧvj (25 á 30 cent.) al dia.

6916. P. DE ANTIMONIO MERCURIAL (*Smith*).

℞ Sulfuro negro de mercurio. . . . . ǧxxx (15 dec.).
Polvo antimonial. . ǧij (4 dec.).

M. I. Afecciones escrofulosas. *D.* En dos tomas.

6917. P. ANTIMONIAL (*Sichel*).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Ruibarbo,
Carbonato de magn., ãã. 3j (4 gr.).

M. S. A. veinte papeles para los niños y diez para los adultos.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Uno mañana y noche con un poco de agua azucarada.

6918. *Otro* (SICHEL).

℞ Etiope antimonial. . . 5ij (8 gr.).
Magnesia pura. . . . . ǧxij (6 dec.).
Goma arábiga en polvo,
Resina de guayaco, ãã. 5j (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Una á ocho tomas al dia.

6919. P. ANTINEURÁLGICO (*J. P. FRANK*).

℞ Almizcle. . . . . ǧxx (1 gr.).
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . ǧx (5 dec.).

Mézclese y divídase en veinte tomas.

I. Neuralgias, principalmente la de la cara. *D.* Un papel mañana y noche.

6920. *Otro* (MOLINARI).

℞ Carbonato de hierro. . 5j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 5iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en nueve papeles.

D. Uno cada dos ó tres horas.

6921. P. ANTIOFTÁLMICO OPIADO (*Sichel*).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . ǧvj (3 dec.).
Opio en bruto. . . . . ǧij (1 dec.).
Magnesia pura. . . . . ǧxij (6 dec.).
Goma arábiga en polv. 5j (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro tomas.

I. Oftalmias reumáticas y artríticas. *D.* Una á doce tomas al dia.

6922. P. ANTIOFTÁLMICO RESOLUTIVO (*Graeffe*).

℞ Bióxido de mercurio,
Agárico blanco, ãã. . . . 3ß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 3j (30 gr.).

M. I. Engrosamiento de la córnea. *D.* Se insufla todos los dias un poco de este polvo.

6923. P. ANTIOTORRÉICO (*Dr. Bonnafort*).

℞ Nitrato de plata fundido,
Talco de Venecia,
Licopodio, ãã. . . . ǧxv (75 cent.).

Se reduce á polvo fino y se guarda en un frasco con tapon esmerilado, cubierto de papel negro para que no le dé la luz.

Se limpia el oido con inyecciones ó con una esponjita, y se insufla en el oido el polvo, por medio de un soplete, de modo que se aplique á la úlcera que sostiene la otorrea crónica.

Se renovará estas insuflaciones todos los dias ó de mas tarde en tarde, segun la naturaleza del mal. Si existe perforacion de la caja del tambor, convienen las inyecciones por la trompa.

6924. P. ANTIPERIÓDICO ANTIMONIAL (*Sichel*).

℞ Sulfato de quinina,
Etiope antimonial, ãã. . 3ij (8 gr.).

Mézclese y hágase polvo que se dividirá en veinticuatro papeles.

D. Dos á ocho papeles al dia.

6925. P. ANTIREUMÁTICOS *ó Polvos de Olivencia* (F. DE PLENK).

℞ Hojas de sen,
Zarzaparrilla, ãã. . . . ʒjß (45 gr.).

Se reducen á polvo separadamente, se pasan por un tamiz para que quede un polvo fino y se añade:

Azúcar blanca. . . . . ʒj (30 gr.).

Se mezclan y se reparte en catorce papeles. Se tomarán dos cada dia del modo siguiente: se dará por la noche un papel de polvos en medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; por la mañana se toma en ayunas otro papel con otro medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; despues de dos horas, el enfermo tomará chocolate, al medio dia comerá su puchero compuesto de carnero, ternera, gallina ó perdiz, segun sus fuerzas alcancen, pero siempre debe ser carnero ó vaca y garbanzos, con muy poco jamon ó tocino añejo; no debe comer postre alguno, ni pescado, ni vinagre, ni frutas; por la tarde tomará otro papel despues de haber pasado cinco ó seis horas de la comida, teniéndole ya prevenido en infusion desde por la mañana; pasadas dos horas podrá cenar ó bien sea una sopa con caldo de puchero ó un par de huevos pasados por agua ó una jícara de chocolate. El agua que ha de beber debe ser cocida con la zarzaparrilla y se prepara del modo siguiente: se toman

Zarzaparrilla. . . . . ʒjv (125 gr.)

Se parte en pedacitos y se pone á cocer en

Agua. . . . . lbx (5000 gr.)

hasta que se reduzca á la mitad. Este primer cocimiento es el que sirve para tomar los polvos; se vuelve á cocer la misma zarzaparrilla en otra tanta agua hasta quedar en la mitad y esta es la que sirve para beber á pasto; en tiempo de invierno es menester beberla algo tibia. Si pasados los siete dias no se hubiesen extinguido ó desvanecido los dolores, hinchazones, etc., se tomarán otros siete dias con el mismo método y forma, concluida la curacion tomará por quince ó veinte dias la leche de burras ó de cabras. Si el sugeto que usa estos polvos no llega á diez y seis ó diez y ocho años de edad, tomará la mitad de los polvos de cada papel.

Si se quiere que sean mas purgantes, se les puede añadir ʒjß (6 gr.) de polvos de jalapa ó ʒß (2 gr.) de pulpa de coloquintida.

I. Dolores reumáticos, hinchazones edematosas, etc.

6926. P. ANTIREUMÁTICO (*Vogler*).

℞ Azúcar de leche. . . . . ʒj (32 gr.).
Azufre porfirizado. . . . ʒjß (6 gr.).
Magnesia pura,
Extr. de acónito, ãã. . . ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Artritis reumática, reumatismo muscular y fibroso.

D. Una cucharada de café, tres veces al dia.

6927. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Azufre dorado de antimonio. . . . . ℈j (5 cent.).
Regaliz en polvo. . . . ℈x (50 cent.).

M. D. Para una dosis.

6928. *Otro* (F. DE PLENK).

℞ Zarzaparrilla. . . . . ʒij (60 gr.).
Hojas de sen. . . . . ʒj (30 gr.).
Polipodio,
Hermodáctiles, ãã. . . ʒß (15 gr.).
Azufre. . . . . ʒß (15 gr.).

Se muelen separadamente, se pasan por un tamiz, se mezclan y se reparten en siete partes iguales.

I. Enfermedades venéreas ó reu-

máticas. *D.* Todas las mañanas se toma una parte mezclada con ℥jv (125 gr.) de tisana de zarzaparrilla, que esté algo caliente, permaneciendo el enfermo en cama bien arropado; pasada media hora, beberá un vaso de la tisana tambien tibia y guardará el sudor en el caso en que sobrevenga; despues de haber sudado, podrá levantarse resguardándose del viento y del frio. Tomará los polvos siete dias seguidos, á menos que se sienta débil, y en este caso podrá dejar de tomarlos uno ó dos dias; pero siempre deberá beber á pasto la tisana, que usará tibia en tiempo de invierno.

6929. P. ANTISÉPTICO (H. DE AL.).

℞ Quina en polvo. . . . . ℥j (32 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥j (4 gr.).

M. I. Ulceras atacadas de gangrena de hospital, afecciones gangrenosas.

El POLVO ANTISÉPTICO DE HARTMANN contiene ℈jv (2 dec.) menos de quina por draema.

6930. *Otro* (RUST).

℞ Alcanfor,
Mirra, ää. . . . . ℥ij (8 gr.).
Quina,
Manzanilla, ää. . . . . ℥ß (15 gr.).
Carbon preparado. . . ℥j (30 gr.).

Divídase en ochenta papeles iguales.

I. Gangrena húmeda, cólera, tisis, angina gangrenosa, tifo, calentura tifoidea. *D.* Uno á cuatro papeles mezclados con igual cantidad de azúcar en polvo, ó se espolvorea con él las superficies ulceradas.

6931. P. ANTISÉPTICOS DE SWEDIAUR (H. DE M.).

℞ Raiz de arnica en polvo. 1
Quina Loja en polvo. 1
Alcanfor en polvo. 1

H. S. A. *I.* Ulceras rebeldes ó que están afectadas de gangrena. *D.* C. s. para espolvorear los puntos enfermos.

6932. P. ANTISIFILÍTICO (*Berg*).

℞ Oxido rojo de merc. ℈ij℔ (12 cent.).
Antimonio crudo. . ℥ij℔ (10 gr.).
Azúcar. . . . . ℈ij (2,6 gr.).

H. S. A. diez y seis papeles.

I. Se le aconseja en el tratamiento de las enfermedades venéreas. *D.* Uno á dos papeles en dos veces, mañana y noche, suspendidos en agua.

6933. P. ANTITÍSICO.

℞ Creosota. . . . . 6 gotas.
Malvavisco. . . . . ℥j (4 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (4 gr.).

Divídase en tres papeles.

I. Hemotisis, tisis. *D.* Se toma en el dia.

6934. P. ANTITÍSICO, *Polvo gomoso amigdalino ó polvo de Haly* (F. M.).

℞ Simiente de adormideras blancas. ℥vj (24 gr.).
Goma arábiga,
Goma tragacanto,
Almidon,
Rasuras de marfil,
Ras. de orozuz, ää. ℥ij (8 gr.).
Simiente de membrillos,
Sim. de berd., ää. ℥ß (16 gr.).
Pipas de melon,
Pipas de calab., ää. ℥j (32 gr.).
Azúcar piedra. . . ℥xxviij (112 gr.).

Hágase polvo S. A.

I. Tos seca, tisis, hemotisis. *D.* ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.).

6935. P. ANTITÍSICO (*Bories, Hufeland*).

℞ Acetato de plomo,
Opio, ää. . . . . ℈vj (3 dec.).
Azúcar. . . . . ℈j (12 dec.).

M. y divídase en doce papeles.

I. Sudores y diarreas colicuativas de los tísicos. *D.* Un papel mañana y noche.

6936. P. DE ANTRACOCALI SIMPLE *ó Polvo antiherpético* (*Polya*).

℞ Antracocali. . . . . ʒij (1 dec.).
Regaliz en polvo. . . . ʒvj (3 dec.).
M. I. Eczema, impétigo, lupus, herpes, escrófulas, reumatismos crónicos. *D.* Para una vez tres ó cuatro veces al dia. Este polvo produce sudores abundantes.

6937. P. DE ANTRACOCALI COMPUESTO.

℞ Antracocali. . . . . ʒij (1 dec.).
Azufre lavado. . . . . ʒvj (3 dec.).
Regaliz en polvo. . . . ʒjv (2 dec.).
Se elogia este polvo en la complicacion epsórica.
℞ Antracocali. . . . . ʒij (1 dec.).
Merc. de Hahnemann. . ʒ½ (1 cent.).
Regaliz en polvo. . . . ʒjv (2 dec.).
I. Cólera, sífilides, tiña, eczema, herpes sifilíticos. *D.* Una dosis cada tres horas.

6938. P. DE ARNICA COMPUESTO (H. DE AL.).

℞ Raiz de arnica,
Raiz de serpentaria de Virginia,
Oleosác. de menta pip., ãã. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis papeles.
I. Diarrea, calenturas graves acompañadas de diarrea. *D.* Un papel cada dos horas.

6939. P. AROMÁTICO.

℞ Canela. . . . . ʒj (30 gr.).
Clavo,
Gengibre,
Nuez moscada, ãã. ʒiij (12 gr.).
Macis. . . . . ʒij (8 gr.).
Sándalo rojo. . . . . ʒß (15 gr.).
Azúcar. . . . . ℔ij (1000 gr.).
Hágase polvo.
I. Ulceras atónicas, manchas escrofulosas de la córnea, vegetaciones, torceduras, contusiones. *D.* ʒijß á ʒv (10 á 20 gr.) para espolvorear las partes enfermas.

6940. *Otro* (DUPUYTREN).

℞ Polvo de tomillo,
Polvo de salvia,
Polvo de romero, ãã. ʒjv (125 gr.).
Hidroclorato de amoniaco,
Alcanfor, ãã. . . . . ʒxx (10 dec.).
M. I. Sirve para curar las heridas complicadas con gangrena de hospital, úlceras gangrenosas, tumores frios, contusiones, torceduras, tifo, caquexia.

6941. *Otro* (F. P.).

℞ Nuez moscada. 2
Cardamomo menor. 2
Canela. 1
Gengibre. 1
M. I. Es excitante, carminativo. *D.* ʒß (2 gr.).

6942. P. AROMÁTICO ESTIMULANTE.

℞ Canela. 5
Gengibre. 1
Clavo. 1
Nuez moscada. 1
Azúcar. 10
M. I. Tifo, raquitis, contusiones, dispepsia, anorexia. *D.* gxviij (1 gr.) dos veces al dia.

6943. P. AROMÁTICOS CON HIERRO (F. P.).

℞ Polvos aromáticos. 2
Hierro preparado. 1
Mézclese exactamente.
I. Tónico del sistema digestivo. *D.* ʒß (2 gr.) ó mas.

6944. P. DE ARROZ (F. F.).

℞ Simiente de arroz. . . . . c. s. q.
Se lava con agua hasta que salga clara, se echa entonces sobre un lienzo y se rocia de cuando en cuando con nueva agua, hasta que los granos se vuelvan enteramente opacos y friables, en cuyo estado se pulverizan sin dejar residuo y se seca el polvo en la estufa.
I. y *D.* V. t. I, pág. 98.

6945. P. ARSENICAL (*Justamond*).

℞ Oxido blanco de arsénico en polvo. . . . 5v (20 gr.).
Antimonio crudo porfirizado. . . . . 5x (40 gr.).

M. Se funde en un crisol, se pulveriza de nuevo y se añade segun prescriba el médico.

Extracto de opio. . . 5ijß (10 gr.).

I. Excrecencias y úlceras fungosas y rebeldes *D.* C. s. para espolvorear muy ligeramente las partes enfermas.

Nota. El uso de este polvo exige la mayor circunspeccion.

6946. P. ARSENICAL (*Cazenave*).

℞ Oxido bl. de arsénico. ℊx (5 dec.).
Sulfuro de mercurio. . ℊL (25 dec.).
Carbon animal en polv. ℊx (5 dec.).

Se diluye una corta cantidad sobre un cuerpo sólido, y por medio de una espátula se aplica á la superficie enferma, pero no excederá del grandor de una peseta. A poco tiempo se presenta un dolor vivo, y al cabo de algunas horas una hinchazon erisipelatosa creciente, que á las veinticuatro ó treinta y seis horas presenta el aspecto de una enfermedad gráve; pero estos síntomas se disipan y queda una costra parda muy dura y muy adherida, que dura un mes y al caerse están ya las superficies cicatrizadas ó presentan buen aspecto.

6947. P. ARSENICAL *ó Polvo cáustico (Dupuytren).*

℞ Acido arsenioso. . . . . ℊx (5 dec.).
Calomelanos. . . . . 5j (32 gr.).

M. I. Cáncer, úlceras, lupus, herpes corrosivos. Se espolvorea la ulcera con un copo de algodon cargado de esta mezcla, de modo que se forme una capa de ½ de línea de grosor.

6948. P. ARSENICAL (*Pluncquet*).

℞ Ranunculus flamula. . 3j (4 gr.).
Manzanilla hedionda. . 3ß (16 gr.).
Oxido blanco de arsén. 3ij (8 gr.).
Azufre sublimado. . . . 3j (4 gr.).

Se hace un polvo muy fino, del cual se mezcla una parte con un poco de clara de huevo.

I. Ulceras fungosas ó carcinomatosas. *D.* C. s. de mezcla aluminosa para cubrir ligeramente las partes enfermas.

Nota. Despues de la aplicacion de este polvo, cuyo uso exige mucha prudencia, se forma una escara que cae al cabo de cuarenta y ocho horas.

6949. *Otro* (ROUSSELOT).

℞ Arsénico porfirizado. 1
Sangre de drago. 8
Cinabrio pulverizado. 8

M. I. Escrófulas, carcinoma de la cara, úlceras cancerosas. *D.* Al tiempo de usarle se hace una pasta con saliva ó agua ligeramente gomosa.

6950. P. ARSENICAL FEBRÍFUGO (*Boudin*).

℞ Acido arsenioso. . . . ℊ 1/5 (1 cent.).
Azúcar de leche. . . . ℊxx (1 gr.).

Mézclese intimamente y divídase en veinte papeles; cada uno representará 1/100 de grano de ácido arsenioso.

I. Calenturas intermitentes, afecciones sifilíticas inveteradas, afecciones cutáneas rebeldes. *D.* Un papel, diluido en una cucharada de agua, cinco ó seis horas antes de presentarse el acceso.

6951. P. DE ARTEMISA AZUCARADO *ó Polvo de Bresler.*

℞ Polvo de raiz de artemisa. 1
Azúcar. 2

M. I. Epilepsia y baile de San Vito. *D.* Una cucharada de café

desleida en un poco de agua, tres ó cuatro veces al dia.

6952. P. ARTRÍTICO AMARGO ó *Polvo de genciana compuesto.*

℞ Polvo de genciana.	1
Polvo de aristoloquia redonda. . .	1
Polvo de camedrios.	1
Polvo de manzanilla.	1
Polvo de centaura menor. . . .	1

Mézclese exactamente.

6953. P. DE ASA FÉTIDA.

℞ Asa fétida.	ℊxv (75 cent.).
Jar. de flor de naran).	℥j (30 gr.).
Agua dest. de valer.	℥iij (90 gr.).
Yema de huevo. . .	℥ß (15 gr.).

H. S. A.

6954. P. ASTRINGENTE.

℞ Alumbre.	℥ß (2 gr.).
Opio.	ℊvj (3 dec.).
Goma quino.	ℊxviij (1 gr.).
Diascordio.	℥ß (2 gr.).

H. S. A. y dividase en doce papeles.

I. Metrorragia, diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada tres horas.

6955. *Otro*, n. 2.

℞ Raiz de bistorta.	48
Raiz de tormentila.	48
Flores de granado.	24
Semillas de agracejo.	24
Catecú.	24
Almáciga en lágrimas.	24
Sangre de drago.	24
Sucino.	48
Bol arménico preparado.	48
Tierra sellada preparada. . . .	48
Coral rojo.	48
Extracto de opio.	1

M. I. y *D.* Se usa este polvo como astringente á la dosis de ℊxij á ℥j (6 dec. á 4 gr.).

6956. *Otro* (GAUBIUS).

℞ Oxido rojo de hierro. . .	℥ß (2 gr.).
Sangre de drago. . . .	℥j (4 gr.).
Sarcocola.	℥ij (8 gr.).
Bol arménico.	℥j (32 gr.).

M. D. Sirve para espolvorear las superficies sangrientas despues de haberlas lavado; se las cubre con hilas empapadas en alcohol caliente.

6957. P. ASTRINGENTE.

℞ Alumbre.	℥ß (2 gr.).
Opio.	ℊiij (15 cent.).

Mézclese y dividase en seis papeles.

I. Diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada dos ó tres horas.

6958. *Otro*, n. 2.

℞ Catecú.	1
Sangre de drago.	1

M. I. ℥j á ℥jß (4 á 6 gr.).

6959. *Otro* (BRERA).

℞ Cascarilla.	ℊxviij (1 gr.).
Opio puro.	ℊij (1 dec.).
Ipecacuana.	ℊij (1 dec.).
Catecú.	ℊxviij (1 gr.).

Dividase en doce papeles.

I. Hemorragias, diarrea crónica, disenteria. *D.* Un papel mañana y noche.

6960. P. ASTRINGENTES (F. N. P.).

℞ Alumbre,	
Goma quino, ãã. . . .	℥ß (16 gr.).
Mirra,	
Incienso, ãã.	℥ij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorragia por la picadura de sanguijuelas; úlceras que dan sangre.

6961. P. ASTRINGENTE (*Griffith*).

℞ Bol arménico,	
Alumbre, ãã	℥ß (15 gr.).
Sangre de drago. . . .	℥ij (8 gr.).
Sulfato de hierro. . . .	℥j (30 gr.).

M. y con c. s. de clara de huevo se hace una pasta blanda que se extiende sobre un lechino de hilas, y se introduce en las narices en los casos de epistaxis.

6962. P. ASTRINGENTE (*Otto*).

℞ Sulfato de quinina. ℊiij (15 cent.).
Oxido negro de hier. ℊx (50 cent.).
Regaliz en polvo. . . ℊxij (60 cent.).
Esencia de yerba-buena rizada. . . . 1 gota.

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Gonorreas rebeldes. *D.* Un papel, cuatro veces al dia.

6963. P. ASTRINGENTE (*Voyt*).

℞ Alumbre,
Catecú, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Extracto de ratania,
Regaliz en polvo, ãã. . . 5ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en quince papeles.

I. Flujos mucosos crónicos, hemorragias pasivas. *D.* Dos, tres ó cuatro papeles al dia.

6964. P. ASTRINGENTE HEMOSTÁTICO.

℞ Alumbre. 5
Catecú. 5
Bol arménico. 30
Goma quino. 5

Redúzcase á polvo muy fino.

I. Epistaxis, hemorragia, metrorragia, vegetaciones. *D.* Se espolvorea la superficie que da sangre y se cubre con una planchuela de hilas que se comprimirá; se taparán las fosas nasales ó la vagina.

6965. P. ASTRINGENTES Ó DE LA MEZCLA (H. DE M.).

℞ Alumbre calcinado. 1
Polvo de rosas rojas. 1
Polvo de quina calisaya. 1

H. S. A. *D.* Se usa como tópico en ciertas soluciones de continuidad fungosas y con poca vida.

6966. P. ASTRINGENTE OPIADO.

℞ Alumbre en polvo. . 5j (30 dec.).
Opio en polvo. . . . ℊxvj (8 dec.).
Azúcar en polvo. . . ℊcviij (54 dec.).

Mézclese y divídase en papeles de ℊx á ℊxv (50 á 75 cent.).

I. Diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada tres ó cuatro horas.

6967. P. ASTRINGENTE OPIADO DE VOGEL.

℞ Catecú. . . . . 5jß (6 gr.).
Opio. . . . . ℊvj (3 dec.).
Oleosácaro de clavo. . . ℥ß (15 gr.).

Divídase en doce papeles.

I. Hemorragias, diarreas crónicas. *D.* Un papel cada tres horas. *I.* Vegetaciones. *D.* En aplicaciones.

6968. P. ASTRINGENTE OPIADO (*Bouchardat*).

℞ Alumbre,
Azúcar, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Opio. . . . . ℊjv (2 dec.).

Mézclese y divídase en doce papeles iguales.

I. Diarreas rebeldes, hemorragias pasivas. *D.* Se toman dos ó tres papeles al dia.

6969. P. ATEMPERANTE.

℞ Digital en polvo. . . ℊxviij (1 gr.).
Nitro. . . . . ℊxc (5 gr.).
Azúcar. . . . . 5v (20 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Afecciones del corazon. *D.* Un papel al dia.

6970. *Otro*, n. 2.

℞ Goma arábiga en polvo,
Azúcar de leche,
Azúcar, ãã. . . . . Ibij (1000 gr.).
Nitro. . . . . Ibß (250 gr.).
Tridacio seco,
Acido benzóico, ãã. 5vj (25 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Blenorragias agudas. *D.* ℥ß (15 gr.) disuelta en dos cuartillos (1 lit.) de agua.

6971. P. ATEMPERANTE (n. 3).

℞ Clorato de potasa. ℊvij á ℊx (35 á 50 cent.).
Azúcar. . . . . ℈j (12 dec.).
I. Tisis pulmonar para disminuir el calor febril. *D.* Se repite la dosis dos ó cuatro veces.

6972. *Otro* (PITSCHAFT).

℞ Sulfato de sosa. . . ℊxc (5 gr.).
Opio. . . . . ℊijß (12 cent.).
I. Hemorragias é inflamaciones despues de la sangría.

6973. P. ATEMPERANTE DE STAHL (F. F.).

℞ Sulfato de potasa,
Nitrato de potasa, ää. ℥jx (288 gr.).
Sulfuro rojo de mercurio (cinabrio). . . . ℥ij (64 gr.).
Se porfirizan juntos hasta obtener un polvo sutil.
I. Afecciones herpéticas, eretismo, etc. Este polvo que en el dia no tiene uso, era considerado como sedante por Stahl. *D.* ℊvj á ℊxviij (3 á 9 dec.).

6974. P. DE ATROPINA *ó Tomas de atropina.*

℞ Atropina. . . . . ℊj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . ℊij (10 cent.).
Se mezcla por trituracion y se divide en cien papeles.
I. Coqueluche. *D.* Dos ó tres papeles al dia á los niños de cinco años.

6975. P. AZAFRANADO.

℞ Azafran. . . . . ℥jv (16 gr.).
Ojos de cangrejos. . . ℥ij (8 gr.).
Canela,
Sándalo cetrino, ää. . ℥ß (2 gr.).
Hojas de dictamo,
Mirra, ää. . . . . ℊxviij (1 gr.).
M. I. Amenorrea, dismenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* Se usa para preparar la confeccion de jacintos, y en bolos y píldoras.

6976. P. DE AZÚCAR MERCURIAL.

℞ Azúcar cande. . . . . ℥j (4 gr.).
Calomelanos. . . . . ℥ij (8 gr.).
Tritúrese.
D. ℊjv á ℊviij (2 á 4 dec.) aumentando progresivamente.

6977. P. DE AZUFRE Y ESCILA *ó Polvo incisivo* (H. M. F.).

℞ Azufre sublim. y lavad. ℊjv (2 dec.).
Escila en polvo. . . . ℊij (4 dec.).
M. D. Para una dosis.

6978. P. DE AZUFRE TARTARIZADO (*Jahn*).

℞ Bitartrato de potasa. ℥ß (15 gr.).
Azufre precipitado,
Azúcar blanca, ää. . ℥ij (8 gr.).
Polvo de acónito. . . ℊx (50 cent.).
M. I. Neuralgias, especialmente la ciática. *D.* Una cucharada de café cada dos ó tres horas.

6979. P. BALSAMICO.

℞ Ácido benzóico. . . . ℊxij (6 dec.).
Azúcar en polvo. . . ℈j (12 dec.).
Oleosácaro de anís. ℊxxx (15 dec.).
M. I. Catarros pulmonares crónicos. *D.* En ocho dosis.

6980. P. DE BELEÑO (*Vogler*).

℞ Extracto alcohólico de beleño. . . . . ℊxij (6 dec.).
Subnitrato de bismuto. ℊx (5 dec.).
Magnesia. . . . . ℥ß (2 gr.).
Azúcar de leche,
Oleosác. de hinojo, ää. ℥ijß (10 gr.).
Mézclese y divídase en diez papeles.
I. Asma, coqueluche, catarro, neumonía, bronquitis. *D.* Un papel cada tres horas.

6981. P. DE BELLADONA COMPUESTO *ó Polvo sedante de Wetzler.*

℞ Raiz de bellad. en p. ℊvj (3 dec.)
Azúcar. . . . . ℊxxjv (12 dec.).
Mézclese y divídase en veinticuatro tomas.

I. Coqueluche de los niños y tos nerviosa de los adultos. *D.* Dos á seis tomas al dia á los niños, segun la edad, y hasta doce á los adultos.

6982. P. DE BELLADONA COMPUESTO (*Hufeland*).

℞ Raiz de belladona en p. ʒx (5 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒij (24 dec.).
Mézclese y divídase en diez y ocho tomas.

I. Asma espasmódico, hipertrofia y degeneracion del hígado y del bazo, ictericia, palpitaciones de corazon simpáticas. *D.* Dos ó tres papeles al dia.

6983. P. DE BELLADONA OPIADO *ó Hojas de belladona opiadas.*

℞ Hojas de belladona. . ʒjv (16 gr.).
Extracto de opio. . . . ʒvviij (4 gr.).
Agua pura. . . . . ʒjv (16 gr.).

Se disuelve el extracto en el agua, se impregnan exactamente de él las hojas de belladona colocadas en un vaso de loza, y se secan en un tamiz al aire libre.

I. Hemotisis complicada con tisis pulmonar.

6984. P. BENEDICTOS PARA EL CÁNCER (H. DE M.).

℞ Raiz de *dragoncillo*, recolectada en los meses de junio, julio ó agosto y desecada. . . . . ʒiij (96 gr.).
Acido arsenioso opaco, sutilmente pulveriz. ʒj (32 gr.).
Hollin de chimenea, abundante en principios solubles. . . ʒiij (12 gr.).

Se mezclan exactamente levigándolos sobre un porfido y se guardan en un frasco bien tapado.

I. Cáncer. Segun el autor, son tanto mejores cuanto mas antiguos, por lo que no se usan hasta pasado un año.

6985. P. DE BENJUI (*Pil.*).

℞ Benjui,
Azúcar cande, ãã. . . . ʒß (2 gr.).
Divídase en seis papeles.

I. Asma, bronquitis, catarro crónico, neumonia, histérico. *D.* Un papel mañana y noche en una infusion de marrubio.

6986. P. BEZOARDICOS DE CURBO *ó Polvos antisépticos de quina* (F. E.).

℞ Raiz de contrayerba,
Raiz de carlina,
Raiz de tormentila,
Raiz de dictamo blanco,
Flores de amapola,
Hojas de cardo santo,
Hojas de escordio, ãã. ʒij (8 gr.).
Perlas levigadas,
Cuerno de ciervo levigado,
Ojos de cangrejos levigados,
Antimonio diaforético,
Piedra cananor,
Bezoar oriental,
Pied. cordial de Goa, ãã. ʒj (4 gr.).
Quina peruv. escogida. ʒij (64 gr.).

Se reducen á polvos muy sutiles.

I. Se usan como antipútridos y entran en la composicion de los cocimientos bezoárdicos de Curbo. *D.* De ʒij á ʒj (24 dec. á 4 gr.).

6987. P. BENZOICO ANTIMONIADO.

℞ Quermes mineral. . giij (15 cent.).
Acido benzóico. . . . gvj (30 cent.).
Castóreo. . . . . gij (10 cent.).
Divídase en seis papeles.

I. Catarro sofocante, coqueluche. *D.* Un papel cada cuatro horas en una cucharada de infusion de marrubio.

6988. P. BENZOICO ASTRINGENTE (*Geigel*).

℞ Acido benzóico,
Tanino, ãã. . . . . gxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . ʒijß (10 gr.).
Divídase en veinte papeles.

I. Coqueluche. *D.* Un papel cada dos horas á los niños de tres años.

6989. P. DE BERENDS.

℞ Calomelanos. . . . gv (25 cent.).
Digital purpúrea. . . gjv (20 cent.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).

Háganse doce papeles.

I. Bronquitis, coqueluche, hidrocéfalo, diarrea. *D.* Un papel cada dos horas.

6990. P. DE BERLIN OLOROSO.

℞ Almizcle. . . . . gij (1 dec.).
Benjui,
Cascarilla, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Estoraque calamita,
Lirio, ãã. . . . . 5ß (16 gr.).
Clavo,
Canela, ãã. . . . . 5iij (12 gr.).
Rosas rojas,
Flores de espliego,
Flores de granado, ãã. 5vj (24 gr.).
Macis. . . . . 5ß (2 gr.).
Esencia de bergamota,
Esencia de clavo, ãã. gxij (6 dec.).
Esencia de manzanilla. gviij (4 dec.).
Esencia de rosas. . . . gxij (6 dec.).

Mézclese y redúzcase á un polvo impalpable, de que se echará una pulgarada sobre una chapa de hierro caliente.

6991. P. DE BICARBONATO DE SOSA.

℞ Bicarbonato de sosa. . gxviij (1 gr.).
Opio. . . . . gj (5 cent.).
Oleosácaro de menta piperita,
ó Cajeput. . . . . gxviij (1 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Estafiloma, tifo, cólera, dispepsia. *D.* Un papel cada hora. Despues se toma una cucharadita de café de zumo de limon.

6992. P. DE BOL ARMENICO (F. F.).

℞ Bol de Armenia. . . . . c. s. q.

Se pulveriza por contusion en un almirez, se echa el producto en un barreño con agua fria, se deslie perfectamente, y se deja cuarenta y ocho horas en el agua, meneándole de cuando en cuando. Pasado este tiempo se revuelvé el polvo dentro del agua y despues de algunos minutos de reposo se decanta el líquido turbio, cuya operacion se repite cuantas veces sea necesario para separar todo el polvo sutil: se arroja el residuo como inútil, se dejan sedimentar los líquidos decantados, se separa el sedimento, se pone á escurrir sobre un lienzo, se trocisca y se seca.

I. y *D.* V. t. I, pág. 221.

6993. P. DE CAINCA (*Beral*).

℞ Solucion alcohólica de extr. de cainca. ℥jv (125 gr.).
Azúcar blanca en pedazos. . . . . ℔j℥ß (750 gr.).

Se vierte el líquido sobre el azúcar, se le deja secar al aire libre y se reduce á polvo. *D.* 5j á 5jv (4 á 16 gr.) al dia en cuatro cucharadas de agua.

6994. P. CALMANTE.

℞ Subnitrato de bismuto. gjv (2 dec.).
Magnesia calcinada,
Azúcar, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).

Mézclese y divídase en cuatro papeles.

I. Gastrodinia, cólera, pirosis, dispepsia, tisis, gastralgia, gastritis, bronquitis, ronquera. *D.* Un papel cada hora en media taza de infusion de manzanilla.

6995. *Otro* (BERENDS).

℞ Raiz de belladona. . . giij (15 cent.).
Ipecacuana. . . . . gij (10 cent.).
Oxido de zinc. . . . gvj (30 cent.).
Azúcar. . . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. seis papeles.

I. Epilepsia, hidrocéfalo, tisis, bronquitis, coqueluche, pirosis, dispepsia. *D.* Uno cada dos horas.

6996. *Otro* (CLARUS).

℞ Magisterio de bismuto, gviij á gxjv (4 á 7 dec.).
Ipecacuana. . . . . gij℥ß (12 cent.).
Magnesia calcinada. 5ij (8 gr.).

H. S. A. doce papeles.

I. Gastrodinia. *D.* Un papel, tres ó cuatro veces al dia.

6997. P. CALMANTE (*Cottereau*).

℞ Extr. hidroalcohólico de pulsatila. . . . . gxij (6 dec.).
Polvo de digital purpúrea. . . . . gvj (3 dec.).
Acetato de morfina. . . gj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se deberá dividir en treinta y seis partes iguales.

I. Tos é insomnio de los tísicos, coqueluche, bronquitis, pirosis, neumonía, tisis, catarro crónico, tos convulsiva, dispepsia. *D.* Cuatro tomas cada día, con cerca de cuatro horas de intervalo de unas á otras.

Nota. El modo mas conveniente de administrarlos es diluir cada toma en una cucharada de agua azucarada ó de jarabe, ya de goma ó de puntas de espárragos.

6998. *Otro* (HENNING).

℞ Cianuro de zinc. . . . gvj (3 dec.).
Magnesia calcinada. . gjv (2 dec.).
Canela. . . . . giij (15 cent.).

M. I. Afecciones nerviosas y calambres de estómago. *D.* Se toma cada cuatro horas.

6999. *Otro* (KOPP).

℞ Subnitrato de bism. gxij (60 cent.).
Extr. de lechuga vir. gvj (30 cent.).
Magnesia calcinada. gxv (75 cent.).
Ipecacuana. . . . . gjv (20 cent.).
Oleosácaro de manz. 5ß (2 gr.).

Divídase en cinco papeles.

I. Tisis, gastralgia, bronquitis, ronquera, gastrodinia, dispepsia, pirosis. *D.* Un papel cada dos horas.

7000. *Otro* (KOPP).

℞ Raíz de belladona. . . . gij (1 dec.).
Ipecacuana. gj á gij (5 á 10 cent.).
Azufre depurado. . . . 5ß (2 gr.).
Azúcar de leche. . . . gx (5 dec.).

H. S. A. ocho papeles.

I. Coqueluche. *D.* Un papel, cuatro veces al día.

7001. *Otro* (MARENS).

℞ Magisterio de bismuto, Almizcle, ãã. . . . . gj (5 cent.).
Extracto de beleño. . . gß (25 mil.).
Magnesia. . . . . gvj (3 dec.).

I. Gastrodinia. *D.* Esta cantidad cada tres horas.

7002. *Otro* (VOGT).

℞ Extr. de beleño. . . . 9ij (24 dec.).
Azúcar de leche. . . . gjv (3 gr.).
Regaliz. . . . . 5ß (15 gr.).
Goma arábiga. . . . . 5ij (8 gr.).
Oleosácaro de hinojo. . 5iij (12 gr.).

M. I. Catarros. *D.* Una cucharada de café tres ó cuatro veces al día con agua de malvabisco.

7003. P. CALMANTE ABSORBENTE (*Righini*).

℞ Carbonato de sosa. . . 5ij (8 gr.).
Semillas de beleño. . . gxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . 5j (4 gr.).

Hágase polvo y divídase en seis tomas iguales.

7004. P. DE CALOMELANOS (*Swediaur*).

℞ Mercurio dulce. . . . . gvj (3 dec.).
Almidon. . . . . gxij (6 dec.).
Azúcar blanca. . . . 5ß (2 gr.).

M. I. Es laxante. *D.* De una vez.

7005. P. CALMANTE CONTRA LA COQUELUCHE (*Viricel*).

℞ Polvo de raíz de belladona. . . . . giij (15 cent.).
Cochinilla en polvo,
Bicarb. de sosa, ãã. gxij (60 cent.).
Azúcar en polvo. . . 5j (30 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Es muy eficaz contra la tos convulsiva y la coqueluche. *D.* Un papel por la noche.

7006. P. DE CALOMELANOS CON OPIO (F. P.).

℞ Protocloruro de mercurio. 1
Opio. 1

M. I. Afecciones venéreas, dolores artríticos y venéreos de los ojos. *D.* gß á gj (25 á 50 mil.) ó mas, aumentando gradualmente, y c. s. para destruir la atonía de las úlceras venéreas.

7007. P. DE CALOMELANOS OPIADO (H. DE AL.).

℞ Calomelanos. . . . . gvj (3 dec.).
Opio. . . . . gij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Es alterante, y Hufeland prescribe este polvo en las inflamaciones locales, y principalmente al principio de las pleuresías. *D.* Un papel de hora en hora.

7008. P. DE CAL VIVA.

℞ Cal viva en polvo. . . . . c. s. q.

I. Reumatismo crónico. Se espolvorea las partes doloridas, pero antes se las cubre de miel. Se cubre todo con papel de estraza ó una franela.

7009. P. DE CANELA (F. F.).

℞ Cortezas de canela. . . . . c. s. q.

Se pulverizan por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan las cortezas de CANELA DE CEYLAN, CANELA BLANCA, CLAVO, QUINA CALISAYA SIN EPIDERMIS Y CORTEZA DE WINTER.

7010. P. DE CANELA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Canela. . . . . ʒij (64 gr.).
Cardamomo. . . . . ʒx (40 gr.).
Gengibre. . . . . ʒj (32 gr.).
Pimienta larga. . . . . ʒß (16 gr.).

Se reducen todos á un polvo muy sutil. *D.* gxviij (1 gr.) como tónico.

7011. P. DE CANTÁRIDAS (F. F.).

℞ Cantáridas. . . . . c. s. q.

Se ponen á secar al sol ó en la estufa, y despues de bien secas se pulverizan por contusion en un mortero de bronce sin dejar residuo.

El operario debe tomar las precauciones necesarias para librarse del polvo en esta pulverizacion.

Del mismo modo se pulverizan la COCHINILLA, GRANA QUERMES Y MILPIÉS.

7012. P. DE LOS CAPUCHINOS.

℞ Semilla de cebadilla,
Semilla de estafisagria,
Semilla de peregil,
Hojas de tabaco, ää. . . ʒß (2 gr.).

I. Se usa para destruir los piojos. *D.* Se espolvorea la cabeza con c. s. de este polvo.

7013. P. CAQUÉCTICO.

℞ Oxido negro de hierro. 3
Polvo aromático. 6
Azúcar. 8

M. I. Raquitis, leucorrea. *D.* ʒß á ʒj al dia (2 á 4 gr.) y gvj á gx (3 á 5 dec.) para los niños.

7014. *Otro* (HARTMANN).

℞ Azafran de marte aperitivo. 1
Canela en polvo. 2
Azúcar. 5

H. S. A. Este polvo se emplea como tónico.

7015. P. DE CARBON MAGNESIANO.

℞ Carbon vegetal. . . . . ʒvj (192 gr.).
Magnesia. . . . . ʒij (8 gr.).

Se porfirizan, se mezclan con cuidado y se añade:

Esencia de yerbabuen. gxviij (1 gr.).

Se usa como dentífrico.

7016. P. DE CARBON CON QUINA.

℞ Polvo de quina. 1

Polvo de carbon. 1

M. Se usa para espolvorear y curar las heridas gangrenosas.

Este polvo constituye un dentífrico excelente. Se le añade algunas veces el crémor de tártaro, la mirra, el lirio, etc.

7017. P. DE CARBONATO DE CAL COMPUESTO (F. ED.).

℞ Carbonato de cal preparado y pulverizado. ℥ij (60 gr.).
Canela en polvo. . . . . ℥jß (45 gr.).
Nuez moscada en polvo. ʒij (8 gr.).

M. I. Diarreas y disenterías crónicas. *D.* De 5ß á ʒj (2 á 4 gr.).

7018. P. DE CARBONATO DE MAGNESIA (*Frank*).

℞ Carbon. de magnesia. ʒij (24 dec.).
Polvo de ruibarbo. . . gx (5 dec.).
Polvo de canela. . . . gxij (6 dec.).

D. Se toma en dos veces en los casos de cardialgias y agrios.

7019. P. DE CARBONATO DE MAGNESIA CON LA SOSA (*Nicolai*).

℞ Regaliz en polvo. . . . ʒj (12 dec.)
Carbonato de magnes. ʒß (6 dec.).
Carbonato de sosa,
Polvo de gengibre, ää. gv (25 cent.)

D. Se toma de una vez en los casos de cardialgia.

7020. P. DE CARDAMOMO (F. F.).

℞ Cardamomo. . . . . c. s. q.

Se rompen los frutos del cardamomo para sacar las semillas, se desecan estas en la estufa, y se pulverizan sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan el AMOMO RACIMOSO Y LOS DEMÁS CARDAMOMOS.

7021. P. DE CARDENILLO (F. F.).

℞ Cardenillo. . . . . c. s. q.

Se pulveriza por contusion en un almirez de bronce cubierto con una gamuza, y se pasa por un tamiz de seda tapado.

Del mismo modo se preparan los polvos de ALUMBRE, CAL, CARBON VEGETAL, CRÉMOR DE TÁRTARO, LITARGIRIO, PERÓXIDO DE MANGANESO, SULFATO DE ZINC, DE POTASA Ó DE HIERRO, y en general los de todas las sustancias minerales que puedan rayar el mármol, y que en seco no tienen accion sobre el bronce.

7022. P. DE CARIGNAN, *tal como le ha dado la princesa á Pial y Deyeux.*

℞ Polvo de Guteta. . . ßß (250 gr.).
Ambar gris. . . . . ℥xij (375 gr.).
Coral rojo. . . . . ℥jv (125 gr.).
Tierra sellada. . . . ℥jv (125 gr.).
Cinabrio,
Quermes mineral,
Negro de marfil, ää. ʒij (12 gr.).

Mézclese y divídase en tomas de ℊij (1 dec.).

7023. P. CARMINATIVO Y ESTOMACAL.

℞ Azúcar de leche. . . . ℥jv (125 gr.).
Canela en polvo,
Semillas de anís,
Gengibre, ää. . . . . ʒjv (48 dec.).

M. D. Una cucharadita de café por la mañana, al medio dia y por la noche, en medio vaso de agua azucarada y aromatizada con algunas gotas de agua de flor de naranjo.

7024. P. DE CASTÓREO (F. F.).

℞ Castóreo. . . . . c. s. q.

Se rasgan las bolsas, se quita la cubierta exterior y las membranas que se puedan, y se pulveriza el resto por trituracion tamizándolo sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase tomo I, pág. 141.

Del mismo modo se pulveriza el ALMIZCLE.

7025. P. CATÁRTICO.

℞ Polvo de ruibarbo,

Polvo de cáscara de naranja,
Crémor de tártaro, ãã. ʒß (15 gr.).
M. D. De 5ß á 3j (2 á 4 gr.).

7026. P. CATÁRTICO (H. M.).

℞ Crémor de tártaro,
Azúcar blanca, ãã. . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales. *D.* Uno cada tres horas.

7027. P. CATÁRTICO FEBRÍFUGO (H. DE MOMP.).

℞ Quina roja. . . . . ʒiij (12 gr.).
Magnesia calcinada. . . ʒij (8 gr.).
Manzanilla romana. . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles.
D. Uno cada cuatro horas en una taza de infusion de achicoria silvestre.

7028. P. CATÁRTICO *ó Polvo de jalapa y escamonea.*

℞ Polvo de jalapa. 3
Polvo de escamonea. 1
Bitartrato de potasa. 2
Se tritura por mucho tiempo.
D. gviij á gtjv (4 dec. á 3 gr.) en un vehículo apropiado.

7029. P. CATERÉTICO.

℞ Alumbre calcinado. 1
Pimienta larga. 1
Sulfato de zinc. 1
Sabina. 1
H. S. A. *I.* Excrescencias ó úlceras venéreas, dolores osteocopos. Se espolvorea la parte con c. s. de este polvo.

7030. *Otro* (AMMON).

℞ Sabina. . . . . ʒiij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ʒv (20 gr.).
I. y *D.* Se usa c. s. para espolvorear las úlceras fungosas, vegetaciopes y mamelones carnosos.

7031. *Otro* (RODINGTON).

℞ Alumbre calcinado en polvo. . . . 1
Verde gris en polvo. 1
Sabina en polvo. 1
M. I. Grietas y vegetaciones sifilíticas. *D.* Se espolvorea con este polvo la superficie que se quiere cauterizar.

7032. P. DE CATECÚ COMPUESTO (H. DE AL.).

℞ Catecú,
Cascarilla,
Goma arábiga,
Canela, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
I. Diarrea crónica, hemorragia, odontalgia, espasmo, dispepsia. *D.* Un papel cada dos horas.

7033. P. CATÓLICOS PURGANTES *ó Polvos católicos de escamonea* (F. E.).

℞ Polvos de escamonea escogida. . . . . ʒß (16 gr.).
Raiz de mechoacan,
Raiz de jalapa, ãã. . . ʒvj (24 gr.).
Tartrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Háganse polvos S. A.
I. Son purgantes y convienen principalmente en las obstrucciones de las vísceras. *D.* De ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

7034. P. CÁUSTICO.

℞ Alumbre calcinado. . . ʒj (30 gr.).
Precipitado rojo. . . . ʒß (15 gr.).
M. I. Sirven para corroer y destruir las carnes fungosas de las heridas y de las úlceras, y fijar la úlcera pútrida.

7035. P. CÁUSTICO (*Kruger, Masius*).

℞ Bicloruro de mercurio.
Sulfato de cobre ãã. . . gv (3 dec.

Nitrato de plata. . . . gvj (3 dec.).

U. S. A. I. Vegetaciones y grietas sifilíticas. *D.* Se aplica un poco de este polvo en la superficie que se quiere cauterizar, y se humedece despues con un poco de agua. Se usará este polvo con mucha circunspeccion.

7036. P. CÁUSTICO (PLENK).

℞ Oxido rojo de mercurio,
Alumbre calcinado, ãã. 5j (4 gr.).
Sabina. . . . . 5ß (16 gr.).

M. I. Se usa para reprimir las carnes fungosas de las úlceras venéreas, condilomas, dolores osteocopos, verrugas.

El POLVO CÁUSTICO DE GARDINER tiene la misma composicion.

Los POLVOS CÁUSTICOS ó CATERÉTICOS DE LOS H. DE M. se componen de 5ij 8 gr.) de polvo de sabina, 5ij (8 gr.) de alumbre calcinado y 5j (4 gr.) de precipitado rojo.

7037. P. CEFALICO (*Siedler*).

℞ Peonia. . . . 5ß á 5j (6 á 12 dec.).
Oxido de zinc. ʒx á ʒxjv (5 á 7 dec.).
Extracto de beleño. ʒj á ʒij (5 á 10 cent.).

M. I. Ha sido recomendado en la epilepsia y corea. *D.* ʒxviij (9 dec.) mañana y noche, aumentando la dosis hasta ʒxxjv (12 dec.).

7038. P. CEFÁLICO DE TABACO.

℞ Tabaco rapé. . . . . 5ß (15 gr.).
Polvo de mejorana,
Polvo de lirio de los valles,
Polvo de maro, ãã. . . 5ß (2 gr.).
Polvo de castaño de Indias. . . . . 5j (4 gr.).

M. I. Cefalalgia. *D.* Se toma muchas veces al dia como el tabaco.

7039. P. DE CENTAURA MENOR (F. F.).

Sumidades floridas de centaura menor. . . . . c. s. q.

Se desecan en la estufa y se pulverizan por contusion hasta obtener las tres cuartas partes del peso total.

I. y *D.* V. tomo I, pág. 146.

Del mismo modo se pulverizan las SUMIDADES DE HIPERICON, DE CUAJALECHE y las demás sumidades floridas.

7040. P. DE CETRARINO (*Muller*).

℞ Cetrarino,
Goma arábiga, ãã. . . ʒxviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . ʒxc (3 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes. *D.* Un papel cada dos horas.

7041. P. CIANURADO (*Henning*).

℞ Cianuro de zinc. . . ʒß (25 mil.).
Magnesia calcinada. . ʒjv (20 cent.).
Canela en polvo. . . ʒiij (15 cent.).

Divídase en seis papeles.

I. Enfermedades convulsivas y particularmente las que complican la denticion y las afecciones verminosas de los niños, calambres de estómago, dismenorrea. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7042. P. DE CIANURO DE HIERRO.

℞ Cianuro de hierro. ʒxij (6 dec.).
Azúcar. . . . . ʒxc (5 gr.).

Divídase en quince papeles.

I. Escrófulas, sífilis, epilepsia, corea, calenturas intermitentes. *D.* Un papel cada dos horas.

7043. P. DE CIANURO DE ORO (*Chrestien*).

℞ Cianuro de oro. . . . ʒj (5 cent.).
Raiz de lirio en polvo. ʒij (10 cent.).

Divídase en papelitos que se emplean en fricciones.

7044. P. DE CLARC.

℞ Mercurio dulce. . . . ʒjv (2 dec.

Bolo armeniaco. . . . . gvj (3 dec.).
Divídase en cuatro papeles.
D. En el dia, en cuatro fricciones en las encías, en la superficie interna de los labios, de la lengua y del paladar, por el método de Clarc y Brachet.

7045. P. DE CLORURO DE BARIO (*Swediaur*).

℞ Cloruro de baria. . . . 5ij (8 gr.).
Protocloruro de merc. gx (5 dec.).
Sulfuro de antimonio. . gvj (3 dec.).
Divídase en cincuenta papeles.
I. Escrófulas, sífilis, viruelas, tiña, tifo, gangrena de hospital.
D. Dos papeles al dia en 5ijß (10 gr.) de jarabe.

7046. P. DE CLORURO DE ORO.

℞ Cloruro de oro. . . . gj (5 cent.).
Almidon en polvo. . 3v (600 cent.).
Mézclese exactamente y divídase en quince papeles.
I. Enfermedades venéreas rebeldes al mercurio, escrófulas y herpes. *D.* Un papel en fricciones.

7047. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Magendie*).

℞ Clor. de oro y sodio. gj (5 cent.).
Lirio de Florencia en polvo. . . . . gij (10 cent.).
Mézclese intimamente y divídase en papeles iguales.
I. Sífilides, tiña, viruelas. *D.* Un papel mañana y noche en fricciones en las encías.

7048. P. DEL CONDE DE PALMA.

Con este nombre se ha conseja-do, lo mismo que con el de polvo de Sentinelli, polvo de Valentini, polvo de Swinger ó panacea inglesa, el uso del carbonato de magnesia.

7049. P. DE CLORURO DE PLATA.

℞ Cloruro de plata. . . gj (5 cent.).
Lirio de Florencia. . gij (10 cent.).
Divídase en ocho papeles.
I. Enfermedades sifilíticas, sífilides, epilepsia. *D.* En fricciones en la lengua.

7050. P. DE COLOFONIA (F. F.).

℞ Colofonia. . . . . c. s. q.
Se pulveriza por trituracion, y se pasa por tamiz. Véase tomo I, pág. 160.
Del mismo modo se pulverizan el BUSJÚ, el BÁLSAMO DE TOLÚ, las RESINAS DE ALMÁCIGA, de GUAYACO ó de JALAPA, la SANGRE DE DRAGO y demás resinas.

7051. P. DE COLOQUINTIDA (F. F.).

℞ Frutos de coloquíntida . . . . c. s. q.
Se abren para sacar las semillas que se arrojan, se corta la carne en pedazos pequeños, se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion sin dejar residuo. Véase tomo I, pág. 160 y 161.
Del mismo modo se pulverizan las CABEZAS DE ADORMIDERAS.

7052. P. DE COLOQUINTIDA (H. DE AL.).

℞ Coloquintida. gj á gij (5 á 15 cent.).
Goma arábiga,
Regaliz,
Azúcar blanca, ää. . gv (25 cent.).
M. D. De una vez.

7053. P. DE COLOMBO.

℞ Colombo. . . . . gxviij (1 gr.).
Magnesia calcinada. . 5ß (2 gr.).
Oleosácaro de canela. 5j (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Dispepsia, diarrea, pirosis, acidez de las primeras vias. *D.* Dos papeles mañana y noche.

7054. P. DEL CONDE DE WARWICK.

℥ Diagridio sulfurado. . ʒij (60 gr.).
Antimonio diaforético. ʒß (45 gr.).
Crémor de tártaro. . ʒß (15 gr.).

H. S. A. *I.* y *D.* Se usa como purgante á la dosis de ʒß á ʒj (6 á 12 dec.).

7055. P. DE CONTENT.

℥ Azúcar. . . . . ℔j (500 gr.).
Harina de arroz. . . ℔ij (1000 gr.).
Cacao. . . . . ℔jß (750 gr.).
Canela. . . . . ʒvj (25 gr.).
Clavo. . . . . ʒijß (10 gr.).
Cardamomo. . . . . ℊxc (5 gr.).
Bálsamo negro del Perú. 5 gotas.

H. S. A. Se usa como analéptico.

7056. P. CONTRA LA AMAUROSIS (H. DE M.).

℥ Extracto de pulsatila. ℊj (5 cent.).
Raiz de valeriana en p. ʒij (24 dec.).

Mézclese y divídase en dos papeles. *D.* Se toma uno por la mañana y otro por la noche.

7057. P. CONTRA LA AMENORREA (*Tsuhierchki*).

℥ Extracto de tejo. . . ℊij (10 cent.).
Calomelanos. . . . ℊj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . ℊx (50 cent.).
Esencia de sabina. . 1 gota.

H. S. A. una dosis.

D. Una dosis mañana y noche.

7058. P. CONTRA LA AMENORREA (*Fouquier*).

℥ Carbonato de hierro. . ʒß (18 dec.).
Extracto seco de quina. ʒj (12 dec.).
Polvo de canela. . . . ʒß (6 dec.).

D. Se toma primero en tres veces, despues en dos ó en una al dia antes de comer.

7059. P. CONTRA LA ATROFIA MESENTÉRICA (*Wendt*).

℥ Calomelanos. ℊviij á ℊxvj (4 á 8 dec.).
Flores de azufre. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒj (4 gr.).

Divídase en cuatro papeles iguales.

D. Un papel mañana y noche.

7060. P. CONTRA EL BOCIO.

℥ Esponja tostada de color rojo. . . . . ʒv (20 gr.).
Clorhidrato de amon. ℊxviij (1 gr.).
Carbon vegetal. . . . ℊviij (1 gr.).

M. I. Bocio, tumores blancos, leucorrea, raquitis, escrófulas. *D.* Se da en tomas de ℊxviij (1 gr.). A los enfermos de diez años se dan ℊ.jv (3 gr.) al dia en tres tomas, una por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche. Se introduce la dosis en el fondo de la boca con una cucharadita de café y se hace tragar el polvo seco. Es muy eficaz, y para hacerle mas activo se añade á la fórmula ℊxviij (1 gr.) de ioduro de potasio. Algunas veces se añade ʒv (20 gr.) de musgo de Córcega en polvo, y en este caso hay que poner la mitad del clorhidrato de amoniaco.

Esta preparacion puede reemplazar el *polvo de Senecy*, cuya eficacia está generalmente reconocida.

7061. P. CONTRA LOS CALAMBRES DE ESTÓMAGO (H. DE AL.).

℥ Subnitr. de bismuto. ℊxij (6 dec.).
Gengibre en polvo. . ℊviij (4 dec.).
Conchas de ostras preparadas. . . . . ʒij (24 dec.).
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles.

D. Un papel dos ó tres veces al dia, en una taza de infusion de

manzanilla o de yerbabuena de sabor de pimienta.

7062. P. CONTRA LOS CALAMBRES DE ESTÓMAGO (*Wendt*).

℞ Magisterio de bismuto. ℊxij (6 dec.).
Extracto de lechuga virosa. . . . . ℈j (12 dec.).
Polvo de ipecacuana. ℊiij (15 cent.).
Oleosácaro de menta piperita ó de manzanilla. . . . ℈ijß (3 gr.).
H. S. A. un polvo, que se dividirá en seis tomas iguales. *D.* Tres ó cuatro tomas al dia.

7063. P. CONTRA EL CÓLICO SATURNINO (*Harlon*).

℞ Calomelanos preparados al vapor. . . ℊv (25 cent.).
Opio en polvo. . . . . ℊij (10 cent.).
Acetato de plomo. . ℊiij (15 cent.).
M. D. Para una dosis, que puede repetirse cada dos horas hasta que alivie, lo cual acaece á las dos o tres horas.

7064. P. CONTRA LA COQUELUCHE.

℞ Belladona. 1
Cicuta. 1
Oxido de zinc. 1
D. ℊj á ℊv (5 á 25 cent.) al dia.

7065. *Otro*, n. 2.

℞ Quermes mineral. . . . ℊij (1 dec.).
Ipecacuana. . . . . ℊvj (3 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Un papel cada cuatro horas.

7066. *Otro*, n. 3.

℞ Polvo de raiz de belladona. . . . . ℊjv (2 dec.).
Polvo de ipecacuana. . ℊviij (4 dec.).
Azúcar. . . . . ℈ijß (10 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
D. Uno ó dos al dia á un niño de tres años.

7067. *Otro*, n. 4.

℞ Quermes. . . . . ℊij (1 dec.).
Ipecacuana en polvo. . ℊjv (2 dec.).
Raiz de belladona en p. ℊj (5 cent.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Se toma uno cada cuatro horas.

7068. *Otro* (BRACHET).

℞ Extracto de opio,
Extr. de belladona, ãã. ℊvj (3 dec.).
Azúcar de leche. . . . ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. seis papeles iguales.
D. Uno ó dos en las veinticuatro horas en algunas cucharadas de tisana.

7069. *Otro* (GUERSANT).

℞ Belladona,
Oxido de zinc, ãã. . . . . p. ig.
M. I. Coqueluche, los espasmódica, asma. *D.* gj á gv (5 á 25 cent.) al dia.

7070. *Otro* (KAHLEISS).

℞ Raiz de belladona en p. ℊjv (2 dec.).
Polvos de Dower. . . ℊx (5 dec.).
Azufre sublimado, lavado y porfirizado. . ℈ij (24 dec.).
Azúcar blanca. . . . ℈jv (15 gr.).
H. S. A. un polvo que se divide en veinte papeles iguales.
D. Un papel cada tres horas, para un niño de dos años.
Nota. Entre las tomas se administra la pocion siguiente á la dosis de una cucharada de café:
Agua destilada de manzanilla. . . . . ℈j (32 gr.).
Jarabe simple. . . . . ℈ij (8 gr.).
Ácido prúsico de Vauquelin. . . . . 12 gotas.

7071. *Otro* (PISCHEF).

℞ Tabaco. . . . . ℊij (10 cent.).
Tártaro estibiado. . . ℊj (5 cent.).
Azúcar en polvo. . . ℈ijß (10 gr.).
Goma arábiga. . . . ℈ß (2 gr.).
Divídase en veinte papeles.
D. Uno cada dos horas á los ni-

nos que arrojan muchas flemas y tienen una constitucion atónica.

Si el remedio excita vómitos, estos favorecen la curacion. Su autor asegura que produce buenos resultados y que puede curar la coqueluche en cuatro semanas.

7072. P. CONTRA LA COQUELUCHE (*Sandrás*).

℞ Raiz de belladona en polvo. . . . . gj (5 cent.).
Azúcar. . . . . gv (25 cent.).

M. D. Una toma á los niños de un año, dos á los de dos ó tres años, cuatro á los de mas edad y ocho á los adultos.

7073. P. CONTRA LA COQUELUCHE Y EL CATARRO NERVIOSO.

℞ Azúcar. . . . . 3j (4 gr.).
Regaliz. . . . . 9j (12 dec.).
Raiz de belladona. . giij (15 cent.).

H. S. A. un polvo, que se divide en doce tomas iguales.

D. Una toma al dia.

7074. P. CONTRA LA COQUELUCHE (*Marc*).

℞ Azúcar. . . . . 3j (4 gr.).
Polvo de regaliz. . . 9j (12 dec.).
Raiz de belladona en polvo. . . . . giij (15 cent.).

Hágase polvo S. A. y divídase en doce papeles.

D. Un papel cada seis horas.

7075. P. CONTRA LA COQUELUCHE (*Goelis*).

℞ Almizcle. . . . . giij (15 cent.).
Opio. . . . . gß (25 mil.).
Goma arábiga. . . . . gxviij (4 gr.).
Azúcar. . . . . 3ij (8 gr.).

Divídase en seis papeles.

I. Coqueluche. *D.* Un papel cada tres horas.

7076. P. CONTRA LA COREA (*Bouneau*).

℞ Hierro porfirizado. . giij (10 cent.).
Extracto de opio. gi, á gß (1 á 2 cent.).
Extracto seco de quina. giv (2 dec.).

H. S. A. una toma.

I. Corea de los niños. *D.* Una toma mañana y noche, y se aumenta progresivamente la dosis de hierro y opio.

7077. P. CONTRA EL CRUP.

℞ Regaliz en polvo,
Extr. de belladona, ãã. giij (1 dec.).
Polvos de Dower. . . . giv (2 dec.).
Azúcar blanca. . . . . 3iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles.

D. Dos á cuatro papeles al dia segun las circunstancias.

7078. P. CONTRA EL CRUP (*Weber*).

℞ Calomelanos. . . . . gj (5 cent.).
Magnesia calcinada. gvj (30 cent.).
Azúcar. . . . . gxij (60 cent.).

M. D. Se toma en dos veces con media hora de intervalo. Algunas veces se necesitan quince á diez y seis dosis.

7079. P. CONTRA LA DENTERA.

℞ Subcarbonato de cal,
ó Magnesia,
Azúcar y tierra aluminosa, ãã. p. ig.

I. En fricciones ligeras en los dientes por medio de un cepillo.

7080. P. CONTRA LAS DIARREAS CRÓNICAS (*J. P. Frank*).

℞ Ipecacuana en polvo. . giij (4 dec.).
Azúcar. . . . . 5j (4 gr.)
en la que se echará
Aceite destilado de nuez moscada. . . . . 2 gotas.

Mézclese exactamente y divídase en cuatro dosis iguales.

D. Las cuatro dosis en las veinticuatro horas, y cada una en medio vaso de agua azucarada, y se tomará durante quince ó veinte dias.

7081. P. CONTRA EL ENGROSAMIENTO DE LA CÓRNEA (*Graefe*).

℞ Precipitado rojo,
Agárico blanco, ää. . . . 5ß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℥j (30 gr.).
Mézclese sobre un pórfido.

I. Se administra este polvo por insuflacion.

7082. P. CONTRA LOS ENTUERTOS DE LAS RECIEN PARIDAS.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . ℊij (10 cent.).
Canela en polvo. . . . ℊj (5 cent.).

D. Esta dosis cada cuarto de hora. Generalmente bastan tres ó cuatro dosis, y rara vez hay que usar hasta ocho ó diez.

7083. P. CONTRA LA EPILEPSIA (*Chaberly*).

NÚMERO 1.

℞ Polvo de Guteta. . . . ℥v (150 gr.).
Valeriana en polvo. . . ℥jß (45 gr.).
Mézclese y divídase en papeles de ℊxviij ó ℊxxxvj (1 ó 2 gr.).

NÚMERO 2.

℞ Polvo de Carignan,
Valeriana en polvo, ää. ℥jß (45 gr.).
Divídase en papeles de ℊxviij á ℊxxxvj (1 á 2 gr.).

Chaberly le administra del modo siguiente: da mañana y noche una infusion de hojas de naranjo endulzada con una cucharada de jarabe de valeriana; el dia antes de la luna nueva hace tomar por la mañana en ayunas ℊxviij (1 gr.) de polvo de Carignan ó de Guteta en una taza de infusion de tilo, azucarada con jarabe de valeriana. Por la noche y á los dos dias siguientes las mismas dosis. Obra del mismo modo durante el pleniluvio, y da las dos dosis el dia antes, el mismo dia y al siguiente de esta fase de la luna. Así se toman al mes doce papeles de la mezcla de Carignan, y en los demás dias se administra el jarabe de valeriana. Se continúa este mismo tratamiento durante cinco á seis meses, y despues se suspende el uso de los polvos antiperiódicos usando solo el jarabe de valeriana.

7084. *Otro* (HUFELAND).

℞ Oxido de zinc. . . . . ℊvj (30 cent.).
Extracto de beleño,
Aceite de valer., ää. ℊj (5 cent.).
Valeriana. . . . . ʒß (2 gr.).
Divídase S. A. en nueve papeles.

D. Tres al dia.

7085. *Otro* (PITSCHAFT).

℞ Cinabrio,
Magisterio de bismuto,
Tabaco, ää. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Acibar. . . . . ℊv (25 cent.).
Divídase S. A. en veinte papeles.

D. Un papel mañana y noche.

7086. *Otro* (KAHLEISS).

℞ Raiz de artemisa. . . ℥ij (60 gr.).
Agua. . . . . ℔ß (250 gr.).
Se hierve, se reduce la cuarta parte, se cuela y se añade:
Nitrato de plata fund. ℊx (50 cent.).
Se separa el precipitado despues de la filtracion, se seca y se mezcla con
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Divídase en sesenta papeles.

D. Uno, mañana y noche.

7087. *Otro* (ROSENTHAL).

℞ Haba de S. Ignacio en polvo. . . . . ℊx (30 cent.).
Ipecacuana en polvo. ℊv (25 cent.).
Cáscara de naranja en polvo,
Carbon. de magn., ää. ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de menta pip. ℊjv (20 cent.).

D. Dos cucharadas de café en la intermitencia de los accesos.

7088. P. CONTRA LA EPILEPSIA.

℞ Oxido de bismuto. . gxij (60 cent.).
Carbon. de amoniaco. gvj (30 cent.).
Opio. . . . . giij (15 cent.).
Oleosác. de valerian. 5j (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Epilepsia, corea, gastralgia, histérico. *D.* Dos papeles mañana y noche.

7089. P. CONTRA LA EPILEPSIA *ó Polvo de Ragolo.*

℞ Valeriana. . . . . 5ß (2 gr.).
Sal amoniaco,
Magnesia,
Aceite de cajeput, ãã. gjv (2 dec.).
H. S. A. polvo para una dosis.
I. Epilepsia. *D.* Una á tres tomas al dia. Este remedio ha tenido mucha aceptacion en Alemania.

7090. P. CONTRA EL ERETISMO DE LOS NERVIOS DEL ESTÓMAGO (*Wendt*).

℞ Magisterio de bismuto. gxviij (1 gr.).
Magnesia blanca. . . . 5ß (2 gr.).
Oleosácaro de anis. . 5j (4 gr.).
H. S. A. un polvo que se divide en nueve tomas iguales. *D.* Cuatro tomas al dia.
Nota. Si la enfermedad es pertinaz y el enfermo ha hecho uso largo tiempo de este polvo, se le puede añadir por cada toma g½ (1 cent.) de polvo de ipecacuana.

7091. P. CONTRA LA ESPERMATORREA *ó pérdidas seminales.*

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . gj ½ (6 cent.).
Alcanfor en polvo. . g½ (3 cent.).
D. Se administra esta dosis mañana y noche en una cucharada de jarabe ó de miel ó en una píldora.

7092. P. CONTRA LOS ESPASMOS (*Brachet*).

℞ Oxido de zinc en polvo,
Beleño, ãã. . . . . gij (1 dec.).
I. Espasmos y convulsiones de los niños. *D.* En una cucharada de tisana.

7093. P. CONTRAESTIMULANTE.

℞ Calomelanos. . . . . gxviij (1 gr.).
Nitrato de potasa. . . gxc (5 gr.).
Divídase en nueve papeles.
D. Se da uno cada dos horas en el hidrocéfalo agudo y en otras muchas enfermedades esténicas. Algunos pretenden que el nitro se opone á la salivacion.

7094. P. CONTRA LAS FLATUOSIDADES (*Heim*).

℞ Hojas de sen,
Menta piperita, ãã. . 5ij (24 dec.).
Semillas de cilantro. 5ß (15 gr.).
H. S. A. polvo.
D. Una cucharada de café, tres veces al dia.

7095. *Otro* (SANTOLI).

℞ Almizcle. . . . . gvj (3 dec.).
Goma amoniaco. . . . gxij (6 dec.).
M. I. Timpanitis, flatuosidades. *D.* En tres dosis al dia.

7096. P. CONTRA LA GASTRALGIA (H. DE M.).

℞ Oxido de bismuto. . . . gjv (2 dec.).
Carbonato de magnesia,
Azúcar, ãã. . . . . 5ij (24 dec.).
M. D. En cuatro veces.

7097. P. CONTRA LA GASTRALGIA *ó Tomas contra la gastralgia* (SZERLECKI).

℞ Salnitrato de bismuto,
Extr. de beleño, ãã. gj (3 cent.).

Nuez vómica en polv. gr½ (1 cent.).
Castóreo. . . . . gij (15 cent.).
Azúcar. . . . . gx (50 cent.).
Mézclese y dividase en doce tomas.

D. Una toma cada tres horas.

7098. P. CONTRA LA GASTRODINIA (*Odier*).

℞ Oxido bl. de bismuto. gxc (5 gr.).
Magnesia en polvo,
Azúcar, ãã. . . . . ʒjß (48 gr.).
Dividase en cuatro papeles.

I. Gastralgia independiente de inflamacion.

7099. P. CONTRA LA GOTA SERENA.

℞ Pulsatila. . . . . ʒjv (16 gr.).
Valeriana silvestre. . . ʒjß (48 gr.).
Dividase en treinta y dos papeles iguales.

D. Uno mañana y noche en medio vaso de agua ó en otra bebida mas conveniente.

7100. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS (*Krimer*).

℞ Acetato de plomo. . . . gij (1 dec.).
Opio puro. . . . . gr½ (12 mil.).
Azúcar de leche. . . . gjv (2 dec.).

I. Metrorragias, sobre todo despues del parto. *D.* Se toma esta dosis cada dos horas, hasta seis veces.

7101. P. CONTRA LAS HEMORRAGIAS INTERNAS Y LAS EXCESIVAS.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . gx (50 cent.).
Badiana en polvo. . . gij (15 cent.).
Hágase polvo.

D. Se da esta dosis cada seis horas cuando la hemorragia es abundante; pero si es moderada bastan gjv á gvj (2 á 3 dec.).

7102. P. CONTRA LA HIDROPESIA.

℞ Nitro. . . . . ʒjv (16 gr.).
Escila en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Hágase polvo S. A. y divídase en doce papeles.

D. Dos al dia en un poco de agua, bebiendo despues un vaso de bebida diurética.

7103. P. CONTRA EL IMPÉTIGO (*Biett*).

℞ Azufre sublimado ó precipitado. . . . . ʒj (30 gr.).
Subcarbon. de potasa. . ʒß (15 gr.).

M. I. Impétigo crónico. *D.* gL á gLX (25 á 30 dec.) todas las mañanas en ayunas, en una taza de tisana de dulcamara.

7104. P. CONTRA LOS INFARTOS ESCROFULOSOS DEL CUELLO (*Boynet*).

℞ Sulfato de hierro en polvo,
Clorhid. de amon., ãã. gr.jv (3 gr.).
Fécula de patatas. . . ℔ß (250 gr.).

Se pone este polvo sobre un colchoncillo de lana, que se aplicará constantemente sobre las glándulas.

7105. P. CONTRA LA LARINGITIS MEMBRANOSA (*Mignot*).

℞ Tanino en polvo. ʒß á ʒijß (2 á 10 gr.)
Azúcar en polvo. . . . ʒijß (10 gr.)
Mézclese íntimamente.

I. Se insufla en la boca posterior.

7106. P. CONTRA LAS MANCHAS DE LA CÓRNEA (*Guepin*).

℞ Sulfato de cobre. . . . gxij (6 dec.).
Sulfato de morfina . . gjv (2 dec.).
Azúcar. . . . . ʒij (60 gr.).

I. Se introduce este polvo una vez al dia entre los párpados.

7107. P. CONTRA LA OZENA (*Trousseau*).

℞ Calomelanos,
Precipitado rojo. ãã. . ʒj (4 gr.).

Azúcar cande. . . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Ozena y afecciones herpéticas de las fosas nasales. *D.* Se toma por la nariz, cinco ó seis veces al dia.

7108. P. CONTRA LAS PALPITACIONES DEL CORAZON.

℞ Digital en polvo. . . . ɡviij (4 dec.).
Extr. gomoso de opio. ɡjv (2 dec.).
Azúcar con algunas gotas de esencia de menta piperita. . ʒj (30 gr.).

Mézclese y divídase en ocho á diez dosis iguales.

I. Palpitaciones del corazon por enfermedad orgánica ó neurosis. *D.* Una por la noche al acostarse en medio vaso de agua. Por la mañana en ayunas se beben, en cinco ó seis vasos, dos cuartillos de suero clarificado y nitrado, ó de tisana de grama ó regaliz nitrada.

7109. P. CONTRA LAS PÉRDIDAS SEMINALES (*Heim*).

℞ Licopodio. . . . . ʒjß (45 gr.).
Quasia amarga. . . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y hágase polvo.

D. Una cucharada de café mañana y noche.

7110. P. CONTRA LA PIROSIS (*Heim*).

℞ Raiz de jalapa. . . . . ɡvc (5 gr.)
Trébol de agua. . . . ʒij (8 gr.).
Carbon. . . . . ʒjß (15 gr.).

H. S. A. polvo.

D. Una cucharada de café mañana y noche.

7111. P. CONTRA EL PRURITO DE LA VULVA.

℞ Piedra calaminar. 1
Almidon. 1

Se espolvorean las partes enfermas.

7112. P. CONTRA LA RABIA.

℞ Hojas y tallos de cardo corredor,
Hojas y tallos de equio ó viborera comun,
Hojas y tallos de aliso espinoso,
Hojas y tallos de yerba gatera.

Se toman cantidades suficientes ó iguales de las hojas y tallos de estos vegetales para pulverizarlas, y se distribuyen en dosis de ʒj (12 dec.). Se toma un papel en un sorbo de vino mañana y noche por espacio de nueve dias.

Se deberán coger estas plantas cuando estando bien floridas empiezan á granar, lo que sucede en Julio respecto al cardo corredor y á la viborera comun, y en Agosto respecto á los otros dos. Del cardo corredor se toman con preferencia las raices y tambien el resto de la planta; y de las otras tres todo, á excepcion de las raices. Deben secarse á la sombra y pulverizarlas á partes iguales de cada planta, las que se guardan en un frasco bien tapado para hacer el uso conveniente. En cada toma la dosis es ʒj (12 dec.) para una persona, y ʒj (4 gr.) para los irracionales. Debe propinarse con el vehículo que se quiera. Se debe tomar á lo menos por espacio de nueve dias consecutivos, una toma por la mañana y otra por la tarde, sin que el mordido tenga que sujetarse á dieta, ni cambiar su régimen ordinario. Estos polvos son tan útiles, que en todos los casos de rabia bien marcada en que se han usado, han hecho desaparecer todos los fenómenos de una muerte inevitable. Han sido muy elogiados contra la rabia, y fueron ensayados con muy buen éxito en el hospital de Madrid. Tambien se han recomendado últimamente los polvos del almez.

7113. P. CONTRA LA RAQUITIS (*Temple*).

℞ Oxido negro de hierro,
Roibarbo, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ɡxviij (1 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno, mañana y noche.

7114. P. CONTRA LA RISA CONVULSIVA (*Usteinan*).

℞ Oxido de zinc. . . . . ℊxij (6 dec.).
Oleosácaro de cajeput. ʒij (8 gr.).

H. S. A. un polvo que se divide en doce tomas iguales.

D. Una toma de hora en hora.

7115. P. CONTRA LOS SABAÑONES, *ó Salvado de almendras contra los sabañones* (*Baudof*).

℞ Borato de sosa.	15
Alumbre.	2
Benjuí.	8
Mostaza en polvo.	60
Lirio.	45
Salvado.	45
Raspaduras de almendras. . . .	55
Esencia de cáscara de naranja. .	1
Esencia de bergamota.	1

M. I. Sabañones, grietas. *D.* Se pone una pulgarada en el hueco de la mano, se añade un poco de agua y se dan fricciones.

7116. P. CONTRA LA SALIVACION MERCURIAL.

℞ Sulfuro de potasa. . . . ℊxc (5 gr.).
Crémor de tártaro. . . . ʒß (15 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles, y cada uno contendrá ℊjv (2 dec.) de sulfuro.

I. Salivacion mercurial, gingibitis, estomacace. *D.* Un papel, dos veces al dia.

7117. *Otro*, n. 2.

℞ Azufre,
Cálamo aromático,
Azúcar, ãã. . . . . ℊxviij (1 gr.).

I. Tialismo. *D.* Se toman en media taza de limonada nítrica.

7118. P. CONTRA LAS VEGETACIONES (*Vidal de Cassis*).

℞ Alumbre. . . . . ʒß (2 gr.).
Sabina en polvo. . . . ℊxviij (1 gr.).

M. D. Se aplica á la vegetacion dos veces al dia. Si el glande está cubierto por el prepucio se le descubre y se aplica el polvo sobre la vegetacion; en los casos contrarios basta una simple cura, pues la secrecion de la mucosa fija al principio el polvo.

7119. P. CONTRA LAS VIRUELAS.

℞ Calomelanos,
Jalapa,
Azúcar, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Incubacion de las viruelas, helmintiasis, tenia. *D.* ℊiij (15 cent.) tres ó cuatro veces al dia.

7120. P. CONTRA LAS ÚLCERAS CANCEROSAS (*Rust*).

℞ Alcanfor,
Mirra, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Quina en polvo,
Alcanfor, ãã. . . . . ʒß (16 gr.).
Carbon vegetal. . . . ʒj (32 gr.).

Hágase polvo S. A.

I. Se usa para espolvorear y curar las úlceras cancerosas.

7121. P. CONTRA LAS ÚLCERAS DEL CUELLO DE LA MATRIZ (*Boinet*).

℞ Almidon en polvo. . . ʒv (150 gr.).
Sulfato de hierro en p. ℊxviij (1 gr.).
Sal amoniaco en polvo. ℊxviij (1 gr.).
Sabina en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. . . ℊxviij (1 gr.).

Mézclese exactamente.

D. Se aplica por medio de una porcion de hilas cubiertas de cerato. Se renovará la aplicacion cada dos dias.

7122. P. DE CONTRAYERBA.

℞ Contrayerba. . . . . ʒijß (10 gr.).
Conchas de ostras preparadas. . . . . ʒjx (36 gr.).

M. I. Debilidad del conducto digestivo, diarreas rebeldes. *D.* ℊx á ℊlx (5 á 30 dec.).

7123. P. CORDIAL.

2ª Canela.	16
Clavo.	2
Vainilla.	1
Azúcar.	96
Harina de arroz.	72

M. S. A. *I.* y *D.* Es un excelente estomacal y se administra á la dosis de ℊx á ℊxxx (5 á 15 dec.).

7124. P. DE CORAL ANODINO DE HELVETIUS, *ó Polvo de mirra y coral compuesto.*

2ª Mirra.	6
Cascarilla.	4
Canela aclavillada.	4
Coral rojo preparado.	2
Bol arménico preparado.	1
Opio pulverizado.	1

M. I. Es calmante, astringente y estomacal. *D.* De ℊviij á ℊxxjv (1 á 12 dec.).

7125. P. DE CORAL ROJO (F. F.).

2ª Coral rojo. . . . . c. s. q.

Se lava el coral entero en agua tibia, se pone á secar, se muele en el almirez y se pasa por un tamiz de seda. Se lava este polvo cuatro ó cinco veces con agua hirviendo, y se purifica estando húmedo, añadiendo si hubiese necesidad nueva porcion de agua. Se deslíe despues en agua, para separar por dilucion el polvo mas fino, volviendo el mas grueso al pórfido para continuar del mismo modo hasta que todo se haya reducido á polvo impalpable; se pone este á escurrir, se reduce á troci sos y se secan.

Del mismo modo se pulverizan los OJOS DE CANGREJOS y la MADRE DE PERLAS, y tambien sin previa lacion el CINABRIO, la PIEDRA CALAMINAR, la HEMATITIS y el SUCINO.

I. y *D.* V. t. I, pág. 163.

7126. P. CORNACHINOS, DE TRIBUS, *ó Polvos antimoniales de escamonea* (F. E. y F. F.).

2ª Escamonea de Alepo escogida.
Crémor de tartaro,
Antim. diaforético, ää. ℥jv (125 gr.).

Se reducen separadamente á un polvo muy sutil, y se mezclan.

I. Se usan como purgantes en las intermitentes, embarazos gástricos, hemiplegia, apoplejía, etc. *D.* De 5ß á 5j (2 á 4 gr.).

Nota. Cuando se prepara este polvo con el antimonio diaforético, para cuya elaboracion se ha economizado el nitro, y retiene protóxido de antimonio, sucede con el tiempo que los polvos cornachinos se vuelven eméticos porque se forma tartaro emético.

7127. P. DE CORNEZUELO (F. F.).

2ª Cornezuelo reciente. . . . . c. s. q.

Se pulveriza por trituracion y se pasa por un tamiz de seda.

El polvo de cornezuelo se altera con mucha facilidad, por lo que no se debe preparar sino en cortas porciones y conservarse en frascos bien tapados. Es preferible pulverizarle en el momento en que se pide y solo la cantidad necesaria. Con este objeto Charriere ha inventado un instrumento llamado esclerotribo, que el comadron debe llevar siempre consigo.

I. y *D.* V. t. I, p. 163 y 164.

7128. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO COMPUESTO (*Szerlecki de Mulhouse*).

2ª Cornezuelo de centeno,
Borato de sosa,
Oleosácaro de manzanilla, ää. . . . . ℊx (5 dec.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Parto retardado por inercia de la matriz. *D.* Un papel cada cuarto de hora.

7129. P. CORROBORANTE (*Werlhoff*).

2ª Quina en polvo. . . . . 5ß (2 gr.).

Canela en polvo. . . . . gvj (3 dec.).
Mézclese exactamente.

I. Convalecencia de las calenturas intermitentes. *D.* Se toma de una sola vez.

7130. P. COSMÉTICO JABONOSO PARA LAS MANOS.

℞ Jabon de España en polvo. . 720
Carbonato de potasa. 120
Castaño de Indias. 1440
Esencia de espliego. 4
Esencia de limon. 3
Esencia de clavo. 1
Esencia de bergamota. . . . 4
Azúcar. 30
M. S. A.

7131. P. COSMÉTICO PARA LAS MANOS *ó Pasta de almendras cosmética.*

℞ Harina de castaño de Indias. . 480
Almendras amargas. 360
Raiz de lirio. 30
Carbonato de potasa. 7
Esencia de bergamota. . . . 4
Mézclese.

7132. P. COSMÉTICO PARA LAS MANOS (*F. de Wirt*).

℞ Almend. dulces mondadas. . . . . lbß (250 gr.).
Harina de arroz. . . . ℥j (30 gr.).
Lirio de Florencia. . . ℥j (30 gr.).
Benjuí. . . . . ℥ij (8 gr.).
Esperma de ballena. ℥ij (8 gr.).
Sal de tártaro. . . . . ℥ij (8 gr.).
Esencia de palo de Rodas. . . . . 3 gotas.
Esencia de espliego. . 3 gotas.
Esencia de clavo. . . 3 gotas.
Háganse polvo.

7133. P. DE CRETA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Creta preparada. . . . lbß (250 gr.).
Canela,
Pimienta larga, ää. . ℥iv (125 gr.).
Raiz de tormentila,
Goma arábiga. ää. . . ℥iij (90 gr.).
Se pulveriza separadamente cada sustancia y se las mezcla despues exactamente.

I. Embarazo mucoso del estómago y diarrea con atonía. *D.* De gvj á gxij (3 á 6 dec.) tres veces al dia.

Añadiendo ℥iv (48 dec.) de opio puro en polvo á ℥vjß (195 gr.) de polvos de creta compuestos, se tiene el polvo de CRETA COMPUESTO CON OPIO DE LA F. DE L. Ó POLVOS DE CRETA OPIADOS.

7134. P. DE CRETA CON RUIBARBO (*Nicolai*).

℞ Polvo de creta comp. ℥j (12 dec.)
Polvo de ruibarbo. . gxv (75 cent.)
D. Se usa de una vez por la noche en el tratamiento de la pirosis y de la cardialgia.

7135. P. DE CUBEBAS (F. F.).

℞ Pimienta de cubebas. . . . . c. s. q.
Se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan las PIMIENTAS BLANCA, LARGA Y NEGRA, ANIS, CEBADILLA, SIMIENTE DE AMIOS y las demás simientes de las plantas umbeladas.

I. y *D.* V. t. I, p. 166.

7136. P. DENTÍFRICO.

℞ Ratania,
Quina, ää. . . . . ℥ß (15 gr.).
Sangre de drago,
Coral rojo, ää. . . . . ℥ij (8 gr.).
Aceite de clavo . . . . . 12 gotas.
M. S. A.

7137. *Otro*, n. 2.

℞ Hueso de jibia en polvo. 1
Quina en polvo. 1
Mirra en polvo. 1
Esencia de menta. . . . . c. s.
Mézclese.

7138. *Otro*, n. 3.

℞ Carbon en polvo. . . . ℥v (20 gr.).
Quina en polvo. . . . ℥x (40 gr.).

Azúcar en polvo. . . . ʒijß (10 gr.).
Mézclese sobre un pórfido.

7139. P. DENTÍFRICO.

℞ Cremor de tártaro. . ʒjx (36 gr.).
Bol arménico prepar. ʒvj (24 gr.).
Coral rojo porfirizado. ʒvj (24 gr.).
Hueso de jibia pulver. ʒvj (24 gr.).
Sangre de drago. . . ʒiij (12 gr.).
Canela porfirizada. . ʒjß (6 gr.).
Cochinilla en polvo. . ʒijß (3,2 gr.).
Clavo en polvo. . . . ℈xviij (1 gr.).
Mézclese exactamente.

D. Una pequeña cantidad para frotar los dientes.

Nota. Se emplea tambien este polvo bajo la forma de opiata con c. s. de un jarabe aromático.

7140. *Otro* (BALLY).

℞ Quina en polvo,
Magnesia calcinada,
Coral rojo prepar., ää. ʒß (15 gr.).
Canela. . . . . ʒij (24 dec.).
Se reducen S. A. á un polvo muy fino.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y blanquear los dientes.

7141. *Otro* (CHARLARD).

℞ Cremor de tártaro. . . ʒv (160 gr.).
Alumbre calcinado. . . ʒijß (10 gr.).
Cochinilla. . . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. un polvo fino, que se aromatizará con
Esencia de rosas. . . . 6 gotas.

I. La misma que el anterior.

7142. P. DENTÍFRICO *ó Polvo dentífrico negro* (*Chevalier*).

℞ Carbon polverizado. 1
Quina en polvo. 1
Mézclese. *Nota.* Se puede añadir á este polvo azucar y un aroma. En algunos formularios se pone carbon de pan en lugar del carbon vegetal.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y blanquear los dientes, y para desinfectar las encías saniosas ó caries dentaria.

El POLVO DENTÍFRICO DE RIGHINI se compone de cuatro partes de carbon de pan en polvo y una de quina calisaya.

7143. *Otro* (DESIRABODE).

℞ Coral rojo. . . . . ʒjv (125 gr.).
Sangre de drago. . . ʒj (30 gr.).
Carmin. . . . . ℔v (25 cent.).
Cáscara de limon. . . ℔xviij (1 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒß (15 gr.).
Blanquea los dientes y da un hermoso color rojo á los labios y las encías.

7144. *Otro* (DOCTOR REGNARD).

℞ Magnesia calcinada. ʒß (15 gr.).
Sulfato de quinina. . ℊjx (50 cent.).
Carmin fino,
ó Cochinilla. . . . . ʒß (2 gr.).
Esencia de menta pip. 3 gotas.

7145. *Otro* (F. F.).

℞ Bol de Armenia,
Coral rojo,
Huesos de jibia, ää. ʒiij (96 gr.).
Sangre de drago. . . ʒjß (48 gr.).
Cochinilla. . . . . ʒiij (12 gr.).
Crémor de tártaro. . ʒjvß (140 gr.).
Canela. . . . . ʒvj (24 gr.).
Clavo de especia. . . ʒj (4 gr.).
Se pulverizan separadamente las sustancias, y se mezclan en el pórfido.

Estos polvos tienen el inconveniente de que el bitartrato de potasa puede alterar el esmalte de los dientes por su exceso de ácido. Igual inconveniente tienen todos los polvos y electuarios dentífricos que contienen crémor de tártaro.

7146. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Quina en polvo. . . . ʒvj (24 gr.).
Sándalo rojo porfirizad. ʒij (8 gr.).
Aceite de clavo,
Aceite de bergamota, ää. 3 gotas.
Mézclese y hágase un polvo muy fino.

I. Relajacion escorbútica de las encías.

7147. P. DENTIFRICO (*Jamet*).

℞ Lirio de Florencia lavado en alcohol. . . 1bj (500 gr.).
Magnesia. . . . . ℥iv (125 gr.).
Piedra pomez. . . . . 3bß (250 gr.).
Hueso de jibia. . . . . 1bß (250 gr.).
Sulfato de quinina. . . ℥jv (125 gr.).
Cascarilla. . . . . ℥j (32 gr.).
Azúcar de leche. . . . 1bj (500 gr.).
Esencia de yerbab. ℥j y 5ß (34 gr.).
Esencia de canela. . . 5ij (8 gr.).
Esencia de neroli. . . 5j (4 gr.).
Tintura de ambar. . . 5j (4 gr.).
H. S. A. un polvo muy fino.

7148. *Otro* (KEMERER).

℞ Hollin de leña en polvo. ℥j (32 gr.).
Fresa en polvo. . . . . 5v (20 gr.).
Agua de Colonia. . . . . algunas got.
Segun su autor este polvo blanquea y conserva muy bien los dientes.

7149. *Otro* (LEFOULON).

℞ Cochearia. 1
Rábano silvestre. 1
Guayaco. 1
Quina. 1
Yerbabuena. 1
Pelitre. 1
Cálamo aromático. 1
Redúzcase á un polvo impalpable. Cuando los enfermos están afectados de gastralgia, Lefoulon asocia á este polvo un poco de magnesia calcinada.

7150. *Otro* (MAURY).

℞ Carbon de leña. . . . 1bß (250 gr.).
Quina. . . . . ℥iv (125 gr.).
Azúcar. . . . . 1bß (250 gr.).
Esencia de menta. . . ℥ß (16 gr.).
Esencia de canela. . . 5ij (8 gr.).
Tintura de ambar. . . 5ß (2 gr.).
H. S. A. un polvo muy fino.
Mézclese.

7151. *Otro* (TOIRAC).

℞ Carbonato de cal. . . . 5j (4 gr.).
Magnesia. . . . . 5ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . ℥j (4 gr.).
Crémor de tártaro. . . . 9j (12 dec.).
Esencia de menta. . . . 1 gota.
Es el que con mas frecuencia usa Toirac.

7152. *Otro* (TOIRAC).

℞ Carbon. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Magnesia. . . . . ℊxc (3 gr.).
Quina. . . . . ℊxc (3 gr.).
Crémor de tártaro. . . ℊxv (3 gr.).
Esencia de menta. . . 1 gota.
M. I. Estomatitis, estomacace, odontalgias. *D.* En fricciones ó aplicaciones á los dientes y encias.

7153. P. DENTÍFRICO ACIDO (*Deschamps*).

℞ Talco de Venecia. . . ℥iv (125 gr.).
Crémor de tártaro. . . ℥j (32 gr.).
Carmin. . . . . ℊvj (3 dec.).
Esencia de menta. . . 15 gotas.
Mézclese.

7154. *Otro* (DESFORGES).

℞ Coral porfirizado. . . . ℥v (150 gr.).
Crémor de tártaro en p. ℥j (30 gr.).
Hueso de jibia. . . . . 5v (20 gr.).
Cochinilla. . . . . ℊvj (3 dec.).
Miel de Narbona. ℥v y ℥ijß (170 gr.).
Mézclese.

7155. P. DENTÍFRICO ALCALINO (*Deschamps*).

℞ Talco de Venecia. . . ℥iv (125 gr.).
Bicarbonato de sosa. . ℥j (30 gr.).
Carmin. . . . . ℊvj (3 dec.).
Esencia de yerbabuen. 15 gotas.
Mézclese.

7156. P. DENTÍFRICO ALCANFORADO.

℞ Lirio de Florencia. . . 5ß (15 gr.).
Hueso de jibia. . . . . 5ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.).
Alcohol de 88°. . . . . algunas gotas.
Mézclese.

7157. P. DENTÍFRICO ANTIESCORBÚTICO.

℞ Ratania,
Quina,
Carbon, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Sangre de drago,
Coral rojo, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de clavo,
Bálsamo del Perú, ãã. ℈ß (6 dec.).
M. I. Reblandecimiento de las encías, odontalgia, estomacace, escorbuto. *D. C. s.* como dentífrico.

7158. *Otro*, n. 2.

℞ Extracto de ratania. . . ʒß (16 gr.).
Carbon vegetal. . . . . ʒij (64 gr.).
Canela,
Clavo, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Se reducen todas las sustancias á un polvo impalpable y se mezclan.

7159. *Otro* (F. M.).

℞ Raiz de pelitre,
Corteza de Winter,
Macis, ãã. . . . . ʒiij (12 gr.).
Alumbre calcinado,
Catecú, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Se reducen á polvos muy finos y se hace una pasta con c. s. de miel rosada.

7160. P. DENTÍFRICO DESCOLORANTE (*Magendie*).

℞ Cloruro de cal seco. . . ℊjv (2 dec.).
Coral rojo. . . . . ʒij (8 gr.).
M. I. y *D.* Se humedece ligeramente un cepillo nuevo, se le empapa en el polvo dentífrico y se frotan con él los dientes. Se usa para volver su blancura natural á los dientes amarillos.

7161. P. DENTÍFRICO DESINFECTANTE.

℞ Cloruro de cal seco. 1
Talco de Venecia. 40
Mézclese.

7162. P. DENTÍFRICO DETERSIVO.

℞ Carbon en polvo. . . . ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. . . . . ʒiij (12 gr.).
Esencia de rosas. . . . 2 gotas.
H. S. H.

7163. *Otro*, n. 2.

℞ Canela. . . . . ʒvj (24 gr.).
Hueso de jibia. . . . . ʒj (32 gr.).
Carbon en polvo. . . . ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. . . . . ʒß (16 gr.).
Se aromatiza con cualquier esencia.

7164. P. DENTÍFRICO INGLÉS.

℞ Creta seca. 3
Alcanfor. 1
Mézclese y guárdese en un frasco bien tapado.

7165. P. DENTÍFRICO CON MIRRA.

℞ Crémor de tártaro. . . ʒjv (125 gr.).
Lirio. . . . . ʒij (60 gr.).
Mirra. . . . . ʒj (30 gr.).
Sangre de drago. . . . ʒj (30 gr.).
Esencia de clavo. . . . ʒß (2 gr.).
M. S. A.

7166. P. DENTÍFRICO PERUVIANO (*Poisson*).

℞ Azúcar. . . . . ʒß (2 gr.).
Magnesia. . . . . ʒj (4 gr.).
Almidon. . . . . ʒj (4 gr.).
Canela. . . . . ℊvj (3 dec.).
Macis. . . . . ℊij (1 dec.).
Crémor de tártaro. . ʒj (4 gr.).
Sulfato de quinina. . ℊiij (15 cent.).
Carmin. . . . . ℊv (25 cent.).
Esencia de rosas,
Esencia de menta, ãã. 4 gotas.

7167. P. DENTÍFRICO CON TANINO (*Mialhe*).

℞ Azúcar de leche. . . lbij (1000 gr.).
Laca carminada. . . ʒijß (10 gr.).
Tanino puro. . . . . ʒß (15 gr.).

Esencia de menta. . 20 gotas.
Esencia de anis. . . . 20 gotas.
Esencia de flor de naranjo. . . . . 10 gotas.
H. S. A.

El uso diario de este polvo impide la acumulacion del tártaro y fortifica las encías. Si no bastase se usa el elixir dentífrico astringente. V. D. 1663.

7168. P. DENTÍFRICO TÓNICO.

℞ Canela. . . . . ℥j (30 gr.).
Quina en polvo. . . . ℥j (30 gr.).
Lirio en polvo. . . . . ʒß (15 gr.).
H. S. A.

7169. P. DENTÍFRICO DE SANGRE DRAGO *ó Dentífrico seco* (F. E.).

℞ Crémor de tártaro,
Sangre de drago,
Cuerno de ciervo preparado, ãã. . . . . ʒß (16 gr.).
Raiz de lirio de Florenc. ʒij (8 gr.).

Se pulverizan sutilísimamente y se añade:

Polvos de clavo. . . . ʒj (4 gr.).
Polvos de cochinilla. . . ℈ß (6 dec.).

I. La misma que los anteriores.

Estos polvos atacan al esmalte de los dientes por el exceso de ácido del crémor de tártaro que contienen; por consiguiente cuando solo se quiere usar sustancias para limpiar los dientes, se elegirán los que solo obren mecánicamente. Así se asocia, por ejemplo, los polvos de quina y carbon aromatizado con aceite esencial de menta.

7170. P. DENTÍFRICO DE SULFATO DE QUININA (*Pelletier*).

℞ Coral preparado. . . . ʒj (30 gr.).
Laca carminada. . . . ℊviij (4 dec.).
Sulfato de quinina. . . ℊjv (2 dec.).
Esencia de yerbabuen. 2 gotas.

H. S. A. *D.* C. s. para limpiar los dientes con un cepillo mojado.

7171. P. DEPURATIVO (*Jahn*).

℞ Pensamiento silvestre en polvo,
Azúcar de leche, ãã. . ʒiij (12 gr.).
Magisterio de azufre,
Carbon. de magnesia, ãã. ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Enfermedades crónicas de la piel en general, y costra láctea en particular. *D.* Una cucharada de café, cada tres ó cuatro horas.

7172. P. DEPURATIVO (*Jaser*).

℞ Sulfuro de antimonio en polvo,
Flores de azufre,
Nitro,
Lirio, ãã. . . . . ℊvj (3 dec.).

Se hace un polvo fino.

I. Enfermedades de la piel. *D.* Se da esta dosis mañana y noche en medio vaso de agua azucarada ó mejor en un poco de miel.

7173. P. DETERSIVO (*Vogt*).

℞ Acíbar,
Mirra, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Carbon . . . . . ʒiß (15 gr.).

M. I. Úlceras atónicas fétidas.

7174. P. DESINFECTANTE.

℞ Sulfato de hierro. . Ibcn (200 kil.).
Sulfato de zinc. . . ʒijß (10 gr.).
Carbon vegetal. . . ʒijß (10 gr.).
Sulfato de cal. . . . ʒviijß (266 gr.).
Agua. . . . . C. S.

para hacer pasta.

I. Sirve para desinfectar las materias fecales.

Ciento cincuenta kilógramos bastan para desinfectar mil metros de sumidero.

7175. *Otro* (MEYER).

℞ Carbon en polvo. 1
Quina en polvo. 1
Mirra en polvo. 1

M. I. Sirve para destruir el olor fétido de la ozena. Se toma del mismo modo que el tabaco rapé.

7176. P. DIAFORÉTICO.

℞ Resina de guayaco,
Nitro, ãã. . . . . ℊvj (8 gr.).
Ipecacuana. . . . . ℊiij (15 cent.).

Opio. . . . . ḡij (10 cent.).
H. S. A. seis papeles.
I. Reumatismo, dolores osteocopos. *D.* Un papel cada tres horas.

7177. *Otro*, n. 2.

℞ Nitro. . . . . 3j (4 gr.).
Tártaro emético. . . ḡj (5 cent.).
Calomelanos. . . . . gvj (30 cent.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Uno cada dos horas, en jarabe.

7178. *Otro*, n. 3.

℞ Flores de azufre. . . . 3ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . 9j (12 dec.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Uno ó dos al dia en una taza de té.

7179. *Otro* (RICHTER).

℞ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos al vapor,
Escila en polvo,
Opio purificado, ãã. . gviij (4 dec.).
Azúcar blanca. . . . 3j (4 gr.).
Divídase en ocho dosis.
I. Hidrotorax. *D.* Una dosis mañana y noche.

7180. *Otro* (TIBAER).

℞ Sulfuro de antimonio,
Alcanfor, ãã. gij á ḡjv (1 á 2 dec.).
Nitro. . . . . 5ß á 3j (2 á 4 gr.).
Goma arábiga,
Azúcar, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Pericneumonía, cuando ha pasado la fiebre fuerte. *D.* Un papel cada dos horas.

7181. P. DIAROMATON INGLÉS.

℞ Canela. . . . . 3ij (60 gr.).
Semillas de cardamomo,
Raiz de gengibre,
Nuez moscada, ãã. . . 3j (30 gr.).
H. S. A. *I.* Dispepsia sin calor, flatuosidades, eructos y astenia. *D.* De gv á gxx (25 á 100 cent.).

7182. P. DIGESTIVO.

℞ Azafran de Marte. . . . 3ß (15 gr.).
Azúcar. . . . . 3j (30 gr.).
Oleosácaro de anís. . . 3ij (7,5 gr.).
M. I. Atonía de los órganos digestivos. *D.* Dos á cuatro cucharadas de café al dia.

7183. *Otro* (KLEIN).

℞ Tartrato de potasa. . . 5iij (12 gr.).
Ruibarbo. . . . . 3j (4 gr.).
Magisterio de azufre. . 9ij (24 dec.).
Cáscara de naranjas,
Magnesia, ãã. . . . . 3jß (6 gr.).
D. Una cucharada de café tres veces al dia, en las obstrucciones de la vena porta.

7184. P. DIGESTIVO SIMPLE *ó Polvo de canela azucarado* (*Duc*).

℞ Canela en polvo. . . . 3j (30 gr.).
Azúcar. . . . . lbj (500 gr.).
M. Se dan 5ij á 5iij (8 á 12 gr.) al tiempo de ir á comer, como estomacal, tónico y excitante.

7185. P. DIGESTIVO COMPUESTO.

℞ Sulfato de potasa. . . . 3jv (16 gr.).
Ruibarbo. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en diez papeles.
D. Uno ó dos al dia.

7186. P. DIGESTIVO COMPUESTO (*Lemery*).

℞ Frutos de anís,
Frutos de cilantro,
Frutos de hinojo, ãã. 5iij (12 gr.).
Corteza de naranja amarga,
Corteza de limones,
Canela fina, ãã. . . . ḡrjv (3 gr.).
Clavo de especia,
Ruibarbo, ãã. . . . ḡxviij (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . 3ij (64 gr.).
Se pulverizan todas las drogas juntas á excepcion del azúcar, que se mezcla despues con el polvo compuesto.

7187. P. DE DIGITAL (F. F.).

℞ Hojas de digital purpúrea. . c. s. q.

Se secan en la estufa y se pulverizan por contusion hasta obtener las tres cuartas partes del peso total.

I. V. tomo I, pág. 172.

Del mismo modo se pulverizan las hojas de ACÓNITO, BELEÑO, BELLADONA, NARANJO y SEN, y casi todas las demás hojas.

7188. P. DE DIGITAL COMPUESTO.

℞ Hojas de digital. . . 5ß (2 gr.).
Protoclor. de merc. ℈jx (50 cent.).
Valeriana,
Asa fétida,
Castóreo, ãã. . . . . 5ß (2 gr.).
Azúcar cande. . . . . 3j (4 gr.).

Divídase en doce papeles.

I. Neumonía, asma, hidrocéfalo. *D.* Un papel mañana y noche.

7189. P. DE DIGITAL (H. M. DE PRUSIA).

℞ Digital. . . . . ℈ij (10 cent.).
Cálamo aromático. . ℈v (25 cent.).
Azúcar blanca. . . . ʒß (6 dec.).

Mézclese y divídase en dos papeles.

D. En el dia.

7190. P. DIURÉTICO.

℞ Digital. . . . . ℈xv (75 cent.).
Nitrato de potasa. . 3iij (12 gr.).
Crémor de tártaro. . 3jv (16 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno cada dos horas.

7191. *Otro* (BRERA).

℞ Hojas de digital. . . ℈j ½ (6 cent.).
Oxid. negro de mang. ℈jv (2 dec.).
Regaliz. . . . . ʒß (6 dec.).

Divídase S. A. en seis papeles.

I. Hidropesía complicada con clorosis. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7192. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Cantáridas. . . . . ℈jv (2 dec.).
Alcanfor. . . . . ℈viij (4 dec.).
Azúcar de leche. . . . 3iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno cada dos ó tres horas.

7193. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Enebro tostado. 1
Azúcar blanca. 1

M. D. A cucharadas de café cada dos horas.

7194. *Otro* (H. DE ING.).

℞ Cebolla albarrana. . . . ʒj (12 dec.).
Opio. . . . . ℈jv (2 dec.).
Canela. . . . . 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles. Cada papel contiene ℈iij (15 cent.) de cebolla albarrana.

I. Hidropesías. *D.* Dos papeles al dia.

7195. *Otro* (OSIANDER).

℞ Escila. . . . . ℈ij (1 dec.).
Digital. . . . . ℈x (5 dec.).
Crémor de tártaro. . . . 5ß (2 gr.).

D. Se toma en tres tomas en el dia.

7196. *Otro* (SZERLECKI).

℞ Digital en polvo,
Cebolla alb. en p., ãã. ℈xviij (1 gr.).
Oleosácaro de enebro. 3ijß (10 gr.).

Mézclese y divídase en doce dosis.

I. Hidropesías pasivas. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7197. P. DIURÉTICO ATEMPERANTE.

℞ Crémor de tártaro,
Nitro, ãã. . . . . 5ij (8 gr.)
Azúcar de leche,
Goma,
Azúcar, ãã. . . . . ʒij (64 gr.)

Se divide en ocho papeles. Se

disuelve cada papel en dos cuartillos de agua.

7198. P. DIURÉTICO *ó Tisana seca* (F. F.).

℞ Nitrato de potasa en polvo,
Malvabisco en polvo, ãã. ℥j (32 gr.).
Goma arábiga,
Azúcar, ãã. . . . . ℥ij (64 gr.).

I. Es diurético y se usa principalmente en el tratamiento de las gonorreas. *D.* Una cucharada de café en un vaso de agua.

En el dia rara vez se usa y generalmente se prefiere el nitro solo.

7199. P. DIURÉTICO OPIADO (*Rust*).

℞ Digital en polvo. . . ℊxij (6 dec.).
Opio purificado. . . . ℊiij (15 cent.).
Crémor de tártaro. . ℥j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (8 gr.)

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Hidropesías. *D.* Tres ó cuatro papeles al dia.

7200. P. DIURÉTICO RESOLUTIVO (*Kreysig*).

℞ Calomelanos. . . . . ℊxvj (8 dec.).
Quermes mineral. . . ℊiv (2 dec.).
Nitro. . . . . ℥j y ℊviij (4,40 gr.).
Magnesia,
Azúcar, ãã. . . . . ℈v (6,60 gr.).

Divídase en ocho dosis.

I. Carditis. *D.* Una dosis cada dos horas.

7201. P. DEL DOCTOR ODIER.

℞ Magnesia calcinada,
Azúcar, ãã. . . . . ℥x (40 gr.).
Óxido de bismuto. . . . ℥j (4 gr.).

Divídase S. A. en papeles de á ℊxx (10 dec.).

I. Gastrodinia y dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

7202. P. DE DOWER *ó Polvos de ipecacuana con opio* (F. E.).

℞ Sulfato de potasa. . . . ℥j (32 gr.).
Nitrato de potasa. . . ℥jß (48 gr.).
Raiz de ipecacuana,
Opio, ãã. . . . . ℥ij (8 gr.).

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan todos en un almirez de piedra.

LOS POLVOS DE DOWER DE LOS H. DE M. tienen la misma composicion.

Nota. Cada escrúpulo (12 dec.) contiene ℊij (1 dec.) de opio.

I. Afecciones asmáticas; son expectorantes, diaforéticos y algo calmantes, y se aconsejan en los catarros y principalmente en las afecciones reumáticas. Tambien se los puede prescribir en las sífilis como sudoríficos. *D.* ℈ß á ℈j (6 á 12 dec.).

7203. P. DE DOWER (F. F. Y F. P.).

℞ Polvo de sulfato de potasa,
Polvo de nitrato de potasa, ãã. . . . . ℥jv (125 gr.).
Polvo de ipecacuana,
Polvo de regaliz,
Polvo de extracto seco de opio, ãã. . . . ℥j (32 gr.).

Se mezclan exactamente despues de secarlos bien en la estufa.

I. Diarreas, afecciones pulmonares, bronquitis, carditis, cólera, gota, reumatismo crónico, albuminuria, catarata, isquidrosis, tos, afecciones catarrales, fiebres, reumatismo. *D.* ℊv á ℊvj (25 á 30 cent.) y aun mas al dia.

LOS POLVOS DE DOWER DE LOS H. M. se diferencian de los anteriores en la cantidad de los componentes, pues entran dos partes de sulfato de potasa, otras dos de nitrato de potasa, una de opio pulverizado, otra de ipecacuana pulverizada y dos de polvos de regaliz. D. De ℊx á ℊxx (5 á 10 dec.) en una tisana diaforética tibia.

7204. P. DE DUPUYTREN CONTRA LOS HERPES FAGEDÉNICOS Ó CORROSIVOS.

Convencido Dupuytren de la ineficacia de los remedios antiherpéticos, antiescrofulosos, antivené-

reos y demás empleados contra esta cruel enfermedad, propuso los polvos siguientes:

℞ Calomelanos impalpables. . . 199
Acido arsenioso. 1

Este remedio, que obra mas bien como específico que como cáustico, se puede emplear de diferentes modos.

Si la superficie del herpes está ulcerada, húmeda y limpia, se la espolvorea por medio de una borrita cargada del polvo indicado, de modo que se le cubra con una capa del grosor de media á una línea.

Si la superficie está cubierta de costras, se las hace caer por medio de cataplasmas y se la espolvorea despues como acabamos de decir. Por último si el herpes está cubierto de una cicatriz imperfecta es necesario destruirla y se espolvorea veinticuatro horas despues la superficie, que para entonces ya ha dejado de dar sangre.

Si se teme que el polvo no se adhiera bastante á las partes y que pueda caerse, se le diluye en agua de goma ó se le incorpora con ungüento rosado. En este caso se debe aumentar una ó dos décimas partes la dosis del ácido arsenioso.

En todos estos casos se debe aguardar á que el polvo ó la pomada se caigan por sí mismos, lo que sucede comunmente á los ocho ó diez dias, y se renuevan las aplicaciones hasta la completa curacion, la cual se verifica mas comunmente al cabo de ocho á diez semanas ó despues de cinco ó seis aplicaciones. Se concibe bien que un práctico instruido puede aumentar ó disminuir las proporciones de los elementos constituyentes del remedio, segun la extension y la profundidad del mal; pero parece importante no excluir á ninguno de los que entran en su composicion. Los dos parecen necesarios á su accion, sin que pueda determinarse de un modo preciso la parte que cada uno toma en ella. Véase núm. 6947.

7205. P. ECEFRÁCTICO.

℞ Vitriolo verde. . . . . ʒv (25 cent.).
Gengib. ʒxij á ʒxx (6 dec. á 1 gr.).
M. I. Amenorrea, clorosis, leucorrea, dispepsía. *D.* En dos veces al dia.

7206. *Otro* (SELLE).

℞ Carbonato de magnesia,
Tártaro depurado,
Raiz de ruibarbo,
Flor de manzanilla,
Eleosácaro de hinojo,
Azufre depurado, ãã. . . ʒij (8 gr.).
Mézclese y hágase polvo.
I. Obstrucciones de las vísceras abdominales, hipocondría, sobre todo cuando hay plétora abdominal. *D.* Una cucharada de café tres veces al dia.

7207. P. DE ELATERINA (*Bright*).

℞ Elaterina. . . . . ʒjv (2 dec.).
Crémor de tártaro. . . ʒx (40 gr.).
Divídase en sesenta y cuatro papeles.
I. Enfermedad de Bright. *D.* Un papel cada dos ó tres horas segun el efecto. Este polvo debe producir deposiciones abundantes líquidas sin dolores ni cólicos.

7208. P. DE ELATERIO COMPUESTO (*Bright*).

℞ Extracto de elaterio. . ʒjv (2 dec.).
Tartrato de potasa. . . ʒxx (5 gr.).
Gengibre. . . . . ʒxviij (1 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
I. Enfermedad de Bright. Precede á su uso el reposo en la cama, purgantes diaforéticos y diuréticos comunes, tales como la jalapa, el acetato de amoniaco,

el vino emético, el nitro, etc. *D.* ℊv á ℊxv (25 á 100 cent.). Treinta granos (15 dec.) contienen ℊj (5 cent.) de elaterio.

7209. P. EMENAGOGO.

℞ Polvo de sabina,
Polvo de gengibre, ää. ʒj (4 gr.).
Azúcar con vainilla. . . ʒj (32 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Se tomará uno ó dos al dia.

7210. *Otro* (BERENDS).

℞ Sal amoniaco. . . . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊvij (35 cent.).
Flores de arnica. . . ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . ʒvß (22 gr.).
I. Se puede usar tambien en los catarros crónicos. *D.* Una cucharada de café tres ó cuatro veces al dia.

7211. *Otro* (H. DE IT.).

℞ Limaduras de hierro. . ℊxviij (1 gr.).
Acíbar sucotrino. . . . ℊvj (3 dec.).
Magnesia calcinada. . ʒjß (6 gr.).
Mézclese y divídase en tres papeles.
I. Amenorrea atónica. *D.* Un papel cada cuatro horas.

7212. P. EMÉTICO (H. M.).

℞ Ipecacuana en polvo. . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales.
I. Embarazo gástrico. *D.* Un papel cada media hora hasta producir el vómitos.

7213. *Otro* (H. DE M.).

℞ Raiz de ipecacuana en p. ℈j (12 dec.).
Tártaro emético. . . . . ℊj (5 cent.).
M. D. ʒß á ℈j 4 á (12 dec.).

7214. P. EMETO-CATÁRTICO.

℞ Ipecacuana en polvo. . . ʒj (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒij (8 gr.).
M. D. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).

7215. P. DE ÉNULA (H. DE AL.).

℞ Raiz de énula campan. ʒj (4 gr.).
Raiz de angélica. . . . ℊxij (6 dec.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles.
I. Catarros pulmonares crónicos, dispepsia, etc. *D.* Un papel cada tres horas.

7216. P. ERRINO (*Griffith*).

℞ Alumbre,
Bol arménico, ää. . . . ʒj (4 gr.).
Sangre de drago. . . . ʒß (2 gr.).
Oxido rojo de hierro. . . ʒij (8 gr.).
M. I. Epistaxis.

7217. *Otro* (VOGT).

℞ Alumbre. . . . . ℊv (25 cent.).
Extracto de ratania,
Corteza de encina, ää. ʒj (4 gr.).
M. I. Atonía de la mucosa nasal.

7218. P. ERRINO ASTRINGENTE.

℞ Acíbar,
Mirra, ää. . . . . ʒjß (45 gr.).
Cal viva. . . . . ʒj (4 gr.).
Deutóxido de plomo. . ʒß (2 gr.
Alumbre. . . . . ℊxc (5 gr.).
Cáscara de granada,
Balaustrias, ää. . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de arrayan,
Agua de rosas, ää. ʒij y ʒv (84 gr.).
Agua de llanten. . . . . c. s.
M. I. Ulceras de las narices, ozena, cefalalgia. *D.* Se usa en inyecciones é inhalaciones.

7219. P. ERRINO FEBRIFUGO.

℞ Sulfato de quinina. . ℊxv (75 cent.).
Tabaco en polvo. . . ʒijß (40 gr.).
M. I. Hemicránea, cefalalgia intermitente. *D.* ℊjv (2 dec.) de media en media hora.

7220. P. ERRINO HEMOSTÁTICO.

℞ Alumbre. . . . . 3ß (2 gr.).
Bol arménico. . . . . 3vj (24 gr.).
Vinagre,
Vino tinto, ãã. . . . . c. s.
para hacer una pasta que se introduce en las narices en los casos de epistaxis.

7221. P. DE ESCAMONEA ANTIMONIALES *ó Polvos cornaquinos* (F. E.).

℞ Oxido blanco de antimonio. . . . 1
Crémor de tártaro. 1
Escamonea de Alepo. 1
H. S. A. *D.* Hasta 3j (4 gr.).

7222. P. DE ESCAMONEA CATÓLICOS (F. E.).

℞ Escamonea escogida. . 3ß (16 gr.).
Raiz de mechoacan,
Raiz de jalapa, ãã. . . 3vj (24 gr.).
Tartrato de potasa. . . 3ij (12 gr.).
Se reducen á polvo separadamente, se mezclan todos y se guardan para el uso.
I. Son purgantes. *D.* 9ij (24 dec.).

7223. P. DE ESCAMONEA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Escamonea,
Extr. de jalapa duro, ãã. 3ij (60 gr.).
Gengibre. . . . . 3ß (15 gr.).
Se reducen á polvo fino separadamente y se los mezcla.
I. Es purgante drástico. *D.* Se dan de ℊvj á ℊx (3 á 5 dec.) en un vehículo conveniente.

7224. P. DE ESCAMONEA Y PROTOCLORURO DE MERCURIO (F. P.).

℞ Escamonea en polvo. 1
Protocloruro de mercurio. . . . 1
Azúcar fina. 1
H. S. A. y divídase en papeles de 9ß (6 dec.).
D. Uno á dos al día.

7225. P. DE ESCAMONEA COMPUESTO (*Vimmer*).

℞ Res. de escam. pura. ℊLjv (3 gr.).
Jabon blanco. . . . ℊv (25 cent.).
Azúcar blanca. . . . ʒxij (375 gr.).
Se mezcla, se reducen á polvo ténue y se añade poco á poco:
Bizcocho en polvo. . 3vj (24 gr.).
Agua. . . . . algunas gotas.
Se tritura con cuidado, se seca al aire y se conserva en un frasco tapado.
Cada ℊLjv (3 gr.) contienen cerca de ℊvj (3 dec.) de escamonea.
I. Es buen purgante vermífugo. *D.* ℊviij (4 dec.) para un adulto y ℊij (1 dec). para un niño.

7226. P. ESCARÓTICO ARSENICAL *ó Polvo cáustico de Fray Cosme ó de Rousselot* (F. F.).

℞ Cinabrio porfirizado,
Sang. de drago en p., ãã. 3jv (16 gr.).
Arsén. bl. porfirizado. 9ij (8 gr.).
Se mezclan exactamente y se guardan para el uso.
I. Cáncer, herpes, lepra, elefantiasis, lupus, tiña, soriasis, pirosis, dispepsia.
Cuando haya de usarse se reducen á masa con un poco de saliva ó agua gomosa, y solo se unta de cada vez una superficie como una peseta, por ejemplo, teniendo entendido que puede causar accidentes si se aplica sin precaucion. Esta aplicacion da lugar á una verdadera erisipela; la piel se pone encendida y sobrevienen escalofrios y fiebre; pero estos accidentes ceden ordinariamente con algunos ligeros derivativos, y despues de dos ó tres dias se consigue una escara sólida, gruesa, que cubre una superficie que se cicatriza con rapidez cuando la persistencia ó la profundidad de la afeccion no exigen nuevas aplicaciones.

7227. P. ESCARÓTICO CONTRA LOS CONDILOMAS.

℞ Precipitado blanco. . . ℊvj (3 dec.).
Magnesia blanca. . . . ℥j (12 dec.).
Sabina en polvo. . . . 5j (4 gr.).

M. I. Es un caterético poco activo. *D.* Una pulgarada de este polvo, mañana y noche, sobre las vegetaciones.

7228. P. DE ESCILA (F. F.).

℞ Escama de escila. . . . . c. s. ɳ.

Se desecan en la estufa, y se pulverizan sutilmente por contusion sin dejar residuo. Como el polvo de escila atrae poderosamente la humedad atmosférica es preciso ponerle en la estufa recien preparado, y guardarle en frascos bien secos y pequeños. Se pulverizará corta cantidad á la vez.

I. y *D.* Véase t. I, p. 144.

7229. P. DE ESCILA COMPUESTO (*Sthal*).

℞ Escamas de escila recientes. . . . . ℥vj (180 gr.).
Raiz de asclepias vencetósigo. . . . . ℥j (30 gr.).

Se machaca la escila en un mortero de mármol, y cuando está reducida á polvo se le añade el polvo de vencetósigo. Se deja secar todo en la estufa, se pulveriza de nuevo y se pasa por un tamiz.

I. Hidropesia, asma húmedo y catarro crónico sin irritacion. *D.* ℊiij á ℊv (15 á 25 cent.).

7230. P. DE ESCILA Y AZUFRE ó *Polvo incisivo* (H. M. F.).

℞ Azufre sublimado y lavado. . . . . ℨß (2 gr.).
Escila en polvo. . . . ℊxviij (4 gr.).

M. I. Catarros crónicos. *D.* ℊvj (3 dec.).

7231. P. DE ESCILA Y AZUFRE ó *Polvo incisivo* (F. P.).

℞ Escila preparada en polvo. 1
Azufre sublimado y lavado. . . . 2
Azúcar fino. 2

H. S. A. *I.* Asma, catarros pulmonares, romadizo. *D.* ℊvj á ℊxij (3 á 6 dec.) aumentando progresivamente.

7232. P. DE ESCILA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Escila recien desecada y en polvo. . . . . 5j (4 gr.),
Gengibre en polvo,
Goma amoniaco en polvo, ãã. . . . . ℥ij (8 gr.).
Jabon. . . . . ℥iij (12 gr.).
Jarabe. . . . . c. s.

Mézclense los polvos, pístense con el jabon, y añádase el jarabe para hacer una masa de la consistencia conveniente.

7233. *Otro* (F. P.).

℞ Escila en polvo. 1
Polvos aromáticos. 8
Azúcar fino. 8

H. S. A. *I.* Hidropesias como diurético. *D.* ℊjv á ℊvj (2 á 3 dec.) y mas.

7234. P. DE ESCILA NITRADO (*Vanhelmont*).

℞ Nitrato de potasa. . . . ℨvij (28 gr.).
Raiz de asclepias vencetósigo. . . . . ℨß (2 gr.).
Escamas de escila seca. 5j (4 gr.).

Se hace un polvo muy homogéneo y muy fino.

I. Ascitis. *D.* ℊxij (6 dec.) dos veces al dia.

Nota. Es necesario tener cuidado de secar el nitrato de potasa para quitarle una parte de su agua de cristalizacion.

7235. P. DE ESCILA PARA ENVENENAR LOS RATONES.

℞ Escila en polvo. . . . ℥ij (60 gr.)

Queso oloroso. . . . . lbß (250 gr.).

Esta mezcla mata rápidamente las ratas y ratones.

7236. P. ESCILITICO MERCURIAL (*P. Frank*).

℞ Polvos de cebolla albarrana. . . . . ℈xij (6 dec.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . . ℈vj (3 dec.).

Mézclese y divídase en doce tomas.

I. Hidrotorax complicado con una afeccion del hígado. *D.* Una toma tres veces al dia.

7237. P. EXPECTORANTE (*Babeyrac*).

℞ Flores de benjuí. . . . ℈vj (3 dec.).
Flores de azufre lav. ℈x (5 dec.).
Cascarilla. . . . . ℈xij (6 dec.).
Azúcar piedra. . . . ℈xx (10 dec.).

M. Para una dosis.

I. Sirve para facilitar la expectoracion en el asma húmedo.

7238. *Otro* (*Recamier*).

℞ Cebolla albarrana. . . ℈ß (6 dec.).
Ipecacuana. . . . . ℈j (12 dec.).

M. y divídase en seis papeles.

I. Catarros pulmonares crónicos, al fin de la neumonia, etc. *D.* Un papel cada tres horas.

7239. P. DE ESPONJA COMPUESTOS.

℞ Polvo de esponja ligeramente tostada y de color rojo. . . ʒijß (75 gr.).
Carbon en polvo. . . . ʒß (15 gr.).
Hidrocl. de amoniaco. ʒj (4 gr.).

M. D. A los enfermos de mas de diez años se les dan ℈ij (24 dec.) en tres tomas, una por la mañana, otra al mediodia y otra por la noche. Se introduce la dosis en el fondo de la boca en una cucharada de café y se la traga toda en seco. Se usa contra el bocio.

7240. P. DE ESTAÑO *ó Limaduras de estaño* (F. F.).

℞ Estaño puro. . . . . c. s. ꝙ.

Se funde á un calor suave en un cazo de hierro, se echa inmediatamente en un almirez del mismo metal calentado antes, y se tritura ligeramente con una mano algo plana, tambien caliente, hasta que se solidifique el metal. Se pasa el polvo por un tamiz de seda para separar la porcion mas dividida, y el resto se vuelve á fundir y triturar de la misma manera hasta obtener el polvo que se necesite.

I. y *D.* Véase t. I, p. 186.

7241. P. ESTIBIO OPIADO.

℞ Extracto de opio en polvo,
Emético, ãã. . . . . ℈ij (1 dec.).
Azúcar de leche. . . . ʒj (30 gr.).
Azúcar. . . . . ʒij (60 gr.).

Divídase en doce papeles. *D.* Se da uno por la mañana y otro por la noche, disuelto en un vaso de agua, en las bronquitis crónicas y en la tisis en primer grado.

7242. *Otro*, n. 2.

℞ Tártaro emético. . . . ℈j (5 cent.).
Opio. . . . . ℈jv (20 cent.).
Raiz de valeriana. . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. cuatro papeles.

I. Reumatismo y catarro crónicos. *D.* Un papel cada tres horas.

7243. P. ESTIMULANTE.

℞ Canela. . . . . ʒß (16 gr.).
Gengibre,
Clavo, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).

M. D. ℈xviij á ʒj (1 á 4 gr.), dos á tres veces al dia.

7244. *Otro*, n. 2.

℞ Gengibre. . . . . ʒij (8 gr.).

Canela. . . . . ʒß (16 gr.).
Anis. . . . . ʒj (32 gr.).
Quina en polvo. . . . . ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en papeles de á ɡxij (6 dec.).

D. Se dan de uno á dos papeles al dia en la dispepsia.

7245. *Otro*, n. 3.

℞ Azúcar con vainilla. ʒxijß (50 gr.).
Canela,
Nuez moscada, ãã. . ʒijß (10 gr.).
Ambar gris. . . . . ʒß (2 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.

I. Anafrodisia. *D.* Dos ó tres papeles al dia.

7246. *Otro* (SOMMERVALL).

℞ Alcanfor. . . . . ɡxlv (3 gr.).
Hidroclor. de amoniaco. ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en quince tomas.

I. Retencion de orina por falta de contractilidad de la vejiga. *D.* Una toma cada dos horas.

7247. P. ESTIMULANTE Y NUTRITIVO.

℞ Polvo de osmazomo,
Polvo de gelatina, ãã. ʒj (32 gr.).
Polvo de goma. . . . ʒij (8 gr.).
Polvo de clavo,
Polvo de pimienta,
Polvo de semillas de apio,
Polvo de zanahoria, ãã. ɡxij (6 dec.).

M. D. ʒiij (90 gr.) de este polvo y un poco de sal, diluidas en Ibij (1000 gr.) de agua hirviendo, dan un líquido muy sano y muy agradable. Se deberá colar por un lienzo antes de tomarle.

7248. P. ESTIPTICO (*Augustin*).

℞ Goma arábiga. . . . . ʒij (60 gr.).
Goma quino. . . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Hemorragias traumáticas. *D.* Para espolvorear las heridas y úlceras que dan sangre.

7249. P. ESTIPTICOS *ó Polvos de alumbre y quino* (F. P.).

℞ Alumbre. 4
Quino. 1
H. S. A. *I.* Hemorragias pasivas, flujos serosos, diarreas colicuativas.

7250. P. ESTIPTICO DE COLBATCH *ó especifico astringente de Maetzius.*

℞ Solucion saturada de deutocloruro de hierro. . . . . ʒjv (125 gr.).
Se hace evaporar hasta la mitad y se añade un peso igual de acetato de plomo seco; se continúa la evaporacion á fuego lento hasta la sequedad, se pulveriza el residuo y se le pasa por un tamiz.

Nota. Es necesario libertar este polvo del contacto del aire, porque atrae la humedad.

I. y *D.* Se emplea exterior é interiormente para toda clase de hemorragias. Se da interiormente á la dosis de ɡjv á ɡxij (2 á 6 dec.).

7251. P. ESTOMACAL.

℞ Quina roja,
Ruibarbo, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Hidroclor. de amoniac. ɡxc (5 gr.).
Divídase en doce papeles.

I. Dispepsia, anorexia. *D.* Un papel al dia.

7252. *Otro*, n. 2.

℞ Quina,
Ruibarbo, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

D. Un papel en una cucharada de sopa al tiempo de comer.

7253. *Otro*, n. 3.

℞ Genciana. . . . . ɡxl (20 dec.).
Canela,
Ruibarbo, ãã. . . . ʒj (30 dec.).

Mézclese y divídase en cuatro papeles.

D. Una toma al tiempo de comer, en una cucharada de sopa ó en un poco de vino.

7254. *Otro*, n. 4.

℞ Colombo. . . . . ℈x (5 dec.).
Magnesia calcinada. . ℥ij (24 dec.).

Mézclese y divídase en dos papeles.

I. Dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

7255. *Otro* (BIRKMANN).

℞ Raiz de yaro. . . . . ℥ij (60 gr.).
Raiz de cálamo aromático,
Raiz de saxífraga, ää. ℥j (30 gr.).
Piedras de cangrejos. ℥ß (15 gr.).
Canela fina. . . . . ℥iij (12 gr.).
Sulfato de potasa. . . . ℥ij (8 gr.).
Hidroclor. de amoniac. ℥ij (24 dec.).

H. S. A. Se usa en la debilidad de estómago con embarazo mucoso. *D.* De ℥ij á ℥jv (8 á 16 gr.).

7256. *Otro* (VOGT).

℞ Nuez vómica en polv. ℈xx (1 gr.).
Ipecacuana en polvo. ℥j (12 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Conchas de ostras preparadas. . . . . ℥ij (24 dec.).
Oleosácaro de yerbab. ℥ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles.

D. Una toma cada dos ó tres horas.

7257. P. ESTORNUTATORIO.

℞ Hojas de ásaro,
Hojas de mejorana, ää. . ℥ij (8 gr.).
Flores de espliego,
Lirio de Florencia, ää. . ℥j (4 gr.).
Aceite de clavo. . . . . 7 gotas.

H. S. A. *D.* Una pequeña toma, ya pura ó ya mezclada con cualquier otro polvo de propiedades análogas, pero menos activas, como por ejemplo el tabaco.

7258. P. ESTORNUTATORIO (*Flucher*).

℞ Raiz de pelitre,
Semillas de estafisagria,
Semillas de gengib., ää. ℥j (4 gr.).
Pimienta larga. . . . . ℥ß (2 gr.).

H. S. A. un polvo fino.

I. Epilepsia de los niños, amaurosis, síncopes, coriza, hemicránea, cefalalgia, sordera, otitis, anosmia, histérico. *D.* Se insufla en las narices.

7259. *Otro* (MIALHE).

℞ Azúcar cande en polvo. ℥j (30 gr.).
Veratrina. . ℈j á ℈ij (5 á 10 cent.).

Mézclese exactamente.

Reemplaza muy bien á todos los polvos estornutatorios empleados hasta ahora.

7260. *Otro* (SCHNEIDER).

℞ Alcanfor. . . . . ℈viij (4 dec.).
Raiz de guayaco. . . ℈x (5 dec.).
Camedrios,
Azúcar blanca, ää. . ℥j (30 gr.).

H. S. A. un polvo homogéneo.

I. Coriza.

7261. P. ESTORNUTATORIO, *Polvo de ásaro compuesto ó de St. Angel.*

℞ Hojas secas de ásaro,
Hojas de mejorana,
Hojas de betónica,
Flores secas de lirio de los valles, ää. . . . . ℥ij (8 gr.).

M. I. Jaqueca, hemicránea, amaurosis, síncopes, anosmia, coriza, cefalalgia, histérico, otitis, sordera. *D.* Una pulgarada.

7262. P. ESTORNUTATORIO DE BETÓNICA.

℞ Betónica. 1
Mejorana. 1
Salvia. 1
Espliego. 1
Lirio de Florencia. 1

Redúzcase á polvo.

I. Cefalalgia, sincopes, coriza, hemicránea, histérico crónico, anosmia, sordera, otitis.

7263. P. ESTORNUTATORIO DE ELÉBORO.

℞ Eléboro. . . . . 3j (4 gr.).
Betónica,
Pelitre, ää. . . . . 3ß (2 gr.).
Poleo. . . . . gxviij (1 gr.)
Mejorana. . . . . 3jß (6 gr.).
H. S. A. un polvo fino.
I. Jaqueca, cefalalgia, coriza, amaurosis, sincopes, anosmia, sordera, histérico, otitis.

7264. P. DE ESTRICNINA (*Magendie*).

℞ Estricnina. . . . . gj (5 cent.).
Oxido negro de hierro. 3j (4 gr.).
Azúcar. . . . . 3iij (12 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Uno, mañana y noche.

7265. P. DE ESTRICNINA Y DE ÓXIDO DE HIERRO.

℞ Estricnina. . . . . gij (1 dec.).
Oxido negro de hierro. gxc (5 gr.).
Goma en polvo,
Azúcar en polvo, ää. gjx (45 cent.).
Mézclese y divídase en diez papeles.
D. Uno al dia.

7266. P. ETIÓPICO.

℞ Etiope antimonial. 1
Cicuta en polvo. 1
Carbonato de magnesia. . . . 1
Azúcar. 1
I. Exantemas crónicos de los niños. *D.* gv á gxviij (25 cent. á 1 gr.).

7267. P. EXCITANTE.

℞ Quina. . . . . 3ij (60 gr.).
Mirra. . . . . 3ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
M. I. Gangrena.

7268. P. EXPECTORANTE.

℞ Escila en polvo. . . gxviij (1 gr.).
Gengibre en polvo,
Ipecacuana en p., ää. gxxxvj (2 gr.).
Mézclese y divídase en veinte papeles iguales.
I. Catarros pulmonares crónicos, al fin de las perineumonias, etc.
D. Dos á cuatro al dia.

7269. P. EXPECTORANTE (*Berends*).

℞ Acido benzóico. . . . 3ß (2 gr.).
Azufre dorado de antimonio,
Alcanfor, ää. . . . . gvj (3 dec.).
Oleosácaro de hinojo. . 5j (4 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
D. Uno cada dos horas.

7270. *Otro* (HORN).

℞ Acido benzóico. . . 3ß (2 gr.).
Ipecacuana. . . . . gvj (3 dec.).
Azufre dor. de antim. giij (15 cent.).
Azúcar. . . . . 3j (4 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Neumonía asténica. *D.* Cuatro papeles al dia.

7271. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Quermes mineral. . . gxv (75 cent).
Azúcar blanca. . . . 3j (30 gr.).
Mézclese y divídase en quince papeles.
D. Uno á tres al dia.

7272. P. EXPECTORANTE AMONIACAL.

℞ Azufre dor. de antim. gjv (2 dec.).
Nitro. . . . . gxx (1 gr.).
Alcanfor. . . . . giij (15 cent.).
Extracto de opio . . gij (1 dec.).
Sal amoniaco. . . . . gxx (1 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Ronquera, tos espasmódica, tos catarral, catarro crónico, neumonía. *D.* Un papel cuatro veces al dia.

7273. P. EXPECTORANTE ANTIMONIADO.

℞ Ipecacuana. . . . . gv (25 cent.).
Mirra. . . . . gx (5 dec.).
Azufre dor. de antim. gij (1 dec.).
Goma,
Azúcar, āā. . . . . gxc (3 gr.).
Divídase en diez papeles.

I. Catarros, ronquera, neumonías crónicas, asma, hipo. *D.* Un papel cada dos horas.

7274. P. EXPECTORANTE (*Mursinna*).

℞ Ipecacuana,
Azufre dor. de ant., āā. ℈ß (6 dec.).
Alcanfor. . . . . gjv (2 dec.).
Polvo gomoso. . . . . ℈j (12 dec.).
I. Pericneumonía, cuando se han suprimido los esputos. *D.* Una dosis cada dos horas.

7275. P. DE FAYÉ.

℞ Cort. de encina verde. ℈jß (6 gr.).
Parte esponjosa del fruto del espino serval. . ℈ß (2 gr.).
Escila en polvo. . . . . ℈j (4 gr.).
Vainilla. . . . . gij (1 dec.).
Almidon. . . . . ℈j (4 gr.).
H. S. A. *I.* Se usa en Argél contra la disenteria. *D.* gLjv á gxc (3 á 5 gr.) de este polvo dos veces al dia. Se toma con los alimentos una dosis por la mañana y otra por la noche, y si se vomita se disminuye la cantidad.

Durante su uso pueden los enfermos entregarse á sus ocupaciones, y segun Fayé no contraindica la administracion del medicamento un dolor vivo ó una fiebre intensa.

7276. P. FEBRIFUGO.

℞ Sulfato de quinina. . . . ℈ß (2 gr.).
Sulfato de morfina. . . . gj (5 cent.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Calenturas intermitentes. *D.* Dos papeles al dia.

7277. P. FEBRÍFUGO ó *Febrífugo francés.*

℞ Manzanilla en polvo. 1
Genciana en polvo. 1
Corteza de roble en polvo. . . . 1
M. I. Calenturas intermitentes. *D.* ℈ij á ℈jv (8 á 15 gr.) en bolos ó en píldoras ó bajo la forma de electuario.

7278. P. FEBRÍFUGO (*Boullemer*).

℞ Ojos de cangrejos. . . ℈j (4 gr.).
Hidrocl. de amoniaco. ℈ß (2 gr.).
Mirra. . . . . ℈j (12 dec.).
Se pulverizan y se dividen en tres partes iguales.

D. El enfermo tomará la dosis en tres dias; la primera dos horas antes del paroxismo, la segunda al otro dia á la misma hora y la tercera al dia siguiente.

7279. *Otro* (CHLEGHORN).

℞ Quina gris. . . . . ℈ß (16 gr.).
Sulfato de magnesia. . . ℈vj (24 gr.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles. *D.* Una toma de dos en dos horas, durante la apirexia.

7280. *Otro* (GOLA).

℞ Emético. . . . . giij (15 cent.).
Sulfato de quinina. . gjx (45 cent.).
Mézclese.

7281. *Otro* (HARTMANN).

℞ Polvo de quina. . . . ℈ij (8 gr.).
Polvo de cascarilla. . . gxij (6 dec.).
M. D. Se da de una vez en las fiebres remitentes é intermitentes.

7282. *Otro* (HECKER).

℞ Sulfuro de arsénico amarillo. . . . . gß (25 mil.).

Azúcar blanca. . . . . ʒxij (6 dec.).
Aceite de anis. . . . . ½ de gota.
Mézclese.

7283. P. FEBRIFUGO (H. DE AL.).

℞ Hidroclorato de amon. 5ij (8 gr.).
Opio. . . . . ʒj (5 cent.).
Flores de manzanilla en polvo. . . . . 5iij (12 gr.).
Oleosácaro de hinojo. . ℥ß (16 gr.).
M. D. Una cucharada de café cada dos horas.

7284. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Cianuro de hierro.
Azúcar blanca. ãã. . ʒxviij (1 gr.).
Mézclese y divídase en tres papeles.
D. Se toman en un dia.

7285. *Otro* (H. DE IT.).

℞ Sulfato de cobre amoniacal. . . . . ʒj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . . 5j (4 gr.)
Mézclese y divídase en cuatro papeles.
D. Uno cada cuatro horas.

7286. *Otro* (H. DE ING.).

℞ Quina,
Crémor de tártaro, ãã. ʒß (15 gr.).
Clavo de especia. . . ʒxv (75 cent.).
Mézclese y divídase en nueve papeles.
D. Uno cada tres horas.

7287. P. FEBRIFUGO ESTIBIADO (H. DE IT.).

℞ Quina roja. . . . . ʒj (30 gr.).
Tártaro emético. . . . . ʒj (5 cent.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles.
I. Calenturas intermitentes con sintomas gástricos. *D.* Un papel cada dos horas.

7288. P. FEBRIFUGO (*Jalalol*).

℞ Quina. . . . . ʒj (32 gr.).
Cáscaras de naranjas amargas,
Raiz de genciana, ãã. . 5ij (8 gr.).
Sal amoniaco,
Ruibarbo, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Fiebres intermitentes rebeldes. *D.* ʒj (4 gr.) cuatro veces al dia, diluida en un poco de agua, pasado el acceso.

7289. *Otro* (JUNCKER).

℞ Oxido de antimonio hidrosulfurado anaranjado,
Magnesia,
Sulfato de potasa, ãã. ʒß (2 gr.).
H. S. A. y divídase en cuatro partes iguales.
D. Se dan estas cuatro dosis á iguales distancias, durante la apirexia.

7290. *Otro* (RADIUS).

℞ Hidroclor. de quinina. ʒß (2 gr.).
Escila. . . . . ʒvj (3 dec.).
Opio puro. . . . . ʒxij (6 dec.).
Oleosácaro de menta. 5ij (8 gr.).
Divídase en doce papeles.
D. Tres á cuatro al dia.

7291. P. FEBRIFUGOS COMPUESTOS (H. M.).

℞ Corteza peruviana. . . ʒj (30 gr.).
Genciana. . . . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒxij (6 dec.).
Se reducen á polvo sutil, se mezclan y se dividen en ocho papeles iguales.
D. Uno cada dos horas durante la apirexia.

7292. P. FEBRIFUGO ESTIBIO OPIADO (H. DE IT.).

℞ Quina amarilla. . . . ʒj (30 gr.).
Tártaro emético. . . . ʒij (10 cent.).
Opio purificado. . . . ʒj (5 cent.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles.
I. Calenturas subintrantes ó perniciosas cuando hay que administrar en poco tiempo un tónico muy enérgico.

7293. P. FEBRIFUGO CON MAGNESIA (*Roucher*).

℞ Quina roja. . . . . 3vj (24 gr.).
Magnesia calcinada. . 3jv (16 gr.).
Flores de manzanilla en polvo. . . . . 3ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales.

I. y *D.* Se administra uno, cada cuatro horas, durante la intermitencia de las fiebres de acceso que resisten á las demás mezclas febrífugas. Se diluye en una taza de infusion de achicorias amargas.

7294. P. FEBRIFUGO OPIADO (*Neumann*).

℞ Sulfato de quinina. . ℈iij (15 cent.).
Opio. . . . . ℈j (5 cent.).
Azúcar blanca en polvo,
Goma aráb. en p., ãã. ℈vj (30 cent.).

Hágase polvo.

D. Se toma de una vez antes del acceso.

7295. P. FEBRIFUGO DE LOS POBRES (H. DE AL.).

℞ Raiz de cariofílea,
Goma arábiga, ãã. . . . 3iij (12 gr.).
Hidroclor. de amoniac. 3ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles iguales.

D. De uno á dos y aun mas, en diferentes veces, durante la apirexia.

7296. P. FEBRIFUGO Y PURGANTE (*Helvetius*).

℞ Jalapa. . . . . 3ij (64 gr.).
Crémor de tártaro. . . . 3xjv (56 gr.).
Sulfato de potasa,
Zumo de ajo, ãã. . . . 3j (32 gr.).
Quina. . . . . 3vj (24 gr.).
Diagridio. . . . . ℈ß (16 gr.).
Tartr. de potasa y sosa. 3iij (12 gr.).
Emético. . . . . 3ij (8 gr.).
Nitrato de potasa. . . . 3j (4 gr.).
Azafran,
Gutagamba, ãã. . . . . ℈xij (6 dec.).
Sulfuro rojo de merc. ℈vj (3 dec.).

II. S. A. *I.* Se usa como vermífugo ó en las fiebres intermitentes. *D.* ℈xviij á 3ß (1 á 2 gr.).

7297. P. FEBRIFUGOS SIMPLES (H. M.).

℞ Corteza peruviana en polvo,
Quina calisaya en p., ãã. ℈ß (15 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles.

D. Uno cada dos horas durante la apirexia.

7298. P. FERRUGINOSO.

℞ Oxido negro de hierro. 3j (30 gr.).
Yaro. . . . . 3ij (8 gr.).
Carbonato de cal. . . . ℈ß (15 gr.).
Canela. . . . . ℈xc (5 gr.).
Azúcar. . . . . 3ij (60 gr.).

M. I. Dispepsia, pirosis, raquitis, leucorrea. *D.* ℈vj á ℈x (3 á 5 dec.) ó 9j (12 dec.) dos ó tres veces al dia.

7299. *Otro* (COLOMBAT).

℞ Sulfato de hierro. . . . . 3ß (2 gr.).
Acido tártrico. . . . . 3jß (6 gr.).
Azúcar. . . . . 3iij (12 gr.).

II. S. A. doce papeles.

M. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis. *D.* Una cucharada para lbj (500 gr.) de agua.

7300. P. FERRUGINOSO DE MENZER (F. P.).

℞ Sulfato de hierro crist. 3j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 3iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles, que se los marcará con el número 1.

Por separado se toma:

℞ Bicarbonato de sosa. . . 3j (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 3iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles, á los que se pondrá el número 2.

Se disuelve un papel de cada número en un poco de agua, se reunen los líquidos y se los bebe inmediatamente al tiempo de la

efervescencia. Esta agua ferruginosa artificial contiene carbonato de protóxido de hierro, sulfato y un poco de carbonato de sosa, y puede rivalizar cuando menos con las píldoras de Bland. Es el mejor medio de administrar el subcarbonato de hierro.

7301. P. DE FONTANEILLES.

℞ Arsénico blanco porfirizado. . . . . ℈ij (1 dec.).
Mercurio dulce. . . . . gxvj (8 dec.).
Opio en bruto. . . . . gij (1 dec.).
Goma arábiga. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Se le recomienda contra las fiebres intermitentes rebeldes. *D.* Un papel al dia.

7302. P. DE FORDYCE.

℞ Tartrato de potasa y sosa. . . . . ℈x (50 cent.).
Ruibarbo. . . . . gvij (35 cent.).

Mézclese y divídase en dos papeles.

I. y *D.* Se administra uno todas las mañanas á los niños atacados de atrofia mesentérica.

7303. P. FUMIGATORIO.

℞ Incienso en polvo,
Almáciga en polvo,
Sucino en polvo, ãã. . ʒjv (16 gr.).
Estoraque calamita. . . ʒij (8 gr.).
Benjuí,
Láudano, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Reumatismo, gota, amenorrea, histérico. *D.* C. s. para echarle sobre ascuas. Se dirige el vapor hácia las partes afectadas de dolores reumáticos.

7304. *Otro*, n. 2.

℞ Sucino,
Almáciga,
Enebro, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Cascarilla. . . . . ʒß (2 gr.).

I. Reumatismo, gota, amenorrea, histérico. *D.* Se echa un poco en las ascuas y para fumigaciones secas.

7305. P. FUMIGATORIO BALSÁMICO *ó Polvo de benjuí y almáciga compuesto.*

℞ Almáciga. 1
Incienso. 1
Benjuí. 1
Bayas de enebro. 1
Pulverícense S. A.

7306. P. FUMIGATORIO FÉTIDO.

℞ Cuerno de ciervo rasp. ʒj (30 gr.).
Asa fétida. . . . . ʒij (8 gr.).

M. Se echa sobre las ascuas y se hace respirar los vapores á las mujeres histéricas.

7307. P. FUMIGATORIO MERCURIAL.

℞ Mercurio dulce. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar en polvo,
Benjuí en polvo, ãã. . . ʒß (15 gr.).

M. Se usan de ʒj á ʒjv (4 á 15 gr.) para cada fumigacion, que se dirige á las úlceras rebeldes de la garganta.

7308. P. FUNDENTE (*Clarus*).

℞ Carbon animal. . . . . ʒj (12 dec.).
Subcarbonato de hierro,
Azúcar, ãã. . . . . ʒij (24 dec.).

Divídanse en diez papeles.

I. Hipertrofia incipiente de la matriz y de los ovarios. *D.* Tres ó cuatro papeles al dia.

7309. *Otro* (COTTEREAU).

℞ Extracto hidroalcohólico de estramonio. . . ℈ij (1 dec.).
Polvo de digital purpúrea,
Ioduro de plomo cristalizado, ãã. . . . . ℈vj (3 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. un polvo muy homogé-

neo, que se divide en veinticuatro papeles iguales.

I. Tisis con infartos glandulosos. *D.* Cuatro papeles al dia, con cuatro horas de intervalo de uno á otro.

Nota. Cada toma debe diluirse en una cucharada de agua azucarada, ó mejor de jarabe de puntas de espárragos.

7310. P. FUNDENTE OPIADO (*Most*).

℞ Extracto de opio,
Calomelanos, ãã. . . . ℊvj (3 dec.).
Polvo de regaliz. . . . . 5jß (6 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.

I. Flegmasia blanca dolorosa. *D.* Tres ó cuatro tomas al dia.

7311. *Otro* (JAHN).

℞ Iodo. . . . . ℊj (5 cent.).
Digital en polvo,
Calomelanos, ãã. . . ℊxvj (8 dec.).
Azúcar blanca. . . . ℥ß (15 gr.).
Divídase en diez y seis dosis.

I. Hidrocéfalo crónico. *D.* Una dosis cada tres horas.

7312. P. GALACTOPOYÉTICO ó *Polvo de hinojo y neguilla compuesto* (F. WIRT).

℞ Simiente de anis. 4
Simiente de hinojo. 4
Simiente de neguilla. 2
Trociscos de creta. 3
Trociscos de ojos de cangrejos. . 3
Azúcar blanca. 8

M. I. Aumenta la leche de las nodrizas, absorve los ácidos de las primeras vias y facilita la quilificacion.

7313. P. GASEOSO FEBRÍFUGO ó *Polvo aeróforo* (*Meirieu*).

℞ Acido tártrico. . . . ℊxx (1 gr.).
Sulfato de quinina. . . ℊij (1 dec.).
Se trituran estas dos sustancias y luego se añade:
Bicarbonato de sosa. ℊxxij (11 dec.).
Azúcar blanca en polvo. 5ij (8 gr.).
Para una dosis, que se tomará en el momento de la efervescencia, en medio vaso de agua.

I. Fiebres de los pantanos. *D.* Se puede repetir la misma dosis cada dos horas.

7314. *Otro* (BRETON).

℞ Sulfato de hierro cristalizado. . . . . ℊxij (6 dec.).
Acido tártrico . . . . . 5jv (16 gr.).
Azúcar pulverizada. . 5x (40 gr.).
Bicarbonato de sosa. . 5iij (12 gr.).
Se pulveriza el sulfato de hierro en un mortero de porcelana, se reduce el ácido tártrico á polvo no muy sutil, se añade el azúcar reducido á polvo fino y últimamente el bicarbonato de sosa pulverizado; se mezcla todo y se divide en cuatro dosis, que se ponen en cuatro vasijas de vidrio tapadas.

Para usar este polvo se toma una botella de dos cuartillos casi llena de agua clara, y se echa en ella de una vez una dosis del polvo ferruginoso.

7315. P. GASOSO PARA LIMONADA ó *Limonada seca gaseosa.*

℞ Bicarbonato de sosa. 5v (20 gr.).
Azúcar. . . . . ℥jvß (140 gr.).
Esencia de limon. . ℊxviij (1 gr.).
Divídase en doce papeles azules.
Acido cítrico. . . . . 5vj (24 gr.).
Divídase en doce papeles blancos.

7316. P. GASÍFEROS LAXANTES Ó PURGANTES (H. DE M.).

℞ Acido tártrico pulv. 5vj (24 gr.).
Se divide en doce papeles blancos.
Bicarbonato de sosa pulverizado. . . . . 5vj (24 gr.).
Tartrato de potasa y sosa. . . . . 5xviij (72 gr.).
Se divide en doce papeles azu-

les ó blancos, señalados convenientemente.

I. Gastrodinias. *D.* Un papel de cada uno, en ℥vj (180 gr.) de agua.

7317. P. GASÍFEROS FERRUGINOSOS (H. DE M.).

℞ Sulfato de hierro. . . . 5ß (2 gr.).
Acido tártrico. . . . . 5jß (6 gr.).
Azúcar. . . . . 5iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles blancos.

Bicarbonato de sosa. . . 5ij (8 gr.).
Azúcar. . . . . 5iij (12 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles azules ó blancos, señalados de un modo cualquiera.

I. Gastrodinias con astriccion de vientre. *D.* Uno de cada clase, disueltos en ℥vj (180 gr.) de agua en el acto de tomarlos.

7318. P. DE GENCIANA.

℞ Genciana,
Cascarilla,
Cáscara de nar., ãã. 5j (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . ℈jx (50 cent.).
Oleosácaro de menta piperita, ãã. . . . 5ijß (10 gr.).

I. Dispepsias. *D.* 3ß (2 gr.) mañana y noche.

7319. P. DE GOMA ALUMINOSO (*Leclayse*).

℞ Goma en polvo. 4
Alumbre en polvo. 4

Mézclese. Se usa insuflándole en las fosas nasales en los casos de epistaxis.

7320. P. DE GOMA AMONIACO (F. F.).

℞ Goma amoniaco. . . . . c. s. q.

Se pulveriza por trituracion y se pasa por tamiz.

I. y *D.* Véase tomo I, pág. 204.

Del mismo modo se pulverizan la ASA FÉTIDA, LA GOMA GÁLBANO, INCIENSO, OPOPONACO y demás gomo-resinas.

7321. P. DE GOMA ARÁBIGA (F. F.).

℞ Goma arábiga. . . . . c. s. q.

Se limpia separando los cuerpos extraños que adhieren á su superficie, se quebranta, se seca en la estufa y se pulveriza sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase tomo I, pág. 205.

Del mismo modo se pulveriza la GOMA TRAGACANTO, pero se separa el primer polvo que generalmente sale sin color.

7322. P. DE GOMA QUINO COMPUESTO (F. DE L. Y F. P.).

℞ Goma quino. 15
Canela. 4
Opio puro. 1

Se reducen á polvo con separacion y se mezclan.

I. Son tónicos y astringentes en las diarreas sin inflamacion interna.

7323. P. DE GOMA QUINO.

℞ Goma quino. . . . ℈ĉ (5 gr.).
Canela. . . . . ℈xx (4 gr.).
Opio. . . . . ℈ij (4 dec.).
Digital. . . . . ℈xx (4 gr.).

Divídase en diez papeles.

I. Hemorragias pasivas, diabetes. *D.* Un papel cada hora.

7324. P. DE GOMA QUINO COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Goma quino. . . . . 5xjv (28 gr.).
Canela. . . . . 5jv (16 gr.).
Opio. . . . . 5j (4 gr.).

Se pulveriza separadamente cada sustancia, y se las mezcla despues exactamente.

Nota. Cada dracma (4 gr.) contiene ℈jv (2 dec.) de opio.

I. Se usa como estíptico y astringente en las hemorragias internas. *D.* 9j (12 dec.).

*

7325. P. DE GOMA TRAGACANTO COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Goma tragacanto,
Goma arábiga,
Almidon, ãã. . . . . ʒjß (45 gr.).
Azúcar. . . . . ʒiij (90 gr.).

M. I. Afecciones de las vias urinarias é irritaciones de la mucosa de los intestinos. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) en un vehículo acuoso.

La fórmula de la F. P. solo contiene una parte de los primeros y seis de azúcar.

7326. P. GOMOSO (F. A.).

℞ Almidon en polvo,
Regaliz en polvo, ãã. . ʒj (4 gr.).
Goma arábiga,
Azúcar blanca, ãã. . . . ʒij (64 gr.).
Mézclese.

7327. P. GOMOSO ALCALINO *ó Jabon vegetal.*

℞ Bicarbonato de potasa. 1
Goma arábiga. 3

M. I. Es un fundente que se emplea en los infartos viscerales.

7328. P. GOMOSO ALUMINOSO (*Voyt*).

℞ Alumbre en polvo. . . ʒij (24 dec.).
Goma aráb. en polvo. ʒß (15 gr.).

M. I. Grietas de los pezones. *D.* Se espolvorea las grietas despues de haberlas lavado con aguardiente, teniendo cuidado de lavar el pecho antes de dar de mamar al niño.

7329 P. GOMOSO MERCURIAL (*Mouton*).

℞ Calomelanos porfirizad. ʒj (4 gr.).
Goma arábiga en polvo. ʒjv (16 gr.).

M. I. Afecciones sifilíticas externas. *D.* Se usa espolvoreando la parte enferma.

7330. P. DE GRACIOLA.

℞ Graciola. . . . . ʒß (2 gr.).
Calomelanos,
Asa fétida, ãã. . . . . gjx (50 cent.).
Aceite de menta. . . grij (15 cent.).

Divídase en cuatro papeles.

I. Helmintiasis, tenia, gota. *D.* Un papel cada tres horas.

7331. P. DE GUINDRE.

V. la prep. t. I, p. 323.

I. Embarazo gástrico, destete, estreñimiento, ictericia, calenturas biliosas. *D.* Se usa como purgante en media taza de caldo de yerbas.

7332. P. DE GUAYACO (F. F.).

℞ Palo de guayaco. . . . . c. s. q.

Se reduce á polvo grueso por medio de una escofina, se deseca en la estufa y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan los leños y las raices gruesas muy leñosas, como el LEÑO ÁLOES, los SÁNDALOS CETRINO Y ROJO, la RAIZ DE QUASIA AMARGA y el SASAFRÁS.

7333. P. DE GUAYACO OPIADO (*Peraire*).

℞ Guayaco porfirizado. . ʒß (16 gr.).
Hojas de nar. en polvo. ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. . . gj (5 cent.).

Mézclese y divídase en diez y seis papeles.

I. Reumatismo articular agudo. *D.* Una toma cada dos horas en una infusion béquica.

7334. P. DE GUTAGAMBA.

℞ Gutagamba. . . . . grij (15 cent.).
Azúcar. . . . . gxxjv (12 dec.).

M. D. Se toma cada tres horas hasta promover deposiciones de vientre.

7335. P. DE GUTETA *ó Polvo antiepiléptico de Guteta.*

℞ Visco acercino.	2
Raiz de dictamo blanco.	2
Raiz de peonia.	2
Semillas de peonia.	2
Semillas de armuello.	1
Coral rojo preparado.	1
Uña de elan.	2

H. S. A. *I.* Convulsiones de los niños, epilepsia, apoplejía, perlesía, validos y calenturas malignas. *D.* Algunos granos.

7336. P. DE HALY, *Polvo gomoso amigdalino ó polvo antitísico.*

℞ Azúcar cande.	℥vj (24 gr.).
Almendras dulc. mond.	℥ij (8 gr.).
Semillas de membrillos,	
Semillas de adormideras blancas,	
Almidon,	
Goma arábiga,	
Goma tragacanto, ãã.	℥j (4 gr.).
Regaliz.	ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Hemotisis, tisis, diarrea y debilidad de estómago. *D.* ʒß á ℥ß (2 á 6 gr.) al dia.

Nota. Este polvo no se conserva largo tiempo, y es necesario prepararle en pequeñas cantidades á la vez.

7337. P. HEMOSTÁTICO (*Dr. Bonafoux*).

℞ Colofonia.	℈ij (60 gr.).
Goma arábiga,	
Carbon, ãã.	℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorragias capilares, metrorragias y epistaxis. *D.* C. s. para una aplicacion en la superficie que da sangre.

7338. *Otro* (MALHERBE).

℞ Sulfato de hierro.	℥iij (12 gr.).
Canela en polvo. . . .	℔x (50 cent.).

Mézclese y dividase en quince papeles.

I. Hemorragias uterinas y menstruaciones abundantes. *D.* Cuatro papeles al dia en un poco de agua azucarada ó té. Se da mayor ó menor número de dosis segun la urgencia.

7339. *Otro* (GRAEFFE).

℞ Goma arábiga.	℈j (30 gr.).
Sulfato de cobre.	℥ij (8 gr.).
Goma quino.	℥j (4 gr.).
Piedra hematitis.	ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorragias traumáticas. *D.* Se espolvorean las heridas y superficies que dan sangre.

7340. *Otro* (MIALHE).

℞ Alumbre,	
Goma tragacanto,	
Tanino, ãã.	℥ij (8 gr.).

M. I. Es muy eficaz para detener las hemorragias producidas por las picaduras de las sanguijuelas.

7341. P. DE HENNING.

℞ Oxido de zinc. . . .	℔vj (3 dec.).
ó Cianuro de zinc. . . .	ʒß (2 gr.).
Magnesia calcinada. .	ʒj (12 dec.).
Canela.	℔xx (1 gr.).

H. S. A. catorce papeles.

I. Calambres de estómago, enteralgias, coqueluche, hipo. *D.* Un papel cada dos horas.

7342. P. DE LOS HERMANOS MAHON CONTRA LA TIÑA.

℞ Cenizas de boj nuevo.	℥ij (60 gr.).
Carbon porfirizado. . .	℥j (30 gr.).

Se variará la cantidad del carbon segun la alcalinidad de las cenizas y la susceptibilidad del enfermo. Se espolvoreará diariamente la cabeza de los enfermos con este polvo.

7343. P. HIDRAGOGOS (F. M.).

℞ Crémor de tártaro. . .	℥j (32 gr.).
Mechoacan,	
Jalapa, ãã.	℥vj (24 gr.).

Simiente de yezgos. . . ʒß (16 gr.).
Goma gamandra. . . . ʒjß (6 gr.).
Nuez moscada. . . . . ʒij (8 gr.).
Hágase polvo.

I. Es un excelente remedio en la hidropesía y la ictericia rebelde. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).

7344. P. HIDRAGOGO (*Jahn*).

℞ Iodo. . . . . gʒ½ (3 cent.).
Calomelanos,
Digital, ää. . . . . gij (1 dec.).
Azúcar. . . . . ʒß (15 gr.).
H. S. A. cuatro papeles.

I. Hidrocéfalo, hidropesía. *D.* Un papel cada tres horas.

7345. P. HIDRAGOGO *ó Polvo de jalapa y soldanela compuesto.*

℞ Polvo de jalapa. 8
Polvo de mechoacan. 4
Polvo de ruibarbo. 3
Polvo de soldanela. 2
Polvo de gutagamba. 1
Polvo de canela. 2
Polvo de anís. 1

I. Es purgante á la dosis de gvj á gxxxvj (3 á 18 dec.).

7346. P. DE HIERRO Y CANELA.

℞ Hierro porfirizado,
Canela, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Azúcar. . . . . ʒvj (24 gr.).
Se mezclan y dividen en veinticuatro papeles.

7347. LIMADURAS DE HIERRO PORFIRIZADAS (F. F.).

℞ Limaduras de hierro prep. . c. s. q.

Se porfirizan en cortas porciones y en seco hasta reducirlas á polvo sutilísimo. Las limaduras de hierro porfirizadas son de color oscuro; se las preservará de la humedad atmosférica.

7348. LIMADURAS DE HIERRO PREPARADAS (F. F.).

℞ Limaduras de hierro. . . . . c. s. q.

Se contunden en un almirez de hierro con mano de lo mismo, se pasan por un tamiz fino y se arroja el polvo que en su mayor parte proviene del óxido que tenia el hierro; se pasa el residuo por un tamiz de cerda tupido, para separar las partes mas gruesas que tambien se ponen aparte. Las limaduras preparadas así deben ser brillantes, atraibles al imán y solubles en el ácido clorhídrico con desprendimiento de hidrógeno, produciendo una solucion casi sin color. Se las guardará en frascos tapados.

7349. POLVO DE HIRSCHEL.

℞ Azúcar de leche. . . . . ʒij (60 gr.).
Goma arábiga,
Salep, ää. . . . . ʒj (30 gr.).
Polvo de hinojo acuático. ʒj (4 gr.).

M. D. Se toma una cucharada de café en un vaso de agua azucarada tres ó cuatro veces al dia. Es útil en los romadizos y catarros crónicos.

7350. P. DE HUESOS DE JIBIA (F. F.).

℞ Huesos de jibia. . . . . c. s. q.

Se raspan con un cuchillo para quitarles todos los cuerpos extraños que ensucian su superficie, y se arrojan las partes duras de la concha testácea; se pulveriza el resto en un mortero, se pasa por un tamiz de seda, y despues se pulveriza en seco hasta reducirlo á polvo impalpable.

I. y *D.* V. t. I, pág. 230.

7351. P. DE HUFELAND.

℞ Nuez vóm. en polvo. gij (15 cent.).
Goma aráb. en polvo,
Azúcar, ää. . . . . gxij (60 cent.).

M. I. Se usa con buen éxito en algunos casos de disenteria y diarrea. *D.* gxx á gxxx (10 á 15 dec.) dos ó tres veces al dia.

7352. P. DE HUFELAND CONTRA LA DIARREA DE LOS NIÑOS.

℞ Magnesia calcinada. 1
Ojos de cangrejos. 1
Cuerno de ciervo raspado. . . . 1
Polvo de viseo acercino. 1
Raiz de valeriana. 1
M. D. Una ó dos tomas de ℊvj (3 dec.) al dia.

7353. P. IMPERIAL DE LEMERY ó *Polvo de canela y gengibre almizclado.*

℞ Canela. . . . . 5ijß (10 gr.).
Gengibre. . . . . 5ij (8 gr.).
Clavo. . . . . 5j (4 gr.).
Galanga menor,
Macis,
Nuez de especia,
Almizcle, ãã. . . . 5ß (2 gr.).
I. Es digestivo y excitante. *D.* ℊxij á ℊxxxvj (6 á 18 dec.).

7354. P. INCISIVO (*Mongenot*).

℞ Azúcar,
Goma arábiga, ãã. . 5j (4 gr.).
Lirio de Florencia. . 9j (12 dec.).
Oxido de antimonio hidrosulfur. pardo. ℊij (10 cent.).
Tártaro emético. . . . ℊj (5 cent.).
Hágase polvo S. A. y divídase en noventa y seis tomas.
I. Afecciones catarrales, pasado el período de irritacion. *D.* Una toma cada media hora.

7355. P. DE IODOFORMO (*Bouchardat*).

℞ Iodoformo. . . . . 5ijß (10 gr.).
Azúcar. . . . . 5ijß (75 gr.).
Azúcar con vainilla. . 5ijß (10 gr.).
M. Se usa esta preparacion como los polvos de Sency.

7356. P. DE ALMIDON IODURADO CONTRA LA ASCITIS (*Burnet*).

℞ Iodo. 3
Almidon. 800
Se cubre el abdómen de una capa bastante gruesa de esta mezcla. Se harán frecuentes lociones para lavar la piel.

7357. P. DE IODURO DE BARIO (*Magendie*).

℞ Ioduro de bario. ℊj á ℊx (5 á 50 cent.).
Canela,
Azúcar, ãã. . . . . 5j (4 gr.).
Divídase en ocho papeles.
M. I. Escrófulas, atrofia mesentérica, sífilis, corea. *D.* Un papel dos ó tres veces al dia.

7358. P. DE IODURO DE PLOMO.

℞ Ioduro de plomo,
Digital, ãã. . . . . ℊvj (3 dec.).
Extracto alcohólico de estramonio. . . . . ℊij (1 dec.).
Azúcar. . . . . 5j (4 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
I. Atrofia mesentérica, sífilis, impétigo, prostatitis, escrófulas, catarata. *D.* 5j (4 gr.) al dia en fricciones.

7359. P. DE IPECACUANA (F. F.).

℞ Raiz de ipecacuana. . . . . c. s. q.
Se deseca en la estufa, y se pulveriza por contusion hasta obtener en polvo sutil las tres cuartas partes de la raiz empleadas.
I. y *D.* Véase tomo I, pág. 228.

7360. P. DE IPECACUANA, CALOMELANOS Y OPIO (*Ellis*).

℞ Calomelanos. . . . . ℊxx (1 gr.).
Opio. . . . . ℊv (25 cent.).
Ipecacuana. . . . . ℊx (50 cent.).
Divídase en ocho papeles.
I. Disenteria. *D.* Un papel cada hora.

7361. P. DE IPECACUANA COMPUESTO (F. DE L.).

℞ Ipecacuana en polvo,
Opio puro en polvo, ãã. 5j (4 gr.).

Sulf. de potasa en polvo. ℥j (32 gr.).
Mézclese.

7362. P. DE IPECACUANA Y RUIBARBO.

℞ Ipecacuana. . . . . ℥j (4 gr.).
Ruibarbo. . . . . ℥ij (8 gr.).
M. D. ℊx á ℊxx (5 á 10 dec.) como emeto-catártico y ℊjv á ℊvj (2 á 3 dec.) dos ó tres veces al dia como diaforético.

7363. P. DE JALAPA COMPUESTO, *Polvo catártico ó purgante.*

℞ Raiz de jalapa en polvo,
Escamonea en polvo, ää. ℥j (4 gr.).
Sulfato de potasa en polvo. ℥ij (8 gr.).
M. D. ℊxviij á ʒß (1 á 2 gr.).

7364. P. DE JALAPA COMPUESTO.

℞ Polvo de jalapa. . . . . ℊij (4 dec.).
Ruibarbo,
Canela, ää. . . . . ℊj (5 cent.).
M. D. Para una toma para los niños.

7365. *Otro* (F. E.).

℞ Raiz de jalapa. 4
Crémor de tártaro. 4
Magnesia calcinada. 1
H. S. A. *D.* De ʒß á ʒjß (2 á 6 gr.).

7366. *Otro* (F. DE L.).

℞ Jalapa. . . . . ℥iij (96 gr.).
Bitartrato de potasa. . ℥vj (192 gr.).
Raiz de gengibre. . . . ʒij (8 gr.).
M. D. Es un buen purgante á la dosis de ʒj (4 gr.).

7367. P. DE JAMES ó *Polvo antimonial de James.*

℞ Deutóxido de antimon. ℥jß (48 gr.).
Protocloruro de merc. ʒj (4 gr.).
Mézclese exactamente.
Nota. Algunas veces se duplica la proporcion del óxido.
I. Fiebres designadas en otro tiempo con el nombre de pútridas ó adinámicas. *D.* ʒj ó ʒjß (4 á 6 gr.).

7368. P. DE JAMES (F. F.).

℞ Sulfuro de antim. en polvo grueso. 1
Cuerno de ciervo raspado. 1
Se mezclan estas materias y se las hace tostar en una cazuela caliente, agitando continuamente hasta que la masa haya adquirido un color gris; se la reduce á polvo fino y se la calienta durante dos horas en un crisol hecho ascua.
I. Son diaforéticos, eméticos, purgantes, y se los ha recomendado en las fiebres, sarampion, escarlatina, afecciones de pecho, obstrucciones.

7369. P. DE KAEMPF.

℞ Resina de guayaco. . . . ʒß (2 gr.).
Bitartrato de potasa. . . . ʒj (4 gr.).
Hágase polvo S. A.
I. Vértigos por retroceso de dolores reumáticos. Beck ha preconizado su linimento contra los vértigos nerviosos V. núm. 3843.
D. En dos dosis iguales, que se toman con un dia de intermedio de una á otra.

7370. P. DE KATRIMER.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . ℊij (10 cent.).
Canela en polvo. . . . gv (25 cent.).
M. I. Partos laboriosos por inercia de la matriz. *D.* Una dosis cada tres cuartos de hora para calmar los entuertos de las mujeres en el puerperio. Generalmente bastan tres ó cuatro dosis.

7371. P. DE KLEIST.

℞ Sulfato ácido de potas. ℥vj (180 gr.).
Acetato de plomo. . . ℥jß (45 gr.).
Bióxido de mangan. . lbß (250 gr.).
Se reducen á polvo.
I. Sirve para hacer fumigacio-

nes en las salas de los escorbúticos.

7372. P. DE KNOX.

℞ Hidroclorato de sosa. 8
Cloruro de cal. 3

Se mezclan y se conserva en un frasco bien tapado. Cuando se vierte un gran vaso de agua sobre ʒj ó ʒij (30 á 60 gr.) este polvo abandona el cloro; pero el desprendimiento será mas considerable si se añaden algunas gotas de ácido sulfúrico.

I. y *D.* Los ingleses consideran á este polvo como un preservativo de las enfermedades sifilíticas, y le emplean en locion antes y despues del coito.

7373. P. LAXANTE.

℞ Magnesia calcinada. . ℊv (25 cent.).
Crémor de tártaro en polvo. . . . . ℊxx (10 dec.).
Calomelanos preparados al vapor. . . . . ℊv (25 cent.).

D. De dos á cinco tomas de ℊxxx (15 dec.) al dia.

7374. *Otro*, n. 2.

℞ Sal de Seignete. . . . . ʒj (32 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . ʒij (8 gr.).
Oleosácaro de hinojo. . ʒß (16 gr.).

D. A cucharadas hasta que produzca efecto.

7375. *Otro*, n. 3.

℞ Sen en polvo. 1
Anis en polvo. 1
Azúcar blanca en polvo. . . . 1
Crémor de tártaro en polvo. . . 1

M. D. Se da ʒj (4 gr.) mañana y noche.

7376. P. LAXANTE Y ATEMPERANTE (H. DE AL.).

℞ Crémor de tártaro. . . ʒiij (96 gr.).
Nitrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. D. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) por la mañana en un vaso de suero.

7377. P. DE LECHE.

℞ Leche de vacas. . . . Ibij (1000 gr.).
Subcarbon. de sosa. ʒß (2 gr.).

Se evapora hasta sequedad.

7378. P. DE LINAZA *ó harina de linaza* (F. F.).

℞ Simiente de lino. . . . . c. s. q.

Se muele en un mortero y se pasa por un tamiz de cerda.

I. y *D.* Véase t. I. p. 236.

7379. P. DE LIQUEN AZUCARADO (*Robinet*).

℞ Líquen islándico mondado. . . . . Ibj (500 gr.).

Se macera durante dos dias en c. s. de agua fria, renovando esta cada seis horas á fin de quitar el amargor de la planta. Se exprime y se hierve el líquen en c. s. de nueva agua hasta que se haya disuelto la mayor parte, se cuela con expresion y se añade al cocimiento:

Azúcar blanca en polvo. . . . . Ibj (500 gr.).

Se evapora á fuego lento, agitando continuamente hasta que se haya secado la materia y reducido á polvo; se pasa por un tamiz y se conserva.

I. Se usa para preparar el chocolate y las pastillas de líquen.

7380. P. DE LÍQUEN ISLÁNDICO (F. F.).

℞ Líquen de Islandia. . . . . c. s. q.

Se deseca en la estufa y se pulveriza por contusion sin dejar residuo.

Cuando el médico quiera usar el líquen privado de su principio amargo debe prescribirlo así.

7381. P. LITONTRIPTICO (H. DE AM.).

℞ Gayuba,
Quina, āā. . . . . 5ij (8 gr.).
Opio. . . . . ℊiij (15 cent.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Cistitis, cálculos urinarios y catarro crónico de la vejiga. *D.* Uno, tres ó cuatro papeles al dia, bebiendo en seguida ℥ij (60 gr.) de agua de cal.

7382. P. DE LIRIO COMPUESTO.

℞ Lirio de Florencia en polvo. . . . 1
Azúcar. 4
Mézclese.

7383. P. DE LUPULINA (*Magendie*).

℞ Lupulina. 1
Azúcar. 2
M. D. Diez granos á ℊxviij (5 á 9 dec.) tres veces al dia en un poco de agua.

7384. P. DE MAGNESIA BLANCA (F. F.).

℞ Magnesia blanca en panes. c. s. q.
Se coloca un tamiz de cerda sobre un papel, se van frotando sobre las cerdas los panes hasta que hayan pasado enteramente al otro lado, y despues se vuelve á pasar el polvo por tamiz de seda.

I. y *D.* Véase t. I, p. 242.

Del mismo modo se pulveriza el ALBAYALDE, pero si se le quiere obtener mas fino se porfiriza en seguida.

7385. P. DE MAGNESIA COMPUESTO, *Polvo antiácido ó polvo absorvente.*

℞ Magnesia. . . . . 5ij (8 gr.).
Canela. . . . . ℊxviij (1 gr.).
M. En algunas fórmulas se reemplaza la canela por el colombo, el polvo de cáscara de naranja ó los oleosácaros; otros añaden azúcar, nuez moscada, hinojo, genciana y azafran.

7386. P. DE MAGNESIA COMPUESTO.

℞ Magnesia calcinada. . 5j (4 gr.).
Genciana,
Hinojo,
Canela, āā. . . . . ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. siete papeles.

I. Acidez de las primeras vias, falta de leche, dispepsia, vómitos, tialismo. *D.* Uno ó dos papeles al dia.

7387. P. DE MAGNESIA COMPUESTO *ó Sacarolado de magnesia.*

℞ Magnesia. 1
Azúcar. 4
Mézclese y guárdese en un frasco bien tapado.

7388. P. DE MALATO DE HIERRO.

℞ Malato de hierro. ℊLjv (3 gr.).
Azúcar. . . . . ℊxxxvj (2 gr.).
NÚMERO 2.
Extracto de manzanas ferrurado. 5ß (2 gr.).
Extracto de trébol de agua. . . . . 5j (4 gr.).
Azúcar. . . . . ℥vj (196 gr.).
M. I. Raquitis, caquexia, escrófulas, convalecencia. *D.* En bolos, píldoras y chocolate.

7389. P. MARCIAL, *Polvo marcial aromático, polvo emenagogo, polvo anticlorótico.* (H. DE AL.).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas,
Canela, āā. . . . . 5ß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 5iij (12 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Clorosis, amenorrea. *D.* Un papel cada tres horas.

7390. P. MARCIAL AROMÁTICO (*Jourdan*).

℞ Limaduras de hierro

Carbonato de magnesia,
Canela,
Resina de guayaco, ãã. 3ß (2 gr.).
Azúcar. . . . . 3ijß (10 gr.).
M. S. A. doce papeles.

I. Dispepsia, raquitis, úlceras atónicas, contusiones, escrófulas, clorosis, amenorrea, tifo, gangrena de hospital. *D.* Tres papeles al dia.

7391. P. MASTICATORIO.

℞ Raiz de imperatoria,
Corteza de saúco, ãã. ʒß (16 gr.).
Hojas de laurel. . . . 3jß (6 gr.).
Semillas de mostaza,
Sem. de estafis., ãã. 3j (4 gr.).
Clavo. . . . . 3jv (48 dec.).
Mirra. . . . . 3vj (24 gr.).
M. S. A.

I. Afonía y parálisis de la lengua. *D.* 3j (12 dec.).

7392. P. DE MARC *ó Polvo narcótico y tónico.*

℞ Extracto de opio. . . gj (5 cent.).
Goma en polvo. . . gij (10 cent.).
Colombo en polvo. . gxl (2 gr.).
Azúcar. . . . . gxc (5 gr.).
Esencia de yerbab. gij (10 cent.).
Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Cardialgia. *D.* Una por la mañana y otra por la noche, media hora antes de comer y de cenar.

7393. P. DE MENZER.

℞ Sulfato de hierro crist. gjv (2 dec.).
Azúcar. . . . . gc (5 gr.).
Canela en polvo. . . . gj (5 cent.).
Se reduce el sulfato á polvo, se le mezcla con el azúcar en polvo y la canela, y se guarda en un papel al que se pone el núm. 1.
Por otra parte se toma
Carbon. de sosa en polvo. gjv (2 dec.),
en un papel con el núm. 2.
Se vierte el papel núm. 1 en medio vaso de agua, se agita y después se añade el papel núm. 2 y se toma inmediatamente.

7394. P. MERCURIAL Y DE CARBONATO DE MAGNESIA (*Cheyne*).

℞ Sulfuro de mercurio negro,
Magnesia calcin., ãã. gv (25 cent.).
Deutocloruro de mercurio. . . . . gʹ¼ (25 mil.).
Mézclese exactamente. *D.* Se toma de una vez por la noche, al tiempo de acostarse, en el tratamiento de las afecciones cutáneas.

7395. P. MERCURIAL CON CICUTA (*Pistchaft*).

℞ Cinabrio. . . . . gxx (1 gr.).
Polvo de cicuta. . . . gij (10 cent.).
Bióxido de mercurio. gj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . ʒß (15 gr.).
Mézclese y divídase en veinte papeles.

I. Afecciones escrofulosas avanzadas, caries escrofulosa, coxalgia, formas secundarias de la sífilis, espina ventosa, etc. *D.* Una toma despues del desayuno y la segunda por la noche. Esta fórmula es para los niños de uno á dos años; pero á los de mas edad se aumenta proporcionalmente la dosis de la cicuta hasta gx (5 dec.) y la del bermellon á gxl (2 gr.).

7396. P. DE MERCURIO Y CRETA (H. DE INGL.).

℞ Mercurio purificado. . ʒiij (90 gr.).
Creta preparada. . . . ʒv (150 gr.).
Tritúrese hasta que se extinga el mercurio.

Nota. Ocho granos (4 dec.) de esta masa contienen giij (15 cent.) de mercurio.

D. gjv á gx (2 á 5 dec.) dos veces al dia, en un jarabe ó mucílago.

7397. P. MERCURIAL LÁCTEO (*Griesselich*).

℞ Mercurio soluble de Hanhemann. . . . . gij (5 cent.).
Azúcar de leche. . . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. un polvo, que se dividirá en veinticuatro tomas.

I. Salivacion no mercurial. *D.* Tres tomas al dia.

7398. P. MERCURIAL OPIADO (*Hufeland*).

℞ Calomel. al vapor. . gvj (3 dec.).
Oxido de zinc sublim. giij (15 cent.).
Opio puro. . . . . gij (1 dec.).
Azúcar blanca. . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. y dividase en seis papeles.

I. Hidrotorax determinado por afecciones asmáticas, metástasis artríticas ó neumonías. *D.* Una dosis cada tres horas.

7399. P. MERCURIAL OPIADO (*Rust*).

℞ Calomelanos . . . . . 5ß (2 gr.).
Opio. . . . . giij (15 cent.).
Digital. . . . . 3ß (6 dec.).
Oleosácaro de hinojo. 3ij (8 gr.).

H. S. A. polvo y dividase en doce papeles.

I. Hidroftalmia. *D.* Uno á dos papeles al dia.

7400. P. MERCURIAL PARA LAS MUJERES PREÑADAS.

℞ Protocloruro de mercurio al vapor. . . . gij (1 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . 3j (12 dec.).
Azúcar. . . . . 3ij (24 dec.).

M. D. gxviij á gxx (9 á 10 dec.) por la mañana, al medio dia y por la noche en un poco de tisana.

7401. P. DE MOSTAZA ó *Harina de mostaza* (F. F.).

℞ Mostaza. . . . . c. s. q.

Se muele en un mortero de hierro ó de bronce con mano que tenga poca superficie y se pasa por un tamiz de cerda.

I. y *D.* V. t. 1, p. 269.

7402. P. DE MERCURIO SACARINO (*Lagneau*).

℞ Azúcar blanca. . . . . 3ß (16 gr.).
Mercurio vivo. . . . . 5ij (8 gr.).

Se trituran hasta que se extinga completamente el mercurio y se divide en treinta y seis dosis iguales.

I. Afecciones sifilíticas en los niños y en las personas delicadas. *D.* Una dosis cada dia en una taza de chocolate ó de café.

7403. P. DE MUSGO MARINO (*Frank*).

℞ Musgo marino. . . . . 3ß (12 gr.).
Agua. . . . . lbj (500 gr.).

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se añade:

Azúcar. . . . . 3iv (125 gr.).
Goma. . . . . 3j (30 gr.).
Lirio en polvo. . . . . 5j (4 gr.).

Se evapora hasta sequedad y se mezcla con

Arrowroot. . . . . 3iij (90 gr.).

Sirve para preparar jaleas, utiles contra la tos y diarreas en la fiebre hética.

7404. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA (F. F.)

℞ Musgo de Córcega. . . . . c. s. q.

Se golpea con una varita sobre una mesa, se monda separándole los pedazos de conchas y caracolitos, y se criba para acabar de limpiarle; se deseca despues en la estufa, y se pulveriza sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase t. I, p. 271.

7405. P. DE MUSGO DE CÓRCEGA COMPUESTO.

℞ Musgo de Corcega,

Santónico,
Ajenjos,
Tanaceto. ãã. . . . . 3ijß (10 gr.).
Ruibarbo. . . . . ʒxc (5 gr.).
M. I. Afecciones verminosas. *D.* ℊxviij á 3j (1 á 4 gr.) diluido en agua, leche ó incorporado á un bizcocho.

7406. P. NAUSEOSO.

℞ Digital. . . . . 9j (12 dec.).
Ipecacuana. . . . . ℊviij (4 dec.).
Mézclese y divídase en ocho papeles.
D. Un papel cada dos horas.

7407. P. DE NITRATO DE BISMUTO (*Recamier*).

℞ Nitrato de bismuto. . ℊjv (2 dec.).
Magnesia en polvo,
Azúcar, ãã. . . . . 9ij (24 dec.).
M. I. Gastrodinias rebeldes no inflamatorias. *D.* En cuatro dosis.

7408. P. DE NITRATO DE POTASA (F. F.).

℞ Nitrato de potasa. . . . . c. s. q.
Se pulveriza por confusion en un mortero de mármol con mano de boj y se pasa por tamiz.
Del mismo modo se pulverizan el ACETATO DE PLOMO, el BICARBONATO DE SOSA, el TARTRATO DE POTASA, y en general todas las sales neutras no metalizadas.

7409. P. DE NITRO ALCANFORADO.

℞ Extracto de acónito. . ℊjv (2 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒß (15 gr.).
Nitro. . . . . 5j (4 gr.).
Divídase en cuatro papeles.
I. Gota, reumatismo. *D.* Se toman en el dia.

7410. *Otro* (SWEDIAUR).

℞ Nitro en polvo. . . . . ℊx (5 dec.).
Alcanfor. . . . . ℊjv (2 dec.).
Goma en polvo. . . . . 9j (12 dec.).
D. Se divide en tres dosis y se usa como atemperante y diurético.

7411. P. DE NITRO ANTIMONIAL (*Burchard*).

℞ Nitro. . . . . 3jv (15 gr.).
Azufre dorado de antimonio. . . . . 9ß (6 dec.).
Divídase en doce dosis.
I. Hidrotorax. *D.* Cuatro dosis al dia en una infusion teiforme de bayas de enebro.

7412. P. DE NITRO ANTIMONIADO Y ALCANFORADO (*Thaer*).

℞ Nitrato de potasa. . 5j (4 gr.).
Azufre dorado de antimonio,
Alcanf. en polvo, ãã. ℊiij (15 cent.).
Divídase en seis tomas.
I. Neumonía aguda despues de las emisiones sanguíneas locales, y cuando ha cesado de pronto la expectoracion. *D.* Una toma cada dos horas.

7413. P. DE NUEZ VÓMICA (H. DE AL.).

℞ Nuez vómica. . . . . ℊiij (15 cent.).
Goma arábiga,
Azúcar blanca, ãã. . ℊxij (60 cent.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
I. Disenteria. *D.* Dos á seis papeles al dia.

7414. P. NUTRITIVO.

℞ Grenetina,
Osmazomo, ãã. . . . . 3j (30 gr.).
Goma arábiga. . . . . 5ij (8 gr.).
Clavo,
Pimienta,
Semillas de zanahoria,
Semillas de apio, ãã. . 9ß (6 dec.).
D. 3iij (90 gr.) hervidas en dos cuartillos (1 litro) de agua, y añadiendo c. s. de sal.

7415. P. OCÍTICO (*Schmidt*).

℞ Cornezuelo de centeno,

Borato de sosa.
Oleosácaro de manzanilla, ãã. . . . . ℊx (50 cent.).

H. S. A. polvo, que se divide en seis papeles.

I. Partos laboriosos por inercia de la matriz, hemorragias uterinas.

7416. P. OFTÁLMICOS (F. P.).

℣ Oxido de zinc. 1
Azúcar candc. 1
Protocloruro de mercurio. 1

Hágase polvo S. A.

I. Opacidad de la córnea. Véase *Colirio.*

7417. *Otro* (SICHEL).

℣ Etiope antimonial. . . 3ij (8 gr.).
Resina de guayaco,
ó Ruibarbo. . . . . 3j (4 gr.).
Magnesia calcinada. . . ℊxij (6 dec.).
Goma arábiga. . . . . 3j . (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro partes.

D. Se dan de una á ocho al dia en un vaso de agua azucarada, contra las oftalmias escrofulosas.

7418. *Otro* (SICHEL).

℣ Calomelanos,
Azufre dorado de antimonio, ãã. . . . . ℊvj (3 dec.).
Magnesia calcinada. . ℊxij (6 dec.).
Goma arábiga en polv. 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en doce papeles. Se toma de uno á doce al dia en las oftalmias escrofulosas y reumáticas. Se puede añadir al anterior ℊij (1 dec.) de opio en bruto.

7419. *Otro* (SICHEL).

℣ Calomelanos,
Azufre dorado de antimonio,
Resina de guayaco, ãã. ℊjv (2 dec.).
Magnesia calcinada. . ℊxij (6 dec.).
Extracto de acónito. . ℊjv (2 dec.).
Goma en polvo. . . . 3j (4 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Se usa en las oftalmias artríticas y reumáticas.

7420. *Otro* (SICHEL).

℣ Etiope antimonial,
Sulfato de quinina. ãã. 3ij (8 gr.).

Mézclese y divídase en papeles de ℊxl á ℊl (20 á 25 dec.).

I. Oftalmias periódicas. *D.* De dos á ocho papeles al dia.

7421. *Otro* (DELILLE).

℣ Semillas de cañafístula privadas de su túnica externa y pulverizadas, c. s.

I. Oftalmias serosas. *D.* De ℊj á ℊxij (5 á 60 cent.) dentro del párpado inferior.

7422. P. OPIADO (*Spiegel*).

℣ Sulfato de sosa. . . . 3ij (8 gr.).
Opio purificado. . . . ℊij (15 cent.).

Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Hemorragias en general y hemotisis en particular, así como en todas las inflamaciones después de haber usado la sangría. *D.* Una toma por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche.

7423. P. DE OPIO (F. F.).

℣ Opio escogido. . . . . c. s. q.

Se corta en pedazos, se deseca en la estufa y se pulveriza sin dejar residuo.

Del mismo modo se pulverizan el ACÍBAR, el CATECÚ, el EXTRACTO DE REGALIZ y la GOMA QUINO.

7424. P. DE OPIO Y CRETA.

℣ Creta preparada. . . 3ij (64 gr.).
Canela. . . . . 3j (32 gr.).
Tormentila. . . . . 3vj (24 gr.).
Goma arábiga. . . . . 3vj (24 gr.).
Pimienta larga. . . . 3j (4 gr.).
Opio. . . . . 3ß (2 gr.).

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan.

D. Se usa á la dosis de gjx (45 cent.) en las diarreas y en los flujos durante la dentición de los niños. Cada escrúpulo (12 dec.) contiene gß (25 mil.) de opio.

7425. P. DE ÓXIDO BLANCO DE ZINC *ó Sacarolado de óxido de zinc.*

℞ Flores de zinc. . . . . gxjv (7 dec.).
Azúcar. . . . . 3j (4 gr.).
Divídase en seis papeles.

I. Coqueluche y enfermedades convulsivas de los niños. *D.* Un papel por la mañana y otro por la noche.

7426. P. DEL PAPA BENEDICTO (F. M.).

℞ Simiente de cilantro,
Simiente de anis,
Simiente de hinojo,
Simiente de alcarabea,
Simiente de comino de Marsella,
Raiz de zedoaria,
Raiz de regaliz,
Canela escogida, ãã. 3j (30 gr.).
Azúcar blanca. . . . . 3vj (180 gr.).
Hágase polvo S. A.

I. Afecciones del estómago; facilita la digestion y disipa los flatos. *D.* 3j á 3ij (4 á 8 gr.).

7427. P. PARA CALAS (F. M.).

℞ Trociscos de Alhandal. 3j (30 gr.).
Acibar sucotrino. . . . 3jß (45 gr.).
Sal gemma. . . . . 3ij (60 gr.).
Háganse polvos S. A.

7428. P. PARA CORREGIR LA MALA CALIDAD DE LA LECHE Y AUMENTAR SU SECRECION.

Se toma tres veces al dia, en una taza de agua de tila, una cucharada de la mezcla siguiente:

℞ Magnesia inglesa. . . 3ijß (10 gr.).
Polvo de cáscara de naranja. . . . . gxc (5 gr.).
Azúcar. . . . . 3ij (64 gr.).

Bastan dos ó tres cucharadas para obtener el efecto deseado.

La siguiente fórmula da los mismos resultados:

Azúcar. . . . . 3xx (80 gr.).
Bicarbonato de sosa. . 3j (4 gr.).
Cáse. de naranja en p. 3j (4 gr.).
Se toma del mismo modo.

7429. P. PARA LOS NIÑOS.

℞ Magnesia pura en polv. 3ß (2 gr.).
Simiente de anis. . . . gx (5 dec.).
Mézclese y divídase en ocho partes iguales.

D. Dos al dia mezcladas con leche de la nodriza.

7430. *Otros* (HUFELAND).

℞ Carbonato de magnes. 3j (30 gr.).
Raiz de ruibarbo. . . . 3ij (8 gr.).
Raiz de valeriana. . . . 3ß (2 gr.).
Oleosácaro de hinojo. . 3ß (15 gr.).
Mézclese y háganse polvos.

D. Se da una ó dos veces al dia lo que se coge con la punta de un cuchillo.

7431. *Otro* (HUFELAND).

℞ Azafran en polvo. . . gviij (4 dec.).
Valeriana,
Magn. calcinada, ãã. gxjv (3 gr.).
Licio de Florencia. . . 5j (4 gr.).
Regaliz. . . . . 3jß (6 gr.).
Mézclese.

D. Se divide en mayores ó menores dosis segun la edad de los niños.

7432. P. PARA TEÑIR EL PELO.

℞ Cenizas de plomo. . . . 3ß (16 gr.).
Cal apagada. . . . . 3ij (8 gr.).
Creta. . . . . 3ß (16 gr.).
Se mezcla este polvo con agua en la que se sumerge un pincel, con el que se frota muchas veces los cabellos; al cabo de dos horas se lava la cabeza.

7433. P. PARA TEÑIR EL PELO DE NEGRO (*Hanmann*).

℞ Litargirio porfirizado. lbß (250 gr.).
Cal viva porfirizada. . ʒjv (125 gr.).
Polvo de pólvora. . . ʒij (60 gr.).

H. S. A. un polvo perfectamente homogéneo.

Se forma una masita con c. s. de polvo y agua caliente. Se aplica esta masa á los cabellos teniendo cuidado de empapar bien los pelos hasta la raiz. Se procurará que no penetre ninguna partícula del polvo en los ojos, porque resultaria una oftalmía.

Se cubre todo con una pelota de algodon acolchado humedecido ligeramente en agua, y se sujeta con un lienzo ó pañuelo grande doblado muchas veces.

Se tendrá aplicada la pasta durante tres horas y mejor una noche, porque el calor favorece su accion. Para quitar esta pasta que se ha secado y endurecido, se frota los cabellos entre los dedos y se los lava despues con agua de jabon. Para darles suavidad se les da pomada y se pasa un peine.

Se renueva cuando haya necesidad.

7434. P. PARA TISANA EXTEMPORÁNEA (*Chaussier*).

℞ Nitro. . . . . ʒij (8 gr.).
Azúcar,
Extracto seco de regaliz,
Extracto de grama, ää. ʒij (60 gr.).
Goma arábiga. . . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Cianosis, ictericia, metritis aguda, cistitis. *D.* Una cucharadita en un vaso de agua.

7435. P. PARA LAS ÚLCERAS DEL CUELLO DE LA MATRIZ (*Boinet*).

℞ Almidon en polvo. . . ʒv (150 gr.).
Sulfato de hierro en p. gxviij (1 gr.).
Clorhidrato de amon. gxviij (1 gr.).
Sabina en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. . gxviij (1 gr.).

Se aplica dos veces al dia por medio de un pelotoncito de hilas cubierto de cerato.

7436. P. PECTORAL (*Schneider*).

℞ Esencia de milenrama,
Esencia de salvia,
Esencia de hisopo, ää. . 4 gotas.
Arrowroot,
Azúcar, ää. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Broncorreas. *D.* Una cucharadita de café cada dos horas.

Schneider añade á veces gx (50 cent.) de extracto alcohólico de beleño ó gxx (1 gr.) de lactucario inglés, ó gj ó gij (5 á 10 cent.) de extracto acuoso de opio.

7437. *Otro* (WEDEL).

℞ Azúcar blanca. . . . . ʒij (60 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒß (15 gr.).
Raiz de regaliz,
Lirio de Florencia, ää. ʒij (8 gr.).
Acido benzoico. . . . . ʒj (12 dec.).
Esencia de anis,
Esencia de hinojo, ää. 10 gotas.

H. S. A. *I.* Catarros pulmonares crónicos. *D.* De ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).

7438. P. PECTORAL Ó POLVO DE REGALIZ COMPUESTO (H. M. F.).

℞ Regaliz. . . . . ʒjß (48 gr.).
Sen. . . . . ʒijß (40 gr.).
Semillas de anis,
Azufre sublimado y lavado, ää. . . . . ʒv (20 gr.).

Mézclese.

D. ʒij (8 gr.) una, dos ó tres veces al dia.

7439. P. DE PLUMER, ANTISIFILÍTICO Y ANTIESCROFULOSO.

℞ Protocloruro de mercur. ʒj (4 gr.).
Azufre dorado de antim. ʒij (8 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Enfermedades sifilíticas y escrofulosas, como preservativo de la escarlatina, convalecencia de

las calenturas intermitentes, infartos de las vísceras abdominales con edema de las extremidades inferiores. *D.* gvij (35 cent.) mañana y noche, bebiendo despues uno ó dos vasos de cocimiento de zarzaparrilla. Se le debe preparar en el momento de usarle, porque se descompone al aire húmedo y toma un color pardusco.

7140. P. DE POLIGALA ALCANFORADO (*Richter*).

℞ Poligala virginiana en polvo,
Azúcar en polvo, ää. . . 5ij (8 gr.).
Alcanfor en polvo. . . . 5ß (2 gr.).
Mézclese y divídase en doce tomas.

I. Neumonía con síntomas tifoideos. *D.* Una toma cada tres horas.

7141. P. DE POLIGALA CON MAGNESIA (*Schmaltz*).

℞ Poligala de Virginia en polvo. . . . . 3ß (16 gr.).
Tartrato de potasa. . . 5vj (24 gr.).
Carbonato de magnes. 5ij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Iritis y oftalmia en el período de exudacion y enfermedades consecutivas á las oftalmias reumáticas, reumático-catarrales, artríticas, á la iritis, hipopion y tericion. *D.* Tres cucharaditas de café al dia.

7142. P. DE POLIGALA TARTARIZADO (*Ammon*).

℞ Poligala de Virginia en polvo. . . . . 3ß (16 gr.).
Tartrato de potasa. . . 5ijß (10 gr.).
Oleosácaro de cálamo aromático. . . . . 5jß (6 gr.).
H. S. A. *I.* Tiene los mismos usos que el polvo de poligala con magnesia.

7143. P. DE PRINCE.

Este polvo, empleado en Inglaterra en las enfermedades sifilíticas y escrofulosas, no es mas que el deutóxido de mercurio perfectamente puro.

I. Se usa principalmente al exterior para curar las úlceras sifilíticas ó fungosas y la oftalmia crónica.

7144. P. DE PROVENZA Ó DE MARSELLA.

℞ Caterú,
Hierro porfirizado,
Azúcar, ää. . . . . 5ij (8 gr.).
Hágase polvo y divídase en papeles de gxviij (1 gr.).

I. Clorosis y afecciones crónicas del estómago.

7145. P. PURGANTE.

℞ Jalapa en polvo. . . . ℥ij (10 cent.).
Ruibarbo en polvo. . ʒj (5 cent.).
Canela en polvo. . . . ʒj (5 cent.).
M. D. En una toma á los niños.

7146. *Otro*, n. 2.

℞ Jalapa . . . . . 3v (150 gr.).
Escamonea. . . . . 3j (30 gr.).
Crémor de tártaro. . . 3ij (60 gr.).

7147. *Otro*, n. 3.

℞ Jalapa en polvo. . . . . ℈j (12 dec.).
Sulfato de sosa. . . . . 3v (20 gr.).
Divídase en tres partes iguales.
Es un purgante eficaz y económico, que se da cada media hora hasta producir deposiciones. Se diluye cada dosis en un vaso de caldo de yerbas.

7148. *Otro* (H. DE M.).

℞ Raiz de jalapa pulverizada. . . . 1
Crémor de tártaro. 1
I. Embarazos intestinales sin inflamacion. *D.* De 5j á 5ij (4 á 8 gr.).

7149. *Otro* (WOLFF).

℞ Digital en polvo. . . . ℈ß (6 dec.).

Jalapa en polvo. . . . . 3ij (8 gr.).
Calomelanos al vapor. 3j (12 dec.).
Divídase en doce dosis.

I. Hidrotorax. *D.* Una dosis cada tres horas hasta que produzca su efecto purgante.

7150. P. PURGANTE Y ANTIHELMÍNTICO (*Pringle*).

℞ Polvo de ruibarbo. . ʒx (5 dec.).
Calomelanos. . . . . ɡxviij (9 dec.).

D. Se toma de una vez en las fiebres biliosas y contra las lombrices lumbricoides.

7151. P. PURGANTE Y ATEMPERANTE.

℞ Nitro. . . . . 3j (4 gr.).
Emético. . . . . ɡj (5 cent.).

Se disuelven en tres cuartillos (1½ lit.) de caldo de yerbas. Se bebe á tazas hasta producir suficiente efecto purgante.

7152. P. PURGANTE DE CITRATO DE MAGNESIA.

℞ Carbonato de magnesia. 16
Acido cítrico. 24
Azúcar. 60

Se priva á estas sustancias, por medio de la desecacion, de toda el agua que pueden retener.

7153. *Otro*, n. 2.

Es una mezcla de cuarenta y seis partes de ácido cítrico y quince de magnesia calcinada. Esta mezcla representa 3ij (60 gr.) de citrato de magnesia; se disuelve muy pronto en el agua caliente y tarda cinco á diez minutos en disolverse en la fria. Si se quiere usar el carbonato en lugar de la magnesia, se pondrá treinta partes; pero en este caso abulta mas el polvo y hace efervescencia al ponerle en un líquido.

7154. P. PURGANTE COMPUESTO.

℞ Calomelanos . . . . . ɡx (5 dec.).
Jalapa en polvo. . . . . 3j (4 gr.).
Azúcar. . . . . ɡxx (1 gr.).

M. D. gL (25 dec.) á los adultos.

7155. P. PURGANTE Y DIURÉTICO (*Lescure*).

℞ Sulfato de sosa. . . 3ij (8 gr.).
Acetato de potasa. . ɡxxx (15 dec.).
Cebolla albarrana,
Digital purpúrea, ää. ɡv (25 cent.).
Resina de jalapa. . . ɡvj (30 cent.).

M. I. Hidropesías, obstrucciones de las vísceras abdominales y caquexia que sobreviene á consecuencia de las calenturas intermitentes. *D.* Se toma en una sola dosis por la mañana en ayunas en un cocimiento aperitivo.

7156. P. PURGANTE Y TÓNICO.

℞ Tartrato de potasa y sosa. . . . . ɡx (50 cent.).
Ruibarbo en polvo. . . ɡv (25 cent.).

M. I. Atrofia mesentérica de los niños. *D.* Se toma de una vez por la mañana.

7157. P. DE QUARIN CONTRA LA TOS CONVULSIVA.

℞ Extracto de regaliz,
Azúcar, ää. . . . . 3ij (8 gr.).
Azufre sublimado. . . . 3j (4 gr.).
Goma tragacanto,
Goma arábiga, ää. . . . 3ß (2 gr.).
Oxido de antimonio hidrosulfurado pardo. . . . ɡij á ɡiv (1 á 2 dec.).

H. S. A. *D.* 3ß (2 gr.) cada cuatro horas, en un looc ó en un vehículo adecuado.

7158. P. DE QUERMES ALCANFORADO (H. DE AL.).

℞ Quermes mineral. . ɡß (25 mil.).
Alcanfor. . . . . ɡj (5 cent.).
Azúcar blanca. . . . ɡxxjv (12 dec.).

Mézclese y divídase en dos papeles.

D. En el dia.

7459. P. DE QUINA ALUMINOSO.

℞ Quina roja. . . . . ʒj (30 gr.).
Alumbre. . . . . ʒij (8 gr.).
Canela,
Alcanfor, ää. . . . . ʒß (2 gr.).

M. I. Estomacace, tialismo, hemorragia pasiva, metrorragia, odontalgia, diarrea crónica, úlceras atónicas, úlceras saniosas, gangrena de hospital, gangrena. *D.* ʒj (4 gr.). Se espolvorea la parte enferma.

7460. P. DE QUINA ESTIBIADO.

℞ Quina roja. . . . ʒj (30 gr.).
Tártaro emético. gxx (4 gr.).
Carbonato de sosa. gxxx (15 dec.).
Hidroclorato de amoniaco. . . . . ʒj (4 gr.).
Opio. . . . . gjv (20 cent.).

Divídase en diez papeles.

I. Calenturas intermitentes, remitentes, perniciosas ó tifoideas, tifo. *D.* Tres papeles al dia.

7461. P. DE QUINA FACTICIO (*Hufeland*).

℞ Corteza de sáuce,
Corteza de castaño de Indias,
Genciana,
Cálamo aromático,
Cariofilea, ää. . . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes, dispepsia, debilidad del conducto digestivo, tifo, reumatismo, gangrena de hospital. *D.* En píldoras, bolos ó cocimiento.

7462. P. DE QUINA É ICTIOCOLA.

℞ Quina. . . . . ʒj (30 gr.).
Ictiocola. . . . . ʒjß (6 gr.).

Divídase en diez y seis papeles.

I. Hemorragias uterinas pasivas, leucorrea, blenorrea, diarreas crónicas. *D.* Cuatro papeles al dia y despues seis.

7463. P. DE QUINA DE LOJA (F. F.).

℞ Quina de Loja. . . . . c. s. q.

Se raspan las cortezas con un cuchillo para quitar los líquenes, la epidermis y el tegido celular inmediato, se seca en la estufa y se pulveriza sutilmente sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase t. I, pág. 309.

Del mismo modo se pulverizan las cortezas de QUINA ROJA Y QUINA AMARILLA sin epidermis, la CASCARILLA y la ANGUSTURA VERDADERA Y FALSA.

7464. P. DE QUINA Y MAGNESIA.

℞ Quina. 1
Magnesia. 1

Del mismo modo se preparan los polvos de QUINA Y RUIBARBO, QUINA Y CAYÉ, QUINA Y VALERIANA.

7465. P. DE QUININA Y MORFINA (*Magendie*).

℞ Sulfato de quinina. gij á gvj (10 á 30 cent.).
Sulfato de morfina. gß á gj (25 á 50 mil.).

Mézclese y divídase en cuatro papeles iguales. *D.* Una toma cada dos ó tres horas durante la apirexia.

7466. P. DE QUININA EMETIZADO (*Dr. Gola*).

℞ Tártaro estibiado. . gij (15 cent.).
Sulfato de quinina. . gx (50 cent.).

Mézclese exactamente y divídase en seis papeles iguales. *D.* Esta mezcla, que se ha empleado con mucho éxito contra ciertas calenturas intermitentes que habian resistido á la accion del sulfato de quinina, solo debe tomarse á la dosis de un papel cada dos horas durante la apirexia.

7467. P. DE QUININA OFTÁLMICO (*Sichel*).

℞ Etiope antimonial,
Sulfato de quinina, ãã. ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Oftalmias periódicas. *D.* Dos á ocho papeles al dia.

7468. P. DE REGALIZ (F. F.).

℞ Raiz de regaliz. . . . . c. s. q.

Se raspa ligeramente con un cuchillo, se corta en rodajas delgadas, se seca en la estufa y se pulveriza por contusion hasta que solo quede un residuo fibroso y casi insípido.

Del mismo modo se preparan los polvos de raices de MALVABISCO, GATUÑA Y PAREIRA BRAVA y de todas las raices muy fibrosas.

7469. P. DE RAIZ DE HELECHO MACHO (F. F.).

℞ Cepas radicales de helecho macho, c. s. q.

Se cortan en pedazos menudos, se aventan para separar las escamas foliáceas, se secan en la estufa y se pulverizan por contusion sin dejar residuo.

I. y *D.* Vease t. I, p. 211.

7470. P. REFRIGERANTE (*Van Mons*).

℞ Nitro. 2
Sal amoniaco. 1
Mézclese triturando.

Se usa poniéndole en una vejiga con agua ó mezclado con hielo machacado, y se aplica sobre la parte enferma.

I. Contusiones, encefalitis, telangiectasia, asma, aracnitis, meningitis. *D.* Se aplica en las hernias sobre el tumor herniario, y en fomentos en las contusiones y equimosis.

7471. P. REFRIGERANTE Y DIURÉTICO.

℞ Malvabisco en polvo. ℈xx (1 gr.).
Regaliz en polvo. . . ℈xx (1 gr.).
Sal de nitro. . . . . gjv (20 cent.).
Alcanfor. . . . . gj (5 cent.).
Azúcar de leche. . . ʒijß (10 gr.).
Azúcar. . . . . ʒijß (10 gr.).
M. I. Inflamacion aguda de las vias urinarias. *D.* Tres dosis al dia en ʒjx (280 gr.) de agua. Es muy cómodo para las personas que viajan.

7472. *Otro*, n. 2.

℞ Nitrato de potasa. . gxij (6 dec.).
Malvabisco en polvo,
Regaliz en polvo, ãã. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . gij (15 cent.).
Mézclese y divídase en tres papeles.

I. Es muy cómodo para los viajeros afectados de uretritis aguda. *D.* Un papel tres veces al dia en un vaso de agua.

7473. P. DE RESINA DE ESCAMONEA.

℞ Resina de escamonea. grjv (3 gr.).
Jabon de Venecia. . . gv (25 cent.).
Azúcar blanca. . . . . ʒjx (288 gr.).
H. S. A. polvo muy ténue, al que se añade:
Bizcocho en polvo. . . ʒvj (24 gr.).
Agua. . . . . algunas gotas.
Se mezclan S. A.

I. Es purgante y vermífugo. *D.* gviij (4 dec.) que bastan para producir muchas deposiciones á un adulto; á los niños de quince años se reduce la dosis á gvj (3 dec.); gjv (2 dec.) para los de siete á ocho años, y gij (1 dec.) para los de uno á dos años.

7474. P. DE RESINA DE GUAYACO COMPUESTO (*Hufeland*).

℞ Resina de guayaco. . . ʒvj (24 gr.).
Extracto de acónito,
Esencia de valeriana,
Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ãã. . . . ʒj (12 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ʒß (16 gr.).
Mézclese y divídase en veinticuatro tomas.

I. Prosopalgia artrítico-reumática. *D.* Una toma mañana y noche.

7475. P. RESOLUTIVO (*Berends*).

℥ Mercurio dulce. . . . gjv (20 cent.).
Digital purpúrea. . . gv (25 cent.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
Divídase en doce papeles.

I. Hidrocéfalo crónico. *D.* Dos papeles al dia.

7476. P. RESOLUTIVO (*Boinet*).

℥ Almidon en polvo. . . ʒv (150 gr.).
Sulfato de hierro. . . gxviij (1 gr.).
Clorhidrato de amon. gxviij (1 gr.).
Sabina en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Acetato de morfina. . gxviij (1 gr.).

M. Sirve en las curas de las úlceras del cuello de la matriz. Se aplica por medio de un pelotoncito de hilas cubierto de cerato, y se renueva esta cura cada dos dias.

7477. *Otro* (RICHTER).

℥ Azufre dorado de antimonio,
Calomelanos, ää. . . . gvj (3 dec.).
Cicuta en polvo. . . . ʒß (2 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).

Mézclese y divídase en seis tomas.

I. Hepatitis crónica. *D.* Una toma mañana y noche.

7478. *Otro* (RUPIPIUS).

℥ Calomel. al vapor. gviij (40 cent.).
Tártaro emético. . . gj (5 cent.).
Láud. de Sydenham. 8 gotas.
Azúcar blanca. . . . ʒij (8 gr.).

Hágase polvo y divídase en ocho dosis iguales.

I. Flegmasías de los órganos parenquimatosos. *D.* Una dosis cada dos horas.

7479. P. RESOLUTIVO Ó DIGESTIVO (*J. P. Frank*).

℥ Cremor de tártaro. . . . ʒß (16 gr.).
Tártaro emético. . . . . gj (5 cent.).

Mézclese bien y divídase en seis dosis iguales.

I. Calenturas biliosas y embarazos gástricos.

Obra casi siempre como purgante cuando se da una dosis de tarde en tarde.

7480. P. RESTAURANTE.

℥ Cacao tostado. . . . . lbß (250 gr.).
Arroz,
Azúcar, ää. . . . . ʒjv (125 gr.).
Canela. . . . . ʒj (4 gr.).

I. Enflaquecimiento, caquexia, marasmo, consuncion, convalecencia, gastritis crónica, bulimia, dispepsia. *D.* Dos cucharadas en una taza de leche ó caldo.

7481. P. RESTRICTIVOS DE NUECES DE CIPRÉS *ó Polvos restrictivos* (F. E.).

℥ Bol arménico. . . . . ʒij (8 gr.).
Raiz de bistorta,
Rosas encarnadas,
Bayas de arrayan,
Nueces de ciprés,
Incienso,
Sulfato de zinc, ää. . . . ʒj (32 gr.).

Háganse polvos S. A. muy finos.

I. y *D.* Mezclados con clara de huevo y aplicados exteriormente aprovechan en los flujos de sangre por las narices, en las almorranas y en otros: algunas veces se usan interiormente en las diarreas y en el esputo de sangre.

7482. P. DE ROBERTO THOMAS.

℥ Goma tragacanto. . . . ʒj (12 dec.).
Oxido de bismuto. gij á gx (15 á 50 cent.).

H. S. A. *I.* Gastrodinia. *D.* Se repite esta dosis tres veces al dia.

7483. P. DE ROSAS ROJAS (F. F.).

℥ Pétalos de rosas rojas. . . . c. s. q.

Se secan en la estufa y se pul-

verizan por contusion sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase t. I, p. 319.

Del mismo modo se preparan los polvos de los PÉTALOS DE VIOLETAS, los estigmas de AZAFRAN, las flores de ARNICA, MANZANILLA Y SANTÓNICO, y de todas las flores aisladas.

7484. P. DE ROSSEN DE ROSENSTEIN PARA LAS NODRIZAS.

℞ Magnesia blanca. . . . . ʒj (32 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).
Cáscaras de naranjas en polvo,
Sem. de hinojo en p., ãã. ʒj (4 gr.).
H. S. A. y divídase en doce dosis.

I. y *D.* Se dan dos ó tres al dia para aumentar la leche de las nodrizas, impedir que se agrie y facilitar la digestion.

7485. P. DE RUBIA Y QUINA (*Osiander*).

℞ Quina en polvo,
Rubia en polvo, ãã. . . ʒß (15 gr.).
Mézclese y divídase en ocho tomas.

I. Amenorrea en el curso de la tisis pulmonar. *D.* Una toma todos los dias.

7486. P. DE RUIBARBO (F. F.).

℞ Raiz de ruibarbo. . . . . c. s. q.

Se quebranta en el almirez ó se corta en pedazos, se pone á secar en la estufa, y se reduce despues á polvo sutil por contusion sin dejar residuo.

Del mismo modo se preparan los polvos de raiz de APIO, ARISTOLOQUIA LARGA Y REDONDA, BARDANA, CÁLAMO AROMÁTICO, BRIONIA, COLOMBO, CURCUMA, ELÉBORO BLANCO, ÉNULA CAMPANA, GALANGA, GENCIANA, GENGIBRE, JALAPA, LIRIO, PACIENCIA, PELITRE, PEONIA, VARO, ZEDOARIA Y FORMENTILA; y en general los de todas las raices que siendo jugosas y carnosas cuando están frescas, son compactas despues de secas, y no constan apenas de partes fibrosas: no obstante, se preparan tambien del mismo modo los polvos de las raices fibrosas de RATANIA Y ZARZAPARRILLA.

7487. P. DE RUIBARBO CON BELLADONA (*Hufeland*).

℞ Polvo de raiz de belladona. . . . . gx (5 dec.).
Polvo de ruibarbo. . . ʒij (24 dec.).
Hágase polvo y divídase en diez dosis.

I. Asma espasmódico, hipertrofia y degeneracion del hígado y del bazo, ictericia, palpitaciones simpáticas del corazon. *D.* Dos ó tres dosis al dia.

7488. P. DE RUIBARBO COMPUESTO (H. DE ING.).

℞ Ruibarbo,
Carbonato de potasa, ãã. ʒj (4 gr.)
Colombo. . . . . ʒij (8 gr.).
Mézclese. *D.* gx á gxx (5 á 10 dec.), dos ó tres veces al dia.

7489. P. DE RUIBARBO FERRUGINOSO (*Sachs*).

℞ Limaduras de hierro porfirizadas,
Polvo de ruibarbo, ãã. . ʒj (4 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).
Hágase polvo, que se dividirá en doce tomas.

I. Raquitis. *D.* Una toma al dia, aumentando poco á poco hasta tres ó cuatro papeles.

7490. P. DE RUIBARBO Y MERCURIO (H. DE ING.).

℞ Ruibarbo. . . . . ʒjv (125 gr.)
Calomelanos,
Gengibre. ãã. . . . ʒj (4 gr.).
M. D. Diez granos á gxxjv (5 á 12 dec.).

7491. P. DE RUIBARBO OPIADO.

℞ Extr. de opio en polvo. gij (1 dec.).
Ruibarbo en polvo. . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. seis papeles.

I. y *D.* Se usa uno al dia como

estomacal en las gastralgias. Si se desarrolla mucho ácido se añade 5j (4 gr.) de magnesia calcinada, y entonces se obtiene el polvo de ruibarbo y magnesia opiado.

7492. P. DE RUIBARBO COMPUESTOS (F. P.).

℞ Magnesia en polvo,
Ruibarbo en polvo, ãã. 5j (4 gr.).

Divídase en doce tomas. Se usa una antes de cada comida en el tratamiento de la pirosis y de la gastralgia.

7493. P. DE SABINA (F. F.).

℞ Sabina. . . . . c. s. q.

Se seca en la estufa y se pulveriza sin dejar residuo.

I. y *D.* Véase t. I, pág. 322.

Del mismo modo se pulverizan las hojas de DICTAMO CRÉTICO, TE Y GAYUBA.

7494. P. SACARINO EFERVESCENTE (*Davidson*).

℞ Azúcar en polvo. . . . ʒjv (125 gr.).
Sacaruro de vainilla. . ʒij (60 gr.).
Ácido tártrico. . . . . ʒij (60 gr.).
Bicarbonato de sosa. . ʒiij (90 gr.).

Mézclese y guárdese bien.

I. Cálculos ó arenillas de ácido úrico. *D.* Una cucharadã disuelta en medio vaso de agua, que se toma por la mañana en ayunas.

7495. P. DE SAL AMONIACO.

℞ Sal amoniaco. ʒjß á ʒiij (6 á 12 gr.).
Regaliz en polvo. . . . ʒiij (12 gr.).

Divídase en nueve tomas.

I. Flujos crónicos de las vías urinarias. *D.* Una toma cada tres horas en cocimiento de harina de avena mondada.

7496. P. DE SALEP.

℞ Salep. . . . . ʒi (32 gr.).
Sagú. . . . . ʒv (20 gr.).
Goma tragacanto. . . . ℈ʒjv (3 gr.).

M. I. Convalecencia de las calenturas graves, caquexia, calenturas tifoideas ó atáxico-adinámicas, cólera, diarrea. *D.* Una cucharadita pequeña de café cocida en una taza de leche.

7497. *Otro* (F. F.).

℞ Salep de Persia. . . . . c. s. q.

Se sumerge en agua fría por veinticuatro horas, se enjuga frotándole fuertemente con un lienzo áspero para quitarle la parte cortical, se seca en la estufa, se le reduce por contusion á un polvo muy fino, y se pasa por un tamiz fino de seda.

7498. P. DE SALICINA.

℞ Salicina. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Azúcar. . . . . ℈xc (5 gr.).

Mézclese y divídase en tres tomas.

I. Calenturas intermitentes. *D.* Se toman con media hora de intervalo.

7499. P. SALINO COMPUESTO (H. DE ING.).

℞ Sulfato de magnesia. 4
Sal comun. 4
Sulfato de potasa. 3

Mézclese, pero se triturarán separadamente cada uno de los ingredientes. *D.* Una cucharadita de café en dos cuartillos de agua.

7500. P. DE SALVADO COMPUESTO *ó Salvado contra los sabañones* (*Baudot*).

℞ Borato de sosa. . . . . ʒß (15 gr.).
Alumbre,
Benjuí, ãã. . . . . ʒijß (10 gr.).
Mostaza. . . . . ʒij (60 gr.).
Raiz de lirio,
Salvado, ãã. . . . . ʒjß (45 gr.).
Salvado de almendras. ʒv (150 gr.).

Se mezclan estas sustancias

despues de haberlas reducido á polvo, y se usa con un poco de agua para prevenir los sabañones. V. n. 7115.

7501. P. DE SANTÓNICO COMPUESTO.

℞ Santónico,
Tanaceto, ãã. . . . . ℈ij.v (3 gr.).
Sulfato de hierro. . . . ℈xviij (1 gr.).
Divídase en seis papeles.
I. Lombrices, ascárides, helmintiasis. *D.* Un papel cada dos horas en miel, leche, etc.

7502. P. SATURNINO OPIADO (*Hufeland*).

℞ Acetato de plomo,
Opio purificado, ãã. . . ℈vj (3 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ℥j (12 dec.).
H. S. A. polvo que se dividirá en doce tomas.
I. Sudores colicuativos. *D.* Una toma mañana y noche.

7503. P. SEDANTE (*Gumprech*).

℞ Lactucario. . . . . ℈jv (2 dec.).
Azúcar de leche. . . . . 5j (4 gr.)
H. S. A. y divídase en cuatro dosis.
I. Segundo ó tercer período de la coqueluche. *D.* Un papel cada dos horas.

7504. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Opio. . . . . ℈j (5 cent.).
Nitrato de potasa. . . ℈xij (6 dec.).
Azúcar blanca. . . . . ℥ij (24 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
I. Afecciones reumáticas. *D.* Un papel cada dos horas.

7505. *Otro* (REGAMIER).

℞ Borax. . . . ℈x á ℈xx (5 á 10 dec.).
Azúcar en polvo. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese.

7506. P. SEDANTE AZUFRADO (*Richter*).

℞ Extracto de beleño,
Extracto de cicuta, ãã. ℥ß (5 dec.).
Azufre porfirizado,
Azúcar blanca, ãã. . . ℥ij (24 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.
I. Tos seca, los espasmódica. *D.* Una toma tres veces al dia.

7507. P. SEDANTE Y DIAFORÉTICO.

℞ Polvos de Dower,
Polvo de James, ãã. . ℈jv (2 dec.).
M. I. Dolores reumáticos rebeldes. *D.* Se da esta dosis cada cuatro horas.

7508. P. DE SEDLITZ, *Polvo gasífero ó sedlitz powers.*

℞ Acido tártrico en p. ℥vj (24 gr.).
Divídase en nueve papeles blancos.
Bicarbonato de sosa. ℥vj (24 gr.).
Tartrato de potasa y sosa. . . . . ℥xviij (72 gr.).
Mézclese y divídase en nueve papeles azules.
Para usarle se echa el polvo contenido en uno de los papeles blancos en un vaso grande que tenga el tercio de su capacidad de agua, se añade el polvo que contiene el papel azul, y se bebe al instante.
I. Se usa como refrigerante, antiemético y laxante, en las calenturas biliosas y embarazo gástrico.

7509. AGUA DE SEDLITZ.

℞ Sulfato de magnesia. ℥ijß (10 gr.).
Cloruro de magnesio. ℈xviij (1 gr.).
Agua gaseosa de tres volúmenes. . . . . ℥xv (600 gr.).
Disuélvase. *I.* Flegmasías cró-

nicas, neumonia, hepatitis, bronquitis, embarazo de las primeras vias, calenturas biliosas, calentura mucosa, estreñimiento, disenteria, lepra, eclima, eczema, efélides, acne, erisipela, afecciones tifoideas, ictericia, hidropesía, hipocondría, corea, gastrorrea, ovaritis, cólera, adenitis, albuminuria, amaurosis, pasmo, conjuntivitis, aneurisma, apoplejía, calentura, cólicos y hematuria. *D.* A vasos.

7510. P. DE SEDLITZ COMPUESTO (*Planche*).

℞ Sulfato de magnesia purificado y reducido á polvo fino. . . 3ij (8 gr.).
Bicarbonato de sosa. . 3ij (24 dec.).
Se mezclan exactamente.
Se señala este polvo con el número 1.
Acido tartárico puro en polvo fino. . . . . 3ß (2 gr.).
Se señala este polvo con el número 2.
Se ponen los dos papeles en ℔ß (250 gr.) de agua, y se toma al tiempo de hacer la efervescencia.

7511. P. DE SELTZ.

℞ Acido tártrico en polv. 3vß (22 gr.).
Se divide en doce papeles blancos.
Bicarbonato de sosa en polvo. . . . . 3vj (24 gr.).
Se divide en doce papeles azules.
Se disuelve el ácido en un vaso grande lleno de agua hasta la tercera parte, se añade el bicarbonato, se agita y se bebe en el momento de la efervescencia.

7512. P. DE SELTZ, *Polvo gasifero simple*, *soda*, *powders*.

℞ Acido tártrico en polvo. 3jv (16 gr.).
Bicarbonato de sosa. . . 3vj (24 gr.).
Se divide el ácido tártrico en doce partes, que se ponen en papel blanco, y el bicarbonato en otros doce papeles azules.

Se disuelve el papel del ácido en un vaso de agua grande lleno solo hasta la tercera parte, se añade el papel del polvo alcalino, se agita y se bebe despues.

Este polvo tiene sabor agrillo aunque el bicarbonato se encuentra en exceso, y depende de que no se ha disuelto completamente en el momento de tomarle, y además en que está impregnado de ácido carbónico.

7513. P. DE SEN COMPUESTO *ó Polvo antiartritico purgante* (H. M. F.).

℞ Sen en polvo,
Canela en polvo,
Crémor de tártaro en polvo,
Goma arábiga en p. ãã. gviij (4 dec.).
Palo de guayaco en polvo,
Zarzaparrilla en polvo,
Escamon. en polv., ãã. gjv (2 dec.).
M. D. Para una dosis.

7514. P. DE SEN COMPUESTOS (F. P.).

℞ Bitartrato de potasa.	8
Hojas de sen.	8
Escamonea de Alepo.	2
Gengibre.	1

H. S. A. *I.* Es purgante. *D.* 3ß á 3ij (15 á 60 gr.).

7515. P. DE SENGY.

℞ Polvo de esponja de color de rosa. . . . 5v (20 gr.).
Clorhidrato de amon. gxviij (4 gr.).
Carbon vegetal. . . . gxviij (4 gr.).
Se tuesta las esponjas finas lo menos posible y se las reduce á polvo. V. núm. 7239.

D. gxviij (1 gr.) á los de menos de diez años; á los demás gxviij por la mañana, al medio dia y á la noche. Se introduce el polvo en el fondo de la boca con una cucharada de café y se le traga todo y en seco. Es muy eficaz.

7516. P. DE SEYFFER.

℞ Bioduro de mercur. ℊj (5 cent.).
Alcohol. . . . . 2 gotas.
Se disuelve y se añade:
Calomelanos preparados al vapor. . . ℊviij (40 cent.).
Se tritura y despues se añade:
Azúcar. . . . . 3ijß (10 gr.).
H. S. A. un polvo muy homogéneo que se divide en treinta y dos dosis.

I. Hidrocéfalo agudo. *D.* Se prescribe una dosis por la mañana, otra al medio dia y otra por la noche á los niños de tres á seis años.

7517. P. DE SOBREOXALATO DE POTASA (F. F.).

℞ Sobreoxalato de potasa. . . . c. s. q.
Se pulveriza por contusion en un mortero de vidrio ó de porcelana.

Del mismo modo se preparan los polvos de ÁCIDO TÁRTRICO, ó CÍTRICO, el CRÉMOR de TÁRTARO SOLUBLE, el TÁRTARO EMÉTICO, el MERCURIO DULCE y el SUBLIMADO CORROSIVO, y en general los de todos los ácidos cristalizados, las sales ácidas, y otras varias que sin ser ácidas atacan con facilidad los almireces metálicos.

7518. P. DE SUCINO AZUCARADO ó *Polvo fumigatorio sucinado.*

℞ Sucino. 1
Azúcar. 1
Mézclense.

7519. P. SULFURO-MAGNESIANO (*Biett*).

℞ Azufre sublimado,
Magnesia, ää. . . . . 3ß (15 gr.).
Divídase en diez y ocho papeles. Se da uno diariamente en el eczema crónico, acne, lupus, impétigo, y en las afecciones escamosas ó impetiginosas.

7520. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . . ℊxij (6 dec.).
Azúcar blanca en polv. 3ß (2 gr.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Dos á seis papeles, entre obleas ó en una cucharada de miel.

7521. P. DE SULFATO DE QUININA Y TABACO (*Huy*).

℞ Sulfato de quinina. . ℊxv (75 cent.).
Tabaco rapé. . . . . 3j (30 gr.).
Mézclese con cuidado.

I. Dolores de cabeza nerviosos intermitentes. *D.* Se toma como el tabaco rapé. V. n. 7219.

7522. P. SULFUROSO ACIDULO (*Sundelin*).

℞ Sulfuro de magnesia. . 3j (4 gr.).
Acido tártrico. . . . . 3ij (24 dec.).
Azúcar blanca . . . . 3ij (8 gr.).
Divídase en diez y ocho papeles.

I. Salivacion mercurial. *D.* Un papel cada tres horas.

7523. P. DE SULFURO DE ANTIMONIO.

℞ Sulfuro de antimonio. 1
Asta de ciervo. 1
I. Es excitante y diaforético, que se usa contra las neuralgias, y principalmente la facial. *D.* ℊvj á ℊv (3 á 5 dec.) en bolos ó píldoras.

7524. P. DE SULFURO DE ESTAÑO COMPUESTO (F. P.).

℞ Sulfuro de estaño en polvo 4
Raiz de jalapa en polvo. 2
Asa fétida en polvo. 1
H. S. A. *I.* Tenia, lombrices. *D.* 9ß á 9j (6 á 12 dec.) tres veces al dia.

7525. P. DE SULFURO MAGNESIANO.

℞ Azufre lavado,
Magnesia calcinada, ãã. ʒjv (16 gr.).
H. S. A. diez y ocho papeles.
I. Eczema crónico y soriasis. *D.* Se toma un papel cada dia.

7526. P. DE SULFURO DE MERCURIO Y ESTAÑO (F. P.).

℞ Estaño reducido á polvo fino. . . . 4
Sulfuro negro de mercurio. 1
H. S. A. *I.* Ténia, lombrices. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) con miel ó triaca.

7527. P. DE SULFURO NEGRO DE MERCURIO COMPUESTO (F. P.).

℞ Raiz de valeriana silvestre en polvo. 2
Simiente de Alejandría. 1
Sulfuro negro de mercurio. 1
M. I. Lombrices, ténia. *D.* ℈jv á ℈xij (2 á 6 dec.) y aun mas.

7528. P. SULFURO TÁRTRICO.

℞ Sulfuro de magnesia. . ʒj (4 gr.).
Acido tártrico. . . . . ℈ij,jv (3 gr.).
Azúcar. . . . . ℈xc (5 gr.).
H. S. A. doce papeles.
I. Tialismo. *D.* Un papel cada tres horas en media taza de limonada.

7529. P. TENÍFUGO (*Dupuis*).

℞ Limaduras de estaño. ʒj (12 dec.).
Tanino. . . . . ℈x (50 cent.).
Gutagamba. . . . . ℈x (50 cent.).
Dicosácaro de cajeput. ℈v (25 cent.).
Divídase en dos papeles.
D. Uno á las seis de la mañana y otro media hora despues.

7530. P. TISANÍFERO.

℞ Goma arábiga,
Extracto de regaliz, ãã. ʒij (60 gr.).
Nitrato de potasa. . . . ʒij (8 gr.).
M. D. Una cucharadita de café en un vaso de agua.

7531. P. TÓNICO.

℞ Quina en polvo. . . . ʒj (4 gr.).
Genciana en polvo,
Serpentaria de Virginia, ãã. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor en polvo. . . ℈xij (6 dec.).
M. I. Calenturas intermitentes. *D.* En dos tomas.

7532. *Otro*, n. 2.

℞ Quina roja. . . . . ʒj (4 gr.).
Café tostado,
Cacao tostado, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. cinco papeles.
I. Dispepsia, anorexia, clorosis. *D.* Un papel mañana y noche.

7533. *Otro*, n. 3.

℞ Quina roja en polvo,
Ruibarbo, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Canela. . . . . ʒß (2 gr.).
Opio. . . . . ℈vj (3 dec.).
Divídase en papeles de ℈xij (6 dec.).
I. Este polvo es útil en algunas atonías del estomago.

7534. *Otro* (H. DE AMÉR.).

℞ Tartrato de potasa y hierro. . . . . ℈x (50 cent.).
Colombo. . . . . ℈xv (75 cent.).
M. D. Una dosis cada cinco horas.

7535. *Otro* (H. DE AMÉR.).

℞ Subcarbonato de hierro,
Colombo,
Ruibarbo,
Gengibre, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
Mézclese y divídase en doce papeles.
D. Tres al dia.

7536. P. TÓNICO Y ASTRINGENTE (*Otto*).

℞ Sulfato de quinina. ℊij (15 cent.).
Oxido negro de hier. ℊx (50 cent.).
Regaliz en polvo. . . ℊxij (60 cent.).
Esencia de yerbab. 1 gota.

Mézclese y divídase en doce papeles.

I. Gonorreas rebeldes. *D.* Un papel cuatro veces al dia.

7537. P. TÓNICO ALOÉTICO (*Bories*).

℞ Quina gris. . . . . ℥ij (64 gr.).
Nuez de agalla. . . . . ʒiij (12 gr.).
Oxido negro de hierro,
Acibar sucotrino, ãã. . ʒij (8 gr.).

M. I. Sirve para fortificar los estómagos perezosos de los sugetos á quienes falta el apetito; conviene para facilitar las reglas difíciles por atonia, lombrices. *D.* De ℊx á ℊxx (5 á 10 dec.) en la primer cucharada de sopa.

7538. P. TÓNICO DE BRERA.

℞ Oxido negro de hierro,
Colombo, ãã. . . . . ℊxc (5 gr.).
Cáscara de naranja. . ʒijß (10 gr.).
Canela. . . . . ℊxviij (1 gr.).

Divídase en nueve papeles.

I. Clorosis, bocio, amenorrea, leucorrea, raquitis. *D.* Tres papeles al dia.

7539. P. TÓNICO DE BUCHNER (*Radius*).

℞ Vitriolo verde.
Bicarb. de sosa, ãã. ℊj (5 cent.).
Azúcar. . . . . ℊvj (30 cent.).

Se toma en un vaso de agua azucarada.

7540. P. TÓNICO Y ESTIMULANTE.

℞ Quina. . . . . ʒß (2 gr.).
Canela. . . . . ℊvj (3 dec.).

M. I. Convalecencia de las calenturas intermitentes, para reanimar las fuerzas digestivas.

7541. P. TÓNICO Y ESTOMACAL.

℞ Limaduras de hierro,
Quina, ãã. . . . . ʒij (8 gr.).
Canela. . . . . ʒj (4 gr.).
Crémor de tártaro. . . ʒß (15 gr.).

Mézclese y divídase en veinticuatro papeles.

I. Clorosis. *D.* Un papel por la mañana y otro por la noche en un poco de agua azucarada.

7542. P. TÓNICO Y EXPECTORANTE DE BENJUÍ.

℞ Acido benzóico. . . . . ʒß (2 gr.).
Ipecacuana,
Alcanfor,
Azufre dorado de antimonio, ãã. . . . . ℊvj (3 dec.).
Oleosácaro de anís. . . ʒj (4 gr.).

Mézclese y divídase en ocho papeles.

I. Catarro crónico, neumonía, bronquitis, astenia. *D.* Un papel cada tres horas.

7543. P. TÓNICO INCISIVO (*Lassone*).

℞ Polvo de regaliz. . . . ʒj (4 gr.).
Catecú,
Canela,
Lirio, ãã. . . . . ʒj (12 dec.).
Carbonato de sosa,
Deutóxido de hier., ãã. ℊxij (6 dec.).
Ipecacuana. . . . . ℊiv (2 dec.).
Quermes. . . . . ℊij (1 dec.).

H. S. A. y divídase en treinta dosis.

I. y *D.* Se dan en el embarazo gástrico tres dosis cubiertas de un pedazo de hostia mojada, mediando un cuarto de hora de intervalo entre cada dosis.

Nota. Se toman una ó dos horas antes de comer.

7544. P. TÓNICO PURGANTE.

℞ Sulfato de magnesia.
Quina, ãã. . . . . ʒvj (24 gr.).

Mézclese y divídase en seis papeles.

D. Uno cada dos horas.

7545. P. DE TONQUIN DE REUSS *ó Polvo de almizcle compuesto.*

℞ Almizcle. . . . . 5jß (6 gr.).
Raiz de valeriana en p. 5j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . 5ß (2 gr.)

H. S. A. *I.* Enfermedades convulsivas, espasmos, histérico, epilepsia, hidrofobia, gastritis, hipocondría. *D.* gjv á gxij (2 á 6 dec.).

7546. P. DE TORBISCO (F. F.).

℞ Cortezas de torbisco. . . . . c. s. q.

Se cortan al través en pedacitos, se desecan en la estufa y se pulverizan por contusion hasta que no quede mas que una pelusa voluminosa.

Esta pulverizacion es peligrosa para el que la ejecuta, por lo que debe tenerse mucho cuidado en tapar el mortero y el tamiz.

Del mismo modo se pulverizan las cortezas de OLMO, SIMARUBA, SÁUCE, SAUCO y todas las cortezas muy fibrosas.

7547. P. DE LOS TRES SÁNDALOS (F. M.).

℞ Polvo de los tres sándalos,
Rosas encarnadas,
Rasuras de regaliz, ää. 5ß (16 gr.).
Simiente de escarola,
Simiente de verdolaga,
Simiente de melon,
Goma tragacanto,
Goma arábiga, ää. . . . 5j (4 gr.).
Rasuras de marfil. . . . 5ij (8 gr.).

Hágase polvo S. A.

I. Ardores del estómago y del hígado, disenterías y calentura hética. *D.* Desde 5ß á 9jv (2 á 5 gr.).

7548. P. DE LOS TRES SÁNDALOS *ó Especies de los tres sándalos.*

℞ Sándalo citrino.	95
Sándalo blanco.	95
Sándalo rojo.	99
Semillas de verdolaga. . . .	70
Rosas.	1010
Violetas.	150
Ruibarbo.	70
Almidon.	50
Marfil calcinado.	70
Zumo de regaliz.	70
Goma arábiga.	50
Goma tragacanto.	50

H. S. A. *D.* ℊxviij á 5j (1 á 4 gr.).

7549. P. DE VAINILLA (F. F.).

℞ Vainilla. . . . . 5j (32 gr.).
Azúcar. . . . . 5iij (96 gr.).

Se corta con tijeras la vainilla en pedazos muy pequeños; se tritura despues en un mortero de mármol con el azúcar y se pasa por un tamiz de seda.

M. Sirve para aromatizar con vainilla diferentes preparaciones.

7550. P. DE VALERIANA (F. F.).

℞ Raiz de valeriana. . . . . c. s. q.

Se quebranta ligeramente la raiz en un almirez con mano de madera, se criba para separar la tierra, se seca en la estufa y se pulveriza en almirez de bronce sin dejar residuo.

Del mismo modo se obtienen los polvos de raices de ANGÉLICA, ARNICA, ÁSARO, CONTRAYERBA, ELÉBORO NEGRO, SERPENTARIA VIRGINIANA, VENCETÓSIGO, y en general de todas las raices delgadas, poco leñosas y que por estar reunidas en hacecillos retienen fácilmente la tierra.

7551. P. DE VALERIANA AROMÁTICO *ó Polvo nervino* (H. M. F.).

℞ Valeriana en polvo. . . 5ß (2 gr.).
Canela en polvo. . . . . gvj 3 dec.).

M. D. Se toma de una vez.

I. Afecciones nerviosas.

7552. P. VERMÍFUGO.

℞ Santónico. . . . . ℊxij (6 dec.).

Calomelanos. . . . . ℊx (5 dec.).
Azúcar en polvo. . . ℊxx (10 dec.).
Mézclese y divídase en cuatro papeles.

I. Ascárides lumbricoides. *D.* Dos papeles al dia en miel ó en dulce.

7553. P. VERMICIDA.

℞ Helecho macho. . . . ʒj (30 gr.).
Escamonea. . . . . ℊx (5 dec.).
Gutagamba,
Calomelanos, ãã. . . . ℊxjv (7 dec.).
Divídase en tres papeles.

I. Helmintiasis, afecciones verminosas, diarreas. *D.* Un papel cada tres horas.

7554. P. VERMÍFUGO.

℞ Helecho macho. 1
Santónico. 1
Ruibarbo. 1
Musgo de Córcega. 1
M. D. ℊx á ℊxij (5 á 6 dec.) para los niños, y ʒj (4 gr.) para los adultos.

7555. *Otro*, n. 2.

℞ Santónico en polvo. ʒiij (12 gr.).
Calomelanos. . . . ℊiij (15 cent.).
Mézclese y divídase en tres papeles.

D. Se dan contra las ascárides y las lombrices en una cucharada de miel, uno por la noche al acostarse, otro al dia siguiente por la mañana, y otro al inmediato dia al levantarse.

7556. *Otro*, n. 3.

℞ Coralina de Córcega. 1
Santónico. 1
Semillas de ajenjos. 1
Semillas de tanaceto. 1
Hojas de escordio. 1
Hojas de sen. 1
Ruibarbo. 1
H. S. A. *D.* ℊvj (3 dec.) para los niños y hasta ʒj (4 gr.) para los adultos.

7557. *Otro* (BEEK).

℞ Mercurio dulce. . . ℊxxjv (12 dec.).
Cuerno de ciervo calcinado,
Cinabrio, ãã. . . . . gxij (6 dec.).
M. D. Se da una dósis cada cuatro á cinco horas.

Por la tarde se bebe ʒij (60 gr.) de aceite de almendras; al dia siguiente se toma en ayunas en jarabe la tercera parte del polvo preparado con
Helecho. . . . . ʒj (4 gr.).
Jalapa,
Gutagamba,
Cardo santo,
Carbon animal, ãã. . . ʒß (2 gr.).
Si la ténia no sale, se toma la segunda tercera parte á las dos horas y la última tercera parte dos horas despues.

7558. *Otro* (BRUGNATELLY).

℞ Estaño de Malaca en limaduras. . . . . ʒiij (90 gr.).
Azufre sublimado. . . ʒj (30 gr.).
Se calienta esta mezcla en un crisol sobre las ascuas hasta que se manifiesta una llama muy viva. Se aparta el crisol del fuego, se le tapa, se le deja enfriar, se pulveriza y se tamiza el sulfuro. Se le conserva en una vasija de vidrio.

I. y *D.* Se da este polvo, ya solo ó ya mezclado con azúcar ó magnesia, á la dosis de ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) cuatro veces al dia, á las personas que tienen lombrices ó la ténia.

7559. *Otro* (F. F.).

℞ Polvo de musgo de Córcega,
Polvo de santónico, ãã. ʒj (32 gr.).
Polvo de ruibarbo. . . . ʒß (16 gr.).
Se mezclan exactamente y se guardan para el uso en un frasco tapado.

D. Se puede dar en leche ó agua á la dosis de ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.) para los niños.

7560. P. VERMÍFUGO (H. DE AL.).

℞ Helecho macho. . . . ʒj (12 dec.).
Guiagamba. . . . . gij (1 dec.).
Mézclese.
D. Para una dosis.

7561. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Limaduras de estaño. ʒij (8 gr.).
Sulfato de hierro. . . gv (25 cent.).
Se trituran con cuidado y se divide en seis papeles.
I. Afecciones verminosas, helmintiasis, tenia. *D.* Un papel cada dos horas.

7562. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Santónico. . . . . ʒß (2 gr.).
Tartrato de potasa. . . ʒiij (12 gr.).
Azúcar blanca. . . . . ʒij (8 gr.).
Mézclese y divídase en diez y seis papeles. *D.* Uno cada tres ó cuatro horas.

7563. *Otro* (GOELIS).

℞ Calomelanos. . . . . gij (1 dec.).
Valeriana. . . . . gxx (1 gr.).
Badiana. . . . . gjv (2 dec.).
Azúcar. . . . . ʒj (4 gr.).
Divídase en diez y seis papeles.
D. Uno por la mañana en una cucharada de agua azucarada.

7564. P. VERMIFUGO DE ASA FÉTIDA (*Augustin*).

℞ Asa fétida. . . . . ʒß (2 gr.).
Protocloruro de merc. gv (25 cent.).
Cenizla. . . . . ʒß (2 gr.).
Esencia de menta piper. 3 gotas.
Divídase en diez papeles.
I. Afecciones verminosas. *D.* Un papel cada tres horas.

7565. P. VERMIFUGO DE ESTAÑO.

℞ Estaño reducido á polvo fino. . . . . ʒj (32 gr.).
Sulfuro negro de merc. ʒij (8 gr.).
M. S. A. y divídase en seis dosis iguales.
D. Se da una en un poco de jarabe, de triaca ó de miel, dos veces al dia.

7566. P. VERMIFUGO MERCURIAL (F. F. 1818).

℞ Sulfuro negro de mercurio. 1
Polvos cornaquinos. 1
Se mezclan con cuidado.
D. gv á gx (25 á 30 cent.) y aun gxv (35 cent.).

7567. P. VERMIFUGO PURGANTE (*Bally*).

℞ Azúcar muy refinada. . ʒiij (12 gr.).
Ruibarbo,
Escamonea,
Protocloruro de mercurio sublimado y lavado, ãã. . . . . ʒj (4 gr.).
M. S. A. *D.* gx á gxij (3 á 6 dec.) para los niños, y ʒj (4 gr.) una ó dos veces á la semana para los adultos.

7568. P. DE VERNIX ó *Polvo de vitriolo compuesto.*

℞ Sulfato de cobre,
Sulfato de zinc,
Alumbre calcinado,
Carbonato de plomo,
Tierra sellada, ãã. . . . ʒj (30 gr.).
Se funden los sulfatos en un crisol, se echan en un mortero, se pulverizan, se añaden las dos sustancias y se pasa por un tamiz.
I. y *D.* Se aplica exteriormente c. s. para detener la sangre. Se usa tambien en inyecciones en la gonorrea.

7569. P. DE VICHY.

Se compone de las mismas sales que el agua de Vichy, solo que en lugar de bicarbonato de sosa se usa el carbonato simple.

Se emplea disolviéndole en agua y mejor si es gaseosa.

7570. P. VOMITIVO.

℞ Ipecacuana. . . . . ʒj (12 dec.).
Emético. . . . . ʒj (5 cent.).
Mézclese y divídase en tres papeles.

I. Embarazo gástrico, calentura biliosa, acne, cálculos. *D.* Un papel cada cuarto de hora. Si bastan los dos primeros, no se da el tercero. Se facilita el vómito bebiendo mucha agua caliente. Es un buen emético.

7571. *Otro* (HELVETIUS).

℞ Crémor de tártaro. . lbß (250 gr.).
Emético. . . . . ℥j (30 gr.).
Ipecacuana. . . . . ℥ß (15 gr.).
Se trituran cuidadosamente y se pasan por un tamiz de seda.

I. y *D.* Se da á la dosis de ɡxviij (1 gr.) para excitar el vómito sin sacudidas violentas.

Nota. Algunas veces es purgante.

7572. *Otro* (H. DE AL.).

℞ Ipecacuana,
Azúcar blanca, ā. . . ʒj (12 dec.
Mézclese y divídase en cuatro papeles.

D. Uno cada cuarto de hora hasta producir el vómito.

7573. P. VOMITIVO COMPUESTO.

℞ Tártaro emético. . . ɡijß (12 cent.).
Ipecacuana. . . . . ʒij (24 dec.).
Almidon. . . . . ʒß (2 gr.).
Divídase en tres papeles.

D. Uno de cuarto en cuarto de hora.

7574. P. DE WENDT.

℞ Subnit. de bismuto. ɡxij (6 dec.).
Extracto de lechuga virosa. . . . . ɡxxjv (12 dec. .
Ipecacuana en polv. ɡiij (15 cent.).
Eleosácaro de menta piperita. . . . ɡlx (30 dec.).
Mézclese y divídase en seis papeles.

I. Calambres de estómago.

POMADAS.

7575. POMADA CON ACEITE DE BREA (*Giraud*).

℞ Aceite de pirelaina de brea. ʒij á ʒjv (8 á 15 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Soriasis. *D.* En fricciones.

7576. P. DE ACEITE DE CROTON.

℞ Manteca. 5
Cera. 1
Se funde y cuando esté casi fria la mezcla se añade:
Aceite de croton. 2

I. Es rubefaciente y puede servir para los vejigatorios.

7577. P. DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO (*Brefeld*).

℞ Aceite de higado de bacalao. . . . . ʒijß (10 gr.).
Acetato de plomo liq. ɡxc (5 gr.).
Manteca. . . . . ʒijß (10 gr.).
M. I. Ulceras escrofulosas.

7578. *Otra* (CARRON DE VILLARDS).

℞ Extracto de hollin. 2
Ungüento cetrino. 4
Aceite de higado de bacalao. . 2
Tuétano de vaca fundido. . . . 48
H. S. A. *I.* Rubicundez cronica de los bordes de los párpados

7579. P. DE ACEITE VOLÁTIL DE ALMENDRAS AMARGAS.

℞ Esencia de almendras amargas,
Manteca de cacao, ää. . 5j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Glaucoma, iritis y para combatir los dolores neurálgicos. *D.* El volumen de un guisante en fricciones, de hora en hora, en la frente y sienes.

7580. P. DE ACETATO DE MORFINA *ó Pomada calmante.*

℞ Acetato de morfina. . . gvj (3 dec.).
Manteca. . . . . 5ij (8 gr.).

M. I. En fricciones en los puntos doloridos.

7581. P. DE ACETATO DE PLOMO.

℞ Acetato de plomo. . . gxviij (4 gr.).
Corcho quemado. . . 5ß (15 gr.).
Manteca fresca. . . . 5ij (60 gr.).
Extracto de belladon. gjs (50 cent.).
Láudano líquido. . . . 5ß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorroides dolorosas, eczema, pitiriasis, pórrigo, congelacion, erisipela, blefaritis, epinictis, encantis. *D.* En fricciones.

7582. P. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar,
Extracto de ajenjos, ää. 5ij (8 gr.).
Manteca de cerdo. . . . 5j (30 gr.).

M. I. Afecciones verminosas, mareo, blenorragia, ovaritis, amenorrea. *D.* En fricciones al aldómen.

7583. P. DE ACÍBAR.

℞ Acíbar . . . . . 5ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 5j (32 gr.).

M. I. Se usa en fricciones como vermífuga.

7584. P. CON EL ACIDO ARSENIOSO.

℞ Acido arsenioso. gij, gv ó gvij (10, 25 ó 35 cent.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).

M. I. Lupus.

7585. P. DE ACIDO FOSFÓRICO.

℞ Acido fosfórico á 45°. 1
Manteca de cerdo. 8

M. I. Se ha alabado esta pomada contra los tumores huesosos de los raquíticos.

7586. P. DE ACONITINA (*Turnbull*).

℞ Aconitina. . . . . gijß (12 cent.).
Alcohol. . . . . 6 gotas.
Manteca. . . . . 5j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Produce muy buenos efectos en las neuralgias, neuralgia facial, etc. *D.* En fricciones.

7587. P. DE ACÓNITO.

℞ Extracto de acónito. . . 5j (4 gr.).
Manteca de puerco. . . 5j (30 gr.).

H. S. A.

Del mismo modo se preparan las pomadas de BELLADONA, CICUTA, DIGITAL, BELEÑO, YERBAMORA Y ESTRAMONIO.

Tambien se podrian preparar cociendo una parte de la planta con dos de manteca, del mismo modo que la de laurel.

7588. P. ALCALINA (*Brierre de Boismont*).

℞ Carbonato de potasa. . 5ijß (10 gr.).
Manteca . . . . . 5j (30 gr.).

M. I. Comezon de las partes genitales ó al rededor del ano, acompañadas de herpes ó eczema. Se emplea comunmente con lociones hechas con el cocimiento de perifollo.

7589. P. ALCALINA ALCANFORADA (*Cazenave*).

℞ Subcarbon. de potasa. gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . 5v (20 gr.).
Alcanfor. . . . . giij (15 cent.).

H. S. A. *I.* Es muy útil contra la sicosis.

7590. P. ALCALINA (*Bielt*).

℞ Subcarbonato de potasa. ʒij (8 gr.).
Manteca purificada. . . ʒij (64 gr.).

M. I. Afecciones papulosas, pórrigo.

7591. P. ALCALINA DE CULLERIER (F. P.).

℞ Subcarbonato de potasa. ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).
Vino de opio compuesto. ʒj (4 gr.).

M. I. Afecciones papulosas y pórrigo.

7592. P. ALCALINA COMPUESTA (*Bielt*).

℞ Subcarbonato de sosa. ʒij (8 gr.).
Extracto de opio. . . . ℊx (5 dec.).
Cal apagada. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Prúrigo.

7593. P. ALCALINA *ó Pomada depilatoria.*

℞ Sosa de Alicante. . . . ʒiij (12 gr.)
Cal apagada. . . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

Se reduce la sosa de Alicante á polvo fino, se añade la cal y la manteca, y se mezclan exactamente.

I. Tiña.

7594. P. ALCALINA OPIADA (*Gibert*).

℞ Carbonato de potasa. 100
Láudano de Sydenham. 50
Manteca. 850

M. I. Prúrigo, líquen. *D.* En fricciones mañana y noche.

7595. P. ALCANFORADA.

℞ Alcanfor en polvo,
Oxido de zinc, ãã. . ℊiij (15 cent.).
Manteca fresca. . . . ʒiij (12 gr.).
Esperma de ballena. ʒij (64 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒiij (96 gr.).

Se funden los cuerpos grasos, y triturando se añade el alcanfor y el óxido de zinc.

I. Ciertas enfermedades de ojos y para impedir que los párpados se peguen durante el sueño. *D.* Se extiende en pedazos estrechos de lienzo fino, que se aplican despues sobre el borde libre de los párpados y se sostienen con una venda.

7596. *Otra*, n. 2.

℞ Alcanfor. . . . . ℊjx (50 cent.).
Petróleo. . . . . ʒjß (6 gr.).
Ungüento populeon. . ʒvj (24 gr.).

M. I. Ninfomanía, sífilides, blenorragia, priapismo, cistitis, disuria, sabañones, heridas, grietas, quemaduras, crup, efélides, erisipela, mammitis. *D.* En fricciones.

7597. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Calomelanos. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊjv (3 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Herpes de la cara.

7598. *Otra* (RASPAIL).

℞ Manteca. 3

Se funde en el baño maría y se añade:

Alcanfor en polvo. 1

Se menea hasta que esté bien disuelto el alcanfor.

I. Escoriaciones, úlceras, dolores.

7599. P. DE ALIBERT.

℞ Sosa de Alicante bien pulverizada,
Sulfato de potasa en polvo, ãã. . . . . ʒiij (12 gr.).
Manteca. . . . . ʒiij (96 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Tiña, favus, lepra. *D.* Se frota todos los dias la cabeza de los tiñosos con esta pomada, despues de haber hecho caer las

costras ó las escamas por medio de cataplasmas emolientes.

Se cortan los cabellos bastante cerca de la cabeza para hacer mejor las fricciones, y se cubre despues el cuero cabelludo con un papel de estraza.

7600. P. ALOÉTICA (*Rognetta*).

℞ Acibar. . . . . ℥ij (60 gr.).
Petróleo,
Hiel de buey, ää. . ℥iij (90 gr.).
Grasa purificada. . . ℔ij (1000 gr.).

Se mezcla todo á fuego lento y se añade poco á poco la grasa.

I. Diarrea inflamatoria de los niños y como vermífugo. *D.* ʒj á ℥ij (30 á 60 gr.) en fricciones al vientre.

7601. P. AMARILLA DE FRAY COSME.

℞ Cera amarilla. . . . . ℥j (32 gr.).
Aceite rosado. . . . . ℥jß (48 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈xv (75 cent.).
Extracto de Saturno. ℥v (160 gr.).

Mézclese S. A.

Se extiende en un lienzo y se aplica á la úlcera cancerosa despues de haber usado la pasta cáustica de Fray Cosme, v. número 4737, y cuando se haya caido el pedazo de yesca que se aplica inmediatamente.

7602. *Otra* (F. DE CERDEÑA).

℞ Carbonato de amon. ℈ljv (3 gr.).
Cominos,
Manzanilla, ää. . . . . ℥ijß (10 gr.).
Alcanfor disuelto en aceite de trementina. ʒß (2 gr.).
Rob de saúco. . . . . ℥jv (125 gr.).
Jabon negro. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Inflamaciones, lumbago, ciática, reumatismo crónico, absceso, soriasis, hidroraquis, cáncer, cefalalgia, meningitis, neuritis. *D.* En fricciones.

7603. P. DE SAN ANDRÉS *ó de la viuda de Farnier.*

℞ Acetato de plomo. . . ℥ß (16 gr.).
Clorato de amoniaco. ʒß (2 gr.).
Tucia preparada. . . . ℈xviij (1 gr.).

Se reduce á polvo fino y se añade:

Manteca fresca lavada con agua de rosas. ℥iij (96 gr.).

Se reduce á polvo fino y se añade:

Oxido rojo de merc. ʒß (16 gr.).

I. Oftalmias, oftalmitis, blefaritis. *D.* ℈xviij á ʒj (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

7604. P. ANODINA (*Bourge*).

℞ Cerato de Galeno. . . ʒx (40 gr.).
Extracto de belladon. ʒijß (10 gr.).
Acetato de morfina. . ℈jv (2 dec.).

M. I. Reumatismos articulares ó musculares. *D.* Se usa en fricciones.

7605. P. ANTICANCEROSA (*Plunkett*).

℞ Acido arsenioso. . . . . ʒj (4 gr.).
Flores de azufre,
Ranúnculo acre,
Asa fétida, ää. . . . . ℥j (32 gr.).

Se forma una pasta con una clara de huevo.

Esta pomada debe usarse con mucha prudencia. (*C. pr. de inv.*).

7606. P. ANTIEPSÓRICA.

℞ Nitrato de potasa.	25
Sulfato de alúmina y potasa. . .	30
Azufre sublimado.	30
Protóxido de plomo.	30
Clavo de especia.	15
Aceite comun.	60
Manteca de cerdo.	60

Se funde la manteca con el aceite y se incorporan las demás materias en polvo muy fino.

*

I. Sarna inveterada. *D.* ʒß (15 gr.) para cada friccion.

7607. P. ANTIEPSÓRICA.

℞ Jabon negro. . . . . ℔ß (250 gr.).
Flores de azufre. . . ʒjv (125 gr.).
Esencia de trementin. ʒj (30 gr.).
M. D. ʒj (30 gr.) al dia, en fricciones.

7608. *Otra*, n. 2.

℞ Manteca.	200
Jabon negro.	300
Carbonato de potasa.	50
Flores de azufre.	100
Esencia de trementina.	50

M. I. Sarna. *D.* ʒj (30 gr.) al dia en fricciones.

7609. *Otra*, n. 3.

℞ Jabon blanco. . . . . ʒiij (96 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒv (160 gr.).
Azufre sublimado. . . ʒv (20 gr.).
Carbonato de potasa. ʒijß (10 gr.).
Esencia de limon. . . . ʒj (32 gr.).
M. I. Sarna. *D.* ʒj (30 gr.).
Es buena fórmula, principalmente en la medicina de los pobres.

7610. *Otra*, n. 4.

℞ Flor de azufre.	4
Pulpa de raiz de paciencia. . . .	8
Manteca.	16
Zumo de limon.	8

Mézclese.

7611. *Otra* (VAN DER ANWIERMULIN).

℞ Ungüento cetrino.	135
Aceite comun.	93
Acetato de plomo crist. en polv.	18
Sulfato de zinc en polvo.	12

Se funde el ungüento cetrino y el aceite comun á fuego lento, y se les añade las sales reducidas separadamente á polvo impalpable.

7612. *Otra* (DENIS).

℞ Subcarbon. de potasa. ʒj (30 gr.).
Azufre sublimado. . . ʒij (60 gr.).
Jabon negro. . . . . ʒjv (125 gr.).
Divídase en ocho dosis.
D. Una al dia, en una ó dos fricciones, y un baño diario.

7613. *Otra* (H. M. F.).

℞ Azufre sublimado. . . . ʒjv (150 gr.).
Sal comun decrepitada. ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . ʒx (300 gr.).
H. S. A. D. ʒij (8 gr.) para cada friccion.

7614. *Otra* (ALIBERT).

℞ Manteca. . . . . ʒjv (125 gr.).
Flores de azufre. . . ʒij (60 gr.).
Subcarb. de potasa. . ʒj (30 gr.).
Se trituran la potasa y la sosa, se añade despues la grasa y se mezclan exactamente.
D. De ʒß á ʒj (15 á 30 gr.) al dia en fricciones.

7615. *Otra* (F. F.).

Flores de azufre. . . ℔ß (250 gr.).
Hidroclorato de amoniaco,
Alumbre, ää. . . . . ʒß (16 gr.).
Manteca. . . . . lbj (500 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Sarna. *D.* Se emplea c. s. de esta pomada para fricciones. El tratamiento dura de doce á quince dias.

7616. *Otra* (H. M.).

℞ Flores de azufre. . . ʒjv (125 gr.).
Sal amoniaco. . . . ʒj (12 dec.).
Manteca de cerdo. . ʒxij (375 gr.).
Mézclese S. A.

7617. *Otra* (GIRAUD).

℞ Manteca. . . . . lbj (500 gr.).
Aceite ó pirelaina de brea. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. Esta pomada no mancha la ropa.

7618. P. ANTIEPSÓRICA (*Jasser*).

℞ Azufre,
Sulfato de zinc, ää. . ʒxviij (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).
Algunos formularios añaden aceite de laurel.

7619. *Otra* (POUZIN).

℞ Manteca. . . . . ʒxxx (900 gr.).
Albayalde. . . . . ʒxv (450 gr.).
Sublimad. corrosivo. ʒj (30 gr.).
Mézclese exactamente.
D. Una dracma (4 gr.) con la que se dan fricciones en las partes afectadas, particularmente en las articulaciones, despues de usar medicamentos internos apropiados.

7620. *Otra* (PRINGLE).

℞ Azufre sublimado y porfirizado. . . . . ʒj (30 gr.).
Eléb. blanco en polvo. ʒij (8 gr.).
Clorhidrato de amoniaco en polvo. . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒijß (75 gr.).
H. S. A. y dividase en cuatro dosis.
D. Una en fricciones por la noche.
Nota. Comunmente bastan las cuatro dosis para obtener la curacion.

7621. *Otra* (PRINGLE).

℞ Eléboro. . . . . ʒij (60 gr.).
Azufre. . . . . ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . ʒjv (125 gr.).
M. I. Herpes, tiña, sarna, eczema, lepra. *D.* En fricciones.
Se parece mucho á la pomada antiepsórica inglesa.

7622. *Otra* (THOMANN).

℞ Manteca de vacas fresca,
Manteca de cerdo, ää. ʒiij (90 gr.).
Polvo de carbon. . . . . ʒij (8 gr.).
Se trituran hasta que sea íntima la mezcla.
D. Despues que el enfermo haya tomado un baño tibio, se le frota con ʒij (8 gr.) de esta pomada, y se le lava al dia siguiente por la mañana con una solucion acuosa de jabon tibio. Al otro dia se da nueva friccion, y al cabo de cinco ó seis dias se cura la sarna.

7623. *Otra* (ZELLER).

℞ Muriato amoníaco merc. ʒj (4 gr.).
Manf. de cerdo. ʒj á ʒij (32 á 64 gr.).
M. D. Se usa en fricciones.

7624. P. ANTIESCABIOSA (H. DE M.).

℞ Aceite comun,
Sebo, ää. . . . . lbjv (2000 gr.).
Azufre pulverizado. lbij (1000 gr.).
Sal comun decrepit. lbj (500 gr.).
Hágase pomada S. A.
I. Sarna.

7625. P. ANTIESCROFULOSA.

℞ Ioduro de hierro. . . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Tumores blancos, infartos linfáticos; pero despues del periodo inflamatorio.

7626. P. ANTIESCROFULOSA (*Rust*).

℞ Precipitado rojo. . ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Cerato de Saturno. ʒj (30 gr.).
M. I. Ulceras escrofulosas.

7627. P. ANTIESPASMÓDICA.

℞ Láudano de Sidenham. . ʒj (4 gr.).
Alcanfor,
Ungüento de altea, ää. . ʒij (60 gr.).
H. S. A. *I.* Afecciones nerviosas del bajo vientre. *D.* En fricciones.

7628. P. ANTIESPASMÓDICA (*Golfin*).

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ℥jv (125 gr.).
Cera virgen. . . . . ℥j (30 gr.).
Opio en bruto. . . . . ℥ij (60 gr.).

Se funde la cera en el aceite á un calor moderado, se añade el opio, se deja infundir durante media hora y se cuela con expresion.

Se hierve el residuo en ℥jv (125 gr.) de agua hasta que se reduzca á la mitad, se cuela y se agita el cerato opiado con este cocimiento.

I. Retencion de orina, supresion del flujo menstruo por causa espasmódica, dolores reumáticos crónicos y cardialgia. *D.* Se dan fricciones sobre las partes enfermas ó las que simpatizan con ellas.

7629. P. ANTIHELMÍNTICA.

℞ Acíbar. 10
Aceite de petroleo. 45
Bilis de buey. 45
Grasa purificada. 100

M. D. ℥ij á ℥v (8 á 20 gr.) en fricciones en las paredes del vientre.

7630. P. ANTIHEMORROIDAL.

℞ Pomada de pepinos. . . ℥jv (16 gr.).
Cal apagada con agua, Láudano líquido, ää. . ℥ß (2 gr.).

Mézclese S. A.

I. Es muy eficaz para resolver los tumores hemorroidales y templar los dolores que ocasionan.

7631. *Otra* (CULLEN).

℞ Polvo de nuez de agalla. ℥j (4 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).

Mézclese.

7632. *Otra* (WARE).

℞ Nuez de agalla en polvo. ℥ij (8 gr.).
Alcanfor en polvo. . . . ℥j (4 gr.).

Mézclese é incorpórese con
Cera líquidada. . . . . ℥j (32 gr.).
Añádase:
Tintura de opio. . . . . ℥ij (8 gr.).

M. I. Hemorroides, principalmente despues de las aplicaciones de sanguijuelas. *D.* ℥j (4 gr.) mañana y noche en fricciones ligeras.

7633. *Otra* (VALLEZ).

℞ Extr. de hojas de saúco. ℥j (4 gr.).
Ungüento populeon. . . ℥ß (15 gr.).
Alumbre calcinado. . . ℥ß (2 gr.).

D. Se da el volúmen de una avellana de esta pomada, en unturas, en las hemorroides fluentes.

7634. P. ANTIHERPÉTICA.

℞ Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
Azufre sublimado. . . . ℥ij (8 gr.).
Litargirio en polvo.
Precip. rojo en polvo, ää. ℥j (4 gr.).

M. I. Produce excelentes efectos en el tratamiento de diversas especies de herpes.

7635. *Otra*, n. 2.

℞ Cinabrio. . . . . ℥jß (6 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ℥ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥ij (60 gr.).
Agua de rosas. . . . . ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Pitiriasis, para moderar el prurito y disminuir la produccion de insectos.

7636. *Otra* (ALIBERT).

℞ Cinabrio en polvo. . . ℊr.jv (3 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊr.xviij (1 gr.).
Cerato. . . . . ℥vj (24 gr.).

H. S. A.

7637. *Otra* (BIETT).

℞ Cal apagada. . . . . ℊr.xc (5 gr.).
Carbonato de sosa. . . ℥ijß (10 gr.).
Extr. acuoso de opio. . ℈ß (6 dec.).
Manteca. . . . . ℥ij (60 gr.).

Mézclese por trituracion.

I. Herpes, tiña, eczema, fabus, pórrigo, prúrigo, sabañones, ozena. *D.* Dos unturas al dia.

7638. P. ANTIHERPÉTICA (*Biett*).

℞ Protosulfato de merc. 3j (4 gr.).
Azufre sublimado. . . 3ij (8 gr.).
Manteca de cerdo. . . ℥ij (60 gr.).
Esencia de limon. . . ℊxv (75 cent.).

H. S. A. *I.* Herpes liquenoides. *D.* En fricciones ligeras.

7639. P. ANTIHERPÉTICA *ó de manteca de cacao* (CORBEL Y LAGNEAU).

℞ Precipitado blanco. . . ℊxviij (4 gr.).
Manteca de cacao. . . ℥j (30 gr.).
Bálsamo del Perú. . . 5j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Herpes superficiales, manchas cutáneas, erupciones de la cara despues del sobreparto, conocidas comunmente con el nombre de leche esparcida por el cuerpo.

7640. P. ANTIHERPÉTICA (*Chevallier*).

℞ Cloruro de cal. . . . 3iij (12 gr.).
Turbit mineral. . . . 3ij (8 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . 3vj (24 gr.).
Manteca. . . . . 5x (40 gr.).

H. S. A. *I.* Lepra, herpes, impétigo, tiña, escrófulas, sífilis, sifílides, tiriasis, eczema, encantis, bocio. *D.* C. s. para dos fricciones ligeras al dia, mañana y noche, en las partes enfermas.

7641. *Otra* (CORBEL Y LAGNEAU).

℞ Aceite de almendras dulces. . . . . ℥jß (45 gr.).
Esperma de ballena. ℥j (30 gr.).
Cera blanca. . . . . ℊxviij (4 gr.).
Agua dest. de rosas. ℊxc (75 gr.).
Precipitado blanco. . ℊxxxvj (2 gr.).

H. S. A. *I.* Herpes superficiales, manchas cutáneas, erupciones de la cara despues del parto, llamadas paños, y atribuidas á la leche derramada.

7642. *Otra* (CULLERIER).

℞ Turbit mineral. . . . . 3j (4 gr.).
Láudano líquido. . . . . 5j (4 gr.).
Azufre sublimado. . . . 3ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).

M. I. Afecciones herpéticas. *D.* Se dan fricciones en las partes enfermas, y se repiten con mas ó menos frecuencia. Se asocia el uso de los baños de agua simple.

7643. *Otra* (DUBOIS).

℞ Pomada de pepino. . . . ℥ß (16 gr.).
Nitrato de mercurio. . . 3ij (8 gr.).

I. Herpes poco considerables. *D.* Se usa en fricciones sobre las partes afectadas.

7644. *Otra* (FAURE).

℞ Subnitrato de mercurio desecado. . . . . ℊjv (2 dec.).
Manteca pura. . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Es muy eficaz en el eczema crónico y grietas del ano.

7645. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Calomelanos. . . . . 3j (4 gr.).
Azufre sublimado. . . . 5ij (8 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Herpes liquenoides.

7646. *Otra* (GIBERT).

℞ Cloruro amoniacal de mercurio, Alcanfor, ää. . . . . ℊviij (4 dec.).
Manteca. . . . . ℥jv (16 gr.).

M. I. Oftalmias herpéticas.

7647. *Otra* (H. DE M. Y H. M.).

℞ Ungüento rosado . . . . ℥j (30 gr.).
Precipitado blanco. . . . 5j (4 gr.).

II. S. A. *D.* Dos unturas al dia. Véase *Pomada contra los herpes de la F. E.*

7648. P. ANTIHERPÉTICA QUERMETIZADA.

℞ Quermes mineral. . . . ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. . . . . ʒß (15 gr.).
Manteca de cerdo. . . . ʒj (30 gr.).

II. S. A. *I.* Herpes. *D.* En fricciones. Cuando irrita demasiado se modera su accion con 5j (¼ gr.) de láudano líquido.

7649. P. ANTIHERPÉTICA (*Lassaigne*).

℞ Borato de azufre. 1
Manteca de cerdo. 8

M. I. Herpes furfuráceos.

7650. *Otra* (RICORD).

℞ Cerato azufrado. . . ʒj (30 gr.).
Turbit mineral. . . . ℊxviij (4 gr.).
Brea. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Erupciones secas de la piel.

7651. P. ANTIMONIADA.

℞ Antimonio porfirizado. . ʒß (15 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Reumatismo, ceática, pulmonia, pleuresía, hepatitis, laringitis, encefalitis, epilepsia, peritonitis crónica, tétanos, soriasis, tisis, hemicránea, neuritis, flebitis. *D.* En fricciones y obra como la de Autenrieth.

7652. P. ANTINEURÁLGICA.

℞ Opio. . . . . ʒj (4 gr.).
Carbonato de hierro. ʒijß (10 gr.).
Manteca. . . . . ʒß (16 gr.).
Bálsamo tranquilo. . c. s.

M. I. Neuralgia, neuralgia facial, lepra. *D.* En fricciones en los puntos doloridos.

7653. *Otra* (DEBREYNE).

℞ Extracto de belladona. ʒiij (12 gr.).
Opio. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒiij (12 gr.).

Se aromatiza con la esencia que se quiera. *D.* El grosor de una judía en fricciones en la parte afectada, tres veces al dia.

7654. *Otra* (FLORENT).

℞ Aceite de almendras amargas,
Manteca de cacao, ää. . . ʒj (4 gr.).

M. I. Neuralgias sintomáticas que se observan en algunas afecciones oculares, principalmente en la iritis. *D.* El volúmen de un guisante en fricciones en la frente y sienes.

7655. P. ANTIOFTÁLMICA.

℞ Oxido rojo de mere. . ℊv (25 cent.).
Sulfato de zinc. . . . . ℊx (50 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Se mezcla en un mortero de porcelana ó mejor sobre un pórfido.

I. Oftalmias crónicas. *D.* Se aplica como el volúmen de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

7656. *Otra* (CARRON DE VILLARDS).

℞ Manteca de hígado de raya. . . . . ʒj (30 gr.).
Cianuro de hierro. . . ʒj (12 dec.).
Cianuro de mercurio. . ℊviij (4 dec.).
Esencia de espliego. . 4 gotas.

Mézclese sobre un pórfido.

I. Conjuntivitis escrofulosa crónica. *D.* En fricciones á dosis muy pequeñas.

7657. P. ANTIOFTÁLMICA *ó Pomada oftálmica* (*Carron de Villards.*)

℞ Ungüento mercurial doble. . . . . ʒj (30 gr.).
Estricnina. . . . . ℊviij (4 dec.).
Aceite esencial de almendras amargas. . 8 gotas.

M. I. Oftalmias graves; tiene la ventaja de combatirla inflamacion y mantener la pupila bastante dilatada para no temer la atresia.

7658. P. ANTIOFTÁLMICA (*Desmarres*).

℞ Manteca muy fresca y lavada con agua caliente. . . . ʒujv (3 gr.).
Precipitado rojo. ʒij á ʒjv (10 á 20 cent.).
Alcanfor. . . . . ʒiij (15 cent.).

II. S. A. *I.* Queratitis vasculares crónicas en los escrofulosos, y manchas aun no organizadas de la córnea. *D.* El volúmen de un grano de trigo al borde libre de los párpados al acostarse.

7659. P. ANTIOFTALMICA DE DESSAULT (F. F).

℞ Oxido rojo de mercurio,
Tucia preparada,
Acetato de plomo,
Alumbre calcinado, ãã. ʒj (4 gr.)
Sublimado corrosivo. . gxij (6 dec.).
Pomada rosada. . . . . ʒj (32 gr.).

Se mezcla todo porfirizándolo por mucho tiempo.

I. Se usa contra las afecciones herpéticas y las inflamaciones crónicas de los párpados Al usarla el dolor aumenta primero, pero se avivan las superficies que hasta entonces tenian un color rojo lívido y progresa rapidamente la curacion. *D.* C. s. para dar ligeras fricciones en los bordes de los párpados.

7660. P. ANTIOFTALMICA (*Dupuytren*).

℞ Manteca de puerco. . ʒj (30 gr.).
Oxido rojo de merc. ℊx (5 dec.).
Sulfato de zinc. . . . ℊxx (10 dec.).

M. I. Oftalmias crónicas y rebeldes sostenidas por vicio escrofuloso. *D.* Se usa untando ligeramente con ella el borde de los párpados.

7661. *Otra* (GRAN JEAN).

℞ Precipitado rojo. . . . ʒj (8 gr.).
Cerato sin agua. . . . . ʒß (16 gr.).

M. I. Oftalmias crónicas. Se usa como la anterior.

7662. *Otra* (GUEPIN).

℞ Oxido rojo de mercurio. 6
Sulfato de zinc. 1
Manteca. 60

II. S. A. *I.* Conjuntivitis agudas, en que dice Guepin que es muy eficaz. *D.* Se introduce como el volúmen de un grano de avena de esta pomada entre los párpados; el dolor se aumenta y se vuelve muy vivo durante una hora, pero despues se calma; á las seis horas el enfermo está mejor, y á la segunda aplicacion está curado.

7663. *Otra* (H. DE AL.).

℞ Oxido rojo de hierro. . ʒß (2 gr.).
Manteca purificada. . . ʒjv (16 gr.).

M. I. Oftalmia crónica. *D.* El grosor de un guisante, con el que se cubre el borde de los párpados.

7664. P. ANTIOFTÁLMICA *ó Pomada de óxido rojo de mercurio.*

℞ Oxido rojo de mercurio porfirizado,
Alcanfor,
Subacetato de plomo cristalizado, ãã. . ℊxviij (4 gr.).
Manteca fresca y purificada. . . . . ʒjvß (18 gr.).

Mézclese por trituracion en un mortero de vidrio.

I. Oftalmias crónicas. *D.* Se pone en el angulo del ojo el volúmen de la cabeza de un alfiler.

7665. P. ANTIOFTÁLMICA *ó Pomada psoftálmica* (SICHEL).

℞ Cerato de torbisco,
Pomada de torb., ãã. ℊvj (30 cent.).

Estricnina. . . . . gʒ/₂ (1 cent.).

M. I. Sirve para curar los vejigatorios, que se aplican en la frente en el tratamiento de la amaurosis. *D.* Puede aumentarse progresivamente la dosis de la estricnina hasta gj (5 cent.).

7666. P. ANTIOFTÁLMICA *ó Pomada oftálmica (St. Ives).*

℞ Manteca de vacas fresca sin sal. . . . . ʒiij (96 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒiß (16 gr.).
Deutóxido de mercurio. ʒijß (10 gr.).
Oxido de zinc. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor disuelto en aceite de huevos. . . gʟjv (3 gr.).

Despues de haber hecho fundir la cera y la manteca, se mezclan todas las sustancias en un mortero de mármol

I. Se usa contra las oftalmias crónicas escrofulosas. *D.* Se pone un poco de pomada sobre el borde de los párpados al tiempo de acostarse. Por la mañana se dan ligeras fricciones con esta pomada sobre las partes enfermas.

7667. P. ANTIOFTÁLMICA *(Velpeau).*

℞ Nitrato de plata fundid. gij (1 dec.).
Manteca. . . . . ʒij (8 gr.).

Se trituran en un mortero de porcelana.

I. Se aplica el tamaño de la cabeza de un alfiler sobre la superficie interna de los párpados enfermos.

7668. P. ANTIPERIÓDICA *(Dr. C. Spinelli).*

℞ Sulfato de quinina. . ʒß (2 gr.).
Subcarbonato de peróxido de hierro. . gxij (60 cent.).
Opio puro. . . . . gij (15 cent.).
Manteca reciente. . ʒxx (80 gr.).
H. S. A.

Se recomienda esta pomada cuando los paroxismos periódicos ó la intermitencia no es bastante marcada para que sea posible tomar las preparaciones de quina á dosis determinadas ó fijas.

Se usa en los niños muy tiernos que no pueden usar el sulfato de quinina mas que por el método iatraléptico; en los casos de intermitentes con paroxismos próximos, que no permiten el uso de la quina ó sus álcalis; en la calentura intermitente acompañada de vómito y disfagia; en las intermitentes perniciosas y en las calenturas remitentes de mal carácter, para prevenir la recidiva de las intermitentes cuando se las quiera cortar.

Se da una untura cada dos horas durante tres dias en la region vertebral, despues de haber lavado esta parte con agua de jabon.

7669. P. ANTIPRURIGINOSA *(Gibert).*

℞ Alumbre. . . . . gxx (1 gr.).
Alcanfor. . . . . gxv (75 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Mezclense.

7670. P. ANTISIFILÍTICA.

℞ Ungüento de mercurio duplicado,
Cerato opiado, ää. . . ʒj (30 gr.).

D. Se usa para curar las úlceras sifilíticas estacionarias.

7671. *Otra* (GIBERT).

℞ Cerato opiado. . . . ʒj (30 gr.).
Precipitado rojo. . . gxv (75 cent.).

M. D. Se usa para curar las úlceras sifilíticas estacionarias, cuando no se teme reanimar la inflamacion.

7672. *Otra* (RUST).

℞ Calomelanos. . . . . ʒj (4 gr.).

Opio. . . . . 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Ulceras sifilíticas secundarias de la piel.

7673. P. DE ANTRACOCALI (*Gibert*).

℞ Antracocali. 4
Manteca de cerdo. 30
M. I. Eczema, impétigo, lupus. *D.* En fricciones ligeras mañana y noche.

7674. P. AROMÁTICA (*Cazenave*).

℞ Tuétano de vaca. . . . . ℥j (30 gr.).
Tintura aromática. . . . gxc (5 gr.).
M. I. Pórrigo decalvans, favus. *D.* Se usa en untura mañana y noche, pero antes de aplicar la pomada se lavan las partes enfermas con un poco de agua salada.

7675. P. DE ARSENIATO DE SOSA.

℞ Arseniato de sosa. . . . ℥j (4 gr.).
Manteca. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. I. Afecciones cancerosas.

7676. P. ARSENICAL.

℞ Arsénico blanco porfirizado. . . . 1
Manteca. 8
Mézclese.

7677. *Otra* (BOUDIN).

℞ Arseniato de amoniac. gl, (1 cent.).
Manteca. . . . . ℥j (4 gr.).
Mézclese con cuidado.
I. Se usa en ciertos herpes para calmar las comezones.
Boudin llama á su fórmula mineral en lugar de arsenical.

7678. P. ARSENICAL CONTRA LOS PIOJOS.

℞ Mantera. 12
Polvo de Rousselot. 5
M. Ha producido muy buenos efectos contra los piojos (*ricinus gallinæ*) de las gallinas y perdices comunicados al hombre.

7679. P. DE ASA FÉTIDA (*Ricken*).

℞ Asa fétida en polvo. . . ℥j (4 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).
M. I. Coqueluche. *D.* Se dan fricciones dos veces al dia en el vientre y pecho, en la columna vertebral y en las plantas de los piés.

7680. P. ASTRINGENTE.

℞ Polvo de nuez de agallas. 1
Polvo de nuez de ciprés. 1
Bayas de arrayan. 1
Cáscara de granada. 1
Hojas de zumaque. 1
Almáciga. 1
Pomada rosada. 18
Se liquida la pomada de rosas, se la echa en un mortero y con ella se incorporan los polvos en caliente. Es un astringente bastante enérgico.

7681. *Otra*, n. 2.

℞ Oxido de zinc. . . . . ℥j (4 gr.).
Cerato simple,
ó Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).
Mézclese sobre un pórfido.
I. Grietas del pecho y afecciones herpéticas ligeras.

7682. *Otra* (RUST).

℞ Alumbre. . . . . ℥jß (6 gr.).
Alcanfor,
Opio, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . ℥j (4 gr.).
Cerato de Saturno. . . . ℥ß (15 gr.).
M. I. Manchas de la piel, hemorroides, encantis, nefritis. *D.* En fricciones cada dos horas en las partes entorpecidas por el frio.

7683. P. ASTRINGENTE DE AGRAZ.

℞ Agraz ó zumo de uva sin madurar depurado. . . . . ℔ß (250 gr.).

Ungüento rosado. . . Ibj (500 gr.).
Cera amarilla. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se cuecen en una vasija de barro hasta que se consuma el líquido acuoso; se separan las heces de la pomada fria; se liquida de nuevo y se la aromatiza con esencia de rosa.

I. Grietas de los pechos y de los labios; se puede usar tambien contra las hemorroides.

7684. P. ASTRINGENTE Y SEDANTE (*Dupuytren*).

℞ Extracto de Saturno,
Extr. de belladona, ãã. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ℥jß (48 gr.).

M. I. Grietas del ano, fistulas, herpes, quemaduras, congelacion, encantis, eczema, metritis, blenorragia, disuria, hemorroides. *D.* En aplicaciones.

7685. P. ASTRINGENTE OPIADA.

℞ Alumbre en polvo. . . ℊxc (5 gr.).
Cerato opiado. . . . . ʒij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Hemorroides dolorosas y fluentes, metritis, congelacion, encantis, tiriasis, manchas de la córnea. *D.* Se frota la parte enferma mañana y noche.

7686. P. DE ATROPINA.

℞ Atropina. . . . . ℊv (25 cent.).
Manteca. . . . . ℊc (5 gr.).

Mézclese con cuidado.

I. Adherencia del iris con el cristalino. *D.* Se introduce mañana y noche el volúmen de la cabeza de un alfiler entre los párpados.

7687. P. AURÍFERA (*Niel*).

℞ Oro dividido. . . . . ℊxij (6 dec.).
Cerato de Galeno. . . . ʒj (30 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Ulceras venéreas. *D.* Se puede usar por el método iatraléptico.

7688. P. AZUFRADA (F. F.).

℞ Azufre sublimado y lavado. . . . . ℥jv (125 gr.).
Manteca de cerdo. . ℥xij (375 gr.).

M. I. Sarna y afecciones crónicas de la piel, principalmente las formas escamosas como la soriasis y la lepra vulgar. *D.* ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).

7689. P. DE AZUFRE Y CARBON (*Biett*) (F. P.).

℞ Carbon en polvo. 1
Azufre sublimado. 2
Manteca. 5

M. I. Pórrigo.

7690. P. DE BANYER.

℞ Alumbre calcinado,
Calomelanos en p., ãã. ʒiij (12 gr.).
Litargirio porfirizado. ʒjv (16 gr.).

Mézclense exactamente é incorpórense con
Manteca. . . . . Ibß (250 gr.).
Trement. de Venecia. ʒij (64 gr.).

I. Tiña anular, tiña favosa. *D.* ʒijß (10 gr.) al dia.

7691. P. DE BAREGES.

℞ Hidrosulfato de sosa,
Carbonato de sosa, ãã. ʒij (8 gr.).

Se disuelven en un poco de agua y se mezclan con
Manteca balsámica. . . ʒijß (75 gr.).

I. Herpes ligeros.

7692. P. DE BELEÑO (*Weber*).

℞ Extracto de beleño ℊxxjv (12 dec.).
Manteca fresca. . . ʒij (8 gr.).

M. I. Fotofobia que acompaña á las oftalmias escrofulosas. *D.* Tres ó cuatro fricciones al dia en la parte exterior del párpado superior y sobre el punto correspondiente al agujero supraorbitario.

7693. P. DE BELEÑO.

℞ Hojas de beleño,
Hojas de estramonio,
Hojas de dulcamara,
Hojas de saúco, ãã. . ℥jv (120 gr.).
Manteca. . . . . ℥x (300 gr.).
Se cuece, se cuela y se añade:
Aceite de semillas de beleño. . . . . ℥ij (60 gr.).

I. Sabañones, grietas, reumatismo, nefritis. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

7694. P. DE BELLADONA.

℞ Extracto de belladona. . ℥j (4 gr.).
Manteca balsámica. . . . ℥j (32 gr.).

M. I. Se usa para dilatar el cuello de la matriz en los casos de contraccion espasmódica de este órgano, hernias, constriccion de los esfínteres. Puede aumentarse la dosis del extracto hasta igualar la cantidad de manteca.

La POMADA DE BELLADONA DE LOS H. DE M. se compone de una parte de extracto de belladona y cuatro de manteca de puerco.

La POMADA ANTIESPASMÓDICA DE LOS H. M. se compone de ℥j (12 dec.) de extracto de belladona, y ℥B (15 gr.) de manteca fresca.

7695. *Otra* (CHAUSSIER).

℞ Extracto de belladona. ℥ij (8 gr.).
Agua destilada,
Cerato, ãã. . . . . ℥ij (64 gr.).
Se disuelve el extracto y se incorpora el cerato por trituracion.

I. Se usa con buen éxito para obtener la relajacion del cuello de la matriz en ciertos casos de partos difíciles, en el fimosis y paratimosis y en las rigideces y constricciones espasmódicas. *D.* Se aplica á la dosis de ℥ij (8 gr.) en el utero, dirigiéndola por medio de una geringuilla.

7696. P. DE BELLADONA.

℞ Belladona fresca. 1
Manteca. 2
Se prepara del mismo modo que el aceite de belladona, solo que se exprime en caliente y se separan las heces despues que se haya enfriado la pomada.

Del mismo modo se preparan las pomadas de BELEÑO, VERBAMORA, TABACO Y ESTRAMONIO.

I. Contracciones espasmódicas de la matriz en el acto del parto, tumores blancos.

7697. P. DE BELLADONA *ó Pomada contra la fotofobia* (*Cunier*).

℞ Extracto de belladona. 1
Aceite de hígado de bacalao. . . . 2
H. S. A. *I.* Fotofobia.

7698. P. DE BELLADONA ALCANFORADA (*Jadioux*).

℞ Extr. de zumo depurado de belladona,
Alcanfor, ãã. . . . . ℥ij (8 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Peritonitis. *D.* ℥ij (8 gr.) tres ó cuatro veces al dia.

7699. P. DE BELLADONA Y SATURNO *ó Manteca de belladona y Saturno* (*Dupuytren*).

℞ Manteca. 6
Extracto de belladona. 1
Subacetato de plomo líquido. . . . 1
M. Es un tópico sedante y astringente que se usa en los casos de grietas del ano, cuando los enfermos no se quieren someter á la operacion.

7700. P. DE BERTON.

℞ Tuétano de vaca,
Aceite de ricino, ãã. . . ℥j (30 gr.).
Se funde al calor del baño maría, se cuela y se añade S. A.:
Brea. . . . . ℥ij (8 gr.).
I. Alopecia. *D.* Una aplicacion mañana y noche.

7701. P. DE BIGKER.

℞ Verde gris,
Calomelanos. ãã. . . . ℥j (12 dec.).

Pomada rosada. . . . . ʒjß (45 gr.).
I. Tiña anular, tiña fabosa. *D.* Una aplicacion mañana y noche.

Se hace tomar al mismo tiempo, dos veces al dia, ℊj (5 cent.) de una mezcla de partes iguales de calomelanos, azufre dorado de antimonio y azúcar.

7702. P. DE BISMUTO.

℞ Magisterio de bismut. ʒijß (10 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
I. Liquen, eczema, herpes, fabus, lepra. *D.* En fricciones.

7703. P. DE BORAX (*Sichel*).

℞ Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).
Borax. . . . . ℊiij (15 cent.).
Láud. de Sydenham. 8 á 10 gotas.
I. Blefaritis glandular.

7704. P. DE BORAX *ó Pomada antiherpética de Lassaigne.*

℞ Borax en polvo. . . . . ʒj (4 gr.).
Mantera. . . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese sobre un pórfido.
I. Prúrigo, esclerotitis, didimalgia, hernia, sifílides, efélides, lumbago, zona, eczema, prúrigo, mammitis, nefritis. *D.* En fricciones dos veces al dia.

7705. P. BORATADA.

℞ Borato de sosa,
Nuez de agalla, ãã. . . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
Se incorpora en
Cera liquida. . . . . ʒj (30 gr.).
Se añade:
Tintura de opio. . . . . ʒij (8 gr.).

7706. *Otra*, n. 2.

℞ Cerato simple. . . . . ʒijß (10 gr.).
Borato de sosa. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Conserva de rosas. . . ʒß (2 gr.).
Neroli. . . . . ℊjv (2 dec.).
I. Hemorroides, prúrigo, binchazon escrófulosa de los labios. *D.* En fricciones ligeras.

7707. P. DEL DOCTOR BOUCHERON PARA HACER CRECER EL PELO.

℞ Jabon medicinal,
Cenizas de cuero,
Sal gemma,
Tártaro rojo,
Polvo de peinar,
Sulfato de hierro,
Sal amoniaco,
Coloquintida, ãã. . . . . ʒj (30 gr.).
Caterú. . . . . ʒij (8 gr.).
Se reduce á polvo y con c. s. de manteca se hace pomada. Se da de esta pomada á un gorro de hule y se le aplica á la cabeza.

7708. P. DE BOYER.

℞ Aceite de alm. dulces. ʒjv (120 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒß (15 gr.).
Manteca lavada,
Zumo de siempreviva
menor, ãã. . . . . ʒiij (90 gr).
H. S. A. *I.* Se emplea como dulcificante y refrigerante contra las irritaciones de la piel y las hemorroides. *D.* C. s. para ligeras fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

Nota. Accarie, hallando demasiado líquida esta pomada, ha propuesto añadirle ʒß (15 gr.) de cera.

7709. P. DE BREA.

℞ Brea. . . . . ʒj (30 gr.).
ó Pirelaina. . . . . ʒß (15 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒj (30 gr.).
Tintura de opio. . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒiij (90 gr.).
I. Lepra, pitiriasis, prúrigo, eczema, soriasis, herpes, fabus, liquen, sarna, reumatismo, lumbago. *D.* En fricciones.

7710. *Otra* (EMERY).

℞ Brea vegetal. . . . . ʒß (2 gr.).

Cera blanca,
Manteca, ãã. . . . . ʒß (15 gr.).
Agua de Colonia. . . . 20 gotas.

I. Afecciones cutáneas crónicas y principalmente la soriasis, sarna, herpes, prúrigo, lepra vulgar. *D.* En fricciones mañana y noche.

7711. P. DE BREA (*Emery*).

℞ Brea. 100
Manteca. 300

I. Sarna, herpes, pórrigo. Debe usarse en gran cantidad, pero su uso ocasiona accidentes graves. Cura mas pronto que las preparaciones arsenicales, pero su curacion es menos duradera. Mancha la ropa.

7712. *Otra* (GIRAULT).

℞ Manteca. 600
Aceite ó pirelaina de brea. . . . 100

Se ha propuesto en los mismos casos que la anterior.

7713. *Otra* (RICORD).

℞ Subsulfato de merc. ʒij (8 gr.).
Brea. . . . . ʒß (15 gr.).
Manteca. . . . . ʒiijß (105 gr.).

M. I. Soriasis sifilítica, tiña. *D.* En tópico.

7714. P. DE BREA ALCANFORADA (*Baumes*).

℞ Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Brea. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈jx (50 cent.).

M. I. Erupciones vesiculosas ó puro-vesiculosas, pápulo-prurigi-nosas y escamosas; calma la comezon.

7715. P. BROMURADA.

℞ Bromuro de potasio. ℊxviij (1 gr.).
Bromo líquido. . . . . ℈jx (50 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Infartos escrofulosos, bocio, hidrocele, escrófulas, oftalmias, manchas, blefaritis, conjuntivitis, congestion, encantis, pedionalgia, reumatismo, gota, tenesmo, sífilis, eczema tiña, amenorrea. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) mañana y noche en fricciones.

7716. P. DE BROMURO DE HIERRO.

℞ Bromuro de hierro. . ʒj (4 gr.).
Bromo. . . . . ℊxij (6 dec.).
Manteca de cerdo. . . ʒj (32 gr.).

H. S. A. *I.* Amenorrea de las tísicas, y principalmente infartos escrofulosos y leprosos, sifílides, bocio, encantis. *D.* ʒß (2 gr.) en fricciones en la parte interna de los muslos, lo mas cerca posible de los grandes labios; se reparte la dosis para uno y otro muslo.

7717. P. DE BROMURO DE POTASIO.

℞ Bromuro de potasio. . . ʒj (12 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. Se puede emplear el bromuro de sodio en lugar del de potasio.

I. Infartos escrofulosos. *D.* De ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) en fricciones sobre las partes enfermas.

Nota. Añadiendo á las dosis indicadas de ℊvj á ℊxij (3 á 6 dec.) de bromuro, se tiene la *pomada de bromuro de potasio bromurado.*

7718. *Otra* (MAGENDIE).

℞ Bromuro de potasio. . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Infartos escrofulosos. *D.* ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) en fricciones.

7719. P. DE CADMIO (*Radius*).

℞ Sulfato de cadmio. . . . ℊij (1 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Manchas de la córnea, catarata. *D.* ℊxviij (1 gr.) en fricciones mañana y noche.

7720. P. CALMANTE.

℞ Extr. de zumo depurado de cicuta. . 2
Dilúyase en un poco de agua y mézclese con
Cerato. . . . . 5j (4 gr.).

7721. *Otra* (POTT).

℞ Polvo de cicuta. . . . . ʒß (15 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Enfermedades escrofulosas con inflamacion y en el mal vertebral de Pott. *D.* Se usa en fricciones á la dosis de ʒß á ʒij (2 á 8 gr.).

7722. *Otra* (FOUQUIER).

℞ Carbonato de plomo. . ʒj (30 gr.).
Opio. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒß (15 gr.).
Bálsamo tranquilo. . . . c. s.
I. Tenesmo, l[illegible]ago, neuralgias, jeroftalmías, mammitis, nefritis, neuralgia facial, hemicránea. *D.* En aplicacion y en fricciones.

7723. *Otra* (GUEPIN).

℞ Calomelanos. 1
Extracto de belladona. 5
Manteca balsómica. 30
M. I. En unturas en las oftalmias dolorosas.

7724. *Otra* (JAMES).

℞ Esencia de laurel real. ʒij (8 gr.).
Manteca de cerdo. . . . ʒij (60 gr.).
M. Véase *Pomada de laurel real.*

7725. *Otra* (ROGNETTA).

℞ Extracto de cicuta menor,
Extr. de estramon., ää. ʒij (8 gr.).
Extracto de belladona. ℈xviij (1 gr.).
Manteca preparada con
agua de rosas. . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese S. A.
Se aplica esta pomada sobre el cuello de la matriz, y en fricciones sobre el hipogastrio en los casos de catarro uterino.

7726. P. DE CALOMELANOS *ó de Protocloruro de mercurio* (H. M. F.).

℞ Mercurio dulce preparado al vapor. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Se mezcla por trituracion.
I. Escoriaciones, bubones y úlceras sifilíticas y escrofulosas.
Biett la usa en la mayor parte de las erupciones crónicas y al fin del tratamiento de las afecciones escamosas.
Si á ʒiij (90 gr.) de la pomada anterior, se añade ʒj (4 gr.) de extracto gomoso de opio ó ʒij (8 gr.) de láudano líquido, se tiene la POMADA DE CALOMELANOS OPIADA, que se usa para curar las pústulas primitivas planas, ó las úlceras venéreas indolentes, etc.

7727. P. DE CALOMELANOS ALCANFORADA (*Cazenave*).

℞ Calomelanos preparados al vapor. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈vj (3 dcc.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Herpes de la cara que pasan rápidamente al estado crónico.

7728. P. DE CAMUESAS.

℞ Manteca reciente lav. lbij (1000 gr.).
Camuesas partidas en pedacitos. . . . . lbj (500 gr.).
Agua rosada. . . . . lbß (250 gr.).
Benjuí.
Estoraque calam., ää. ʒj (4 gr.).
Clavo de especia. . . ʒß (2 gr.).
Se ponen las tres últimas sustancias contundidas en una muñequita de lienzo, se suspende esta en la vasija que contenga las demás, se cuece todo hasta que se consuma la humedad, comprimiendo con una espátula la muñequita, se cuela, se deja enfriar, se saca con cuidado para separar las heces, se agita y se guarda para el uso.
I. Es refrigerante y se emplea

en las escoriaciones de los labios, de las narices, ó de las manos, y en las cicatrices, principalmente de las que resultan de las viruelas.

7729. P. CANTARIDADA.

℞ Cantáridas en polvo. ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se liquida la manteca, se añaden las cantáridas y se hierve algunos instantes la mezcla en el baño maria.

7730. P. DE CANTARIDINA.

℞ Cantaridina. . . . . gj (5 cent.).
Manteca. . . . . ʒvij (28 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒj (4 gr.).

Se tritura la cantaridina con un poco de alcohol, se añade el excipiente graso y se los tritura mucho tiempo hasta que estén bien mezclados.

7731. P. DE CANTARIDINA *ó Pomada vexicante de cantaridina.*

℞ Cantaridina. 1
Manteca. 8

Se digiere en el baño maria durante seis horas, se cuela con expresion y se deja aposar, se decanta y se filtra.

7732. P. DE CARACOLES.

℞ Carne de caracoles,
Aceite de ricino, ää. . ʒj (30 gr.).

Se cuece, se cuela y se añade:
Brea. . . . . ʒijß (10 gr.).

I. Tiña, favus, alopecia y zona. *D.* En fricciones.

7733. *Otra* (RIVIERE).

℞ Caracoles de viña. . número 50.
Cera blanca. . . . . lbj (500 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . lbjv (2000 gr.)
Esencia de rosas. . 2 gotas.

Se pulpa la carne de los caracoles en un mortero, y por otra parte se hace un cerato con la cera y el aceite, y con él se incorpora la pulpa de caracoles, y al fin se añade la esencia.

I. Grietas de los pezones.

7734. P. DE CARBON Y FLORES DE AZUFRE (F. P.).

℞ Carbon vegetal en polvo. 1
Flores de azufre. 2
Cerato blanco. 5

Mézclese exactamente.

I. Es eficacisimo en la tiña.

7735. P. DE CARBONATO DE PLOMO *ó Ungüento blanco de Rasis* (F. F.).

℞ Manteca. . . . . ʒv (20 gr.).
Carbonato de plomo. . . ʒj (4 gr.).

M. Se usa como desecante y se emplea con buen éxito contra las neuralgias faciales. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

Esta pomada se curancia pronto, por lo que solo se preparará cuando se necesite.

7736. P. DE CARBONATO DE POTASA Y CAL (*Devergie*).

℞ Carbonato de potasa. . . ʒj (4 gr.).
Cal. . . . . ßß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. Un enfermo que padecia ictiosis parda, se ha curado con esta pomada y los baños alcalinos.

7737. P. CATERÉTICA.

℞ Acido arsenioso en polvo fino. . . . . ʒj (4 gr.).
Sulfuro rojo de mercu. ßß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).
M. S. A.

7738. *Otra* (NEUMANN).

℞ Alcali volátil. 5
Sublimado corrosivo. 5
Sabina en polvo. 10
Manteca. 30

M. I. Se extiende en hilas y se cubre con él las berrugas; dolores osteocopos.

7739. P. CÁUSTICA (*Baumes*).

℞ Manteca. . . . . 5ij (8 gr.).
Sabina en polvo,
Alumbre,
Calomelanos, ãã. . . . gxviij (1 gr.).
M. I. Vegetaciones.

7740. P. CÁUSTICA (*Graeffe*).

℞ Deutocloruro de mere. 5ij (8 gr.).
Goma arábiga en polvo,
Agua destilada, ãã. . . 3j (12 dec.).
M. I. Grietas y vegetaciones sifilíticas, úlceras cancerosas. *D.* Una aplicacion ligera cada cuatro ó cinco dias. Esta solucion tiene el nombre impropio de pomada.

7741. P. DE CAZENAVE.

℞ Zumo de siempreviva,
Zumo de yerbamora,
Aceite de almendras dulces, ãã. . . . . 5jv (125 gr.).
Manteca de cerdo. . . 5ij (60 gr.).
M. I. Grietas y fístulas. Se da de grasa una mecha y se introduce en el ano. Metritis, quemaduras, encantis, hemorroides, catarro útero-vaginal. *D.* En aplicacion.

7742. P. DE CEBADILLA (*José Gascon*).

℞ Cebadilla. 16
Manteca. 100
H. S. A. *I.* Sarna. *D.* Se dan fricciones dos veces al dia en los puntos enfermos. El tratamiento dura de cinco á seis dias.

7743. P. CETRINA *ó Ungüento cetrino* (F. F.).

℞ Manteca de cerdo,
Aceite comun, ãã. . . lbß (250 gr.).
Mercurio. . . . . 5j (32 gr.).
Acido nítrico de 32°. 5jß (48 gr.).
Se disuelve el mercurio en el ácido nítrico á un calor lento, se licúa la manteca con el aceite, y cuando esté medio frio la mezcla se echa en ella la solucion mercurial, se agita para mezclarla exactamente y se vacia en moldes de papel.

I. Sarna; pero no se debe recurrir á ella, porque tiene el grave inconveniente de excitar la salivacion. Vease *Ungüento cetrino de la F. F.*

7744. P. CETRINA CON EL ACEITE DE OLIVAS (*Planche*).

℞ Mercurio purificado. . . 5ij (8 gr.).
Ácido nítr. puro de 32°. 5jv (16 gr.).
Se opera la solucion sin auxilio de mas calor que el que resulta de la reaccion del metal y del ácido.
Por separado se pone en una cazuela de porcelana:
Aceite de olivas muy puro. 5ij y 5iij (76 gr.).
Se coloca la cazuela en un baño de agua calentada á 30° Reaumur; se vierte poco á poco la solucion mercurial, meneando la mezcla á la misma temperatura durante media hora. Se aparta la cazuela del baño y se continua meneando sin interrupcion hasta que la masa haya adquirido la consistencia de cerato; entonces se echa en un tarro de loza.
La pomada preparada de este modo se conserva durante nueve meses á lo menos sin que se altere su color.
Haciendo la mezcla en frio, la pomada es menos consistente y mas pálida; disminuyendo la mitad de la dosis del nitrato de mercurio, se la obtiene aun mas blanda y capaz de reemplazar extemporáneamente la mezcla gris de pomada cetrina y cerato.
I. Sarna y ciertas afecciones herpéticas. *D.* De 5j á 5ij (4 á 8 gr.) para fricciones en las partes enfermas.

7745. P. DE CIANURO DE MERCURIO (*Biett*).

℞ Cianuro de mercurio. . gjv (2 dec.

Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Ulceraciones sifilíticas.

7746. *Otra*, n. 2.

℞ Cianuro de mercurio. ḡxvj (8 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Esencia de limon. . . . 15 gotas.
H. S. A. *I.* Se usa ventajosamente contra los herpes escamosos húmedos, acompañados de inflamacion intensa y de prurito quemante, peritonitis, meningitis, metritis, angina, esplenitis, viruelas, atrofia mesentérica, tétanos, cataratas, iritis, oftalmias, sífilis, sifílides, divieso, muermo, prurigo, zona, liquen, efélides, gota. *D.* C. s. para dar ligeras fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

7747. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Cianuro de mercurio. ḡx (50 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Enfermedades de la piel con prurito y úlceras venéreas.

7748. *Otra* (PARENT).

℞ Cianuro de mercurio. ḡxij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Ulceras sifilíticas, herpes escamosos húmedos con inflamacion y prurito.
Nota. Se puede aromatizar esta pomada con algunas gotas de un aceite esencial.

7749. P. DE CIANURO DE PLATA.

℞ Cianuro de plata. . . . ḡxij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. Para diez fricciones.
I. Enfermedades sifilíticas, prurito, encantis, oftalmias. *D.* Dos fricciones al dia.

7750. P. DE CIANURO DE POTASIO (*Biett*).

℞ Cianuro de potasio. . ḡxij (6 dec.).
Aceite de almendras amargas. . . . . ʒij (8 gr.).
Cerato de Galeno. . . ʒij (60 gr.).
M. I. Liquen y prúrigo, cuando la piel está muy seca y es muy viva la comezon.

7751. P. DE CIANURO DE POTASIO (H. DE M.).

℞ Cianuro de potasio. . ḡiij (15 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
H. S. A. *I.* Neurosis. *D.* En fricciones.

7752. *Otra* (LOMBART).

℞ Cianuro de potasio. ḡiij á ḡvj (15 á 30 cent.).
Manteca de cerdo. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Ulceraciones escrofulosas complicadas con sífilis y acompañadas de dolores. *D.* El volúmen de una avellana para cada friccion.

7753. *Otra* (SANDRAS).

℞ Cianuro de potasio. . . ḡjv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).
M. I. Neuralgias, reumatismo crónico. *D.* En fricciones.

7754. P. DE CIANURO DE ZINC.

℞ Cianuro de zinc. . . . . ḡjv (2 dec.).
Grasa,
Manteca de cacao, ää. ḡxc (5 gr.).
H. S. A. *D.* Una friccion cada cuarto de hora en la frente, párpados y sienes con el volúmen de una judía de esta pomada.

7755. P. DE CICUTA.

℞ Cicuta machacada. 1
Manteca. . . . . 2 á 4
Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresion y se separan las heces.
I. Sirve para curar las úlceras escrofulosas.

7756. *Otra*, n. 2.

℞ Aceite de cicuta,
Aceite de beleño, ää. ʒijß (40 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Catarata, priapismo, didi-

malgia, mammitis, reumatismo, cuerpos extraños, úlceras cancerosas y escrofulosas, hemorroides. *D.* En fricciones en la parte dolorida.

7757. P. CINABARINA.

℞ Sulfuro rojo de mercur. ʒiß (6 gr.).
Sal amoniaco. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
Se tritura y se aromatiza con
Agua de rosas. . . . . ʒj (4 gr.).

I. Sífilis, sifílides, prúrigo, sarna, lupus, muermo, esplenitis, coriza, atrofia mesentérica. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

7758. P. DE CIRILLO (F. F., F. P., H. DE M.).

℞ Sublimado corrosivo. . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (32 gr.).

Se porfiriza el sublimado corrosivo, se añade la manteca y se continúa la porfirizacion hasta que se obtenga una mezcla muy exacta. Se usa en fricciones como antisifilítico á la dosis de ʒj á ʒij (12 dec. á 4 gr.) en cada friccion. Cirillo aconsejaba precediera á la friccion un pediluvio, y daba la friccion en los dos piés. Es medicamento muy peligroso.

I. Diviesos, herpes, sífilis, escrófulas, cataratas, iritis, liquen, encefalitis, soriasis, pleuresía, atrofia mesentérica.

Si se añade ʒij (12 dec.) de extracto de opio se tiene la pomada de CIRILLO OPIADA. *I.* Gonorrea rebelde. *D.* En fricciones en el perineo.

7759. P. DE CITRATO DE QUININA.

℞ Citrato de quinina. . . ʒß (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).

M. I. Calenturas intermitentes. *D.* En fricciones en los sobacos.

7760. P. CLORADA (F. A.).

℞ Cloro líquido. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (30 gr.).

M. I. Herpes, sarna, tiña, escrófulas, pian, úlceras, lepra, sífilis, eczema. *D.* Se debe preparar en el momento de usarla.

7761. P. DE CLORHIDRATO DE MORFINA.

℞ Clorhidrato de morfina. gx (5 cc.).
Manteca de puerco. . . ʒij (30 gr.).
Mézclese exactamente.

D. Se extiende sobre el sitio de eleccion una masa mas ó menos considerable, segun la superficie de la parte dolorida y la intensidad del dolor, desde el volúmen de un guisante hasta el de una nuez, repitiéndose estas fricciones segun lo exige la clase y rebeldía de la afeccion.

7762. P. DE BICLOROIODURO DE MERCURIO.

℞ Bicloruro de mercurio. . . . 1 á 2
Bioduro de potasio. . . . . 1 á 2
Manteca. 30

Se tratan los dos cuerpos por el alcohol, juntos ó separados, se los somete á la evaporacion, se los deseca en la estufa y se los mezcla con la manteca.

7763. P. DE CLOROIODURO DE MERCURIO (*Recamier*).

℞ Cloroioduro de merc. ʒij (4 dec.).
Manteca.
ó Cerato sin agua. . . . ʒijß (10 gr.).
Mézclese exactamente.

I. Sirve para resolver los tumores del pecho. *D.* Una ó dos fricciones al dia con gxviij (1 gr.) de esta pomada.

7764. P. CLORO-MERCÚRICA (*Miathe*).

℞ Bicloruro de mercurio. ʒij (4 gr.).
Clorhidrato de amoníac. ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (64 gr.).

Se tritura el sublimado y la sal amoníaco, se añade poco á poco la manteca y se continúa triturando hasta que esto bien homogénea.

Se puede usar en lugar de la pomada napolitana en el tratamiento abortivo de ciertas afecciones inflamatorias locales, y se la ha preconizado para reemplazar la pomada de Cirillo, siendo mas activa que ella.

7765. P. CLORO-PLATÍNICA (*Hoefer*).

℞ Cloruro de platino. 1
Extracto de belladona. 2
Manteca. 30
M. I. Ulceras indolentes. *D.* En fricciones.

7766. P. CLORO-PLÓMBICA (*Mialhe*).

Acetato neutro de plomo . . . . . gxviij (1 gr.).
Cloruro de sodio. . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese.

7767. P. DE CLORURO AMONIACO MERCURIAL (*Biett*).

℞ Cloruro amoniaco mercurial. ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gx (5 dec.).
Cerato amigdalino. . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Acne, sicosis. *D.* En fricciones.

El UNGUENTO DE CLORURO DE MERCURIO Y AMONIACO DE LA F. DE L. se compone de ʒj (4 gr.) de cloruro y ʒßß (48 gr.) de manteca.

7768. P. CON EL CLORURO DE CAL.

℞ Azufre sublimado y lavado. . . . . ʒiij (90 gr.).
Cloruro de cal bien triturado. . . . . ʒjv (125 gr.).
Manteca. . . . . ʒxij (375 gr.).
M. I. Sarna. *D.* Se usa en fricciones mañana y noche.

7769. P. DE CLORURO DE CALCIO.

℞ Cloruro de calcio. . . . ʒj (4 gr.).
Digital. . . . . ʒij (8 gr.).
Vinagre. . . . . gxlv (3 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Artrocace, adenitis crónica, tisis, sífilis, pian, eczema, lepra. *D.* ʒj (4 gr.) en fricciones, dos veces al dia.

7770. P. DE CLORURO DE ESTAÑO.

℞ Cloruro de estaño. ℊj á ℊij (5 á 10 cent.).
Manteca de cerdo. . . ℔j (500 gr.).
H. S. A. Se divide en ocho dosis iguales, de las cuales emplea una el enfermo en friccion en la parte interna de los muslos.

7771. P. DE PROTOCLORURO DE MERCURIO *ó Pomada de mercurio dulce* (*Cazenave*).

℞ Protocloruro de mercurio. ℈j á ʒj (1,3 á 4 gr.).
Manteca purificada. . . ʒj (30 gr.).
I. Al fin de las erupciones crónicas y en el tratamiento de las afecciones escamosas, úlceras sifilíticas.

La fórmula de los H. M. F. contiene una parte de protocloruro por ocho de manteca.

7772. P. DE CLORURO DE ORO (*Chrestien*).

℞ Cloruro de oro. . . . ℊxij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Se usa en tópico un poco espeso ó en fricciones ligeras sobre las excrescencias sifilíticas, úlceras venéreas rebeldes de naturaleza escrofulosa, etc.

7773. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Magendie*).

℞ Cloruro de oro y sodio. ℊij (1 dec.).
Manteca purificada. . . . ʒj (30 gr.).
D. Se aplica esta pomada en la superficie de un pequeño vejigatorio para hacer absorver la sal de oro.

7774. P. DE CLORURO DE ORO Y SODIO (*Chrestien*).

℞ Cloruro de oro y sodio. ᵍ̃xij (6 dec.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
Mézclese bien.

I. Sífilis, sifílides, helmintiasis, pian, lepra, lupus. *D.* En fricciones. *I.* Congestion, bubones indolentes, aplicado á la superficie de un vejigatorio pequeño.

7775. *Otra* (NIEL).

℞ Cloruro de oro y sodio. ᵍ̃v (5 dec.).
Manteca. . . . . ℨß (15 gr.).

I. Para aplicar en la piel denudada por un vejigatorio, cuando el enfermo no puede darse las fricciones en la lengua.

7776. P. DE CLORURO DE PLATA (*Sicard*).

℞ Cloruro de plata. . . . ᵍ̃jv (2 dec.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Infartos escrofulosos.

7777. P. DE COLOQUÍNTIDA (*Chrestien*).

℞ Coloquíntida en polvo. . ℥j (4 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).
M. Se usa como purgante en fricciones sobre el vientre, y en las afecciones mentales, en el delirio maniático y en la demencia. *D.* ℥ij (8 gr.) en fricciones en el vientre.

7778. P. DE LA CONDESA ó *Pomada virginal.*

℞ Sulfato de zinc. . . . . ℨß (16 gr.).
Hojas de arrayan,
Zumaque, ãã. . . . . ℨiij (12 gr.).
Agallas de encina,
Nuez de ciprés,
Cáscara de granada. ãã. ℥ij (8 gr.).

Se pulverizan separadamente todas estas sustancias, se las mezcla, se las pasa por un tamiz muy fino y se las incorpora con cantidad suficiente de unguento rosado.

I. Se usa esta preparacion astringente para hacer contraer los esfínteres demasiado dilatados. Metrorragias, leucorrea, metritis, marceo, catarro úlero-vaginal. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes que se quiere hacer contraer.

7779. P. CONTRA EL ACNE ENDURECIDO.

℞ Cal apagada. . . . . ℥j (4 gr.).
Alcanfor puro. . . . . ℨß (6 dec.).
Cerato calaminar. . . . ℥j (30 gr.).
D. Se usa tópicamente.

7780. P. CONTRA EL ACNE ROSADO (*Boinet*).

℞ Protoioduro de mercur. ℨß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℨv (20 gr.).
M. I. Barros inveterados. *D.* En fricciones mañana y noche.

7781. P. CONTRA LA ALOPECIA (*Schneider*).

℞ Zumo reciente de limon. ℥j (4 gr.).
Extracto de quina. . . . ℥ij (8 gr.).
Tintura de cantáridas. . ℥j (4 gr.).
Aceite de cedro. . . . . ℥j (12 dec.).
Aceite de bergamota. . 10 gotas.
Tuétano de vaca. . . . . ℥ij (60 gr.).

Se liquida el tuétano de vaca, y primero se añade el extracto de quina ablandado con el zumo de limon y despues la tintura alcohólica y los aceites.

Se lava primero la cabeza con agua de jabon, al otro dia se da una friccion con un poco de pomada y se vuelve á aplicar todos los dias, durante un mes ó seis semanas.

7782. *Otra*, n. 2.

℞ Manteca balsámica. 300
Zumo de limon. 6

Tintura de cantáridas. 2
Esencia de limones. 10
H. S. A.

7783. P. CONTRA LA ALOPECIA.

℞ Tuétano de vaca. . . . . ʒvj (24 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒij (8 gr.).
Sulfato de quinina. . . . ʒß (2 gr.).
Esencia de rosas. . . . . 3 gotas.

Se incorpora exactamente el sulfato de quinina en la mezcla líquida de los dos cuerpos grasos y se la aromatiza con esencias. Se aplica todas las mañanas un poco de esta pomada.

7784. P. CONTRA LA AMAUROSIS (*Miquel*).

℞ Cerato. 48
Pomada epispástica. 60
Estricnina. . . . . 5 á 6
Alcohol. . . . . algunas gotas

para disolver la estricnina.

M. Se cura el vejigatorio en la nuca con gxij (6 dec.) de esta pomada, extendida en una hoja de acelga.

7785. P. CONTRA EL BOCIO (*Pitschaft*).

℞ Borato de sosa. 10
Opio puro 5
Pomada rosada. 50

H. S. A. una pomada perfectamente homogénea.

I. Bocio, várices. *D.* C. s. para dos fricciones al dia sobre el tumor.

7786. P. CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS.

℞ Quina roja en polvo. . ʒj (4 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒij (8 gr.).
Tuétano de vaca fundido y clarificado. ʒvj (180 gr.).

Se trituran hasta el completo enfriamiento y se añade al fin:

Esencia de bergamota. 6 gotas.
Bálsamo del Perú. . . 20 gotas.

7787. *Otra* (DUPUYTREN).

℞ Tuétano de vaca. . ℔ß (250 gr.).
Acet. de plomo crist. ʒj (4 gr.).
Bals. negro del Perú. ʒij (8 gr.).
Alcohol de 21°. . . . ℥j (32 gr.).
Tintura de cantár. ℥j (12 dec.).
Tintura de clavo,
Tint. de canela, ãã. 15 gotas.

D. Todas las noches se unta el cuero cabelludo con el grueso de una nuez de esta pomada.

7788. *Otra* (RICORD).

℞ Tuétano de vaca preparado,
Cerato azufrado, ãã. . . ʒß (16 gr.).
Turbit mineral. ʒß á ʒj (2 á 4 gr.).
Esencia de limon. . . . . c. s.

para aromatizarla.

I. Sífilis y ciertas afecciones eruptivas de la piel de la cabeza. El enfermo se aplicará la pomada con los dedos.

7789. P. CONTRA LOS CALLOS.

℞ Pez blanca. . . . . ʒj (4 gr.).
Cera amarilla. . . . . ʒij (8 gr.).
Trementina. . . . . ʒß (2 gr.).

Se liquida y se añade:

Acetato de cobre purificado. . . . . ʒß (2 gr.).

Se agita hasta que se enfrie.

D. Se cubre con ella los callos y ojos de gallo.

7790. P. CONTRA LA CIÁTICA (*Bourge*).

℞ Pomada estibiada. . . . ʒj (30 gr.).
Extracto de acónito. . . ʒj (4 gr.).

M. I. Se usa en fricciones en la direccion del nervio.

7791. P. CONTRA LA CIFOSIS (*Cazenave*).

℞ Carbonato de potasa. gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒv (20 gr.).
Alcanfor. . . . . giij (15 cent.).

Mézclese.

7792. P. CONTRA EL CRUP.

℞ Precipitado blanco. . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. D. Se emplea en dos ó tres veces al dia despues de las emisiones sanguíneas.

7793. *Otra* (RADEMACHER).

℞ Extracto de digital. . . . ʒij (8 gr.).
Cerato. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *D.* Se aplica á la parte anterior del cuello y por medio de compresas empapadas en esta pomada. Probablemente habrá convenido en el crup falso y en la angina estridula.

7794. P. CONTRA EL DERRAME ARTICULAR (*Biechy*).

℞ Nitrato de plata. . . . . ʒj (1 gr.).
Agua destilada. . . . . c. s.

para disolver la sal.

Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

El autor recomienda disolver antes la sal en agua, para evitar la rubefaccion y la vexicacion. Produce buenos efectos.

7795. P. CONTRA EL ECZEMA (*Velpeau*).

℞ Precipitado blanco. ȝß á ʒj (2 á 4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Mézclese exactamente.

I. Afecciones escamosas con prurito.

7796. P. CONTRA EL ECZEMA CRÓNICO (*Mialhe*).

℞ Manteca reciente. 40
Turbit nitroso. 2
Extracto de opio. 1

H. S. A. *I.* Blefaritis crónica. *D.* En fricciones mañana y noche.

7797. P. CONTRA EL ECZEMA Y CIERTOS PRURITOS (*Wienhoffb*).

℞ Plombagina. . . . . ʒvj (180 gr.).
Manteca. . . . . ʒv (300 gr.).

M. D. Dos aplicaciones al dia con cantidad proporcionada á las superficies enfermas.

7798. P. CONTRA EL ECZEMA (*Devergie*).

℞ Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Calomelanos. . . ȝß á ʒj (2 á 4 gr.).
Alcanfor. . . gv á gvj (25 á 30 cent.).

Se pulverizará el alcanfer por medio de un poco de alcohol y despues se mezclará todo.

Calma las comezones violentas del eczema.

En el último período para dar á la piel su resistencia primitiva, se usa la pomada siguiente:

Tanino. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Tambien se usa la de brea; pero entonces no conviene una fórmula que contenga mucha brea sino la siguiente:

Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Brea. . . gjx á gxvij (0,5 á 1 gr.).

La brea es muy resolutiva, pero tambien es muy excitante para una superficie eczematosa.

7799. P. CONTRA EL ECZEMA DE LA PIEL DE LA CABEZA, TIÑA AMIANTACEA.

℞ Sulfato de potasa. . . . ȝß (2 gr.).
Sosa de Alicante. . . . ȝß (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Se da en unturas por la noche y se cubre la cabeza con papel de seda.

I. Afecciones escamosas con prurito.

7800. P. CONTRA LAS ERUPCIONES SECAS (*Ricord*).

NÚMERO 1.

℞ Cerato azufrado. . . ʒj (30 gr.)

Turbit mineral. . . . ℊxviij (1 gr.).
Brea. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A.

NÚMERO 2.

℞ Cerato azufrado. . . ʒj (30 gr.).
Calomelanos preparados al vapor. . . ʒß (2 gr.).
Brea. . . . . ʒj (4 gr.).
H. S. A. *J.* Irritaciones secas de la piel, pitiriasis, ictiosis, liquen, lepra vulgar ó sifilítica, y en la terminacion de las erupciones que se parecen á las que se acaba de enumerar.

7801. P. CONTRA EL ECZEMA (*Biett*).

℞ Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Sulfato amar. de merc. ℈j (12 dec.).
Láudano líquido. . . . ℊxij (6 dec.).
D. Se usa en unturas sobre las partes atacadas de eczema crónico.

7802. P. CONTRA LAS ESCORIACIONES OCASIONADAS POR PERMANECER EN LA CAMA.

℞ Cort. de encina machac. ʒij (64 gr.).
Agua. . . . . c. s.
Se cuece durante una hora, de modo que se obtenga ℔ß (250 gr.) de líquido colado, en el cual se añade:
Acetato de plomo en polvo. . . . c. s.
hasta que ya no forme precipitado. Se deja en reposo, se recoge el precipitado que se lava en agua fria y se incorpora en
Manteca fresca. . . . . ʒj (32 gr.).
Se aplica con el objeto indicado.

7803. P. CONTRA LA ESTIOMENA (*Duchesne Duparc*).

NÚMERO 1.

℞ Estoraque líquido,
Manteca lavada, ää. . ʒiij (90 gr.).
Sublimado corrosivo,
Tártaro emético, ää. . ʒj (4 gr.).
Tintura de cantáridas,
Aceite de euforbio, ää. ʒß (2 gr.).
H. S. A. una pomada homogénea.

NÚMERO 2.

℞ Estoraque líquido. . . ʒjv (120 gr.).
Manteca lavada. . . . ʒij (60 gr.).
Sublimado,
Emético, ää. . . . . ʒij (8 gr.).
Tintura de cantáridas,
Aceite de euforbio, ää. ʒj (4 gr.).
H. S. A. una pomada homogénea.

7804. P. CONTRA EL FAVUS.

℞ Dentoioduro de merc. ℊxx (1 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. D. C. s. para fricciones en las partes enfermas.

7805. P. CONTRA LAS GRIETAS DEL ANO (*Dilay*).

℞ Manteca. . . . . ʒß (15 gr.).
Tanino. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Se eleva la dosis hasta ℊlv (3 gr.) segun el efecto que se observe.
D. El volúmen del hueso de una guinda de esta pomada, introducida por medio del dedo.

7806. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LAS MANOS (*Vercl*).

℞ Polvo fino de bol arménico,
Polvo fino de mirra,
Polvo fino de albayalde, ää. . . . . ʒiij (12 gr.).
Yema de huevo. . . . . c. s.
H. S. A. una pomada blanda.

7807. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS (*Bericl*).

℞ Manteca pura. . . . . ʒj (30 gr.).
Oxido de zinc. . . . . ʒß (2 gr.).
Láud. de Sydenham. ℊxviij (1 gr.).
H. S. A. *J.* Es muy eficaz contra las grietas. *D.* Se usa en unturas tres veces al dia.

7808. P. CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS (*Chevallier*).

℞ Manteca de cacao. . . . ʒß (15 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒij (8 gr.).
Mucilago de semillas de membrillos. . . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. I. Se usa como cicatrizante de las grietas. *D. C. s.* para cubrir ligeramente y muchas veces al dia los puntos enfermos.

7809. *Otra* (CRUVEILHIER).

℞ Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Bals. liquido del Peru. ʒj (4 gr.).

M. Si los dolores son muy vivos se añade :

Opio en bruto. . . . . ℊij (1 dec.)

y en este caso el niño no debe mamar.

7810. P. CONTRA EL HERPES CIRCINATUS.

℞ Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Sulfuro de cal. . . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxv (75 cent.).

M. D. El volúmen de una nuez pequeña para cada friccion.

7811. P. CONTRA LOS HERPES (*Gibert*).

℞ Ungüento cetrino. 10

Se lava con cuidado con agua destilada y se incorpora con

Pomada de pepino. 30

I. Herpes, pitiriasis, líquen y soriasis. Se debe acompañar el uso de esta pomada con un tratamiento interno. *D.* En fricciones.

7812. P. CONTRA LOS HERPES (*Mad. Marechale*).

℞ Manteca lavada en agua de rosas. . . . . ʒij (64 gr.).
Oxido rojo de mercurio. ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊvj (3 dec.).

M. I. Oftalmias, herpes. *D.* Se dan fricciones con el volumen de un grano de trigo de esta pomada en el borde libre de los párpados. Tiene mucha analogía con la *pomada del Regente de la F. F.*

7813. P. CONTRA EL HERPES TONSURANS (*Cazenave*).

℞ Tanino. . . . . ℊxviij (1 gr.
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Agua. . . . . c. s.

H. S. A. D. En unturas en las partes afectadas. Se las lava todos los dias con una solucion alcalina. Cazenave usa algunas veces la siguiente pomada.

7814. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Ungüento cetrino. . . ʒv (20 gr.).
Brea. . . . . ʒijß (10 gr.).

M. D. En fricciones.

7815. P. CONTRA EL IMPÉTIGO DESPARRAMADO.

℞ Cerato. . . . . ʒj (30 gr.).
Sulfato de mercurio rojo. ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊx (5 dec.).

M. D. C. s. para dar fricciones todas las noches sobre las partes enfermas, en cantidad proporcionada á las superficies afectadas.

7816. P. CONTRA LOS INFARTOS CANCEROSOS (*Boinet*).

℞ Bromuro de potasio.
Joduro de hierro, ää. ʒß (2 gr.).
Bromo liquido. . . . . 40 gotas.
Manteca. . . . . ʒjß (45 gr.).

M. D. Una friccion, mañana y noche, de un cuarto de hora de duracion.

7817. P. CONTRA LOS INFARTOS GLANDULARES (*Boinet*).

℞ Deutoioduro de merc. ℊiv (2 dec.)

Ioduro de potasio. . . ℈j (12 dec.).
Manteca. . . . . ℥jv (125 gr.).
M. D. Dos fricciones al dia.

7818. P. CONTRA EL INTERTRIGO (*Rosen*).

℞ Cerato. . . . . ℥ß (15 gr.).
Flores de zinc,
Polvo de licopodio, ää. ʒj (4 gr.).
H. S. A.

7819. P. CONTRA EL LÍQUEN (*Biett*).

℞ Protonitrato de mercurio,
Alcanfor, ää. . . . . ℈j (12 dec.).
Manteca,
Aceite de almendras dulces, ää. . . . . ℥ß (15 gr.).
M. D. C. s. para fricciones por la noche sobre las partes enfermas.

7820. *Otra* (BIETT).

℞ Alumbre. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxv (75 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. D. Se dan fricciones sobre las partes enfermas al tiempo de acostarse.

7821. P. CONTRA LA MENTAGRA.

℞ Protosulfuro de mercurio. . . . ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Manteca. . . . . ℥ij (60 gr.).
M. D. Se aplica á las superficies enfermas.

7822. P. CONTRA LAS NEURALGIAS (*Debourge*).

℞ Cerato. . . . . ℥jv (16 gr.).
Carbonato de plomo. . ʒiij (12 gr.).
Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
M. I. Es muy útil en las neuralgias faciales. *D.* Una friccion tres horas antes de la aparicion del acceso, y se repite de hora en hora; cada una durará diez minutos á la vez. Antes de usar las unturas se recomienda quitar la pomada que quedó de la untura anterior, y empezar las unturas con nueva dosis de pomada.

7823. P. CONTRA LA NEURALGIA FACIAL (*Brookes*).

℞ Atropina. . . . . ℊv (25 cent.).
Manteca de cerdo. . . ʒiij (12 gr.).
Esencia de rosas. . . una gota.
H. S. A.

7824. P. CONTRA LAS NEURALGIAS (*Calvé*).

℞ Veratrina. . . . . ℊj (5 cent.).
Manteca rancia. . . . ʒj (4 gr.).
Se aumenta sucesivamente la dosis de la veratrina hasta ℊij (1 dec.).
D. Se dan fricciones en el punto dolorido, ó en el punto de donde nace el dolor.

7825. P. CONTRA LA NEURALGIA FACIAL (*Fouquier*).

℞ Opio. . . . . ʒj (4 gr.).
Carbonato de plomo. . . ʒj (32 gr.).
Manteca. . . . . ℥ß (16 gr.).
Bálsamo tranquilo. . . c. s.
M. D. Se dan fricciones en los puntos doloridos muchas veces al dia.

7826. P. CONTRA LA OCTORREA CRÓNICA (*Meniere*).

℞ Protoioduro de merc. ℊxx (1 gr.).
Hidrocl. de morfina. . ℊjv (2 dec.).
Pomada de pepinos. . ℥ß (15 gr.).
D. Se usa en fricciones en el interior del oido, con un clavo de hilas de algodon cubierto de esta pomada.

7827. P. CONTRA LAS OFTALMIAS ESCROFULOSAS (H. DE NIÑOS).

℞ Oxido de zinc. . . . ℊxv (75 cent.).
Calomelanos. . . . ℊxij (6 dec.).

Alcanfor. . . . . gviij (4 dec.).
Manteca de vacas
fresca. . . . . 3ij (8 gr.).
Manteca de cacao. . 3xij (48 gr.).

M. D. El tamaño de la cabeza de un alfiler en el borde libre de los párpados, cada dos ó tres dias, al tiempo de acostarse.

7828. P. CONTRA LOS PIOJOS ó *Pomada de estafisagria.*

℞ Polvo de estafisagria. 1
Manteca. 2

Se infunde en caliente durante algunas horas y se cuela con expresion. V. *Pomada de estafisagria.*

Sirve para destruir los piojos.

7829. P. CONTRA LOS PIOJOS Y LAS LADILLAS.

℞ Vinagre,
Estafisagria,
Miel,
Azufre, ãã. . . . . 3j (30 gr.).
Aceite comun. . . . . 3ij (60 gr.).
M. S. A.

7830. P. CONTRA EL PRÚRIGO.

℞ Manteca,
Zumo de siempreviva,
Aceite de hipericon,
Agua de cal, ãã. . . . . 3ij (30 gr.).

D. Se usa en fricciones sobre las partes enfermas.

7831. *Otra* (BIETT).

℞ Carbonato de sosa. . . 3ij (8 gr.).
Extr. acuoso de opio. . gx (5 dec.).
Cal apagada. . . . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3ij (60 gr.).

D. Se usa con ventaja en diferentes especies de prúrigo.

7832. *Otra* (DEBREYNE).

℞ Pez líquida. . . . . 3ij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (24 dec.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).

H. S. A. *D.* En fricciones mañana y noche.

7833. P. CONTRA LAS PUSTULAS DE LAS VIRUELAS.

℞ Ungüento mercurial. . . . . 1?
Cera amarilla. 5
Pez negra. 3

H. S. A. Se aplica esta pomada sobre las postillas de las viruelas; impide que dejen impresiones en la piel, y tiene la ventaja sobre la pomada mercurial de ser mas consistente y de no correrse.

7834. P. CONTRA LAS QUEMADURAS.

℞ Yema de huevo endurecida. . . . . número una.
Cera amarilla. . . . . 3ß (15 gr.).
Aceite de alm. dulces. 3jß (45 gr.).

Se hace un cerato con el aceite y la cera, y se le incorpora la yema de huevo.

7835. *Otra* (SUTRO).

℞ Creosota. . . . . 15 gotas.
Carbon animal. . . . . gxviij (1 gr.)
Alcohol rectificado. . 3ß (2 gr.)
Ungüento de esperma
de ballena. . . . . 3j (30 gr.).

H. S. A. *D.* Se aplica á las superficies ulceradas por medio de compresas finas ó de planchuelas de hilas.

7836. P. CONTRA LOS SARAÑONES.

℞ Cera amarilla. . . . . ßvß (250 gr.).
Extracto de Saturno. 3j (30 gr.).
Alcanfor. . . . . 3j (30 gr.).
Aceite de laurel. . . . ßvß (250 gr.).
Manteca. . . . . ßvß (250 gr.).

H. S. A. *D.* 5ij á 5iij (8 á 12 gr.) en fricciones en las partes no ulceradas.

7837. P. CONTRA LOS SARAÑONES ó *Arcano del cura Walher, comprado por el Gobierno de Wurtemberg.*

℞ Manteca de vaca.

Manteca de puerco, ãã. lbj (500 gr.).
Limaduras de hierro. 5jß (16 gr.).

Se mezclan en una vasija de hierro, agitando con una espátula del mismo metal hasta que la masa tome color negro; despues que se ha dejado aposar se decanta y se añade:

Trementina de Venecia. ʒij (64 gr.).
Aceite de bergamota. . ʒj (4 gr.).
Bol de Armenia, triturado antes con aceite comun. . . . ʒij (32 gr.).

Mézclese exactamente.

Se cubren las partes enfermas ulceradas ó no con esta preparacion.

7838. P. CONTRA LOS SABAÑONES *ó Arcano contra los sabañones (Brefeld).*

℞ Manteca de vacas,
Grasa de puerco, ãã. lbj (500 gr.).
Mézclese con
Oxido negro de hierro. ʒij (64 gr.).

Se mezclan en una vasija de hierro, agitando continuamente con una espátula del mismo metal, hasta que la mezcla tome color negro, y despues de haberla dejado aposar, se cuela y se añade:

Trementina de Venecia. ʒij (64 gr.).
Aceite de bergamota. . ʒj (4 gr.).
Bol arménico triturado antes con aceite comun. . . . . ʒij (32 gr.).

Mézclese exactamente.

Se cubren las partes enfermas con compresas de lienzo ó planchuelas de hilas cubiertas de este ungüento.

Se usa principalmente en los casos de sabañones graves.

La formula de Berlen se diferencia de las dos anteriores, en que contiene ʒij (30 gr.) de oxido negro de hierro, ʒij (30 gr. de trementina de Venecia, ʒß (2 gr.) de aceite de bergamota, y ʒß (15 gr.) de bol armenico, por lbj (500 gr.) de manteca de puerco y lbj (500 gr.) de manteca de vacas.

7839. *Otra* (DEN ERGH).

℞ Manteca de cerdo . . . ʒj (30 gr.
Creosota. . . . . 40 gotas.
Extracto de Saturno. . 40 gotas.
Extracto tebáico. . . . gij (1 dec.).
M. S. A.

Se extiende mañana y noche una capa de esta pomada sobre las partes hinchadas por los sabañones, y se la cubre por medio de un paño de lienzo.

7840. *Otra* (KNOERLZER).

℞ Opio. . . . . ʒj (4 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒß (2 gr.).
Carbonato de amoniac. ʒj (4 gr.).
Acetato de plomo. . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒjß (48 gr.).

Mézclese.

7841. *Otra* (RUST).

℞ Alcanfor,
Opio en polvo, ãã. ʒj á ʒß (12 dec. á 2 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . ʒj (4 gr.)

Se tritura y se añade:

Alambre en polvo. . . . ʒjß (6 gr.).
Cerato de Saturno. . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Sabañones en el segundo grado.

7842. P. CONTRA LOS SABAÑONES ULCERADOS.

℞ Acetato de plomo liq. 6 gotas.
Alcanfor en polvo. . . gxviij (1 gr.).
Pomada de pepinos. . ʒj (30 gr.).
Tintura de benjuí,
Tintura de Tolú, ãã. . ʒß (2 gr.).

M. I. Se aplica una capa ligera sobre los sabañones ulcerados.

7843. P. CONTRA LA SARNA.

℞ Flores de azufre. . . . ʒvj (24 gr.).
Polvo de eléboro bl. ʒiv (16 gr.).
Carbonato de potasa. ʒxij (48 gr.).
Jabon negro. . . . . ʒxij (48 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (32 gr.).
Esencia de espliego. . ʒj (4 gr.).

M. D. ʒß (15 gr.) durante ocho dias. Es muy usada en Inglaterra y en Bélgica.

7844. P. CONTRA LA SARNA.

℞ Brea. . . . . ʒj (30 gr.).
Turbit mineral. . . . ʒß (15 gr.).
Oxido rojo de mercur. ʒß (15 gr.).
Manteca. . . . . ʒiij (90 gr.).
Esencia de limon. . . . ℥xviij (1 gr.).

M. I. Sarna. *D.* ʒß (15 gr.) en fricciones, mañana y noche. Cura en cuatro dias.

7845. *Otra* (EMERY).

℞ Jabon negro. . . . . lbß (250 gr.).
Sal marina. . . . . ʒjv (125 gr.).
Azufre. . . . . ʒjv (125 gr.).
Alcohol. . . . . ʒj (30 gr.).
Vinagre. . . . . ʒij (60 gr.).
Cloruro de sodio. . . . ʒß (15 gr.).

D. ʒj (30 gr.) al dia para dos fricciones.

7846. *Otra* (FORGET).

℞ Sulfuro de cal. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . c. s.

D. Se dividen en dos partes iguales, que se colocan por la noche en el sobaco.

7847. *Otra* (HOSPITAL).

℞ Azufre sublimado y lavado. . . . . ʒiij (96 gr.).
Cloruro de cal bien triturado. . . . . ʒjv (125 gr.).
Manteca. . . . . ʒxij (375 gr.).

M. D. Tres fricciones al dia en los puntos ocupados por las vesículas.

Cada dos dias se prescribe un baño ó lociones generales para limpiar la superficie del cuerpo y facilitar la accion de las fricciones. Basta esta dosis para diez ó doce dias.

7848. *Otra* (LISSON).

℞ Litargirio. . . . . ʒi (30 gr.).
Se disuelve á fuego lento en
Aceite comun. . . . . ʒjv (125 gr.).

D. ʒß (15 gr.) mañana y noche para cada friccion, que se hará en las manos, en los piés y en las axilas.

7849. *Otra* (MELIER).

℞ Azufre sublimado. . . . ʒv (150 gr.).
Carbonato de potasa. . ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . ʒj (30 gr.).
Aceite comun. . . . . ʒß (15 gr.).

Se disuelve el carbonato, se le añade el aceite y se incorpora despues el azufre en el jabon formado de este modo.

I. Sarna.

Nota. Esta pomada no ensucia la ropa y no tiene olor. La duracion media del tratamiento es de trece dias.

7850. *Otra* (ROLB).

℞ Calomelanos. . . . . ʒij (8 gr.).
Aceite de almendras. . . ʒi (32 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒij (8 gr.).

H. S. A. *D.* En diez dosis.

7851. P. CONTRA LAS SIFÍLIDES ESCROFULOSAS (*Biett*).

℞ Protocloruro amoniacal de mercurio. . . ʒj (12 dec.).
Alcanfor. . . . . ʒß (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. C. s. como tópico en las partes enfermas.

7852. P. CONTRA LA SORIASIS (*Boinet*).

℞ Protoioduro de mercurio. ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).

H. S. A. *I.* Es excelente en la soriasis y en todas las afecciones escamosas rebeldes. *D.* Una friccion al dia.

7853. *Otra* (BOINET).

℞ Deutoioduro de merc. ℥jv (2 dec.).
Joduro de potasio. . . ℥xxx (15 dec.).
Manteca. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. D. Dos fricciones al dia.

7854. P. CONTRA LA TIÑA.

℞ Sosa cáustica,
Sulfuro de potasa, ãã. ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒiij (90 gr.).

Se reducen á polvo la sosa y el sulfuro y se los incorpora despues con la manteca.

D. Se usa en fricciones sobre la cabeza de los tiñosos, despues de haber hecho caer las costras por medio de cataplasmas y de haber cortado los cabellos: luego se cubre el cuero cabelludo con papel de estraza.

7855. *Otra*, n. 2.

℞ Ungüento cetrino. . . . ʒß (45 gr.).
Ungüento de brea. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Tiña, pórrigo, liquen. *D.* En fricciones en las partes enfermas.

7856. *Otra*, n. 3.

℞ Carbon,
Azufre, ãã. . . . . ʒjß (50 gr.).
Hollin. . . . . ʒvj (25 gr.).
Carbonato de sosa. . . ʒijß (10 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (100 gr.).

M. I. Tiña, impétigo, liquen. *D.* En fricciones en el cuero cabelludo.

7857. *Otra* (BORIES).

℞ Hollin en polvo fino. . ʒjß (38 gr.).
Sulfato de zinc. . . . . ʒvj (24 gr.).
Manteca. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. D. El grosor de una nuez pequeña dos veces al dia.

7858. *Otra* (ORDINAIRE).

℞ Almidon. 110
Pez de Borgoña. 220
Pez resina. 100
Trementina. 50
Vinagre blanco. 1250

Se hace engrudo con la vinagre y el almidon, se añade la mezcla de pez y trementina y se aparta despues de un ligero hervor. Se extiende esta pomada en capas bastante gruesas sobre vendoletes, que se aplican á los puntos enfermos despues de haber cortado los cabellos. Al siguiente dia están tan pegados que es imposible desprenderlos sin arrancar todos los pelos; se cubre la parte de aceite comun y encima con papel de filtros. Se continúa usando alternativamente los vendoletes aglutinantes y las fricciones aceitosas hasta que la piel haya vuelto á su estado normal.

Ha producido muy buenos efectos.

7859. *Otra* (PINEL GRANCHAMP).

℞ Oxido rojo de mere. . ʒijß (40 gr.).
Carbon. de sosa seco. ʒß (16 gr.).
Sulfato de zinc. . . . . ʒjß (6 gr.).
Tucia. . . . . ʒj (4 gr.).
Flores de azufre. . . . ʒß (16 gr.).
Manteca. . . . . ʒjv (125 gr.).

Mézclese exactamente.

D. Todas las noches se cubre la cabeza con esta pomada y al otro dia se la lava con agua tibia.

7860. P. CONTRA LA TIÑA CON CARBON VEGETAL (H. DE M.).

℞ Carbon vegetal,
Flores de azufre, ãã. ʒjv (125 gr.).
Hollin de chimeneas. ʒij (60 gr.).

Mézclese despues de bien pulverizados y añádase:
Manteca de puerco. . ʒxv (450 gr.).

I. Tiña.

7861. P. CONTRA LA TIÑA CON CARBON ANIMAL (H. DE M.).

℞ Carbon animal. . . ʒij (60 gr.).
Azufre puro. . . . . ʒj (30 gr.).
Precipitado blanco. ʒß (15 gr.).
Sebo,
Manteca, ãã. . . . ʒxviij (360 gr.).

H. S. A. *I.* Tiña.

7862. P. Y POLVO CONTRA LA TIÑA FAVOSA (*Petel*).

℞ Sosa del comercio. . . ʒxij (6 dec.).
Cal apagada. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒjv (120 gr.).
Hágase una pomada S. A.
℞ Cal viva. . . . . ʒjv (120 gr.).
Carbon en polvo. . . . ʒij (8 gr.).
Hágase polvo.

Se corta el pelo hasta tres líneas de la cabeza, se hace caer las costras aplicando cataplasmas emolientes de linaza, y se lava la cabeza con agua de jabon ó una lejía ligera. Al sesto dia se da diariamente una friccion con la pomada sobre la parte enferma, se limpia la cabeza con un peine untado con un cuerpo graso y con lociones con agua de jabon cada seis á ocho dias. A las seis semanas, dos meses y frecuentemente mas tarde, se ha conseguido que desaparezca el favus. Entonces se echa cada dos dias una pulgarada del polvo sobre los cabellos. Estos pierden poco á poco su adherencia á la piel y se los puede arrancar fácilmente con unas pinzas ó con los dedos. La avulsion no causa dolor y se concluye á pocas aplicaciones. Luego que está limpia la cabeza se ha terminado la operacion, y solo queda dar de pomada la cabeza cada dos ó tres dias y tener mucha limpieza. Los cabellos nacen donde no se ha destruido su raiz. Se suspenden las fricciones cuando la piel ha tomado su color natural.

7863. P. DE CORNEZUELO DE CENTENO.

℞ Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . ʒxv (15 gr.).
Carburo de azufre. . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Partos laboriosos, aborto, hemorragias, metrorragias, escrecheces, enuresis. *D.* En aplicacion ó en fricciones.

7864. P. COSMÉTICA *ó Cosmética de Albert.*

℞ Agua de rosas. . . . ℔ij (1000 gr.).
Pomada de pepinos. ʒiij (90 gr.).
Jabon amigdalino. . ʒiij (12 gr.).
H. S. A. *I.* Barros ó granos que se presentan en la cara ó en la parte superior del tronco. *D.* Una locion ligera, mañana y noche.

7865. P. COSMÉTICA DE MANTECA DE CACAO (*Lange*).

℞ Manteca de cacao. . ℔j (500 gr.).
Cera virgen. . . . . ℔ß (250 gr.).
Esperma de ballena. ℔ß (250 gr.).
Aceite comun. . . . ℔ij (1000 gr.).
Flores de benjui. . . ʒj (4 gr.).
Bermellon. . . . . ʒj (4 gr.).

Se funden las grasas, en seguida se las bate en un mortero añadiendo ℔vj (3000 gr.) de agua, que contenga en solucion las flores de benjui, despues se añade el bermellon y c. s. de esencia de rosas.

I. Grietas de la cara, de las manos y de los pechos.

7866. P. DE CREMA PARA LA CARA.

℞ Cera blanca. 1
Esperma de ballena. 1
Aceite de almendras dulces. . . 16
Agua de rosas. 12

Se liquida la cera y la esperma de ballena en aceite á fuego lento; se colocan en un mortero caliente y se agita con fuerza; se incorpora poco á poco el agua de rosas.

7867. P. DE CREOSOTA.

℞ Creosota. . . . . ʒß (25 mil.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
Triturese.
I. Ulceras de mal carácter.

7868. P. DE CREOSOTA (*Biff*).

℞ Creosota. . . . . 80 gotas.
Oxido de zinc. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (64 gr.).
H. S. A. *I.* Tiña.

7869. *Otra* (MAX. SIMON).

℞ Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).
Creosota. . . . . gxviij (1 gr.).
Es muy eficaz en el tratamiento de las afecciones papulosas inveteradas. Se debe usar solo cuando la inflamacion ha pasado al estado crónico.
D. En unturas en las partes afectadas.

7870. P. CRISOCROMA (*Cottereau y Verdé-Delisle*).

℞ Ioduro de plomo. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (30 gr.).
Esencia de limon. . . . . c. s.
H. S. A. una pomada.
Nota. Se puede aumentar la cantidad de ioduro hasta ʒij (8 gr.) y mas; se puede añadir igualmente, segun sea necesario, ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) de láudano de Sydenham ó laudano de Rousseau.
I. Se usa ventajosamente contra los infartos escrofulosos, los cánceres, las úlceras de la matriz y otras. Al parecer excede en actividad á las preparaciones de iodo y al iodo mismo; esto inducen á creer los numerosos experimentos que se han hecho estos últimos años. *D.* C. s. para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

7871. P. DE CROLIUS.

℞ Acido sulfúrico. . . . . ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Sarna.

7872. P. DE DELFINA.

℞ Polvo de delfina. . . . gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Piojos. *D.* En fricciones. Véase número 7893.

7873. P. DESECANTE.

℞ Manteca de cacao,
Esperma de ballena, ãã. ʒj (30 gr.).
Cera amarilla. . . . . ʒß (15 gr.).
Acetato de plomo. . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Ulceras por decúbito. Se aplica en capas muy delgadas.

7874. P. DE DESSAULT (H. DE S. J.).

℞ Oxido rojo de mercurio,
Tucia preparada,
Acetato de plomo,
Alumbre calcinado, ãã. ʒj (4 gr.).
Sublimado corrosivo. . gxij (6 dec.).
Pomada rosada. . . . . ʒj (30 gr.).
Se mezcla todo porfirizándolo por mucho tiempo.
I. Afecciones herpéticas, eczema, lepra, zona, lumbago, gota, reumatismo, cuerpos extraños, oftalmias rebeldes, conjuntivitis. *D.* El volúmen de la cabeza de un alfiler para untar el párpado. Con su influencia el dolor aumenta por el pronto; pero las superficies que basta entonces son de un color rojo cárdeno ó pálido, se avivan y propenden progresivamente á la curacion.

7875. P. DE DIGITALINA.

℞ Digitalina. . . . . gj (5 cent.).
Se disuelve en algunas gotas de alcohol á 22° y se incorpora con
Manteca balsámica. . . ʒijß (10 gr.).
I. Anasarca. *D.* En fricciones.

7876. P. DE DIGITAL.

℞ Digital fresca. 1
Manteca. 2
Se cuece á fuego lento hasta que se consuma la humedad.

7868. P. DE CREOSOTA (*Hiff*).

℞ Creosota. . . . . 80 gotas.
Oxido de zinc. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (64 gr.).
H. S. A. *I.* Tiña.

7869. *Otra* (MAX. SIMON).

℞ Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).
Creosota. . . . . gxviij (1 gr.).
Es muy eficaz en el tratamiento de las afecciones papulosas inveteradas. Se debe usar solo cuando la inflamacion ha pasado al estado crónico.
D. En unturas en las partes afectadas.

7870. P. CRISOCROMA (*Collercau y Verde-Delisle*).

℞ Ioduro de plomo. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒi (30 gr.).
Esencia de limon. . . . . c. s.
H. S. A. una pomada.
Nota. Se puede aumentar la cantidad de ioduro hasta ʒij (8 gr.) y mas; se puede añadir igualmente, segun sea necesario, ʒß á ʒj (2 á 4 gr.) de láudano de Sydenham ó láudano de Rousseau.
I. Se usa ventajosamente contra los infartos escrofulosos, los cánceres, las úlceras de la matriz y otras. Al parecer excede en actividad á las preparaciones de iodo y al iodo mismo; esto inducen á creer los numerosos experimentos que se han hecho estos últimos años. *D.* C. s. para fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas.

7871. P. DE CROLIUS.

℞ Ácido sulfúrico. . . . ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
M. I. Sarna.

7872. P. DE DELFINA.

℞ Polvo de delfina. . . . gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Piojos. *D.* En fricciones. Véase número 7893.

7873. P. DESECANTE.

℞ Mantera de cacao,
Esperma de ballena, ãã. ʒj (30 gr.).
Cera amarilla. . . . . ʒß (15 gr.).
Acetato de plomo. . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Ulceras por decúbito. Se aplica en capas muy delgadas.

7874. P. DE DESSAULT (H. DE S. J.).

℞ Oxido rojo de mercurio,
Tucia preparada,
Acetato de plomo,
Alumbre calcinado, ãã. ʒj (4 gr.).
Sublimado corrosivo. . gxij (6 dec.).
Pomada rosada. . . . . ʒj (30 gr.).
Se mezcla todo pulverizándolo por mucho tiempo.
I. Afecciones herpéticas, eczema, lepra, zona, lumbago, gota, reumatismo, cuerpos extraños, oftalmias rebeldes, conjuntivitis. *D.* El volúmen de la cabeza de un alfiler para untar el párpado. Con su influencia el dolor aumenta por el pronto; pero las superficies que hasta entonces son de un color rojo cárdeno ó pálido, se avivan y propenden progresivamente á la curacion.

7875. P. DE DIGITALINA.

℞ Digitalina. . . . . gj (5 cent.).
Se disuelve en algunas gotas de alcohol á 22° y se incorpora con
Manteca balsámica. . . ʒijß (10 gr.).
I. Anasarca. *D.* En fricciones.

7876. P. DE DIGITAL.

℞ Digital fresca. 1
Manteca. 2
Se cuece á fuego lento hasta que se consuma la humedad.

I. Tumores escirrosos ó cancerosos, úlceras cancerosas.

7877. P. ECTRÓTICA CONTRA LAS PÚSTULAS VARIOLOSAS.

℞ Ungüento mercurial.	144
Cera blanca.	60
Pez negra.	36

Mézclese.

Esta mezcla reemplaza muy bien el emplasto de Vigo, que es demasiado duro. Se extiende en una piel, que se coloca en la parte del cuerpo que se quiere libertar de los estragos de las viruelas.

7878. P. DE ELÉBORO.

℞ Raiz de eléboro en polvo. . .	1 á 2
Manteca de puerco.	8

M. Se usa en algunos casos de herpes inveterados.

7879. P. DE ELÉBORO BLANCO.

℞ Polvo de raiz de eléboro blanco. . . . . ℥ß	(15 gr.).
Manteca. . . . . lbß	(250 gr.).

Se mezcla y se añade:

Esencia de limon. . . 3 gotas.

I. Sarna. *D.* En fricciones. El tratamiento dura trece ó catorce dias.

7880. P. EPILATORIA (*Cazenave*).

℞ Carbonato de sosa. . . ℥ij	(8 gr.).
Cal. . . . . ℥j	(4 gr.).
Manteca. . . . . ℥j	(32 gr.).

M. I. Tiña.

7881. P. EPISPÁSTICA (*Radius*).

℞ Ungüento populeon.	
Cera blanca, ää. . . . ℥j	(30 gr.).

Se funde y se añade:

Cantáridas,	
Torbisco, ää. . . . . ℈ß	(6 dec.).

D. gxviij (1 gr.) para activar la supuracion de los vejigatorios.

7882. P. EPISPÁSTICA ALCANFORADA (*Marjolin*).

℞ Cantáridas en polvo.	℥j (35 gr.).
Agua.	℥xij (375 gr.).
Manteca.	℥vj (190 gr.).
Aceite comun,	
Cera blanca, ää. . . .	℥jv (125 gr.).
Alcanfor.	℥ij (8 gr.).

Se hierven las cantáridas en el agua durante media hora, se filtra y se evapora hasta cerca de ℥v (160 gr.), se añaden los cuerpos grasos, se hace evaporar toda el agua, se deja enfriar y se añade el alcanfor.

I. Sirve para mantener la supuracion de los vejigatorios sin ocasionar una irritacion demasiado viva y sin obrar sobre las vias urinarias.

7883. P. EPISPASTICA AMARILLA O SUAVE (F. F.).

℞ Cantáridas en polvo grueso.	℥jv (125 gr.).
Grasa de puerco. .	lbiij y ℥jv (1680 gr.).
Cera amarilla. . .	lbß (250 gr.).
Cúrcuma en polvo.	℥ij (8 gr.).
Esencia de limon,	
ó Esencia de cidra. .	℥ij (8 gr.).

Se ponen las cantáridas y la manteca en un baño maria y se digieren durante tres ó cuatro horas á la temperatura del agua hirviendo, meneando de cuando en cuando; se cuela con fuerte expresion, se pone la pomada al fuego con el polvo de cúrcuma, se hace digerir, se filtra, se liquida el producto con la cera amarilla, se menea la mezcla hasta que se ha enfriado en parte, y se la aromatiza con el aceite volátil de limon.

Tiene las mismas propiedades que la pomada epispastica verde, y se la cree, sin razon suficiente, menos activa.

7884. P. EPISPÁSTICA VERDE (F. F.).

℞ Cantáridas en polvo fino. . . . . ℥j (32 gr.).
Ungüento populeon. ℥xviij (875 gr.).
Cera blanca. . . . ℥jv (125 gr.).

Se liquida la cera á fuego lento con el ungüento populeon, se añaden las cantáridas y se menea hasta que se enfrie.

I. Sirve para sostener una irritacion suficiente en los vejigatorios que se quiere hacer supurar ó impedir que se cicatricen. Se aumenta, disminuye ó se suprime esta pomada, segun que la irritacion es suficiente, fuerte ó excesiva. Se reconoce este último estado en que se segrega una seudomembrana muy adherente, la cual se desprende suspendiendo el uso de la pomada y aplicando sobre el vejigatorio una cataplasma emoliente.

7885. P. EPISPÁSTICA DE TORBISCO (F. F.).

℞ Manteca de cerdo. ℥xjvß (152 gr.).
Cera blanca. . . . . ℥jß (48 gr.).
Cortezas secas de torbisco. . . . . ℥jv (125 gr.).

Se cortan en pedacitos al través las cortezas de torbisco, se echan en un almirez de hierro, se humedecen con un poco de alcohol y se machacan hasta reducirlas á una masa fibrosa; se pone esta en digestion con la manteca por doce horas, se cuela con fuerte expresion, y se deja enfriar lentamente el producto, se separa el sedimento, se licúa la pomada con la cera y se agita hasta que se enfrie.

Conviene cuando se quiere una revulsion lenta y prolongada, y cuando se teme el uso de las cantáridas por razon de una irritacion existente ya en los órganos urinarios ó por una predisposicion de ellos á irritarse. Por lo demás se emplea como las cantáridas, y á veces con preferencia para mantener la supuracion de los vejigatorios.

7886. P. EPISPÁSTICA CON LAS PREPARACIONES DE ORO (*Niel*).

℞ Manteca. . . . . ßß (2 gr.).
Oro dividido por el mercurio. . . . . ℈j (5 cent.).

I. Se emplea en las enfermedades sifilíticas, cuando el estado de la boca no permite emplear fricciones sobre esta parte. *D.* Se pone á descubierto el dermis de uno de los lados del cuello, y estableciendo en él una lengüeta epispástica, se curan mañana y noche los vejigatorios con las mezclas precedentes. Se aumenta gradualmente la dosis del oro dividido hasta ℈ij (10 cent.) y despues se reemplaza la primera pomada por esta:

Manteca. . . . . ßß (2 gr.).
Cloruro de oro y sodio. ℈$_{1/20}$ (5 mil.).

7887. P. EPISPÁSTICA SUAVE (*Henry* y *Guibourt*).

℞ Cantáridas en polvo. 2
Manteca. 42

Se digiere en baño maría, se cuela con expresion, se filtra y se añade:

Cera blanca. 6
Bálsamo nerval. 1

7888. P. DE ESENCIA DE ALMENDRAS AMARGAS.

℞ Esencia de almendras amargas,
Manteca de cacao, ää. . ℥j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Glauconia, iritis, dolores neurálgicos. *D.* Una friccion de hora en hora en la frente y sienes con el volúmen de un guisante de esta pomada.

7889. P. EXCITANTE (*Trussen*).

℞ Clorito de cal,
Borax, ää. . . . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
I. Sabañones. *D.* En fricciones.

7890. P. DE ESPERMA DE BALLENA.

℞ Esperma de ballena. 3
Cera blanca. 1
Aceite de almendras dulces. . . . 8
Se liquidan á fuego lento, se echan en un mortero calentado por medio del agua hirviendo y se tritura hasta que se enfrie la mezcla.
Algunos formularios añaden gjv (2 dec.) de tintura de ambar.

7891. P. DE ESPLIEGO (*Baumé*).

℞ Manteca de cerdo. lbv (2500 gr.).
Flores de espliego recientes y mondadas. . . lbxxx (15000 gr.).
Cera blanca. . . lbß (250 gr.).
Se malaxan en un lebrillo lbjv (2000 gr.) de flores de espliego y toda la manteca; se pone la mezcla en baño maria de estaño, tapado, y se calienta por dos horas; se cuela por un lienzo fuerte; se exprime, se deja en reposo para que se enfrie y separar el agua: se malaxa la manteca con *lbjv (2000 gr.) de nuevas flores;* se pone al calor como la primera vez y se repiten las mismas operaciones hasta que se haya empleado las lbxx (10000 gr.) de flores. Entonces se separa por última vez la pomada del agua que se encuentra en el fondo; se malaxa en muchas aguas para privarla de toda la parte extractiva de las flores; se derrite y enfria de nuevo para separar la humedad y últimamente se licúa con la cera y se echa en las vasijas.

7892. P. DE ESTAFISAGRIA.

℞ Mercurio. . . . . gxviij (1 gr.
Sem. de estafisagria. 5ß (2 gr.
Eléboro blanco. . . . gxviij (1 gr.
Tabaco. . . . . gij (15 cent.
Trementina. . . . . gvj (3 gr.
Manteca. . . . . 3ß (48 gr.
M. I. Tiña, sarna, enfermedad pedicular. *D.* En fricciones en el cuero cabelludo.

7893. *Otra*, n. 2.

℞ Estafisagria en polvo. 1
Cerato simple ó manteca. . . . 24
M. La pomada de estafisagria de Swediaur se prepara con
Estafisagria en polvo. 1
Manteca. 3
Se digiere en el baño maria, se cuela con expresion y se separan las heces despues de fria la pomada.
I. Se usan para matar los piojos.

7894. P. ESTIBIADA (*Fabre*).

℞ Tártaro emético. . . 5ß (2 gr.).
Hidroclorat. de amon. 3j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . gxviij (1 gr.).
Almizcle. . . . . gjx (50 cent.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
Se tritura con cuidado.
I. Calenturas intermitentes, obstrucciones de las vísceras abdominales, hemicránea, epilepsia, enagenacion, angina, aftas, inflamaciones, tisis, pleuresía, bronquitis, carditis, cistitis, laringitis, enteritis, peritonitis, neumonía, coqueluche, encefalitis, meningitis, reumatismo, ciática, cólera, soriasis, catarata. *D.* gxviij (1 gr.) en fricciones, la que se aumentará progresivamente.

7895. P. ESTIBIADA CON BELLADONA (*Bourge de Rollot*).

℞ Pomada estibiada. . . . 3x (40 gr.).
Extracto de belladona. . gxc (5 gr.).
M. D. Se usa en fricciones en las

paredes del pecho para combatir muchas afecciones de los órganos contenidos en esta cavidad.

7896. P. ESTIBIADA *ó Pomada de Autenrieth* (F. F. Y H. M.).

℞ Tártaro emético porfir. 5j (4 gr.).
Manteca de cerdo. . . . 5iij (12 gr.).

Mézclese exactamente sobre un pórfido.

D. El grosor de una nuez para frotar muchas veces al dia la region del estómago.

Nota. Esta preparacion se usa como revulsiva y estimulante local; así obra como rubefaciente, ó producirá pústulas segun la cantidad de pomada y la frecuencia en su aplicacion.

7897. P. ESTIBIADA (H. DE M.).

NUMERO 1.

℞ Tártaro emético. . . . 5j (4 gr.).
Manteca de puerco. . . 5vij (28 gr.).

NUMERO 2.

℞ Tártaro emético. . . . 5ij (8 gr.).
Manteca de puerco. . . 5vj (24 gr.).

NUMERO 3.

℞ Tártaro emético. . . . 5iij (12 gr.).
Manteca de puerco. . . 5v (20 gr.).

Se reduce el tártaro emético á polvo fino, se le mezcla con la manteca y se porfiriza la pomada.

D. En fricciones como revulsivo.

7898. P. ESTIBIO-MERCURIAL (*Stannay*).

℞ Manteca. . . . . ℥jß (48 gr.).
Tártaro emético en polvo fino. . . . . 5ij (8 gr.).
Bicloruro de mercurio. gvj (3 dec.).

H. S. A. Es mas pronta que la pomada de Autenrieth sin producir salivacion.

7899. P. ESTIBIO-RICÍNICA (*Vitzmann*).

℞ Tártaro emético porfirizado. . . . . ǧjv (2 dec.).
Aceite de ricino,
Manteca fresca, ãã. . . 5j (4 gr.).

M. I. Manchas de la córnea. *D.* El grosor de una lenteja, dos veces al dia. En seguida se frota el párpado superior, se cubre el ojo con una compresa caliente para que la pomada se extienda con uniformidad y se absorba. Si se irrita el ojo y hay congestion á la cabeza, se usan pediluvios sinapizados y pomada estibiada á la nuca.

7900. P. ESTIMULANTE (*Levacher*).

℞ Cerato. . . . . ℥jß (48 gr.).
Esencia de trement. ǧxjv (3 gr.).
Láud. de Sydenham. ǧxxxvj (2 gr.).

M. I. Úlceras atónicas y particularmente en las úlceras epsóricas.

7901. P. DE EXTRACTO DE BELLADONA.

℞ Extracto blando de belladona. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca,
ó Cerato simple. . . . . ℥j (30 gr.).

Se pesa la manteca, se coloca el extracto sobre papel graso, se coloca un poco de manteca en el mortero y se tritura; se quita el extracto con un cuchillo dado de grasa, se le pone en un mortero y se tritura; se añade un poco de agua si es necesario, se tritura y se añade el resto del cuerpo graso. Operando así se emplea menor cantidad de agua que la que se necesitaria si se diluyera el extracto. Se puede preparar esta pomada sin añadir agua, reemplazando una porcion de grasa por ǧxc á 5ij (5 á 8 gr.) de cerato de Galeno.

Del mismo modo se preparan las pomadas con el EXTRACTO DE CICUTA, BELEÑO, etc., cualquiera que sea el peso del extracto.

7902. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Hojas de estramonio. ʒij (60 gr.).
Manteca. . . . . ʒiv (120 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒj (30 gr.).
Se cuece á fuego lento.

I. Gota, reumatismo, neuralgia. *D.* En fricciones.

7903. P. DE ESTRAMONIO.

℞ Extracto de estramonio. ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Gota, reumatismo, neuralgias. *D.* En fricciones.

7904. P. DE ESTRICNINA.

℞ Estricnina. . . . . gjv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Mézclese.

7905. *Otra* (SANDRAS).

℞ Estricnina. . . . . gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Reumatismo, ceática, gota, lumbago, anasarca, parálisis, enuresis, nefritis. *D.* Se usa en fricciones sobre los miembros paralizados. Hace desaparecer los tumores que se forman en el dorso de las manos.

7906. P. DE FABRÉ.

℞ Manteca. . . . . ʒj 30 gr.).
Hidroclorato de amoniaco. . . . . ʒj (4 gr.).
Tartrato de potasa antimoniado. . . . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (12 dec.).
Almizcle. . . . . gx (5 dec.).

M. I. Infartos del hígado y obstrucciones análogas, manchas, oftalmias. *D.* gxviij (1 gr.) en fricciones.

Nota. Se puede aumentar gradualmente la dosis segun el grado de sensibilidad de la piel.

7907. P. FEBRÍFUGA CON SULFATO DE QUININA (*Boudin*).

℞ Sulfato de quinina. . . . ʒj (4 gr.).

Se disuelve con algunas gotas de alcohol y ácido sulfúrico y se incorpora con

Manteca. . . . . ʒß (15 gr.).

Se usa cuando el estómago y el recto no pueden soportar la accion de la quinina.

D. En fricciones en la ingle ó axilas despues de haber afeitado la parte, que se cubrirá con un pedazo de lude.

7908. P. FERRUGINOSA CONTRA LA ERISIPELA ó *Pomada marcial* (*Velpeau*).

℞ Protosulfato de hierro en polvo fino. . . . ʒijß (10 gr.).
Manteca fresca. . . . . ʒvij (90 gr.).

M. D. En unturas.

7909. P. FILOCOMA.

℞ Extracto de quina. . . . ʒß (2 gr.).
Aceite de rosas. . . . . 2 gotas.
Aceite de bergamota. . 8 gotas.
Tuétano de vaca. . . . ʒß (15 gr.).

M. I. Recomendada en la calvicie y alopecia.

7910. P. DE FOSFATO DE MERCURIO (*Albano*).

℞ Deutofosfato de merc. ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒxj (44 gr.).

Se mezclan por porfirizacion.

I. Bubones sifilíticos. Comunmente bastan ʒj ó ʒij (4 á 8 gr.) para la curacion.

7911. P. FOSFORADA (*Lescot*).

℞ Aceite fosforado. . . . ʒj (30 gr.).
Manteca. . . . . lbß (250 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Raquitis, disenteria crónica y por atonía. *D.* En fric-

ciones en los riñones, espinazo y miembros.

7912. P. FOSFORADA Y ALCANFORADA (*Cruveilhier*).

℞ Fósforo. . . . . gx (5 dec.).
Alcanfor. . . . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
M. I. Parálisis apoplécticas. *D.* 5ß á 5j (2 á 4 gr.) al dia en fricciones.

7913. P. DE FÓSFORO *ó Grasa de fósforo* (F. F.).

℞ Fosforo. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca de cerdo. . . . 5ij (200 gr.).
Se pone la manteca en un frasco de vidrio de boca ancha y con tapon esmerilado; se añade el fósforo y se coloca en el baño maria teniendo cuidado de interponer entre el cuello y el tapon del frasco un papelito, que impidiendo que se ajuste el tapon dé salida al aire interior; se hace hervir el agua del baño maria, se tapa entonces exactamente el frasco y se agita con violencia hasta que se haya disuelto el fósforo; se saca del baño maria, y se sigue agitando hasta que se enfrie la pomada.
I. Es excitante y se usa en la parálisis, ciertos herpes, varices, gota, reumatismos. *D.* gxviij á gxxxvj (1 á 2 gr.) al dia.

7914. P. DE FOURNIER.

℞ Ungüento mercurial doble. . . . . 3ijß (48 gr.).
Ungüento basilicon. 3vj (24 gr.).
Cantáridas en polvo. gjx (50 cent.).
M. I. Se usa en las Antillas contra las heridas de animales venenosos. *D.* Se cura la herida ó picadura, dos veces al dia, con esta pomada extendida en hilas.

7915. P. DE FULIGOCALI (*Deschamps*).

℞ Fuligocali. gxviij á gxxxvj (1 á 2 gr.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
M. I. Es resolutiva y ligeramente estimulante; á grandes dosis es muy irritante.

7916. P. DE FULIGOCALI SULFURADO (*Deschamps*).

℞ Fuligocali sulfurado,
Almidon, ää. . . . . 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
Mézclese.

7917. P. FUNDENTE.

℞ Cerato opiado. . . . 3j (32 gr.).
Calomelanos. . . . . 5j (4 gr.).
Tintura de iodo. . . . 20 gotas.
Alcanfor en polvo. . . 3ijß (40 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Infartos escrofulosos.

7918. *Otra* (FABRE).

℞ Muriato de amoniaco. . 3j (4 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (12 dec.).
Almizcle. . . . . gx (5 dec.).
Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
M. I. Infartos del hígado. *D.* En fricciones en la region de este órgano.

7919. *Otra* (LERMINIER).

℞ Mercurio dulce. . . . . 3j (4 gr.).
Cerato blanco. . . . . 3j (32 gr.).
Se usa en fricciones en el vientre en los infartos crónicos del hígado.

7920. P. DE GIACOMINI.

℞ Manteca fresca. . . . . 3ß (15 gr.).
Acetato de plomo. . . . 5j (4 gr.).
Agua cohobada de laurel real. . . . . 5j (4 gr.).
M. I. Inflamaciones externas y particularmente contra los sabañones.

7921. P. DE GIROUX.

℞ Brea. . . . . 5ij (8 gr.).

Láudano. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca. . . . . 5j (32 gr.).

M. I. Prúrigo y afecciones escamosas.

7922. P. DE GONDRET (F. F., H. DE M. Y F. P.).

℞ Sebo. . . . . 5j (32 gr.).
Manteca de cerdo. . . . 5j (32 gr.).
Amoniaco líquido de 25°. 5ij (64 gr.).

Se licúan el sebo y la manteca en un frasco de boca ancha, se añade el amoniaco, se tapa el frasco, y se agita con violencia; se sumerje en seguida en agua fria, y se agita la pomada hasta que se enfrie.

Esta pomada sumamente irritante determina la vexicacion en breve tiempo. Así se usa siempre que se quiere denudar prontamente la superficie para administrar algun medicamento por el método endérmico. Mas no es este su principal uso, pues se emplea mucho mas frecuentemente como revulsivo é irritante local en la amaurosis y ciertas oftalmias crónicas. En estos casos generalmente se aplica á la base de la órbita y sobre el trayecto del nervio frontal.

Se emplea con buen éxito contra ciertas afecciones rebeldes de la piel, singularmente contra el prúrigo, y en la catarata, amaurosis, neumonía, epilepsia, encefalitis, neuralgias, ciática, reuma crónico, parálisis, cólera, catarro úterovaginal, angina, laringitis, crup. *D.* En fricciones como rubefaciente; en aplicacion como vexicante. Para esto se cubre de ella una compresa y se hace desprender el amoniaco colocando encima un cuerpo caliente.

7923. P. DE GRAND JEAN.

℞ Ungüento populeon. . 8ijß (750 gr.).
Aceite comun. . . . . 8ij (500 gr.).
Cera amarilla. . . . . 5jx (270 gr.).
Cantáridas. . . . . 5jß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Esta pomada es epispástica. Se aplica detrás de las orejas para desviar la fluxion que se dirige á los ojos.

Nota. Si esta pomada no tiene mas usos, cualquiera otro epispásticoes tan bueno como ella. V. *Pomada epispástica verde*. V. números 7883, 7884 y 7885.

7924. P. DE HANAY.

℞ Tártaro emético. . . . 5ij (8 gr.).
Sublimado corrosivo. . gvj (3 dec.).
Manteca. . . . . 5jß (45 gr.).

Mezclese con cuidado.

D. Se usa exteriormente.

7925. P. DE HELMERICH *ó Pomada sulfojabonosa.*

℞ Flores de azufre. 2
Carbonato de potasa seco. . . . 1
Manteca. 8

M. I. Cáncer, sarna. *D.* Se frota el cuerpo del enfermo en un baño jabonoso de modo que se rompan las pústulas de la sarna, despues se hacen fricciones tres veces al dia, ante el fuego, con 5j (30 gr.) de la mezcla en cada friccion. El tratamiento dura de diez á trece dias.

La formula de la F. P. contiene una parte de subcarbonato de potasa, dos de azufre sublimado y cuatro de grasa de puerco.

7926. P. DE HENKE.

℞ Manteca fresca. . . . 5j (30 gr.).
Oxido de zinc. . . . . 5ß (2 gr.).
Opio en polvo. . . . gj (5 cent.).

H. S. A. *I.* Impétigo crónico.

7927. P. DE LOS HERMANOS MAHON.

℞ Sosa del comercio. . . 5ij (12 gr.).
Cal apagada. . . . . 5ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 5ij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Tiña, favus. *D.* Se usa como la pomada de Alibert.

7928. P. HIDRIODATADA (*Riecke*).

℞ Ioduro de potasio. . . . 5j (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . 5ß (2 gr.).
Agua de rosas. . . . . 5ij (8 gr.).
Ungüento rosado. . . . . 3vj (24 gr.).
H. S. A. Esta pomada se conserva bastante tiempo.

7929. P. HIDRIODATADA (F. F. Y F. P.).

℞ Ioduro de potasio. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca reciente. . . . . 5j (32 gr.).
M. Se tritura primero el ioduro solo, despues con una parte de la manteca, y luego se añade el resto de esta.
I. Tumores escrofulosos é infartos crónicos no cancerosos de los pechos y testículos. *D.* 5ß á 5j (2 á 4 gr.) durante ocho dias, y despues 5j (4 gr.) en fricciones mañana y noche.
Del mismo modo se prepara la POMADA DE IODURO DE PLOMO DE LA F. F.

7930. P. HIDRIODATADA É IODURADA (*Baudeloque*).

℞ Manteca. . . . . 3j (30 gr.).
Iodo. . . . . gr̄vij (6 dcr.).
Ioduro de potasio. . . . 5j (4 gr.).
M. I. Afecciones escrofulosas, y principalmente contra las escrófulas tuberculosas, celulosas ó linfáticas, etc. *D.* El grosor de una avellana en fricciones.

7931. P. DE HIDRIODATO DE AMONIACO (*Biett*).

℞ Hidriodato de amon. gr̄xviij (1 gr.).
Grasa de carnero. . . 3ß (15 gr.).
Aceite de alm. dulces. 5ij (8 gr.).
Mezclense.

7932. *Otra* (GIBERT).

℞ Hidriodato de amoniaco. . . . 1
Manteca. 9
M. I. Soriasis. *D.* En fricciones mañana y noche.

7933. P. DE HIDRIODATO DE POTASA Ó IODURO DE POTASIO (H. DE M.).

NUMERO 1.

℞ Ioduro de potasio. . . . 5ß (2 gr.).
Manteca de puerco. . . 5ij (60 gr.).

NUMERO 2.

℞ Ioduro de potasio. . . . 5j (4 gr.).
Manteca de puerco. . . . 5ij (60 gr.).
H. S. A. *I.* Se usa como resolutiva, no existiendo síntomas de inflamacion aguda.

7934. P. DE HIDRIODATO DE POTASA Y MERCURIO.

℞ Hidriodato de potasa. gr̄xviij (1 gr.).
Ungüento gris. . . . . 5ß (15 gr.).
M. I. Sarcocele, absceso, artrocace, bocio, adenitis, orquitis crónica, esplenitis, pleuresía, infartos, escrófulas, hidrocele, acne, sifílides. *D.* 5ß (2 gr.) en fricciones, mañana y noche.

7935. P. DE HIDRIODATO IODURADO DE POTASA (*Magendie*).

℞ Hidriodato de potasa. . 5ß (2 gr.).
Iodo puro. gr̄v á gr̄xv (25 á 75 cent.).
Manteca. . . . . 5jß (45 gr.).
M. I. Bocio, tumores glandulares escrofulosos, ciertos infartos de los testículos.

7936. P. DE HÍGADO DE AZUFRE.

℞ Hígado de azufre líquid. 5jv (46 gr.).
Manteca balsámica. . . 5x (40 gr.).
Jabon de potasa. . . . . 5x (40 gr.).
M. I. Es muy eficaz en los herpes escamosos ligeros.

7937. P. DE HOLLIN.

℞ Carbon en polvo.
Azufre, ää. . . . . 5j (30 gr.).
Hollin. . . . . 5ß (15 gr.).
Manteca. . . . . c. s.
M. I. Tiña, porrigo, grietas.

helmintiasis. *D.* 5iij á 5jv (12 á 16 gr.) cada tres dias en fricciones en la piel de la cabeza, lavada antes con agua de jabon.

7938. P. DE HOLLIN.

℞ Hollin. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Manteca. . . . . 5j (4 gr.).
Mézclese.

7939. *Otra*, n. 2.

℞ Extr. acético de hollin. ℈xc (5 gr.).
Sal marina decrepitad. 5ijß (10 gr.).
Manteca. . . . . 5jv (125 gr.).
M. I. Herpes ulcerados, tiña, eczema, zona. *D.* En fricciones despues de lavar la parte enferma.

7940. P. DE HOLLIN (*Blaud*).

℞ Hollin. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca. . . . . 5jv (16 gr.).
Mézclese. *I.* Herpes ulcerados, tiña, etc.

7941. *Otra* (CARRON DE VILLARDS).

℞ Tuétano de vaca. . . . 5j (30 gr.).
Extr. de hollin de leña. ℈lx (3 gr.).
Ungüento cetrino. . . . ℈xij (6 dec.).
Aceite de hígado de bacalao. . . . . 9ij (24 dec.).
M. D. El grosor de la cabeza de un alfiler sobre los párpados que han quedado enrojecidos por la oftalmia variolosa.

7942. *Otra* (FOY, MARINAS).

℞ Hollin en polvo,
Manteca, ää. . . . . 5j (4 gr.).
M. I. Tiña y herpes.

7943. *Otra* (LANEAU).

℞ Concreciones de hollin preparadas. . . . . ʒß (15 gr.).
Alcohol de 30° C. . . 5iij (12 gr.).
Manteca fresca. . . . 5ij (60 gr.).

Se bate el hollin y el alcohol en un mortero de mármol, y luego que la mezcla está pastosa se mezcla fácilmente con la manteca.

Las concreciones de hollin aumentan las virtudes de la pomada, y es útil en el tratamiento de ciertos herpes, tiña y ciertas úlceras.

7944. P. DE HOLLIN CONTRA LA TIÑA (*Lablache*).

℞ Manteca. . . . . 5iv (125 gr.).
Hollin en polvo. . . . . c. s.
para dar á la manteca un color pardo oscuro. Se la somete durante veinticuatro horas á una ligera ebullicion.

Se cortan los cabellos y se cubre la cabeza con una cataplasma. Se lava la cabeza con el cocimiento de hollin de Blaud y despues se la cubre con la pomada. Se necesitan de quince á veinte dias para la curacion.

7945. P. LLAMADA DE LOS HOSPITALES MILITARES FRANCESES CONTRA LA SARNA.

℞ Manteca. . . . . lbxß (5250 gr.).
Azufre sublimado. lbijß (1250 gr.).
Sal marina decrep. lbj (500 gr.).
Se pulvirizan las sales con un poco de grasa, en seguida se funde la grasa y despues se mezcla todo en un barreño barnizado.

D. 5j (30 gr.) cada dia en fricciones.

Nota. Esta pomada cura en catorce ó quince dias.

7946. P. DE IODHIDRARGIRATO DE IODURO DE POTASIO.

℞ Iodhidrárgirato de ioduro de potasio. 20
Manteca. 500
Se puede aumentar la dosis del iodhidrargirato.

7947. P. DE IODHIDRARGIRATO DE MERCURIO Y POTASIO (*Mialhe*).

℞ Ioduro de potasio,
Protoioduro de mercurio, āā. . . . . 5ß (2 gr.).
Hidroclorato de morf. gr̄viij (4 dec.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).

Se mezclan muy bien las tres sales y despues se añade la manteca. En algunas circunstancias se puede aumentar la dosis de la sal.

I. Glándulas infartadas y úlceras escrofulosas ó sifilíticas. *D.* En fricciones ó para curas.

7948. P. DE IODO.

℞ Iodo. . . . . 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa en fricciones en los tumores indolentes, bubones que han terminado por induracion, etc.

7949. *Otra*, n. 2.

℞ Iodo. . . gr̄xviij á gr̄xxvj (1 á 2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

Mézclese para el uso.

D. ℥ij (8 gr.) en fricciones en los tumores indolentes.

7950. *Otra* (H. DE M.).

℞ Iodo. . . . . ℈j (12 dec.).
Manteca de puerco. . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa como resolutivo cuando no existen síntomas de inflamacion aguda.

7951. P. IODO-CALMANTE (*Chomel*).

℞ Ioduro de potasio. . . gr̄xviij (1 gr.).
Clorhidrato de morfin. 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . 5x (40 gr.).

M. I. Tumores dolorosos de los pechos. *D.* En unturas mañana y noche.

7952. P. DE IODOFORMO.

℞ Cerato. 8
Iodoformo. 1
Láudano de Sydenham. 1

H. S. A. *I.* Cánceres ulcerados.

7953. *Otra* (GLOWER).

℞ Iodoformo. . . . . 5ß (2 gr.).
Cerato simple. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Afecciones rebeldes de la piel, lepra, soriasis, eczema crónico. *D.* En fricciones.

7954. P. IODO-NARCÓTICA ALCANFORADA.

℞ Ioduro de potasio. . ℈j (12 dec.).
Extracto de beleño,
Extr. de cicuta, āā. gr̄xviij (9 dec.).
Alcanfor. . . . . gr̄jv (2 dec.).
Manteca. . . . . 5ijß (10 gr.).
Iodo. . . . . gr̄j (5 cent.).

D. Se usa como tópico sedante en las úlceras sifilíticas, cancerosas ó escrofulosas.

7955. P. IODURADA (F. F.).

℞ Iodo. . . . . 5j (4 gr.).
Ioduro de potasio. . . . 5iij (12 gr.).
Manteca. . . . . ℥iij (96 gr.).

Se tritura el iodo con el ioduro de potasio, se añade la manteca y se mezcla perfectamente sobre un pórfido.

I. Tumores escrofulosos, infartos crónicos no cancerosos de los pechos y testículos.

7956. *Otra* (BAUDELOCQUE).

℞ Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
Iodo puro. . . . . 5ß (6 dec.).
Ioduro de potasio,
ó Ioduro de plomo. . . . 5j (4 gr.).
ó Ioduro de mercurio. . . 5ß (2 gr.).

M. I. Ulceras escrofulosas, infartos escrofulosos. *D.* 5ß á 5j (2 á 4 gr.) y mas en fricciones.

7957. P. IODURADA DE LUGOL (F. P.).

NUMERO 1.

℞ Iodo. . . . . ; ℈xij (60 cent.).
Ioduro de potasio. . . ʒjv (48 dec.).
Manteca purificada. . 5xvj (64 gr.).

NUMERO 2.

℞ Iodo. . . . . ℈xvij (90 cent.).
Ioduro de potasio. 5ij (8 gr.).
Manteca purificada. 5xvj (64 gr.).

NUMERO 3.

℞ Iodo. . . . . ℈xvj (105 cent.).
Ioduro de potasio. ʒijß (10 gr.).
Manteca purificad. 5xvj (64 gr.).

NUMERO 4.

℞ Iodo. . . . . ℈xvjv (120 cent.).
Ioduro de potasio. ʒiij (12 gr.).
Manteca purificad. 5xvj (64 gr.).

Se mezclan intimamente.

I. Tumores escrofulosos ó huesosos, úlceras tuberculosas y cutáneas, escrófulas, úlceras ó fístulas escrofulosas, varitis, orquitis, didimalgia, prostatitis, sarcocele, blenorragia, sífilis, sifílides, atrofia mesentérica, erisipela, bocio, lepra, lupus, soriasis, marco, flemon, abscesos, fisoblefaron, infartos ó induraciones glandulares. *D.* En fricciones.

7958. P. IODURADA CONTRA LA GOTA (*Gendrin*).

℞ Manteca,
Bálsamo tranquilo, ãã. ʒß (15 gr.).
Joduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
Iodo. . . . . ʒj (12 dec.).

M. D. Dos fricciones, mañana y noche, en las partes enfermas con una cucharadita de la mezcla.

7959. P. IODURADA JABONOSA (*Riecke*).

℞ Ioduro de potasio. . . . ʒj (4 gr.).
Jabon medicinal. . . . . ʒij (24 dec.).
Agua destilada. . . . . 5ij (8 gr.).
Aceite de cajeput. . . . ʒij (8 gr.).
Pomada rosada. . . . . 5vj (24 gr.).

M. I. Inflamacion crónica ó induracion del hígado, del páncreas ó del bazo. *D.* ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) tres veces al dia, en fricciones en el vientre.

7960. P. IODURADA OPIADA (*Lemasson*).

℞ Iodo. . . . . ℈xviij (1 gr.).
Ioduro de potasio. . . ℈xc (15 gr.).

Mézclese en un mortero de porcelana y añádase:

Manteca. . . . . ʒiij y ʒj (100 gr.).
Láudano de Rousseau. ʒijß (10 gr.).

M. I. Úlceras escrofulosas. *D.* Se extiende esta pomada sobre una planchuela de hilas, que se aplica sobre las úlceras. Si produce mucha irritacion se aplica encima una cataplasma emoliente.

7961. P. DE IODURO DE ARSÉNICO (*Biett*).

℞ Ioduro de arsénico. . ℈iij (15 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Herpes corrosivos y tuberculosos, úlceras escrofulosas, sifílides, lepra, eczema. *D.* C. s. para cubrir ligeramente las partes enfermas.

Nota. El uso de esta pomada exige mucha circunspeccion.

7962. P. DE IODURO DE AZUFRE.

℞ Ioduro de azufre. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Manteca. . . . . ʒjvß (140 gr.).

H. S. A. *I.* Ciertas afecciones cutáneas de naturaleza escrofulosa, ulceraciones herpéticas complicadas con escrófulas, sífilis, pórrigo, etc.; se la ha usado tambien en el nodus reumático. *D.* C. s. en fricciones.

7963. *Otra*, n. 2.

℞ Ioduro de azufre. . . . ℈xij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. Se usa frotando ligeramente

las partes enfermas, dos veces al dia, con un escrúpulo de ella.

7964. P. DE IODURO DE AZUFRE (*Biett*).

℞ Ioduro de azufre. . . ℈xviij (4 gr.).
Manteca purificada. . ʒv (20 gr.).

M. I. Escrófulas cutáneas, acne, prúrigo, sarna, pórrigo, soriasis, eczema, amenorrea, escrófulas, herpes, tiña, sífilis, sifílides, favus, lepra, liquen, tubérculos de la piel, sarna, impetigo, lupus. *D.* En fricciones.

7965. P. DE IODURO DE BARIO (*Biett*).

℞ Ioduro de bario. . . . . ℈iv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Ciertos casos de infartos escrofulosos. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al dia sobre las partes enfermas con ʒj (4 gr.) de pomada.

7966. *Otra* (RADIUS).

℞ Ioduro de bario. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Efélides, escrófulas, sífilides, eczema, pórrigo, cáncer, lepra, lupus. *D.* En fricciones.

7967. P. DE IODURO DE HIERRO.

℞ Ioduro de hierro. . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).

M. I. Leucorrea y catarro úterovaginal. *D.* En fricciones en los muslos. Tumores blancos, infartos escrofulosos, sífilis, sifílides, lepra, soriasis, lupus, ovaritis, orquitis, prostatitis, sarcocele, hidrocele, hernia, esplenitis, bocio.

7968. *Otra* (PIERQUIN).

℞ Ioduro de hierro. . . ʒß (6 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Amenorrea, flores blancas. *D.* El grosor de una avellana, mañana y noche, en la parte interna y superior de los muslos.

7969. P. DE IODURO DE IODHIDRATO DE QUININA (*Righini*).

℞ Ioduro de iodhidrato de quinina. . . . . ʒß (2 gr.).
Esperma de ballena. . . ʒv (20 gr.).
Aceite de alm. dulces. ʒx (40 gr.).

Se funde á fuego lento el aceite y la esperma de ballena, se deja enfriar, y despues se le incorpora con cuidado con la sal de quinina.

I. Infarto del bazo á consecuencia de las calenturas intermitentes rebeldes. *D.* En fricciones.

7970. P. DE PROTOIODURO DE MERCURIO (*H. DE M.*).

℞ Protoioduro de mercurio. ʒß (6 dec.).
Manteca purificada. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Bubones venéreos, úlceras venéreas. D. ℈xviij (1 gr.) para una friccion.

7971. *Otra* (BIETT).

℞ Protoioduro de merc. ʒj á ʒij (12 á 24 dec.).
Manteca de puerco. . . ʒj (32 gr.).

M. I. Ulceras venéreas. *D.* ℈xviij (1 gr.) para una friccion.

7972. *Otra* (MAGENDIE).

℞ Protoioduro de mercur. ℈xx (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒjß (45 gr.).

H. S. A. *I.* y *D.* Se ha alabado esta pomada en el tratamiento de las úlceras venéreas inveteradas, cuya cicatrizacion acelera segun se asegura.

7973. *Otra* (LUGOL).

NÚMERO 1.

℞ Protoioduro de mercur. ℈ij (4 dec.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

NUMERO 2.

℞ Protoioduro de mercur. ℊjv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

NUMERO 3.

℞ Protoioduro de merc. ℊv (25 cent.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Lepra, liquen, lupus, efélides, acne, soriasis, rupia, eczema, sífilis, sifílides, sarcocele, bocio, escrófulas, orquitis, adenitis indolentes, esclerotitis, catarata, iritis, oftalmia, angina, esplenitis, hepatitis, meningitis, clorosis, erisipela, flebitis, metritis, flegmasia blanca dolorosa. *D.* En fricciones.

La fórmula de la F. P. contiene ℈ij (24 dec.) en el número 1, ʒj (36 dec.) en el número 2, y ℈jv (48 dec.) en el número 3.

7974. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (H. DE M.).

℞ Deutoioduro de merc. . ℊxij (6 dec.).
Manteca de puerco. . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa como resolutiva cuando hay complicacion sifilítica.

7975. P. DE BIODURO DE MERCURIO (*Hoffmann*).

℞ Manteca. . . . . ʒij (8 gr.).
Bioduro de mercurio. ℊj (2 cent.).

H. S. A. *I.* Efélides y afecciones de la piel de naturaleza indeterminada. *D.* C. s. en fricciones.

7976. P. DE DEUTOIODURO DE MERCURIO (*Magendie*).

℞ Manteca. . . . . ʒjß (15 gr.).
Deutoioduro de merc. ℊxx (4 gr.).

H. S. A. *I.* y *D.* Esta pomada, mas activa que la de protoiduro, se usa del mismo modo, pero á menor dosis, contra las úlceras venéreas inveteradas.

La pomada de ioduro de mercurio de los H. M. se compone de ℈j (12 dec.) de proto ó deutoioduro de mercurio y ʒj (30 gr.) de manteca de puerco.

7977. *Otra* (BIETT).

℞ Deutoioduro de merc. ℊxij (6 dec.)
Manteca purificada. . . ʒj (30 gr.)
Esencia de bergamota, c. s.

M. I. Sífilis y afecciones escamosas secas y rebeldes, fijas en ciertas regiones, tubérculos sifilíticos, úlceras sifilíticas, sífilis constitucional.

7978. P. DE IODURO DE PLATA (F. DE L.).

℞ Ioduro de plata. . . . ℊxij (6 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Tritúrese.

I. Enfermedades sifilíticas, blenorragia, bubones indolentes, encantis, lepra, lupus, mareo. *D.* Para diez fricciones dos veces al dia.

7979. P. DE IODURO DE PLOMO.

℞ Ioduro de plomo. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Emplasto de cicuta. . . . ʒj (30 gr.).

M. I. Tumores venéreos y escrofulosos, úlceras escrofulosas, úlceras de la matriz. *D.* Si hay dolores vivos se añaden ℊvj á ℊxij (3 á 6 dec.) de extracto gomoso de opio.

7980. P. DE IODURO DE PLOMO (H. DE M.).

℞ Deutoioduro de plomo. ʒj (4 gr.).
Manteca de puerco. . . . ʒj (32 gr.).

H. S. A. *I.* Ulceras escrofulosas.

7981. P. DE IODURO DE POTASIO.

℞ Ioduro de potasio. . . . ℊxx (4 gr.).
Manteca de puerco. . . ʒj (30 gr.).

La farmacopea francesa indica ℊxx (10 dec.) de ioduro por ʒjv (16 gr.) de manteca; creemos que esta fórmula es mala, sobre todo al principio. En nuestro concepto les preferible empezar por una

trigesima parte de iodo para llegar á la octava, que es la cantidad por la que dicha farmacopea aconseja que se empiece.

7982. P. DE IODURO DE POTASIO.

Cuando hay que usar la pomada de ioduro de potasio en partes cuya piel es muy fina é impresionable, se puede usar la siguiente:

♀ Ioduro de potasio. . .	gxviij (1 gr.).
Cerato sin agua. . . .	5ijß (10 gr.).
Agua de rosas.	gxviij (1 gr.).
Esencia de rosas. . .	2 gotas.

M. S. A.

Si hay que combatir tumores acompañados de dolores vivos se puede añadir á la pomada anterior:

Iodhidrato de morfin.	gjx (50 cent.).
♁ Alcanfor.	5ß (2 gr.).

7983. *Otra* (MAGENDIE).

♀ Manteca.	5j (32 gr.).
Ioduro de potasio. . . .	5ß (2 gr.).

M. S. A. *I.* Bócio, escrófulas, tumores indolentes ó infartos crónicos de las glándulas. *D.* Se dan fricciones sobre el tumor y despues se le cubre con papel empapado en la misma pomada.

7984. P. DE IODURO DE POTASIO IODURADA (*Coindet*).

Se añade á la anterior:

♀ Iodo.	gx (5 dec.).

I. y *D.* Las mismas que las anteriores.

7985. P. DE IODURO DE POTASIO (*Mialhe*).

♀ Manteca fresca.	5j (30 gr.).
Ioduro de potasio.	gxviij á 5ij - 1 á 8 gr.).

Es uno de los mejores tópicos iodurados.

Segun Mialhe la pomada de ioduro de potasio, preparada con la manteca fresca y el ioduro potásico bien neutro, es sin contradiccion el mejor tópico iodurado que se conoce. Algunos prácticos añaden á esta pomada cierta cantidad de iodo con el objeto de aumentar sus propiedades fluidificantes y desobstruentes; pero este último, en lugar de aumentar su accion curativa, inflama el tegido dermoideo, y se pierde en todo ó en parte el efecto dinámico que se ha obtenido durante la absorcion del ioduro.

Si existe dolor se puede añadir:

Hidroclor. de morfin.	gjx (50 cent.).
♁ Alcanfor.	5ß (2 gr.).

7986. P. DE IODURO DE POTASIO IODURADO (H. DE M.).

♀ Iodo.	9ß (6 dec.).
Ioduro de potasio. . . .	5ß (2 gr.).
Manteca.	5j (30 gr.).

M. S. A. *I.* Tumores de naturaleza sifilítica.

7987. P. DE IODURO DE ZINC (*Ure y Magendie*).

♀ Manteca.	5j (30 gr.).
Ioduro de zinc.	5j (4 gr.).

M. S. A. *I.* Ulceraciones escrofulosas, tumores escrofulosos; reemplaza en ciertos casos á la pomada de ioduro de potasa. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al dia sobre las partes enfermas con 5j (4 gr.) de esta pomada.

7988. P. IRRITANTE.

♀ Extracto de belladona.	1
Ungüento mercurial.	1
Aceite comun.	c. s.

M. I. Oftalmias agudas. *D.* En fricciones.

7989. *Otra*, n. 2.

♀ Aceite de croton. . .	gx (50 cent.).
Manteca.	5ß (15 gr.).

M. D. El volúmen de una avellana, dos veces al dia, en fricciones, hasta producir la salivacion.

7990. P. IRRITANTE (H. M.).

℞ Tártaro emético. . . . . 3iij (12 gr.).
Alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
Azufre sublimado. . . . 3j (4 gr.).
Se trituran y se añade:
Manteca de puerco. . . 3j (32 gr.).
H. S. A. Se cubre con ella el sitio prescrito y se aplica encima una cataplasma emoliente.

7991. P. DE JAMES *ó Pomada de laurel real.*

℞ Esencia de laurel real. . 3ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 3ij (60 gr.)
M. I. Quemaduras, infartos de las mamas, marco. Sirve para calmar los dolores lancinantes de los cánceres.

7992. P. DE JANIN (H. DE S. J.).

℞ Mercurio dulce,
Tucia, ãã. . . . . 3j (4 gr.).
Bol arménico. . . . . 3ij (8 gr.).
Manteca lavada en agua de rosas. . . . . 3ß (16 gr.).
M. I. Oftalmia escrofulosa, blefaritis, conjuntivitis, manchas de la córnea. *D.* gxviij á 3j (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

7993. P. DE JASSER.

℞ Flores de azufre,
Sulfato de zinc,
Bayas de laurel, ãã. . 3ijß (10 gr.).
Ungüento rosado. . . 3x (40 gr.).
M. I. Sarna, cáncer, lepra, elefantiasis. *D.* En fricciones.

7994. P. DE KOPP.

℞ Precipitado blanco. . . . . 4 á 5
Ungüento de digital. . 30

Es mas activa y causa menos dolor que la de Autenrieth.

I. Coqueluche, peritonitis puerperal, neumonia, bronquitis, catarro crónico, herpes, eczema tiño. *D.* En fricciones en el epigastrio ó sitios correspondientes.

7995. P. DE KRUGER HAUSEN.

℞ Calomelanos. . . . . 3ß (12 gr.).
Opio. . . . . gxij (6 dcg.).
Manteca. . . . . 3ß (15 gr.).
M. I. Crup. *D.* En fricciones en la parte anterior del cuello.

7996. P. DE LAUREL *ó Ungüento de laurel (F. F.).*

℞ Hojas recientes de laurel,
Bayas de laurel, ãã. . lbj (500 gr.).
Manteca de puerco. lbij (1000 gr.).
Se contunden las hojas y bayas de laurel y se ponen con la manteca á un fuego moderado hasta que se evapore toda la humedad; se cuela con fuerte expresion, se deja enfriar con lentitud y se separa el sedimento que forma; se derrite otra vez la pomada, y cuando está medio fria se la echa en una vasija de barro.

I. Dolores reumáticos, parálisis, etc. *D.* En fricciones.

7997. P. DE LUPULINA (*Freake*).

℞ Lupulina en polvo. . . 3j (30 gr.).
ó Lúpulo. . . . . 3ij (60 gr.).
Se digiere en el baño maría durante cinco á seis horas en
Manteca. . . . . 3iij (90 gr.).
Se cuela y se guarda.

I. Cáncer y escrófulas. Se usa como sedante en los dolores cancerosos.

7998. P. DE LÚPULO.

℞ Lúpulo muy oloroso. 1
Manteca. 16
Se digiere y se cuela con expresion.

I. Se usa para calmar los dolores lancinantes del cáncer. Debe preferirse la pomada de lupulina.

7999. P. DE LYON.

℞ Ungüento rosado. . . . ʒj (32 gr.)
Dentóxido de mercurio. ʒß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Inflamacion crónica de los párpados. *D.* Se extiende ligeramente esta pomada sobre los bordes de los párpados infartados, que destilan un humor mucoso que los pega durante el sueño.

8000. *Otra*, n. 2.

℞ Oxido rojo de merc. . ℊxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ʒvj (24 gr.).
Esencia de limon. . . . ℊxviij (1 gr.).

M. I. Oftalmias escrofulosas, blefaritis, conjuntivitis. *D.* ℊxviij á gxxxvj (1 á 2 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados.

8001. P. DE MANZANAS Y PASAS (F. P.).

℞ Manteca de vacas fresca, sin sal, 3
ó á falta de ella
Manteca de puerco sin sal. 3
Cera amarilla. 1
Pasas sin semillas. 1
Manzanas dulces sin pepitas. . . . 1

Se derrite primero la manteca y la cera, se añade despues las pasas y las manzanas bien machacadas y mezcladas, se cuece en una vasija de barro, hasta que echando algunas gotas en la lumbre no se enciendan; se cuela la masa hirviendo por un paño con expresion en un vaso lleno de agua rosada, y despues de fria se separa de ella.

I. Inflamaciones, grietas y escoriaciones de los labios.

8002. P. DE MANGANESO.

℞ Bióxido de manganeso. 1
Manteca 1

M. I. Tiña, sarna, herpes.

8003. P. DE MELIER.

℞ Subcarbonato de sosa. ʒij (60 gr.).
Agua. . . . . ʒi (30 gr.).

Se disuelve en caliente y se añade:

Aceite comun. . . . ʒjv (125 gr.).

Se forma un jabon y se incorpora con

Flores de azufre. . . ʒjv (125 gr.);

ó bien con

Alcanfor. . . . . ʒß (15 gr.).

I. Sarna, asma. *D.* Dos fricciones al dia con ʒij (60 gr.) de pomada durante doce á catorce dias.

8004. P. MERCURIAL (*Bataille*).

℞ Ungüento mercurial. . ʒvj (24 gr.).
Cera amarilla. . . . . ʒijß (10 gr.).
Pez negra. . . . . ʒjß (6 gr.).

H. S. A. Se aplica exactamente desde el principio de la erupcion variolosa.

8005. *Otra* (BIETT).

℞ Protosulfato de merc. ʒj (4 gr.).
Azufre sublimado. . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).
Esencia de limon. . . 15 gotas.

M. I. Herpes liquenoides poco intensos.

8006. P. MERCURIAL DE COTTEREAU (F. P.).

℞ Pomada mercurial antigua. . . . 4
Mercurio purificado. 8

H. S. A. y al concluir se añade:

Manteca de cerdo sin sal. . . . 4

Se continúa triturando hasta que se extinga perfectamente el mercurio, y se añade:

Manteca de cerdo. 7

Mézclese exactamente.

I. Sífilis. *D.* En fricciones.

8007. *Otra* (DUPUYTREN).

℞ Ungüento napolitano,
Sal amoniaco, ää. . . ʒß (15 gr.).

M. I. Prostatitis, orquitis, adenitis, úlceras venéreas é indolentes, infartos linfáticos y cancerosos, sífilides, artrocace, hidroraquis, blefarospasmo, hidroftalmia, iritis, amaurosis, esclerotitis, manchas, catarata, flebitis, meningitis, metritis, peritonitis, angina, pleuresía, carditis, atrofia mesentérica, hidrocéfalo, flegmasía blanca dolorosa, tétanos, coriza, sabañones, eczema, efélides, viruelas, soriasis, rupia, lleimon, muermo. *D.* 5j (¼ gr.) en fricciones mañana y noche.

8008. P. MERCURIAL DE GOTTEREAU (*Jadelot*).

℞ Jabon blanco raspado.	1
Aceite comun.	2
Protocloruro de mercurio preparado al vapor.	1

Se añade al jabon la octava parte de su peso de agua y se le ablanda en el baño maría. Se diluye en aceite y se añade el mercurio dulce en frio.

I. Se usa como antisifilítico y antiepsórico.

8009. P. MERCURIAL DE SAVE (F. P.).

℞ Mercurio purificado.	20
Manteca de cerdo.	20
Acido tártrico.	3

H. S. A.

8010. P. IODO MERCURIAL ALCANFORADA (*Golfin*).

℞ Protoioduro de merc. 5ß	(2 gr.).
Iodura de potasio. . . . gxjv	(3 gr.).
Alcanfor. 5ß	(2 gr.).
Cerato de Galeno. . . . 3j	(32 gr.).

H. S. A. *I.* Hidrocéfalo agudo. *D.* 5ß á 5j (2 á 4 gr.) en fricciones.

8011. P. MERCURIAL AMONIACAL (*Hufeland*).

℞ Bicloruro de mercurio 3ß	(15 gr.).
Clorhidrato de amon. 3ß	(15 gr.).
Agua destil. de rosas. 3jv	(125 gr.).
Manteca. 3jv	(125 gr.).

H. S. A. *I.* Exóstosis traumáticas, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* 5ß á 5j (2 á 4 gr.) en fricciones mañana y noche.

8012. P. MERCURIAL ANODINA (*Weller*).

℞ Extracto de beleño. . . gxij	(6 dcg.).
Opio purificado. . . . . gvij	(3 dcg.).
Pomada merc. doble. 5j	(4 gr.).

M. I. Dolores nocturnos que acompañan á la oftalmia sifilítica. *D.* En fricciones por la noche en la region ciliar.

8013. P. MERCURIAL ASTRINGENTE (*Bitterich*).

℞ Mercurio precipitado blanco. . . . . gjv	(2 dcg.).
Oxido de zinc sublim. gviij	(4 dcg.).
Extracto de ratania. . gx	(5 dcg.).
Manteca de vacas fresc. 5ij	(18 gr.).

M. I. Tercer período de la blenoftalmia de los recien nacidos. *D.* El grosor de la cuarta parte ó mitad de un grano de trigo, introducido mañana y noche entre los párpados.

8014. P. MERCURIAL CON BELLADONA (*P. de Mignot.*).

℞ Ungüento mercur. doble. 3j	(32 gr.).
Extracto hidroalcohólico de belladona. 5j	(1 gr.).
Bálsamo líquid. del Perú. 3j	(4 gr.).

M. I. Fimosis complicada con sífilis y en otros muchos casos. Así añadiendo gxviij á gxxxvj de extracto gomoso de opio, se obtiene un excelente tópico contra los tumores hemorroidales.

8015. P. MERCURIAL BELLADONIZADA (*Siebel*).

℞ Extracto de belladona 5j	(4 gr.).
Agua destilada. . . . 5ij	(8 gr.).

Disuélvase y mézclese S. A. con
Pomada mercurial doble. ʒij (8 gr.).
I. Oftalmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. *D.* El grosor de una avellana en fricciones sobre la parte superior de la frente, cinco á seis veces al dia.

Nota. Sustituyendo á la solucion de belladona ʒj (4 gr.) de laudano de Rousseau se tiene la *pomada mercurial laudanizada*, que se usa en los mismos casos y del mismo modo.

8016. P. MERCURIAL CON BELLADONA (*Velpeau*).

℞ Ungüento merc. doble. ℥j (30 gr.).
Extracto de belladona. . ʒj (4 gr.).
M. I. Infartos linfáticos.

8017. P. MERCURIAL BELLADONIZADA Y ALCANFORADA (*J. Cloquet*).

℞ Ungüento mercurial doble. 1
Extracto de belladona. 1
Alcanfor. 1
M. I. Oftalmias rebeldes. *D.* En fricciones en la frente y sienes.

8018. P. Ó UNCION MERCURIAL CON BELLADONA (*Desmarres*).

℞ Miel blanca. 10
Extracto de belladona. 5
Mercurio. 5
H. S. A. *I.* Fotofobia en las oftalmias intensas. *D.* Cinco á seis fricciones al dia en la frente y sienes con el volumen de una avellana de la mezcla, cuidando de limpiarla á la media hora.

8019. P. MERCURIAL CON CREOSOTA (*Tanesville*).

℞ Oxido rojo de mercurio portirizado. . . gʏvij (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
Creosota. . . . . 10 gotas.
M. I. Enfermedades crónicas de la conjuntiva. *D.* Se aplica á la parte enferma.

8020. P. MERCURIAL CON ZINC (*Vogel*).

℞ Tucia preparada. . . ℈xv (75 cent.).
Sulfato de zinc. . . . ℈ij (10 cent.).
Bióxido de mercurio. ℈vj (30 cent.).
Manteca fresca. . . . ʒij (8 gr.).
H. S. A. *I.* Blenoftalmia catarral atónica, manchas de la córnea. *D.* El volúmen de un grano de trigo, introducido mañana y noche entre los párpados.

8021. P. MERCURIAL IODURADA (*Blanche*).

℞ Ungüento gris. . . . ʒj (30 gr.).
Iodo. . . . . gvüj (4 dec.).
Ioduro de potasio. . . ʒiß (6 gr.).
M. I. Inflamacion del periostio. Al mismo tiempo se administra el agua iodurada.

8022. P. MERCURIAL DE MANTECA DE CACAO.

℞ Manteca de cacao. . . . ʒß (15 gr.).
Aceite de almendras. . ʒj (4 gr.).
Se funde, se echa en un mortero de mármol calentado y se añade poco á poco:
Mercurio. . . . . ʒv (20 gr.)
hasta que se extinga.

8023. P. MERCURIAL CON MANTECA DE CACAO, DE PLANCHE (F. P.).

℞ Mercurio purificado,
Manteca de cacao muy reciente, ãã. . . . . ʒij (60 gr.)
Aceite de huevos muy reciente. . . . . 20 gotas.
H. S. A. *I.* y *D.* Se emplea en los mismos casos y á las mismas dosis que el ungüento mercurial doble, pero es de un uso mas agradable.

*

8024. P. DE MERCURIO AMONIACAL (*Dupuytren*).

℞ Pomada merc. doble. 5xij (48 gr.)
Hidroclorato de amon. 5jv (16 gr.).

M. I. Exóstosis traumáticas, tumores blancos, tumores glandulosos. *D.* De 5ß á 5j (2 á 4 gr.) mañana y noche.

8025. P. MERCURIAL OPIADA.

℞ Ungüento mercurial doble. . . . 4
Cerato opiado. 4

M. I. Segundo periodo de la peritonitis puerperal, oftalmias, oftalmitis, hidroftalmia, hipopion, catarata, conjuntivitis, iritis, amaurosis, esclerotitis, escrófulas, sífilis, sifílides, hidrocele, angina, esplenitis, blenorragia, artrocace, úlceras, soriasis, rupia, eczema, muermo, atrofia mesentérica, meningitis, flebitis, carditis, metritis, ovaritis, sabañones, gota, hidroraquis, flegmasia blanca dolorosas. *D.* 5j (4 gr.) en fricciones al abdómen, dos ó tres veces al dia.

8026. *Otra* (WELLER).

℞ Bióxido de mercurio. ℈v (25 cent.).
Láudano de Sydenham. 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . 5j (4 gr.).

M. I. Manchas de la córnea. *D.* Se aplica una ó dos veces al dia una cantidad que equivalga al grueso de la cabeza de un alfiler.

8027. P. DE MERCURIO DULCE.

℞ Mercurio dulce prepa-
rado al vapor. . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈vj (3 dec.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).
Mézclese. *I.* V. núm. 8029.

8028. *Otra*, n. 2.

℞ Mercurio dulce. . . . . 1 á 2
Manteca. . . . . s
Mézclese. *I.* V. la siguiente.

8029. *Otra* (F. P.).

℞ Mercurio dulce. . . . 5j (4 gr.).
Ungüento rosado. . . . 5j (32 gr.).
Aceite de espliego. . . 9j (12 dec.).

M. I. Infartos del hígado. *D.* 5ß á 5ij (2 á 8 gr.) en fricciones.

8030. P. MINERAL *ó Pomada de sulfato mercurioso.*

℞ Sulfato mercurioso. . . 5ß (2 gr.).
Manteca de yemas de
chopo. . . . . 5ij (60 gr.).
Mézclese.

8031. P. DE MONESIA.

℞ Extracto de monesia. . 5j (4 gr.).
Manteca de cerdo. . . . 5j (32 gr.).

H. S. A. una pomada, que contendrá la octava parte de su peso de extracto.

I. V. la siguiente.

8032. *Otra*, n. 2.

℞ Extracto de monesia. 1
Agua. 1
Aceite de almendras. 4
Cera blanca. 2

H. S. A. Se debe llamar á esta pomada cerato de monesia.

I. Ulceras cutáneas de diferente naturaleza, oftalmias purulentas, estomatitis, hemorroides, grietas del ano, sabañones no ulcerados.

8033. P. DE MORFINA.

℞ Acetato de morfina. . . ℈vj (3 dec.).
Manteca. . . . . 5ij (8 gr.).

M. I. Dolores, neuralgias, reumatismo, gota, ciática, lumbago, tenesmo, zona.

8034. *Otra* (SANDRAS).

℞ Clorhidrato de morfina. ℈ij (1 dec.

Manteca balsámica. . . 3jß (16 gr.).

M. I. Neuralgia facial, ciática, neuralgia del corazon, neuralgia femoral. *D.* Se aplica en unturas á la parte dolorida.

8035. P. DE NAFTALINA (*Emery*).

℞ Naftalina. . . . . 5ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Soriasis, lepra, prúrigo, sarna, tiña granulosa, herpes, eczema, etc.

8036. P. CONTRA LAS NEURALGIAS (*Debreyne*).

℞ Extracto de belladona,
Manteca de cerdo, ää. 5iij (12 gr.).
Opio. . . . . 5ß (2 gr.).
Esencia de tomillo. . . c. s.

H. S. A. *I.* Neuralgia, excepto la ciática, dolores nerviosos locales, jaquecas, etc. *D.* El volúmen de una avellana de esta pomada por la mañana, al medio dia y á la noche, sobre todo cuando los dolores son muy fuertes. Cada friccion durará cinco á seis minutos hasta que se absorba la pomada, y se añade un poco de saliva para que la pomada penetre mejor. Se suspenderá cuando la vista se altere.

8037. P. DE NITRATO DE ESTRICNINA (*Wendt*).

℞ Manteca. . . . . 5ij (8 gr.).
Nitrato de estricnina. gij (4 dec.).

H. S. A. *I.* Gota anómala, afecciones artríticas y de la columna vertebral. *D.* 5j (4 gr.) en fricciones.

8038. P. DE NITRATO DE MERCURIO.

℞ Protonitrato de merc. gxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Eczema crónico y particularmente en las formas escamosas.

8039. *Otra* (DUBOIS).

℞ Pomada de pepinos. . . ℥ß (16 gr.).
Nitrato de mercurio. . . 5ij (8 gr.).

M. I. Afecciones herpéticas poco intensas.

8040. P. DE PROTONITRATO DE MERCURIO.

℞ Protonitrato de mercur. 5jß (6 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (32 gr.).

Se trituran en un mortero de vidrio.

I. Lepra y soriasis.

8041. P. DE PROTONITRATO DE MERCURIO (*Biett*).

℞ Protonitrato de merc. ℈j (12 dec.).
Manteca purificada. . . ℥j (30 gr.).

M. I. Sarna, lepra y afecciones escamosas.

8042. P. DE NITRATO DE PLATA.

℞ Nitrato de plata crist. gv (25 cent.).
Opio. . . . . gjv (20 cent.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Blenorrea, úlceras, quemaduras, blefaritis, encantis, lepra. *D.* Se introduce en el conducto de la uretra, ó se dan fricciones en la parte dolorida.

8043. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Pez blanca. . . . . 5jv (16 gr.).
Cera. . . . . 5ij (8 gr.).
Aceite de almendras dulces. . . . . 5ß (2 gr.).

Se liquida y se añade:

Nitrato de plata fundido en polvo. . 5vjß (26 gr.).

M. I. Sirve para cauterizar las estrecheces de la uretra. *D.* C. s. para untar un bordon.

8044. P. DE NITRATO DE PLATA ó *Pomada oftálmica* (*Guthrie*).

℞ Nitrato de plata cristalizado y porfiriz. gviij (4 dec.).

Manteca. . . . . 5ij (8 gr.).
Acetato de plomo liq. gvj (3 dec.).
Mézclese exactamente.

I. Oftalmias escrofulosas, catarrales ó crónicas, blefaritis, manchas de la córnea, y en bujías en la blenorrea rebelde. *D.* El grosor de una cabeza de alfiler, tres ó cuatro veces al dia, sobre el borde libre de los párpados.

8045. *Otra* (GUEPIN).

℞ Nitrato de plata. 1
Grasa balsámica. 20
Aceite. 5
H. S. A. *I.* Se usa en los mismos casos que otras pomadas análogas.

8046. *Otra* (H. M. F.).

℞ Nitrato de plata cristalizado. . . . . gviij (4 dec.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).
Se tritura exactamente sobre un pórfido (Scouteten).

8047. *Otra* (JOBERT).

NUMERO 1.

℞ Nitrato de plata. . . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3j (32 gr.).
M. I. Tumores blancos de la rodilla. *D.* En fricciones.

La pomada número 2 contiene 5ij (8 gr.) de nitrato, y la del número 3 5iij (12 gr.) por 3j (32 gr.) de manteca.

8048. POMADA DE NOGAL.

℞ Extracto de hojas de nogal. . . . . 3j (32 gr.).
Manteca. . . . . 3x (40 gr.).
Esencia de bergam. giij (15 cent.).
Se hacen fricciones suaves durante un cuarto de hora, dos veces al dia.

8049. P. DE NUEZ DE AGALLA.

℞ Nuez de agalla.
Tintura de opio, ää. 5ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gxviij (1 gr.).
Cera. . . . . 5ij (8 gr.).
M. I. Hemorroides, caida del recto, encantis. *D.* Se aplica al rededor del ano.

8050. P. OBSTÉTRICA (*Chaussier*).

℞ Extracto de belladona. 5ij (8 gr.).
Agua destilada. . . . . 5ij (60 gr.).
Se disuelve el extracto en el agua y se le incorpora con
Manteca ó cerato. . . . 3ij (60 gr.).
I. Rigidez de la matriz en el momento del parto. *D.* Se aplican 5ij (8 gr.) por medio de una geringuita de cánula larga ó por medio del dedo.

8051. P. OFTÁLMICA.

℞ Manteca. . . . . gxc (5 gr.).
Nitrato de plata. . . . gij (1 dec.).
M. I. Oftalmias granulares. *D.* El volúmen de un guisante en el borde libre de los párpados inferiores.

8052. *Otra*, n. 2.

℞ Ungüento rosado. . . 3j (32 gr.).
Precipitado rojo. . . gxxxvj (2 gr.).
M. I. Oftalmias crónicas. *D.* Se usa como la pomada oftálmica de Grand Jean, solo que es mas suave.

8053. *Otra*, n. 3.

℞ Ungüento napolitano. 5ij (8 gr.).
Opio en bruto. . . . gvj (3 dec.).
Extracto de beleño. . gxij (6 dec.).
M. Se usa como la pomada oftálmica de Sichel.

8054. *Otra*, n. 4.

℞ Aceite de hígado de bacalao. . . . gxxxij (16 dec.).
Yema de huevo ó manteca. . . . gxxvj (12 dec.).
Extr. de Saturno. gvj (8 dec.).

M. S. A. I. Oftalmias escrofulosas con manchas y úlceras de la córnea.

8055. P. OFTÁLMICA.

℞ Ungüento napolitano. . . 3j (4 gr.).
Láudano de Rousseau. . . 3ß (2 gr.).

M. I. Oftalmias dolorosas sin fotofobia. *D.* El grosor de una avellana para fricciones, cinco ó seis veces al dia, en la parte superior de la frente.

8056. *Otra* (CARRON DE VILLARDS).

℞ Manteca de hígado de raya. . . . . 3j (30 gr.).
Cianuro de hierro. . gxxjv (12 dec.).
Cianuro de mercurio. gviij (4 dec.).
Esencia de espliego. 4 gotas.

Mézclese sobre un pórfido.

I. Conjuntivitis escrofulosa crónica, manchas, oftalmias crónicas. *D.* Se usa en fricciones á dosis muy pequeñas.

8057. P. OFTÁLMICA (*Cunier*).

℞ Precipitado rojo. . . . . gjv (2 dec.).
Aceite de hig. de bacal. 5j (4 gr.).
Cerato. . . . . 3ß (2 gr.).

M. I. Úlceras interciliares, nubes de la córnea á consecuencia del pannus vascular, pannus celuloso y úlceras atónicas, etc.

8058. *Otra* (DESMARRES).

℞ Sulfato de cobre porfir. gij (1 dec.).
Manteca lavada. . . . 5ß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gjv (2 dec.).

I. Ulceraciones de los párpados.

8059. P. ANTIOFTÁLMICA (H. M.).

℞ Manteca de puerco. . 3ij (60 gr.).
Oxido rojo de mere. gx (5 dec.).
Sulfato de zinc. . . . gxx (10 dec.).

H. S. A. *I.* Oftalmias crónicas y rebeldes sostenidas por una afeccion escrofulosa general. *D.* Se cubre ligeramente el borde de los párpados.

8060. *Otra* (F. P.).

℞ Manteca fresca de cerdo, lavada en agua de rosas. 48
Alcanfor. 1
Oxido rojo de mercurio 1
Extracto de Saturno. 1

H. S. A. *I.* Inflamacion crónica de los párpados.

8061. P. OFTÁLMICA ó *Pomada antioftalmica* (*Guthrie*).

℞ Nitrato de plata. gij á gx (10 á 50 cent.).
Pomada de esperma de ballena. . . . . 3j (4 gr.).
Subacetato de plomo liq. 15 gotas.

M. I. Oftalmias crónicas, escrofulosas, catarrales ó purulentas. *D.* El volúmen de la cabeza de un alfiler, debajo del párpado superior, y se dan fricciones ligeras tres ó cuatro veces al dia.

Graefe la usa en la gonorrea crónica rebelde, en bujías de cera.

8062. P. OFTÁLMICA (H. DE M.).

℞ Precipitado rojo. . . . gij (1 dec.).
Manteca de puerco. . . 3j (4 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa untando ligeramente las pestañas.

8063. *Otra* (JADELOT).

℞ Manteca reciente. . 5ij (8 gr.).
Mercurio precipitado blanco. . . . . gvij (6 dec.).
Alcanfor. . . . . gviij (4 dec.).
Tucia preparada. . . gxv (75 cent.).
Manteca de cacao. . 5ß (2 gr.).

H. S. A. *I.* Oftalmias escrofulosas. *D.* Se pone en el borde de los párpados el volúmen de una cabeza de alfiler de pomada, cada dos ó tres dias, en el momento de acostarse.

8064. P. OFTÁLMICA DE JANIN (H. DE M.).

℞ Precipitado blanco. . . 3j (4 gr.).
Oxido de zinc impuro preparado,
Bol arménico, ãã. . . . 3ij (8 gr.).
Manteca lavada con agua de rosas. . . . . ℥ß (15 gr.).
Mézclese S. A. y porfiricese.

I. Oftalmias escrofulosas, oftalmias crónicas. *D.* Se dan fricciones ligeras en el borde libre de los párpados, por la noche, con pequeñas porciones de pomada.

8065. P. OFTÁLMICA (*Lyon*).

℞ Ungüento rosado. . . 5v (20 gr.).
Precipitado rojo. . . . gxviij (1 gr.).

M. I. Oftalmias crónicas. *D.* Se aplica como el grosor de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

8066. *Otra* (REGENTE).

℞ Azafran. . . . . 3ij (64 gr.).
Agua de rosas. . . lbvij ß (3750 gr.).

Se macera durante veinticuatro horas y se cuela con expresion. Por otra parte se toman:

Alcanfor. . . . . 3ij (8 gr.).
Aguardiente. . . . c. s.

Se disuelve y se vierte la solucion encima del líquido de la maceracion; se pone despues con la mezcla:

Manteca de vacas, despojada antes de la leche que contiene por la malaxacion en agua fresca de pozo, lbjv (2000 gr.).

Se maceran despues durante cuatro dias, se separa luego la manteca del agua y se incorpora S. A.

Deutóxido de mercurio porfirizado,
Acetato de plomo cristalizado y porfirizado, ãã. . . . . 3jv (125 gr.).

I. Oftalmias crónicas, oftalmias escrofulosas. *D.* C. s. para cubrir ligeramente el borde libre de los párpados.

8067. *Otra* (VELPEAU, SICHEL).

℞ Precipitado blanco. gj á gij (5 á 15 cent.).
Manteca ó cerato sin agua. . . . 3j (30 gr.).
H. S. A. V. núm. 8111.

8068. *Otra* (SCARPA).

℞ Tucia. . . . . 3ß (2 gr.).
Calomelanos. . . . . gj (5 cent.).
Acíbar. . . . . gx (5 dec.).
Manteca. . . . . 3ij (8 gr.).

M. I. Oftalmia escrofulosa.

8069. *Otra* (SICHEL).

℞ Manteca. . . . . 3j (4 gr.).
Precipitado rojo. . . gxv (75 cent.).

Se mezcla y se añade:

Sulfato de cadmio. . gij (10 cent.).

M. Se usa para disminuir las cicatrices de la córnea. *D.* Dos ó tres fricciones al dia sobre el borde libre de los párpados inferiores, con el grueso de la cabeza de un alfiler de la mezcla.

8070. *Otra* (SICHEL).

℞ Ungüento mercurial. . . 3ij (8 gr.).

I. Fotofobia y conjuntivitis muy agudas. *D.* El grosor de una avellana para fricciones, cinco ó seis veces al dia, en la parte superior de la frente.

8071. *Otra* (SICHEL).

℞ Ungüento napolitano. . . 3ij (8 gr.).
Extracto de belladona. . 3j (4 gr.).

M. I. Oftalmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. *D.* El grosor de una nuez para fricciones, cinco ó seis veces al dia, en la parte superior de la frente.

8072. *Otra* (VELPEAU).

℞ Nitrato de plata. . . . gj (5 cent.).

Manteca. . . . . 3j (4 gr.).

M. I. Oftalmias granulares, blefaritis, manchas de la córnea. *D.* El grosor de un guisante en el borde libre de los párpados inferiores. Se procurará, antes de aplicar esta pomada, hacer caer las costras por medio de unturas hechas con aceite comun ó de almendras dulces, manteca ó cataplasmas emolientes.

8073. P. OFTÁLMICA (*William Adams*).

℞ Nitrato de plata fundido en polvo,
Azul de Prusia, ãã. . ℊxx (10 dec.).
Manteca. . . . . 3j (4 gr.).
Gotas de Blacks. . . . ℊxx (10 dec.).

M. I. Oftalmia egipcia. *D.* Despues de haber practicado la excision de la conjuntiva, se cubre el interior de los párpados con un poco de pomada.

8074. P. OFTÁLMICA BLANCA DE AGUILERA (H. DE M.).

℞ Sublimado corrosivo. ℈ß (6 dec.).
Litargirio. . . . . 3ß (2 gr.).
Sal amoniaco. . . . . 9j (12 dec.).
Extracto de opio. . . ℊvij (35 cent.).
Manteca lavada con
agua de rosas. . . 3jß (45 gr.).
Bás. peruano negro. 9j (12 dec.).

Se reducen á polvo las tres primeras sustancias, se disuelve el extracto en la menor cantidad posible de agua, se mezcla todo S. A. y se porfiriza.

I. Oftalmias crónicas palpebrales, sifilíticos y algunas otras.

8075. P. OFTALMICA DE DESSAULT (H. DE M.).

℞ Oxido rojo de mercurio pulverizado,
Litargirio pulverizado,
Oxido de zinc impuro
preparado, ãã. . . 3j (4 gr.).
Sublimado corrosivo. . ℊxij (6 dec.).
Ungüento rosado. . . . 3j (30 gr.).

Mézclese S. A. y porfirícese la pomada. V. n. 7859.

I. Oftalmias crónicas en que hay complicacion sifilítica.

8076. P. OFTÁLMICA EXCITANTE (*Rust*).

℞ Precipitado rojo. . . . ℊvj (3 dec.).
Manteca fresca sin sal. 3ij (8 gr.).
Láudano de Sydenham,
Subacetato de plomo lí-
quido, ãã. . . . . 9ß (6 dec.).

M. I. Soroftalmia; segun período de casi todas las oftalmias, sobre todo en las catarrales y escrofulosas, úlceras de los párpados, de la conjuntiva y de la córnea. *D.* El volúmen de la cabeza de un alfiler entre los párpados ó en fricciones sobre los párpados cerrados. Si produce mucho dolor se disminuye por cierto tiempo.

8077. P. OFTÁLMICA CON HOLLIN (*Carron de Villards*).

℞ Tuétano de vaca. . . . 3j (30 gr.).
Extracto de hollin. . . ℊjv (3 gr.).
Ungüento cetrino. . . 9ß (6 dec.).
Aceite de hígado de
bacalao. . . . . 3ij (24 dec.).

M. D. El volúmen de la cabeza de un alfiler en los párpados, que quedan enrojecidos despues de la oftalmia variolosa.

8078. P. OFTÁLMICA CON TUCIA (H. DE M.).

℞ Precipitado rojo. . . . . ℊjv (2 dec.).
Oxido de zinc impuro
levigado. . . . . ℊvj (3 dec.).
Manteca de puerco. . . 5ij (8 gr.).

Mézclese S. A.

I. Oftalmias crónicas palpebrales.

8079. P. OPIADA.

℞ Láudano líquido. . . . . ℊxc (5 gr.).
Ungüento populeon. . . 5ij (60 gr.).

Yema de huevo fresco. número 1.
Harina de trigo. . . . . c. s.
Triturese todo.

I. Quemaduras, hemorragias, inflamaciones, cólico espasmódico, zona, erisipela, grietas, blenorragias, orquitis, cuerpos extraños, tenesmo, vólvulo, disuria, didimalgia, flebitis, oftalmia, lumbago, mammitis. *D.* En fricciones en la parte enferma.

8080. P. OPIADA.

℞ Opio en polvo. . 5j á 5ij (4 á 8 gr.).
Cerato. . . . . 5jv (125 gr.).
M. I. Sirve para curar las heridas y úlceras muy dolorosas, y para dar unturas en ciertas pústulas y en los tumores venéreos.

8081. *Otra*, n. 3.

℞ Extracto de opio. . . ℊxviij (1 gr.).
Disuélvase en
Agua. . . . . 5B (2 gr.).
y se mezcla con
Manteca balsámica. . 5x (10 gr.).
M. I. Ulceras ó úlceras venéreas muy dolorosas. *D.* ℊxviij (1 gr.) en cada cura.

8082. P. DE ORO (*Legrand*).

℞ Oro dividido. ℊvj á ℊxij (3 á 6 dec.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).
M. I. Se usa en fricciones sobre las úlceras indolentes y excrescencias, úlceras venéreas, bubones venéreos, lepra, sífilides. Por el método endérmico. Encantis. *D.* ℊxviij á ℊxxxvj (1 á 2 gr.).

8083. P. DE OXIDO DE PLATA.

℞ Oxido de plata. . . . ℊxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).
M. I. Enfermedades sifilíticas, gangrena de hospital, neuritis. *D.* Para diez fricciones dos veces al dia.

8084. P. DE OXIDO ROJO DE MERCURIO *ó Pomada de deutóxido de mercurio* (*Biett*).

℞ Oxido rojo de mercurio. 5B (2 gr.).
Manteca. . . . . 5j (32 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊjv (2 dec.).
M. I. Sífilides, afecciones crónicas de la piel con prurito, pérrigo.

8085. P. DE DEUTÓXIDO DE MERCURIO ALCANFORADA (*Monod*).

℞ Bióxido de mercurio. . . 5B (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊvj (5 gr.).
Manteca. . . . . 5x (10 gr.).
M. I. Sífilides y afecciones crónicas de la piel con prurito.

8086. P. DE OXIDO ROJO DE MERCURIO *ó Pomada contra la oftalmia.*

℞ Oxido rojo de merc. ℊv (25 cent.).
Sulfato de zinc. . . . . ℊx (50 cent.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).
M. I. Oftalmias crónicas, sobre todo cuando están sostenidas por la diátesis escrofulosa. *D.* Se aplica el grosor de un guisante sobre el borde libre de los párpados.

8087. P. DE OXIDO DE ZINC (*Schmidt*).

℞ Oxido de zinc porfirizad. 5B (2 gr.).
Aceite de nuez. . . . . 5j (4 gr.).
Manteca de cerdo. . . . . 5j (30 gr.).
M. I. Manchas de la córnea. *D.* Se aplica un poco de la pomada como el tamaño de una lenteja, dos veces al dia.

8088. *Otra* (CAZENAVE).

℞ Oxido de zinc. . . . . 5B (2 gr.).
Cerato. . . . . 5v (20 gr.).
M. I. Eczemas semiagudos, que fluyen poco humor.

8089. *Otra* (MARTIN SOLON).

℞ Manteca. . . . . 5j (30 gr.).

Oxido de zinc. . . . . 5ß (2 gr.).

M. I. Eczema, impétigo, ectima.

8090. P. NÍTRICA *ó ungüento oxigenado* (F. E.)

℞ Manteca. . . . . Ibß (250 gr.).

Se derrite en una vasija ancha de porcelana y se echa poco á poco:

Acido nítrico puro. . . 5j (30 gr.).

Se menea con una espátula de madera hasta que no desprenda vapores rojos; entonces se aparta del fuego, se menea mucho, y cuando está fria se echa los moldes de papel y se guarda para cuando haya de usarse.

I. Sarna y afecciones crónicas de la piel, principalmente contra el pórrigo.

La POMADA OXIGENADA DE LOS H. M. se diferencia de la anterior, en que contiene 5vj (24 gr.) de ácido nítrico.

8091. P. OXIGENADA *ó Pomada nítrica* (F. F., F. A. Y F. P.).

℞ Manteca de cerdo. . . Ibj (500 gr.)
Acido nítrico de 32°. . 5ij (64 gr.).

Se derrite la manteca en una vasija de tierra, se añade el ácido nítrico y se continúa al fuego meneándola con un tubo de vidrio hasta que empiecen á desprenderse búrbujas de gas nitroso, en cuyo caso se aparta del fuego, se sigue meneándola hasta que esté medio fria y se vacia en moldes de papel.

I. Afecciones crónicas de la piel, y principalmente contra la sarna, el pórrigo, herpes, afecciones cutáneas, epsóricas ó venéreas.

8092. P. PARA LOS CABELLOS (*Boucheron*).

℞ Jabon medicinal.	31
Cenizas de cuero.	31
Sal gemma.	31
Tártaro rojo.	31
Polvo para el pelo.	31
Sulfato de hierro.	8
Sal amoniaco.	8
Coloquíntida.	8
Catecú.	8

Se mezclan exactamente todas estas sustancias, divididas antes, con c. s. de manteca para hacer una pomada, y se unta un gorro de tafetan de esta composicion.

8093. *Otra* (HUART).

℞ Manteca saturada de lirio,
Manteca saturada de clavel,
Manteca saturada de canela,
Manteca saturada de hojas de menta alcanforada, ãã. . . Ibj (500 gr.).
Oxido blanco de antimonio tartarizado,
Esencia de tomillo,
Esencia de salvia, ãã. 5jv (16 gr.).

Se toma la raiz de lirio en pedazos y la corteza de canela, se machacan los pétalos de clavel y hojas de menta, y se introducen estas sustancias en una vasija herméticamente cerrada; se funde la manteca á fuego lento, se la calienta mas y se la echa casi hirviendo sobre las sustancias citadas, se tapa la vasija, y se deja en contacto durante quince dias; al cabo de este tiempo se la funde de nuevo, se la prensa y cuela por un lienzo tupido, se incorpora á la manteca el óxido reducido antes á polvo impalpable y las esencias por medio de la trituracion.

8094. POMADA Ó CREMA PARA LA CARA.

℞ Cera blanca.	10
Esperma de ballena.	10
Aceite de almendras dulces. . .	150
Agua de rosas.	120

H. S. A.

8095. P. PARA DILATAR LA PUPILA.

℞ Alcanfor. . . . . 3j (12 dec.).
Aceite de alm. dulces, c. s.

Se disuelve y se incorpora :

Extracto de belladona. 3ij (8 gr.).
Ungüento napolitano. . 3ij (8 gr.).

Para unturas en los párpados, cejas y sienes con un poco de esta pomada.

8096. P. PARA HACER ABORTAR LAS VIRUELAS.

℞ Ungüento napolitano. 3
Almidon en polvo. 1

M. Se la ha propuesto en lugar del emplasto de Vigo. Se usa teniendo cubierta constantemente la parte afectada.

8097. P. PARA LOS RECONOCIMIENTOS.

℞ Esperma de ballena. 1
Cera amarilla. 1
Aceite comun. 16
Sosa cáustica. 1

Se funde la esperma de ballena y la cera en aceite, á un calor lento, en un barreño barnizado; se añade la sosa cáustica y se agita hasta que se enfrie.

Se usa esta pomada para hacer los reconocimientos en la época del parto.

8098. P. DE PEPINOS.
Procedimiento de Page.

℞ Pan de puerco mondado. lbxxjv (15000 gr.).
Grasa de vaca. . . . lbxv (7500 gr.).

Se machaca en un mortero de hierro, se lava despues, primero con agua tibia y despues con agua fria, se deja escurrir y en seguida se funde en el baño maría, despues de haber añadido:

Báls. del Perú disuelt. 3vj (24 gr.).
Agua de rosas. . . . . 3jv (125 gr.).

Se cuela con expresion y se deja aposar.

Se mondan sesenta pepinos, se los rae, se pone la pulpa en un saco de crin agujereado, se exprime y se pasa el zumo por un tamiz.

En un perol estañado, de la capacidad conveniente, se pesa

Grasa preparada antes aun caliente y colocada en la superficie. lbxxv (13000 gr.).

Se añade un tercio del zumo.

8099. *Procedimiento de Bouron.*

℞ Pepinos. . . . . lbxv (7500 gr.).
Alcohol á 85°. . . . lbß (250 gr.).

Se rae los pepinos, se los pone con el alcohol sobre el diafragma de una cucúrbita, y se destila hasta obtener 3viij (250 gr.) de alcoholato de pepinos. Se toma:

Manteca. . . . . 3jv (125 gr.).
Esperma de ballena. 3ß (15 gr.).
Cera blanca. . . . . 3ij (8 gr.).
Licor anterior. . . . 3ij (8 gr.).

Se funden los cuerpos grasos, se los vierte en un mortero calentado en agua hirviendo, y se añade el licor aromático; cuando la pomada empiece á trabarse, se la echa en botes.

8100. *Procedimiento de Henry y Guibourt.*

℞ Manteca de puerco preparada. . . . . lbjv (2000 gr.).
Sebo de ternera purificado. . . . . lbj (500 gr.).

Se licúan y cuelan, y cuando las grasas están frias se añade:

Zumo de pepinos. . lbiij (1500 gr.).

Se mezcla y malaxa con la mano para multiplicar los puntos de contacto, se abandona esta mezcla por veinticuatro horas, se decanta el zumo, se reemplaza con otro nuevo, y esto se repite hasta diez veces haciéndolo siempre del mismo modo.

Cuando la manteca ha adquirido un olor muy declarado á pepinos, se derrite en el baño maría y se añade 3jß (45 gr.) de almidon en polvo, destinado á dar consistencia al agua interpuesta y conseguir la precipitacion.

8101. *Procedimiento de Dorvault.*

℞ Manteca. . . . . lbij (1000 gr.).
Pepinos. . . . . lbv (2500 gr.).
Melones. . . . . lbv (2500 gr.).
Manzanas de la reina, número 4.
Leche de vacas. . . . lbij (1000 gr.).

Se rae los frutos y se los pone con la grasa y la leche en una vasija que se calienta en el baño maría durante ocho ó diez horas; se cuela despues con expresion, se deja enfriar en un paraje fresco, se separan la parte acuosa y las heces, se funde y se deja enfriar de nuevo para separar las primeras partes de este, y finalmente se bate.

I. Se usan como dulcificantes de la piel, y como excipientes de pomadas mas activas. Pitiriasis, viruelas, eclima, efélides, epinictis, grietas, sabañones, ninfomanía. *D.* 5ß á 5ij (2 á 8 gr.) en fricciones.

8102. P. DE PEYSSON.

℞ Tártaro emético. . . . gxjv (7 dec.).
Agua hirviendo. . . . c. s.
Se disuelve y se añade:
Manteca. . . . . ℥ß (15 gr.).
Divídase en doce papeles.

I. Apirexia de las calenturas intermitentes, inflamaciones, encefalitis, neumonía, cardiitis, cólera, coqueluche, laringitis, epilepsia, meningitis, neuritis, cáncer. *D.* Cuatro ó cinco fricciones al dia en el vientre, dorso, muslos ó brazos, cambiando de sitio para evitar los exantemas.

8103. P. DE PICROTOXINA.

℞ Picrotoxina. . . . . gx (5 dec.).
Manteca de cerdo. . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Se la ha aconsejado contra la tiña.

8104. P. DE PIHOREL.

℞ Pomada mercurial doble. . . . . 5ijß (10 gr.).
Sulfuro de cal amoniacada en polvo. . ℥j (4 gr.).

M. I. Antisifilítica. *D.* En fricciones en las manos y en los piés á la dosis de ℥j á ℥ij (4 á 8 gr.); la mitad por la mañana y la otra mitad por la noche.

8105. P. DE PIMIENTA *ó Pomada rubefaciente de pimienta.*

℞ Pimienta negra en polvo fino. . . 1
Manteca. 4

M. I. Pórrigo. *D.* Esta pomada se usa como rubefaciente.

8106. P. DE PIMIENTA (*Cazenave*).

℞ Pimienta en polvo. . . . ℥ß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Es muy útil en el pórrigo favoso.

8107. P. DE PINEL GRANDCHAMP.

℞ Óxido rojo de merc. . 5ijß (10 gr.).
Carbon. de sosa seco. ℥jv (16 gr.).
Sulfato de zinc. . . . 5jß (6 gr.).
Tucia. . . . . ℥j (4 gr.).
Flores de azufre. . . . ℥jv (16 gr.).
Manteca. . . . . ℥jv (125 gr.).

M. I. Tiña, favus, pórrigo. *D.* Se cubre las partes enfermas despues de haberlas lavado con agua de jabon.

8108. P. DE PIRELAINA DE EMERY (F. P.).

℞ Pirelaina de brea. 1
Manteca. 1

M. I. Herpes. No mancha la ropa.

8109. P. DE PRINGLE.

℞ Manteca. . . . . ℥ijß (75 gr.).
Azufre. . . . . ℥j (30 gr.).
Eléboro blanco,
Sal amoniaco, ãã. . . ℥ij (8 gr.).

Nota. Es probable que el azafran sea enteramente inútil en esta composicion; por consiguiente se le podria suprimir y limitarse á verter la solucion alcohólica de alcanfor en el agua de rosas. Respecto de esta última, despues de separada de la manteca, se la conserva para ser destilada el año siguiente sobre nuevas rosas.

H. S. A. *I.* Sarna y prúrigo. *D.* ℥j (30 gr.) al dia en fricciones. Esta pomada cura comunmente en quince ó veinte dias.

§110. P. DE PLOMBAGINA (*Maerker*).

℞ Plombagina. . . . . 3ij (8 gr.).
Sulfato de zinc. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
D. Se usa tópicamente.

§111. P. DE PRECIPITADO BLANCO.

℞ Manteca. . . . . ℥j (4 gr.).
Precipitado blanco. gj á gij (5 á 15 cent.).
Láudano de Sydenham. 8 á 10 gotas.
M. I. Blefaritis glandular.

§112. *Otra*, n. 2.

℞ Precipitado blanco. . ℊxviij (1 gr.).
Manteca fresca. . . . ʒv (20 gr.).
Esencia de rosas. . . ℊxxxvj (2 gr.).
M. I. Afecciones herpéticas acompañadas de comezon viva.

§113. P. DE PRECIPITADO BLANCO Y ROJO (*Gibert*).

NÚMERO 1.

℞ Precipitado blanco. . . ℥j (12 dec.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. Para los niños solo se pone ℊxv (75 cent.) de precipitado blanco.

NUMERO 2.

℞ Precipitado rojo. . ℊxv (75 cent.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Ulceras venéreas. *D.* La primera se usa para untar las mechas que se introducen en el ano en los casos de grietas, y la segunda en la cura de los tubérculos planos de las partes genitales, vegetaciones, tubérculos ulcerados de los niños de pecho y úlceras del ano.

§114. P. DE PRECIPITADO ROJO.

℞ Oxido rojo de merc. . ℊxviij (1 gr.).
Sulfato de zinc. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ℥ij (100 gr.).
M. I. Oftalmias escrofulosas, esclerotitis, oftalmitis, meningitis, y en fricciones en el borde libre de los párpados, en el punto dolorido, en la sífilis, sífilides, peritonitis, viruelas, hepatitis, soriasis, eczema, lepra, muermo.

§115. P. DE PRECIPITADO ROJO ó *Pomada oftálmica* (*Siebel*).

℞ Manteca. . . . . ℥j (4 gr.).
Precipitado rojo. gß á gij (25 cent. á 10 cent.).
Láudano de Sydenham. 8 á 10 gotas.
M. I. Blefaritis glandulares y manchas de la córnea. *D.* Se dan unturas en el borde libre de los párpados con una porcion de pomada como la cabeza de un alfiler.

Siebel añade á veces gij á giij (10 á 15 cent.) de sulfato de zinc, de cobre ó de cadmio.

§116. P. DE PULSATILA.

℞ Pulsatila en polvo. . . ℊxc (5 gr.).
Láudano. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Reumatismo, gota, protoptosis y didimalgia. *D.* En fricciones.

§117. P. PURGANTE (*Chrestien*).

℞ Coloquintida en polvo. . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).
M. I. Se usa en fricciones sobre el abdomen á la dosis de ʒij (8 gr.).

§118. P. DE QUINA AMARILLA (*Rust*).

℞ Alcanfor triturado,
Mirra en polvo, ää. ʒj á ʒij (4 á 8 gr.).
Quina amarilla en polvo,
Ungüento de estoraque líquido,
Carbon en polvo, ää. . ʒvj ; 24 gr.).
Aceite de trementina. . . . . c. s.
para hacer una pomada.
I. Ulceras gangrenosas y pútridas. Se puede reemplazar el ungüento de estoraque por un poco de bálsamo del Perú.

§119. P. DEL REGENTE.

℞ Oxido rojo de mercurio. . . . 6

Manteca fresca. 100
Cera blanca. 15

M. I. Oftalmias, blefaritis, manchas de la córnea, conjuntivitis, deslumbramiento de la vista. *D.* gxviij á 3j (1 á 4 gr.) en fricciones en el borde libre de los párpados. V. n. 8066.

8120. P. DEL REGENTE (F. F.).

℞ Manteca lavada con agua de rosas. 3ij y 3ij (72 gr.).
Alcanfor. . . . . gvj (3 dec.).
Oxido rojo de mercur. 5j (4 gr.).
Acetato de plomo crist. 5j (4 gr.).

Se porfirizan con cuidado el óxido de mercurio y la sal de plomo; se añade el alcanfor pulverizado con algunas gotas de alcohol y despues la manteca, y se mezcla todo porfirizándolo mucho tiempo.

I. Ulceras venéreas primitivas ó consecutivas, pero principalmente contra las oftalmias palpebrales crónicas.

8121. P. RESOLUTIVA.

℞ Calomelanos,
Cebolla albarrana, ää. 3ß (15 gr.).
Manteca. . . . . 3ij (8 gr.).
Aceite de rosas. . . . . 4 gotas.

M. I. Se usa en fricciones en los infartos crónicos de las articulaciones.

8122. *Otra* (BIETT).

℞ Protocloruro de mercurio,
Acetato de plomo, ää. gr.jv (3 gr.).
Manteca purificada. . . 3v (20 gr.).
Alcanfor. . . . . gx (5 dec.).

M. I. Tubérculos.

8123. *Otra* (DUPUYTREN).

℞ Sal amoniaco en polvo. gxc (5 gr.).
Ungüento mercurial. . 3iij (90 gr.).

M. I. Infartos escrofulosos. *D.* El grosor de una avellana en fricciones, mañana y noche.

La misma composicion en las proporciones siguientes:
Sal amoniaco. . . . . 3ijß (10 gr.).
Ungüento mercurial. . 3j (30 gr.).

Se usa contra las exóstosis traumáticas y los tumores que sobrevienen al rededor de la rótula, en las personas que tienen la costumbre de estar mucho tiempo de rodillas.

8124. *Otra* (LISFRANC).

℞ Cerato de Galeno. . . . 3iij (90 gr.).
Digital en polvo. . . . . 3j (30 gr.).

M. I. Tumefacciones, derrames pasivos. *D.* Se dan unturas con el volúmen de una avellana de esta pomada.

Esta pomada es un buen auxiliar de la compresion.

8125. *Otra* (SUNDELIN).

℞ Cloruro de calcio. . . . 3iij (12 gr.).
Polvo de digital. . . . . 3vj (24 gr.).
Vinagre fuerte. . . . . 3ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 3iij (96 gr.).

M. I. Infartos glandulares crónicos. *D.* De 3j á 3ij (4 á 8 gr.) en fricciones.

8126. P. RESOLUTIVA CALMANTE.

℞ Joduro de potasio. . . gxc (5 gr.).
Hidriodato de morfina. gxviij (1 gr.).
Manteca muy fresca. 3jß (48 gr.).
Esencia de rosas. . . . 5 gotas.

M. I. Dolores ocasionados por un tumor del pecho, y para resolver estos. *D.* Se hacen fricciones, mañana y noche, con gxviij (1 gr.) de pomada.

8127. P. RESOLUTIVA MERCURIAL.

℞ Calomelanos,
Escila, ää. . . . . 3ß (2 gr.).
Goma amoniaco. . . . 3j (4 gr.).
Manteca. . . . . 3ß (15 gr.).
Aceite de rosas. . . . . 5 gotas.

H. S. A. *I.* Absceso, artrocace, sabañones, infartos crónicos de las articulaciones, adenitis, escrófulas, eczema, sífilis, sífilides, efélides, conjuntivitis, hidroftalmia, hepatitis, hidrorraquis, ovaritis, nefritis. *D.* En fricciones.

8128. P. DE ROL.

℞ Aceite de almendras. . . ℥j (30 gr.).
Cera blanca. . . . . ʒij (8 gr.).
Se liquidan y se incorpora:
Protocloruro de mercur. ʒij (8 gr.).
Divídase en doce dosis.
I. Sarna. *D.* Una friccion por la noche al acostarse, en las partes afectadas.

8129. P. DE ROMERO COMPUESTA.

℞ Jabon. 48
Manteca. 48
Alcanfor. 16
Aceite de romero. 10
Aceite de espliego. 10
Aceite de cajeput. 10
Aceite de menta. 10
Aceite de manzanilla. 10
M. I. Reumatismo crónico, anestesia. *D.* 5j á 5ijß (4 á 10 gr.) en fricciones.

8130. P. DE ROSAS.

℞ Manteca lavada en agua de rosas. . . . . ℥j (30 gr.).
Esencia de rosas. . . . . 2 gotas.
M. Se usa como cosmética.

8131. P. RUBEFACIENTE.

℞ Cantáridas en polvo, Alcanfor, ää. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca balsámica. . . . ℥j (32 gr.).
Mézclese exactamente.
I. Crup. *D.* De 5j á 5ij (4 á 8 gr.) en fricciones al rededor del cuello.

8132. P. DE RUST.

℞ Precipitado blanco. ℊiij (15 cent.).
Láudano líquido de Sydenham. . . . . ℊviij (40 cent.).
Extracto de Saturno. ℊviij (40 cent.).
Manteca. . . . . ʒj (4 gr.).
II. S. A. *I.* Blefaritis glandulosas crónicas.

8133. P. DE SABINA.

℞ Sabina en polvo. 1
Manteca. 1
Mézclese.

8134. P. SATURNINA (F. POLACA).

℞ Grasa de puerco. . . . . ʒiij (90 gr.).
Acetato de plomo crist. ʒj (4 gr.).
Mézclese y añádase poco á poco agitando continuamente la masa:
Agua destilada. . . . . ʒß (15 gr.).
I. Se usa en el tratamiento de las úlceras superficiales de la piel.

8135. P. SATURNINA ALCANFORADA (*Baumés*).

℞ Manteca. . . . . ʒvj (24 gr.).
Extracto de Saturno. . . ʒij (8 gr.).
Alcanfor. . . . . ʒj (4 gr.).
II. S. A. *I.* Se usa para hacer desaparecer las manchas que suceden á las sifilides papulosas y otras; úlceras venéreas indolentes, sabañones ulcerados, etc.

8136. P. SATURNINA RESOLUTIVA (*Baumés*).

℞ Cerato. . . . . ʒiij (90 gr.).
Extracto de Saturno. . ʒijß (10 gr.).
Alcanfor. . . . . ℊxviij (1 gr.).
II. S. A. *I.* Úlceras venéreas indolentes, sabañones, úlceras, etc.

8137. P. DE SAÚCO ó *Ungüento de saúco.*

℞ Hojas frescas de saúco. 300
Manteca. 400
Sebo. 200
Se cuece hasta que se consuma la humedad y se cuela.

8138. P. SEDANTE.

℞ Cianuro de potasio. . . ℊjv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).
M. I. Jaqueca, neuralgia facial, enfermedades nerviosas, flebitis. *D.* En fricciones.

8139. *Otra* (DUPUYTREN).

℞ Acetato de plomo en polvo, Extracto de bellad., ää. ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒvj (24 gr.).
M. I. Grietas del ano. *D.* Se engrasa una mecha de un volumen conveniente que se introduce en el ano. Se aumenta poco á poco el grosor de la mecha.

8140. *Otra* (PETREQUIN).

℞ Manteca. . . . . ʒjx (36 gr.).

Extracto de belladona,
Digital en polvo, āā. ʒj (4 gr.).
Tintura de digital. . . ʒß (2 gr.).
Acido prúsico medic. 25 gotas.

H. S. A. *I.* Enfermedades del corazon. *D.* En fricciones en la region de este órgano.

8141. P. SEDANTE Y ABORTIVA (*Debreyne*).

℞ Ungüento napolitano. . . ʒij (8 gr.).
Extracto de belladona. . ʒj (4 gr.).
Opio. . . . . ʒj (4 gr.).

I. Panarizo. *D.* Se cubre la parte enferma con toda la pomada, y se dan fricciones cada hora para favorecer la absorcion. Comunmente bastan veinticuatro horas para que aborte la inflamacion.

8142. P. SEDANTE ANTIHEMORROIDAL (*Debreyne*).

℞ Ungüento populeon. . ʒj (30 gr.).
Extracto de belladona. ʒj (4 gr.).
Extracto de opio . . . gxij (6 dec.).

Se mezcla y aromatiza.

8143. P. SEDANTE Ó CALMANTE.

℞ Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).
Extracto de opio. . . . gxij (6 dec.).

Se disuelve el extracto en c. s. de agua y se incorpora con la manteca.

I. Inflamaciones crónicas, úlceras, cánceres ulcerados. *D.* En fricciones.

8144. P. DE SULFATO DE COBRE (*Desmarres*).

℞ Sulfato de cobre. gj á gjv (5 á 20 cent.).
Manteca fresca lavada en agua caliente. . . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . gij (1 dec.).

Se porfiriza exactamente el sulfato de cobre y el alcanfor, añadiendo una gota de aceite, y despues se mezcla exactamente con la manteca.

I. Manchas no enteramente formadas de la córnea, queratitis vasculares crónicas, cuando la pomada de óxido rojo de mercurio causa demasiada irritacion. *D.* El grosor de un grano de trigo en fricciones en los párpados al acostarse.

8145. P. DE SULFATO DE QUININA.

℞ Sulfato de quinina. . . . ʒß (15 gr.).
Alcohol de 38° ó 40° cerca de. . . . . ʒj (30 gr.).
Acido sulfúr. cerca de. 30 gotas.
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

H. S. A. *I.* Calenturas intermitentes, obstrucciones del bazo de los niños débiles. *D.* ʒiij (12 gr.) que representan ʒß (2 gr.) de sulfato de quinina en fricciones en los muslos y axilas; se cubre despues la parte con un hule y se sujeta con una venda.

8146. P. SULFOALCALINA.

℞ Azufre sublimado y lav. ʒß (16 gr.).
Potasa purificada. . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).

M. I. Es muy usada contra la sarna, á la que cura sin irritar la piel.

8147. P. SULFUROALCALINA.

℞ Azufre. 2
Carbonato de potasa. 4
Manteca. 8

M. I. Sarna. *D.* ʒij á ʒß (8 á 15 gr.) en fricciones, mañana y noche.

8148. *Otra* (JADELOT).

℞ Jabon blanco. . . . . Ibß (250 gr.).
Agua. . . . . ʒß (15 gr.).

Se reblandece en el baño maría y se añade poco á poco:

Higado de azufre. . . ʒjß (45 gr.).
Aceite de clavel. . . . Ibj (500 gr.).

I. Prúrigo, vegetaciones, pitiriasis. *D.* En fricciones.

8149. L. SULFOAMONIACAL.

℞ Azufre. . . . . ʒj (30 gr.).
Hidroclorato de amoniaco, Alumbre, āā. . . . . ʒß (2 gr.).
Manteca. . . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Vegetaciones, impétigo, sarna, herpes, tiña, prúrigo, eczema, favus. *D.* En fricciones.

8150. P. SULFOCARBONOSA.

℞ Azufre,
Carbon, āā. . . . . ℥j (30 gr.).
Quina,
Hollin, āā. . . . . ℥ß (15 gr.).
Cerato. . . . . c. s.

M. I. Vegetaciones, heridas, liquen, sarna, herpes, tiña, pórrigo, eczema, impétigo, pitiriasis. *D.* En fricciones.

8151. P. SULFOJABONOSA CON ELÉBORO.

℞ Azufre subl. y porfir. ℥j (30 gr.).
Eléboro blanco en polv. ℥j (4 gr.).
Nitro. . . . . ʒß (6 dec.).
Jabon negro,
Manteca, āā. . . . . ℥jß (45 gr.).

H. S. A. *I.* Sarna. *D.* En fricciones.

8152. P. SULFOJABONOSA (*Lugol*).

℞ Azufre sublimado,
Jabon blanco, āā. . . . ℥ij (60 gr.).

Disuélvase el jabon en el agua, cuélese y añádase el azufre.

I. Sarna. No mancha la ropa y cura muy bien la sarna en diez dias, término medio. La rubicundez que estas fricciones ocasionan cede fácilmente al uso de los baños.

8153. P. SULFURADA (F. F.).

℞ Azufre subl. y lavado. ℥iv (125 gr.).
Manteca de cerdo. . . ℥xij (375 gr.).

M. I. Sarna y muchas afecciones crónicas de la piel, principalmente en las formas escamosas, tales como la soriasis y la lepra vulgar. *D.* ʒjv á ʒviij (15 á 30 gr.) para una ó dos fricciones al dia.

8154. F. SULFÚRICA (*Naylor*).

℞ Acido sulfúrico. . . . . ℥j (4 gr.).
Alcanfor en polvo. . . . . ℥ij (8 gr.).
Manteca. . . . . ℥j (30 gr.).

H. S. A. *I.* Bocio. *D.* 5ß á ℥j (2 á 4 gr.) en fricciones, mañana y noche.

8155. P. DE SULFURO DE ARSÉNICO Y CALCIO (F. P.).

℞ Cal viva reciente. 4
Oropimente. 1
Lejía fuerte de potasa. 3200

Se pone á hervir en una vasija de barro hasta la consistencia conveniente.

I. Herpes corrosivo, lobanillos, tumores escrofulosos indolentes, glándulas escirrosas.

8156. P. DE SULFURO DE CARBONO.

℞ Sulfuro de carbono ó carburo de azufre. . ℥ß (15 gr.).
Alcanfor. . . . . ℥ij (8 gr.).
Aceite comun. . . . . ℥ij (60 gr.).

M. I. Partos laboriosos, metritis, estrecheces de la uretra ó de la vagina, blenorrea. *D.* En aplicacion.

8157. P. DE SULFURO DE MERCURIO (*Biett*).

℞ Sulfuro de mercurio. . ʒß (2 gr.).
Alcanfor. . . . . ℈x (5 dec.).
Cerato simple. . . . . ℥j (30 gr.).

M. I. Erupciones vexico-pustulosas en estado crónico. Es el cerato antiherpético de Alibert.

8158. P. DE SULFURO DE SODIO (F. P.).

℞ Jabon animal. . . . ℥j (30 gr.).
Sulfuro de sodio seco. ℥ij (60 gr.).
Alcohol á 30°. . . . . ℥vj (180 gr.).

H. S. A.

8159. P. SULFUROSA.

℞ Jabon blanco. 2
Manteca balsámica. 2
Polisulfuro de potasio líquido. . . 1

M. Se renueva á menudo porque se altera pronto.

I. Tiña, afecciones de la piel, sarna, herpes rebeldes. *D.* En unturas mañana y noche.

8160. P. DE LA SULTANA.

℞ Cera blanca. . . . . ℥iij (12 gr.).
Esperma de ballena. . ℥j (32 gr.).

Se liquida á fuego lento en
Aceite de alm. dulces. ℥ij (64 gr.).

Se echa en una vasija de porcelana y se agita hasta que esté bien hecha la mezcla; se incorpora despues:

Agua de rosas. . . . 5j (4 gr.).
Bálsamo de la Meca. gxxjv (12 dec.).
Tintura de benjui. 12 gotas.

Es buen cosmético.

§161. P. DE TANATO DE PLOMO (*Voit*).

℞ Tanato de plomo seco. 5ij (8 gr.).
Manteca. . . . . 5j (30 gr.).

M. I. Úlceras gangrenosas, úlceras atónicas, hernias, caida del recto, hemorroides.

§162. P. DE TANINO.

℞ Grasa de puerco rec. 5jß (45 gr.).
Tanino,
Agua para, ää. . . . . 5ij (8 gr.).

Se disuelve el tanino en c. s. del agua prescrita, triturándolos juntos en un mortero de vidrio; se añade la grasa y se mezcla exactamente.

I. Atonía de las úlceras, relajacion de ciertos órganos y hernias de los niños, caida del recto, úlceras, hemorroides, artrocace, encantis.

§163. P. DE THIERRY.

℞ Ungüento populeon. lbß (250 gr.).
Ungüento basilicon. . 5iij (90 gr.).
Cera amarilla. . . . . 5ij (60 gr.).

Se liquida todo, se menea y se añaden:

Cantáridas reducidas
á polvo fino. . . . 5ß (15 gr.).

I. y *D.* Esta pomada es epispástica y sirve para mantener abiertos los vejigatorios.

§164. P. DE TODDE.

℞ Alcornoque dulce,
Cicuta en polvo,
Oxido de zinc,
Acetato de plomo, ää. 5jß (6 gr.).
Miel rosada. . . . . c. s.

M. I. Úlceras corrosivas y cancerosas, sífilis, cálculos.

§165. P. DE TORBISCO (H. DE M.).

℞ Polvos de corteza de torbisco,
Cera blanca, ää. . . 5j (30 gr.).
Manteca. . . . . 5xjv (420 gr.).

M. S. A. *I.* Se usa como excitante para mantener la supuracion en los vejigatorios.

§166. P. DE TORBISCO ESTIBIADA (*Terborgh*).

℞ Pomada de torbisco. . . 5j (32 gr.).
Tártaro emético. . . . . 5j (4 gr.).

M. I. Tisis laríngea. *D.* Se usa en fricciones en la region cervical anterior. Se suspende cuando ha producido la erupcion especifica de los antimoniales. Obra como la pomada de Antenrieth y el autor dice que es mas eficaz.

§167. P. TREMENTINADA (*Debreyne*).

℞ Esencia de trementin. 5ij (60 gr.).
Aguardiente alcanfor. 5ij (30 gr.).
Amoniaco. . . . . 5ij (8 gr.).
Manteca. . . . . lbß (250 gr.).

I. Ciática. *D.* En fricciones mañana y noche.

§168. P. DE TUÉTANO DE VACA.

℞ Tuétano de vara preparado,
Mant. de vacas prep., ää. 5ij (60 gr.).
Bálsamo del Perú. . . . 5j (4 gr.).
Vainilla. . . . . 5ß (2 gr.).
Aceite de avellana. . . . 5ij (8 gr.).

H. S. A. *I.* Se usa como cosmético cuando los cabellos están secos y áridos.

§169. P. DE TURBIT MINERAL.

℞ Turbit mineral. . . . gxij (6 dec.).
Manteca. . . . . 5ß (15 gr.).

D. Se toma una porcion como 9j (12 dec.) para ligeras fricciones sobre la parte enferma.

§170. *Otra* (SWEDIAUR).

℞ Turbit mineral. 4
Manteca. 8

§171. P. DE TURBIT (*Alibert*).

℞ Manteca. . . . . lbij (1000 gr.).

*

Turbit mineral. . . . ʒij (60 gr.).

Se reduce el sulfato á polvo muy fino, se funde la manteca á un calor lento, se la incorpora el polvo y se menea con la mano de un mortero hasta que la grasa se haya enfriado enteramente. Se la conserva en una vasija de loza.

I. Herpes escamosos y crustáceos. *D.* C. s. para fricciones ligeras en las partes enfermas.

8172. P. DE VERATRINA DE MAGENDIE (H. DE M.).

℞ Veratrina. . . . . ℊjv (2 dec.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Neuralgias, reumatismo crónico, anasarca, gota, cuerpos extraños, disuria, mammitis. Algunos la aconsejan en el asma. *D.* De ʒj á ʒij (4 á 8 gr.) en fricciones.

8173. *Otra* (TERRIER)

NÚMERO 1.

℞ Veratrina. . . . . ℊx (50 cent.).
Alcohol. . . . . c. s.
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

NÚMERO 2.

℞ Veratrina. . . . . ℊxx (1 gr.).
Alcohol. . . . . c. s.
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

NÚMERO 3.

℞ Veratrina. ℊxxx á ℊxl (1,50 á 2 gr.).
Alcohol. . . . . c. s.
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

Se empieza por la pomada número 1, despues el 2 y el 3.

I. Oftalmias con fotofobia, amaurosis incipiente, ambliopia amaurótica y dolores ó neuralgias del ojo. *D.* La dosis debe ser menos elevada para las mujeres y los niños. Se da ℈ (2 gr.) para cada friccion. Se procurará que no caiga en los ojos y se limpiará con cuidado la parte.

8174. P. VERMÍFUGA.

℞ Acíbar. . . . . ʒij (8 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (32 gr.).

M. I. Es antihelmíntica.

8175. P. VERMIFUGA (*Doerffurt*).

℞ Hiel de toro espesada,
Extracto de cáscara de nuez, ää. . . . . ʒijß (10 gr.).
Manteca de cerdo. . . ʒij (60 gr.).
Aceite de tanaceto. . . ʒß (2 gr.).

M. S. A. *D.* Se frota el vientre de los niños que tienen lombrices.

8176. P. DE WERLHOF.

℞ Calomelanos. . . . . ʒj (4 gr.).
Ungüento rosado. . . . ʒj (32 gr.).

M. I. Sarna. *D.* En fricciones.

8177. P. DE WITZMANN.

℞ Tártaro emético. . . . ℊjv (2 dec.).
Aceite de ricino,
Manteca fresca, ää. . . ʒj (4 gr.).

M. I. Manchas á consecuencia de oftalmias, catarata, neuritis, inflamacion, tétanos, cáncer, laringitis, calenturas intermitentes, meningitis, albugo. *D.* Se introduce en el ojo el volúmen de una lenteja y se hacen fricciones en el párpado superior.

8178. P. DE LA VIUDA DE FARINIER.

℞ Manteca muy fresca. . ʒij (60 gr.).
Minio. . . . . ℊxviij (1 gr.).
Acetato de plomo crist. ℊjv (3 gr.).

H. S. A. *I.* Conjuntivitis y queratitis crónicas, inflamaciones de los folículos palpebrales, queratitis ulcerosas crónicas, manchas de la córnea.

8179. P. DE WILLAN.

℞ Carbonato de potasa. ʒß (15 gr.).
Sulfuro rojo de mercurio,
Agua de rosas, ää. . . ʒi (30 gr.).
Esencia de bergamota. ʒß (15 gr.).
Azufre sublimado,
Manteca, ää. . . . . ʒjx (270 gr.).

M. I. Sarna.

8180. P. DE YEMAS DE ÁLAMO.

℞ Yemas secas de álamo. 1
Manteca. 4

Se digiere en el baño maría ó sobre un fuego suave, se cuela con expresion y se separan las heces.

I. Hemorroides.

8181. P. ZINCO-PLÚMBICO OPIADA (*Rosenthal*).

℞ Pomada de tucia,
Pomada de albayalde,
Aceite de adorm., ãã. ʒj (4 gr.).
Bióxido de mercurio porfirizado. . . . . gij (15 cent.).
Opio purificado. . . . gx (50 cent.).

H. S. A. *I.* Blenoftalmia catarral á consecuencia de las calenturas exantemáticas, blenoftalmia contagiosa crónica. *D.* El volúmen de medio grano de trigo, introducido entre los párpados, mañana y noche.

8182. P. DE ZINC Ó ZINCADA (*Schmidt*).

℞ Oxido de zinc porfirizad. ʒß (2 gr.).
Aceite de nueces. . . . . ʒj (4 gr.).
Manteca. . . . . ʒj (30 gr.).

H. S. A. *I.* Manchas de la córnea. *D.* El volúmen de una lenteja, que se aplica dos veces al dia.

8183. P. DE ZINC.

℞ Oxido de zinc. . . . gxv (75 cent.).
Calomelanos. . . . . gxij (60 cent.).
Alcanfor. . . . . gviij (40 cent.).
Acíbar. . . . . gj (5 cent.).
Ungüento rosado. . ʒijß (10 gr.).

H. S. A. *I.* Hernia, callos, pórrigo, eczema, favus, lepra, lupus, metrorragias, oftalmia escrofulosa, encantis, manchas de la córnea. *D.* En fricciones en los puntos doloridos y en el borde libre de los párpados.

PONCHES.

8184. PONCHE.

℞ Aguardiente. . . . . ʒij (60 gr.).
Alcohol de melisa. . . ʒijß (10 gr.).
Jarabe simple. . . . . ʒj (30 gr.).
Pocion gomosa. . . . . ʒij (60 gr.).

M. I. Para reanimar las fuerzas en las calenturas graves y á los niños débiles; adinamia y convalecencia de las enfermedades de larga duracion, tifo, delirio trémulo, cólera morbo, astenia, convulsiones, etc. *D.* A cortadillos.

8185. P. CONTRA LAS CALENTURAS NERVIOSAS DE LOS ANCIANOS.

℞ Infusion de té. . . . . lbj (500 gr.).
Ron de la Jamáica,
Zumo de limon, ãã. . ʒij (60 gr.).
Azúcar. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Enfermedades asténicas de los ancianos por falta de influencia nerviosa. Cuando no se encuentre ron de buena calidad se le puede reemplazar por ʒiij ó ʒjv (90 ó 125 gr.) de vino de Madera, siendo las mismas las cantidades de los otros ingredientes. *D.* ʒij (60 gr.) cada hora ó cada dos horas.

8186. P. ESPAÑOL.

℞ Cerveza. . . . . una botella.
Agua de limon helada. . un cuartillo.

M. I. Se usa como refrescante.

8187. P. OFICINAL.

℞ Té. . . . . ʒij (8 gr.).
Agua. . . . . lbß (250 gr.).

Se infunde, se cuela y se añade:

Alcohol de 33°. . . . ʒiv (125 gr.).
Zumo de limon. . . . número 1.
Jarabe simple. . . . . ʒjv (125 gr.).

M. I. Es estimulante y sudorífico, aconsejado por Magendie en el período álgido del cólera, en el envenenamiento por el arsénico, en el enfriamiento y colapso que acompaña ó precede á muchas enfermedades agudas. Es menos alcohólico que el ponche comun. *D.* A cortadillos.

PULPAS.

8188. PULPA DE CAÑAFÍSTULA (F. F. Y F. P.).

℞ Cañafístula. . . . . c. s. q.

Se rompen los frutos á lo largo de las suturas, para lo cual una de estas se apoya sobre un punto resistente y se golpea en la opues-

ta; se sacan con una espátula la pulpa, las simientes y los discpimentos, y se pasa la pulpa por un tamiz de cerda.

Si la pulpa interior estuviese muy dura, se ablanda primero con un poco de agua antes de sacarla del fruto.

I. Es un laxante muy suave que conviene aunque haya irritacion intestinal y calentura. *D.* ℥j á ℥ij (30 á 60 gr.).

8189. P. DE CAÑAFISTULA COMPUESTA, *ó Pulpa de cañafistula para lavativas.*

℞ Hojas de acelga,
Hojas de malva,
Hojas de mercurial,
Hojas de parietaria,
Hojas de violetas,
Flor. de violetas, ää. ℥ß (15 gr.).
Agua. . . . . lbij (1000 gr.).

Se reduce por la cocion hasta ℥xx (625 gr.) y se añade:

Pulpa de cañafistula. c. s.
Azúcar. . . . . lbij (1000 gr.).

Se cuece hasta la consistencia de electuario.

I. Estreñimiento, cólicos. *D.* En lavativas.

8190. P. DE CICUTA (F. F.).

℞ Hojas mondadas de cicuta. . c. s. q.

Se reducen á pasta fina machacándolas en un mortero de mármol, y se pasa por un tamiz de cerda.

Del mismo modo se preparan las pulpas de BERROS, COCLEARIA, ROSAS ROJAS y de todas las demás flores y hojas frescas.

8191. P. DE CIRUELAS (F. F.).

Se exponen las ciruelas sobre un diafragma á la accion del vapor de agua, hasta que estén enteramente ablandadas; y despues de quitarles los huesos, se machaca la carne del fruto en un mortero de mármol y se la pasa por un tamiz de cerda.

Del mismo modo se preparan las pulpas de DÁTILES, AZUFAIFAS, CEBOLLAS COMUNES, CEBOLLA ALBARRANA, CEBOLLA DE LIRIO, AZUCENAS, RAIZ DE ÉNULA CAMPANA, RAIZ DE MALVAVISCO Y ESPECIES EMOLIENTES, etc.

Las ciruelas cocidas suministran una bebida refrigerante y ligeramente laxante; su pulpa tiene las mismas propiedades y entra en la composicion de otras pulpas.

8192. P. DE COCLEARIA (F. F.).

℞ Hojas frescas y mondadas de cocleria. . . . . c. s. q.

Se reducen á pasta fina machacándolas en un mortero y se las pasa por un tamiz.

Del mismo modo se preparan las pulpas de BERRO, ROSAS ROJAS, CICUTA y de todas las flores y hojas frescas.

8193. P. DE ESCARAMUJOS Ó CINOSBASTOS (F. F.).

℞ Cinosbastos ó escaramujos. . c. s. q.

Se cogen un poco antes que hayan llegado á su perfecta madurez; se les quita el limbo del cáliz y la extremidad inflada del pedúnculo; se arrojan igualmente las semillas y los pelos que las envuelven; se echa el resto en una vasija de loza *blanca*, se rocia con un poco de vino blanco, se coloca en un paraje fresco, y se revuelve de cuando en cuando con una espátula de madera para repartir por igual la humedad. Cuando estén bien blandos se machacan en un mortero de mármol, y se pasan por un tamiz de cerda.

I. La pulpa de escaramujos es un astringente muy enérgico, pero rara vez se usa interiormente.

8194. P. DE TAMARINDOS (F. F.).

℞ Tamarindos. . . . . c. s. q.

Se ponen en una vasija de loza blanca, se añade un poco de agua, se dejan en digestion sobre cenizas calientes hasta que se ablanden por igual, y entonces se pasa por un tamiz para separar las semillas y los filamentos que tiene el fruto.

I. Se administra como laxante en los mismos casos que la cañafístula. *D.* De ʒß á ʒj (15 á 30 gr.).

8195. P. DE TAMARINDOS ARTIFICIAL.

℞ Pulpa de tamarindos. . ʒj (30 gr.).
Crémor de tártaro. . . . ʒij (8 gr.).

M. I. Estreñimiento, cólicos, embarazo gastro-intestinal. *D.* De una vez como purgante.

8196. P. DE ZANAHORIA (F. F.).

℞ Raiz de zanahoria. . . . . c. s. q.

Se reducen las raices á pulpa por medio del rallo.

Del mismo modo se preparan las pulpas de PACIENCIA, AJO, PATATAS, MEMBRILLO, etc.

I. Cáncer, quemaduras, úlceras; cánceres ulcerados en que obra como demulcente; afecciones de la piel, en todos los casos en que están indicadas las cataplasmas emolientes. *D.* En cataplasmas.

PURGANTES.

8197. PURGANTE ACÍDULO.

℞ Pulpa de cañafistula,
Pulpa de tamarindos, ää. ʒj (30 gr.).

Se cuece en lbj (500 gr.) de sucro clarificado hasta que quede en ʒxij (375 gr.); se cuela y se añade:

Zumo de limon. . . . . ʒj (30 gr.).

D. En dos tomas, por la mañana, con el intermedio de una ó dos horas. Se bebe limonada interin produce el efecto purgante.

8198. P. ANTILECHOSO.

℞ Sen mondado,
Sal de Glauhero, ää. . ʒij (8 gr.).

Se infunde en un vasito de agua hirviendo, se cuela y se añade:

Maná en lágrimas. . . . ʒij (60 gr.).
Jar. de achicorias comp. ʒj (30 gr.).

Se cuela y se añaden despues de frio dos ó tres gotas de esencia de anis.

I. Es buen purgante y se puede usar al mismo tiempo caldos de yerbas.

8199. P. DE CALOMELANOS.

℞ Calomelanos. . . . . ℊxij (6 dec.).
Miel blanca y dura. . ʒij (8 gr.).

M. D. De una vez. Es el modo mas cómodo de administrar los calomelanos.

8200. P. DRÁSTICO (*Andral*).

℞ Aguardiente aleman,
Jar. de espino serval, ää. ʒj (30 gr.).

M. I. Afecciones cutáneas rebeldes. *D.* De una vez por la mañana en ayunas.

8201. P. DE GRANT.

℞ Tártaro soluble. ʒvj á ʒviij (24 á 32 gr.).
Maná en lágrimas. . . ʒij (64 gr.).
Agua de achicorias amargas. . . . . ʒxx (625 gr.).

H. S. A. *I.* Atonia del hígado, afecciones hipocondríacas. *D.* En dos ó tres tomas por la mañana.

8202. P. LECHOSO.

℞ Escamonea sin color por el carbon. . . . ℊxij (6 dec.).
Leche de vacas. . . . . ʒjv (125 gr.).
Jar. de flores de nar. ʒj (30 gr.).

M. D. Para una dosis.

8203. P. DE LE ROY.
Primer grado.

℞ Escamon. de Alepo. ʒjß (48 gr.).
Raiz de turbit. . . . ʒvj (24 gr.).
Jalapa. . . . . ʒvj (192 gr.).
Aguardiente de 20°. lbxij (6000 gr.).

Se infunden las sustancias reducidas á polvo, durante doce horas, en un baño maria á la temperatura de veinte grados, se cuela y se añade el jarabe siguiente:

Sen. . . . . ʒvj (192 gr.).
Agua hirviendo. . . lbjß (750 gr.).

Se infunde durante cinco horas, y despues de exprimido se cuela; se añade lbiij (1500 gr.) de azú-

car terciada y se hace S. A. un jarabe.

Esta tintura puede representarse aproximadamente por la siguiente:

Tintura de escamonea.	℥j	(32 gr.).
Tintura de turbit. . . .	℥ß	(16 gr.).
Tintura de jalapa. . .	℥ß	(16 gr.).
Jarabe de sen.	℥ijß	(80 gr.).

Segundo grado.

℞ Escam. de Alepo.	℥ij	(64 gr.).
Raiz de turbit. . .	℥j	(32 gr.).
Jalapa.	lbß	(250 gr.).
Aguardiente de 20°	lbxij	(6000 gr.).

Se prepara del mismo modo que el anterior, y se añade el jarabe preparado con

Sen.	lbß	(250 gr.).
Agua hirviendo. . .	lbij	(1000 gr.).
Azúcar terciada. . .	lbijß	(1250 gr.).

Tercer grado.

℞ Escam. de Alepo.	℥iij	(96 gr.).
Raiz de turbit. . . .	℥jß	(48 gr.).
Jalapa.	℥xij	(375 gr.).
Aguardiente de 21°.	lbxij	(6000 gr.).

Se prepara como las anteriores, y se añade el jarabe preparado con

Sen.	℥xij	(375 gr.).
Agua hirviendo. . .	lbiij	(1500 gr.).
Azúcar terciada. . .	lbiij	(1500 gr.).

Cuarto grado.

℞ Escam. de Alepo.	℥jv	(125 gr.).
Raiz de turbit. . . .	℥ij	(64 gr.).
Jalapa.	lbj	(500 gr.).
Aguardiente de 22°.	lbxij	(6000 gr.).

Se prepara como las anteriores y se añade el jarabe preparado con

Sen.	lbj	(500 gr.).
Agua hirviendo. . .	lbiij	(1500 gr.).
Azúcar terciada. . .	lbiijß	(1750 gr.).

Este remedio drástico puede convenir en todos los casos en que el médico juzgue están indicados los drásticos; pero ignorantes empíricos han abusado de él y han sucumbido numerosas víctimas á consecuencia de su imprudente administracion, habiendo caido en descrédito una fórmula que en muchos casos puede ser útil.

I. Embarazo gástrico, cólico saturnino, hidropesías, ascitis, afecciones biliosas. *D.* De una á cuatro cucharadas al dia.

8204. VOMIPURGATIVO DE LE ROY.

℞ Vino blanco de buena calidad.	lbjv	(2000 gr.).
Sen.	℥jv	(125 gr.).

Se infunde en frio durante tres dias meneando la mezcla de cuando en cuando, se cuela y se esprime de modo que resulte en cuanto sea posible la cantidad de vino indicada.

Se añade por cada libra (500 gr.) de vino preparado de este modo, 5j (4 gr.) de tártaro emético.

Se cuela.

Este licor puede representarse por

Vino de sen. . . .	Ʒvijß	(34 gr.).
Tártaro emético. . .	℈jvß	(22 cent.).

D. Una cucharada.

8205. P. VERMÍFUGO.

℞ Sen mondado.	℥ij á ℥jv	(8 á 16 gr.).
Musgo de mar.	ƷJ	(4 gr.).
Limon en rebanadas. . .	núm.	1.
Maná.	℥ij	(60 gr.).
Agua hirviendo. . . .	un	vaso.

Se deja infundir durante la noche y se cuela al dia siguiente. Despues se puede beber un caldo de vaca, en la que se infunde hojas de achicorias amargas.

FIN DEL TOMO III.