

J. L. Estrada

FORMULARIO

UNIVERSAL.

10

FORMULARIO

UNIVERSAL,

Por D. Francisco Alvarez,
Profesor de Medicina y Cirujía.




TOMO III.

Madrid: 1841.

LIBRERIA DE LA SEÑORA VIUDA DE CALLEJA É HIJOS.

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA



6104876743

IMPRESA QUE FUE DE FUENTENEbro,
á cargo de Alejandro Gomez.

FORMULARIO.

CONTINUACION DE LA CUARTA PARTE.

POLVOS.

POLVO ABSORBENTE.

Magnesia calcinada, *diez y seis granos.*

Canela, *dos granos.*

M. y divídase en dos papeles. *D.* Diarrea en los niños por formación de ácido en las primeras vías. *D.* En dos tomas al día.

POLVOS DE AILHAUT.

Escamonea, *una dracma.*

Hollin, *dracma y media.*

Colofonia, *dos dracmas.*

M. Se usa á la dosis de media dracma como purgante drástico.

POLVO ANODINO (*Helvetius*).

Mirra, *dos libras*.

Cascarilla. } *a. diez y seis*
 Canela de olor de clavo. } *onzas.*

Opio. }
 Bol arménico. } *a. cuatro onzas.*
 Coral rojo preparado. . }

H. S. A. I. Disenterias, cólicos de estómago y pleuresía. *D.* De diez y ocho granos á dos escrúpulos. *Nota.* Esta composicion es mas escitante que anodina. Es necesario no dejarse llevar del título y de la adición del opio (*Bally*).

POLVO ANTIÁCIDO.

Magnesia calcinada, *media onza*.

Cáscara de naranja. } *a. una dracma.*
 Azúcar blanca. }

M. y divídase en seis papeles. *I.* Agrios del estómago. *D.* Tres ó cuatro al dia.

POLVO ANTIARTRÍTICO (*Hartmann*).

Azúcar, *dos onzas*.

Canela, *onza y media*.

Carbonato de hierro, *media onza*.

H. S. A. D. De media á una dracma.

POLVO ANTIARTRÍTICO (*Marc*).

Polvo de regaliz, *dos dracmas*.

Rhododendrum chrysanthum, *diez granos*:

H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se divide en diez tomas iguales. *D.* Una toma mañana y tarde. *Nota.* Se aumenta una dosis cada día hasta que se produzca un abundante sudor ó aumento de la escrecion de la orina. Algunas veces hay que administrar hasta treinta granos al día.

POLVO ANTIARTRITICO PURGANTE.

Goma arábica.	} <i>a. media onza.</i>
Cremor de tártaro.	
Sen.	
Canela.	
Escamonea.	} <i>a. dos dracmas.</i>
Zarzaparrilla.	
China.	
Palo de guayaco.	

Reduzcanse á polvo *S. A. I. y D.* Se usa como purgante suave para prevenir los ataques de gota á la dosis de una dracma todos los meses.

POLVO ANTICARCINOMATOSO (*Fr. Cosme*).

Sulfuro rojo de mercurio, *dos dracmas*.

Oxido blanco de arsénico, *dos escrúpulos*.

Sangre drago, *trece granos.*

Cenizas de suelas viejas, *ocho granos.*

Se hace un polvo muy fino. *D.* Se empapá
e. s. de este polvo con un poco de agua, se le
estiene con un pincel sobre la úlcera cance-
rosa, que se cubrirá despues con un lienzo. *No-*
ta. La escara cae al cabo de tres ó cuatro días.

POLVO ANTICATARRAL (F. A.).

Azúcar, *tres onzas.*

Lirio de Florencia, *tres dracmas y un es-*
crúpulo.

Flores de azufre, *una dracma y dos escri-*
pulos.

Azafran oriental, *una dracma.*

Goma arábica.	} <i>a. un escrúpulo.</i>
Almidon.	
Regaliz.	

II. S. A. I. Catarros pulmonales con es-
pectoracion difícil. *D.* De una á dos dracmas
al día.

POLVO ANTICLORÓTICO (*Dubois*).

Limaduras de hierro, *un escrúpulo.*

Canela en polvo, *media dracma.*

Quina en polvo, *una dracma.*

M. y divídase en doce papeles. *I.* Cloro-
sis. *D.* Uno, cada dos ó cuatro horas.

POLVO ANTIDIARREICO.

Ipecacuana en polvo. . . . }
 Opio en polvo. } *a. un grano.*
 Alcanfor en polvo. . . . }

M. D. Cinco ó seis dosis al dia en un vehículo apropiado.

POLVO ANTIEPILÉPTICO (*Kirczkoff*).

Prusiato de hierro, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *una onza.*

M. y divídase en diez y seis dosis iguales.

I. Epilepsia no sostenida por lesión orgánica. Si el enfermo tiene una constitución sanguínea, debe preceder á su administración una larga sangría y algunas sanguijuelas en las sienas.
D. Se da una dosis al dia, dividida en cuatro partes y con tres ó cuatro horas de intervalo.

OTRO (*Quincy*).

Raiz de valeriana silvestre. }
 — de peonía macho. . . } *a. media onza.*

Semillas de ruda. }
 Mirra. } *a. dos dracmas.*
 Castoreo. }
 Sucino blanco. . . }

Cinabrio natural, *una onza.*

Se reducen á polvo y se los mezcla exacta-

mente. *D.* De diez á veinte granos á los niños, y de ochenta granos á una dracma á los adultos.

POLVO ANTIÉPSÓRICO.

Azufre sublimado y lavado, *doce dracmas.*

Bardana en polvo, *seis dracmas.*

Regaliz en polvo, *seis dracmas.*

Alcanfor, *una dracma.*

M. D. Dos dracmas al dia en dos tomas.

OTRO (*Bally*).

Azufre sublimado. }
 Polvo fino de carbon de leña. } *a. part. igual.*
 Ladrillo machacado. }

H. S. A. D. Un puñado grande, que se humedece con un poco de aceite y con el que se frota el hueco de la mano durante un cuarto de hora, mañana y tarde. *Nota.* Este remedio cura muy bien la sarna, aun cuando sea inveterada.

OTRO (*Chaussier*).

Flores de azufre. . }
 Acetato de plomo. } *a. dos partes.*

Sulfato de zinc, *una parte.*

I. y D. Se usa en fricciones en las palmas de las manos, á la dosis de una pulgarada diluida en algunas gotas de aceite.

POLVO ANTIESPASMÓDICO.

Castoreo, *una dracma.*

Canela, *diez y ocho granos.*

Azúcar, *dos dracmas.*

Mezelese y divídase en doce papeles. Se toma uno de hora en hora.

OTRO (*Brachet*).

Oxido de zinc, *seis á doce granos.*

Azúcar, *veinte á treinta granos.*

Mezelese y divídase en seis tomas.

I. Convulsiones de los niños. *D.* Uno cada dos horas en un poco de agua azucarada. Se puede añadir de seis á diez granos de extracto de beleño.

OTRO (*F. P.*).

Raiz de valeriana silvestre en polvo, *una dracma.*

Almizcle ó ambar gris, *un escrúpulo.*

Asa fétida, *seis granos.*

Alcanfor, *doce granos.*

M. S. M. y háganse polvos. *I.* Histerismo, epilepsia, convulsiones, &c. *D.* De doce hasta veinte granos.

OTRO (*Magendie*).

Cianuro de zinc, *medio grano.*

Magnesia calcinada, *cuatro granos.*

Canela, *tres granos.*

Se toma cada cuatro horas.

POLVOS ANTIESPASMÓDICOS (*Recamier*).

Sub-nitrato de bismuto, *cuatro granos.*

Magnesia. } *a. dos escrúpulos.*
Azúcar. . }

Se dividen en cuatro papeles iguales y se toma uno á la vez.

POLVO ANTIGASTRÁLGICO.

Magnesia, *una dracma.*

Canela, *media dracma.*

Opio en bruto, *un grano.*

Mezelese y divídase en doce papeles. Se toma uno ó dos al dia antes de comer.

POLVO ANTHELMINTICO.

Coralina de Córcega. } *a. tres onzas;*
Santónico. . . . }

Calomelanos, *un escrúpulo.*

M. y divídase en ocho papeles. Se toman en un dia.

OTRO (*Dupuytren*).

Calomelanos, *dos granos.*

Ruibarbo, *seis granos.*

Jalapa, *treinta granos.*

M. I. Se usa tambien como purgante suave.
D. De una vez.

POLVO ANTIHELMINTICO (H. DE M.).

Coralina en polvo. }
 Helecho macho. . } *a. partes iguales.*

M. I. Lombrices intestinales. *D.* Media dracma.

POLVO DE ANTIMONIO MARCIAL DIAFORÉTICO
 (*Keup*).

Limaduras de hierro. . . . }
 Sulfuro de antimonio nativo. . } *a. ocho onz.*

Se trituran y se mezclan estas sustancias, se ponen en un crisol enrojecido al fuego y se las menca con una varilla de hierro hasta que parezcan reducidas á escorias; se las saca y cuando la masa está fria, se la tritura de nuevo con tres veces su peso de nitro seco; despues se echa el polvo á cucharadas en un crisol hecho ascuá; cuando han terminado la desflagracion y la calcinacion, se echa la materia en cantidad suficiente de agua para disolver la potasa que contiene. Se precipitará el antimoniato de potasa y hierro bajo la forma de un polvo amarillo. Se procederá á la levigacion; se secará muy bien el polvo que ha quedado sobre el filtro.

I. Caquexia, ictericia y debilidad de los intestinos, *D.* Cinco á seis granos al dia.

POLVO DE ANTIMONIO MERCURIAL (*Smith*).

Sulfuro negro de mercurio, *treinta granos*.
 Polvo antimonial, *dos granos*.

M. I. Afecciones escrofulosas. *D.* En dos tomas.

POLVOS ANTIREUMÁTICOS Ó POLVOS DE OLIVENCIA (F. P.).

Hojas de sen. . }
 Zarzaparrilla. . } *a. onza y media.*

Se reducen á polvo separadamente, se pasan por un tamiz para que quede un polvo fino y se añade:

Azúcar blanca; *una onza*.

Se mezclan y se reparte en catorce papeles. Se tomarán dos cada día del modo siguiente: se dará por la noche un papel de polvos en medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; por la mañana se toma en ayunas otro papel con otro medio cuartillo de cocimiento de zarzaparrilla; despues de dos horas, el enfermo tomará chocolate, al mediodia comerá su puchero compuesto de carnero, ternera, gallina ó perdiz, segun sus fuerzas alcancen, pero siempre debe ser de carnero ó vaca y garbanzos, con muy poco jamon ó tocino añejo; no debe comer postre alguno, ni pescado, ni vinagre, ni frutas; por la tarde tomará otro pa-

pel despues de haber pasado cinco ó seis horas despues de la comida, teniéndole ya prevenido en infusion desde por la mañana; pasadas dos horas podrá cenar ó bien sea una sopa con caldo de puchero ó un par de huevos pasados por agua ó una jícara de chocolate. El agua que ha de beber debe ser cocida con la zarzaparrilla y se prepara del modo siguiente: se toman

Zarzaparrilla, *cuatro onzas.*

Se parte en pedacitos y se pone á cocer en

Agua, *diez cuartillos,*

hasta que se reduzca á la mitad: este primer cocimiento es el que sirve para tomar los polvos; se vuelve á cocer la misma zarzaparrilla en otra tanta agua hasta quedar en la mitad y esta es la que sirve para beber á pasto; en tiempo de invierno es menester beberla algo tibia. Si pasados los siete dias no se hubiesen extinguido ó desvanecido los dolores, hinchazones &c., se tomarán otros siete dias con el mismo método y forma; concluida la curacion tomará por quince ó veinte dias la leche de burras ó de cabras. Si el sujeto que usa estos polvos no llega á diez y seis ó diez y ocho años de edad, tomará la mitad de los polvos de cada papel.

Si se quieren hacer mas purgantes estos polvos, se les puede añadir *dracma y media* de polvos de jalapa ó *media dracma* de pulpa de coloquintida.

I. Dolores reumáticos, hinchazones edematosas, &c.

POLVO ANTIREUMÁTICO (F. P.).

Zarzaparrilla, *dos onzas.*

Hojas de sen, *una onza.*

Polipodio. . . } *a. media onza.*

Hermodactiles. } *a. media onza.*

Azufre, *media onza.*

Se muelen separadamente, se pasan por un tamiz, se mezclan y se reparten en siete partes iguales.

I. Enfermedades venéreas y reumáticas.

D. Todas las mañanas se toma una parte mezclada con cuatro onzas de tisana de zarzaparrilla, que esté algo caliente, permaneciendo el enfermo en cama bien arropado; pasada media hora, beberá un vaso de la tisana también tibia y guardará el sudor en el caso en que sobrevenga; despues de haber sudado, podrá levantarse guardándose del viento y del frio. Tomará los polvos siete dias seguidos, á menos que se sienta débil, y en este caso podrá dejar de tomarlos uno ó dos dias; pero siempre deberá beber á pasto la tisana, que usará tibia en tiempo de invierno.

POLVO ANTISÉPTICO (*Swediaur*).

Polvo de raíz de arnica mon-
 tana. } *a. partes*
 — de quina. } *iguales.*
 — de alcanfor. }

Mezclense exactamente. *I.* Ulceras rebeldes ó afectadas de gangrena. *D. C. s.* para espolvorear los puntos enfermos.

POLVO ANTITÍSICO (*Bories*).

Acetato de plomo. } *a. seis granos.*
 Opio. }
 Azúcar, *un escrúpulo.*

M. y divídase en doce papeles. *I.* Sudores y diarreas colicativas de los tísicos. *D.* Uno mañana y tarde.

POLVO AROMÁTICO (*Dupuytren*).

Polvo de tomillo. }
 — de salvia. } *a. cuatro onzas.*
 — de romero. }
 Hidroclorato de }
 amoniaco. . . } *a. veinte granos.*
 Alcanfor. . . . }

M. I. Sirve para curar las heridas complicadas con gangrena de hospital.

POLVO ARSENICAL (*Justamond*).

Sulfuro de antimonio, *una onza*.

Oxido blanco de arsénico, *media drac.*

Se los mezcla y se los funde en un crisol; cuando se ha enfriado la masa, se la reduce á polvo y se añade:

Extracto de opio, *dos dracmas y media*.

I. Excrecencias y úlceras fungosas y rebeldes. *D. C. s.* para espolvorear muy ligeramente las partes enfermas. *Nota.* El uso de este polvo exige la mayor circunspeccion.

OTRO (*Pluncquet*).

Banunculus flamula, *una dracma*.

Manzanilla hedionda, *media onza*.

Oxido blanco de arsénico, *dos dracmas*.

Azufre sublimado, *una dracma*.

Se hace un polvo muy fino, del cual se mezcla una parte con un poco de clara de huevo.

I. Úlceras fungosas ó carcinomatosas. *D. C. s.* de mezcla aluminosa para cubrir ligeramente las partes enfermas. *Nota.* Despues de la aplicación de este polvo, cuyo uso exige mucha prudencia, se forma una escara que cae al cabo de cuarenta y ocho horas.

POLVO ARSENICAL (*Rousselot*).

Arsénico porfirizado, *una parte.*

Sangre drago, *ocho partes.*

Cinabrio pulverizado, *ocho partes.*

M. I. Úlceras cancerosas. *D.* Al tiempo de usarle se hace una pasta con saliva ó agua ligeramente gomosa.

POLVO ASTRINGENTE.

Raiz de bistorta.	} <i>a. cuarenta</i>	
— de tormentila.		} <i>y ocho part.</i>
Flores de granado.	} <i>a. veinte y</i>	
Semillas de berberis.		} <i>cuatro partes.</i>
Catecú.		
Almáciga en lágrimas.		
Sangre drago.		
Sucino.		
Bol arménico preparado.	} <i>a. diez y</i>	
Tierra lemnia preparada.		} <i>ocho partes.</i>
Coral rojo.		
Extracto de opio, <i>una parte.</i>		

M. I. y D. Se usa este polvo como astringente á la dosis de doce granos á una dracma.

POLVO ASTRINGENTE.

Alumbre en polvo, *una dracma.*

Opio en id., *diez y seis granos.*

Azúcar en id., *ciento ocho granos.*

M. y divídase en papeles de diez á quince granos. *I.* Diarreas rebeldes. *D.* Un papel cada tres á cuatro horas.

OTRO.

Alumbre, *media dracma.*

Opio, *tres granos.*

M. y divídase en seis papeles.

I. Diarreas rebeldes. *D.* Uno, cada dos ó tres horas.

OTRO (*Gaubius*).

Oxido rojo de hierro, *media dracma.*

Sangre drago, *una dracma.*

Sarcocola, *dos dracmas.*

Bol arménico, *una onza.*

M. Sirve para espolvorear las superficies sangrientas despues de haberlas lavado; se las cubre con hilas empapadas en alcohol caliente.

POLVO ATEMPERANTE (*Stahl*).

Nitrato de potasa.	} <i>a. nueve part.</i>
Sulfato de potasa.	
Sulfuro de mercurio, <i>dos partes.</i>	

D. De un escrúpulo á media dracma.

POLVOS BENEDICTOS DE LOPCHES (*ad cancrum*).Raiz de estragon pulverizada, *tres onzas.*Arsénico levigado con espíritu de vino, *una onza.*Hollin, *tres dracmas.*

Se mezclan exactamente, levigándolos sobre un pórfido, y se guardan en un sitio seco.

No se debe usar estos polvos hasta pasado un año. Se emplean esterioresmente.

POLVOS BEZOARDICOS DE CURBO ó *polvos antisepticos de quina (F. E.).*

Raiz de contrayerba.	} <i>a. dos dracmas.</i>
— de carlina	
— de tormentila.	
— de dictamo blanco.	
Flores de amapola	} <i>a. una dracma.</i>
Hojas de cardo santo.	
— de escordio.	
Margaritas levigadas.	} <i>a. una dracma.</i>
Cuerno de ciervo id.	
Ojos de cangrejos id.	
Antimonio diaforético.	
Piedra cananor.	} <i>a. una dracma.</i>
Bezoar oriental.	
Piedra cordial de Goa.	} <i>a. una dracma.</i>
Quina peruviana escogida, <i>dos onzas.</i>	

Se reducen á polvos muy sutiles.

I. Se usan como antipútridos y entran en la composición de los cocimientos bezoárdicos de Curbo.

D. De dos escrúpulos á una dracma.

POLVOS DE BRESLER.

Polvo de raíz de artemisa , *media onza.*

Azúcar en polvo , *una onza.*

M. I. Epilepsia y baile de S. Vito. *D.* Una cucharada de café cuatro veces al dia.

POLVO CALMANTE (*Cottereau*).

Extracto hidro-alcohólico de pulsatila , *doce granos.*

Polvo de digital purpúrea , *seis granos.*

Acetato de morfina , *un grano.*

Azúcar blanca , *una dracma.*

H. S. A. un polvo muy homogéneo , que se deberá dividir en treinta y seis partes iguales.

I. Tos é insomnio de los tísicos. *D.* Cuatro tomas cada dia , con cerca de cuatro horas de intervalo de unas á otras. *Nota.* El modo mas conveniente de administrarlos es diluir cada toma en una cucharada de agua azucarada ó de jarabe , ya de goma ó ya de puntas de espárragos.

POLVOS DE CAL MELANOS (*Swedjaur*).

Mercurio dulce, *seis granos*.

Almidon, *doce granos*.

Azúcar blanca, *media dracma*.

M. I. Laxante. *D.* De una vez.

POLVO CAQUECTICO (*Hartmann*).

Azafran de marte aperitivo, *una parte*.

Canela en polvo, *dos partes*.

Azúcar, *cinco partes*.

H. S. A. Este polvo se emplea como tónico.

POLVO DE CARBON.

Carbon vegetal, *seis onzas y dos dracmas*.

Magnesia, *dos dracmas y media*.

Se porfirizan, se mezclan con cuidado y se añade:

Esencia de yerbabuena, *diez y ocho granos*.

Se usa como dentífrico.

POLVO DE CARBONATO DE CAL COMPUESTO

(*F. ED.*).

Carbonato de cal preparado y pulverizado, *dos onzas*.

Canela en polvo, *onza y media*.

Nuez moscada en polvo, *dos dracmas*.

M. I. Diarreas y disenterias crónicas. *D.* De media á una dracma.

POLVO DE CARBONATO DE MAGNESIA.

Carbonato de magnesia, *dos escrúpulos.*

Polvo de ruibarbo, *diez granos.*

— de canela, *doce granos.*

M. Se toma en dos veces en los casos de cardialgias y agrios.

POLVO DE CARBONATO DE MAGNESIA CON LA SOSA (*Nicolai*).

Regaliz en polvo, *un escrúpulo.*

Carbonato de magnesia, *doce granos.*

Carbonato de sosa. } *a. cinco granos.*

Polvo de gengibre. }

M. Se toma de una vez en los casos de cardialgia.

POLVOS CATARTICOS (*H. M.*).

Cremer de tártaro. } *a. una onza.*

Azúcar blanca. . . }

Mezclese y divídase en cuatro papeles iguales. *D.* Uno cada tres horas.

POLVOS CATÓLICOS PURGANTES ó *polvos católicos de escamonea* (F. E.).

Polvos de escamonea escogida, *media onza.*

Raiz de Mechoacan. } *a. seis dracmas.*
 — de jalapa. . . }

Tartrato de potasa, *tres dracmas.*

Háganse polvos *S. A.*

Son purgantes y convienen principalmente en las obstrucciones de las vísceras. *D.* De uno á dos escrúpulos.

POLVO CÁUSTICO (*Kruger*).

Dento-cloruro de mercurio. } *a. diez gran.*
 Sulfato de cobre. . . }

Nitrato de plata, *seis granos.*

H. S. A. I. Excrecencias sifilíticas. *D.* Se humedece este polvo con un pincel y se aplica un poco sobre las partes enfermas. *Nota.* El uso de este polvo exige mucha circunspeccion.

OTRO (*Plenck*).

Oxido rojo de mercurio. } *a. una dracma.*
 Alumbre calcinado. . . }

Sabina, *media onza.*

M. I. Se usa para reprimir las carnes fungosas de las úlceras venéreas.

Es muy análoga la preparacion de los *polvos cáusticos* de los hospitales de Madrid, en

los cuales entran *dos dracmas* de polvo de sabina, *dracma y media* de sulfato de alúmina y *una dracma* de óxido de mercurio nitrado rojo.

POLVO CEFÁLICO DE TABACO.

Tabaco rapé, *media onza.*

Polvo de mejorana.	} <i>a. med. drac.</i>
— de lirio de los valles.	
— de maro.	
— de castaño de Indias, <i>una drac.</i>	

M. I. Cefalalgia. *D.* Se toma muchas veces al dia como el tabaco.

POLVO DE CENTENO CORNEZUELO.

Se seca en la estufa el centeno cornezuelo y se le pulveriza sin dejar residuo. Este polvo se debe preparar en corta cantidad á la vez, y guardarle en un frasco bien tapado porque se altera pronto. Se procurará que el centeno cornezuelo no tenga mas de un año.

Es la preparacion mas activa del centeno cornezuelo y se usa á la dosis de doce granos á una dracma. *I.* Partos laboriosos, &c.

POLVO DE CETRARINO (*Muller*).

Cetrarino.	} <i>a. diez y seis granos.</i>
Goma arábiga.	
Azúcar, <i>noventa y seis granos.</i>	

Mezclese y divídase en ocho papeles. Se toma uno cada dos horas en la apirexia de las fiebres intermitentes.

POLVO DE CLORURO DE ORO.

Cloruro de oro, *un grano.*

Almidon en polvo, *cinco escrúpulos.*

M. exactamente y divídase en quince papeles. *I.* Enfermedades venéreas rebeldes al mercurio, escrófulas y herpes. *D.* Un papel en fricciones.

POLVO DE CLORURO DE ORO Y SÓDIO.

Cloruro de oro y sódio, *un grano.*

Lirio de Florencia en polvo, *dos granos.*

M. íntimamente y divídase en quince papeles iguales.

I. y D. Las mismas que el anterior.

POLVO DEL CONDE DE PALMA.

Con este nombre se ha aconsejado, lo mismo que con el de polvo de Sentinelli, polvo de Valentini, polvo de Swinger ó panacea Inglesa, el uso del carbonato de magnesia.

POLVO DEL CONDE DE WARWICK.

Diagridio sulfurado , *dos onzas.*

Antimonio diaforético , *onza y media.*

Sobre-tartrato de potasa , *media onza.*

H. S. A. I. y D. Se usa como purgante á la dosis de doce á veinte y cuatro granos.

POLVO CONTRA LA AMENORREA (*Fouquier*).

Carbonato de hierro , *treinta y seis granos.*

Extracto seco de quina , *un escrúpulo.*

Polvo de canela , *medio escrúpulo.*

M. Se toma primero en tres veces , despues en dos ó en una al dia antes de las comidas.

POLVO CONTRA EL COQUELUCHE.

Kermes , *dos granos.*

Ipecacuana en polvo , *seis granos.*

Raiz de belladona en polvo , *un grano.*

M. y divídase en seis papeles. Se toma una cada cuatro horas.

OTRO (*Kahleiss*).

Raiz de belladona en polvo , *cuatro granos.*

Polvos de Dower , *diez granos.*

Azufre sublimado , lavado y portirizado , *dos escrúpulos.*

Azúcar blanca , *cuatro dracmas.*

H. S. A. un polvo que se divide en veinte papeles iguales. *D.* Un [papel, cada tres horas, para un niño de dos años. *Nota.* Entre las tomas se administra la pocion siguiente á la dosis de una cucharada de café:

Agua destilada de manzanilla, *una onza.*

Jarabe simple, *dos dracmas.*

Acido prúsico de Vauquelin, *doce gotas.*

POLVO CONTRA EL COQUELUCHE Y EL CATARRO NERVIOSO.

Azúcar, *una dracma.*

Regaliz, *un escrúpulo.*

Raiz de belladona, *tres granos.*

H. S. A. un polvo, que se divide en doce tomas iguales. *D.* Una toma al dia.

POLVO CONTRAESTIMULANTE.

Calomelanos, *diez y ocho granos.*

Nitrato de potasa, *noventa granos.*

Divídase en nueve papeles. Se da uno cada dos horas en el hidrocefalo agudo y en otras muchas enfermedades esténicas. Algunos pretenden que el nitro se opone á la salivacion.

POLVO CONTRA EL CRUP (*Weber*).

Calomelanos, *un grano.*

Magnesia calcinada, *seis granos.*

Azúcar, *doce granos.*

M. Se toma en dos veces con media hora de intervalo. Algunas veces se necesitan quince á diez y seis dosis.

POLVO CONTRA EL ENGROSAMIENTO DE LA
CÓRNEA (*Græffe*).

Precipitado rojo }
Agárico blanco. } *a. media dracma.*
Azúcar blanca, *una onza.*

Mezclese sobre un pórfido. Se administra este polvo por insuflacion.

POLVO CONTRA EL ERETISMO DE LOS NERVIOS
DEL ESTÓMAGO (*Wendt*).

Magisterio de bismuto, *diez y ocho gran.*
Magnesia blanca, *media dracma.*
Oleósacaro de anís, *una dracma.*

H. S. A. un polvo, que se divide en nueve tomas iguales. *D.* Cuatro tomas al dia.

Nota. Si la enfermedad es pertinaz y el enfermo ha hecho uso largo tiempo de este polvo, se le puede añadir por cada toma un quinto de grano de polvo de ipecacuana.

POLVO CONTRA EL IMPÉTIGO (*Bielt*).

Azufre sublimado ó precipitado, *una onza.*
Sub-carbonato de potasa, *media onza.*

M. I. Impétigo crónico. *D.* Cincuenta á se-

senta granos, todas las mañanas en ayunas, en una taza de tisana de dulcamara.

POLVO CONTRA LA RAQUITIS (*Temple*).

Oxido negro de hierro. }
 Ruibarbo. } *a. diez y ocho gr.*
 Azúcar, una dracma.

M. y divídase en seis papeles. *D.* Uno, mañana y tarde.

POLVO CONTRA LA RISA CONVULSIVA (*Usteinan*).

Oxido de zinc, *doce granos.*
 Oleosácaro de cajeput, *dos dracmas.*

H. A. S. un polvo que se divide en doce tomas iguales. *D.* Una toma de hora en hora.

POLVO CONTRA LOS CALAMERES DE ESTÓMAGO
 (*Wendt*).

Magisterio de bismuto, *doce granos.*
 Extracto de lechuga virosa, *un escrúpulo.*
 Polvo de ipecacuana, *tres granos.*
 Oleosácaro de yerbabuena de sabor de pimienta ó de manzanilla, *dos escrúpulos y medio.*

H. S. A. un polvo, que se dividirá en seis tomas iguales. *D.* Tres ó cuatro tomas al día.

POLVO CORDIAL.

Canela, diez y seis partes.

Clavo, dos partes.

Vainilla, una parte.

Azúcar, noventa y seis partes.

Harina de arroz, setenta y dos partes.

II. S. A. I. y D. Es un excelente estomacal y se administra á la dosis de diez á treinta granos.

POLVOS CORNACHINOS, de Tribus ó pólvos anti-
moniales de escamonea (F. E.).

Escamonea de Alepo. . .	} a. partes iguales.
Cremor de tártaro. . .	
Antimonio diaforético.	

Se reducen á un polvo muy sutil.

Nota. Cuando se prepara este polvo con el antimonio diaforético, para cuya elaboracion se ha economizado el nitro, y que retiene protóxido de antimonio, sucede con el tiempo que los polvos cornachinos se vuelven eméticos, porque se forma tártaro emético.

I. Se usan como purgantes en las intermitentes, &c. *D.* De media hasta una dracma.

POLVO CORROBORANTE (*Werlhoff*).

Polvo de quina, media dracma.

— de canela, seis granos.

M. exactamente.

I. Convalecencia de las fiebres intermitentes. *D.* Se toma de una sola vez.

POLVOS DE CRETA COMPUESTOS (F. L.).

Creta preparada, *ocho onzas.*

Canela. } *a. cuatro onzas.*

Pimienta larga. }

Raiz de tormentila. } *a. tres onzas.*

Goma de acacia. }

Se pulveriza separadamente cada sustancia y se las mezcla despues exactamente.

I. Embarazo mucoso del estómago y diarrea con atonía. *D.* De seis á doce granos, tres veces al dia.

POLVO DE CRETA CON RUIBARBO (Nicolai).

Polvo de creta compuesto, *un escrúpulo.*

— de ruibarbo, *quinze granos.*

M. Se usa de una vez por la tarde en el tratamiento de la pirosis y de la cardialgia.

POLVO DENTÍFRICO.

Huesos de jibia porfirizados, *ocho partes.*

Polvo de lirio de Florencia, *ocho partes.*

Cremor de tártaro porfirizado, *seis partes.*

Clavo pulverizado, *dos partes.*

Laca carminada, *ocho partes.*

Se los mezcla sobre un pórfido.

POLVO DENTÍFRICO ANTIESCORBÚTICO.

Extracto de ratania, *media onza.*

Carbon vegetal, *dos onzas.*

Canela. . . } *a. dos dracmas.*
Clavo. . . }

Se reducen todas las sustancias á un polvo impalpable y se mezclan.

POLVO DENTÍFRICO DESCOLORANTE (*Magendie*).

Cloruro de cal seco, *cuatro granos.*

Coral rojo, *dos dracmas.*

M. I. y D. Se humedece ligeramente un cepillo nuevo, se le empapa en el polvo dentífrico y se frotan con él los dientes. Se usa para volver su blancura natural á los dientes amarillos.

POLVO DENTÍFRICO (*Bally*).

Polvo de quina. . . }
Magnesia calcinada. . } *a. media onza.*
Coral rojo preparado. }
Canela, *dos escrúpulos.*

Se reducen *S. A.* á un polvo muy fino.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y blanquear los dientes.

POLVO DENTÍFRICO (*Charl....*).

Tartrato acidulo de potasa, *cinco onzas.*

Alumbre calcinado, *dos dracmas y media.*

Cochinilla, *dos dracmas.*

H. S. A. un polvo fino, que se aromatiza-
rá con un aroma cualquiera.

I. La misma que la anterior.

OTRO (*Chevalhier*).

Carbon pulverizado. } *a. partes iguales.*
Quina en polvo. . . }

Mezclese. *Nota.* Se puede añadir á este pol-
vo azúcar y un aroma.

I. Se emplea en fricciones para limpiar y
blanquear los dientes y para desinfectar las encías
saniosas.

POLVO DENTÍFRICO DE SANGRE DRAGO
ó *dentrífico seco* (F. E.).

Tartrito acidulo de potasa pu-
rificado. } *a. media*
Sangre drago. } *onza.*
Cuerno de ciervo calcinado. . }

Raiz de lirio de Florencia, *dos dracmas.*

Se pulverizan sutilísimamente y se añade:

Polvos de clavo, *una dracma.*

— de cochinilla, *medio escrúpulo.*

I. La misma que los anteriores.

POLVO DENTÍFRICO DE SULFATO DE QUININA
(*Pelletier*).

Coral preparado, *una onza*:

Laca carminada, *ocho granos*.

Sulfato de quinina, *cuatro granos*.

Esencia de yerbabuena ú otra, *c. s.*

H. S. A. D. C. s. para limpiar los dientes
con un cepillo mojado.

POLVO DIAFORÉTICO₄

Nitro, *una dracma*.

Tártaro emético, *un grano*.

Calomelanos, *seis granos*.

M. y divídase en seis papeles. *D.* Uno, cada
dos horas, en jarabe.

POLVO DIAROMATON INGLÉS.

Canela, *dos onzas*.

Semillas de cardamomo.)

Raiz de gengibre. } *a. una dracma.*

Nuez moscada. }

H. S. A. I. Dispepsia sin calor, flatuosidades,
eructos y astenia. *D.* De cinco á veinte
granos.

POLVO DIGESTIVO SIMPLE (*Duc*).

Canela en polvo, *una onza*.

Azúcar, *diez y seis onzas*.

M. Se dan dos á tres dracmas al tiempo de ir á comer.

POLVO DIGESTIVO COMPUESTO.

Sulfato de potasa, *cuatro dracmas*.

Ruibarbo, *una dracma*.

M. y divídase en diez papeles. *D.* Uno ó dos al dia.

POLVO DIURÉTICO.

Digital, *quinze granos*.

Nitrato de potasa, *tres dracmas*.

Cremor de tártaro, *cuatro dracmas*.

M. y divídase en seis papeles. *D.* Uno cada dos horas.

POLVO DIURÉTICO ATEMPERANTE.

Cremor de tártaro.	}	<i>a. dos dracmas.</i>
Nitro.		
Azúcar de leche.	}	<i>a. dos onzas.</i>
Goma.		
Azúcar.		

Se divide en ocho papeles. Se disuelve cada papel en dos cuartillos de agua.

POLVO DIURÉTICO ó *tisana seca.*

Nitrato de potasa en polvo.	} <i>a. una onza.</i>
Malvabisco en polvo. . . .	
Goma arábica.	} <i>a. dos onzas.</i>
Azúcar.	

D. Una cucharada de café en un vaso de agua.

I. Se usa principalmente en el tratamiento de las gonorreas.

POLVO DEL DOCTOR MARC *contra el coqueluche.*

Azúcar, *una dracma.*

Polvo de regaliz, *un escrúpulo.*

Raiz de belladona en polvo, *tres granos.*

H. S. A. y dividase en doce papeles. *D.* Un papel cada seis horas.

POLVO DEL DOCTOR ODIER.

Magnesia calcinada.	} <i>a. diez dracmas.</i>
Azúcar.	

Oxido de bismuto, *una dracma.*

M. S. A. y háganse papeles de á veinte granos. *I.* Gastrodinia y dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

POLVOS DE DOWER ó *polvos de ipecacuana con opio* (F. E.).

Sulfato de potasa, *una onza.*

Nitrato de potasa, *onza y media.*

Raiz de ipecacuana. } *a. dos dracmas.*
 Opio purificado. . . }

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan todos en un mortero de piedra.

La composicion de los *polvos de Dover* de los hospitales de Madrid solo se diferencia de la de los anteriores en que entra el extracto gomoso de opio en lugar del opio puro.

A. Afectos asmáticos; son expectorantes, diaforéticos y algo calmantes. *B.* De medio á un escrúpulo. *Nota.* Cada escrúpulo de estos polvos contiene dos granos de opio.

Los polvos de Dover de la Farmacopea Francesa se componen del modo siguiente:

Sulfato de potasa, *cuatro partes.*

Nitrato de potasa, *cuatro partes.*

Extracto de opio seco y pulverizado, *una parte.*

Ipecacuana, *una parte.*

Regaliz, *una parte.*

Los *polvos de Dover* de los hospitales militares se diferencian de los anteriores en la cantidad de los componentes, pues entran dos partes de sulfato de potasa, otras dos de nitrato de

potasa, una de opio pulverizado, otra de ipecacuana pulverizada y dos de polvos de regaliz.
D. De diez á veinte granos en una tisana diaforética tibia.

POLVO DE DUPUYTREN *contra los herpes sagedénicos ó corrosivos.*

Convencido Dupuytren de la ineficacia de los remedios antiherpéticos, antiescrofulosos, antivenéreos y demás empleados contra esta cruel enfermedad, ha propuesto los polvos siguientes:

Calomelanos impalpables, *ciento noventa y nueve partes.*

Acido arsenioso, *una parte.*

Este remedio, que obra mas bien como específico que como cáustico, se puede emplear de diferentes modos.

Si la superficie del herpes está ulcerada, húmeda y limpia, se la espolvorea por medio de una borlita cargada del polvo indicado, de modo que se le cubra con una capa del grosor de media á una línea.

Si la superficie está cubierta de costras, se las hace caer por medio de cataplasmas y se espolvorea despues la superficie como acabamos de decir. Por último si el herpes está cubierto de una cicatriz imperfecta, es necesario destruirla y se espolvorea veinte y cuatro horas despues

la superficie, que para entonces ya ha dejado de dar sangre.

Si se teme que el polvo no se adhiera bastante á las partes y que pueda caerse, se le diluye en agua de goma ó se le incorpora con unguento rosado. En este caso se debe aumentar una ó dos décimas partes la dosis del ácido arsenioso.

En todos estos casos se debe aguardar á que el polvo ó la pomada se caigan por sí mismos, lo que sucede comunmente á los ocho ó diez dias; y se renuevan las aplicaciones hasta la completa curacion, la cual se verifica mas comunmente al cabo de ocho á diez semanas ó despues de cinco ó seis aplicaciones. Se concibe bien que un práctico instruido puede aumentar ó disminuir las proporciones de los elementos constituyentes del remedio, segun la estension y la profundidad del mal; pero parece importante no escluir á ninguno de los que entran en su composicion. Los dos parecen necesarios á su accion, sin que se pueda determinar de un modo preciso la parte que cada uno toma en ella.

POLVO CEFRACTICO (*Selle*).

Magnesia calcinada.	} <i>a. media</i> <i>onza.</i>
Sobre-tartrato de potasa.	
Flores de azufre.	
Ruibarbo en polvo.	
Flores de manzanilla en polvo.	
Oleosácaro de hinojo.	

H. S. A. I. Obstrucciones y debilidad de las vísceras del bajo vientre, sobre todo cuando hay plétora abdominal. *D.* Una cucharada de café, muchas veces al día.

POLVO PARA EMBALSAMAR.

Se compone de nuez de agalla en polvo y corteza de roble, *a. veinte y seis libras y ocho onzas*; polvos de sal marina decrepitada, *veinte libras*; polvos de nitro, romero, espliego, sabia, tomillo, yerbabuena de sabor de pimienta, acíbar sucotrina, benjui, mierra, gengibre, clavo, nuez moscada y pimienta negra, *a. seis libras y ocho onzas*.

Se mezclan perfectamente estos polvos y se conserva la mezcla para el uso.

Se emplea para barnizar las vendas que sirven para cubrir el cuerpo la preparación siguiente: bálsamo del Perú negro, bálsamo de copaiba y estoraque líquido, *a. cuatro libras*; aceite de nuez moscada, *diez y seis onzas*; aceite volátil de espliego, *cuatro onzas*; y aceite volátil de tomillo, *una onza*.

Se liquidan en el baño maría, se cuele por un lienzo y se guarda para el uso.

POLVO EMENAGOGO.

Polvo de sabina. . }
 — de gengibre. } *a. una dracma.*

Azúcar con vainilla, *una onza.*

M. y divídase en doce papeles. Se tomará uno ó dos al día.

OTRO.

Limaduras de hierro, *diez y ocho granos.*

Acibar sucotriño, *seis granos.*

Magnesia calcinada, *dracma y media.*

M. y divídase en tres papeles.

I. Amenorrea atónica. *D.* Uno, cada cuatro horas.

POLVOS EMÉTICOS (H. M.).

Ipecacuana en polvo, *una dracma.*

Azúcar, *dos dracmas.*

M. y divídase en cuatro papeles iguales. *D.* Un papel cada media hora hasta conseguir el efecto. *I.* Embarazo gástrico.

POLVO DE ESCAMONEA COMPUESTO (*Forminng*).

Resina de escamonea. }
 — de jalapa. . . } *a. una onza.*

Raiz de gengibre, *dos dracmas.*

M. Se dan de seis á diez granos en un vehí-
culo conveniente. *I.* Es purgante drástico.

POLVO DE ESCILA COMPUESTO (*Stahl*).

Escamas de escila recientes, *seis onzas.*

Raiz de asclepias venetósigo, *una onza.*

Se machaca la escila en un mortero de már-
mol, y cuando está reducida á polvo se le aña-
de el polvo de venetósigo. Se deja secar todo en
la estufa, se pulveriza de nuevo y se pasa por
un tamiz.

Se usan en la hidropesía, asma húmedo y
catarro crónico sin irritacion, á la dosis de tres
á cinco granos.

POLVO DE ESCILA COMPUESTO Ó POLVO INCISIVO.

Polvos de escila, *una dracma.*

— de azúcar, *tres dracmas.*

Azufre sublimado y lavado, *dos dracmas.*

M. Se dan de seis á diez y ocho granos con-
tra los romadizos y catarros.

POLVO DE ESCILA NITRADA (*Vanhelmont*).

Nitrato de potasa, *siete dr. y un escrúpulo.*

Raiz de asclepias venetósigo, *media drac.*

Escamas de escila seca, *una dracma.*

Se hace un polvo muy homogéneo y muy
fino. *Nota.* Es necesario tener cuidado de secar

el nitrato de potasa para quitarle una parte de su agua de cristalización.

I. Ascitis. *D.* Doce granos, dos veces al día.

POLVO ESPECTORANTE (*Babeyrac*).

Flores de benjuí, *seis granos*.

Flores de azufre lavadas, *diez granos*.

Cascarilla, *doce granos*.

Azúcar piedra, *veinte granos*.

M. para una dosis.

I. Sirve para facilitar la expectoración en el asma húmedo.

OTRO (*Recamier*).

Cebolla albarrana, *doce granos*.

Ipecacuana, *un escrúpulo*.

M. y divídase en seis papeles.

I. Catarros pulmonales crónicos, al fin de la neumonía, &c. *D.* Uno, cada tres horas.

POLVOS DE ESPONJA COMPUESTOS.

Polvo de esponja ligeramente tostada y de color rojo, *dos onzas y media*.

Carbon en polvo, *media onza*.

Hidroclorato de amoniaco, *una dracma*.

M. A los enfermos de más de diez años se les dan dos escrúpulos en tres tomas, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Se

introduce la dosis en el fondo de la boca en una cuchara de café y se la traga toda en seco. Se usa contra el bocio.

POLVO ESTIBIO OPIADO.

Extracto de opio en polvo. } *a. dos granos.*
 Emético. }
 Azúcar de leche, *una onza.*
 Azúcar, *dos onzas.*

Divídase en doce papeles. Se da uno por la mañana y otro por la tarde, disuelto en un vaso de agua, en las bronquitis crónicas y en la tisis en primer grado.

POLVO ESTIMULANTE.

Gengibre, *dos dracmas.*
 Canela, *media onza.*
 Anís, *una onza.*
 Quina en polvo, *diez y ocho granos.*

M. y divídase en papeles de á doce granos. Se dan de uno á dos papeles al día en la dispepsia.

POLVO ESTIMULANTE Y NUTRITIVO.

Polvo de osmazomo. . . } *a. una onza.*
 — de gelatina. . . }
 — de goma, *dos dracmas.*
 — de clavo. . . . }
 — de pimienta . . . } *a. doce granos.*
 — de semillas de apio. }
 — de zanahoria. . . }

M. D. Tres onzas de este polvo y un poco de sal, diluidas en dos cuartillos de agua hirviendo, dan un líquido muy sano y muy agradable. Se deberá colar por un lienzo antes de tomarle.

POLVO ESTÍPTICO.

Goma kino, *media dracma.*

Goma arábiga, *una onza.*

M. I. Hemorragias traumáticas y las que resultan de las picaduras de las sanguijuelas.

POLVO ESTÍPTICO DE COLBATCH ó *específico astringente de Maetzius.*

Disolución saturada de deuto-cloruro de hierro, *cuatro onzas.*

Se hace evaporar hasta la mitad y se añade un peso igual de acetato de plomo seco; se continúa la evaporación á fuego lento hasta la sequedad, se pulveriza y se pasa por un tamiz.

Nota. Es necesario libertar este polvo del contacto del aire, porque atrae la humedad.

I. y D. Se emplea exterior é interiormente para toda clase de hemorragias. Se da interiormente á la dosis de cuatro á doce granos.

POLVO ESTOMACAL.

Quina. . . }
 Ruibarbo. . . } *a. una dracma.*

M. y divídase en doce papeles. *D.* Un papel en una cucharada de sopa al tiempo de comer.

OTRO.

Genciana, *cuarenta granos.*

Canela. . . . }
 Ruibarbo. . . . } *a. una dracma.*

M. y divídase en cuatro papeles. *D.* Una toma al tiempo de comer en una cucharada de sopa ó en un poco de vino.

OTRO.

Colombo, *diez granos.*

Magnesia calcinada, *dos escrúpulos.*

M. y divídase en dos papeles.

I. Dispepsia. *D.* Un papel cada tres horas.

OTRO (*Birkmann*).

Raiz de yaro, *dos onzas.*

— de cálamo aromático. }
 — de sasifraga. . . . } *a. una onza.*

Piedras de cangrejos, *media onza.*

Canela fina, *tres dracmas.*

Sulfato de potasa, *dos dracmas.*

Hidroclorato de amoniaco, *dos escrúpulos.*

H. S. A. Se usa en la debilidad de estómago con embarazo mucoso. *D.* De dos á cuatro dracmas.

POLVO ESTORNUTATORIO.

Hojas de ásaro. . . } *a. dos dracmas.*
 — de mejorana. }
 Flores de espliego. } *a. una dracma.*
 Lirio de Florencia. }
 Aceite de clavo, *siete gotas.*

H. S. A. D. Una pequeña toma, ya pura ó ya mezclada con cualquier otro polvo de propiedades análogas, pero menos activas, como por ejemplo, el tabaco.

POLVO ESTORNUTATORIO ó de ásaro compuesto.

Hojas de mejorana. . . }
 — de betónica. . . } *a. partes iguales.*
 — de azarabácara. . . }
 Flores de lirio de los valles. }

H. S. A. I. y D. Las mismas que el anterior.

POLVO DE ESTRICNINA (*Magendie*).

Estricnina, *un grano.*
 Oxido negro de hierro, *una dracma.*
 Azúcar, *tres dracmas.*

M. y divídase en seis papeles. *D.* Uno, mañana y tarde.

POLVO FEBRÍFUGO (*Boullemer*).

Ojos de cangrejos, *una dracma*.

Hidroclorato de amoniaco, *media dracma*.

Mirra, *un escrúpulo*.

Se pulverizan y se dividen en tres partes iguales. *D.* El enfermo tomará la dosis en tres dias; la primera dos horas antes del paroxismo, la segunda al otro dia á la misma hora y la tercera al dia siguiente.

POLVOS FEBRÍFUGOS COMPUESTOS (H. M.).

Corteza peruviana, *una onza*.

Genciana, *dos dracmas*.

Alcañor, *doce granos*.

Se reducen á polvo, que se divide en ocho papeles iguales. *D.* Uno cada dos horas durante la apirexia.

POLVO FEBRÍFUGO (*Chleghorn*).

Quina gris, *media onza*.

Sulfato de magnesia, *seis dracmas*.

M. y divídase en cuatro papeles. *D.* Una toma de dos en dos horas, durante la apirexia.

OTRO (*Jadelot*).

Quina, *una onza*.

Cáscaras de naranjas amargas } *a. dos dr.*

Raiz de genciana. }

Sal amoniaco. } *a. una dr.*
 Ruibarbo. }

M. I. Fiebres intermitentes rebeldes. *D.* Una dracma cuatro veces al dia, diluida en un poco de agua, pasado el acceso.

POLVO FEBRÍFUGO (*Hartmann*).

Polvo de quina, *dos dracmas.*
 — de cascarilla, *doce granos.*

M. Se da de una vez en las fiebres remitentes é intermitentes.

OTRO (*Juncker*).

Oxido de antimonio hidro-
 sulfurado anaranjado. . . } *a. media dr.*
 Magnesia. }
 Sulfato de potasa. . . . }

H. S. A. y divídase en cuatro partes iguales. *D.* Se dan estas cuatro dosis á iguales distancias, durante la apirexia.

OTRO (*Roucher*).

Quina roja, *seis dracmas.*
 Magnesia calcinada, *cuatro dracmas.*
 Flores de manzanilla en polvo, *dos dracmas.*

M. y divídase en cuatro papeles iguales. *I. y D.* Se administra uno, cada cuatro horas, durante la intermitencia de las fiebres de acceso que resisten á las demás mezclas febrífugas.

Se diluye en una taza de infusion de achicorias amargas.

POLVO FEBRÍFUGO DE LOS POBRES.

Raiz de cariofilca. } *a. tres dracmas.*
Goma arábica. . }

Hydroclorato de amoniaco, *dos dracmas.*

M. y divídase en veinte y cuatro papeles iguales. *D.* De uno á dos y aun mas, en diferentes veces, durante la apirexia.

POLVO FEBRÍFUGO Y PURGANTE (*Helvetius*).

Se compone de jalapa, *dos onzas*; sobre-tartrato de potasa, *una onza y seis dracmas*; sulfato de potasa y zumo de ajo, *a. una onza*; quina, *seis dracmas*; diagridio, *media onza*; tartrato de potasa y sosa, *tres dracmas*; emético, *dos dracmas*; nitrato de potasa, *una dracma*; azafran y gutagamba, *a. doce granos*, y sulfuro rojo de mercurio, *seis granos*.

H. S. A. I. Se usa como vermífugo ó en las fiebres intermitentes. *D.* De diez y ocho granos á media dracma.

POLVOS FEBRÍFUGOS SIMPLES (U. M.).

Corteza peruviana en polvo. } *a. media onza.*
Quina calisaya en polvo. . }

M. y divídase en ocho papeles. *D.* Uno cada dos horas durante la apirexia.

POLVO FERRUGINOSO.

Sulfato de hierro cristalizado, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *tres dracmas.*

Mezclense y dividause en doce papeles, que se los marcará con el número 1.

Por separado se toma:

Bicarbonato de sosa, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *tres dracmas.*

Mezclense y dividanse en doce papeles, á los que se pondrá el número 2.

Se disuelve un papel de cada número en un poco de agua, se reúnen los líquidos y se los bebe inmediatamente al tiempo de la efervescencia. Esta agua ferruginosa artificial contiene carbonato de protóxido de hierro, sulfato y un poco de carbonato de sosa.

POLVO PARA AGUA GASEOSO-FERRUGINOSA

(*Quesneville*).

Azúcar, *cuatro dracmas.*

Citrato ácido de sosa, *una dracma.*

Bicarbonato de sosa. . . } *a. diez y ocho*

Citrato de hierro y sosa. } *granos.*

Este polvo contiene segun el análisis de Breton en cada cien partes:

Bicarbonato de sosa.	20,00
Acido tartárico.	22,60
Sulfato de hierro	00,95
Azúcar.	56,45

Media onza de este polvo da una bebida azucarada, acídula, de sabor ferruginoso y de fácil digestion, en razon del exceso de ácido carbónico que contiene.

POLVO DE FORDYCE.

Tartrato de potasa y sosa, *diez granos.*

Ruibarbo, *siete granos.*

M. y divídase en dos papeles. *I. y D.* Todas las mañanas á los niños atacados de carreau.

POLVO DE FONTANEILLES.

Arsénico blanco porfirizado, *dos granos.*

Mercurio dulce, *diez y seis granos.*

Opio en bruto, *dos granos.*

Goma arábica, *una dracma.*

Azúcar, *una dracma.*

M. y divídase en veinte y cuatro papeles. *I.* Se recomienda contra las fiebres intermitentes rebeldes. *D.* Uno al dia.

POLVO FUMIGATORIO FÉTIDO.

Cuerno de ciervo raspado, *una onza.*

Asa fétida, *dos dracmas.*

M. Se echa sobre las ascuas y se hace respirar los vapores á las mujeres histéricas.

POLVO FUMIGATORIO MERCURIAL.

Mercurio dulce, *una dracma.*

Azúcar en polvo. }
Benjuí en polvo. } *a. media onza.*

M. Se usan de una á cuatro dracmas para cada fumigacion, que se dirige á las úlceras rebeldes de la garganta.

POLVO FUNDENTE (*Cottreau*).

Extracto hidro-alcohólico de estramonio, *dos granos.*

Polvo de digital purpúrea. }
Ioduro de plomo cristalizado. } *a. seis gran.*
Azúcar blanca, *una dracma.*

H. S. A. un polvo muy homogéneo, que se divide en veinte y cuatro papeles iguales.

I. Tisis con infartos glandulosos. *D.* Cuatro papeles al dia con cuatro horas de intervalo de uno á otro. *Nota.* Cada toma debe diluirse en una cucharada de agua azucarada, ó mejor de jarabe de puntas de espárragos.

POLVO DE GRIMALDIO.

Deutóxido de hierro, *cuatro onzas y media.*

Escamonea. }
Perlas finas preparadas. } *a. una onza.*
Bezoar oriental. }
Negro de humo, *seis dracmas.*

Magnesia blanca.	} <i>a. media onza.</i>
Sobre-tartrato de potasa.	
Aceite esencial de enebro.	} <i>a. tres dracm.</i>
Bálsamo de copaiba.	

H. S. A. I. Enfermedades cutáneas. *D.* Dos escrúpulos al día.

POLVO DE HALY.

Azúcar candi, <i>seis dracmas.</i>	
Almendras dulces mondadas, <i>dos dracmas.</i>	
Semillas de membrillos.	} <i>a. una dr.</i>
— de adormidera blanca.	
Almidon.	} <i>a. una dr.</i>
Goma arábiga.	
— tragacanto.	
Regaliz, <i>media dracma.</i>	

H. S. A. I. Hemoptisis, diarrea y debilidad de estómago. *D.* De media dracma á dracma y media al día. *Nota.* Este polvo no se conserva largo tiempo y es necesario prepararle en pequeñas cantidades á la vez.

POLVO HEMOSTÁTICO (*Doctor Bonnafox*).

Colofonia, *dos onzas.*
 Goma arábiga, *una onza.*
 Carbon, *cuatro dracmas.*

H. S. A. I. Hemorragias. *D. C. s.* para una aplicacion en la superficie que da sangre.

POLVO DE LOS HERMANOS MAISON *contra*
la tiña.

† Cenizas de boj nuevo, *dos onzas.*

Carbon porfirizado, *una onza.*

Se variará la cantidad de carbon segun la alcalinidad de las cenizas y la susceptibilidad del enfermo. Se espolvoreará diariamente la cabeza de los enfermos con este polvo.

POLVO DE HIRSCHL.

Azúcar de leche, *dos onzas.*

Goma arábica, }
Salep. } *a. una onza.*

Polvo de phelandrium, *una dracma.*

M. Se toma una cucharada de café en un vaso de agua azucarada tres ó cuatro veces al dia. Es útil en los romadizos.

POLVO INCISIVO (*Mongenot*).

Azúcar. }
Goma arábica. } *a. una dracma.*

Lirio de Florencia, *un escrúpulo.*

Oxido de antimonio hidrosulfurado pardo,
dos granos.

Tartrato de potasa antimoniado, *un grano.*

H. S. A. y divídase en noventa y seis tomas.

I. Afecciones catarrales, pasado el período de irritacion. *D.* Una toma cada media hora.

POLVO DE JAMES.

Deutóxido de antimonio, *onza y media.*

Proto-cloruro de mercurio, *una dracma.*

Mezclense exactamente.

I. Fiebres designadas en otro tiempo con el nombre de pútridas ó adinámicas. *D.* Una dracma ó dracma y media. *Nota.* Algunas veces se duplica la proporción del óxido. Soubeiran da la fórmula siguiente:

Sulfuro de antimonio en	}	<i>a. partes iguales.</i>
polvo grueso.		
Cuerno de ciervo raspado.		

Se mezclan estas materias y se las hace tostar sobre un tiesto caliente, agitando continuamente hasta que la masa haya adquirido un color gris; se la reduce á polvo fino y se la calienta durante dos horas en un crisol hecho ascua.

POLVO DE KINO COMPUESTO (F. L.).

Kino, *catorce dracmas.*

Canela, *media onza.*

Opio, *una dracma.*

Se pulveriza separadamente cada sustancia y se las mezcla despues exactamente.

I. Se usa como estíptico y astringente en las hemorragias internas. *D.* Un escrúpulo. *Nota.* Cada dracma contiene cuatro granos de opio.

POLVO DE KNOX.

Hidroclorato de sosa , *ocho partes.*

Cloruro de cal , *tres partes.*

Se mezclan y se conserva en un frasco bien tapado. Cuando se vierte un gran vaso de agua sobre una ó dos onzas, este polvo abandona el cloro; pero el desprendimiento será mas considerable si se añaden algunas gotas de ácido sulfúrico.

I. y D. Los ingleses consideran á este polvo como un preservativo contra las enfermedades sifilíticas, y le emplean en locion antes y despues de la cohabitacion.

POLVO DE LAEYSON ó *colirio seco amoniacal.*

Cal apagada , *dos onzas.*

Hidroclorato de amoniaco , *dos dracmas.*

Clavo.	} <i>a. media dracma.</i>
Canela.	
Carbon vegetal.	

Bol arménico , *una dracma.*

Se reducen todas las sustancias á polvo separadamente y se las introduce en un frasco tapado al esmeril del modo siguiente : se pone en el fondo de la vasija una porcion de la cal apagada, mezclada préviamente con carbon, y despues el hidroclorato de amoniaco por capas sucesivas ; se añaden los aromas y se cubre todo con

el resto de la cal y el bol arménico; se vierte un poco de agua y se tapa exactamente.

I. Oftalmias persistentes.

D. Se emplea este polvo, dejando desprender sobre los párpados el gas amoniacal.

POLVO LAXANTE.

Magnesia calcinada, *cinco granos.*

Cremor de tártaro en polvo, *veinte granos.*

Calomelanos preparados al vapor, *cinco granos.*

D. De dos á cinco tomas de á treinta granos al dia.

POLVO DE LIQUEN.

Se monda el liquen de las materias extrañas; se le priva de su principio amargo macerándole en agua, que se renueva muchas veces; se le seca en la estufa y se le machaca en un mortero de hierro. Es muy difícil obtener este polvo por la tenacidad membranosa del liquen.

POLVO DE LIQUEN AZUCARADO (*Robinet*).

Liquen islándico mondado, *diez y seis onzas.*

Se macera durante dos dias en *c. s.* de agua fria, renovando esta cada seis horas á fin de quitar el amargor de la planta. Se exprime y se hierve el liquen en *c. s.* de nueva agua hasta que

se haya disuelto la mayor parte; se cuele con expresion y se añade al cocimiento:

Azúcar blanca en polvo, *diez y seis onzas*.

Se evapora á fuego lento, agitando continuamente hasta que se haya secado la materia y reducido á polvo; se pasa por un tamiz y se conserva.

I. Se usa para preparar el chocolate y las pastillas de liquen.

POLVO MERCURIAL (*Hahnemann*).

Opio en polvo, *dos granos*.

Mercurio soluble de Hahnemann, *dos granos*.

Goma tragacanto, *veinte granos*.

M. Se usa á la dosis de seis granos en el tratamiento de la sífilis.

POLVO MERCURIAL Y DE CARBONATO DE MAGNESIA (*Cheyne*).

Sulfuro de mercurio negro. } *a. cinco gran.*
Magnesia calcinada. . . . }

Deuto-cloruro de mercurio, *medio grano*.

Mezclense exactamente. Se toma de una vez por la noche al tiempo de acostarse en el tratamiento de las afecciones cutáneas.

POLVO DE MERCURIO SACARINO (*Lagneau*).Azúcar blanca, *media onza*.Mercurio vivo, *dos dracmas*.

Se trituran hasta la completa estincion del mercurio y se divide en treinta y seis dosis iguales. *I.* Afecciones sifilíticas en los niños y en las personas delicadas. *D.* Una dosis cada dia en una taza de chocolate ó de café.

POLVO NARCÓTICO Y TÓNICO (*Marc*).Extracto de opio, *un grano*.Goma en polvo, *dos granos*.Polvo de colombo, *media dracma*.Azúcar, *una dracma*.Esencia de yerbabuena, *dos gotas*.

Mezclense y divídase en seis papeles. Se toma uno por la mañana y otro por la tarde.

POLVO NITRO-ALCANFORADO (*Swediaur*).Polvo de nitro, *diez granos*.— de alcanfor, *cuatro granos*.— de goma, *un escrúpulo*.

M. Se divide en tres dosis, que se usan como atemperantes y diuréticas.

POLVO OFTÁLMICO (*Sichel*).Etiopie antimonial, *dos dracmas*.Resina de guayaco, *una dracma*.

Magnesia calcinada, *doce granos.*

Goma arábica, *una dracma.*

M. y divídase en veinte y cuatro partes.

Se dan de una á ocho al dia en un vaso de agua azucarada contra las oftalmias escrofulosas.

POLVO OFTÁLMICO (*Sichel*).

Calomelanos. } *a. seis gra-*
Azufre dorado de antimonio. } *nos.*

Magnesia calcinada, *doce granos.*

Goma arábica en polvo, *una dracma.*

M. y divídase en doce papeles. Se toma de uno á doce al dia en las oftalmias escrofulosas y reumáticas. Se puede añadir al anterior dos granos de opio en bruto.

OTRO (*Sichel*).

Calomelanos. } *a. cuatro gra-*
Azufre dorado de antimonio. } *nos.*
Resina de guayaco. }

Magnesia calcinada, *doce granos.*

Extracto de acónito, *cuatro granos.*

Goma en polvo, *una dracma.*

M. y divídase en veinte y cuatro papeles.

Se usa en las oftalmias artríticas y reumáticas.

OTRO (*Sichel*).

Etiopie antimonial. } *a. dos dracmas.*
Sulfato de quinina. }

Mezclese y divídase en papeles de cuarenta á cincuenta granos.

I. Oftalmias periódicas. *D.* De dos á ocho al día.

POLVO OFTÁLMICO (*Delille*).

Semillas de cañafístula privadas de su túnica esterna y pulverizadas, *c. s.*

I. Oftalmias serosas. *D.* De uno á doce granos dentro del párpado inferior.

POLVO OLOROSO DE BERLIN.

Se compone de almizcle, *dos granos*; benjuí, *una dracma*; cascarilla, *una dracma*; estoraque calamita, *media onza*; lirio, *media onza*; clavo especia, *tres dracmas*; canela, *tres dracmas*; rosas rojas, *seis dracmas*; flores de espliego, *seis dracmas*; flores de granado, *seis dracmas*; macis *media dracma*, esencia de bergamota; *doce gotas*; esencia de clavo especia, *doce gotas*; esencia de manzanilla, *ocho gotas*; y esencia de rosa, *doce gotas*.

Mezclese. Se echa una pulgarada en una lámina caliente.

POLVO DE OPIO Y CRETA.

Creta preparada, *dos onzas*.

Canela, *una onza*.

Tormentila , *seis dracmas.*

Goma arábica , *seis dracmas.*

Pimienta larga , *una dracma.*

Opio , *treinta y cuatro granos.*

Se reducen á polvo separadamente y se mezclan. Se usa á la dosis de nueve granos en las diarreas y en los flujos durante la dentición de los niños. Cada escrúpulo contiene medio grano de opio.

POLVOS PARA CALAS (F. M.).

Trociscos de Alhandal , *una onza.*

Acibar sucotrina , *onza y media.*

Sal gema , *dos onzas.*

II. polvos S. A.

POLVO PARA FUMIGACIONES.

Incienso en polvo.)

Almáciga id. . . .) *a. tres dracmas.*

Sucino id.)

Estoraque calamita en polvo , *dos dracmas.*

Benjuí.) *a. una dracma.*

Ládano.)

Se echa la *c. s.* sobre ascuas y se dirige el vapor á las partes afectadas de dolores reumáticos.

POLVO PARA SUERO.

Sal marina , *dos onzas.*

Azúcar de leche , *cuatro onzas.*

Nitro. } *a. dos dracmas.*
 Alumbre. }

M. Sirve para preparar el suero artificial.

POLVO PECTORAL (*Wedel*).

Azúcar blanca, *dos onzas.*

Flores de azufre, *media onza.*

Raiz de regaliz. } *a. dos dracmas.*
 Lirio de Florencia. }

Acido benzóico, *un escrúpulo.*

Aceite volátil de anís. } *a. diez gotas.*
 — — de hinojo. }

H. S. A. I. Catarros pulmonales crónicos.

D. De uno á dos escrúpulos.

POLVO DE LA PRINCESA DE CARIÑAN.

Sucino preparado, *dos onzas y media.*

Visco de bayas blancas. }
 Raices de dictamo blanco. } *a. diez dracm.*
 Cuerno de ciervo preparado. }

Raiz de peonía. } *a. cinco dracm.*
 Carbonato de amoniaco. }

H. S. A. I. Enfermedades convulsivas de los niños. *D.* Diez y ocho granos á los niños de un año; treinta y seis granos á los de dos años; cincuenta y cuatro granos á los de tres años, y una dracma á los de cuatro años y mas.

POLVO DE PRINCE.

Este polvo, empleado en Inglaterra en las enfermedades sifilíticas y escrofulosas, no es mas que el deutóxido de mercurio perfectamente puro.

I. Se usa principalmente al exterior para curar las úlceras sifilíticas ó fungosas y la oftalmia crónica.

POLVO DE PLUMER, ANTISIFILÍTICO Y
ANTIESCROFULOSO.

Proto-cloruro de mercurio. }
Oxido de antimonio hidro- } *a. partes ig.*
sulfurado anaranjado. . }

M. exactamente. *I.* Enfermedades sifilíticas y escrofulosas. *D.* Siete granos, mañana y tarde, bebiendo despues uno ó dos vasos de cocimiento de zarzaparrilla.

POLVO PURGANTE Y ANTIHELMÍNTICO (*Pringle*).

Polvo de ruibarbo, diez granos.

Calomelanos, diez y ocho granos.

M. Se toma de una vez en las fiebres biliosas y contra las lombrices lumbricoides.

POLVO PURGANTE Y ATEMPERANTE.

Nitro, *una dracma.*

Emético, *un grano.*

Se disuelven en tres cuartillos de caldo de yerbas. Se bebe á tazas hasta producir suficiente efecto purgante.

POLVO PURGANTE COMPUESTO.

Calomelanos, *diez granos.*

Jalapa en polvo, *una dracma.*

Azúcar, *veinte granos.*

M. D. Cuarenta granos á los adultos.

POLVO PURGANTE Y DIURÉTICO (*Lescure*).

Sulfato de sosa, *dos dracmas.*

Acetato de potasa, *treinta granos.*

Cebolla albarrana. } *a. cinco granos.*

Digital purpúrea. }

Resina de jalapa, *seis granos.*

M. J. Hidropesías, obstrucciones de las vísceras abdominales y caquexia que sobreviene á consecuencia de las fiebres intermitentes.

D. Se toma en una sola dosis por la mañana en ayunas en un cocimiento aperitivo.

POLVO PURGANTE (H. DE M).

Raiz de jalapa en polvo. . . }
 Tartrato ácido de potasa en polvo. } *a. partes*
 Carbonato de magnesia en polvo. } *iguales.*

M. exactamente. *D.* De una dracma á dracma y media.

POLVO DE QUARIN *contra la tos convulsiva.*

Extracto de regaliz. }
 Azúcar. } *a. dos dracmas.*

Azufre sublimado, *una dracma.*

Goma tragacanto. . }
 — arábiga. . . . } *a. media dracma.*

Oxido de antimonio hidrosulfurado pardo,
de dos á cuatro granos.

H. S. A. D. Media dracma, cada cuatro horas, en un looc ó en un vehículo adecuado.

POLVO DE QUININA EMETIZADA (*Dr. Gola*).

Tártaro estibiado, *tres granos.*

Sulfato de quinina, *diez granos.*

Mezclese exactamente y divídase en seis papeles iguales. *D.* Esta mezcla, que se ha empleado con mucho éxito contra ciertas fiebres intermitentes que habian resistido á la accion del sulfato de quinina, solo debe tomarse á la dosis de un papel cada dos horas durante la apirexia.

POLVO DE QUININA Y MORFINA (*Mageudie*).

Sulfato de quinina, *de dos á seis granos.*

— de morfina, *de medio á un grano.*

M. y divídase en cuatro papeles iguales. *D.*

Una toma cada dos ó tres horas durante la apirexia.

POLVOS RESTRICTIVOS DE CIPRÉS (F. E.).

Bol arménico, *dos dracmas.*

Raiz de bistorta. .

Rosas encarnadas. .

Frutos de arrayan. .

Nueces de ciprés. .

Iucienso.

Sulfato de zinc. .

} *a. una onza.*

Háganse polvos *S. A.* Mezclados con clara de huevo y aplicados exteriormente aprovechan en los flujos de sangre por las narices, en las almorranas y en otros; algunas veces se usan interiormente en las diarreas y en el esputo de sangre.

POLVO REFRIGERANTE Y DIURÉTICO.

Polvo de malvabisco. } *a. un escrúpulo.*

— de regaliz. . . }

Sal de nitro, *cuatro granos.*

Alcanfor, *un grano.*

Azúcar de leche, *dos dracmas.*

Azúcar, *dos dracmas.*

M. y divídase en tres dosis, que se usan como el siguiente.

POLVO REFRIGERANTE Y DIURÉTICO.

Nitrato de potasa, *doce granos.*

Malvabisco en polvo. } *a. una dracma.*

Regaliz en polvo. }

Alcanfor, *tres granos.*

M. y divídase en tres papeles. *I.* Es muy cómodo para los viajeros afectados de uretritis aguda. *D.* Uno tres veces al día en un vaso de agua.

POLVO REVULSIVO (*Ivel*).

Sulfato de zinc en polvo. } *a. tres dracmas.*

— de cobre. . . . }

Alcanfor, *dos escrúpulos.*

Azafran, *veinte granos.*

M. exactamente. *I.* Inflamacion crónica de los párpados. *D.* Una á dos dracmas de esta mezcla maceradas durante veinte y cuatro horas en dos cuartillos de agua; se filtra.

POLVO DE ROBERTO THOMAS *contra la gastrodinia.*

Goma tragacanto, *un escrúpulo.*

Oxido de bismuto, *de tres á diez granos.*

H. S. A. D. Se repite esta dosis tres veces al día.

POLVO DE ROSSEN DE ROSENSTEIN *para las
nodrizas.*

Magnesia blanca, *una onza.*

Azúcar blanca, *dos dracmas.*

Cáscaras de naranjas en polvo. } *a. una dr.*
Semillas de hinojo en polvo. . }

H. S. A. y divídase en doce dosis. *I. y D.*

Se dan dos ó tres al día para aumentar la leche de las nodrizas, impedir que se agrie y facilitar la digestión.

POLVO DE RUIBARBO OPIADO.

Extracto de opio en polvo, *dos granos.*

Ruibarbo en polvo, *una dracma.*

H. S. A. seis papeles. *I. y D.* Se usa uno al día como estomacal.

POLVO DE RUIBARBO Y MAGNESIA.

Magnesia calcinada. } *a. una dracma.*
Ruibarbo en polvo. }

Divídase en doce tomas. Se usa una antes de cada comida en el tratamiento de la pirosis y de la gastralgia.

POLVO SEDANTE (*Wetzler*).

Zumo ó polvo de regaliz , *cuatro escrúp.*
 Polvo de raiz de belladona , *un escrúpulo.*

Se mezclan exactamente y se dividen en noventa y seis tomas, de las cuales cada una contiene la cuarta parte de grano de belladona.

I. Han sido recomendados por algunos médicos alemanes como específico contra el coqueluche. *D.* Una toma, mañana y tarde, á los niños de menos de un año; tres tomas á los que tienen menos de dos años; cuatro tomas para los de tres á cuatro años; seis para los de cuatro á seis años. Se aumenta gradualmente, de modo que para los de mas edad la dosis sea de doce tomas en veinte y cuatro horas, es decir grano y medio de belladona. *Nota.* Este remedio produce muy buenos efectos en la tos nerviosa de los adultos.

POLVOS DE SEDITZ INGLÉS ó *Sedlitz Power*
(*Paris*).

Tartrato de sosa y potasa , *dos dracmas.*
 Carbonato saturado de sosa , *dos escrúpulos.*

Se pulverizan finamente, se mezclan exactamente y se ponen en un papel con el número 1. Por separado se toma:

Acido tartárico pulverizado , *treinta y cinco granos.*

Se pone en un papel con el número 2.

D. Se toma en *ocho onzas* de agua en el momento de la efervescencia.

POLVO DE SEDLITZ COMPUESTO (*Planche*).

Sulfato de magnesia purificado y reducido á polvo fino, *dos escrípulos*.

Bicarbonato de sosa, *dos dracmas*.

Se mezclan exactamente.

Se señala este polvo con el número 1.^o

Acido tartárico puro en polvo fino, *media dracma y cuatro granos*.

Se señala este polvo con el número 2.

Se toma del mismo modo que el polvo de Sedlitz inglés.

POLVO SULFURO-MAGNESIANO (*Bielt*).

Azufre sublimado.	} <i>a. media onza.</i>
Magnesia.	

Divídase en diez y ocho papeles. Se da uno diariamente en el eczema crónico y en las afecciones escamosas.

POLVO ATEMPERANTE Y LAXANTE

(*Bouillon Lagrange*).

Tartrato de potasa, *cuatro onzas y media*.

Nitrato de potasa pulverizado, *tres onzas*.

Acido borácico, *una onza*.

Se pulverizan exactamente y se pasan por un tamiz de seda muy fina.

Se pone media dracma en dos cuartillos de agua y se añade :

Sulfato de sosa eflorescido, *dos dracmas*.

— de sosa ordinario, *media onza*.

I. y D. Es laxante y atemperante. Se usa en las afecciones cutáneas; se le emplea con buen éxito, á la dosis de un vaso todas las mañanas, en algunas afecciones catarrales y en ciertas retenciones de orina.

POLVO TÓNICO.

Quina roja en polvo. } *a. una dracma.*

Ruibarbo de la China. }

Canela, *media dracma*.

Opio, *seis granos*.

Divídase en papeles de á doce granos. *I.* Este polvo es útil en algunas atonías del estómago.

POLVO TÓNICO Y ASTRINGENTE (*Otto*).

Sulfato de quinina, *tres granos*.

Oxido de hierro negro, *diez granos*.

Regaliz en polvo, *doce granos*.

Aceite esencial de yerbabuena, *una gota*.

M. y divídase en doce papeles. *I.* Gonorreas rebeldes. *D.* Un papel cuatro veces al día.

POLVO TÓNICO (*Bories*).Quina gris, *dos onzas.*Nuez de agalla, *tres dracmas.*Oxido negro de hierro. } *a. dos dracmas,*

Acibar sucotrino. . . }

M. I. Sirve para fortificar los estómagos perezosos de los sugetos á quienes falta el apetito; conviene para facilitar las reglas difíciles por atonía. *D.* De diez á veinte granos en la primer cucharada de sopa.

POLVO TÓNICO INCISIVO (*Lassone*).Polvo de regaliz, *una dracma.*Catecú. } *a. un escrúpulo.*

Canela. }

Lirio. }

Carbonato de sosa. . . } *a. doce granos.*

Deutóxido de hierro. }

Ipecacuana, *cuatro granos.*Kermes, *dos granos.*

H. S. A. y divídanse en treinta dosis. *I.* y *D.* Se dan en el embarazo gástrico tres dosis cubiertas de un pedazo de hostia mojada, mediando un cuarto de hora de intervalo entre cada dosis. *Nota.* Se toman una ó dos horas antes de comer.

POLVO DE TUNQUIN DE'REUSS.

Raiz de valeriana en polvo, *un escrúpulo.*

Almizcle, *diez y seis granos.*

Alcanfor, *seis granos.*

H. S. A. I. Enfermedades convulsivas, espasmos, histerismo, epilepsia é hidrofobia. *D.* Doce granos.

POLVO VERMÍFUGO.

Musgo de Córcega. } *a. una dracma.*
Santónico. . . . }

Ruibarbo, *media onza.*

M. D. De media á una dracma.

OTRO.

Santónico, *media dracma.*

Tartrato de potasa, *tres dracmas.*

Azúcar blanca, *dos dracmas.*

Mezclense y divídanse en diez y seis papeles. *D.* Uno cada tres ó cuatro horas.

OTRO.

Santónico en polvo, *tres dracmas.*

Calomelanos, *tres granos.*

Mezclense y divídanse en tres papeles. Se dan contra las ascárides y las lombrices en una cucharada de miel, uno por la noche al acos-

tarse, otro al dia siguiente por la mañana y otro al inmediato dia al levantarse.

POLVO VERMÍFUGO.

Coralina de Córcega.	} <i>a. partes iguales.</i>
Santónico.	
Semillas de ajenjos .	
— de tanaceto.	
Hojas de escordio. .	
— de sen.	
Ruibarbo.	

H. S. A. D. Seis granos para los niños y hasta una dracma para los adultos.

OTRO (*Brugnatelly*).

Estaño de Malaca en limaduras, *tres onzas*.
Azufre sublimado, *una onza*.

Se calienta esta mezcla en un crisol sobre las ascuas hasta que se manifiesta una llama muy viva. Se aparta el crisol del fuego, se le tapa, se le deja enfriar, se pulveriza y se tamiza el sulfuro. Se le conserva en una vasija de vidrio.

I. y D. Se da este polvo, ya solo ó ya mezclado con azucar ó magnesia. Se le prescribe á la dosis de media á una dracma, cuatro veces al dia, á las personas que tienen lombrices ó la ténia.

POLVO VERMÍFUGO DE ESTAÑO.

Estaño reducido á polvo fino, *una onza.*

Sulfuro negro de mercurio, *dos dracmas.*

H. S. A. y divídase en seis dosis iguales.

D. Se da una en un poco de jarabe, de triaca ó de miel, dos veces al día.

POLVO VERMÍFUGO MERCURIAL.

Sulfuro negro de mer-	} <i>a. partes iguales.</i>
curio.	
Polvos cornachinos. .	}

Se mezclan con cuidado. *D.* De cinco á diez granos y aun quince.

POLVO VERMÍFUGO PURGANTE (*Bally*).

Azúcar muy refinada, *tres dracmas.*

Ruibarbo	} <i>a. una dracma.</i>
Escamonca.	
Proto-cloruro de mercurio.	

H. S. A. D. De diez á doce granos para los niños, una ó dos veces por semana; una dracma para los adultos.

POLVO DE VERNIX.

Sulfato de cobre.	} <i>a. una onza;</i>
— de zinc.	
Alumbre calcinado.	
Sub-carbonato de plomo.	
Tierra lemnia	

H. S. A. I. y D. Se aplica exteriormente *r. s.* para detener la sangre.

POLVO DE VIENA.

Potasa preparada por	} <i>a. partes iguales.</i>
la cal.	
Cal viva en polvo.	

I. y D. C. s. para que, diluida en un poco de alcohol, forme una pasta blanda, que se aplica en el punto en que se quiere establecer el cauterio, empleando las dos partes de esparadrapo, del mismo modo que se hace con la piedra de cauterio.

POLVO DE WITTCHICKE *contra las neuralgias.*

Subcarbonato de hierro, *una dracma.*

Polvo de canela, *quinze granos.*

I. Se usa en diferentes neuralgias y principalmente en la facial, y obra escitando un temblor en los nervios semejante al que produce una

serie de descargas eléctricas. Se toma esta dosis en un día, en tres veces á iguales distancias.

POLVO VOMITIVO.

Ipecacuana. } *a. un escrúpulo.*
Azúcar blanca. }

M. y divídase en cuatro papeles. *D.* Una cada cuarto de hora hasta producir el vómito.

OTRO.

Ipecacuana, *un escrúpulo*;
Emético, *un grano*.

M. y divídase en tres papeles. Uno cada cuarto de hora. Si bastan los dos primeros, no se da el tercero. Se facilita el vómito bebiendo mucha agua caliente. Es un buen emético.

OTRO (*Helvetius*).

Sobre-tartrato de potasa, *ocho onzas*.
Emético, *una onza*.
Ipecacuana, *media onza*.

Se trituran cuidadosamente y se pasan por un tamiz de seda.

I. y D. Se da á la dosis de diez y ocho granos para escitar el vómito sin sacudidas violentas. *Nota.* Algunas veces es purgante.

POMADAS.

POMADA DE ACIBAR.

Acibar, *dos dracmas.*

Manteca, *una onza.*

M. I. Se usa en fricciones como vermífuga.

POMADA ALCALINA.

Sub-carbonato de sosa, *dos dracmas.*

Manteca, *una onza.*

Vino de opio compuesto, *una dracma.*

Mezclese. *I.* Afecciones papulosas y porriego.

OTRA (*Biell*).

Sub-carbonato de potasa, *dos dracmas.*

Manteca purificada, *dos onzas.*

Mezclese. Se usa como la anterior.

POMADA ALCANFORADA.

Alcanfor en polvo. . . . } *a. tres granos.*

Oxido de zinc. . . . }

Manteca fresca, *tres dracmas.*

Blanco de ballena, *dos onzas.*

Cera blanca, *tres onzas.*

Se funden los cuerpos grasos y triturando se añade el alcanfor y el óxido de zinc.

I. Ciertas enfermedades de ojos y para im-

pedir que los párpados se peguen durante el sueño. *D.* Se extiende en pedazos estrechos de lienzo fino, que se aplican despues sobre el borde libre de los párpados y se sostienen con una venda.

POMADA ANTIEPSÓRICA.

Flores de azufre, *ocho onzas.*

Hidroclorato de amoniaco. } *a. media onza.*

Alumbre. }

Manteca, *diez y seis onzas.*

M. I. Sarna. D. Se emplea *c. s.* de esta pomada para fricciones.

OTRA.

Jabon negro, *ocho onzas.*

Flores de azufre, *cuatro onzas.*

Esencia de trementina, *una onza.*

D. Una onza al dia, en fricciones.

OTRA (*Alibert*).

Manteca, *cuatro onzas.*

Flores de azufre, *dos onzas.*

Sub-carbonato de potasa, *una onza.*

Se trituran la potasa y la sosa, se añade despues la grasa y se mezclan exactamente. *D.* De cuatro dracmas á una onza en fricciones cada dia.

POMADA ANTIEPSÓRICA (*Giraud*).

Manteca, *diez y seis onzas.*

Aceite ó pirlaina de brea, *cuatro onzas.*

Esta pomada no mancha la ropa.

POMADA ANTIHERPÉTICA (*Gibert*).

Cloruro amoniaco. . .	} <i>a. ocho granos.</i>
de mercurio.	
Alcanfor.	

Manteca, *cuatro dracmas.*

M. I. Oftalmias herpéticas.

POMADA ANTIEPSÓRICA (*Pouzin*).

Manteca, *treinta onzas.*

Albayalde, *quince onzas.*

Sublimado corrosivo, *una onza.*

M. exactamente. *D.* Una dracma, con la que se dan fricciones en las partes afectadas, particularmente en las articulaciones, despues de usar medicamentos internos apropiados.

OTRA (*Thomann*).

Manteca de vacas fresca. }	} <i>a. tres onzas.</i>
Manteca de cerdo.	

Polvo de carbon, *dos dracmas.*

Se trituran hasta que sea íntima la mezcla.

D. Despues de haber hecho tomar un baño

tibio al enfermo, se le frota con dos dracmas de esta pomada; despues se le lava al dia siguiente por la mañana con una disolucion acuosa de jabon tibio. Al otro dia se da nueva friccion, y al cabo de cinco ó seis dias se cura la sarna.

POMADA ANTIESPASMÓDICA (*Golfin*).

Accite de almendras dulces, *cuatro onzas.*

Cera vírgen, *una onza.*

Opio en bruto, *dos onzas.*

Se funde la cera en el accite á un calor moderado, se añade el opio, se deja infundir durante media hora y se cuele con expresion. Se hierva el residuo en cuatro onzas de agua hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se agita el cerato opiado con este cocimiento.

I. Retencion de orina, supresion del flujo menstruo por causa espasmódica, dolores reumáticos crónicos y cardialgia. *D.* Se dan fricciones sobre las partes enfermas ó las que simpatizan con ellas.

OTRA.

Cal apagada, *una dracma.*

Carbonato de sosa, *dos dracmas.*

Extracto acuoso de opio, *diez granos.*

Manteca, *dos onzas.*

M. I. Diversas especies de prurigo.

POMADA ANTIHERPÉTICA.

Calomelanos. } *a. una dracma.*
 Azufre sublimado. }
 Manteca, *una onza.*

M. I. Herpes liquenoides.

OTRA (H. M.).

Ungüento rosado, *una onza.*
 Precipitado blanco, *una dracma.*
H. S. A. D. Dos unturas al día.

OTRA (Chevallier).

Manteca, *dos onzas.*
 Aceite de almendras dulces, *seis dracmas.*
 Cloruro de cal, *tres dracmas.*
 Turbit mineral, *una dracma.*

Se reducen el turbit y el cloruro á polvo muy fino, y se incorporan los polvos en el aceite y la manteca.

I. Se usa en el tratamiento de los herpes, &c.
D. C. s. para dar ligeras fricciones, mañana y tarde, en las partes enfermas.

POMADA ANTIHERPÉTICA (*Cullerier*).

Turbit mineral, *una dracma*.

Láudano líquido, *una dracma*.

Azufre sublimado, *media dracma*.

Manteca, *una onza*.

I. Afecciones herpéticas. *D.* Se dan en las partes enfermas fricciones, que se repiten con mas ó menos frecuencia. Se asocia el uso de los baños de agua simple.

OTRA (*Dubois*).

Pomada de pepino, *media onza*.

Nitrato de mercurio, *dos dracmas*.

I. Herpes poco considerables. *D.* Se usa en fricciones sobre las partes afectadas.

POMADA ANTIOFTÁLMICA (*Desault*).

Deutóxido de mercurio.	} <i>a. una</i> <i>dracma.</i>
Litargirio.	
Tucia preparada.	
Alumbre calcinado.	
Deuto-cloruro de mercurio, <i>doce granos</i> .	

Se tritura todo sobre un pórfido y después se incorpora *S. A.* en:

Ungüento rosado ó cerato no lavado, *ocho onzas*.

I. Se usa contra las afecciones herpéticas y las inflamaciones crónicas de los párpados. *D.*

C. s. para dar ligeras fricciones en los bordes de los párpados.

POMADA ANTIOFTÁLMICA (*Carron de Villards*).

Ungüento mercurial doble, *una onza*.

Estricnina, *ocho granos*.

Aceite esencial de almendras amargas, *ocho gotas*.

M. I. Oftalmias graves; tiene la ventaja de combatir la inflamacion y mantener la pupila bastante dilatada para no temer la atresia.

OTRA (*Gran Jean*).

Precipitado rojo, *una dracma*.

Cerato sin agua, *media onza*.

M. I. Oftalmias crónicas. Se usa como la anterior.

OTRA (*Guthrie*).

Nitrato de plata fundido, *seis granos*.

Acetato de plomo, *cinco granos*.

Se trituran exactamente sobre un pórfido y se incorporan con:

Manteca, *una onza*.

Se introduce cada dos dias en el ojo el grueso de una cabeza de alfiler de esta mezcla, y se obtienen muy buenos y prontos efectos en el tratamiento de las oftalmias crónicas, que tienen su asiento en la conjuntiva. Se usa con

Buen éxito el mismo tópicó en el tratamiento de la gonorrea. Se introduce en el conducto de la uretra, en la extension de cerca de una pulgada, una candelilla cargada de esta pomada.

POMADA ANTIHERPÉTICA (*Sichel*).

Cerato de torbisco. }
 Pomada de torbisco. } *a. seis granos.*
 Estricnina, *un quinto de grano.*

Mezclense. Sirve para curar los vejigatorios que se aplican en la frente en el tratamiento de la amaurosis. Puede aumentarse progresivamente la dosis de la estricnina hasta un grano.

OTRA (*St. Ives*).

Manteca de vacas fresca sin sal, *tres onzas.*
 Cera blanca, *media onza.*
 Deutóxido de mercurio, *dos dracmas y media.*

Oxido de zinc, *una dracma.*

Alcanfor disuelto en aceite de huevos, *dos escrúpulos y seis granos.*

Después de haber hecho fundir la cera y la manteca, se mezclan todas las sustancias en un mortero de mármol.

I. Se usa contra las oftalmias crónicas escrofulosas. *D.* Se pone un poco sobre el borde de los párpados por la noche al tiempo de acostarse. Por la mañana se dan ligeras friccio-

nes con esta pomada sobre las partes enfermas.

POMADA ANTIHEMORROIDAL (*Cullen*).

Polvo de nuez de agalla, *una dracma.*

Manteca, *una onza.*

Mezclese.

POMADA ANTIPRURIGINOSA (*Gibert*).

Alumbre, *diez y ocho granos.*

Alcañor, *quince granos.*

Manteca, *una onza.*

Mezclense.

POMADA ANTISIFILÍTICA.

Ungüento de mercurio duplicado, *una onza.*

Cerato opiado, *una onza.*

D. Se usa en el tratamiento de las úlceras sifilíticas estacionarias.

OTRA (*Gibert*).

Cerato opiado, *una onza.*

Precipitado rojo, *quince granos.*

D. Se usa para curar las úlceras sifilíticas, cuando no se teme reanimar la inflamacion.

POMADA DE ARSENIATO DE SOSA.

Arseniato de sosa, *una dracma.*

Manteca, *dos onzas.*

M. I. Afecciones cancerosas.

POMADA ASTRINGENTE.

Oxido de zinc, *una dracma.*

Cerato simple ó manteca, *una onza.*

Mezclese sobre un pórfido. *I.* Grietas del pecho.

POMADA ASTRINGENTE DE AGRAZ.

Agraz ó zumo de uva sin madurar depurado,
ocho onzas.

Ungüento rosado, *diez y seis onzas.*

Cera amarilla, *cuatro onzas.*

Se cuecen en una vasija de barro hasta que se consuma el líquido acuoso. Se separan las heces de la pomada fria y se liquida de nuevo. Se la aromatiza con esencia de rosa.

I. Grietas de los pechos y de los labios; se puede usar tambien contra las hemorroides.

POMADA DE AUTENRIETH *contra el coqueluche.*

Manteca, *diez y seis partes.*

Tartrato de potasa antimoniado, *cinco part.*

H. S. A. D. El grosor de una nuez para frotar muchas veces al dia la region del estómago.

Nota. Se presentan en la parte en que se hacen las fricciones pústulas semejantes á los granos de la viruela. Autenrieth asegura que los romadizos y coqueluche mas pertinaces han cedido á este medicamento.

La *pomada estibiada* de los hospitales militares se compone de dos dracmas de tártaro emético y seis dracmas de manteca de puerco. *M.*

La *pomada estibiada* de los hospitales de Madrid se compone de una dracma de tártaro estibiado y una onza de manteca. *M.*

POMADA AZUFRADA.

Azufre sublimado y lavado, *cuatro onzas.*
Manteca, *doce onzas.*

M. I. Sarna y afecciones herpéticas.

OTRA (*Helmerich*).

Manteca, *ocho partes.*

Azufre sublimado, *dos partes.*

Potasa purificada, *una parte.*

H. S. A. I. Sarna. D. Se dan fricciones dos veces al dia con dos onzas de pomada cada vez.

Nota. Esta pomada cura comunmente la sarna en diez ó doce dias.

POMADA DE AZUFRE Y CARBON (*Bielt*).

Carbon en polvo, *una onza*.
 Azufre sublimado, *dos onzas*.
 Manteca, *cinco onzas*.
 Mezclese. *I. Porigo*.

POMADA DE BAUYER.

Alumbre calcinado, *tres dracmas*.
 Calomelanos en polvo, *tres dracmas*.
 Litargirio porfirizado, *cuatro dracmas*.
 Mezclense exactamente e incorporese con:
 Manteca, *ocho onzas*.
 Trementina de Venecia, *dos onzas*.
I. Porigo.

POMADA DE BELLADONA.

Extracto de belladona, *dos dracmas*.
 Agua destilada. }
 Cerato. } *a. dos onzas*.

Se disuelve el extracto y se incorpora el cerato por trituracion.

I. Se usa con buen éxito para obtener la relajacion del cuello de la matriz en ciertos casos de partos dificiles y en las rigideces y constricciones espasmódicas. *D.* Se aplica á la dosis de dos dracmas en el útero, dirigiéndola por medio de una geringuilla.

El extracto de belladona es la base de la *pomada antiespasmódica* de los hospitales militares, que se compone de un escrúpulo de extracto y media onza de manteca fresca.

POMADA DE BREA (*Emery*).

Brea, *una onza*.
Manteca, *ocho onzas*.
Mezclese.

POMADA DE BOYER.

Aceite de almendras dulces, *cuatro onzas*.
Manteca lavada. } *a. tres onz.*
Zumo de siempreviva menor. }

H. S. A. L. Se emplea como dulcificante y refrigerante contra las irritaciones de la piel. *D. C. s.* para dar ligeras fricciones, mañana y tarde, en las partes enfermas. *Nota.* Accarie, hallando demasiado líquida esta pomada, ha propuesto añadirla media onza de cera.

POMADA DE BROMURO DE POTASIO.

Bromuro de potasio, *veinte y cuatro gran.*
Manteca, *una dracma*.

M. I. Infartos escrofulosos. *D.* De media á una dracma en fricciones.

POMADA DE BROMURO DE POTASIO BROMURADO
(Magendie).

Manteca, *una onza.*

Bromuro de potasio, *veinte y cuatro gran.*

Bromo líquido, *de seis á doce gotas.*

M. D. Se usa en fricciones de media á una dracma. *I.* La misma que la anterior, solo que es mas activa.

POMADA DE CAMUESAS.

Manteca reciente lavada, *treinta y dos onz.*

Camuesas partidas en pedacitos, *diez y seis onzas.*

Agua rosada, *ocho onzas.*

Benjuí. } *a. una dracma.*

Estoraque calamita. }

Clavo de especia, *media dracma.*

Se ponen las tres últimas sustancias contundidas en una muñequita de lienzo, se suspende esta en la vasija que contenga las demás, se cuece todo hasta que se consuma la humedad, comprimiendo con una espátula la muñequita, se cuele, se deja enfriar, se saca con cuidado para separar las heces, se agita y se guarda para el uso.

I. Es refrigerante y se emplea en las escoriaciones de los labios y de las narices.

POMADA DE CALOMELANOS.

Mercurio dulce preparado al vapor, *diez y ocho granos.*

Manteca, *una onza.*

Se mezcla por trituracion.

I. Escoriaciones, bubones y úlceras sifilíticas y escrofulosas.

Bieta la usa en la mayor parte de las erupciones crónicas y al fin del tratamiento de las afecciones escamosas.

Si se añaden á *tres onzas* de la pomada anterior *una dracma* de extracto gomoso de opio ó *dos dracmas* de láudano líquido se tiene la *pomada de calomelanos opiada*, que se usa para curar las pústulas primitivas planas ó las úlceras venéreas indolentes, &c.

POMADA CALMANTE.

Polvo de cicuta, *media onza.*

Manteca, *una onza.*

M. I. Enfermedades escrofulosas con inflamacion y en el mal de Pott. *D.* Se usa en fricciones á la dosis de media á dos dracmas.

OTRA.

Extracto de zumo depurado de cicuta, *una dracma.*

Dilúyase en un poco de agua y mézclese con:

Cerato, *una onza.*

POMADA DE CIANURO DE MERCURIO (*Bielt*).

Cianuro de mercurio, *diez y seis granos.*

Manteca, *una onza.*

Esencia de limon, *quince gotas.*

H. S. A. I. Se usa ventajosamente en los herpes escamosos húmedos, acompañados de una inflamacion intensa y de un prurito quemante. *D. C. s.* para dar ligeras fricciones, mañana y tarde, en las partes enfermas.

POMADA DE CIANURO DE MERCURIO (*Parent*).

Cianuro de mercurio, *doce granos.*

Manteca, *una onza.*

Mézclese. *I.* Ulceras sifilíticas.

POMADA DE CIANURO DE POTASIO (*Bielt*).

Aceite de almendras amargas, *dos draemas.*

Cianuro de potasio, *doce granos.*

Cerato de Galeno, *dos onzas.*

Mézclese. *I.* Líquen y prúrigo, cuando la piel está muy seca y es muy vivo el comezon.

POMADA DE CINABRIO.

Cinabrio, *dracma y media*.

Hidrociorato de amoniaco, *media dracma*.

Manteca, *dos onzas*.

Agua de rosas, *una dracma*.

M. I. Se usa en el *prurigo pedicularis* para disminuir el prurito y el desarrollo de los piojos.

POMADA DE CIRILIO.

Sublimado, *una dracma*.

Manteca, *una onza*.

M. I. Se usa en fricciones sobre los herpes.

POMADA CITRINA CON EL ACEITE DE OLIVAS
(*Planche*).

Mercurio purificado, *dos dracmas*.

Acido nítrico puro de 32°, *cuatro dracmas*.

Se opera la disolucion sin auxilio de mas calor que el que resulta de la reaccion del metal y del ácido.

Por separado se pone en una cápsula de porcelana:

Aceite de olivas muy puro, *dos onzas y tres dracmas*.

Se coloca la cápsula en un baño de agua ca-

lentada á 30° Reaumur; se vierte poco á poco la disolucion mercurial, meneando la mezcla á la misma temperatura durante media hora. Se aparta la cazuela del baño y se continúa meneando sin interrupcion hasta que la masa haya adquirido la consistencia de cerato; entonces se echa en un tarro de loza.

La pomada preparada de este modo se conserva durante nueve meses á lo menos sin alterarse su color.

Haciendo la mezcla en frio, la pomada es menos consistente y mas pálida; disminuyendo la mitad de la dosis del nitrato de mercurio, se la obtiene aun mas blanda y capaz de reemplazar extemporaneamente la mezcla gris de pomada citrina y cerato.

I. Sarna y ciertas afecciones herpéticas. *D.* De una á dos dracmas para dar fricciones en las partes enfermas.

POMADA CLORADA.

Cloro líquido, *dos dracmas.*

Manteca, *una onza.*

M. I. Herpes, sarna y tiña.

POMADA CON EL CLORURO DE CAL.

Azufre sublimado y lavado, *tres onzas.*

Cloruro de cal bien triturado, *cuatro onzas.*

Manteca, *doce onzas.*

Mezclese. *I. Sarna.* Se usa en fricciones, mañana y tarde.

POMADA DE CLORURO DE ORO Y SÓDIO
(*Magendie*).

Cloruro de oro y sódio, *un grano.*
Manteca purificada, *media onza.*

M. I. Sífilis constitucional.

Se aplica esta pomada en la superficie de un pequeño vejigatorio para hacer absorver la sal de oro.

POMADA DE LA CONDESA ó *pomada virginal.*

Sulfato de zinc, *media onza.*

Hojas de arrayan. } *a. tres dracmas.*

Zumaque. }

Agallas de encina. }

Nuez de ciprés. } *a. dos dracmas.*

Cáscara de granada. }

Se pulverizan separadamente todas estas sustancias, se las mezcla, se las pasa por un tamiz muy fino y se las incorpora en cantidad suficiente de unguento rosado.

Se usa esta preparacion astringente para hacer contraer los esfínteres demasiado dilatados. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes que se quiere hacer contraer.

POMADA CONTRA EL ACNE ENDURECIDO.

Cal apagada , *una dracma.*
 Alcanfor puro , *medio escrúpulo.*
 Cerato calaminar , *una onza.*
D. Se usa tópicamente.

POMADA CONTRA EL ECZEMA (*Bielt*).

Manteca , *una onza.*
 Sulfato amarillo de mercurio , *un escrúpulo.*
 Láudano líquido , *doce granos.*
D. Se usa en untura sobre las partes atacadas de eczema crónico.

POMADA CONTRA EL FAVUS.

Deuto-ioduro de mercurio , *diez y ocho gr.*
 Alcanfor , *doce granos.*
 Manteca , *una onza.*
M. D. C. s. para dar fricciones en las partes enfermas.

POMADA CONTRA EL IMPÉTIGO.

Cerato , *una onza.*
 Sulfato de mercurio rojo , *media dracma.*
 Alcanfor , *diez granos.*
Mezclese. D. C. s. con fricciones todas las noches sobre las partes enfermas.

POMADA CONTRA EL LÍQUEN (*Biett*).

Proto-nitrato de mercurio. . .	} <i>a. un escrúp.</i>
Alcanfor.	
Manteca.	} <i>a. media onz.</i>
Aceite de almendras dulces. }	

M. D. C. s. para dar fricciones por la noche sobre las partes enfermas.

POMADA CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS.

Quina roja en polvo, *una dracma.*
 Aceite de almendras dulces, *dos dracmas.*
 Tuétano de vaca fundido y clarificado,
seis onzas.

Se tritura hasta el completo enfriamiento y se añade al fin:

Aceite esencial de bergamota, *seis gotas.*
 Bálsamo del Perú, *veinte gotas.*

POMADA CONTRA LA CALVICIE (*Dupuytren*).

Tuétano de vaca, *ocho onzas.*
 Acetato de plomo cristalizado, *una dracma.*
 Bálsamo negro del Perú, *dos dracmas.*
 Alcohol de 21°, *una onza.*
 Tintura de cautáridas, *veinte y cuatro gr.*
 Tintura de clavo. }
 — de canela. } *a. quince gotas.*

Mezclense. Todas las noches se unta el cuero cabelludo con el grueso de una nuez de esta pomada.

POMADA CONTRA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS
(*Cruveilhier*).

Manteca, *una onza*.

Bálsamo del Perú líquido, *una dracma*.

Mezclese. Si los dolores son muy vivos se añade :

Opio en bruto, *dos granos*.

En este caso el niño no debe mamar.

POMADA CONTRA LA NEURALGIA FACIAL
(*Fouquier*).

Opio, *una dracma*.

Carbonato de plomo, *una onza*.

Manteca, *media onza*.

Bálsamo tranquilo, *c. s.*

M. D. Se dan fricciones en los puntos doloridos muchas veces al día.

POMADA CONTRA LAS NEURALGIAS ó *de carbonato de plomo*.

Manteca, *cinco dracmas*.

Carbonato de plomo, *una dracma*.

M. Se usa como desecante y se emplea con buen éxito contra las neuralgias faciales. *D.* De una á dos dracmas en fricciones.

POMADA CONTRA LA OCTORREA CRÓNICA
(*Meniere*).

Proto-ioduro de mercurio, *diez y ocho grs*
Hidroclorato de morfina, *cuatro granos*.
Pomada de pepino, *media onza*.

M. Se usa en fricciones en el interior del oído con un clavo de hilas de algodón cubierto de esta pomada.

POMADA CONTRA LAS QUEMADURAS.

Yema de huevo endurecida, *número una*.
Cera amarilla, *media onza*.
Aceite de almendras dulces, *onza y media*.

Se hace un cerato con el aceite y la cera, y se le incorpora la yema de huevo.

POMADA CONTRA LOS SABAÑONES (*Knoerlzer*).

Opio, *una dracma*.
Alcanfor, *media dracma*.
Carbonato de amoniaco, *una dracma*.
Acetato de plomo, *dos dracmas*.
Manteca, *onza y media*.
Mezclese.

FOMADA CONTRA LA SARNA.

Azufre sublimado , *cinco onzas.*

Carbonato de potasa , *dos onzas.*

Agua , *una onza.*

Accite comun , *cuatro dracmas.*

Se disuelve el carbonato, se le añade el aceite y se incorpora despues el azufre en el jabon formado de este modo.

I. Sarna. Nota. Esta pomada no ensucia la ropa y no tiene olor. La duracion media del tratamiento es de trece dias.

La pomada *antiepsórica* de los hospitales militares se compone de *una libra* de manteca de cerdo, *cuatro onzas* de flores de azufre y *un escrúpulo* de sal amoniaco.

OTRA.

Flores de azufre , *seis dracmas.*

Polvo de eléboro blanco , *cuatro dracmas.*

Carbonato de potasa , *doce dracmas.*

Jabon negro , *doce dracmas.*

Manteca , *una onza.*

Esencia de espliego , *una dracma.*

Mezclese. *U.* Media onza durante ocho dias.

OTRA (Rollb).

Calomelanos , *dos dracmas.*

Accite de almendras , *una onza.*

Cera blanca , *dos dracmas.*

H. S. A. D. En diez dosis.

POMADA CONTRA LA SARNA (*Lisson*).

Litargirio, *una onza*.

Se disuelve á fuego lento en

Aceite comun, *cuatro onzas*.

D. Media onza, mañana y tarde, para cada friccion, que se hará en las manos, en los pies y en las axilas.

POMADA CONTRA LA TIÑA.

Carbon de bej en polvo. } *a. dos onzas.*
 Flores de azufre. . . . }

Hollin, *una onza*.

Manteca, *ocho onzas*.

Mezclense. Despues de haber lavado la cabeza con agua de jabon, se frotan cada tres dias las partes enfermas con tres ó cuatro dracmas de esta mezcla.

OTRA.

Sosa cáustica. . . . } *a. dos dracmas.*
 Sulfuro de potasa. . . . }

Manteca, *tres onzas*.

Se reducen á polvo la sosa y el sulfuro y se los incorpora despues con la manteca. *D.* Se usa en fricciones sobre la cabeza de los tiñosos, despues de haber hecho caer las costras por medio

de cataplasmas y de haber cortado los cabellos; luego se cubre el cuero cabelludo con papel de estraza.

POMADA CONTRA LA TIÑA (*Bories*).

Hollin en polvo fino, *onza y media*.

Sulfato de zinc, *seis dracmas*.

Manteca, *cuatro onzas*.

M. D. El grosor de una nuez pequeña dos veces al día.

POMADA DE CREOSOTA (*Hiff.*).

Creosota, *ochenta gotas*.

Óxido de zinc, *una dracma*.

Manteca, *dos onzas*.

H. S. A. I. Pórrigo.

POMADA DE CROLIUS.

Ácido sulfúrico, *una onza*.

Manteca, *dos onzas*.

Mezelese. I. Sarna.

POMADA CRISOUROMA (*Collereau y Verdé-Delisle*).

Ioduro de plomo cristalizado, *una dracma*.

Manteca, *una onza*.

Esencia de limon, *c. s.*

H. S. A. una pomada. *Nota.* Se puede aumentar la cantidad de ioduro hasta dos drac-

mas y mas; se le puede añadir igualmente, segun sea necesario, de media á una dracma de láudano de Sydenham ó de láudano de Rousseau.

I. Se usa ventajosamente contra los infartos escrofulosos, los cánceres, las úlceras de la matriz, &c. Al parecer escede en actividad á las preparaciones de iodo y al iodo mismo; esto induce á creer los numerosos experimentos que se han hecho estos últimos años. *D. C. s.* para untar bien, mañana y tarde, las partes enfermas.

POMADA CON LOS CALOMELANOS.

Calomelanos preparados al vapor, *una drac.*
Manteca, *una onza.*

Mezelese. Se usa en los mismos casos que la pomada de calomelanos.

POMADA DE DEUTO-IODURO DE MERCURIO (Magendie).

Manteca, *onza y media.*

Deuto-ioduro de mercurio, *veinte granos.*

II. S. A. I. y D. Esta pomada, mas activa que la de proto-ioduro, se usa del mismo modo, pero á menor dosis, contra las úlceras venéreas inveteradas.

La pomada de ioduro de mercurio de los hospitales militares se compone de *un escrúpulo* de

proto ó deuto-ioduro de mercurio y *una onza* de manteca de puerco.

POMADA DE DEUTO-IOURO DE MERCURIO
(*Bielt*).

Deuto-ioduro de mercurio, *doce granos*.
Manteca purificada, *una onza*.

Mezclase. *I.* Sífilides y afecciones escamosas secas y rebeldes, fijas en ciertas regiones.

POMADA DE DEUTÓXIDO DE MERCURIO (*Bielt*.)

Deutóxido de mercurio, *media dracma*.
Manteca, *una onza*.

Alcanfor, *cuatro granos*.

Mezclense. *I.* Afecciones papulosas de la cara.

POMADA DE DUCHESNE DUPARC.

Estoraque líquido.	} <i>a. tres onzas.</i>
Manteca.	
Sublimado.	} <i>a. una dracma.</i>
Emético.	
Tintura de cantáridas.	} <i>a. media dracma.</i>
Polvo de euforbio.	

Mezclense. *I.* Estiomena. *Nota.* Se distingue esta pomada con el número 2; añadiéndole tres onzas de estoraque líquido, se obtiene el número 1.

POMADA DE ELÉBORO.

Polvo de raíz de eléboro blanco, *una onza*.
Manteca, *ocho onzas*.

Se mezclan y se añaden:

Esencia de limón, *una dracma*.

I. Sarna. D. En fricciones para trece ó catorce días.

POMADA EPISPÁSTICA AMARILLA Ó SUAVE.

Cantáridas en polvo grueso, *cuatro onzas*.

Grasa de puerco, *cuatro libras y media*.

Cera amarilla, *ocho onzas*.

Cúrcuma en polvo, *dos dracmas*.

Aceite volátil de limón, *dos dracmas*.

Se ponen las cantáridas y la manteca en un baño maría y se digieren durante tres ó cuatro horas á la temperatura del agua hiviendo, meneando de cuando en cuando; se cuele con una fuerte expresion, se pone la pomada al fuego con el polvo de cúrcuma, se hace digerir, se filtra, se liquida el producto con la cera amarilla, se menea la mezcla hasta que se ha enfriado en parte, y se la aromatiza con el aceite volátil de limón.

Esta pomada se emplea para curar los vejigatorios, y conviene mejor que la verde á las personas irritables.

La pomada epispástica de los hospitales militares se compone de *dos dracmas* de cantáridas.

das en polvo y *cuatro onzas* de manteca de puerco.

POMADA EPISPÁSTICA VERDE.

Cantáridas en polvo fino, *una onza*.

Ungüento populeon, *dos libras y cuatro onz.*

Cera blanca, *cuatro onzas*.

Se liquida la cera á fuego lento con el unguento populeon, se añaden las cantáridas y se menea hasta que se enfríe.

I. Esta pomada es mas activa que la pomada epispástica amarilla y se usa en los mismos casos; escita una supuracion activa.

POMADA EPISPÁSTICA ALCANTOBADA.

Cantáridas en polvo, *una onza*.

Agua, *doce onzas*.

Manteca, *seis onzas*.

Aceite comun. } *a. cuatro onzas.*

Cera blanca. . }

Aleanfor, *dos draemas*.

Se hierven las cantáridas en el agua durante media hora, se filtra y se evapora hasta cerca de cinco onzas, se añaden los cuerpos grasos, se hace evaporar toda el agua, se deja enfriar y se añade el aleanfor.

I. Sirve para mantener la supuracion de los vejigatorios sin ocasionar una irritacion demasiado viva y sin obrar sobre las vias urinarias.

POMADA DE TORBISCO.

Manteca, *diez onzas.*

Cera blanca, *una onza.*

Corteza de torbisco, *cuatro onzas.*

Se divide la corteza de torbisco por el proceder de Coldefy; se la pone en un baño maría y se hace digerir durante doce horas; se cuele con fuerte expresion y se deja aposar tranquilamente la pomada. Cuando está fria, se la rasa por encima para separar las heces. Se la funde con la cera y se menea hasta que se enfrie para evitar que se hagan grumos.

POMADA EPISPÁSTICA CON LAS PREPARACIONES DE ORO (*Niel*).

Manteca, *media dracma.*

Oro dividido por el mercurio, *un grano.*

I. Se emplea en las enfermedades sifilíticas, cuando el estado de la boca no permite emplear fricciones sobre esta parte. *D.* Se pone á descubierto el dermis de uno de los lados del cuello y estableciendo en él una lengüeta epispástica, se curan mañana y tarde los vejigatorios con las mezclas precedentes. Se aumenta gradualmente la dosis del oro dividido hasta dos granos; despues se reemplaza la primera pomada por esta:

Manteca, *media dracma.*

Muriato de oro y sosa, *una décima parte de grano.*

POMADA DE FABRÉ.

Manteca, *una onza.*

Hidrociorato de amoniaco, *una dracma.*

Tartrato de potasa antimoniado, *media dr.*

Alcanfor, *veinte y cinco granos.*

Almizcle, *diez granos.*

I. Infartos del hígado y obstrucciones análogas. *D.* Diez y ocho granos en fricciones. *Nota.* Se puede aumentar gradualmente la dosis segun el grado de sensibilidad de la piel.

POMADA DE FOSFATO DE MERCURIO (*Albano*).

Deuto-fosfato de mercurio, *una dracma.*

Manteca, *once dracmas.*

Se mezcla por porfirizacion.

I. Bubones. Comunmente bastan una ó dos dracmas para la curacion.

Se obtiene el deuto-fosfato de mercurio por doble descomposicion del deuto-nitrato de mercurio y del fosfato de sosa.

POMADA DE FÓSFORO.

Fósforo, *cuatro partes.*

Grasa de puerco, *doscientas partes.*

H. S. A.

POMADA FUNDENTE (*Lerminier*).

Mercurio dulce , *una dracma.*

Cerato blanco , *una onza.*

Se usa en fricciones en el vientre en los infartos crónicos del hígado.

POMADA DE GIROUX.

Brea , *dos dracmas.*

Láudano , *una dracma.*

Manteca , *una onza.*

Mezclese. Prúrigo y afecciones escamosas.

POMADA DE GRAND-JEAN.

Ungüento populeon , *dos libras.*

Aceite comun , *diez y seis onzas.*

Cera amarilla , *nueve onzas.*

Cantáridas , *onza y media.*

H. S. A. I. Esta pomada es epispástica. Se aplica detrás de las orejas para desviar la fluxion que se dirige á los ojos. *Nota.* Si esta pomada no tiene mas usos , cualquiera otro epispástico es tan bueno como ella,

POMADA DE HIDROBROMATO DE HIERRO
BROMURADO (*Cottureau*).

Hidrobromato de hierro, *una dracma*.

Bromo, *doce granos*.

Manteca, *una onza*.

H. S. A. D. Se emplea particularmente contra la amenorrea de las tísicas en fricciones dadas mañana y tarde en la parte superior interna de los muslos, lo mas cerca posible de los grandes labios, y á la dosis de media dracma, que se reparte para uno y otro muslo.

POMADA DE HIDRIODATO DE AMONIACO (*Bielt*),

Hidriodato de amoniaco, *diez y ocho granos*.

Grasa de carnero, *media onza*.

Aceite de almendras dulces, *dos dracmas*.

Mezclense.

POMADA HIDRIODATADA É IODURADA
(*Baudelocque*).

Manteca, *una onza*.

Iodo, *doce granos*.

Ioduro de potasio, *una dracma*.

Mezclense. *I.* Afecciones escrofulosas y principalmente contra las escrófulas tuberculosas, celulares, huesosas, &c. *D.* El grosor de una avejilana en fricciones,

POMADA DE HIDRIODATO DE HIERRO (*Pierquin*).

Hidriodato de hierro, *dracma y media*.

Manteca, *una onza*.

H. S. A. D. El grueso de una nuez para dar fricciones mañana y tarde en la parte superior é interna de cada muslo.

POMADA CON EL HIDROCLORATO DE ORO
(*Chrestien*).

Hidroclorato de oro, *doce granos*.

Manteca, *una onza*.

Mézclese.

POMADA DE HIDRIODATO DE POTASA
(*Magendie*).

Manteca, *una onza*.

Hidriodato de potasa, *media dracma*.

H. S. A. I. Bócio, escrófulas, tumores indolentes é infartos crónicos de las glándulas. *D.* Se dan fricciones sobre el tumor y despues se le cubre con papel empapado en la misma pomada.

La pomada de hidriodato de potasa de los hospitales de Madrid se diferencia de la anterior en que contiene onza y media de manteca en lugar de una onza.

POMADA DE HIDRIODATO DE POTASA IODURADA
(Coindet).

Se añade á la pomada anterior
Todo, diez granos.

I. y D. Las mismas que la anterior.

POMADA DE HIDROBROMATO DE POTASA.

Hidrobromato de potasa, un escrúpulo.
Manteca, una onza.

II. S. A. I. Infartos escrofulosos. D. De media á una dracma en fricciones sobre las partes enfermas. Nota. Se puede emplear el hidrobromato de sosa en lugar del de potasa. Añadiendo á las dosis indicadas de seis á doce granos de bromo, se tiene la pomada de hidrobromato de potasa bromurado.

POMADA DE HOLLIN (Blaud).

Hollin, una dracma.

Manteca, cuatro dracmas.

Mezclese. I. Herpes ulcerados, tiña, &c.

OTRA (Caron de Villards).

Tuétano de vaca, una onza.

Extracto de hollin de leña, cincuenta y cuatro granos.

Ungüento cetrino, *doce granos.*

Accite de hígado de bacalao, *dos escrúpulos.*

Mezclese. *D.* El grosor de la cabeza de un alfiler sobre los párpados que han quedado enrojecidos por la oftalmia variolosa.

POMADA DE HOLLIN CONTRA LA TIÑA
(*Lublache*).

Manteca, *cuatro onzas.*

Hollin en polvo, *c. s.*

para dar á la manteca un color pardo oscuro. Se la somete durante veinte y cuatro horas á una ligera ebullicion.

Se cortan los cabellos y se cubre la cabeza con una cataplasma. Se lava la cabeza con el cocimiento de hollin de Maud y despues se la cubre con la pomada. Se necesitan de quince á veinte dias para la curacion.

POMADA LLAMADA DE LOS HOSPITALES MILITARES
contra la sarna.

Manteca, *diez libras y ocho onzas.*

Azufre sublimado, *dos libras y ocho onzas.*

Sal marina decrepitada, *diez y seis onzas.*

Se porfirizan las sales con un poco de grasa, en seguida se funde la grasa y despues se mezcla todo en un barreño barnizado. *D.* Una onza cada dia en fricciones. *Nota.* Esta pomada cura en catorce ó quince dias.

POMADA DE IODO.

Iodo, *media dracma*.

Manteca, *onza y media*.

H. S. A. I. Se usa en fricciones en los tumores indolentes, bubones que han terminado por induración, &c.

POMADAS IODURADAS.

	N.º 1.	N.º 2.	N.º 3.	N.º 4.
Iodo. . . .	12 gr.	18 gr.	22 gr.	25 gr.
Ioduro de potasio. . .	100 gr.	150 gr.	187 gr.	187 gr.
Manteca purificada. .	17 dr.	17 dr.	17 dr.	17 dr.

Se mezclan íntimamente. *I. Escrófulas.*

POMADA DE IODURO DE ARSÉNICO (*Bielt*).

Ioduro de arsénico, *tres granos*.

Manteca, *una onza*.

H. S. A. I. Herpes corrosivos tuberculosos. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes enfermas. *Nota.* El uso de esta pomada exige mucha circunspección.

POMADA DE IODURO DE AZUFRE,

Ioduro de azufre, *dos dracmas.*

Manteca, *cuatro onzas y media.*

H. S. A. I. Ciertas afecciones cutáneas de naturaleza escrofulosa. *D.* La misma que las anteriores.

POMADA DE IODURO DE BARIO (*Bielt*).

Ioduro de bario, *cuatro granos.*

Manteca, *una onza.*

H. S. A. I. Ciertos casos de infartos escrofulosos. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al día sobre las partes enfermas con una dracma de pomada.

POMADA IODURADO-OPIADA (*Lemasson*).

Iodo, *quinze granos.*

Ioduro de potasio, *una dracma.*

Se mezclan en un mortero de porcelana y se añade:

Manteca, *dos onzas.*

Láudano de Rousseau, *dos dracmas.*

I. Ulceras escrofulosas. *D.* Se extiende esta pomada sobre una planchuela.

POMADA DE IODURO DE PLOMO.

Ioduro de plomo, *una dracma.*

Manteca, *una onza.*

M. I. Se usa para curar las úlceras escrofulosas.

POMADA DE IODURO DE ZINC (*Ure*).

Manteca, *una onza.*

Ioduro de zinc, *una dracma.*

H. S. A. I. Reemplaza en ciertos casos á la pomada de hidriodato de potasa. *D.* Se dan fricciones dos ó tres veces al día sobre las partes enfermas con una dracma de esta pomada.

POMADA IODO-NARCÓTICA ALCANFORADA.

Hidriodato de potasa, *un escrúpulo.*

Extracto de beleño. } *a. diez y ocho gr.*
 — de cicuta. }

Alcanfor, *cuatro granos.*

Manteca, *dos dracmas y media.*

Iodo, *un grano.*

Mézclese. Se usa como tópico sedante en las úlceras sifilíticas, cancerosas y escrofulosas.

POMADA IRRITANTE (II. M.).

Tártaro emético, *tres dracmas.*

Alcanfor, *dos dracmas.*

Azufre sublimado, *una dracma.*

Se trituran y se añade:

Manteca de puerco, *una onza.*

II. S. A. Se cubre con ella el sitio prescrito y se aplica encima una cataplasma emoliente.

POMADA DE JAMES ó pomada de laurel real.

Aceite esencial de laurel real, *dos dracmas.*

Manteca, *dos onzas.*

M. I. Sirve para calmar los dolores lancinantes de los cánceres.

POMADA PARA LOS LABIOS ó cerato de rosa.

Aceite de almendras dulces, *dos onzas.*

Cera blanca, *una onza.*

Raiz de ancusa, *una dracma.*

Esencia de rosa, *doce gotas.*

Se calientan las materias en el baño maría hasta que el cuerpo graso haya tomado un color rojo, se cuele con expresion y se añade la esencia de rosa.

I. Sequedad y grietas de los labios.

POMADA DE LAUREL.

Hojas recientes de laurel, *diez y seis onzas.*

Bayas de laurel, *diez y seis onzas.*

Manteca de puerco, *treinta y dos onzas.*

H. S. A. I. Dolores reumáticos. *D.* En fricciones.

POMADA DE LUPULINA (*Freake*).

Lupulina en polvo, *una onza.*

Se digiere en el baño maría durante cinco á seis horas en:

Manteca, *tres onzas.*

Se cuele y se guarda.

I. Se usa como sedante en los dolores cancerosos.

POMADA DE LYON.

Ungüento rosado, *una onza.*

Deutóxido de mercurio, *media dracma.*

H. S. A. I. y D. Se estiende ligeramente esta pomada sobre los bordes de los párpados infartados, que destilan un humor mucoso que los pega durante el sueño.

POMADA DE MELIER.

Sub-carbonato de sosa, *dos onzas.*

Agua, *una onza.*

Se disuelve en caliente y se añade:

Aceite comun, *cuatro onzas.*

Se forma un jabon y se incorpora con:

Flores de azufre, *cuatro onzas.*

ó bien

Alcanfor, *media onza.*

I. Sarna. D. Dos fricciones al día con dos onzas de pomada durante doce á catorce dias.

POMADA DE MERCURIO AMONIACAL.

Pomada mercurial doble, *doce dracmas.*

Hidroclorato de amoniaco, *cuatro dracmas.*

M. I. Exóstosis traumático. *D.* De media á una dracma, mañana y tarde.

POMADA MERCURIAL (*Jadelot*).

Jabon blanco raspado, *una parte.*

Aceite comun, *dos partes.*

Proto-cloruro de mercurio preparado al vapor, *una parte.*

Se añade al jabon la octava parte de su peso de agua y se le ablanda en el baño maría. Se le diluye en aceite y se le añade el mercurio dulce en frio. *I.* Se usa como antisifilítico y anti-
tiepsórico.

POMADA MERCURIAL DE MANTECA DE CACAO
(*Planche*).

Mercurio purificado. } *a. una onza*
Manteca de cacao muy reciente. }
Aceite de huevos muy reciente, *veinte gotas.*

M. S. A. I. y D. Se emplea en los mismos casos y á las mismas dosis que el unguento mercurial doble, pero es de un uso mas agradable.

POMADA MERCURIAL OPIADA.

Ungüento de mercurio. } *a. partes iguales.*
Cerato opiado. }

M. I. Segundo período de la peritonitis puerperal. *D.* Una dracma en fricciones sobre el abdomen, dos ó tres veces al dia. *Nota.* Ricord emplea esta pomada en los casos en que el unguento mercurial irrita mucho.

POMADA DE NITRATO DE PLATA (*Guthrie*).

Nitrato de plata cristalizado y porfirizado,
tres granos.

Manteca, *una dracma.*

Acetato de plomo liquido, *cinco gotas.*

M. exactamente. *I.* Oflalmias escrofulosas, catarrales, crónicas, &c. *D.* El grueso de una cabeza de alfiler, tres ó cuatro veces al dia, sobre el borde libre de los párpados.

POMADA OFTÁLMICA.

Ungüento rosado, *una onza.*

Precipitado rojo, *treinta y seis granos.*

Mezclese. *I.* Oftalmias crónicas. *D.* Se usa como la pomada oftálmica de Grand-Jean, solo que es mas suave.

OTRA.

Ungüento napolitano, *dos dracmas.*

Opio en bruto, *seis granos.*

Extracto de beleño, *doce granos.*

Mezclese. Se usa como la pomada oftálmica de Sichel.

OTRA (*Carron de Villards*).

Manteca de higado de raya, *una onza.*

Cianuro de hierro, *veinte y cuatro granos.*

— de mercurio, *ocho granos.*

Aceite esencial de espliego, *cuatro gotas.*

Mezclese sobre un pórfido. *I.* Conjuntivitis escrofulosa crónica. Se usa en fricciones á dosis muy pequeñas.

OTRA (*Dupuytren*).

Manteca de puerco, *dos onzas.*

Oxido rojo de mercurio, *diez granos.*

Sulfato de zinc, *veinte granos.*

H. S. A. I. Oftalmias crónicas y rebeldes sostenidas por una afección escrofulosa general. *D.* Se cubre ligeramente el borde de los párpados.

La composición de la *pomada antioftálmica* de los hospitales militares es igual á la de la anterior.

POMADA OFTÁLMICA (*Jadelot*).

Manteca reciente, *dos dracmas*.

Mercurio precipitado blanco, *doce granos*.

Alecanfor, *ocho granos*.

Tucia preparada, *quince granos*.

Manteca de cacao, *media dracma*.

M. S. A. I. Oftalmias escrofulosas. *D.* Se pone en el borde de los párpados gruesos como una cabeza de alfiler, cada dos ó tres días, en el momento de acostarse.

OTRA (*Sichel*).

Manteca, *una dracma*.

Precipitado rojo, *quince granos*.

Se mezclan y se añade:

Sulfato de cadmio, *dos granos*.

Mezclase. Se usa para disminuir las cicatrices en la córnea. *D.* Dos ó tres fricciones al día sobre el borde libre de los párpados inferiores, con el grueso de la cabeza de un alfiler de la mezcla.

POMADA OFTÁLMICA (*Sichel*).

Ungüento mercurial, *dos dracmas*.

I. Fotofobia y conjuntivitis muy agudas. *D.* El grosor de una avellana para dar fricciones cinco ó seis veces al día en la parte superior de la frente.

OTRA (*Sichel*).

Ungüento napolitano, *dos dracmas*.

Extracto de belladona, *una dracma*.

M. I. Oftalmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. *D.* El grosor de una nuez para dar fricciones, cinco ó seis veces al día, en la parte superior de la frente.

OTRA (*Velpeau*).

Manteca, *una dracma*.

Nitrato de plata, *dos granos*.

Mezclese. *I.* Oftalmias granulares. *D.* El grosor de un guisante en el borde libre de los párpados inferiores.

POMADA OFTÁLMICA (*Janin*).

Manteca sin sal, *media onza*.

Tucia } *a. dos dracmas.*

Bol arménico. }

Precipitado blanco, *una dracma*.

Se lava muchas veces la manteca en agua de rosas, y se la mezcla despues muy exactamente en un mortero de vidrio con las demás sustancias pulverizadas.

I. Oftalmias crónicas. *D. C. s.* para cubrir muy ligeramente el borde libre de los párpados.

OTRA (*Regent*).

Azafran, *dos onzas*.

Agua de rosas, *diez libras y ocho onzas*.

Se macera durante veinte y cuatro horas y se cuele con expresion.

Por otra parte se toman:

Alcanfor, *dos dracmas*.

Aguardiente, *c. s.*

Se disuelve y se vierte la disolucion encima del líquido de la maceracion; se pone despues en la mezcla:

Manteca de vacas (despojada previamente de la leche que contiene por la malaxacion en agua fresca de pozo), *cinco libras y ocho onzas*.

Se maceran despues durante cuatro dias, se

separa luego la manteca del agua y se incorpora *S. A.*:

Deutóxido de mercurio porfirizado.	} <i>a. cuatro onzas.</i>
Acetato de plomo cristalizado y porfirizado. .	

I. y D. Las mismas que las anteriores.

POMADA OPIADA.

Opio en polvo, *de una á dos dracmas.*

Cerato, *cuatro onzas.*

M. I. Sirve para curar las heridas y úlceras muy dolorosas, y para dar unturas en ciertas pústulas y en los tumores venéreos.

POMADA OXIGENADA Ó NÍTRICA (F. E.).

Manteca, *ocho onzas.*

Se derrite en una vasija ancha de porcelana y se echa poco á poco:

Acido nítrico puro á 32°, *una onza.*

Se menea con una espátula de madera hasta que no desprendan vapores rojos; entonces se aparta del fuego, se menea mucho y cuando está fría se echa en moldes de papel y se guarda para cuando haya de usarse.

I. Sarna y herpes.

La *pomada oxigenada* de los Hospitales militares se diferencia de la anterior en que contiene seis dracmas de ácido nítrico.

POMADA PARA LAS GRIETAS DE LOS PECHOS
(*Chevallier*).

Manteca de cacao, *media onza*.

Accite de almendras dulces, *dos dracmas*.

Mucilago de pepitas de membrillos, *dos dracmas*.

H. S. A. D. C. s. para cubrir ligeramente y muchas veces al dia los puntos enfermos.

POMADA DE PEPINO.

Es la grasa de puerco y de vaca cargada de los principios aromáticos del pepino fresco, del benjuí y del agua de rosas.

Se usa como cosmético y como vehículo de las pomadas medicamentosas.

POMADA DE PIMIENTA.

Pimienta negra en polvo fino, *una parte*.

Manteca, *cuatro partes*.

M. Esta pomada se usa como rubefaciente.

POMADA DE PLOMBAGINA (*Maerker*).

Plombagina, *dos dracmas*.

Sulfato de zinc, *cincuenta y seis granos*.

Manteca, *una onza*.

Mezclese. Se usa tópicamente.

POMADA DE PRINGLE.

Manteca, *dos onzas y media.*

Azúfre, *una onza.*

Eléboro blanco. . . . } *a. dos dracmas.*
 Sal amoniaco. . . . }

Nota. Es probable que el azafran sea enteramente inútil en esta composición; por consiguiente se le podría suprimir y limitarse á verter la disolución alcohólica de alcanfor en el agua de rosas. Respecto de esta última, después de la separación de la manteca, se la conserva para ser destilada el año siguiente sobre nuevas rosas.

II. S. A. I. Sarna. D. Una onza al día en fricciones. *Nota.* Esta pomada cura comúnmente en quince ó veinte días.

POMADA DE PROTO-IODURO DE MERCURIO
 (*Bielt*).

Proto-ioduro de mercurio, *diez y ocho granos.*

Manteca purificada, *una onza.*

M. I. Ulceras venéreas. D. Diez y ocho granos para una fricción.

OTRA (*Magendie*).

Manteca, *onza y media.*

Proto-ioduro de mercurio, *veinte granos.*

H. S. A. I. y D. Se ha alabado esta pomada en el tratamiento de las úlceras venéreas inveteradas, cuya cicatrización acelera según se asegura.

POMADA DE PROTO-NITRATO DE MERCURIO
(*Bielt*).

Proto-nitrato de mercurio, *un escrúpulo.*

Manteca purificada, *una onza.*

Mézelese. *I.* Sarna y lepra.

POMADA DE PROTO-CLORURO DE MERCURIO
AMONIACAL (*Bielt*).

Proto-cloruro de mercurio amoniacal, *media dracma.*

Alcanfor, *diez granos.*

Cerato amigdalino, *una onza.*

M. I. Acne y síosis.

POMADA PURGANTE.

Coloquintida en polvo, *una dracma.*

Manteca, *una onza.*

M. I. Se usa en fricciones sobre el abdomen á la dosis de dos draemas.

POMADA RESOLUTIVA.

Calomelanos. } *a. media onza.*
Cebolla albarrana. }

Manteca, *dos dracmas.*

Aceite de rosas, *cuatro gotas.*

M. I. Se usa en fricciones en los infartos crónicos de las articulaciones.

POMADA RESOLUTIVA (*Bielt*).

Proto-cloruro de mercurio. } *a. dos escrúpu-*
 Acetato de plomo. } *los.*

Manteca purificada, *media onza.*

Aleanfor, *seis granos.*

Mézlense. *I.* Tubérculos.

POMADA RESOLUTIVA (*Dupuytren*).

Sal amoniaco en polvo, *una dracma y diez y ocho granos.*

Ungüento mercurial, *tres onzas.*

Mézlense. *I.* Infartos escrofulosos. *D.* El grueso de una avellana en fricciones, mañana y tarde.

La misma composición en las proporciones siguientes:

Sal amoniaco, *dos dracmas y media.*

Ungüento mercurial, *siete dracmas y media,* se usa contra los exóstosis traumáticos y los tumores que sobrevienen al rededor de la rótula, en las personas que tienen la costumbre de estar mucho tiempo de rodillas.

POMADA RESOLUTIVA (*Sandelin*).

Cloruro de calcio, *tres dracmas*.

Polvo de digital, *seis dracmas*.

Vinagre fuerte, *dos dracmas*.

Manteca, *tres onzas*.

I. Infartos glandulares crónicos. *D.* De una á dos dracmas en fricciones.

POMADA RUBEFACIENTE.

Cantáridas en polvo, *una dracma*.

Alcanfor, *una dracma*.

Manteca, *una onza*.

Mézclense exactamente. *I.* Crup. *D.* De una á dos dracmas en fricciones al rededor del cuello.

POMADA SEDANTE (*Dupuytren*).

Acetato de plomo en polvo. }
Extracto de belladona. . . } *a. una dracma.*

Manteca, *seis dracmas*.

Mézelese. *I.* Grietas del ano. *D.* Se engrasa una mecha de un volumen conveniente que se introduce en el ano. Se aumenta poco á poco el grosor de la mecha.

POMADA DE SULFURO DE MERCURIO (*Bielt*).Sulfuro de mercurio, *media dracma*.Alcanfor, *diez granos*.Cerato simple, *una onza*.

I. Erupciones vesico-pustulosas en estado crónico.

POMADA SULFURO-JABONOSA (*Lugol*).Azufre sublimado. . . . } *a. dos onzas.*

Jabon blanco. . . . }

Se funde el jabon en *c. s.* de agua y se añade poco á poco el azufre. *I. Sarna.*

POMADA DE TANATO DE PLOMO (*Yoll*).Tanato de plomo seco, *dos dracmas*.Manteca, *una onza*.

Mézclese. *I.* Ulceras gangrenosas. Se prepara el tanato de plomo, precipitando por el acetato de plomo un cocimiento de corteza de roble.

POMADA DE TANINO.

Grasa de puerco reciente, *onza y media*.Tanino. } *a. dos dracmas.*

Agua pura. }

Se disuelve el tanino en *c. s.* del agua prescrita, triturándolos juntos en un mortero de

vidrio; se les añade la grasa y se mezclan exactamente.

I. Atonía de las úlceras, relajacion de ciertos órganos y hernias de los niños.

POMADA DE WERLHOF.

Calomelanos, *una dracma.*

Ungüento rosado, *una onza.*

I. Sarna.

POMADA PARA EL TACTO.

Blanco de ballena, *una parte.*

Cera amarilla, *una parte.*

Aceite de olivas, *diez y seis partes.*

Sosa cáustica, *una parte.*

Se funden el blanco de ballena y la cera en aceite, á un calor lento, en un barreño barnizado. Se añade la sosa cáustica y se agita hasta el enfriamiento.

Se usa esta pomada para hacer los reconocimientos en la época del parto.

POMADA DE THIERRY.

Ungüento populeon, *ocho onzas.*

— basilicon, *tres onzas.*

Cera amarilla, *dos onzas.*

Se liquida todo, se menea y se añaden:
Cantáridas reducidas á polvo fino, *media onza.*

I. y D. Esta pomada es epispástica y sirve para mantener abiertos los vejigatorios.

POMADA DE TURBIT (*Alibert*).

Manteca, *treinta y dos onzas.*

Sulfato sobresaturado de mercurio (turbit mineral), *dos onzas.*

Se reduce el sulfato á polvo muy fino, se funde la manteca á un calor lento, se la incorpora el polvo y se la menea con una mano de mortero hasta que la grasa se haya enfriado enteramente. Se la conserva en una vasija de loza.

I. Herpes escamosos y crustáceos. *D. C.* s. para dar fricciones ligeras en las partes enfermas.

POMADA DE WILLAR.

Carbonato de potasa, *media onza.*

Sulfuro rojo de mercurio. } *a. una onza.*

Agua de rosas. } *a. una onza.*

Esencia de bergamota, *media onza.*

Azufre sublimado. } *a. nueve onzas.*

Manteca. } *a. nueve onzas.*

M. I. Sarna.

POMADA DE VERATRINA (*Magendie*).

Veratrina, *cuatro granos.*

Manteca, *una onza.*

H. S. A. I. Neuralgias, reumatismo crónico, anasarca y gota. *D.* De una á dos dracmas en fricciones.

PURGANTE DE CALOMELANOS.

Calomelanos, *doce granos.*

Miel blanca y dura, *dos dracmas.*

M. D. De una vez. Es el modo mas cómodo de administrar los calomelanos.

PURGANTE DE LEROY.

Primer grado.

Escamonea de Alepo, *onza y media.*

Raiz de turbit, *seis dracmas.*

Jalapa, *seis onzas.*

Aguardiente de 20º, *diez y seis libras.*

Se infunden las sustancias reducidas á polvo durante doce horas en un baño maría á la temperatura de veinte grados, se cuele y se añade el jarabe siguiente:

Sen, *seis onzas.*

Agua hirviendo, *veinte y cuatro onzas.*

Se infunde durante cinco horas, y despues de exprimido se cuele, se añaden cuatro libras de azúcar terciada y se hace *S. A.* un jarabe.

Esta tintura puede representarse aproximadamente por la siguiente:

- Tintura de escamonea , *una onza.*
 — de turbit , *media onza.*
 — de jalapa , *cuatro dracmas.*
 Jarabe de sen , *dos onzas y media.*

Segundo grado.

- Escamonea de Alepo , *dos onzas.*
 Raiz de turbit , *una onza.*
 Jalapa , *ocho onzas.*
 Aguardiente de veinte grados , *diez y seis libras.*

Se prepara del mismo modo que la anterior,
 y se añade el jarabe preparado con :

- Sen , *ocho onzas.*
 Agua hirviendo , *treinta y dos onzas.*
 Azúcar terciada , *cuarenta onzas.*

Tercer grado.

- Escamonea de Alepo , *tres onzas.*
 Raiz de turbit , *onza y media.*
 Jalapa , *doce onzas.*
 Aguardiente de 21° , *diez y seis libras.*

Se prepara como las anteriores y se añade el
 jarabe preparado con :

- Sen , *doce onzas.*
 Agua hirviendo , *cuatro libras.*
 Azúcar terciada , *treinta y dos onzas.*

Cuarto grado.

- Escamonea de Alepo , *cuatro onzas.*
 Raiz de turbit , *dos onzas.*

Jalapa , *treinta y dos onzas.*

Aguardiente de 22º , *diez y seis libras.*

Se prepara como las anteriores y se añade el jarabe preparado con:

Sen , *diez y seis onzas.*

Agua hirviendo , *cuatro libras y ocho onzas.*

Azúcar terciada , *dos libras.*

Este remedio drástico puede convenir en todos los casos en que el médico juzgue estan indicados los drásticos ; pero ignorantes empíricos han abusado de él y han sucumbido numerosas víctimas á consecuencia de su imprudente administracion, habiendo caído en descrédito una fórmula que en muchos casos puede ser útil.

D. De una á cuatro cucharadas al día.

RACAHOUT DE LOS ÁRABES.

Hace algunos años que se vende con este nombre un polvo alimenticio que se compone con la bellota de una especie de encina exótica, el *palamoud de los Arabes*. Esta harina, examinada con cuidado en dos épocas diferentes por dos personas (Kerrouman y Cottereau) que la han analizado separadamente, ha presentado variaciones notables en su composicion. En el primer caso no ha presentado mas que cacao, harina de avena mondada, azúcar y una pequeña cantidad de estoraque calamita; en el segundo ha sido reconocida como un compuesto de los elementos siguientes :

Cacao tostado, *dos onzas.*

Fécula de patata, *cinco onzas.*

Salep, *una onza.*

Azúcar, *ocho onzas.*

Vainilla, *c. s.*

Nota. Kerrouman ha visto un pedazo en que al parecer la goma tragacanto reemplazaba al salep. *I. y D.* Esta harina, empleada como analéptica en los mismos casos que el chocolate, se usa para preparar un caldo muy claro, ya con agua, ya con leche, á la dosis de una, dos ó tres cucharadas por ocho á doce onzas de líquido.

RATAFÍA DE LOS CARIBES.

Aguardiente de azúcar, *seis cuartillos.*

Resina de guayaco, *dos onzas.*

Se machaca la resina y se la hace digerir en el aguardiente durante quince días.

I. Gota blanda. *D.* Media onza al día. *Nota.* Endulzando y aromatizando este aguardiente se obtiene un licor agradable.

RATAFÍA DEL COMENDADOR DE COUMARTIN, *contra las arenillas.*

Se compone de aguardiente, *trece libras y siete onzas*; azúcar, *treinta y dos onzas y cinco dracmas*; raíces de gatuña, cinorrodon, malvabisco, sello de Salomon y cardo corredor, *a. dos onzas*; raíz de consuelda mayor y bayas de

enebro, *a. una onza*; nuez moscada, *seis dracmas*; y semillas de anís, *una dracma*. Se maceran las raíces en el aguardiente durante quince días, se cuela con expresión, se funde el azúcar en el líquido y se filtra.

D. Un vaso pequeño, mañana y tarde. *Nota.* Se auxilia este remedio por el uso de una infusión de hinojo de mar (pasa piedra, cresta marina) *crithmum maritimum*.

QUINTA ESENCIA ANTIÉPSÓRICA ó agua de
Mettemberg.

Sublimado, *una dracma y cuatro granos*.

Agua pura, *treinta y cuatro onzas*.

Se disuelve y se añade:

Acido hidroclórico alcoholizado, *una onza y media dracma*.

I. Sarna. Se usa en locciones.

Algunos creen que esta fórmula tiene por base al nitrato de mercurio.

QUINTA ESENCIA DE AJENJOS.

Sumidades secas de ajenjos, *una onza*.

— — de ajenjo pónico, *una onza*.

Clavo machacado. } *a. media onza.*
Azúcar. }

Alcohol á 21°, *diez y seis onzas*.

Se usa como estomacal. *D.* Una á dos onzas.

REMEDIOS.

REMEDIOS DE ALIBERT *contra la ténia.*

Se da por bebida habitual á los enfermos el cocimiento siguiente :

Raiz de helecho macho , *cuatro onzas.*

Agua comun , *cuatro libras.*

Se hierve y se reduce por la ebullicion á dos cuartillos y despues se añade:

Jarabe de coralina de Córcega , *dos onzas.*

Tres horas despues de la comida se administra el bolo siguiente:

Mercurio dulce. } *a. tres granos.*

Cuerno de ciervo calcinado. }

Conserva de rosas, e s.

Por la tarde se da una onza de aceite de almendras dulces.

Al segundo dia se prescribe el purgante siguiente :

Escamonea en polvo , *diez y ocho granos.*

Raiz de helecho macho en polvo , *una onza.*

Gutagamba. } *a. doce granos.*

Mercurio dulce. }

Se toma en una sola dosis en agua azucarada ó mezclada con vino.

REMEDIO DE BICKER *contra la tiña.*

Oxido de antimonio sulfu- rado anaranjado.	} <i>a. partes iguales.</i>
Proto-cloruro de mercurio.	
Azúcar blanca.	

D. De medio á un grano dos veces al dia. Se dan fricciones, mañana y tarde, sobre las partes enfermas con el unguento siguiente:

Manteca fresca, *once dracmas.*

Acetato de cobre.	} <i>a. un escrúpulo.</i>
Proto-cloruro de mercurio.	

Nota. Las costras se caen muy pronto, fro-tándolas con un cepillo ordinario; se lava des-pues la cabeza con agua tibia, jabon y sulfuro de potasa. Luego que ha desaparecido la tiña, debe lavarse mucho tiempo la cabeza con una diso-lucion tibia de sub-carbonato de potasa.

REMEDIO DE BORDIER *contra la iénia.*

Por la tarde el enfermo toma una panatela con yema de huevo. Al dia siguiente por la ma-ñana en un vaso de un cocimiento fuerte de he-lecho:

Éter sulfúrico, *una dracma.*

Cinco minutos despues se usa una lavativa con el mismo cocimiento, al cual se añade:

Éter sulfúrico, *dos dracmas.*

Una hera despues se da el purgante si-guiente:

Accite de ricino , *dos onzas.*

Jarabe de flores de albérchigo , *una onza,*
cuya accion se auxilia con algunas tazas de caldo
de yerbas.

NOTA DE GUILBERT SOBRE EL TRATAMIENTO
DE LA TENIA.

Este profesor en su práctica no dirige en general ningun medio de tratamiento contra la solitaria; ha observado que este animal parásito puede existir largo tiempo en la economía sin determinar ningun accidente, con tal que se tenga cuidado de alimentar mucho á los enfermos. En un gran número de sugetos que ha tenido ocasion de observar, los purgantes drásticos eran la principal causa de la enfermedad. Por consiguiente ha abandonado la ténia á sí misma, persuadido de que concluye por desaparecer espontáneamente. Sin embargo, cuando la lombriz llega á producir accidentes graves, lo que sucede alguna vez, prefiere el tratamiento de Bourdier.

REMEDIO CONTRA LAS FLORES BLANCAS
(*Doctor Kopp*).

Cocimiento de ratania , *doce onzas.*

Extracto de ratania , *cuatro dracmas.*

Tintura de catecú. . . } *a. dracma y media*
— de kino. . . }

M. D. Se introduce en la vagina una esponja empapada en este líquido astringente y se renueva todos los dias la aplicacion hasta la perfecta curacion.

REMEDIO CONTRA LA TENIA DE MATHIEU, *farmacéutico de Berlín, y del Doctor Kuttlinger. Publicado por orden del colegio de médicos de Prusia.*

ELECTUARIO A.

Limaduras de estaño puro de Cornualles,
una onza.

Polvo de raiz de helecho macho, *seis dr.*

Semillas de ajenos, *cuatro dracmas.*

Polvo de raiz de jalapa. }
Sulfato de potasa. . . } *a. una dracma.*

Miel, *c. s.*

para dar á la mezcla la consistencia conveniente.

ELECTUARIO B.

Raiz de jalapa en polvo. }
Sulfato de potasa. . . } *a. dos escrúpulos.*

Polvo de escamonea de Alepo, *un escrúpulo.*

Gutagamba en polvo, *diez granos.*

Miel, *c. s.*

El enfermo debe alimentarse ligeramente durante el uso de estos medios, evitar los alimentos salinos y no tomar mas que panatelas, legumbres y frutas bien cocidas.

Se le da cada dos horas una cucharada de café del electuario A, y se continúa de este modo durante dos á tres dias, hasta que experimente en los intestinos sensaciones determinadas comunmente por la presencia de la ténia.

Entonces se hace tomar el electuario B del mismo modo que el anterior hasta que salga la ténia. En el caso en que no se verifique esta espulsion, se la provoca por algunas cucharadas de aceite de ricino, ó bien se le administra una lavativa con una onza de este aceite.

En general se debe regular la dosis de estos remedios, segun la edad, el sexo y la constitucion del enfermo.

REMEDIO CONTRA LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS
POR LOS HONGOS.

Acibar sucotrino, *dos onzas y media.*

Mirra, *onza y media.*

Resina de guayaco, *diez dracmas.*

Se ponen estas sustancias cada una aparte en

Aguardiente, *diez y seis onzas.*

Se muncan diariamente las botellas durante doce á quince dias, despues se decantan los líquidos y se los mezcla (1). *D.* Inmediatamen-

(1) El residuo de esta mezcla es bueno para curar las heridas y las contusiones.

te que se siente la menor incomodidad despues de haber comido los hongos, se toma una copa de este remedio y cada vez que se vomita se toma medio vaso. Algun tiempo despues que han cesado los vómitos, se bebe té muy azucarado. Este elíxir conviene tambien en las indigestiones, en los cólicos de estómago y del bajo vientre y en la supresion de las reglas por debilidad. Es vulnerario y se emplea contra la gota y los dolores reumáticos.

**REMEDIO CONTRA EL ENVENENAMIENTO
POR LOS HONGOS.**

Se debe emplear un vomitivo, tal como el tartrato de potasa antimoniado; se le debe administrar á dosis suficiente, asociarle á alguna sal propia para escitar la accion del estómago y diluir y dividir el humor mucoso, cuya secrecion se vuelve mas abundante por la impresion de los hongos.

Se hará beber la *disolucion emeto-catártica* tibia á vasos, dejando mas ó menos intervalo de tiempo, aumentando las dosis hasta que el enfermo haga evacuaciones. Desde los primeros instantes el vómito basta á veces para llevar consigo todos los hongos y hacer cesar los accidentes; pero si se ha diferido dar los socorros convenientes, si no han sobrevenido los acciden-

tes hasta muchas horas despues de la comida, se debe presumir que parte de los hongos venenosos ha pasado á los intestinos, y entonces se usará con buen éxito una mistura hecha con aceite de ricino y jarabe de flores de melocoton, que se aromatizará con algunas gotas de licor mineral de Hoffmann y se hará tomar á cucharadas con intervalos mas ó menos grandes.

Despues de estas evacuaciones, que son de una necesidad indispensable, es necesario recurrir al uso de los mucilaginosos y de los dulcificantes, que se asociarán á los fortificantes para remediar los dolores y la irritacion producida por el veneno. Por esta razon se prescribirá el agua de arroz gomosa y una ligera infusion de flores de saúco mezclada con leche, á la cual se añadirá agua de flores de naranjo, agua simple de yerbabuena y un jarabe. Se usarán tambien con buen éxito las emulsiones y las pociones aceitosas aromatizadas con cierta cantidad de éter sulfúrico. En algunos casos se recurrirá á los tónicos y á las pociones alcanforadas, y cuando haya tension dolorosa en el vientre se emplearán fomentos emolientes, algunas veces baños y las sangrías.

REMEDIO CONTRA LA GOTA (*Turk*).

Lejía de sosa cáustica á 8º, *veinte cuartillos*.

Se satura con:

Alúmina en jalea, *c. s.*

Se añade:

Goma arábica, *siete onzas*.

Trementina de Chio, *seis onzas y dos dr.*

Aceite comun, *tres onzas y una dracma.*

Alcohol de 36º alcanforado, *ocho onzas*.

REMEDIO CONTRA EL TIALISMO.

Sulfato de sosa, *cincuenta partes*.

Carbon, *diez partes*.

Azufre, *seis partes*.

Se funden en un crisol cubierto, se lava, se filtra y se hace cristalizar.

D. Un escrúpulo, cuatro veces al día, contra la salivacion ocasionada por el mercurio.

Nota. Se usa tambien este remedio en las enfermedades del hígado, que se han hecho crónicas.

REMEDIO DE DUBOIS *contra la ténia*.

El dia antes por la tarde se da una panatela.

Al dia siguiente por la mañana en una taza de caldo de yerbas,

Polvo de helecho, *media onza*.

Una hora despues se hace tomar en tres bolos , de hora en hora , la masa siguiente:

Jalapa.	} <i>a. seis granos.</i>
Diagridio.	
Gutagamba.	
Escamonea.	

Se hace beber todo el resto del dia caldo de yerbas.

REMEDIO DEL DOCTOR BARLOW *contra la tiña.*

Agua de cal , *siete onzas y media.*
 Sulfuro de sosa reciente , *tres onzas.*
 Jabon medicinal , *media onza.*
 Alcohol rectificado , *dos dracmas.*
 Jabon medicinal , *dracma y media.*
 Mezclense exactamente y fíltrese.

L. Se lava muchas veces la cabeza del enfermo con este agua , mañana y tarde. Se la deja secar sin tocarla. Las costras se desprenden , se caen y dejan las partes subyacentes perfectamente sanas. No es necesario cortar los pelos ni afeitar la cabeza para hacer uso de esta agua.

REMEDIO DEL DOCTOR COINDET DE GINEBRA
contra el bocio.

Agua destilada , *una onza.*
 Hidriodato de potasa , *media dracma.*
 Iodo , *diez granos.*

H. S. A. D. Se dan á los adultos seis gotas, tres veces al dia, en una tacita de agua azucarada. Al mismo tiempo se dan fricciones sobre el tumor con la pomada de hidriodato de potasa iodurado. Se usa este remedio contra el bocio, las escrófulas, los tumores indolentes y los infartos crónicos de las glándulas.

REMEDIO DE MADAMA NOUFFER *contra la ténia ó lombriz solitaria.*

El dia antes, por la tarde, el enfermo come una buena panatela. Por la mañana toma tres dracmas de raíz de helecho macho en polvo muy fino y diluido en seis onzas de tisana de helecho ó de flores de tilo. Se cuele dos ó tres veces la misma tisana á su vasito para que no deje polvo. Dos horas despues se toma un bolo purgante compuesto de:

Panacea mercurial.	} <i>a. diez granos.</i>
Resina de escamonea.	
Gutagamba,	<i>seis granos.</i>
Confeccion de jacintos,	<i>c. s.</i>

Se divide comunmente esta cantidad en tres bolos iguales.

D. Uno para los niños, dos para las personas nerviosas y delicadas y tres para los adultos vigorosos, con un cuarto de hora de intervalo de una á otra toma.

Nota. Se debe beber detrás de cada bolo una ó dos tazas de infusion de te.

REMEDIO DE POUGENS *contra los sabañones.*

Almendras amargas recientes, *cuatro onzas.*

Miel, *tres onzas.*

Alcanfor. } *a. dos dracmas.*

Harina de mostaza. } *a. una dracma.*

Alumbre calcinado. . } *a. una dracma.*

Incienso en polvo. . } *a. una dracma.*

Yemas de huevo, *número dos.*

Se mezclan y se hace una especie de pomada.

Se frotran los sabañones no ulcerados, dos ó tres veces al día.

REMEDIO DE PURMANN *contra los tumores crónicos de las articulaciones.*

Disolucion de hidrociorato de sosa, *treinta y dos onzas.*

Vinagre concentrado, *un cuartillo.*

Sulfato de cobre, *onza y media.*

— de alúmina en polvo, *cinco dracmas y media.*

Hojas de salvia, *dos puñados.*

Se hierven durante media hora. *D. C. s.* aplicada tibia al rededor de las articulaciones hinchadas.

REMEDIO DE QUARIN *contra la disenteria.*

Agua de flores de amapola , *un cuartillo.*

Jarabe de malvabisco , *una onza.*

Polvo de salicaria , *dracma y media.*

H. S. A. D. Tres onzas y media cada tres horas.

REMEDIO DE QUARIN *contra la disenteria maligna.*

Agua de toronjil , *ocho onzas.*

Jarabe de kermes , *una onza.*

Catecú , *tres dracmas.*

Alcanfor triturado con goma arábica , *ocho granos.*

M. S. A. D. A cucharadas de hora en hora, cuando se juzga á propósito suspender las evacuaciones.

REMEDIO DE QUARIN , *cuando son insuficientes los anteriores.*

Conserva de rosas rojas. } *a. seis dracmas.*
 Jarabe de arándano. }

Polvo de raíz de tormentila , *una dracma.*

— — — de ipecacuana , *media dr.*

Opio purificado , *cuatro granos.*

M. S. A. D. Una dracma cada dos horas.

REMEDIOS VERMÍFUGOS DE BREMSER.

Núm. 1.º *Electuario.*

Santónico machacado ó bien semillas ó mejor flores de tanaceto, *media onza.*

Polvo de valeriana silvestre, *dos dracmas.*

— de raíz de jalapa. } *a. de dr. y media*
Sulfato de potasa. . . } *á dos dracmas.*

Ojimiél escilitico, *c. s.*

Núm. 2.º *Especies para lavativas.*

Ajenjos. } *a. una onza.*

Raiz de valeriana, . . } *a. una onza.*

Semillas de tanaceto. } *a. media onza.*

Cáscaras de naranjas. } *a. media onza.*

Divídanse y mezclense.

En dos cucharadas de estas sustancias se vierte un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante la noche, se cuele, se exprime y se usa la infusión para dos lavativas. A cada una se añade una cucharada de aceite em-pireumático.

Núm. 3.º *Polvo purgante.*

Polvo de raíz de jalapa, *un escrúpulo.*

— de hojas de sen, *media dracma.*

Sulfato de potasa, *una dracma.*

Se dividen en tres ó cuatro dosis iguales, que se toman de hora en hora, ó por medias

dosis cada media hora , hasta que obre el remedio.

*Núm. 4.º Aceite antihelmintico de Chabert.
Véase página 293 , tomo 1.º*

Núm. 5.º Tintura fortificante.

Tintura de malato de hierro , una onza.

Elixir vitriólico de Mynsicht , media dr.

Tintura de acibar compuesta de la farmacopea austriaca , una dracma.

D. Diez , veinte , treinta gotas y aun mas, tres ó cuatro veces al dia , en un poco de agua ó vino. Aunque hay descomposicion en esta mezcla , el autor asegura que no por eso obra con menos eficacia.

APLICACION DE LOS REMEDIOS.

Contra el tricocéfalo y los oxiuros se administra una cucharada de café del electuario número 1.º , mañana y tarde , y dos lavativas pequeñas del número 2.º ; para las personas poco irritables se añade una cucharada de bilis de buey reciente. Se continúa durante muchas semanas.

Contra los oxiuros introducidos en la vagina se usan inyecciones de agua fria acidulada con vinagre.

Contra las ascárides se usa una ó dos cu-

charadas de café del electuario número 1, mañana y tarde. Cuando se necesitan dos pociones se purga, reemplazando momentáneamente el electuario por el polvo purgante número 3.

Contra el botriocéfalo y la ténia se usan dos ó tres cucharadas de café al día del electuario número 1, y se pasa despues al uso del aceite número 4, dado á la dosis de una ó dos cucharadas, mañana y tarde; se le mezcla con un poco de agua y aun mejor con jarabe de limon. Cuando el enfermo ha tomado de este modo dos onzas y media á tres de este aceite, se le da el polvo número 3. Se empieza de nuevo con el uso del aceite hasta que haya tomado de seis á siete onzas. Este tratamiento es largo, pero el autor le considera seguro. Cuando hay predisposición á la formacion de flemas, administra durante algunas semanas la tintura número 5.

ROB DEPURATIVO.

Zarzaparrilla, *ocho onzas.*

Corteza de dafne mecereon, *cuatro onzas.*

Se infunden en *c. s.* de agua hasta obtener cuatro cuartillos de líquido colado. Se disuelven despues en él:

Azúcar, *diez libras y ocho onzas.*

Proto-ioduro de hierro, *ocho escrúpulos.*

D. Se toman dos á seis cucharadas al día en la sífilis constitucional.

ROB DEPURATIVO (*Duvergie*).

Bardana.	} <i>a. treinta y dos onzas?</i>
Paciencia.	
Hojas de saponaria.	
Guayaco raspado.	
Sen, <i>ocho onzas.</i>	
Miel.	} <i>a. trece libras y cua-</i>
Azúcar.	
Agua, <i>treinta cuartillos.</i>	

H. S. A. D. Tres cucharadas al día en las afecciones sifilíticas.

RODOMEL CIDONIADO CONTRA EL TIALISMO
(*Rahi, Formulario de Barcelona*).

Semillas de membrillo, *una onza.*

Se hierven en dos libras de agua hasta que se reduzca la tercera parte; se añade al líquido colado:

Sub-borato de sosa, *tres dracmas.*

Rodomel (1), *dos onzas.*

D. Se usa en gargarismos cinco ó seis veces al día.

(1) Sinónimo de *miel rosada*.

SACAROLADOS.

SACAROLADO DE CITRATO DE HIERRO (*Beral*).

Azúcar en polvo, *once onzas*.

Citrato de peróxido de hierro líquido, *una onza*.

Se mezclan exactamente, se seca la mezcla en la estufa y se la reduce á polvo. *Nota.* Se puede aromatizar este sacarolado con seis gotas de aceite esencial de limon, y reemplazar el citrato líquido por el citrato en polvo.

D. De media á una dracma sola ó en un vehículo apropiado.

SACAROLADO DE GELATINA DE LIQUEN (*Beral*).

Gelatina alcohólica de liquen, *treinta y cuatro onzas*.

Azúcar pulverizada groseramente, *sesenta y cuatro onzas*.

Se mezclan, triturando en un mortero de mármol, despues se deja secar en la estufa ó al calor del baño maría, meneando frecuentemente la masa.

Nota. El azúcar, cargado de este modo del principio gelatinoso del liquen, no tiene amargor y se disuelve completamente y con facilidad en el agua hirviendo.

I. Se usa ventajosamente para preparar la jalea y las tabletas ó pastillas de Beral.

SACARURO DE BERRO DE PARÁ. *V. Azúcar de berro de Pará.*

SACARURO DE EXTRACTO DE CAINCA. *V. Azúcar de extracto de cainca.*

SALES.

SAL ESENCIAL DE LAGARAYE *ó extracto seco de quina.*

Para obtener este extracto se usa con preferencia la quina gris, que contiene mas materias extractivas que las demás quinas, y que suministra un extracto seco de hermoso aspecto.

Se usa mas bien como tónico que como febrífugo. *I. y D. V. Quina. (Posologia).*

SAL DE GUINDRE.

Sulfato de sosa eflorescido, *seis dracmas.*

Nitrato de potasa, *doce granos.*

Tártaro emético, *medio grano.*

I. y D. Se funde esta mezcla en dos cuartillos de tisana ó de caldo de yerbas para tomar á vasos como purgante por la mañana de hora en hora.

SAQUITO RESOLUTIVO.

Sal amoniaco.	} <i>a. una onza.</i>
Cal apagada.	

Se mezclan y se coloca entre dos capas de algodón; se pone todo en un pedazo de muselina, con el que se rodeará el cuello de los enfermos que padecen bocio.

SINAPISMOS.

SINAPISMO Ó CATAPLASMA DE MOSTAZA.

Harina de mostaza, *ocho onzas.*

Agua tibia, *c. s.*

M. Cuando se los quiere hacer mas activos se espolvorean con :

Hidroclorato de amoniaco, *una onza.*

I. Se usa como rubefaciente y revulsivo. *Nota.* No debe usarse agua hirviendo para la preparacion de los sinapismos, porque no se desarrolla el aceite esencial bajo su influencia; á la temperatura de 40° es mas rápida la trasformacion de la sinapisina en aceite volátil que á la temperatura ordinaria.

SINAPISMO PARA LAS PLANTAS DE LOS PIES ó *cataplasma discuciente de mostaza (F. E.).*

Levadura agria, *onza y media.*

Polvos de mostaza, *cuatro onzas.*

Muriato de amoniaco, *una dracma.*

Yerba reciente de ruda machacada, *media onza.*

Vinagre bueno, *c. s.*

para formar una pasta blanda.

I. Se usa como rubefaciente en las afecciones soporosas, &c. *Nota.* Debe usarse agua tibia en lugar de vinagre, porque los ácidos vegetales, que marcan cuando menos 3^o en el arcómetro, se oponen á la formación del aceite volátil, principio activo de la mostaza.

SINAPISMO MITIGADO ó *cataplasma sinapizada.*

Cataplasma emoliente, *cuatro onzas.*

Se espolvorea con:

Harina de mostaza, *cuatro dracmas.*

I. Estos sinapismos son menos irritantes que los anteriores, y se usan con preferencia para determinar una derivación prolongada mas bien que fuerte.

SODA POWDER (*Paris*).

Carbonato saturado de sosa, *media dracm.*

Acido tartárico, *veinte y cinco granos.*

Para un vaso que contenga ocho onzas de agua.

Nota. Solo se debe emplear polvos secos y tan finos como sea posible; y cualquiera que sea el número de las dosis pesarlas todas separadamente, teniendo cuidado de envolver el ácido en papel azul para distinguirlo de la sal de sosa. (Véase *Limonada gaseosa en polvo*, página 322, tomo II.)

SONDAS.

Solo se diferencian de las bujías en que son huecas y estan abiertas por los dos extremos. Se preparan con tejidos de seda sumergidos diferentes veces en una mezcla de una parte de aceite de lino hecho secante por el litargirio, la tercera parte de sucino, la cuarta parte de aceite de trementina y una vigésima de cautchú.

Se las deja secar al aire ó en la estufa y se las pulimenta con piedra pomez.

Recientemente Charriere las ha preparado con marfil elástico, es decir, con marfil privado de gran parte de su principio solidificable (el fosfato de cal) por medio del ácido hidroc্লórico.

SUEROS.

SUERO.

Leche de vacas, *dos cuartillos.*

Se calienta la leche hasta la ebullicion, y se añade poco á poco la cantidad suficiente de una disolucion hecha con

Acido tartárico, *una parte.*

Agua, *ocho partes.*

Cuando esté bien formado el coágulo, se cuela con expresion; se pone el suero al fue-

g6 con la mitad de una clara de huevo, que estará diluida y batida con algunas cucharadas de agua fria, se calienta hasta la ebullicion, se echa un poco de agua fria para calmar el hervor, se cuele por una estameña y por último se filtra por un papel, que se habrá lavado previamente en agua hirviendo. Se puede coagular la leche con otros ácidos y mejor aun con el cuajo.

El *cuajo líquido* puede componerse de

Cuajo reciente, *una libra.*

Sal marina, *dos onzas.*

Alcohol á 31°, *dos onzas.*

Vino blanco, *ocho cuartillos.*

Se digiere durante veinte y cuatro horas y se filtra.

Una cucharada de café basta para cuajar dos cuartillos de leche.

El suero es una bebida atemperante que se prescribe en las enfermedades inflamatorias y sobre todo en las del conducto digestivo. Comunmente se le asocia al jarabe de violetas y sirve de vehículo á medicamentos mas activos.

SUERO PREPARADO (F. E.).

Leche recién ordeñada, *c. s.*

Se la mezcla poco á poco con flor de cardo ó con cualquier ácido vejetal en una vasija de barro vidriada á fuego lento para que se cuaje la leche. Se echa el coágulo en la manga pa-

ra que destile el suero, y se cuecla dos ó tres veces.

SUERO CLARIFICADO (F. E.).

Suero extraído del modo anterior, *una libra*.
Tartrato acidulo de potasa muy puro y pulverizado, *medio escrúpulo*.

Se agita con una yema de huevo y se añade poco á poco al suero hirviendo suero no calentado. Se cuecla por una manga y, si no estuviere el líquido colado bastante claro, se vuelve á colar el suero cuando esté medio frio.

SUERO ANTIESCORBÚTICO.

Zumo de coclearia, *cuatro onzas*.

Leche de vacas, *un cuartillo*.

Se cuece y se cuecla despues de coagulado.

D. A tazas pequeñas al dia.

OTRO (Boerhaave).

Acederilla. } *a. un puñado.*

Betónica. }

Claveles, *medio puñado*.

Tamarindos, *onza y media*.

Se infunde durante una hora en caliente en
Suero clarificado, *cuatro libras*.

Se cuecla y se añade:

Jarabe de limones. . . } *a. onza y media.*
 — de violetas. . . }

D. Dos ó tres cucharadas cada media hora.

SUERO ARTIFICIAL.

Polvo para suero, *tres dracmas.*

Agua, *dos cuartillos.*

Se disuelve y se añade:

Vinagre. } *a. diez y ocho gr.*
 Jarabe de espino cerval. }

SUERO EMETIZADO.

Emético, *de medio á un grano.*

Suero, *diez y seis onzas.*

Se usa á tazas como ligero laxante.

SUERO FACTICIO.

Azúcar de leche, *tres onzas.*

Muriato de sosa, *dos onzas.*

Nitrato de potasa, *cuatro dracmas.*

Goma arábica en polvo, *cuatro dracmas.*

Azúcar en polvo, *ocho onzas.*

Flores de alazor en polvo, *media dracma.*

Mezclense exactamente *S. A.* para hacer un polvo homogéneo; entonces se toma del

Polvo precedente, *dos dracmas.*

Vinagre, *media dracma.*

Agua filtrada, *un cuartillo.*

H. S. A.

SUERO CASEOSO.

Suero clarificado, *veinte onzas.*

Gas ácido carbónico seis veces el volúmen del suero.

Se usa como diluyente y refrigerante; facilita la evacuacion de las flemas y mucosidades del estómago.

SUERO GASEOSO Y PURGANTE.

Su composicion es idéntica al del anterior, pero contiene

Tartrato acidulo de potasa soluble, *media á una onza.*

Es purgante y conviene á las personas de constitucion débil.

SUERO NITRADO.

Sal de nitro, *diez y ocho granos.*

Suero clarificado, *dos cuartillos.*

D. Se da á tazas en diferentes veces al dia. Es diurético y refrigerante.

SUERO PURGANTE.

Maná, *una onza.*

Cremor de tártaro, *media onza.*

Suero clarificado, *seis onzas.*

M. D. Se da en dos ó tres veces, dejan-

do de dos horas de intervalo entre cada toma.

SUERO DE WEIS, *reformado*.

Foliculos de sen.	} <i>a media drac.</i>
Sal de Epsom.	
Sumidades de hipericon.	} <i>a. un escrúpulo.</i>
— de gálio.	
Flores de saúco.	

Suero hirviendo, *un cuartillo*.

Se infunde y se cuele. *I.* Se ha alabado este remedio como un excelente antilechoso y en las enfermedades de la piel.

D. Se toma por la mañana en tres ó cuatro dosis.

SUERO TAMARINDADO.

Pulpa de tamarindos, *una onza*.

Suero, *un cuartillo*.

Se hierve y cuele. *I.* Se usa como minorativo y refrigerante. *D.* A vasos.

SULFURO DE CAL (*Pihorel*).

Sulfuro de cal, *dos dracmas*.

I. Sarna. D. Se pone la dosis indicada de sulfuro en polvo en la palma de la mano, se le añade una pequeña cantidad de aceite y se dan fricciones en las manos y en las muñecas.

Nota. Este remedio cura comunmente en diez y ocho ó veinte y dos dias.

SUPOSITORIOS Ó CALAS.

SUPOSITORIO ALOÉTICO ó *cala aloética.*

Manteca de cacao, *dos dracmas.*

Acibar, *diez y ocho granos.*

H. S. A. un supositorio, que se usa para provocar el flujo hemorroidal.

SUPOSITORIO ANODINO ó *cala anodina* (H. DE M.).

Miel, *dos onzas.*

Opio, *cuatro granos.*

H. S. A. dos calas.

SUPOSITORIO ANTIESPASMÓDICO ó *cala antiespasmódica.*

Polvo de castoreo, *media dracma.*

Manteca de cacao, *dos dracmas.*

H. S. A. un supositorio.

Si se pone un grano de extracto de opio en lugar del castoreo, se tiene un *supositorio calmante.*

SUPOSITORIO ANTIHELMINTICO ó *cala antihelmintica.*

Miel cocida hasta la consistencia necesaria, *cuatro onzas.*

Acibar, *media onza.*

Vitriolo de marte, *dos dracmas.*

H. S. A. supositorios de doce granos de peso. Se conservan despues de untados de aceite y secos.

Se aplican á los niños despues de haber hecho las deposiciones de vientre.

El *supositorio antihelmíntico* de los hospitales de Madrid se compone de acibar sucotrina y raíz de ásaro, *a. dos dracmas*; sal gema, *un escrúpulo*; y miel espesada, *dos onzas*.

Se preparan *S. A.* supositorios de doce á quince granos, que se conservan en aceite.

SUPOSITORIO PARA PROVOCAR LAS HEMORROIDES.

Acibar en polvo.	} <i>a. un escrúpulo.</i>
Sal gema.	
Polvo de coloquintida, <i>cinco granos.</i>	

H. S. A. un supositorio.

SUPOSITORIO ANTIELMÍNTICO (*Swediaur*).

Acibar sucotrina, *media onza.*

Sal comun, *tres dracmas.*

Harina, *dos dracmas.*

Miel, *c. s.*

Se forma una pasta firme, que se modela en forma de cono.

SUPOSITORIO, CALA COMUN Ó CALA COMUN
DE MIEL (F. E.).

Miel, *dos onzas*.

Se cuece á fuego lento hasta que se ponga dura, y, cuando está acabando de cocer, se añade:

Muriato de sosa pulverizado, *dos dracmas*.

Se mezclan muy bien, y sobre una tabla ó piedra untada de aceite se forman dos calas cónicas, pendientes de un hilo doble.

La *cala comun* de los hospitales de Madrid contiene una dracma de muriato de sosa y *ca.* s. de miel.

SUPOSITORIO CONTRA LAS HEMORROIDES.

Manteca de vacas fresca, *dos dracmas*.

Corcho quemado. } *a. una dracma.*
Cera. }

H. S. A. tres supositorios.

SUPOSITORIO DE COPAIBA (*Colombat*).

Bálsamo de copaiba sólido. } *a. una dr.*
Manteca de cacao. }

Extracto de opio, *medio grano*.

Se prepara un supositorio. Se aplica uno por la mañana y otro por la noche contra la blenorrea y leucorrea crónicas.

SUPOSITORIO FORTIFICANTE (*Reuss*).

Polvo de raíz de tormentila. }
 — de corteza de encina. } *a. dos dr.*

Miel, *c. s.*

H. S. A. ocho supositorios.

I. Se usan en la caída del recto, en la debilidad de este intestino y después de las hemorragias.

SUPOSITORIO IRRITANTE ó *cala irritante*
(*F. E.*).

Miel cocida hasta que esté dura, *una onza.*

Polvo de coloquintida, *media dracma.*

— de muriato de sosa, *una dracma.*

Se mezcla y sobre una tabla ó piedra untada de aceite se hace una *cala*. *I.* Se usa en las enfermedades soporosas.

La *cala irritante* de los hospitales de Madrid se diferencia de la anterior en que solo contiene dos escrúpulos de muriato de sosa.

SUPOSITORIO DE JABON ó *cala de jabon.*

Se prepara cortando en forma de cono con un cuchillo un pedazo de jabon medicinal. Se usa como laxante.

SUPOSITORIO LAXANTE.

Jabon medicinal, *dos onzas.*

Sal comun, *una onza.*

Miel espesada, *c. s.*

M. y prepárense *S. A.* conos del grosor conveniente, que se introducen en el ano.

SUPOSITORIO PURGANTE ó *cala purgante.*

Manteca de cacao, *una dracma:*

Aceite de tártago, *siete gotas.*

II. S. A. un supositorio. Se usa cuando no puede administrarse interiormente el aceite de tártago.

TABLETAS.

TABLETAS DE ACEITE DE CROTON TIGLIO.

Aceite de croton tiglio, *cinco gotas.*

Se le divide en un mortero de porcelana con:

Almidon, *veinte y cuatro granos.*

Azúcar, *una dracma.*

Se incorpora todo en

Pasta caliente de chocolate con vainilla, *dos dracmas.*

Se mezcla exactamente y se preparan treinta píldoras, que se aplastan ligeramente sobre

una lámina de hoja de lata calentada. Cada tableta contiene un sexto de gota de aceite de croton tiglio. Se necesitan de seis á doce para obtener una abundante purgacion.

TABLETAS DE ÁCIDO LÁCTICO (*Magendie*).

Acido láctico, *dos dracmas*.

Azúcar, *una onza*.

Vainilla, *diez y ocho granos*.

Mucílago, *c. s.*

H. S. A. tabletas de á media dracma. Se dan cuatro al dia en los casos de dispepsia y cálculos de fosfato de cal.

TABLETAS ANTICARRALES (*Tronchin*).

Azúcar blanca, *treinta y dos onzas*.

Goma arábica en polvo, *ocho onzas*.

Extracto de regaliz por infusion, *dos onzas*.

Kermes mineral. . . . } *a. una onza y un*

Semillas de anís. . . . } *escrúpulo.*

Extracto gomoso de opio, *doce granos*.

Mucílago de goma tragacanto, *c. s.*

H. S. A. tabletas de á seis granos. *I. y D.* Se toman de seis á ocho al dia, cuando se quiere escitar la expectoracion.

TABLETAS ANTIHELMINTICAS.

Sulfato de hierro, *media dracma*.

Santónico, *dracma y media*.

Azúcar, *seis dracmas*.

Mucilago de goma arábiga, *c. s.*

H. S. A. treinta y dos tabletas. *D.* Dos ó tres al día (esta dosis es para un niño de siete á ocho años).

TABLETAS ANTIMONIALES (*Kunkel*).

Almendras dulces, *dos onzas*.

Azúcar, *diez y seis onzas*.

Semillas de cardamomo menor, *una onza*.

Canela, *media onza*.

Sulfuro de antimonio porfirizado, *una onza*.

Goma tragacanto, *dos dracmas*.

Se pulverizan las almendras y el azúcar, se añaden los demás polvos y con *c. s.* de mucilago se hacen tabletas de á doce granos.

I. Enfermedades cutáneas, reumatismo y gota. *D.* De cuatro á diez al día.

TABLETAS DE AZUFRE SIMPLES.

Azufre lavado, *una onza*.

Azúcar en polvo, *ocho onzas*.

Goma tragacanto, *una dracma*.

Agua de rosas, *una onza*

Se hace un mucilago con el agua de rosas y la goma del modo ordinario, y se preparan pastillas de á diez y ocho granos.

I. Enfermedades herpéticas. *D.* De una á cuatro dracmas.

TABLETAS DE AZUFRE COMPUESTAS.

Azufre lavado, *seis dracmas.*

Flores de benjuí, *treinta granos.*

Lirio de Florencia, *cien granos.*

Aceite de anís, *veinte granos.*

Azúcar, *diez y seis onzas.*

Mucilago de goma tragacanto, *c. s.*

II. S. A. D. De media á dos dracmas. *I.*

Se usan en los mismos casos que las anteriores.

TABLETAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ.

Bálsamo de Tolú. } *a. una onza.*

Alcohol de 34°. }

Azúcar, *diez y seis onzas.*

Goma tragacanto, *cuatro escrúpulos.*

Agua destilada, *dos onzas.*

H. S. A. tabletas de á diez y seis granos. *D.*

De cuatro á seis al día.

TABLETAS DE CALABRIA (*Manfredi*).

Maná de Calabria puro, *seis onzas.*

Raiz de malvabisco, *tres onzas.*

Azúcar blanca, *ocho libras.*

Extracto acuoso de opio, *doce granos.*

Agua de flores de naranjo, *tres onzas.*

Aceite volátil de bergamota, *diez gotas.*

Agua de fuente, *cuatro cuartillos.*

Se hierve la raíz de malvabisco con el agua durante seis minutos, se añaden el maná y el

azúcar, se cuele y se clarifica con una clara de huevo, se añade el extracto de opio y se cuece hasta la consistencia de conserva. Hacia el fin de la operación, se añaden el aceite volátil y el agua de flores de naranjo; se echa después la masa espesada en un cuadrado de papel dado de aceite y, antes que sea completo el enfriamiento, se corta en pedacitos cuadrados de dos líneas de espesor por seis líneas de anchura.

I. Toses pertinaces, coqueluche, bronquitis, catarro pulmonal crónico y tisis. *D.* De una á dos dracmas y mas en las veinte y cuatro horas.

TABLETAS DE CARBON Y CHOCOLATE

(*A. Chevalhier*).

Chocolate en polvo, *tres onzas.*

Carbon vegetal lavado y potfirizado.	} <i>a. una onza.</i>
Azúcar blanca.	

II. S. A. y empleando *c. s.* de mucilago de goma tragacanto preparado con agua de flores de naranjo se hacen tabletas de á doce granos de peso.

I. Se usan para destruir el mal olor del aliento; se emplean algunas veces con buen éxito contra los esputos de pus y la tisis. *D.* De seis á doce al dia.

TABLETAS DE CATECÚ.

Extracto de catecú , *cuatro onzas.*

Azúcar blanca , *diez y seis onzas.*

Mucílago de goma tragacanto , *c. s.*

para hacer tabletas de á doce granos.

I. Fetidez del aliento ; se usan como estomacales. *D.* De tres á diez y mas al dia.

. TABLETAS DE CIANURO DE ORO Y CHOCOLATE.

Cianuro de oro , *un grano.*

Pasta de chocolate , *ciento veinte granos.*

Se mezclan exactamente en un mortero de mármol calentado y se dividen en diez y seis tabletas.

I. Enfermedades sífilíticas y enfermedades escrofulosas. *D.* Una diariamente y se aumenta una cada ocho dias.

TABLETAS DE CLORURO DE CAL ó tabletas
desinfectantes (A. Chevalhier).

Cloruro de cal seco , *doce granos.*

Azúcar , *una onza.*

Goma tragacanto en polvo , *veinte granos.*

Se divide el cloruro de cal en un mortero de vidrio ; se le trata por el agua en pequeña cantidad ; se usa este líquido para convertir el azúcar y la goma en una masa homogénea , que

se divide en tabletas de diez y ocho á veinte granos de peso. *Nota.* Se las puede aromatizar, mezclando al azúcar un aceite volátil, según la prescripción del práctico.

I. Se emplean para destruir el mal olor del aliento; se usan algunas veces con éxito en la tisis. *D.* De seis á ocho al día.

TABLETAS DE CLORURO DE CAL (*Deschamps*).

Cloruro de cal seco, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *ocho onzas.*

Almidon, *una onza.*

Goma tragacanto en polvo, *una dracma.*

Carmin, *tres granos.*

II. S. A. tabletas de diez y ocho á veinte granos. *I. y D.* Las mismas que las anteriores.

TABLETAS CONTRA EL BOCIO (*Dubois*).

Esponja en polvo, *media onza.*

Carbonato de sosa, *dos dracmas.*

Canela, *una dracma.*

Azúcar, *doce dracmas.*

Mucílago de goma tragacanto, *c. s.*

II. S. A. tabletas de á diez granos.

TABLETAS DE ESPONJA TOSTADA.

Esponja tostada en polvo, *cuatro onzas.*

Azúcar blanca, *doce onzas.*

Mucílago de goma tragacanto hecho con agua de canela, *c. s.*

H. S. A. tabletas de á doce granos. *I.* Bocio y escrófulas. *D.* De dos á cuatro.

TABLETAS DE GELATINA DE LIQUEN (*Beral*).

Sacarolado de liquen en polvo, *diez y seis onzas.*

Azúcar en polvo, *catorce onzas.*

Sacaruro de vainilla en polvo, *dos onzas.*

Mucílago de goma arábica reducido á la cuarta parte, *cerca de cuatro onzas.*

H. S. A. tabletas de figura orbicular y de á diez y ocho granos de peso. Cada onza de estas tabletas contiene diez y ocho granos de gelatina seca, que corresponden á dos dracmas de gelatina blanda.

D. De dos á cuatro dracmas y mas en el espacio del dia.

TABLETAS DE LIQUEN Ó PASTILLAS DE LIQUEN
(*Robinet*).

Polvo de liquen azucarado, *ocho onzas y media.*

Azúcar en polvo, *diez y siete onzas.*

Agua, *dos onzas.*

Se ponen en un mortero el agua y una parte del polvo de liquen; se hace un mucílago, al cual se añade despues el resto del polvo y por último el azúcar. Entonces se forman *S. A.* tabletas de á doce granos de peso.

D. La misma que las anteriores.

TABLETAS INCISIVAS PECTORALES.

Azúcar en polvo, *diez y seis onzas.*

Maná en lágrimas, *cuatro onzas.*

Tridacio, *dos dracmas.*

Ipecacuana en polvo, *media onza.*

Cebolla albarrana en polvo, *una dracma.*

Mucílago de goma tragacanto, *c. s.*

H. S. A. tabletas de a diez y ocho granos. Se dan cinco ó seis al dia contra los romadizos y catarros crónicos.

TABLETAS DE IPECACUANA Y CHOCOLATE Ó DE DAUBENTON.

Ipecacuana en polvo, *una onza.*

Chocolate de vainilla, *doce onzas.*

Se liquida el chocolate á un calor suave, se le incorpora el polvo de ipecacuana y se divide en masas pequeñas de á trece granos, que se arrollarán en bolas, á las que se hará tomar una figura hemisférica, teniéndolas durante algunos instantes sobre una hoja de lata calentada.

I. Se dan como vomitivas á los niños, y bastan tres ó cuatro para producir este efecto.

TABLETAS DE KERMES.

Kermes, *dos dracmas.*

Azúcar, *diez y siete onzas.*

Goma arábica. } *a. una onza.*
 Agua de flores de naranjo. }

Cada una contiene un sexto de grano de kermes. *I.* Asma húmedo y catarros pulmonales crónicos. *D.* De una á doce y aun mas.

TABLETAS DE MAGNESIA.

Magnesia calcinada, *tres onzas.*

Azúcar, *trece onzas.*

Mucilago de goma tragacanto, *c. s.*

Se preparan tabletas de diez y seis granos.

I. Agrios del estómago y atonía de los órganos digestivos. *D.* De seis á doce.

TABLETAS DE MAGNESIA Y DE CATECÚ.

Magnesia calcinada, *dos onzas.*

Catecú, *una dracma.*

Azúcar, *trece onzas.*

Mucilago de goma tragacanto preparado con agua de canela, *c. s.*

Se preparan tabletas de á diez y seis granos, de las cuales cada una contiene un grano de catecú y dos de magnesia.

D. Seis ó siete.

TABLETAS MARCIALES.

Oxido negro de hierro, *una onza.*

Canela, *dos dracmas.*

Azúcar, *cinco onzas.*

Mucilago de goma tragacanto, *c. s.*

H. S. A. tabletas de á doce granos.

Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, &c. *D.* De dos á seis al dia.

TABLETAS MARCIALES Ó TABLETAS DE HIERRO.

Limaduras de hierro porfirizadas, *una onza.*

Azucar blanca, *diez onzas.*

Canela en polvo, *dos dracmas.*

Mucílago de goma tragacanto, *e. s.*

H. S. A. tabletas de á doce granos. *I.*

Amenorrea, escrófulas, clorosis, &c. *D.* Tres ó cuatro al dia.

TABLETAS PURGANTES PARA LOS NIÑOS.

Chocolate de salud, *diez y seis onzas.*

Jalapa, *seis dracmas.*

Mercurio dulce, *una dracma.*

H. S. A. tabletas de á dracma. *D.* Una para un niño de uno ó dos años, y dos para los de tres á seis años.

TABLETAS DE QUINA.

Quina en polvo, *dos onzas.*

Canela, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *catorce onzas.*

Mucílago de goma tragacanto, *e. s.*

Se preparan tabletas de á diez y seis granos, de las cuales cada una contendrá dos granos de quina. *D.* De dos á seis al dia.

TABLETAS DE RUIBARBO.

Ruibarbo en polvo , *una onza.*

Azúcar , *once onzas.*

Mucilago preparado con agua de canela , *c. s.*

Se preparan *S. A.* pastillas de á doce granos.

I. Se usan como estomacales. *D.* Tres ó cuatro al dia.

TABLETAS DE SUB-NITRATO DE BISMUTO
(*Trousseau*).

Sub-nitrato de bismuto , *una onza.*

Azúcar , *diez y seis onzas.*

Mucilago de goma tragacanto , *c. s.*

H. S. A. tabletas de á diez y ocho granos.

Convienen principalmente á los niños.

TABLETAS VERMÍFUGAS DE SANTÓNICO.

Sulfato de hierro en polvo , *una dracma.*

Santónico en polvo , *tres dracmas.*

Azúcar blanca en polvo , *dos onzas.*

Se mezclan y se añade:

Mucilago de goma tragacanto , *c. s.*

H. S. A. sesenta y cuatro tabletas. Se dan de seis á ocho al dia.

TABLETAS DE VIDA.

Confeccion de alquermes, *una onza.*

Ambar gris. } *a. dos dracmas.*
 Almizcle. }

Azúcar, *diez y seis onzas.*

Mucílago de goma tragacanto, *c. s.*

II. tabletas S. A.

I. Convienen para restaurar las fuerzas en los ancianos y en los convalecientes. *D.* Se da una ó dos dracmas al dia.

TAFETANES.

TAFETAN VEJIGATORIO.

Se concentra en una retorta la tintura alcohólica de cantaridas; cuando está muy concentrada, se la extiende por medio de un pincel y en caliente sobre tafetan estirado por medio de un bastidor. Se deja secar el tafetan y se le cubre de una segunda capa y despues de otra tercera.

OTRO.

Éter acético, *dos onzas.*

Cantaridas en polvo, *onza y media.*

Se infunden durante ocho dias, se decanta y se disuelve:

Colofonia, *dos dracmas.*

Se aplica sobre un hule.

TAFETAN VEJIGATORIO (*Guilbert*).

Agua, *cuatro libras*.

Corteza de torbisco, *seis dracmas*.

Se hierve, se cuela y se añade:

Cantáridas en polvo.	} <i>a. seis onzas.</i>
Mirra escogida.	
Euforbio en polvo.	

Se hierven con el líquido. Se cuela por una tela doble cruda, y se concentra bastante para estender este líquido caliente por medio de un pincel sobre el tafetan.

TAFETAN VEJIGATORIO DE TORBISCO.

Cera blanca.	18	} <i>cuarenta y ocho partes.</i>
Aceite comun.	9	
Galipodio.	21	

Extracto alcohólico de torbisco, *una parte*.

Alcohol de 32°, *seis partes*.

Se funden la cera y el aceite y se añade la disolucion alcohólica del extracto. Se evapora el alcohol á fuego lento, se añade el galipodio y se cuela al través de un tejido de lana.

Se impregna de esta mezcla papel, tela ó tafetan en una ó en las dos caras.

Se obtiene el papel número 2, que es mas activo, haciendo uso de la fórmula siguiente:

Del escipiente anterior, *treinta y dos partes*.

Extracto de torbisco, *una parte*.

Alcohol de 33°, *seis partes*.

TARTRATO DE POTASA Y HIERRO.

Bitartrato de potasa en polvo, *ocho onzas y media.*

Agua destilada, *treinta y cuatro onzas.*

Peróxido de hierro recién preparado, *c. s.*

Se mezclan el agua y el bitartrato en una cápsula de platino y se calienta hasta el grado de ebullición; entonces se añade tanto peróxido de hierro húmedo cuanto pueda disolver el líquido; se le satura después con

Potasa cáustica líquida, *c. s.*

Se filtra y se concentra de modo que se obtengan veinte onzas de líquido.

Nota. Para obtener esta sal en estado sólido, después de haber concentrado el tartrato líquido hasta la consistencia de jarabe, se le deseca sobre las paredes de un perol que se agita en todos sentidos, encima de un fuego moderado, hasta que se desprenda en escamas. En este estado es sólido, trasparente, de color oscuro y muy soluble en el agua. Es necesario guardarle en un frasco bien tapado, porque atrae un poco la humedad del aire. Se usa en píldoras; puede servir para preparar bebidas ferruginosas, y se puede preparar con él, del mismo modo que con el citrato, un jarabe y un sacarolado. *D.* De seis granos á media dracma bajo la forma de píldoras ó disuelto en un vehículo apropiado.

TÉ PECTORAL (*Boerhaave*).

Raiz de clavo de montaña, *dos onzas.*

— de regaliz, *onza y media.*

Verónica. } *a. un puñado.*

Yedra terrestre. }

Flores de hipericon, *tres pulgaradas.*

— de centaurea menor, *dos pulgaradas.*

Semillas de hinojo, *tres dracmas.*

Macháquense y mezclense.

I. Se le ha recomendado en la tisis pulmonal. Se usa del mismo modo que el té, y se le dulcifica con miel purificada. *D.* Tres ó cuatro tazas al dia.

TÉ TUNKA.

Flores de meliloto, *dos onzas.*

— de manzanilla. }

— de saúco. } *a. diez y siete escrú-*

Hojas de botris. } *pulos.*

Se maceran durante ocho dias en dos cuartillos de alcohol á veinte grados; se cuele y despues se mezcla de la

Tintura anterior, *una parte.*

Jarabe de culantrillo, *dos partes.*

I. Es estomacal y antiespasmódico, y puede reemplazar á las tisanas en las enfermedades asténicas; es bueno en las indigestiones, dolores reumáticos, vapores y retardo de las reglas.

D. Una cucharadita de café por taza de agua caliente.

TESORO PARA LA BOCA.

Alcoholato de coclearia, } *a. seis onzas y dos*
 — de espliego. . . } *dracmas.*
 — de yerbabuena, } *a. tres onzas y una*
 — de limon. . . } *dracma.*

M. D. Una cucharada de café en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

TINTURAS.

TINTURA DE ACEITE DE CROTON TIGLIO.

Accite de croton tiglio, *diez y seis gotas.*
 Alcohol rectificado, *una onza.*

H. S. A. D. Veinte gotas en una taza de tisana de harina de avena.

TINTURA DE ACIBAR COMPUESTA (F. A.).

Tintura de acibar, } *a. dos partes.*
 — de mirra, }
 — de azafran, *una parte;*

M. I. Se usa como emenagogo. **D.** De un escrúpulo á una dracma en un vehículo apropiado.

TINTURA ALCOHÓLICA DE CAINCA.

Alcohol hidrolizado á veinte grados, *diez y siete onzas.*

Raiz de cainca en polvo, *dos onzas y una dr.*

Se macera *S. A.* durante seis dias y se filtra, *D.* Cuatro dracmas á una onza al dia.

TINTURA ALCOHÓLICA DE CAINCA AMONIACAL.

Alcohol amoniacal, *diez y siete onzas.*

Raiz de cainca en polvo, *cuatro onzas y dos dracmas.*

Se macera *S. A.* durante seis dias y se filtra. *Nota.* Esta tintura tiene un color verde oscuro, debido á la accion prolongada del amoniaco sobre la materia colorante de la cainca. *D.* De una á dos dracmas al dia mezcladas con cuatro onzas de un vehiculo acuoso, que se tomará á cucharadas cada dos horas.

TINTURA ALCOHÓLICA DE CANTÁRIDAS (F. E.).

Polvos de cantáridas, *media onza.*

— de cochinilla, *una dracma.*

Espiritu de vino, *tres libras.*

Se pone en digestion durante ocho dias, meneando á menudo, y luego se añade:

Ambar gris, *media dracma.*

Espiritu de canela, *tres onzas.*

Se continúa la digestión por tres días y se filtra.

I. Se usa exteriormente como estimulante.

TINTURA ALCOHÓLICA DE HIPÉRICON VULNERARIA
ó bálsamo católico (F. E.).

Flores secas de hipericon	} <i>a. media onza.</i>
con las semillas.	
Raiz de cálamo aromático.	} <i>a. media onza.</i>
Espíritu de vino, tres libras.	

Se pone á digerir en una vasija bien tapada por espacio de algunos días en un sitio caliente, meneando de cuando en cuando. Entonces se añaden las sustancias siguientes quebrantadas:

Benjuí, tres onzas.

Estoraque.

Bálsamo de Tolú. } *a. dos onzas:*

Mirra, media onza.

Se digiere de nuevo y se cuele. Se usa en las heridas, úlceras, mordeduras de animales venenosos y rabiosos, dolores de las articulaciones, de los oídos y de los dientes, y en las almorranas, aplicándola fría; en los dolores cólicos y de estómago. Se administra de seis gotas á un escrúpulo.

TINTURA ALCOHÓLICA DE PELITRE FLOJA.

Raiz de pelitre, *una onza.*
 Espiritu de romero, *diez y seis onzas.*
 Se usa para el tocador.

TINTURA DE ALMACIGA COMPUESTA.

Alcohol rectificado, *cinco libras.*
 Almaciga en lágrimas. }
 Mirra } *a. dos onzas y me-*
 Incienso. } *dia.*

Se digieren hasta que parezca completa la disolución y se filtra.

I. y D. Se usa, pero con precaucion, para fortificar los pies y las manos que padecen sabañones y grietas.

TINTURA ALCOHÓLICA JABONOSA DE OPIO ó
bálsamo anodino (F. E.).

Jabon blanco, *una onza.*
 Opio, *media onza.*
 Alcanfor, *seis dracmas.*
 Azafran, *una dracma.*

Se mezclan y se ponen á digerir en una vasija tapada por espacio de ocho dias en libra y media de alcohol comun y se cuela.

Se usa en los dolores gotosos y reumáticos, á la dosis de dos dracmas para fricciones.

Cada onza contiene diez y seis granos de opio.

TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA UTERINA ó
esencia antihistérica (F. E.).

Mirra escogida.	} <i>a. dracma y media.</i>
Asa fétida.	
Azafran.	
Castorco.	

Alcanfor, *una dracma.*

Carbonato de amoniaco cristalizado, *dos dr.*

Aceite destilado de succino, *media dracma.*

Alcohol, *ocho onzas.*

Se prepara *S. A.* una tintura, que se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afecciones histéricas y epilépticas. *D.* De diez á veinte gotas.

TINTURA ALEXIFARMACA DE HUXHAN ó *tintura*
alcohólica de quina compuesta (F. E.).

Quina de Loja en polvo, *dos onzas.*

Corteza amarilla de naranja, *media onza.*

Raiz de serpentaria virginiana, *tres drac.*

Azafran, *cuatro escrúpulos.*

Cochinilla, *dos escrúpulos.*

Despues de quebrantadas todas estas sustancias, se ponen á macerar en una vasija bien tapada por espacio de cuatro dias en diez y seis onzas de espíritu de vino comun; despues se filtra y se guarda para el uso.

I. Calenturas adinámicas y atáxicas, intermitentes pestilenciales y epidémicas. D. Hasta media onza.

TINTURA DE AMBAR BALSÁMICA (*Dippel*).

Ambar gris. . . . } *a. una dracma.*
 Bálsamo del Perú. }

Sub-carbonato de potasa, *tres dracmas.*

Se trituran exactamente y se añade poco á poco :

Alcohol rectificado, *cuatro dracmas y media.*

I. Se usa como antiespasmódica en el trismo de los recién nacidos. D. De quince á treinta gotas.

TINTURA ANISADA (*Alibert*).

Espiritu de anís, *cuatro onzas.*

Polvo de ipecacuana, *una onza.*

Se hace digerir. Se añade á veces un poco de azúcar.

I. y D. Una ó dos onzas en los romadizos. Tres ó cuatro dracmas contra las bronquitis crónicas y asma húmedos en un vehículo apropiado, tal como una infusión teiforme de yedra terrestre ó un vaso de vino de Burdeos.

Esta tintura conviene á los niños que padecen romadizo, porque el perfume encubre el gusto de la ipecacuana; pero entonces solo se da media ó una dracma segun la edad.

TINTURA ANTICÓLICA DE PALACIOS ó *tintura
vinosa de opio anticólica* (F. E.).

Se compone de opio en pedacitos, *dos onzas*; raíz de zedoaria, *una onza*; raíces de carliua y galanga, *a. media onza*; cálcamo aromático, corteza amarilla de naranjas, corteza de cidra seca, semillas de anís y de alcaravea y flor de manzanilla, *a. dos dracmas*; clavo, bayas de laurel y bayas de enebro, *a. media dracma*; y macis, *una dracma*.

Quebrantados todos estos simples se ponen á macerar por ocho dias en tres libras de vino blanco bueno en un matraz de vidrio; despues se filtra y guarda para el uso.

I. Aprovecha en los dolores cólicos, especialmente en los flatulentos. *D.* Hasta dos escrúpulos.

TINTURA ANTIESCORBÚTICA ó *tintura de rábano
compuesta*.

Raíz de rábano, *ocho onzas*.

Semillas de mostaza negra, *cuatro onzas*.

Sal amoniaco, *dos onzas*.

Alcohol de 21° Cartier.)

Alcoholato de coclearia } *a. diez y seis onz.
compuesto.*

Se cortan las raíces en pedazos, se machaca la mostaza y se maceran en los líquidos espi-

rituosos durante ocho dias, se cuele con expresion y se filtra.

Es un buen medicamento, que representa bien los principios activos de las cruzadas, porque este disolvente se carga del aceite esencial acre y de la materia amarga; pero la sinapisina de la mostaza no se convierte en aceite esencial acre por solo la influencia del alcohol.

TINTURA ANTIESPASMÓDICA (*Keup*).

Licor anodino mineral de Hoffmann, *cuatro onzas*.

Raiz de valeriana, *una onza*.

Se digiere durante quince dias y se decanta. Se añaden despues partes iguales de alcoholato de cáscara de naranja.

I. y D. Se dan cada media hora cuarenta gotas con una infusion de manzanilla en el cólico ventoso.

TINTURA ANTIHIDRÓPICA (*Boerhaave*).

Raiz de aristoloquia larga. . . } *a. onza y*
 — — — — — redonda. } *media.*

— de gengibre. }
 — de rábano silvestre. . . } *a. media*
 Bulbo de cebolla albarrana } *onza.*

secos. }
 Sumidades de ajenjos. . . . }
 — de centaura menor. } *a. una onza.*

Bayas de enebro. }
 Sal de ajenjos, *media onza.*

Se machacan y se maceran durante ocho dias en:

Alcohol de enebro, *ocho libras.*

Se filtra. *D.* Se toma una onza, cuatro veces al dia.

TINTURA DE ANTIMONIO (*Jacobi*).

Se hierve una fuerte lejía de escorias recientes de régulo de antimonio con un aceite graso recién exprimido, hasta que todo haya adquirido la consistencia de un jabon; se disuelve este jabon en la tintura acre de antimonio (1) y se filtra. Se llama comunmente á este líquido *azufre líquido de antimonio.*

Esta tintura es resolutive y diurética. Se usa en las gonorreas crónicas y en las obstrucciones de las vísceras abdominales. *D.* Se empieza por algunas gotas y se aumenta sucesivamente la dosis, según lo exigen las circunstancias.

TINTURA ANTIVENÉREA (*Falck*).

Sublimado corrosivo, *un escrúpulo.*

Alcohol rectificado, *una onza.*

Se disuelve. Por separado se toma:

(1) La *tintura acre de antimonio de The- den* se prepara digiriendo alcohol potasiado sobre vidrio de antimonio en polvo.

Bálsamo del Canadá. }
 Goma de guayaco. . } *a. una onza.*
 Alcohol rectificado, *siete onzas.*

Se disuelven el bálsamo del Canadá y la resina de guayaco en el alcohol, y se mezclan los dos líquidos después de haberlos filtrado.

Entonces se añade:

Aceite de sasafrás, *dos dracmas.*

I. Este medicamento obra con buen éxito en las afecciones sífilíticas más graves. *D.* Diez, veinte hasta treinta gotas en un vaso de leche ó de tisana apropiada.

TINTURA AROMÁTICA DE ARNICA.

Flores de arnica, *una onza.*

Clavo. . . . }
 Canela. . . . } *a. dos dracmas.*
 Geagibre. . . . }

Anís, *dos onzas.*

Alcohol, *diez y seis onzas.*

Se macera durante ocho días y se cuele. *I.* Caídas y contusiones. *D.* Una cucharada en medio vaso de agua azucarada, que se repite dos ó tres veces al día.

TINTURA AROMÁTICA ó esencia cefálica.

Nuez moscada. . . . }
 Clavo. } *a. dos onzas.*

Canela. }
 Flores de granado. } *a. onza y media.*

Alcohol á 21° Cart., *treinta y dos onzas.*

Se macera durante quince días y se cuele. Se usa como estimulante en fricciones ó á la dosis de algunas gotas en agua azucarada.

TINTURA DE ASA FÉTIDA COMPUESTA ó *tintura de hollin fétida.*

Asa fétida, *una dracma.*

Hollin de leña, *dos dracmas.*

Alcohol de 22° , *tres onzas.*

H. S. A. I. Se usa como antiespasmódico contra las convulsiones de los niños. D. Algunas gotas.

TINTURA DE BENJUÍ COMPUESTA.

Benjuí, *seis dracmas.*

Estoraque calamita, *cuatro dracmas.*

Bálsamo de Tolú, *dos dracmas.*

Acibar, *una dracma.*

Alcohol, *ocho onzas.*

H. S. A. I. y D. Se usa en lociones frecuentes contra la quemadura en primer grado, antes que se hayan desarrollado las flictenas.

TINTURA CALMANTE (*Herisson*).

Tintura alcohólica de beleño negro, *una dracma.*

— — de guayaco, *dos dracmas.*

M. I. Gastralgia y neuralgia facial. D. Se

Tomán treinta gotas por la mañana y otro tanto por la noche en agua ó en otro escipiente adecuado. *Nota.* Es necesario seguir un régimen antiflogístico. Los dolores mas atroces cesan inmediatamente, según dicen, por la influencia de este medio.

TINTURA DE CANELA COMPUESTA (F. I.).

Canela quebrantada, *seis dracmas.*

Semillas de cardamomo, *tres dracmas.*

Pimienta larga, *dos dracmas.*

Géngibre, *dos dracmas.*

Espíritu de vino, *cuatro cuartillos.*

Se maceran durante catorce días y se filtra.

D. De una dracma á una onza como aromática, cordial, tónica y estomacal.

TINTURA DE CARDAMOMO COMPUESTA (F. I.).

Alcohol, *diez y seis onzas.*

Pasas privadas de sus pepitas, *cuatro onz.*

Canela, *media onza.*

Semillas de cardamomo,

— de alcaravea.

Cochinilla.

} *a. dos dracmas.*

Se maceran durante catorce días y se filtra.

I. Flatuosidades y lentitud en la digestión.

D. Una cucharada en un vehículo apropiado.

TINTURA DE CIANURO DE MERCURIO (*Parent*).

Extracto de boj, *onza y media*.

— de acónito. . . } *a. tres dracm.*

Hidroclorato de amoniaco. }
 Aceite esencial de anís ó de sasafrás, *un escripulo*.

Cianuro de mercurio, *diez y ocho granos*.

Agua, *catorce onzas*.

Alcohol á 33°, *diez onzas*.

H. S. A. una tintura, que despues de filtrada debe pesar dos libras. *Nota.* Cada onza contiene media dracma de extracto de boj, nueve granos de extracto de acónito, nueve granos de hidroclorato de amoniaco, tres cuartas partes de grano de cianuro de mercurio y un grano de aceite esencial.

I. Afecciones sífilíticas. *D.* De media á una onza al dia, empezando por una cucharada de café mañana y tarde, en medio vaso de agua azucarada ó de tisana de cebada, de grama, &c.

TINTURA CONTRA LAS ASCARIDES (*Dorfmüller*).

Elixir balsámico de Hoffmann. }

Tintura de cálamo aromático } *a. cuatro*
 compuesta (1). } *dracmas.*

Vino marcial. }

(1) La tintura de cálamo aromático compuesta se prepara del modo siguiente, segun la

Mezclense. *D.* Se toman, segun la edad, de treinta á setenta gotas, mañana y tarde, en media cucharada de vino bueno.

TINTURA CORROBORANTE DE WITH ó *tintura alcohólica de corteza de naranja* (F. E.).

Cáscara amarilla de naranjas, *cuatro onzas.*

Raíz de genciana, *una onza.*

Quina de Loja, *dos onzas.*

Se quebrantan bien estas sustancias y se ponen á macerar por veinte y cuatro horas en:

Espíritu de vino, *dos libras.*

Despues se filtra y se guarda para el uso.

Es un excelente tónico y corroborante, y mucho mas si se echa en media copa de agua de nieve ó muy fria.

TINTURA DE DAFFY.

Aguardiente, *dos libras.*

Azúcar, *seis onzas.*

Sen, *una onza.*

farmacopea de Prusia: Raíz de cálamq aromático, *tres onzas*; raíz de cedoaria y gengibre, *a. una onza*; naranjas sin madurar, *dos onzas*; alcohol, *tres cuartillos*. Despues de digerir por tiempo suficiente, se exprime y filtra.

Jalapa. }
 Cilantro. } *a. media onza.*
 Tartrato acídulo de potasa. }

H. S. A. I. y D. Se usa como un purgante grato á la dosis de una á tres onzas, dejando un largo intervalo entre cada toma.

TINTURA ELÁSTICA (*Dr. Bañares*).

Sub-carbonato de potasa, *cinco onzas.*
 Extracto de Marte aperitivo, *seis dracmas.*
 Agua destilada, *doce onzas.*

Se ponen en digestion en un matraz por cuatro dias y se filtra el líquido.

Es tónica y emenagoga. *D.* Una dracma en cuatro libras de agua á pasto.

TINTURA DE ELATERINA (*Morrus*).

Elaterina, *un grano.*
 Alcohol, *una onza.*
 Acido nítrico, *cuatro gotas.*

H. S. A. I. Purgante drástico. *D.* De treinta y seis á cuarenta gotas en medio vaso de agua azucarada.

TINTURA Ó ESENCIA ANTIHISTÉRICA (*F. M.*).

Mirra escogida. }
 Asa fétida. } *a. dracma y media.*
 Azafran. }
 Castoreo. }
 Alcanfór, *una dracma.*

Sal volátil de amoniaco, *dos dracmas.*

Aceite destilado de succino, *media dracma.*

Espíritu de vino rectificado, *ocho onzas.*

H. S. A. Se filtra y guarda en una vasija bien tapada.

I. Afecciones histéricas y epilépticas. *D.* De doce á veinte gotas.

TINTURA DE ESPLIEGO COMPUESTA

(F. L.).

Espíritu de espliego, *cuatro libras.*

— de romero, *diez y seis onzas.*

Canela. } *a onza y media.*

Nuez moscada. }

Sándalo rojo, *una onza.*

Se digiere durante seis dias y se filtra.

I. y D. Es un estimulante activo, que se da desde diez gotas hasta una dracma con dos dracmas de azúcar, en la debilidad del estómago y astenia nerviosa.

TINTURA ESTOMACAL AMARGA.

Alcohol debilitado, *libra y media y una onza.*

Raiz de genciana, *dos onzas.*

Cáscaras secas de naranjas amargas, *una onza.*

Canela blanca, *media onza.*

Cochiuilla, *media dracma.*

Se maceran durante cuatro dias y se filtra.

I. y D. De cuatro á seis dracmas por la mañana en ayunas ó una hora antes de comer.

TINTURA ESTOMACAL (F. V.).

Tintura de cáscaras de naranjas, *cuatro onz.*

Extracto de ajonjos. . . } *a. una onza.*

— de genciana. . . }

Sub-carbonato de potasa, *media onza.*

Se maceran durante tres dias en:

Vino blanco, *cuatro cuartillos.*

Se filtra.

I. Dispepsia, atonía del estómago é indigestiones. *D.* Una cucharada en un vehículo apropiado.

OTRA (F. M.).

Canela de Manila, *una onza.*

Clavo. } *a. media onza.*

Nuez moscada. . . }

Macis, *dos dracmas.*

Cálamo aromático, *tres dracmas.*

Se quebrantan estos simples y se infunden en:

Aguardiente bueno; *cuatro libras.*

Se menea bien y se ponen en digestion por algunos dias; se decanta la tintura y se añade:

Jarabe de corteza de cidra, *cuatro onzas.*

Se mezcla y se guarda para el uso.

I. Indisposiciones flatulentas del estómago. *D.* Una ó dos cucharadas á cualquiera hora.

TINTURA ESTOMACAL (*Moscato*).

Agua destilada de cáscaras	} <i>a. ocho onzas.</i>
de limon.	
— — — de hojas de	
ajenjos.	
Alcohol á 32°.	} <i>a. media onza.</i>
Cáscara de naranjas amargas, <i>una onza.</i>	
Cascarilla pulverizada.	
Hojas secas de cámedrios.	

Se digieren durante tres dias á fuego lento, se cuele y se filtra. *I. y D.* Media onza ó seis dracmas antes de desayunarse ó de comer.

TINTURA ETÉREA DE ACETATO DE HIERRO ó *eterolado de acetato de hierro (Beral).*

Acetato de peróxido de	} <i>a. partes iguales.</i>
hierro.	
Éter acético.	

Se mezclan, se deja obrar durante cuarenta y ocho horas y se filtra *S. A. Nota.* Este éter acético ferrurado tiene un color rojo muy oscuro, se disuelve en parte en el agua y no la enturbia.

I. Amenorrea, leucorrea, clórosis, escrófulas, &c. *D.* De veinte á treinta gotas en una pocion apropiada.

TINTURA ETÉREA DE PERCLORURO* DE HIERRO
 ó *eterolado de percloruro de hierro*
 (*Beral*).

Eter hidrático rectificado, *catorce onzas*.

Percloruro de hierro cristalizado, *dos onz.*

Se pesa el éter en un frasco, se le añade el cloruro y se los agita hasta que se haya disuelto, se deja en reposo durante veinte y cuatro horas y despues se decanta.

Nota. Este éter sulfúrico ferrurado, que reemplaza ventajosamente á la tintura de Bestucheff ó del doctor Klaproth (*Véase* esta palabra) tiene un color amarillo verdoso; tiene siempre la misma composicion y es constante en sus efectos. Muchos farmacologistas prescriben para prepararle añadir alcohol al éter, pero esta adiccion, que es indispensable si se usa percloruro líquido, es inútil cuando se usa percloruro cristalizado.

I. y D. Las mismas que la anterior.

TINTURA ETÉREA DE KLAPROTH. *Eter acético*
marcial de Klaproth.

La tintura de Klaproth se prepara con el óxido de hierro en el mayor grado de oxidacion, el cual le da color rojo. Cuando el acetato está reducido á menor grado de oxidacion, la tintura es verde.

TINTURA DE EXTRACTO OÍLEO-RESINOSO DE
CUBEBAS (*Beral*).

Alcohol rectificado á 33°, *doce onzas*.

Extracto oleo-resinoso de cubebas, *cuatro onzas*.

Mezclese. *D.* De una á cuatro dracmas.

TINTURA FEBRÍFUGA (*Clutton*).

Alcohol, *tres onzas*.

Ácido sulfuroso.	} <i>a. dos onzas.</i>
— sulfúrico.	
Hidroclorato de sosa.	

Se digiere durante ocho días y se destila despues hasta la sequedad. Se añade al líquido destilado :

Raiz de angélica.	} <i>a. onza y media.</i>
— de aristoloquia.	
Semillas de cardamomo.	

D. Se añade cantidad suficiente de esta tintura á agua endulzada con miel ó jarabe para darle una acidez agradable. Se da como bebida ordinaria á los enfermos que tienen fiebres de acceso.

TINTURA DE FELANDRIO (*Dr. Marcius*).

Semillas de felandrio, *cuatro dracmas*.

Alcohol, *seis onzas*.

Se digiere durante veinte y cuatro horas y se añade:

Vino moscado, *seis onzas*.

Se continúa la digestion durante dos dias y se filtra.

I. Tisis pituitosas. *D.* De diez á sesenta gotas en una pocion apropiada.

TINTURA DE GENCIANA AMONIACAL ó *elixir*
contra las escrófulas.

Genciana, *una onza*.

Carbonato de amoniaco, *dos dracmas*.

Alcohol de 21º, *treinta y dos onzas*.

D. De dos á cuatro dracmas en una pocion.

TINTURA DE GENCIANA COMPUESTA (F. L.).

Genciana cortada en pedazos, *dos onzas*.

Cáscara de naranja id., *una onza*.

Semillas de cardamomo menor, *media onza*.

Espíritu de vino, *treinta y dos onzas*.

Se filtra despues de catorce dias. *I.* Es tónica y estomacal. *D.* De una á cuatro dracmas.

TINTURA DE GENCIANINO (*Magendie*).

Alcohol de 24º, *una onza.*

Gencianino, *cinco granos.*

H. S. A. I. y D. Se usa para reemplazar al elixir de genciana á la dosis de una á cuatro dracmas en una pocion adecuada.

TINTURA DE GUAYACO COMPUESTA.

Tintura volátil de guayaco, *media onza.*

— antimonial acre, *tres dracmas.*

— tebáica, *una dracma.*

M. I. Ciática. D. De treinta á cuarenta gotas al dia en una tisana apropiada.

TINTURA DE HIDRIODATO DE HIERRO

(*Pierquin*).

Hidriodato de hierro, *dos dracmas.*

Alcohol rectificado. } *a. dos onzas.*

Agua comun. }

H. S. A. D. De media á una dracma en una bebida apropiada.

TINTURA HIDRÓLICA DE CAINCA.

Agua hirviendo, *un cuartillo.*

Raiz de cainca en polvo, *una dracma y un escrúpulo.*

Se infunde *S. A.* en una vasija de loza du-

rante cuatro horas y se filtra. *D.* Cuatro vasos al dia en cuatro veces.

TINTURA DE HOLLIN.

Hollin, *una dracma.*

Canela. } *a. dos dracmas.*
 Gengibre. }

Se maceran durante ocho dias en Alcohol á 22°, *una onza.*

Se filtra.

Se usa como estimulante á la dosis de una dracma en una tisana apropiada.

TINTURA DE IODO.

Alcohol á 35°, *una onza.*

Iodo, *dos escrúpulos.*

H. S. A. Nota. No se debe preparar esta tintura con mucha anticipacion.

I. Bocio y escrófulas. *D.* De cuatro á diez gotas, tres veces al dia, en medio vaso de agua azucarada. Se aumenta progresivamente la dosis hasta veinte gotas, que es cerca de un grano de iodo.

La *tintura de iodo* de los hospitales militares solo se diferencia de la anterior en que contiene media dracma de iodo.

TINTURA DE IODO DEBILITADA (*Ricord*).

Agua destilada, *tres onzas*.

Tintura de iodo, *de una á seis dracmas*.

M. I. Bubones, hidrocele acompañado de epididimitis, &c. Se usa tópicamente.

TINTURA DE IPECACUANA ANISADA (*Alibert*).

Ipecacuana, *una parte*.

Espiritu de anís, *cuatro partes*.

H. S. A. I. y D. Se administra á los niños como emética á la dosis de media á una dracma.

TINTURA DE IODURO DE POTASIO (*Puche*).

Ioduro de potasio. } *a. media onza.*
Iodo puro. . . . }

Alcohol á 22°, *una onza*.

M. I. Escrófulas y sífilis complicadas con escrófulas. *D.* De dos á ocho gotas en una tisana de genciana.

TINTURA DE JABON.

Jabon blanco, *noventa y seis partes*.

Carbonato de potasa, *cuatro partes*.

Alcohol á 56° cent., *trescientas sesenta y cinco partes*.

Se maceran hasta disolver completamente el jabon y se filtra.

I. Reumatismos, &c. Se usa en fricciones.

TINTURA LEGIVIAL (*Vogler*).

Agua hirviendo, *dos cuartillos y medio*.

Cenizas graveladas, *quince onzas*.

Raiz de genciana, *cuatro onzas*.

Cáscaras de naranjas secas, *dos onzas*.

Se digieren durante dos dias y se añade:

Alcohol rectificado, *dos onzas*.

Se filtra. *I.* Infartos escrofulosos, atrofia y arenillas. *D.* Una draema, que se toma en tres veces al dia, en un vehículo apropiado.

TINTURA DE LOBELIA INFLATA (*J. Andres*).

Hojas de *lobelia inflata*, *dos onzas y media*.

Alcohol á 18°, *diez y seis onzas*.

Se digieren durante quince dias y se filtra.

I. Asma. *D.* De treinta á cuarenta gotas en un vehículo apropiado, muchas veces al dia, segun la gravedad de la enfermedad.

TINTURA DE LUPULINA.

Alcohol á 36°, *dos partes*.

Lupulina machacada, *una parte*.

Se digiere durante seis dias en una vasija tapada, se cuele, se exprime fuertemente, se filtra y se añade la cantidad necesaria de alco-

hol á 36° para obtener tres partes de tintura.

I. Escrófulas y ciertas afecciones cutáneas.

D. De veinte á cincuenta gotas en una pocion apropiada.

TINTURA DE MALATO DE HIERRO.

Zumo reciente de manzanas ácidas ó mejor aun zumo de membrillo, *cuatro libras.*

Limaduras de hierro porfirizadas, *diez y seis onzas.*

Se deja algun tiempo el zumo sobre el metal, y se tiene cuidado de menear á menudo. Cuando el zumo está saturado al parecer, se le decanta y se añade de nuevo mas zumo hasta que todo el hierro esté disuelto; se reúnen estas disoluciones y se las evapora hasta la mitad de su peso; entonces se les añade una parte de alcoholato de canela por cada seis partes de la disolucion concentrada; se digiere la mezcla durante algun tiempo y se filtra.

I. Clorosis, debilidad del estómago y carreau. *D.* De un escrúpulo á una dracma en un vehículo apropiado.

TINTURA DE MARTE TARTARIZADA.

Limaduras de hierro puras, *diez partes.*

Cremor de tártaro, *veinte y cinco partes.*

Alcohol á 33° Cartier, *cinco partes.*

Se ponen las limaduras de hierro y el cre-

mor de tártaro en una caldera de hierro, y se les añade cantidad suficiente de agua para hacer de todo una masa blanda que se abandona á sí misma durante veinte y cuatro horas; entonces se vierte sobre ella:

Agua de lluvia, *trescientas partes*.

Se hierve durante dos horas meneando y añadiendo agua hirviendo para reemplazar á la que se evapora. Se deja aposar, se decanta el líquido que sobrenada, se le filtra y se le evapora hasta que marque 32°. Se añade el alcohol y se mezclan exactamente.

I. Amenorrea, clorosis y escrófulas. D. De veinte á cuarenta gotas en una pocion ó en un poco de agua azucarada.

TINTURA NERVAL Y TÓNICA (F. DE B.).

Alcohol, *treinta y dos onzas*.

Valeriana.	} <i>a. onza y media.</i>
Yerbabuena de sabor de piment.	

Castoreo, *una onza*.

Azafran, *media onza*.

Esencia de yerbabuena, *una dracma*.

II. S. A. I. Espasmos y debilidad del estómago. D. De veinte á treinta gotas en un vehículo apropiado.

TINTURA NERVINO-TÓNICA (*Bestuchef*).

Hidroclorato de hierro líquido, *cuatro partes*.
 Acido nítrico, *una parte*.

Se filtra y se evapora hasta la sequedad en el baño de arena en una cápsula de porcelana.

Se espone la masa desecada en una cueva; atrae la humedad del aire y se resuelve en un líquido que se llama *aceite de Marte*. Se filtra este líquido y se le mezcla con el doble de su peso de éter sulfúrico; se le agita hasta que, después de haberle dejado aposar, haya tomado el éter un color amarillo de oro; se decanta el éter y se le mezcla con el doble de su peso de alcohol muy rectificado, meneando la mezcla en un frasco tapado al esmeril.

I. Enfermedades espasmódicas y asténicas.
D. De veinte á treinta gotas en un vehículo acuoso apropiado.

TINTURA DE NUEZ DE AGALLA COMPUESTA
 (*Leperè*).

Nuez de agalla quebrantada, *diez y seisonz*.

Se hierva en cuatro cuartillos de agua hasta que se reduzca á la mitad, se cuele y se añade:

Alcohol rectificado, *treinta y dos onzas*.

Alcoholato de limon compuesto, *cuatro onz*.

I. *Blenorragia y leucorrea. D.* Se usa dilatada en diez veces su peso de agua en inyecciones.

TINTURA DE NUEZ VÓMICA.

Alcohol á 31° Cart, *cuatro partes.*

Nuez vómica, *una parte.*

II. *S. A. I. y D.* Esta tintura se administra á gotas en pociones y en bebidas en los mismos casos que la estricnina. Se administra en fricciones en las partes atrofiadas ó paralizadas.

TINTURA DE NUEZ VÓMICA AMONIACAL
(*Magendie*).

Tintura de nuez vómica, *una onza.*

Amoniac concentrado, *dos dracmas.*

M. I. Cólera. D. En fricciones.

TINTURA ODONTÁLGICA (F. M.).

Raiz de pelitre, *seis dracmas.*

Rasuras de palo de guayaco, *dos onzas.*

— — de sasafrás, *una onza.*

Hojas de tabaco, *tres dracmas.*

— de tomillo. . . } *a. dos dracmas.*
— de orégano. . . }

Clavo, *una dracma.*

Alcanfor. } *a. dracma y media.*
Opio. }

Se infunden todas las sustancias quebrantadas.

das en tres libras de aguardiente rectificado. Se dejan digerir por doce días, se cuele y se guarda.

I. y D. Enjuagándose con esta tintura se calman los dolores de muelas y dientes.

TINTURA OENÓLICA DE CAINCA. *V. Vino de Cainca.*

TINTURA DE OPIO AMONIACAL.

Opio, *dos dracmas.*

Flores de benjuí. } *a. tres dracmas.*

Azabran. }

Aceite esencial de anís, *media dracma.*

Amoniaco líquido, *cinco onzas.*

Alcohol á 34°, *once onzas.*

D. De media á una dracma en una pocion.

TINTURA DE OPIO COMPUESTA (*Carron de Villards*).

Opio, *dos onzas.*

Clavo, *una dracma.*

Molín lavado, *cuatro dracmas.*

Agua de canela, *ocho onzas.*

Aguardiente, *cuatro onzas.*

Se digieren durante seis días, se cuele con expresión y se filtra. *I.* Se tocan las granulaciones de la córnea con un pincel empapado en este líquido.

TINTURA PAREGÓRICA ó *tintura alcohólica*
de opio (F. E).

Opio en pedazos, *dos onzas.*

Azafran en pedazos, *media onza.*

Canela de Manila quebrantada, *media onza.*

Espíritu de vino comun. } *a. dos onzas.*

Agua. }

Se ponen en digestion durante ocho dias y se filtra.

Cada escrúpulo contiene dos granos de opio.

I. Se usa en los mismos casos que el láudano líquido. *D.* De nueve gotas á un escrúpulo.

TINTURA DE RENUEVOS DE HELECHO MACHO
(*Peschier*).

Renuevos de helecho macho, *una onza.*

Éter sulfúrico, *ocho onzas.*

Se macera durante cinco á seis dias, se decanta y se conserva en una vasija tapada.

I. Es antielmíntica. *D.* De ocho á treinta gotas en och ó treinta pildoras.

TINTURA DE RUIBARBO COMPUESTA.

Ruibarbo quebrantado, *una onza.*

Regaliz, *cuatro dracmas.*

Gengibre, *dos dracmas.*

Azafran, *dos dracmas.*

Espíritu de vino , *treinta y dos onzas.*

Agua , *una libra.*

Se filtra á los catorce dias de maceracion.

D. De dos dracmas á dos onzas como estomacal y catártica.

TINTURA DE RUIBARBO INGLÉS.

Alcohol , *tres libras y cuatro onzas.*

Ruibarbo de la China , *tres onzas.*

Semillas de cardamomo , *media onza.*

Se digieren durante ocho dias y se filtra.

I. y D. De media á una onza en un vehículo apropiado para disipar las flatuosidades y facilitar las digestiones perezosas.

TINTURA DE RUIBARBO (*Spielmann*).

Agua destilada , *nueve onzas.*

Ruibarbo machacado , *una onza.*

Acetato de potasa , *una dracma.*

Se infunde todo durante cuatro horas y se filtra.

I. y D. Media onza en un vehículo apropiado contra los eructos y las flatuosidades y para fortificar el estómago. Conviene tambien en la ictericia.

TINTURA SAGRADA.

Vino de España , *medio cuartillo.*

Acibar , *una onza.*

Pimienta de la Jamaica. }
 Gengibre. } *a. una dracma.*

Se maceran durante ocho días y se filtra.

I. Dispepsia, pérdida del estómago é indigestiones. *D.* Una cucharada en un vehículo apropiado.

TINTURA DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

Semillas de cólchico, *dos onzas.*

Alcohol á 33°, *diez y seis onzas.*

Se macera durante ocho días y se filtra. *D.*

De diez y ocho granos á una dracma.

TINTURA TEBÁICA (*Lamberg*).

Agua de canela hordenda, *ocho onzas.*

Alcohol, *cuatro onzas.*

Opio en bruto, *dos onzas.*

Clavo, *una dracma.*

Se maceran durante seis días y se filtra.

I. y D. Se usa como calmante y antiespasmódico á la dosis de diez á veinte gotas en un vehículo apropiado.

TINTURA VINOSA DE HIERRO TARTARIZADA

(*F. E.*).

Limaduras de hierro bien resplandecientes,
ocho onzas.

Tartrito acídulo de potasa comun, *diez y seis onzas.*

Agua, *diez y seis libras.*

Se cuece todo en una vasija de hierro, meneando continuamente con una espátula por espacio de doce horas y añadiendo la cantidad suficiente de agua hirviendo. Entonces se decanta el licor, se filtra y se evapora en una vasija de barro vidriado hasta que tenga la consistencia de extracto blando; entonces se toma:

De esta masa salina, *tres onzas.*

Vino blanco, *una libra.*

Espíritu de vino comun, *media onza.*

Se pone á digerir por ocho dias y se filtra.

I. Hidropesía, caquexia, amenorrea pasiva y clorosis.

D. De una á dos dracmas.

TINTURA VOLÁTIL DE GUAYACO (*Devees*).

Alcohol á 20°, *treinta y dos onzas.*

Resina de guayaco en polvo, *ocho onzas.*

Fruto de pimienta de la Jamaica en polvo, *dos onzas.*

Carbonato de sosa, *tres dracmas.*

H. S. a. y á cada cuatro onzas de esta tintura añádase:

Amoníaco líquido, *una dracma.*

I. y D. Esta tintura se toma a la dosis de una cucharada de café en un vaso pequeño de vino de Madera ó en una infusion aromática, como un remedio muy activo en los casos de mens-

truacion difícil. *Nota.* Cuando existe plétora inflamatoria, este remedio sería mas dañoso que útil.

TINTURA VOLÁTIL DE GUAYACO (F. L.).

Espíritu volátil aromático de Silvio, *seis onzas.*

Resina de guayaco, *una onza.*

H. S. A. I. Gota, cardialgia, cólico nefrítico y disuria. *D.* De una dracma á media onza en una taza de leche ó de agua tibia, dos veces al dia.

TINTURA VULNERARIA.

Se compone de las hojas frescas de albahaca, de calaminata, de hisopo, de mejorana, de toronjil, de yerbabuena, de orégano, de romero, de ajedrea, de salvia, de serpol y de tomillo, y de hojas de ajenjos, de angélica, de hinojo, de ruda, de hipericon y de espliego, *a. una onza*, y alcohol á 31° Cart. *treinta y dos onzas.* Se maceran y se filtra. Se usa como el alcoholato vulnerario.

TISANAS.

TISANA ALCALINA.

Bicarbonato de potasa cristalizado, *media dracma.*

Tintura de canela. . . . } *a. diez y ocho*
 — de vainilla. . . . } *granos.*
 Jarabe simple, *dos onzas.*
 Agua, *treinta y dos onzas.*

Se toma á tazas en un dia. Se administran de cuatro á ocho cuartillos al dia contra los cálculos de ácido úrico. Se aumenta sucesivamente la dosis del bicarbonato hasta media onza al dia,

TISANA ALCALINA (*Bielt*).

Carbonato de sosa, *media dracma.*
 Agua de cebada, *un cuartillo.*

Se toman cuatro vasos al dia en los casos de liquen, prurigo y afecciones crónicas con comezon.

TISANA ANTICÓLICA ó cocimiento carminativo de maná (F. E.).

Maná, *cuatro onzas.*
 Hojas de sen, *una onza.*
 Tartrato de potasa. } *a. media onza.*
 Semillas de anís machacadas. }

Se ponen á digerir por media hora en una vasija de barro vidriada, despues se cuece un poco y se cuela.

Se usa particularmente en los dolores cólicos. *D.* Hasta seis onzas.

La *tisana laxante* de los hospitales de Madrid se compone de hojas de sen, *dos onzas*, y anís y tartrato de potasa, *a. dos dracmas.* Se

Infunden durante cuatro horas en *cuatro libras* de agua, se cuece ligeramente y se cuele.

TISANA ANTIEPSÓRICA.

Raíces de bardana. . . }
 — de paciencia. . . } *a. media dracma.*
 Dalcamara. }

Se digieren durante cuatro horas en:

Agua caliente, *dos cuartillos.*

Se cuele y se añade:

Jarabe de miel, *dos onzas.*

Se da á tazas al día.

TISANA ANTIESCORBÚTICA.

Especies amargas, *una onza.*

Agua, *dos cuartillos.*

Se infunden y se añade:

Alcoholato de coquearia, *media onza.*

I. Afecciones escrofulosas y escorbúticas. *D.*

À tazas pequeñas, varias veces al día.

TISANA ANTIESPASMÓDICA.

Flores de tilo. . . . }
 — de manzanilla. . . } *a. una pulgarada.*
 Hojas de naranjo. . . }

Se infunden durante medio hora en:

Agua hirviendo, *dos cuartillos.*

Se cuele por una estameña y se añade:

Jarabe simple, *dos onzas.*

I. Una taza pequeña cada dos horas.

TISANA ANTIHERPÉTICA (*Gibert*).Zarzaparrilla, *dos onzas*.Corteza de mecreon, *una dracma*.Semillas de cilantro. } *a. una dracma.*

Regaliz. }

Se infunden en:

Agua, *dos cuartillos*.

Se cuele. Se toma á medios vasos al día.

TISANA ANTISIFILÍTICA, *tisana ó rob de Arnoud*.Zarzaparrilla cortada, *dos onzas*.

Guayaco raspado. }

Corteza de boj. } *a. dos dracmas.*

— de torbisco }

Cola de pescado. }

Agua, *cuatro libras*.

Se hierve hasta que se reduzca á dos cuartillos y se cuele. Se toma á vasos al día contra las afecciones sifilíticas rebeldes.

OTRA (*Dupuytren*).

China cortada en pedazos. }

Guayaco id. } *a. dos onzas*

Zarzaparrilla id. }

Agua, *cuatro libras*.Jarabe de Cuisinier, *cuatro onzas*.

Se hierven las raíces en el agua, hasta que se reduzca á dos cuartillos de líquido, se cuele y se añade el jarabe.

TISANA APERITIVA (II. M.).

Raiz de caña. }
 — de perejil. } *a. dos onzas.*
 — de hinojo. }
 — de regaliz, *una onza.*

Agua comun, *cuatro libras.*

Se cuece *S. A.* y se cuecla.

D. A pasto.

TISANA DE ARROZ Y CATECÚ.

Arroz, *media onza.*

Agua comun, *dos cuartillos.*

Se cuece, se cuecla y se disuelve: . . .

Catecú, *de dos á tres dracmas.*

I. Diarrea y disenterias agudas. *D. A* tazas pequeñas al dia.

Si se reemplaza el catecú por media onza de goma arábica se tendrá la *tisana de arroz gomosa*, que se usa como la anterior.

TISANA ASTRINGENTE.

Raiz de bistorta. }
 — de consuelda mayor. } *a. una dracma.*

Agua, *dos cuartillos.*

Se hierve una hora, se cuecla y se añade:

Jarabe de membrillos ó de catecú, *una onza.*

I. Hemorragias internas consideradas como pasivas. *D. De dos á cuatro onzas.*

La *tisana astringente* de los Hospitales militares se compone de *dos onzas* de raíz de tormentila contundida y *cuatro libras* de agua común; se cuece hasta que se reduzca á tres libras y se añaden *tres onzas* de jarabe de vinagre. *D.* Un cortadillo cada cuatro horas.

TISANA ASTRINGENTE. (*Chaptal*).

Raíz de consuelda, *una onza*.

Rosas rojas, *una pulgarada*.

Bayas de cinorrodon, *num. 12*.

Catecú, *un escrúpulo*.

Se preparan *S. A.* dos cuartillos de tisana, que se endulzan con:

Jarabe de membrillo, *dos onzas*.

I. Disenterias rebeldes, pérdidas blancas y hemorragias pertinaces.

TISANA ATEMPERANTE (II. DE M.).

Cebada, *media libra*.

Se cuece en *c. s.* de agua común hasta que quede en doce libras y se disuelve en el cocimiento:

Nitro puro, *media onza*.

D. A pasto.

TISANA DE BUCHAN.

Cebada perlada, *dos onzas.*

Se hierve durante hora y media en ocho cuartillos de agua y se añade:

Pasas.	} <i>a. dos onzas.</i>
Higos secos.	
Raiz de regaliz raspada. .	

Se continúa hirviendo hasta que solo queden cuatro cuartillos. Se cuela y se añade:

Nitrato de potasa, *una dracma.*

I. y D. Se usa como emoliente y pectoral.

D. A tazas pequeñas en el espacio del día.

TISANA ANGÉLICA.

Raiz de angélica, *una dracma.*

Alcohol, *dos onzas.*

Jarabe simple, *dos onzas.*

Agua, *dos cuartillos.*

Esta bebida se usa en la convalecencia de las enfermedades crónicas, y en todos los casos en que conviene restablecer las fuerzas digestivas y hay que hacer uso de aromáticos y estimulantes.

TISANA CLORURADA.

Cloruro de sosa líquido á 18°, *de doce á veinte granos.*

Tisana comun, *dos cuartillos.*

M. I. Fiebres tifoideas.

TISANA DE CAINCA COMPUESTA.

Cainca , *dos dracmas.*

Agua , *dos cuartillos.*

Se infunde , se cuele y se añade :

Ojimiél cólechico , *una onza.*

Jarabe de goma , *dos onzas.*

Se toma á vasos durante el día.

TISANA CARMINATIVA.

Manzanilla , *media dracma.*

Anís , *una dracma.*

Agua , *dos cuartillos.*

Azúcar , *dos onzas.*

TISANA CONTRA LAS ESCRÓFULAS.

Raiz de rubia , *media onza.*

Lúpulo , *una dracma.*

Agua , *dos cuartillos.*

Se infunden , se cuele y se añade :

Jarabe de quina amarilla con vino , *dos onz.*

Se toma en varias veces al día.

TISANA COMUN.

Grana mondada , *una onza.*

Regaliz raspado , *media onza.*

Se hierve en :

Agua comun , *dos cuartillos.*

Se usa como bebida ordinaria en las fiebres inflamatorias y biliosas , y en todos los casos en que convenga hacer uso de los atemperantes. A esta tisana , que es ligeramente diurética , se pueden añadir algunos granos de nitrato de potasa para aumentar sus propiedades.

La *tisana simple* de los hospitales militares se compone de *cuatro libras* de cebada , *una libra* de regaliz y *sesenta y cuatro libras* de agua comun.

H. S. A.

TISANA CONTRA LA PIEDRA.

Semillas de lino machacadas. } *a. un manojo.*
 Culantrillo. }
 Agua , *un cuartillo.*

Se hierve , se cuele y se añade :

Carbonato de sosa , *un escrúpulo.*

D. A tazas pequeñas , varias veces al dia.

TISANA DE DATISBIÛS.

Limonas , *número dos.*

Se les quita la corteza y las pepitas y se los tritura en un mortero de vidrio ó porcelana con :

Pan tostado , *dos onzas.*

Se echa poco á poco :

Cocimiento de cebada germinada , *dos libras.*

Se cuele y se añade :

Jarabe de moras, *una onza.*

Vino añejo ó generoso, *seis onzas.*

I. Fiebres adinámicas, convalecencia de las fiebres graves y atonía de los órganos digestivos.

D. De dos á cuatro onzas, cada tres ó cuatro horas.

TISANA DIAFORÉTICA (*Brera*).

Corteza interior de olmo, *dos onzas.*

Raíz de paciencia, *una onza.*

Agua comun, *c. s.*

para obtener cuatro libras de líquido colado, que se endulzará. Se dan de cuatro á ocho onzas dos ó tres veces al dia.

OTRA (*Gimelle*).

Agua hirviendo, *cuarenta onzas.*

Polvo de guayaco raspado, *tres dracmas y media.*

Raíz de regaliz, *tres dracmas y media.*

Flores secas de saúco, *cinco escrúpulos.*

— de amapola, *cinco escrúpulos.*

II. S. A. Se dan cuatro vasos al dia.

OTRA (*H. M.*).

Flor de saúco, *dos onzas.*

Agua comun, *tres libras.*

Se infunde *S. A.*, se cuele y se añade al líquido colado :

Arrope de saúco, *dos onzas.*

Se usará tibia á pasto.

TISANA DIURÉTICA.

Especies aperitivas, *una onza.*

Parietaria, *media onza.*

Agua hirviendo, *dos cuartillos.*

Se infunden durante media hora, se cuele
y se añade:

Nitrato de potasa, *media dracma.*

Jarabe de las cinco raices, *dos onzas.*

D. Se da á vasos al dia.

OTRA.

Nitro, *dos dracmas.*

Ojimiél escilítico, *media onza.*

Cocimiento de raíz de esparraguera, *dos cuartillos.*

M. D. Varias tazas pequeñas al dia.

OTRA.

Cinco raices, *una onza.*

Agua, *dos cuartillos.*

Acetato de potasa, *un escrúpulo.*

Miel escilítica, *una onza.*

Se infunden las raices en el agua hirviendo, se cuele á la media hora y se añaden la sal y la miel.

I. Hidropesías. *D.* A tazas pequeñas.

TISANA DIURÉTICA (*Dubois*).

Raiz de fresa. }
 — de esparraguera. } *a. cinco dracmas.*
 — de brusco. }

Agua, *dos cuartillos y medio.*

Se reduce á dos cuartillos, se cuele y se añade:

Jarabe de hisopo. }
 — de las cinco raices. } *a. una onza.*

I. Dubois aconseja esta bebida en las hidropesías esenciales ó sintomáticas del tejido celular y de las cavidades serosas. En algunos casos se puede añadir nitrato de potasa á la dosis de doce á treinta y seis granos.

OTRA (*Foy*).

Digital fresca, *dos dracmas.*

Azúcar blanca, *media onza.*

Se tritura todo junto y se echa en:

Agua hirviendo, *dos cuartillos.*

Se cuele y se añade:

Jarabe simple, *dos onzas.*

Se da á tazas pequeñas al día.

OTRA (*Necamier*).

Goma arábica, *cinco dracmas.*

Jabon medicinal, *media dracma.*

Nitrato de potasa, *un escrúpulo.*

Carbonato de potasa, *dracma y media.*

Infusion de enebro, *dos cuartillos.*

I. Hidropesía y aun en los casos de cálculos urinarios. *D.* A tazas pequeñas, diferentes veces al día.

TISANA EMENAGOGA.

Limaduras de hierro, *cuatro dracmas.*

Quina machacada, *tres onzas.*

Vino tinto ó agua comun, *dos cuartillos.*

Se infunden durante doce horas y se cuele.

D. Una tacita, cada tres ó cuatro horas.

TISANA EMOLIENTE (H. M.).

Flor de malva, *tres puñados.*

Agua comun, *tres libras.*

Se infunden *S. A.*, se cuele y se añade al líquido colado:

Jarabe de altea, *tres onzas.*

Se da un cortadillo cada tres horas.

TISANA EMULSIONADA.

Almendras dulces, *una onza.*

Avena machacada, *tres onzas.*

Se pistan en un mortero y se vierte poco á poco:

Cocimiento de cebada, *cuatro libras.*

Jarabe de violetas, *dos onzas.*

Agua de canela, *media onza.*

M. D. A tazas pequeñas.

TISANA EMULSIONADA Y NITRADA.

Tisana comun, *un cuartillo.*

Emulsion simple, *un cuartillo.*

Nitro, *un escrúpulo.*

M. D. A tazas pequeñas al dia.

TISANA DE FELTZ.

Zarzaparrilla cortada, *tres onzas.*

Sulfuro de antimonio lavado, *cuatro onzas.*

Cola de pescado, *cuatro dracmas y dos escrúpulos.*

Agua, *ocho libras.*

Se toma el sulfuro de antimonio, se le echa en un lienzo y se forma con él una muñequita; se le hierva primero en el agua para disolver una porcion de ácido arsenioso, que sería capaz de incomodar al enfermo. Cuando se la ha hervido durante una hora cuando menos, se ponen en un perol el agua, la zarzaparrilla y la cola de pescado y se suspende la muñequita por medio de un pedazo de madera, que se coloca en los bordes del perol; entonces se calienta hasta la ebullicion, que se continúa hasta que el liquido se reduzca á la mitad. *Nota.* Se puede sustituir á la cola de pescado el doble en peso de goma arábiga.

I. Enfermedades sifilíticas y ciertas afecciones cutáneas.

Segun Soubeiran no está suficientemente estudiado el efecto químico que puede producir el sulfuro de antimonio en esta preparacion. Cuando está cargado de sulfuro de arsénico, este, segun los experimentos de Guibourt, descompone el agua, desprende hidrógeno sulfurado y deja en el líquido ácido arsenioso. Su cantidad es muy variable, porque no siempre contiene arsénico el sulfuro de antimonio, y además, porque no ejerciéndose la accion del agua sino en la superficie, solo es atacado en una pequeña parte. No se convence de que sea este el único efecto del sulfuro de antimonio. ¿No podría suceder que algunas sales alcalinas ó ácidas diesen lugar á su descomposicion y á la disolucion de algunas partes antimoniales?

D. Un cuartillo al dia en tres veces.

El hijo del doctor Feltz dió esta receta al profesor Boyer, que la comunicó al doctor Cullerier, y este la ha trasmitido á F. Cadet. Esta es la que se emplea en el hospital de los venéreos contra la sífilis constitucional.

TISANA DE GUAYACO Y DAFNE MECERON.

Guayaco raspado. }
 Dafne mecereon. } *a. una onza.*

Agua, *dos cuartillos y medio.*

Se hierve hasta que se reduzca á dos cuar-

tillos, se cuele y se endulza á gusto del enfermo.

I. Afecciones sifilíticas, cutáneas rebel-des, &c. *D.* A tazas en el dia.

TISANA IODADA (*Cullerier*).

Iodo. } *a. dos granos.*
 Ioduro de potasio. }
 Cloruro de sódio, *dos dracmas.*
 Agua, *dos cuartillos.*

I. Escrófulas, sífilis, &c. *D.* A tazas en el dia.

TISANA LUSITANA,

Guayaco raspado, *una onza.*
 Mecercón cortado, *media onza.*
 Zarzaparilla id., *tres onzas.*
 Sulfuro de antimonio en una muñequita de lienzo, *dos onzas.*

Se hierve en :

Agua común, *diez y seis libras,*
 hasta que se reduzca á diez libras y ocho onzas.
 Se echa el cocimiento hirviendo sobre :

Sándalo rojo machacado. } *a. tres onzas.*
 — blanco id. . . . }
 Regaliz machacado, *media onza.*
 Palo de rosa. } *a. una onza.*
 Sasafrás. }

Se dan de dos á cuatro cuartillos al dia contra la sífilis constitucional.

TISANA PECTORAL (H. M.).

Hojas de yedra terrestre, *tres onzas.*

Regaliz, *dos onzas.*

Agua comun, *ocho libras.*

Se cuece *S. A.*, se cuela y se endulza con jarabe de altea.

D. A pasto.

TISANA PURGANTE (H. DE M.).

Hojas de sen, *tres dracmas.*

Raiz de jalapa, *una dracma.*

Anís. } *a. drac. y media.*

Tartrato de potasa. }

Se cuece ligeramente en :

Agua comun, *ocho onzas.*

D. De una vez.

TISANA REAL.

Tamarindos, *dos onzas.*

Sen. } *a. media onza.*

Sulfato de sosa. }

Anís. } *a. una pulgarada.*

Cilantro. }

Perifollo. }

Pimpinela. }

Se vierten dos cuartillos de agua hirviendo sobre todas estas sustancias, se las deja infundir media hora meneando muchas veces y se cuela.

I. y D. Se toma esta tisana en una mañana; purga abundantemente y con mucha suavidad.

**TISANA REFRIGERANTE Y ATEMPERANTE
EN POLVO (F. C. G.).**

Goma arábica, *cuatro libras.*

Azúcar de leche. } *a. dos libras y ocho onz.*
Azúcar. }

Extracto seco de grama, *siete onzas y media.*

Se pulveriza separadamente cada una de estas sustancias y se las mezcla despues segun arte. Se conservan en un local tapado.

I. Gonorrea, irritacion gastro-intestinal, &c.
D. Este polvo á la dosis de media onza, disuelto por la agitacion en dos ó cuatro cuartillos de agua, es de un uso cómodo para las personas que no tienen la facilidad de preparar por sí mismas las tisanas comunes.

TISANA SUDORÍFICA.

Palo de guayaco raspado, *dos onzas.*

Raiz de zarzaparrilla, *una onza.*

— de sasafrás, *dos dracmas.*

— de regaliz, *tres dracmas.*

Agua, *c. s.*

para obtener dos cuartillos de tisana.

TISANA SUDORÍFICA.

Especies sudoríficas, *dos onzas.*

Agua caliente, *dos cuartillos.*

Se digiere durante cuatro horas, se cuele y se añade:

Jarabe de zarzaparrilla compuesto, *dos onz.*

OTRA (H. M.).

Raiz de zarzaparrilla. } *a. tres onzas.*
 — de bardana. . . }

— de regaliz, *dos onzas.*

Agua comun, *seis libras.*

H. S. A. D. A pasto.

OTRA (Dubois).

Raices secas de bardana, *una onza.*

Semillas de cebada, *media onza.*

— de hinojo, *tres dracmas.*

Agua, *dos cuartillos y medio.*

Se reduce por la decoccion á dos cuartillos y se añade:

Jarabe sudorífico de Cuisinier, *dos onzas.*

I. Enfermedades venéreas. Dubois hacia tomar al mismo tiempo el licor de Van-Swieten á la dosis de media onza en una taza de leche ó de agua de goma azucarada.

TISANA SUDORÍFICA ECONÓMICA.

Palo de guayaco. . . . } *a. una onza.*
 — de boj. . . . }
 Raiz de bardana. : : . } *a. media onza.*
 — de paciencia. . . . }
 Bayas de enebro, *dos onzas.*
 Agua, *cuatro cuartillos.*

Se hierve hasta que se reduzca á la mitad.

I. Enfermedades venéreas. *D.* Varias tazas al dia.

TISANA DE VIGAROUX.

Se compone de zarzaparrilla, *seis onzas*; sen mondado, *tres onzas*; palo de guayaco raspado puesto en una muñequita, sasafrás, raiz de china, lirio de Florencia, sulfuro de antimonio, anís verde, tartrato acídulo de potasa, aristoloquia larga y redonda, jalapa machacada y polipodio de encina, *a. onza y media*; y nueces ordinarias groseramente machacadas, cáscaras y carne todo junto, *número doce*. Se ponen estas sustancias en una vasija de diez y ocho cuartillos, se las deja infundir durante veinte y cuatro horas sobre cenizas calientes en cuatro cuartillos de vino blanco de buena calidad. Se vierten despues sobre la infusion doce cuartillos

de agua de fuente y se hace hervir todo á fuego moderado y sostenido hasta que el líquido haya disminuido una tercera parte ó cerca de ella, teniendo cuidado durante la operacion de tener tapada la vasija. Se cuele y se guarda el líquido en botellas, á las que se pondrá el número 1.^o

Se echan sobre el residuo todavía caliente dos cuartillos y medio de vino blanco, y se añade la cantidad suficiente de agua de fuente para obtener la misma cantidad de líquido que en la primera operacion. Se vuelve á cocer hasta que se disminuya una tercera parte ó cerca de ella, se cuele y se guarda en botellas, á las que se pondrá el número 2.^o

I. y D. Se usa esta tisana en los dolores reumáticos y en los producidos por enfermedades venéreas antiguas mal tratadas. Se empieza por usar las botellas que tienen el número 2. Cuando se han gastado ya, se pasa á las que tienen el número 1, y se continúa de este modo alternando hasta que el médico juzgue á propósito suspender la tisana.

TISANA DE VINACHE.

Sulfuro de antimonio, <i>dos onzas.</i>	
Zarzaparrilla.	} <i>a. onza y media.</i>
China.	
Guayaco.	} <i>a. media onza.</i>
Sasafrás.	
Sen.	

Se pone en una muñequita el sulfuro en polvo y se le hierva con la zarzaparrilla, la china y el guayaco en seis cuartillos de agua. Reducido el cocimiento una tercera parte, se añade el sen y el sasafrás, que se dejan infundir; se cuele, se deja aposar y se decanta.

I. Se usa como purgante y sudorífica en las enfermedades cutáneas y en la sífilis. *D.* Muchos vasos en el espacio del día.

TISANA DE ZARZAPARRILLA.

Agua comun, *cuatro vasos.*

Extracto oenolizado de zarzaparrilla, *dos cucharadas.*

Mezclese. *Nota.* Una libra de esta preparación representa dos onzas de zarzaparrilla; un vaso representa cuatro dracmas.

TISANA DE ZARZAPARRILLA COMPUESTA.

Zarzaparrilla cortada en pedazos y machacada, *onza y media.*

Guayaco raspado. } *a. dos onzas.*

Sasafrás raspado. }

Regaliz. } *a. tres dracmas.*

Corteza de mecereon. }

Agua comun, *cuatro libras.*

Se digiere todo durante diez á doce horas y se cuela.

I. Afecciones sifilíticas, herpéticas, &c. *D.*
 A tazas en el dia.

TÓPICOS.

TÓPICO ANTISIFILÍTICO (*Cerillo*).

Miel egipciaca, *dos dracmas.*

Agua pura, *dos onzas.*

D. Se aplica dos ó tres veces al dia sobre las úlceras sifilíticas una compresa empapada en este líquido.

TÓPICO AURÍFERO (*Niel*).

Oro dividido, *veinte y cinco granos.*

Jarabe simple, *una onza.*

Mezclese. *I.* Es á propósito para deterger las úlceras sifilíticas, apagar el dolor y destruir las fungosidades y escrescencias venéreas. *D.*

Se aplica sobre las partes enfermas por medio de un pincel muchas veces al día, y se somete al enfermo á un tratamiento metódico por el muriato de oro y sosa.

TÓPICO CALMANTE (*Thompson*).

Acido prúsico medicinal. } *a. una dracma.*
 Alcohol rectificado. . . }
 Agua, *cinco dracmas.*

Mezclese y agítese al tiempo de usarle. Se empapan lienzos que se aplican sobre las partes doloridas.

OTRO (*Pougens*).

Hojas de beleño. } *a. una onza.*
 Flores de adormidera blanca. }
 Opio disuelto en *c. s.* de vinagre, *seis gr.*

Se hace una pasta. Se aplica sobre la frente en la cefalalgia violenta.

TÓPICO CONTRA EL ACNE.

Cal apagada, *una dracma.*
 Cerato calaminar, *dos onzas.*
 Alcanfor, *un escrúpulo.*

Mezclese. Se usa en unturas sobre la piel.

TÓPICO CONTRA LAS MANCHAS HEPÁTICAS
(*Hufeland*).

Sub-borato de sosa, *media dracma*.

Agua de rosas. } *a. seis dracm.*
— de flores de naranjo. }

H. S. A. I. Manchas de pecas de color amarillo (*manchas hepáticas*), que se presentan en la piel de los jóvenes de uno y otro sexo. *D.* Basta humedecer las manchas tres ó cuatro veces al día con esta disolución, teniendo cuidado de dejar secar las partes sin enjuagarlas. En general desaparecen las manchas al cabo de algunos días.

TÓPICO CONTRA LOS SABAÑONES (*Hufeland*).

Sub-borato de sosa, *dos dracmas*.

Ungüento rosado, *una onza*.

H. S. A. D. C. s. para dar fricciones en las partes enfermas por la noche antes de acostarse.

OTRO (*Berton*).

Alcoholato de Fioraventi, *dos onzas*.

Sub-acetato de plomo líquido, *tres onzas*.

Aceite comun, *tres onzas*.

Acido hidroc্লórico, *una onza*.

Se agita la mezcla al tiempo de servirse de ella. Se untan con este linimento por la no-

che las partes afectadas, y se las cubre despues con papel de seda empapado en el mismo líquido.

TRATAMIENTOS ESPECIALES.

TRATAMIENTO ANTIHIDROFÓBICO *por el Doctor
Gottlieb de Schallern.*

Despues de haber cauterizado con un hierro hecho ascua ó á lo menos con la manteca de antimonio la mordedura hecha por el animal rabioso, se somete al enfermo al uso graduado cada dia, mañana y tarde, del polvo siguiente:

Polvo de raiz de belladona, *un grano.*

Azúcar blanca, *dos escrúpulos.*

Calomelanos, *medio grano.*

Aceite de cajeput, *una onza.*

Se hace polvo y se divide en dos partes iguales.

Se toma una por la mañana y otra por la tarde en jarabe de culantrillo. Al segundo dia se aumenta la dosis de la raiz de belladona grano y medio mas; al tercer dia otro grano; y cada dia se sigue aumentando un grano hasta llegar á veinte, pero dejando intervalos entre las dosis; los demás ingredientes del polvo quedan siempre á las mismas dosis.

Se cura la herida cauterizada con el ungüento siguiente:

Alcanfor, *doce granos.*

Se disuelve en :

Aceite volátil de trementina, *dos escrúpulos.*

Se mezclan con :

Ungüento basilicon, *dos onzas.*

Oxido rojo de mercurio, *ocho granos.*

Cantáridas en polvo, *cuatro escrúpulos.*

Cuando se ha cicatrizado la herida, se usa una mezcla de

Ungüento basilicon, *tres partes.*

— de altea, *cinco partes.*

La bebida del enfermo se compone del cocimiento siguiente:

Yerba y flores de anagálide de los campos, *tres onzas.*

Raiz de saponaria. . . } *a. onza y media.*

— de bardana. . . }

— de regaliz, *tres dracmas.*

Tallos de dulcamara, *seis dracmas.*

Semillas de anís, *una dracma.*

Agua, *c. s.*

para obtener dos cuartillos. Se endulza con jarabe de culantrillo.

En los espasmos que pueden sobrevenir se da la mistura siguiente:

Polvo de belladona, *media dracma.*

Agua destilada de laurel real, *onza y media.*

Láudano líquido de Sydenham, *un escrúp.*

Jarabe de amapolas, *una onza.*

Se toma á cucharadas, teniendo cuidado de menear la mezcla.

El uso simultáneo de todos estos remedios tiene mucha aceptación en Alemania para el tratamiento de la rabia,

TRATAMIENTO DE LA SIFILIS (*Dzondi*).Deuto-cloruro de mercurio, *doce granos*.Agua destilada, *c. s.*

Se añade:

Miga de pan } *a. c. s.*
Azúcar blanca. . . . }

para hacer doscientas cuarenta píldoras, que se rodearán de polvo de canela.

Se administran del modo siguiente:

Días. . .	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º
Píldoras.	4	0	6	0	8	0	10	0
Días. . .	9.º	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Píldoras.	12	0	14	0	16	0	18	0
Días. . .	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24
Píldoras.	20	0	22	0	24	0	26	0
Días. . .	25.	26.	27.					
Píldoras.	28	0	30.					

Cada píldora contiene una décima parte de grano de sublimado.

MÉTODO DE DZONDI MODIFICADO.

Deuto-cloruro de mercurio, *tres granos*.Hidroclorato de amoniaco, *ocho granos*.Agua destilada, *c. s.*

para disolver las sales; se añade:

Polvo de salep, *tres dracmas*.Goma arábica, *una dracma*.

Se forma una masa y se divide en píldoras de á dos granos.

El enfermo tomará los dos primeros días, mañana y tarde, cinco píldoras; desde el tercero al noveno día aumentará la dosis dos píldoras al día, de modo que al cabo de estos nueve días haya tomado los tres granos de sublimado.

Se prepara una nueva cantidad de píldoras aumentando un grano de sublimado. El décimo y undécimo día de tratamiento el enfermo toma diez píldoras en una sola dosis, inmediatamente despues de comer; aumentará la dosis dos píldoras al día desde el undécimo al décimo-octavo.

En una tercera cantidad de píldoras se pone un grano mas de sublimado y no se administran las píldoras mas que cada dos días; de este modo se dan el día diez y nueve veinte y una píldoras, el veinte y uno veinte y dos píldoras, y así sucesivamente aumentando cada vez dos granos.

TRATAMIENTO ANTISIFILÍTICO DE ZITTMANN.

a. Cocimiento fuerte.

Raiz de zarzaparrilla, *doce onzas.*

Agua, *veinte y cuatro cuartillos.*

Se hierve y se añade despues de un cuarto de hora, estando estas tres sustancias contenidas en una muñequita.

Alumbre purificado, *onza y media.*

Mercurio dulce, *media onza.*

Cinabrio antimoniado, *una dracma.*

Se añaden despues, hácia el fin de la ebullicion:

Hojas de sen , *tres onzas.*

Raiz de regaliz , *onza y media.*

Semillas de anís. } *a. media onza.*
 — de hinojo. }

Cuando el líquido se ha reducido una tercera parte, es decir, á diez y seis cuartillos, se le pone en ocho botellas.

b. Cocimiento flojo.

Residuo del cocimiento fuerte:

Raiz de zarzaparrilla , *seis onzas.*

Agua , *veinte y cuatro cuartillos.*

Se hierva y al fin de la ebullicion se añade:

Polvo de cáscara de limon. . . }
 — de canela. } *a. tres drac.*
 — de cardamomo. }

Raiz de regaliz , *seis dracmas.*

Se conserva el líquido colado en ocho botellas de dos cuartillos cada una.

c. Píldoras purgantes.

Cuyo uso debe repetirse cada cinco dias durante la administracion de los cocimientos anteriores:

Calomelanos , *veinte y cuatro granos.*

Resina de jalapa , *onza y media.*

H. S. A. ochenta píldoras.

D. De nueve á doce al dia.

El enfermo empieza á tomar de nueve á doce píldoras de una sola vez. Los cuatro días siguientes bebe por la mañana en ayunas una botella del *cocimiento fuerte*, un poco caliente, y despues del mediodia la misma cantidad del *cocimiento flojo* á la temperatura ordinaria. El sexto dia se repite el uso de los laxantes y á los cuatro dias siguientes el de los cocimientos, como la primera vez.

El enfermo se limita á tomar dos onzas de carnero ó de vaca asada con igual cantidad de pan blanco, y solamente tres sopas los dias de purgacion. Debe guardar cama durante todo este tratamiento y aun no salir de su habitacion, seguir un régimen severo y beber un poco de tisana sudorifica durante algunos dias despues de terminado el tratamiento.

Si pasado este tiempo no se han disipado los caracteres de la infeccion sifilítica, conviene proceder á nuevo tratamiento; pero en el mayor número de casos bastan diez ú once dias para hacer cesar todos los síntomas, ó á lo menos reducirlos al punto de no exigir ya una terapéutica especial.

Este tratamiento es útil en las afecciones venéreas recientes, y en las que son antiguas y han sido tratadas infructuosamente y aun exasperadas por las preparaciones mercuriales.

TRATAMIENTO DE DUPUYTREN CONTRA LA
INFLAMACION DE LA RETINA.

La operacion de la catarata se hace siempre en el Hôtel-Dieu por el método de la depression y de la fraccion. Una de las consecuencias mas comunes y mas graves de este método es la inflamacion de la retina, llamada *inflamacion del iris ó iritis*. Esta afeccion produce los síntomas siguientes: dolores continuados y pertinaces de cabeza, constriccion de la pupila, enturbiamiento de los humores acuoso y vítreo, rubicundez de la conjuntiva, secrecion continua de lágrimas quemantes, imposibilidad de sufrir la mas débil luz, contraccion fuerte de los músculos orbiculares, formacion detrás de la pupila de una película fibrosa accidental, á la que se adhiere comunmente el iris, y por último la ceguera, la cual puede tambien remediarse al cabo de algunos meses, destruyendo ó haciendo mudar de sitio á la película de que se acaba de hablar por medio de la aguja de catarata.

Esta inflamacion atacá comunmente á los niños afectados por escrófulas y presenta los mismos síntomas que en los casos anteriores, unidos á un horror á la luz y á una contraccion del orbicular de los párpados. Esta los obliga á ocultarse en los sitios mas oscuros y á comprimir

los párpados uno con otro, de modo que hacen pasar comunmente el párpado inferior detrás del superior, por lo cual, poniéndose las pestañas del primero en contacto con la conjuntiva del segundo, aumentan los dolores y los peligros de la enfermedad de que se trata.

Se concibe que las sangrías, las sanguijuelas, los diluentes y derivativos, tales como los sedales y los purgantes, estan indicados y son útiles en casos iguales; pero la esperiencia ha hecho conocer frecuentemente su insuficiencia, y esto obligó á Dupuytren á buscar otros medios. El que mejor efecto le ha producido al cabo de diez años es el uso interno del polvo y del extracto *de belladona*, á la dosis siguiente: el polvo á la dosis de tres, cuatro, ocho doce ó mayor número de granos; y el extracto á la de uno, dos, tres y mayor número de granos, uno y otro divididos en seis dosis, de las que se toma una cada dos horas.

Para prevenir el narcotismo general ó local que estos remedios podria producir, Dupuytren acompaña su uso con el del agua de Seltz artificial.

Es inútil decir que el uso de los amargos, de los antiescorbúticos y de los antiescrofulosos, remedios tan prodigados desde hace treinta años, solo puede mantener ó exaltar esta inflamacion en los niños. Los principios de Dupuytren dan bastante á conocer que no los emplea jamás

en estas inflamaciones , aunque puedan provenir de una afección escrofulosa.

TRATAMIENTO ANTISIFILÍTICO DE DUPUYTREN.

La sífilis complica muchas enfermedades quirúrgicas; ella solo produce un gran número. De aquí resulta la necesidad de hacer concurrir los remedios antisifilíticos con los remedios quirúrgicos en el tratamiento de estas afecciones complicadas.

Es importante en este caso la elección de los medios curativos. El mercurio metálico, mezclado con la manteca y administrado en fricciones , no puede emplearse con facilidad en los hospitales generales y en las grandes salas privadas de una temperatura suave , que disponga la piel á la absorción. Además el unguento tiene la propiedad de enranciarse en la superficie de la piel y por consiguiente esparcir un olor infecto, que daña comunmente á los que le emplean y á los que estan cerca de ellos; y por último tienen el inconveniente de manchar por mucho tiempo los vestidos y la ropa de la cama.

El sublimado, administrado por la boca en disolución concentrada ó dilatada, tiene otros inconvenientes: en disolución concentrada obra demasiado directamente sobre el estómago, al que irrita é inflama del mismo modo que á los pulmones; en disolución dilatada en la tisana dia-

ria se descompone casi siempre, se precipita y pierde de este modo toda su virtud; por otra parte su administracion, abandonada á la disposicion de los enfermos, es comunmente muy irregular, &c.

La enfermedad venérea, que complica las enfermedades quirúrgicas, es casi siempre antigua, rebelde y constitucional, y está mas comunmente caracterizada por dolores nocturnos.

Estas consideraciones han obligado á Dupuytren á elegir los medios que emplea contra estas afecciones complicadas. Su tratamiento reúne los sudoríficos, los mercuriales y los calmantes, medicamentos cuya combinacion constituye el conjunto mas á propósito para hacer cesar los dolores y combatir el vicio venéreo mas antiguo y mas rebelde.

Da los sudoríficos en tisana y en jarabe, despues el sublimado y el opio combinados y reducidos á píldoras y todo del modo siguiente :

Se toma todos los dias, dividida entre la mañana y tarde, en la cama, si fuese posible, la tisana siguiente :

China.	} <i>a. media onza.</i>
Zarzaparrilla.	
Guayaco.	
Agua, dos cuartillos.	

Se hierva hasta que se reduzca una tercera parte.

Se añade al primer vaso de este cocimiento

por la mañana y al último vaso por la tarde :

Jarabe sudorífico, *dos onzas*.

Por último, se toma todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, una hora á lo menos antes de la comida mas inmediata, una píldora compuesta de

Extracto de guayaco, *dos granos*.

— acuoso de opio, *medio grano*.

Deuto-cloruro de mercurio, *un sexto de grano*.

Una dieta moderada auxilia la acción de este tratamiento.

Generalmente no emplea ningun tratamiento antisifilítico local. De este modo los síntomas locales son hasta cierto punto el termómetro de la eficacia de los medios internos, y desaparecen casi constantemente despues de algun tiempo de su uso; á saber: los dolores al cabo de ocho á diez días; el carácter venéreo de las heridas y úlceras al cabo de algunas semanas; las induraciones, las escrescencias y aun las úlceras al cabo de un mes ó seis semanas, y los exostosis los últimos.

En general se consideran como radicalmente curadas las afecciones venéreas, cuyos síntomas han desaparecido. Pero Dupuytren creia que en el mayor número de casos la enfermedad solo estaba paliada, y ha atribuido á los tratamientos dirigidos segun estos principios las recidivas espontáneas que presentan tan comunmente las enfermedades venéreas en los hospitales; ha

adoptado tambien por regla general en el tratamiento de las enfermedades venéreas constitucionales continuar el uso de los medios curativos despues de la desaparicion completa de todos los síntomas durante un tiempo igual al que ha sido necesario para disipar estos síntomas. Solo entonces se han curado la causa y los efectos y hay que temer las recidivas.

TRATAMIENTO DE LA CARIDAD *contra el cólico de los pintores.*

Primer dia.

Se administra la *lavativa purgante de los pintores*, que se compone de:

Hojas de sen, *media onza.*

Agua, *un cuartillo.*

Se hierva el sen en el agua y se añade al cocimiento:

Sulfato de sosa, *media onza.*

Vino emético, *cuatro onzas.*

Durante el dia se hace tomar el *agua de casia con los granos*, que consta de:

Cocimiento de pulpa de cañafistula, *dos cuartillos.*

Sal de Epsom, *una onza.*

Tártaro emético, *tres granos.*

Si el cólico es muy violento y el enfermo es muy robusto se añade algunas veces al agua de casia:

Jarabe de espiño cervical , *una onza.*

Confeccion de Hamech , *dos dracmas.*

A las cinco de la tarde se da la *lavativa anodina de los pintores* , que se prepara con :

Aceite de nueces , *seis onzas.*

Vino tinto , *doce onzas.*

A las ocho se administra un *bolo* formado de :

Triaca , *una dracma ó dracma y media.*

Opio , *un grano ó grano y medio.*

Segundo dia.

Se administra por la mañana el vomitivo llamado *agua bendita* , que se compone de :

Tártaro emético , *seis granos.*

Agua tibia , *ocho onzas* ,

para tomarle en dos veces con dos horas de intervalo.

Cuando se presentan los vómitos , se facilitan con agua tibia y , luego que el enfermo ha concluido de vomitar , se le da todo el resto del dia la *tisana sudorífica* , que se prepara con :

Guayaco.	} <i>a. una dracma.</i>
China.	
Zarzaparrilla.	

Se hierve durante una hora en :

Agua común , *tres cuartillos* ,

que se reducen á dos , y se añade :

Sasafrás , *una onza.*

Regaliz , *media onza.*

Se hierve ligeramente y se cuela.

A las cinco de la tarde se usa la lavativa anodina, y á las ocho la triaca con el opio como el primer dia.

Tercer dia.

Se prescribe la *tisana sudorífica laxante* que sigue:

Tisana sudorífica simple, *dos cuartillos.*

Sen, *una onza.*

Se hierva un poco y se cuela. Se toma de una vez por la mañana.

En el resto del dia se administra la tisana sudorífica simple; por la tarde á las cuatro la lavativa purgante de los pintores, dos horas despues la lavativa anodina, y por último á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Cuarto dia.

Se da la *pocion purgante de los pintores*, que se prepara con:

Sen, *dos dracmas.*

Agua, *ocho onzas.*

Se hierva hasta que se reduzca á seis onzas y se añade:

Sal de Glaubero, *media onza.*

Jalapa en polvo, *una dracma.*

Jarabe de espino cerval, *una onza.*

Se favorece la accion de este purgante con el auxilio de un caldo de yerbas. Durante el dia

se vuelve al uso de la tisana sudorífica; á las cinco de la tarde se da otra vez la lavativa anodina, y á las ocho se repite el bolo de triaca con el opio.

Quinto dia.

Tisana sudorífica laxante; por la tarde á las cuatro la lavativa purgante, á las seis la lavativa anodina, y á las ocho el bolo de triaca con el opio.

Sesto dia.

Se vuelve á dar el purgante de los pintores y, del mismo modo que en el cuarto dia, se da la tisana sudorífica simple, la lavativa anodina y el bolo de triaca con el opio.

Comunmente los enfermos se curan despues de la segunda medicina; pero si subsistiesen los cólicos, se repite el purgante una, dos, tres veces ó mas, observando la misma conducta que en el cuarto y sexto dia; en los dias intermedios se sigue el mismo método que en el tercero y quinto.

Hay algunos casos, aunque raros, en que los purgantes no determinan evacuaciones ni por arriba ni por abajo; en este caso se usan los *bolos purgantes de los pintores*, que se componen de:

Diagridio.	} a. diez granos.
Resina de jalapa.	

Gutagamba, *doce granos.*

Confeccion de Hamech, *dracma y media.*

Jarabe de espino cervical, *c. s.*

Se hacen doce bolos, de los que se toma uno cada dos horas.

Durante este tratamiento debe prescribirse una dieta severa en los dos ó tres primeros días; se empieza á dar caldos al cuarto ó quinto día, y despues se aumentan gradualmente los alimentos. Cuando se empieza á dar vino debe ser añejo y de buena calidad.

En los niños, en las personas débiles y en las mujeres se disminuyen las dosis del tratamiento, en particular las del vomitivo y las del purgante, pues solo se da la mitad ó la tercera parte de la dosis.

Este es el tratamiento que á pesar de su extraña composicion cuenta tan numerosas curaciones, que muchos médicos han creido deber adoptarle con la mayor escrupulosidad. Lermnier le sigue exactamente en el hospital de la Caridad, á donde acude el mayor número de enfermos del cólico metálico á obtener su curacion. Fouquier ha creido deber modificar este medio empírico; habiéndole demostrado la observacion que en el mayor número de casos existe disposicion marcada al vómito, ha llenado esta indicacion dando un emeto-catártico (agua mineral) que repite dos y aun tres veces hasta que han cesado las náuseas. Entonces solo administra

los purgantes, en los que insiste hasta que las evacuaciones alvinas sean abundantes y fáciles. No usa la lavativa anodina de los pintores, ni el bolo de triaca y opio. Restablecer y mantener el curso de las evacuaciones alvinas son las dos principales indicaciones que Fouquier cree deben llenarse en el tratamiento del cólico metálico. Este práctico usa poco los narcóticos, y antes que la experiencia le hubiese probado la poca eficacia del extracto de beleño, le prefería al de opio, como remedio menos á propósito para producir una constipacion, que constituye la parte principal de la enfermedad. Considera á los medios que la destruyen como el único remedio de dolores atroces que experimentan los enfermos.

Kapeler, médico del hospital de san Antonio, combate con feliz éxito el cólico de plomo por el uso del alumbre, á la dosis de una ó dos dracmas en una pocion gomosa. Se repite otra dosis cuando no se disipa el mal despues de tomar la primera. Los demás remedios que emplea el práctico distinguido de que acabamos de hablar son las lavativas, ya simplemente emolientes, ya aceitosas, que se repiten frecuentemente y algunas veces cada media hora.

TRATAMIENTO DEL CÓLICO DE PLOMO (*Ranque*).

El primer dia toma el enfermo un semicu-
pio de media hora, para que la piel se ponga mas

permeable y susceptible de recibir la impresion de los tópicos que se han de aplicar; despues de salir del baño, se cubre todo el abdómen con un *epitema* compuesto del modo siguiente :

Emplasto de cicuta. . .	}	<i>a. ónza y media.</i>
— de diaquilon. . .		
Triaca, <i>media onza.</i>		
Alcanfor, <i>una dracma.</i>		
Flores de azufre, <i>media dracma.</i>		

Se mezcla todo á fuego lento, y se extiende sobre una piel ó un lienzo bastante grande para cubrir todo el abdómen, incluso el epigastrio y hasta una pulgada del miembro. Antes de aplicar el epitema se le calienta, y despues se cubre su superficie con la mezcla siguiente:

Alcanfor.	}	<i>a. una dracma.</i>
Tártaro emético. . .		
Azufre en polvo, <i>media dracma.</i>		

Se quitará este epitema luego que los enfermos se quejen de la erupcion pustulosa que produce, y se sustituirá por otro nuevo si aun no se hubiesen calmado los dolores cólicos.

Se cubren tambien los lomos desde la última vértebra dorsal hasta el sacro con el *epitema lumbar*, que se prepara con:

Masa emplástica del epitema abdominal, *c. s.*

Se extiende en una piel ó un lienzo del grandor suficiente y se espolvorea con:

Alcanfor, *dos dracmas.*

Este último epitema puede permanecer aplicado por espacio de cinco ó seis dias.

Se frotarán los muslos y los miembros doloridos con el *linimento* siguiente:

Agua destilada de laurel real, *dos onzas*.

Éter sulfúrico, *una onza*.

Extracto de belladona, *dos escrúpulos*.

Se mezcla y se agita antes de usarle. Se empleará una ó dos cucharadas para cada fricción.

Si subsiste astringencia de vientre, se administra la *lavativa antineuropática*, que consta de:

Tintura etérea de hojas de belladona (1),
treinta gotas.

Aceite de olivas ó de almendras dulces, *cuatro onzas*, ó

Cocimiento de semillas de lino, *ocho onzas*.

Esta lavativa se aplica una ó dos veces al día según la intensidad del dolor y la duración de la constipación.

Cuando los dolores se hacen muy violentos, se usa á cucharadas la *poción antineuropática* siguiente:

Agua de tilo, *dos onzas*.

Tintura etérea de belladona, *veinte gotas*.

Jarabe de horchata, *media dracma*.

Algunas veces reemplaza Ranque esta poción por la *mezcla* siguiente:

Tintura etérea de belladona, *seis gotas*.

Jarabe de horchata, *una dracma*.

(1) Puesto el éter en digestión durante algún tiempo sobre el polvo de belladona, quita á esta planta su propiedad venenosa y le da una propiedad sedante.

Se mezcla para una sola dosis.

Durante este tiempo el enfermo estará á dieta absoluta, y usará por bebida agua de cebada gomosa, suero ó emulsiones en pequeña cantidad.

Segundo dia. Se continúa del mismo modo, solo que se suprime la pocion á los sugetos á quienes no calma los dolores. Se sigue exactamente el mismo régimen.

Tercer dia. Se quita el epitema abdominal á los que ya no tienen cólico; se le reemplaza por franelas empapadas en un cocimiento emoliente caliente. Entonces se disponen algunos ligeros alimentos. Cuando es poco considerable el alivio, se reconoce si el epitema ha producido alguna rubicundez; entonces se le vuelve á poner, añadiendo dos draemas de tártaro estibiado. Si no ha habido los cambios que acabamos de enumerar, se continúa con la pocion, la lavativa, las fricciones, las hêbidas y el régimen severo.

Cuarto dia. Si se han calmado los dolores, se quitan los dos epitemas.

Se continúa con las lavativas y las fricciones en los casos en que no haya deposiciones ó subsistan aun los dolores de los miembros.

Cuando han disminuido mucho los dolores, se deja aun el epitema abdominal hasta el dia siguiente, á no ser que el enfermo sufra mucho. Cuando persisten con la misma intensidad, lo que es muy raro, se reconoce levantando el epitema

abdominal, que no ha producido rubicundez ni pústulas. Entonces es necesario aplicar tres ó cuatro ventosas escarificadas en el vientre y hacer tercera aplicacion del epitema, duplicando la dosis del tártaro estibiado.

Se continúa con las fricciones y las lavativas; se aumenta la porcion de alimentos á los sujetos que los soportan bien, y á los que no recobran el apetito se les da una infusion aromática mezclada con leche y un poco de caldo grasoso, mezclado igualmente con leche.

Quinto dia. Si las pústulas que se han desarrollado en el vientre escitan mucha irritacion, se las curará con una mezcla de cerato y unguento rosado extendida en hojas de acelga. Cuando persiste el dolor en las rodillas, en las pantorrillas ó en las plantas de los pies, se reemplaza el linimento por el epitema estibiado, que se aplica en todos los puntos en que existe dolor.

Si se paralizan las manos y las muñecas, se las frota con el linimento; si se declara una amaurosis ó queda cefalalgia, despues de haber cesado el cólico, se frotan con el mismo linimento las sienes, la frente y la nuca; si falta apetito para el sexto dia, se administra el aceite de ricino ó cualquiera otro purgativo.

TRATAMIENTO DEL CÓLICO DE PLOMO
(*Martin Solon*).

Prescribe la *pocion purgante* siguiente;

Jalapa en polvo, *doce granos*.

Sulfato de sosa, *media onza*.

Maná, *una onza*.

Agua, *c. s.*

Se prepara una pocion de cuatro onzas.

Por la tarde se administra una lavativa con sen y sulfato de sosa, y poco despues un julepe con una onza de jarabe de diacodion.

Se repite la misma prescripcion al dia siguiente, sino han cedido completamente los síntomas, lo que sucede con frecuencia. Pero despues del segundo purgante se disipan el estreñimiento y los dolores de los miembros, la cara recobra su expresion natural y se restablece el apetito. Muchos enfermos á quienes se les ha tratado de este modo, se han curado al quinto ó sexto dia de tratamiento. Toma además el enfermo una tisana de vaca tamarindada.

TRATAMIENTO DE LAS NEURALGIAS POR LA
ESENCIA DE TREMENTINA.

La esencia de trementina tiene al parecer una accion específica; su efecto inmediato es producir primero en los órganos digestivos y

despues en el trayecto del nervio enfermo un calor considerable, al que sucede pronto la curacion. La duracion media de este tratamiento es de seis dias, y es tanto mas eficaz cuanto mas aguda es la forma de la enfermedad. El modo mas conveniente de administrarla es interiormente. Algunas veces se manifiestan signos de irritacion gastro-intestinal durante el uso de la esencia de trementina; mas comunmente son pasajeros, y en un gran número de casos no se manifiestan.

Generalmente se administra la trementina combinada con la miel rosada en las proporciones siguientes :

Esencia de trementina, *dos dracmas.*

Miel rosada, *cuatro onzas.*

Se toman cada dia tres cucharadas de esta mezcla.

Esta es la fórmula mas general; pero comunmente los enfermos no pueden soportarla por su sabor detestable, el estómago la rehusa frecuentemente y entonces se emplean las preparaciones siguientes :

Looc terebintinado.

Yema de huevo, *núm. dos.*

Esencia de trementina, *tres dracmas.*

Jarabe de yerbabuena, *dos onzas.*

— de flores de naranjo. } *a. una onza.*
 — de éter. }

Tintura de canela, *media dracma.*

H. S. A. un looc.

La dosis es de tres cucharadas al día.

Algunas veces se añade á este looc una dracma de láudano para prevenir el vómito.

Opiata terebintinada.

Aceite de trementina, *dos dracmas.*

Goma arábica en polvo, *onza y media.*

Jarabe simple, *media onza.*

Jarabe de flores de naranjo, *una onza*

H. S. A. una opiata.

Se tomará la tercera parte cada día en tres veces y entre dos obleas.

Cuando no son suficientes estas preparaciones para hacer que el enfermo soporte la esencia de trementina, se la usa en fricciones, asociándola al láudano líquido.

Linimento terebintinado.

Aceite de manzanilla, *dos onzas.*

Esencia de trementina, *una onza.*

Láudano de Sydenham, *una dracma.*

En los casos de neuralgia de los nervios lumbares se usa ventajosamente este medicamento en lavativa.

Lavativa terebintinada.

Aceite de trementina, *una onza.*

Yema de huevo, *núm. una.*

Cocimiento de adormideras, *medio cuartillo.*

TRATAMIENTO DE DUPUYTREN *contra la hidropesía pasiva del tejido celular.*

Prescribe para bebida :

Raiz de grama.	} <i>a. media onza.</i>
— de fresa.	
— de brusco.	

Agua comun, *dos cuartillos.*

Se hace un cocimiento y se añade :

Jarabe de las cinco raices, *dos onzas.*

Nitrato de potasa, *quince granos.*

Píldoras.

Jabon medicinal, *tres dracmas.*

Polvo de digital, *una dracma.*

Calomelanos, *dos dracmas.*

Para setenta y dos píldoras.

Se toma una por la mañana y otra por la tarde.

Linimento.

Aceite de manzanilla, *seis onzas.*

Tintura de cebolla albarrana.	} <i>a. una drac.</i>
— de digital.	

Se mezcla agitando.

Se dan por la noche fricciones en las partes infiltradas.

Cada cuatro días se suspende el tratamiento para tomar un purgante.

TROCISCOS.

TROCISCOS DE ALHANDAL ó *trociscos de fruto de coloquintida* (F. E.).

Polvo de coloquintida, *cuatro onzas.*

— de goma tragacanto, *dos dracmas.*

Vino blanco generoso, *c. s.*

H. S. A. I. y D. Son purgantes desde dos á veinte y cuatro granos, y se usan en las enfermedades cutáneas, en la hidropesía, en el letargo y en la apoplejía. Se pueden usar en lavativas disueltos en un vehículo apropiado.

TROCISCOS ANTHELMÍNTICOS (F. M.).

Mercurio dulce, *media onza.*

Cuernq de ciervo preparado, *dos escrúpulos.*

Canela, *un escrúpulo.*

Diagridio sulfurado, *una dracma.*

Azúcar blanca, *una onza.*

Conserva de rosas encarnadas, *dos dracm.*

Goma tragacanto disuelta en agua rosada,
c. s.

H. S. A. trociscos. I. Afecciones verni-

nosas. *D.* De medio á un escrúpulo segun la edad.

TROCISCOS DE CARBONATO DE PLOMO ALCANFORADO (F. E.).

Albayalde muy blanco y porfirizado, *onza y media.*

Almidon en polvo. }
Goma arábiga. . } *a. dos dracmas.*
Alcanfor, *media dracma.*

Se reducen á polvo separadamente y con *c. s.* de agua se hacen trociscos: se tendrá cuidado de disolver el alcanfor en alcohol.

Si á una dracma de estos trociscos se añaden tres granos de opio, se llaman entonces *trociscos blancos de Rhasis. I.* Se usan exteriormente en las enfermedades de los ojos; calman la irritacion é inflamacion y moderan las flujiones.

TROCISCOS DE CUBEBAS (*Dr. Spitta*).

Pimienta de cubebas en polvo, *dos dracmas.*
Bálsamo de Tolú, *seis gotas.*

Mezclense exactamente. Por separado se toma:

Extracto de regaliz purificado. }
Jarabe de bálsamo del Perú. . } *a. una onza.*
Goma arábiga en polvo, *c. s.*

Se hace una pasta con estas sustancias y el polvo de cubebas aromático anterior, y se

forman con ella trociscos de diez granos de peso cada uno.

I. Coriza. D. Se pone uno ó dos trociscos sobre la lengua, y á medida que se funden en la boca desaparece el coriza.

TROCISCOS DE CHAUSSIER.

Azúcar, *nueve dracmas.*

Alcanfor, *una dracma.*

Opio, *un escrúpulo.*

Goma tragacanto, *medio escrúpulo.*

Agua, *c. s.*

II. S. A. ciento cincuenta trociscos, en cada uno de los cuales hay una sexta parte de grano de opio.

I. Tisis laringea y angina. D. De cuatro á seis al dia. *Nota.* Hay tan poca diferencia entre estos trociscos y las pastillas de Chaussier contra el crup, que parece duplicada la insercion de las dos fórmulas. En efecto, las sustancias componentes son las mismas, casi igual la proporcion de las sustancias entre sí, y aun la division de la masa total.

TROCISCOS ESCARÓTICOS ó de muriato oxigenado de mercurio (F. E.).

Sublimado corrosivo, *una onza.*

Almidon, *una onza y seis dracmas.*

Se hacen polvos muy sutiles en un mortero

de piedra y con *c. s.* de goma tragacanto se hacen trociscos oblongos, á los que se podrá añadir la cantidad que se quiera de opio. *I.* Se usan como escaróticos para destruir las fungosidades y callosidades de las fístulas y úlceras, para combatir los hongos y abrir abscesos.

TROCISCOS DE MINIO.

Sublimado corrosivo, *dos dracmas.*

Minio, *una dracma.*

Miga de pan tierno, *ocho dracmas.*

Agua destilada, *media dracma.*

II. S. A. trociscos de la figura de los granos de avena, y que tengan tres granos de peso cuando están húmedos; pesan dos despues de la desecacion. *I.* Se usan en los mismos casos que los anteriores.

TROCISCOS ESCILÍTICOS (F. E.).

Médula de escila cocida, *una libra.*

Dictamo blanco, *c. s.*

Se hace una masa y con ella pastillas ó trociscos que se ponen á secar. *I.* Son incipientes y entran en la composicion de la triaca. *D.* De media á una dracma.

TROCISCOS DE HEDICROY ó *trociscos de cálamo aromático de Hedicroy* (F. E.).

Se componen de maro , mejorana , raíz de asaró y palo aloe , *a. once onzas*; raíz de cálamo aromático , esquenanto , hojas de Santa María , valeriana mayor , canela , opobálsamo y jilobálsamo , *a. diez y seis onzas*; malabatro , nardo de Indias , cassia lignea , mirra y azafran , *a. treinta y dos onzas*; amomo racimoso , *sesena y tres onzas*, y almáciga , *cinco onzas y dos dracmas*.

Se reducen á polvo y se hacen trociscos con vino blanco bueno. Entran en la composicion de la triaca.

TROCISCOS DE RAMICHI (F. E.).

Zumo de membrillos , *diez y seis onzas*.

— de agraz , *onza y media*.

Nuez de ciprés , *tres onzas*.

Hojas de arrayan , *dos onzas*.

Rosas rojas , *una onza*.

Se cuecen ligeramente , se cuele y se añade :

Goma arábica en polvo , *onza y media*.

Sándalo cetrino id. , *diez dracmas*.

Zumaque id. , *una onza*.

Rosas rojas id. , *una onza*.

Pimienta de Tabasco , *onza y media*.

Se expone la masa al sol hasta que se seque , se pulveriza despues sutilmente y con *c. s.* de agua de rosas se hacen trociscos *S. A.*

I. Son astringentes. D. De una á dos dracmas.

UNGUENTOS.

UNGUENTO DE LA ABADIA DE BEC.

Manteca. } a. diez y seis onzas.
 Pez de Borgoña. }
 Cera amarilla, diez onzas.
 Pez resina. } a. cinco onzas.
 Pez naval. }
 Incienso en polvo, una onza y dos dracm.

II. S. A. I. Úlceras indolentes. D. C. s. para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre las partes enfermas.

UNGUENTO DE ACETATO DE PLOMO ó manteca de Saturno (F. E.).

Acetato de plomo líquido. } a. una libra.
 Aceite comun. }

Se mezclan en un mortero de piedra y se agita con una mano de madera hasta que adquiera la consistencia de linimento.

I. Úlceras, quemaduras, escoriaciones &c.

UNGUENTO DE ALDERETE ó unguento de muriato
de mercurio oxigenado (F. E.).

Manteca de vacas fresca, *cuatro onzas.*

Trementina. } *a. una onza.*
Aceite rosado. }

Se derriten á fuego lento; despues se me-
nea bien en un mortero de piedra y se mezclan
los polvos siguientes:

Albayalde, *dos onzas y media.*

Sublimado corrosivo, *dos dracmas.*

Alumbre, *dos dracmas.*

Despues se añade:

Yemas de huevo, *núm. dos.*

Zumo de limon, *dos onzas.*

Se mezcla todo y se guarda para el uso.

A cada onza de este unguento corresponde
medio escrúpulo de sublimado. *I.* Sarna y va-
rias enfermedades de la piel.

UNGUENTO DE ALTEA (F. E.).

Aceite de altea, *dos libras.*

Cera amarilla. } *a. media libra.*
Resina. }

Se licúan y despues se mezcla:

Trementina pura, *dos onzas.*

I. Se usa como desecante y emoliente. *D.*
La misma que los anteriores.

UNGUENTO AMONIACAL.

Carbonato de amoniaco, *una dracma.*

Ungüento rosado, *una onza.*

Accite de jazmin, *cuatro gotas.*

M. I. Infartos de las mamas. *D.* Se usa en fricciones, tres ó cuatro veces al dia.

UNGUENTO ANTHELMINTICO (*Boerhaave*).

Bilis de luey. } *a. una dracma.*

Acibar. }

Ungüento de altea, *una onza.*

Se usa en fricciones ó en aplicaciones sobre el abdómen.

UNGUENTO ANTIHEMORROIDAL.

Acetato de plomo, *quinze granos.*

Corcho quemado en polvo, *cuatro dracmas.*

Manteca fresca, *dos onzas.*

M. por trituracion.

UNGUENTO DE ARCEO ó *bálsamo arceo* (F. E.).

Sebo, *una libra.*

Trementina pura. } *a. diez onzas.*

Resina elemi. }

Manteca de puerco. . . . }

Se liquidan y se cuele.

I. Se usa como escitante en el tratamiento de las heridas indolentes y de las úlceras.

La composición del *bálsamo arceo* de los hospitales militares solo se diferencia del anterior en que contiene seis onzas de manteca de puerco.

UNGUENTO DE ARTÁNITA COMPUESTO (F. E.).

Se compone de aceite reciente de raíz de artánita, *dos libras*; manteca de vacas y cera amarilla, *a. ocho onzas*. Se licúan á fuego lento y se añade: goma sagapeno purificada y hiel de buey espesada hasta la consistencia de miel, *a. media onza*. Se mezcla todo y cuando está á medio enfriar se añaden los polvos siguientes: escamonea, raíz de jalapa, coloquintida, hojas de mercuron y acibar, *a. media onza*; sal gema, euforbio, mirra, pimienta larga, gengibre y flor de manzanilla, *a. dos dracmas*.

Se mezcla todo *S. A.* y se guarda para el uso.

I. Facilita el movimiento de vientre, resuelve los tumores edematosos y destruye las lombrices. *D. C. s.* para untar las partes afectadas ó el vientre.

UNGUENTO BASILICON ó de colofonia amarillo
(F. E.).

Cera amarilla.	} <i>a. una libra.</i>
Seho.	
Resina.	
Colofonia.	

Se licúan en

Aceite comun, *libra y media.*

Se cuele. Si se pone pez negra en lugar de la colofonia, se obtiene el unguento *basilicon negro de la F. E.* *Nota.* Este unguento se endurece mucho y debe preferirse la fórmula siguiente :

Pez negra.	} <i>a. treinta y dos partes.</i>
Cera amarilla.	
Colofonia.	

Aceite comun, *ciento veinte y ocho partes.*

Se derriten la pez y la colofonia y se añaden la cera y el aceite; cuando se ha fundido todo, se cuele encima de un mortero ó de un barreño de fondo convexo; se agita con la mano de un mortero hasta que el unguento esté tibio y entonces se le guarda en vasijas convenientes.

I. Se usa como escitante para acelerar la cicatrizacion de las úlceras indolentes y la supuracion de los tumores inflamatorios.

UNGUENTO BLANCO ALCANFORADO.

Manteca, *cinco libras.*

Proto-carbonato de plomo, *dos libras y seis onzas.*

Se calienta, se agita hasta que la grasa tenga la consistencia de unguento y se añade:
Alcaufor en polvo, *seis dracmas.*

I. Quemaduras y contusiones. *D. C. s.* para cubrir ligeramente una planchuela de hilas ó un lienzo fino, que se aplica sobre la parte enferma.

UNGUENTO BLANCO DE RHASSIS (F. E.).

Albayalde, *una libra.*

Aceite rosado, *libra y media.*

Cera blanca, *cuatro onzas.*

Se liquida la cera en el aceite, se mezcla en seguida el albayalde y despues se cuece poco á poco á fuego lento, y se agita hasta que se enfríe.

El *ungüento blanco* de los hospitales militares tiene la misma composicion que el anterior.

Soubeiran adopta la fórmula y modo de preparacion siguiente; porque el unguento anterior se enrancia con facilidad y adquiere acritud, por lo cual es mejor prepararle en el momento de usarle.

Albayalde, *una parte.*

Manteca, *cinco partes.*

M. I. Esta pomada se usa como desecante para facilitar la cicatrizacion.

UNGUENTO ó bálsamo de calabaza.

Calabaza comun. . .	} <i>a. una libra.</i>
Hojas de verdolaga. . .	
— de violeta. . .	
— de llanten. . .	
— de yerba mora. . .	

Se machacan en un mortero de piedra y se ponen á macerar por dos dias en un sitio caliente con:

Accite, *cinco libras.*

Se maceran durante dos dias en un sitio caliente, se cuece hasta que se haya consumido la humedad, se exprime fuertemente y en el aceite depurado se derrite:

Cera, *una libra.*

Se prepara el unguento *S. A. I.* Se usa como calmante.

UNGUENTO BRUNO.

Ungüento basilicon, *diez y seis partes.*

Precipitado rojo, *una parte.*

M. I. y D. Se usa para curar las úlceras atónicas, como estimulante y ligeramente ca-terético.

UNGUENTO CITRINO ó *de nitrato de mercurio*
(F. E.).

Mercurio. }
Acido nítrico. } *a. una onza.*

Se echa poco á poco el ácido en una vasija de vidrio sobre el mercurio. Entonces se toma: Manteca líquida y ya medio enfriada, *diez onzas.*

Se echa en un mortero de piedra y se agita la mezcla hasta que se enfrie.

UNGUENTO DE COBRE (*Swediaur*).

Disolucion de cobre amoniacal, *una drac.*
Cerato simple, *una onza.*

M. I. Ulceras atónicas y fungosas.

UNGUENTO DE LA CONDESA (F. E.).

Aceite de arrayan, *una libra.*

Cera amarilla, *tres onzas.*

Se licúa la cera en el aceite, se aparta del fuego y se añade:

Nuez de agallas en polvo, *una onza.*

Bayas de arrayan en id.)

Nuez de ciprés en id.)

Cáscaras de naranjas en id.)

Zumaque en id., *una onza.*

Almáciga en id., *media onza.*

Se agita hasta que se enfrie y se guarda.

Se usa como tónico y astringente y contra la hemorroides. *D.* Se usa en unturas.

UNGUENTO CONTRA LOS HERPES ó *de mercurio dulce*
(F. E.).

Ungüento rosado, *seis onzas.*

Mercurio dulce, *seis dracmas.*

Se mezclan en un mortero de vidrio.

I. Herpes, sarna y manchas de la piel. *D.* La misma que los anteriores. *Nota.* Cada tres dracmas de este ungüento contienen un escrúpulo de mercurio dulce.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA.

Manteca, *quince onzas.*

Carbon de leña en polvo. }
Flores de azufre. . . . } *a. cuatro onzas.*

Hollin, *dos onzas.*

H. S. A. D. Se frotan con este ungüento las partes afectadas cada tres dias, despues de haber lavado la cabeza con agua de jabon.

Nota. Esta fórmula es igual á la del ungüento contra la tiña con carbon vegetal de los *II.* de *M.*

OTRO.

Vinagre blanco, *treinta cuartillos.*

Harina de trigo. }
Pez negra. . . . } *a. seis libras y ocho onz.*
Pez de Borgoña. }

Se extiende sobre un pedazo de piel y se aplica sobre las partes que padecen tiña. A las doce horas se quita y se lava la herida.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA CON CARBON ANIMAL (II. DE M.).

Carbon animal, *dos onzas.*

Azufre puro, *una onza.*

Precipitado blanco, *cuatro dracmas.*

Sebo. } *a. libra y media.*
Manteca de puerco. }

H. S. A.

UNGUENTO DIURÉTICO.

Cebolla albarrana en polvo, *media dracma.*

Ungüento mercurial, *una dracma.*

M. exactamente. *I.* Hidropesías. *D.* Se dan fricciones en la parte interna de los muslos y en el bajo vientre, cuando los enfermos no pueden tomar las preparaciones de cebolla albarrana.

UNGUENTO DEL DUQUE.

Aceite de nueces, *ocho onzas.*

Flores de azufre, *dos onzas.*

Se los calienta en el baño de arena hasta que se disuelve el azufre y el aceite se vuelve rojo; despues se funde:

Manteca, *ocho onzas.*

Cera amarilla, *una onza.*

Se le da color con *c. s.* de ancusa.

Se cuele por un lienzo y se echa en un mortero de mármol para mezclar en él exactamente el aceite de azufre.

I. Ulceras indolentes y tumores articulares indolentes. *D. C. s.* para cubrir ligeramente las partes enfermas.

UNGUENTO EGIPCIACO ó *ungüento de óxido de cobre (F. E.).*

Miel buena, *catorce onzas.*

Vinagre fuerte, *siete onzas.*

Cardenillo en polvo, *cinco onzas.*

Se cuece á fuego lento hasta que adquiriera la consistencia de unguento, y de suerte que tome un color de púrpura.

Mundifica las úlceras antiguas y fistulosas y destruye las fungosidades.

El *ungüento egipciaco* de los hospitales militares tiene la misma composicion que el anterior.

UNGUENTO EPISPÁSTICO.

Ungüento basilicon, *cuatro onzas.*

Semillas de mostaza, *media onza.*

Estafisagria.	} <i>a. una dracma.</i>
Pimienta larga.	
Pelitre.	

Euforbio, *un escrúpulo.*

Trementina, *c. s.*

H. S. A. I. y D. Las mismas que el siguiente. *Nota.* Este unguento no tiene acción sobre la vejiga.

UNGUENTO EPISPÁSTICO (*Cadet*).

Ungüento basilicon. . . } *a. una onza.*
 — populeon. . . }

Cantáridas en polvo, *diez y ocho granos.*

H. S. A. I. Se emplea para mantener la supuración de los vejigatorios. *D. C. s.* para cubrir ligeramente un pedazo de papel fino ó una hoja de acelga.

UNGUENTO EPISPÁSTICO ó de cantáridas (*F. E.*).

Ungüento de colofonia amarillo, *tres onzas.*

Cera amarilla, *media onza.*

Se derriten y se añade:

Cantáridas en polvo, *onza y media.*

Se mezcla á fuego lento. *I. y D.* Las mismas que los anteriores.

UNGUENTO DE ESTORAQUE.

Colofonia, *diez y seis partes.*

Resina elemí. }
 Cera amarilla. } *a. ocho partes.*
 Estoraque líquido. }

Aceite de nueces, *doce partes.*

Se funden á fuego lento la colofonia, la resina elemí y la cera amarilla, y se añade con precaucion el estoraque y el aceite de nueces; se cuela y se agita hasta que se enfrie el unguiento.

I. Este unguiento se usá comunmente como secante; se le asocia frecuentemente alcerato de Galeno y al láudano.

El unguiento de estoraque de los hospitales de Madrid se prepara con *dos libras* de aceite comun, *veinte onzas* de pez griega, *quince onzas* de resina limon y *otras quince* de cera amarilla. Se licúa todo á fuego lento, y estando casi frio se mezclan poco á poco *veinte onzas* de estoraque líquido.

UNGUENTO DE FALCK.

Limaduras de estaño fino. }
 Mercurio vivo. } *a. dos dracmas.*

Se hace una amalgama y se le añade:

Ungüento rosado, *una onza.*

Mercurio precipitado rojo, *dos dracmas.*

Aceite destilado de yerbabuena de sabor de pimienta, *veinte gotas.*

II. S. A. I. Tumores hemorroidales. *D. C. s.* para untar ligeramente, tres ó cuatro veces al dia, las partes enfermas.

UNGUENTO FUNDENTE OPIADO.

Aceite de lino , *treinta y dos onzas.*

Minio. }
 Albayalde. } *a. ocho onzas.*
 Cera amarilla. }

Trementina , *tres onzas.*

Opio en polvo , *una onza.*

II. unguento S. A. I. Tumores escirrosos cuando están en su principio y aun sensibles. *D.* Se extiende este unguento sobre una piel bastante ancha para cubrir todo el tumor. Se re-nueva cada ocho dias.

UNGUENTO HEMORROIDAL.

Azafran en polvo , *un escrúpulo.*

Alcanfor , *dos escrúpulos.*

Aceite de beleño , *dos dracmas.*

Cerato de Goulard , *seis dracmas.*

M. I. y D. Se usa en unturas sobre los tumores hemorroidales dolorosos.

OTRO (F. M.).

Ungüento populeon. }
 — de litargirio nutrido. } *a. tres onz.*

Yemas de huevo , *núm. tres.*

Azafran en polvo , *dracma y media.*

Opio , *media dracma.*

Se mezclan y se agitan en un mortero de pie-

dra y se hace unguento *S. A. I.* Almorranas dolorosas é inflamadas.

UNGUENTO DE LÚPULO (*Svediaur*).

Lúpulo seco y en polvo, *una onza.*

Manteca, *cinco onzas.*

Se digiere á fuego lento y se cuele con expresion. *I.* Calma los dolores de las afecciones carcinomatosas.

UNGUENTO MADURATIVO (*Canquoïn*).

Infusion acética de torbisco.)

Melote. } *a. doce dracm.*

Aceite comun. }

Bilis de buey, *dos dracmas.*

Se mezclan, se evapora hasta la consistencia de miel espesa y se añade :

Ungüento basilicon. } *a. doce dracmas.*
 — de la mère. }

Sub-nitrato de mercurio porfirizado, *una dracma.*

Se aplica este unguento sobre los tumores escirrosos indolentes de un color rojo violado.

UNGUENTO MAGISTRAL ó *de óxido de plomo rojo*
 (F. E.).

Aceite rosado, *libra y media.*

Cera blanca, *cuatro onzas y media.*

Minio, *cinco onzas.*

Albayalde. . . . } *a. onza y media.*
 Litargirio. . . . }

H. S. A. I. Es demulcente, secante y refrigerante.

El *ungüento de minia* de los hospitales militares se diferencia del anterior en que solo contiene cuatro onzas de cera en lugar de cuatro y media.

UNGUENTO MARCIATON (F. E.).

Aceite de énula campana compuesto, *cuatro libras.*

Cera amarilla, *una libra.*

Manteca de puerco, *cuatro onzas.*

Se licúan y cuando están á medio enfriar se añade:

Estoraque líquido, *once dracmas.*

Almáciga en polvo, *seis dracmas.*

Se agita hasta que se enfríe, y se guarda para usarle.

UNGUENTO MERCURIAL BLANCO.

Cerato ó pomada blanca, *una onza.*

Proto-cloruro de mercurio, *una dracma.*

H. S. A. I. Se usa como cosmético y en las enfermedades cutáneas, epsóricas, herpéticas y sifilíticas. *D.* De media á una dracma en fricciones.

UNGUENTO DE MERCURIO (F. E.).

Manteca de cerdo, *dos libras.*

Mercurio, *una libra.*

H. S. A. Se tritura el mercurio en un mortero de hierro ó de mármol con el tercio de su peso de grasa. Cuando no se percibe con el anteojo ningun glóbulo de mercurio, despues de haber frotado un poco de pomada entre dos pedazos de papel de estraza, se añade el resto de la grasa. *Nota.* Cada dracma contiene un escrúpulo de mercurio.

El *ungüento de mercurio duplicado* contiene partes iguales de mercurio y manteca.

I. Enfermedades venéreas, sarna, peritonitis puerperal; mata los piojos, chinches, ladillas, &c. *D.* De un escrúpulo á una dracma en fricciones en las enfermedades venéreas. De una á cuatro onzas en el vientre, en los casos de peritonitis puerperal.

La misma composicion tiene el *ungüento de mercurio terciado* de los *II. M.*

UNGUENTO DE LA MERE ó *ungüento negruzco de óxido de plomo* (F. E.).

Manteca de puerco fresca.)

— de vacas.)

Cera amarilla.) *a. media libra.*

Sebo.)

Litargirio.)

Aceite comun, *una libra.*

Se cuece no dejando de menear hasta que se ponga casi negro.

Este es el proceder que aconseja la F. E., pero debe seguirse el siguiente: se calientan en un perol de cobre el aceite y las grasas; cuando estos cuerpos grasos empiezan á humear, se echa el litargirio por medio de un tamiz; inmediatamente se verifica una hinchazon y una efervescencia debida á un desprendimiento de ácido carbónico. Se continúa calentando y agitando siempre la mezcla hasta que adquiera un color pardo oscuro, y entonces se añaden la cera y dos onzas y media de pez negra, sustancia que no entra en la fórmula de la F. E.; inmediatamente que se han fundido, se cuele el emplasto, se le deja enfriar en parte y se echa en moldes. Es necesario hacer de día esta operacion; porque si se aproximase un cuerpo inflamado al perol, podrian inflamarse los gases y vapores inflamables.

I. Se emplea para acelerar la supuracion de los bubones, de los abscesos y de las úlceras.

D. Se usa del mismo modo que los anteriores.

UNGUENTO DE MONTPELLIER.

Ungüento de altea.	} <i>a. dos onzas.</i>
— rosado.	
— populeon.	
Miel.	

II. S. A. I. Hemorroides. *D. C. s.* para ungué

tar ligeramente, tres ó cuatro veces al dia, las partes enfermas.

UNGUENTO NERVINO.

Sumidades floridas de salvia. . .	}	<i>a. dos onzas.</i>
— de mejorana. . .		
— de romero. . .		
— de yerbabuena. . .		
— de camepiteos. . .		
— de gordolobo. . .		
— de espliego. . .		
— de hipericon. . .	}	<i>a. una onza.</i>
— de manzanilla. . .		
— de meliloto. . .		
Bayas de laurel.	}	<i>a. una onza.</i>
— de enebro.		

Se dividen convenientemente todas las sustancias y se ponen á macerar por dos dias en treinta y seis onzas de aceite de lombrices (1); despues se cuecen hasta consumir toda la humedad, se cuele el aceite, se deja aposar, se decanta y se le mezcla á fuego lento con:

Cera amarilla, *nueve onzas.*

Despues que esté medio frio, se añade:

(1) Se prepara el *aceite de lombrices*, segun la Farmacopea Española, poniendo en una vasija apropiada *dos libras* de lombrices, *seis onzas* de vino y *tres libras* de aceite; se cuece hasta que se consuma la humedad y se cuele.

Aceite destilado de cera. }
 — — de tre- } *a. dos onzas.*
 mentina. }

Ungüento de altea, *cuatro onzas.*

Se mezcla exactamente y se guarda.

UNGUENTO NUTRIDO ó *de acetato de plomo*

(F. E.).

Litargirio porfirizado, *una libra.*

Aceite comun, *tres libras.*

Vinagre muy fuerte, *diez y seis onzas.*

Se mezclan todas estas materias á fuego lento en un barreño barnizado, y se agita hasta que tenga la consistencia de un ungüento blando.

Se usa como cicatrizante.

UNGUENTO OFTÁLMICO (*Smellome*).

Alcanfor dividido por el alcohol. } *a. seis*

Oxido blanco de zinc. } *dracm.*

Oxido verde de cobre, *dos dracmas.*

Despues de haberlos triturado bien, se añade en un mortero caliente y se agita:

Manteca de puerco. } *a. dos onzas.* ♦
 Clara de huevo. . . }

I. Oftalmia crónica. D. C. s. para cubrir ligeramente, mañana y tarde, el borde libre de los párpados.

UNGUENTO OXIGENADO.

Hidrocloro medicinal, *una dracma.*

Manteca, *una onza.*

Se mezclan por trituracion.

I. Sarna. D. Dos dracmas en fricciones, cada tarde, sobre las partes en que se presentan los granos.

UNGUENTO OXIGENADO MERCURIAL ó *bálsamo oxigenado mercurial (Dr. Bañares).*

Mercurio puro, *una onza.*

Acido nítrico puro, *dos onzas.*

Se disuelve el mercurio en el ácido y luego se echa en un puchero con:

Accite comun, *diez y seis onzas.*

Se pone á un fuego lento y se menea continuamente para oxigenar el aceite, siguiendo de este modo hasta que adquiriera un color amarillo oscuro; entonces se aparta del fuego y se menea hasta que tome la consistencia de manteca.

I. Afecciones cutáneas y principalmente en los herpes.

Si se mezcla este bálsamo con alcohol de mostaza y cantáridas, es mucho mas eficaz y puede usarse en la tiña.

UNGUENTO PARA LAS QUEMADURAS (H. M.).

Cera blanca, *dos onzas.*

Aceite comun, *dos libras.*

Se derrite á fuego lento y se añade:

Piedra calaminar porfirizada, *dos onzas.*

Se agita la mezcla hasta que esté fria.

UNGUENTO PARA LA SARNA (H. M.).

Aceite comun. } *a. cuatro libras.*

Sebo. }

Azufre en polvo, *dos libras.*

Sal comun decrepitada, *una libra.*

H. S. A.

UNGUENTO DE PIDERIT.

Miel amarilla y granosa. . . } *a. siete onzas.*

Pulpa de cebollas cocidas. . . }

Cera amarilla. }

Resina ordinaria. }

Jabon negro. }

a. once dracmas.

Se cuecen las cebollas debajo de la ceniza y se las reduce á pulpa; se funden la cera y la resina; se añaden la miel, las cebollas y el jabon; se mantienen al fuego hasta que se haya evaporado toda la humedad y se menea hasta que se enfríe.

I. Reumatismos. *D. C. s.* para dar fricciones, mañana y tarde, en los puntos doloridos.

UNGUENTO DE PLENCK *contra los sabañones.*

Manteca.	} <i>a. dos onzas.</i>
Grasa de buey.	
Aceite de laurel.	
Cera.	

Se disuelven á fuego lento y se añade después del enfriamiento:

Alcanfor, *media onza*,
disuelto en:

Alcohol rectificado, *una onza.*

D. La misma que el anterior.

UNGUENTO DE PLOMO (F. E.).

Sulfuro de plomo.	} <i>a. dos onzas.</i>
Litargirio.	
Albayalde.	} <i>a. una onza.</i>
Sulfuro de antimonio.	
Aceite rosado, <i>tres libras.</i>	
Cera, <i>nueve onzas.</i>	

H. unguento *S. A.* Es demulcente y sedante.

UNGUENTO POPULEON (F. E.).

Yemas frescas y machacadas de chopo, *tres libras.*

Manteca fresca, *ocho libras.*

Se mezclan y se ponen á macerar en una vasija de barro vidriada hasta que se puedan reunir recientes las yerbas siguientes:

Hojas de beleño, *libra y media.*

Hojas de siempreviva mayor. }
 — de violetas, . . . } *a. una libra.*
 — de ombligo de Venus. }
 — de yerba mora, *dos libras.*

Machacadas estas sustancias, se mezclan y se cuece á fuego lento, agitando continuamente hasta que se consuma la humedad; se cuele y se exprime.

Segun Dumenil se prepara del modo siguiente. Se calientan en cuatro libras de manteca fundida *ocho onzas* de cada una de las sustancias siguientes: hojas recientes y machacadas de adormideras, belladona, beleño y yerba mora hasta que se haya evaporado la humedad; entonces se añaden *doce onzas* de yemas de chopo secas y machacadas, se las deja digerir durante veinte y cuatro horas, se cuele con expresion, se deja enfriar, se separa el depósito y se funde de nuevo la pomada para echarla en un tarro. Este proceder es preferible al anterior. Este unguento es calmante y se le mezcla comunmente á las cataplasmas madurativas para calmar los dolores.

UNGUENTO DE PROPOLEOS (*Cadet*).

Aceite comun, *dos libras.*

Propoleos purificados en agua hirviendo, *cuatro onzas.*

Se disuelven los propoleos en el aceite á

fuego lento y se cuele el unguento en caliente.

I. Ulceras antiguas y hemorroides. *D. C. s.*
para cubrir ligeramente las partes enfermas.

UNGUENTO DE RICOUR.

Aceite rosado, *doce onzas.*

Cera blanca, *ocho onzas.*

Albayalde, *cuatro onzas.*

Litargirio, *dos onzas.*

Se añade al fin de la decoccion :

Bálsamo del Perú líquido, *media onza.*

I. Ulceras indolentes. *D.* La misma que el anterior.

UNGUENTO ROSADO (F. E.).

Manteca recién preparada, *doce libras:*

Pétalos de rosas amarillas recientes, *seis libras.*

Se macera por espacio de tres dias, se cuece despues hasta que se exhale la humedad y se cuele con expresion.

Soubeiran adopta la fórmula y proceder siguientes: se lava muchas veces la manteca con agua de rosas para cargarla del olor de las rosas; se machacan las flores y se las amasa con el cuerpo graso; al cabo de dos dias se liquida la grasa á fuego lento y se cuele con expresion; se añade una cantidad de rosas igual á la primera y se recurre á la misma manipulacion. Se funde

la pomada con un poco de raíz de ancusa, y cuando ha tomado suficiente color se la cuela de nuevo con expresión; se la deja enfriar lentamente para permitir que se aposen el resto de la humedad y las heces; se separa la pomada, se la funde de nuevo y se la echa en un tarro. En este proceder se usan partes iguales de manteca y rosas.

I. Es refrigerante y se usa en las inflamaciones, escoriaciones &c.

UNGUENTO DE RUDA.

Hojas frescas de ruda.	. . .	} a. una parte.
— — de ajénjos.	. . .	
— — de yerbabuena.	. . .	

Manteca, ocho partes.

Se cuece hasta que se consuma la humedad, se cuela con expresión, se deja enfriar y se separan las heces.

UNGUENTO DE SÁÚCO (r. E.).

Corteza interior y reciente de la medula de saúco, dos libras y media.

Hojas del mismo, media libra.

Se machacan y se maceran por espacio de ocho días con nueve libras de manteca de cerdo en una vasija de barro vidriada; se cuece hasta que se consuma casi toda la humedad; entonces

se cuele con fuerte expresion , se quitan las be-
ces y se conserva.

UNGUENTO DE SWEDIAUR *contra los sabañones.*

Almendras amargas mondadas, *ocho onzas.*
Miel, *seis onzas.*
Alumbre calcinado. } *a. dos onzas.*
Incienso en polvo. . }
Harina de mostaza. } *a. media onza.*
Alcanfor. }
Yemas de huevo, *núm. tres.*

Se mezclan y se forma una pasta. *D.* Ligeras fricciones sobre los sabañones, y algunos instantes despues se los lava con agua tibia ó mejor aun se ponen encima guantes ó escarpines.

UNGUENTO DE TOMATE.

Tomates machacados. } *a. partes iguales.*
Manteca fresca. . . }

Se ponen á hervir al fuego hasta que se consuma la humedad , se cuele con expresion y se añade al producto colado igual cantidad de tomates que la primera vez, se vuelve á cocer, se cuele y se guarda despues de frio.

I. Se usa como calmante en las almorranas.

UNGUENTO DE TUCIA.

Oxido de zinc impuro, sublimado y porfirizado, *una parte.*

Manteca lavada en agua de rosas. } *a. dos*
 Ungüento rosado. } *part.*

I. Oftalmías crónicas. *D.* El grueso de una cabeza de alfiler en fricciones en el borde libre de los párpados.

UNGUENTO DE TUÉTANO DE VACA (F. E.).

Manteca de vacas fresca, *una libra.*

Tuétano de vaca, *media libra.*

Se mezclan en un mortero de piedra, se lava muchas veces con agua y se guarda el unguento cubierto de agua de rosas.

I. Se usa como emoliente.

UNGUENTO VERMÍFUGO.

Acibar hepático en polvo, *una onza.*

Hiel de buey espesada, *dos dracmas.*

Ungüento de altea, *una onza.*

M. Se usa en fricciones al rededor del ombligo en los casos de cólico verminoso.

VEJIGATORIOS.

VEJIGATORIO AMONIACAL.

Se prepara con agua de cal y aceite un jabon calcáreo, que tenga la consistencia de la crema. Se le añade un exceso de amoniaco líquido.

D. Se empapa un lienzo en esta mezcla y se le aplica sobre la piel en el sitio en que se quiere hacer levantar una vejiga. Es bueno irritar antes la piel, frotándola con un pedazo de franela. Conviene cortar en redondo el lienzo que debe empaparse en la mezcla (1).

VEJIGATORIO DE BOUVOISIN.

Se toma un pedazo de tafetan de Inglaterra del grandor que se quiera dar al vejigatorio, se le moja por el lado que está engomado con ácido acético muy concentrado (*vinaigre radical*) y se le aplica sobre la piel.

(1) Cuando este vejigatorio solo contiene el álcali necesario para hacerle rubefaciente, los ingleses le aplican antes del paroxismo en los sujetos que padecen fiebres intermitentes.

VEJIGATORIO DE BRETONNEAU.

Polvo de cantáridas, *cuatro onzas.*

Aceite comun, *c. s.*

para obtener una pasta blanda que se conserva en una vasija y se aplica sobre esparadrapo con una espátula, por medio de una hoja de papel, en que se hace una abertura del grandor y forma que se quiere dar al vejigatorio. Se quita la hoja de papel y se vuelve á cubrir la mezcla de cantáridas con una hoja de papel de estraza que la sobrepase un poco. Se aplica inmediatamente el vejigatorio haciendo adherir los bordes libres por medio de diaquilon.

Esta preparacion es muy sencilla y produce buenos efectos.

VEJIGATORIO ECONÓMICO.

Se espolvorea con cantáridas una masa de levadura humedecida con vinagre.

VEJIGATORIO DE GONDRET.

Amoniaco líquido. . . . } *a. partes iguales.*
Manteca. }

M. S. A. D. Se extiende sobre un lienzo y se le aplica sobre la piel; este vejigatorio obra con gran prontitud, produce la rubefaccion en pocos minutos, y corroe la piel cuando se le deja aplicado aunque no sea mas que una hora.

VEJIGATORIO DE LECOMTE.

Cera amarilla , *diez onzas.*

Se funde y se añade:

Trementina.	} <i>a. seis onzas.</i>
Cantáridas pasadas por un tamiz muy fino.	
Euforbio en polvo fino ,	<i>seis dracmas.</i>

Se mezcla y se aromatiza despues con una mezcla de aceite volátil de espliego y de bergamota.

VEJIGATORIO DE LOUYER-VILLERMAY.

Ungüento basilicon.	} <i>a. dos onz.</i>
Cantáridas en polvo impalpable.	
Cera amarilla ,	<i>onza y media.</i>
Pez de Borgoña ,	<i>una onza.</i>
Trementina ,	<i>media onza.</i>
Resina ,	<i>tres dracmas.</i>

Se mezclan *S. A.* y se aromatiza despues con suficiente cantidad de agua de espliego.

VEJIGATORIO MAGISTRAL.

Polvo de cantáridas , *media onza.*
Harina de trigo , *media onza.*
Vinagre , *c. s.*

M. Se hace una masa blanda que se aplica sobre la piel y obra con prontitud.

VEJIGATORIO ó *papel vejigatorio (Trousseau).*

Se empapa un papel de filtro del grandor y de la forma del vejigatorio que se quiere establecer con extracto etéreo de cantáridas, y se evapora hasta la consistencia de jarabe. Se aplica sobre un pedazo de esparadrapo cuyos bordes sobresalgan un poco de la circunferencia del papel de filtro. A las siete ó diez horas de la aplicacion se levanta el epidermis. Esta clase de vejigatorio produce buenos efectos.

VEJIGATORIO DE WAUTERS.

Jabon blanco raspado, *seis onzas y dos dr.*
 Incienso pulverizado, *cinco dracmas.*

Semillas de pimienta negra. }
 Hidroclorato de sosa en polvo. } *a. tres drac.*

Se hace digerir esta mezcla en siete onzas de alcohol, hasta que se haya fundido el jabon. Se cuece durante algunos minutos y se menea con una espátula. *I. y D.* Se extiende este unguento sobre un lienzo y se renueva la cura todos los dias. Este remedio es un rubefaciente que obra en dos ó tres dias. Es útil en los reumatismos. Hay personas en que obra con mucha energía, y otras en que sus efectos son mas lentos.

VINAGRES.

VINAGRE ALCANFORADO (*Spielmann*).

Alcanfor, *una dracma*.

Se le pulveriza en un mortero, añadiéndole:
Alcohol, *veinte gotas*.

Se trituran con el alcanfor dos onzas de azúcar, se vierten encima diez onzas de vinagre bueno, se agita hasta que el líquido esté todo lo saturado que sea posible, se filtra y se conserva en un frasco tapado al esmeril.

I. Fiebres atáxicas y adinámicas, y exantemas. *D.* De dos á cuatro dracmas en un vehículo apropiado. *Nota.* Se aplica tambien sobre las partes gangrenadas.

VINAGRE AROMÁTICO INGLÉS.

Alcanfor, *dos onzas*.

Se le pulveriza en un mortero de vidrio por medio de un poco de ácido acético, se le introduce en un frasco esmerilado y se añaden:

Acido acético muy concentrado, *veinte onzas*.

Aceite volátil de espliego, *nueve granos*.

— — de clavo, *media dracma*.

— — de canela, *veinte granos*.

Despues de quince dias se decanta y está en disposicion de usarse.

VINAGRE BEZOARDICO (*Berlin*).

Se compone de vinagre blanco, *ocho libras*; raíces de angélica, valeriana y yerbabuena, flores de manzanilla y bayas de enebro y laurel, *a. media onza*; azafran oriental y alcanfor, *a. una dracma*.

Se dejan en digestion y despues se cuele el licor.

I. Escorbuto, fiebres malignas y nerviosas, peste, fiebre amarilla y otras enfermedades llamadas contagiosas. *D.* Una dracma muchas veces al dia en un vehículo apropiado.

Nota. Se puede aumentar gradualmente esta dosis segun se presente la indicacion.

VINAGRE DE CAFÉ (*Swediamur*).

Café tostado, *tres onzas*.

Vinagre, *doce onzas*.

Se hierva y se reduce á la mitad, se cuele y se añade:

Azúcar blanca, *onza y media*.

I. Envenenamientos por el opio. *D.* Dos cucharadas calientes cada cuarto de hora.

VINAGRE CÓLCHICO (*Reuss*).

Vinagre de buena calidad, *doce onzas*.

Raiz de cólchico fresca y recogida en otoño, *una onza*.

Se maceran durante cuatro días, se exprime ligeramente la raíz y se añade al líquido:

Alcohol, *seis dracmas*.

Se filtra y se guarda este vinagre en un frasco.

I. Ascitis. D. De una dracma á una onza.

Nota. Se mezcla algunas veces con láudano y se endulza con un jarabe,

VINAGRE DE LOS CUATRO LADRONES ó *vinagre antiséptico alcanforado* (F. E.).

Sumidades floridas y fres-	}	<i>a. onza y media.</i>
cas de ajenjos.		
— de romero.		
— de salvia.		
— de yerbabuena.		
— de ruda.		

Flores secas de espliego, *dos onzas*:

Ajos, *dos dracmas*.

Pimienta de Tabasco, *una onza*.

Se machacan todos estos simples y se ponen á digerir al calor del sol ó en un baño de arena en un matraz cerrado por espacio de doce días en *ocho libras* de vinagre bueno. Se cuele, se exprime fuertemente y se filtra; despues se añade:

Alcanfor dilatado en espíritu de vino, *media onza*.

La F. F. adopta la fórmula siguiente :

Sumidades secas de ajenjo.	}	<i>a. dos onzas.</i>		
— — de ajenjo pónico.				
Romero.				
Salvia.				
Yerbabuena de sabor de pimentia.				
Ruda.				
Flores de esplicgo.				
Ajo.			}	<i>a. dos dracmas.</i>
Raiz de cálamo aromático.				
Canela.				
Clavo.				
Pimienta.	}			
Nuez moscada.				
Vinagre fuerte, <i>ocho cuartillos.</i>				
Aleanfor disuelto en alcohol, <i>media onza.</i>				
Acido acético, <i>dos onzas.</i>				

Se usa para perfumar las habitaciones ; se frota las manos con él como antiséptico. Se le hace respirar en el síncope.

VINAGRE ESCILÍTICO.

Escamas secas de cebolla albarrana, *una lib.*

Vinagre fuerte, *seis libras.*

Se digieren en una redoma de vidrio apropiada, bien tapada y á un fuego suave por espacio de cuarenta y ocho horas, se exprime el licor, se decantan las heces y se añaden tres onzas de alcohol.

Se usa para hacer el ojiniel y disolver las gomas. *D.* De media á tres onzas.

VINAGRE DE ESPLIEGO.

Vinagre muy fuerte. } *a. veinte y cinco*
 Alcohol de espliego. } *dracmas.*

Mezclense. Se usa una cucharada en un vaso de agua como odontálgico.

VINAGRE DE HIERRO.

Vinagre, *una onza.*

Acetato de hierro seco, *dos granos*, ó acetato de hierro líquido, *dos granos y dos tercios.*

D. S. A.

VINAGRE DE OPIO.

Opio en bruto, *una parte.*

Vinagre blanco muy fuerte, *ocho partes.*

Se corta el opio en rebanadas, se le hace macerar en vinagre durante veinte y cuatro horas; al cabo de algun tiempo se le malaxa para dividirle bien, se continúa la maceracion durante cinco ó seis dias, se cuela con expresion y se filtra.

Soubciran adopta esta fórmula que da á esta preparacion un grado de concentracion igual al del láudano de Sydenham. Pero sin embargo el vinagre debe modificar la accion del opio de un modo diferente que el vino.

I Se usa en lugar del láudano de Sydenham. *D.* De doce gotas á un escrúpulo en una pocion.

VINAGRE DE PIMIENTA DE INDIAS (*Swediana*).

Pimienta de Indias fresca, *dos onzas.*

Vinagre blanco. }
Aguardiente. . } *a. doce onzas.*

Se infunde y se filtra.

I. Hidropesías pasivas. *D.* De media á una dracma, muchas veces al dia, en un cocimiento de quina.

VINAGRE ROSADO (F. E.).

Pétalos de rosas rojas secas y sin uñas, *una libra.*

Vinagre de vino bueno, *ocho libras.*

Se ponen á la accion del sol por espacio de algunos dias en una redoma de vidrio tapada, despues se cuele sin expresion y se añaden dos onzas de alcohol.

Este medicamento es incindente, atemperante y antihelmíntico; detiene los vómitos; se mezcla con los alimentos y medicamentos; detiene la putrefaccion; aplicado exteriormente en la frente, causa sueño.

VINOS.

VINO DE AJENJOS.

Hojas secas de ajenjos, *una onza.*

Vino blanco generoso, *dos cuartillos.*

Alcohol, *una onza.*

H. S. A. I. Promueve la menstruacion, escita el apetito y corrobora el estómago. *D.* De una á cuatro onzas.

VINO DE ACETATO DE HIERRO LÍQUIDO ú *oenolado*
de acetato de hierro líquido.

Vino de Chablis privado de su principio astringente, *diez y siete onzas.*

Acetato de peróxido de hierro líquido, *ocho escrúpulos y once granos.*

Mezclese. *Nota.* Cuando se usa vino blanco para preparar este vino calibcado, la materia astringente que contiene obra sobre el acetato de hierro, le descompone y da un medicamento de un color negruzco. Para quitarle esta materia se diluyen una ó dos dracmas de peróxido de hierro recién precipitado y bien lavado, se dejan en contacto durante dos ó tres dias, teniendo cuidado de mencar la mezcla, y se filtra.

D. Una cucharada, mañana y tarde.

VINO AMARGO (*Dubois*).

Vino de Madera, diez y ocho cuartillos.

Quina gris. } a. cuatro onzas y
 — amarilla. } media.

Canela, diez dracmas.

Bayas de enebro. } a. nueve dracmas
 Corteza de limon. } y media.
 — de Winter. }

Carbonato de sosa, cuatro dracmas y media.

II. S. A. I. Debilidad de los órganos digestivos. *D.* De dos dracmas á una onza y mas, ya puro, ya en un vehículo apropiado.

VINO AMARGO AROMÁTICO (*Lazermé*).

Sumidades de ajenjos, un puñado.

Canela. }
 Nuez moscada. } a. un escrúpulo.
 Gengibre. }

Vino tinto, dos libras.

Se reducen á pequeños pedazos, se infunde todo durante veinte y cuatro horas, se filtra y se añade:

Lilium de Paracelso, media onza.

I. Este vino es cordial y estomacal, y conviene para restablecer las digestiones y fortificar el estómago. *D.* Tres cucharadas al día, inmediatamente despues de las comidas.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO (*Corvisart*).

Se compone de vino blanco, *cuatro cuartillos*; alcohol á 34° , corteza de limon y corteza de Winter, *a. dos onzas*; quina en polvo, raiz de asclepias, angélica y cebolla albarrana seca, *a. una onza*; bayas de enebro y macis, *a. dos dracmas*; hojas secas de ajerjos y toronjil, *a. media onza*.

Se machacan las sustancias y se las hace digerir en el baño de arena durante veinte y cuatro horas, meneando de cuando en cuando. Se cuele, se exprime y se filtra por un papel de estraza. Se divide el licor en cuatro vasijas de á cuartillo bien tapadas.

I. Debilidad de los órganos digestivos. *D.* Cuatro cucharadas al dia.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO DE LA CARIDAD.

Se compone de vino blanco, *cuatro libras*; lirio de Florencia, *seis onzas*; raiz de émula campana, cebolla albarrana y marrubio, *a. tres onzas*; sen mondado, *una onza*; tartrato ácido de potasa y tintura de genciana, *a. tres dracmas*; agárico blanco, *dracma y media*, y gengibre, *dos escrúpulos*.

II. S. A. J. La misma que el anterior. *D.* De una á dos onzas, mañana y tarde.

VINO ANTIPOPLECTICO.

Vino blanco, *dos cuartillos y medio.*

Raiz de rábano silvestre, *onza y media.*

— de jalapa, *media onza.*

Canela. . . } *a. dos dracmas.*

Ruibarbo. . . }

Nitrato de potasa, *media dracma.*

Se digieren en frio durante cuatro dias,
se filtra y se añade:

Espiritu aromático aceitoso de Silvio, *dos dracmas.*

D. De tres á cuatro onzas por la mañana en ayunas.

VINO ANTIESCORBÚTICO.

Raiz de rábano silvestre, *una onza.*

Hojas recientes de coclearia. } *a. med.*

— — de berro. }

— — de trebol fibrino. } *onza.*

Semillas de mostaza machacadas. . . }

Sal amoniaco, *dos dracmas.*

Vino blanco generoso, *dos cuartillos.*

Espiritu de coclearia, *media onza.*

Despues de ocho dias de maceracion se cue-
la y se filtra.

I. Afecciones escrofulosas y escorbúticas.

D. De dos á cuatro onzas.

VINO ANTIHIDRÓPICO (*Fuller*).

Se compone de vino blanco, *cuatro cuartillos*; corteza de Winter, *dos onzas*; énula campana y cebolla albarrana, *a. onza y media*; cortezas de saúco y yezgo, *a. una onza*; lirio de Florencia, sen, eléboro negro, jalapa y agárico, *a. dos dracmas*. Se hace infundir en frió.

D. Cuatro onzas por la mañana en ayunas.

VINO ANTHICTÉRICO.

Vino blanco generoso, *dos cuartillos*.

Azafran, *una dracma*.

Naranjas agrias, *núm. dos*.

Se vacían las naranjas y se introduce en ellas el azafran; se las envuelve en un papel y se las cuece entre ceniza. Se las corta después á rebanadas y se las infunde durante doce horas en el vino. Se filtra.

I. y D. Cuatro cucharadas por la mañana é igual cantidad una hora antes de comer, al fin de la ictericia.

VINO ANTILEUCORREICO.

Se compone de agua pura, *veinte y cuatro libras*; alcohol, *cuatro libras*; agua de flores de naranjo, *dos libras*; tintura de marte, *una*

libra; jarabe simple y quina gris, *a. media libra*; azafrán, *tres onzas y un escrúpulo*; quasia amarga y cálamo aromático, *a. onza y media*, y canela y flores de saúco, *a. seis dracmas*.

H. S. A. I. Leucorrea y blenorragia. *D.* Dos onzas, mañana y tarde.

VINO ANTIMONIADO ó *vino emético* (F. E.).

Vino blanco bueno, *una libra*.

Tartrato de potasa antimoniado, *un escrúp.*

Disuélvase. Cada onza contiene dos granos de tártaro emético.

I. Comunmente se usa como diaforético.

D. De una á cuatro dracmas y aun hasta una onza.

La misma composicion tiene el *vino emético claro* de los hospitales de Madrid.

VINO AROMÁTICO.

Especies aromáticas, *cuatro onzas*.

Vino tinto, *dos cuartillos*.

Se macera, se cucla con expresion y se filtra. Henry y Guibourt añaden una onza de agua vulneraria espirituosa.

I. Ulceras atónicas.

VINO AROMÁTICO CON TANINO.

Vino aromático, *treinta y dos onzas.*

Tanino, *de dos á tres dracmas.*

M. Sirve para curar las úlceras venéreas ó las úlceras cutáneas que han llegado á su declinacion.

VINO AROMÁTICO OPIADO.

Vino aromático, *treinta y dos onzas.*

Opio en bruto, *una onza.*

Se disuelve el opio en el vino y se cuela.

I. Úlceras, úlceras venéreas, &c. de mal aspecto y dolorosas.

VINO DE BALARDINI.

Centeno cornezuelo en polvo, *treinta gran.*

Vino blanco, *dos onzas.*

Mezclese y agítese al tiempo de usarle. *I.* Partos laboriosos por inercia de la matriz. Se da una cucharada cada dos minutos.

VINO DE CAINCA ó tintura oenólica de cainca.

Vino de Málaga, *un cuartillo.*

Raiz de cainca en polvo, *una onza.*

Se macera *S. A.* durante seis dias y se filtra.

I. Hidropesías. *D.* Cuatro cucharadas al dia, que se toman en una ó muchas veces.

VINO DE CANTÁRIDAS.

Cantáridas, *diez y seis graños.*

Vino blanco generoso, *un cuartillo.*

H. S. A. Se da de media á una onza en un vaso de agua azucarada.

VINO CALIBEADO.

Limaduras de hierro puras, *una onza.*

Vino blanco generoso, *dos cuartillos.*

I. La misma que el anterior. *D.* De una á cuatro dracmas.

OTRO (*Parmentier*).

Tintura de marte tartarizada, *una onza.*

Vino blanco, *un cuartillo.*

M. I. Amenorrea, leucorrea, clorosis, escrófulas, &c. *D.* De una á cuatro onzas al dia.

El *vino marcial* de los hospitales de Madrid contiene *una onza* de tintura de hierro tartarizada y *dos libras* de vino blanco bueno.

VINO DE CINCONINA (*Magendie*).

Sulfato de cinconina, *un escrúpulo.*

Vino de Madera, *dos cuartillos.*

H. S. A. Nota. Este vino puede prepararse igualmente añadiendo dos onzas de alcohol

de cinchonina á la cantidad indicada de vino de Madera.

I. Atonía de los órganos digestivos y escrófulas. *D.* De una á cuatro onzas y más en diferentes veces en el espacio de un día.

VINO DE CITRATO DE HIERRO ú *oenolado de citrato de hierro (Beral).*

Vino de hablis privado de su principio astringente, *diez y siete onzas.*

Citrato de peróxido de hierro líquido, *ocho escrúpulos y once granos.*

M. I. Amenorrea, clorosis, escrófulas &c.

D. Una cucharada mañana y tarde.

VINO DE CÓLCHICO (*Locher Balber*).

Bulbo de cólchico fresco, *tres onzas.*

Vino de Málaga, *doce dracmas.*

Alcohol á 22°, *dos dracmas.*

Se macera durante ocho días. *I.* Hidropesías y reumatismos crónicos. *D.* Se dan de veinte á cuarenta gotas en una pocion y se aumenta sucesivamente la dosis.

VINO CON MIEL.

Miel, *una onza.*

Vino, *ocho onzas.*

Disuélvase. *I.* Se usa en el tratamiento de las úlceras y heridas de mal carácter.

VINO DE SEMILLAS DE CÓLCHICO.

Semillas de cólchico, *dos onzas.*

Vino de Málaga, *dos cuartillos.*

H. S. A. Nota. Los efectos del vino de semillas de cólchico son mas suaves y mas seguros que los del vino de los bulbos.

I. Hidropesías y reumatismos crónicos. *D.* De ocho á diez gotas en una taza de té, mañana y tarde; se aumenta sucesivamente la dosis.

VINO DIURÉTICO AMARGO DE LA CARIDAD.

Se compone de quina, corteza de Winter, cortezas de limones, raíz de venetósigo, escamas de cebolla albarrana, tallos de angélica, bayas de enebro y macis, *a. dos onzas*; hojas de ajenjos y toronjil, *a. una onza*; y vino blanco, *ocho cuartillos.*

H. S. A. I. Ascitis. *D.* De una á cuatro onzas al dia.

VINO DIURÉTICO INGLÉS.

Canela en polvo, *tres dracmas.*

Raíz de zedoaria, *dos dracmas.*

Carbonato de potasa, *dracma y media.*

Escamas secas de cebolla albarrana.

Ruibarbo en polvo.

Bayas de enebro molidas.

} *a. una*
} *drac.*

Se maceran en media azumbre de vino blanco añejo y se filtra.

I. Hidropesías. *D.* De tres á cuatro vasos al dia.

VINO EMÉTICO TURBIO ó vino de óxido de antimonio (F. E.).

Oxido de antimonio semivitrificado y levigado, *tres onzas.*

Vino blanco bueno, *dos libras.*

Se digiere en un matraz y se filtra. *I.* Se usa en lavativas en las afecciones comatosas.

VINO ESCILÍTICO.

Escamas secas de cebolla albarrana, *una onza.*

Vino de Málaga, *un cuartillo.*

Se machacan las escamas de la cebolla albarrana, se las macera en vino durante doce dias, se cuele y se filtra.

Se usa como diurético á la dosis de dos dracmas á una onza.

OTRO (*Richard*).

Vino blanco, *dos libras.*

Cebolla albarrana, *una onza.*

Cáscaras de naranja, } *a. dos dracmas.*
Cálamo aromático, . }

Se digieren durante tres dias y se añade:

Ojimiél escilítico, *dos onzas.*

I. Hidropesías. *D.* De tres á cuatro cucharadas al día.

El *vino escilítico* de los hospitales de Madrid se compone de *tres dracmas* de cebolla albarrana y *dos libras* de vino blanco. Se infunde durante veinte y cuatro horas. *D.* De media á una onza.

VINO ESTÍPTICO ó *vino del fruto de ciprés compuesto* (F. E.):

Nueces de ciprés verde, *onza y media.*

Hojas de romero . . .

Rosas rojas. . . .

Corteza de granada. . . .

Balaustrias. . . .

Vino tinto bueno, *dos libras.*

a. media onza.

Se machacan todos estos simples, se ponen á digerir por espacio de dos horas á fuego lento y despues se cuela con expresion. Es astringente y corroborante.

VINO ESTOMACAL (*Plenck*).

Vino tinto de buena calidad, *dos cuartillos.*

Raices de genciana secas y cortadas en láminas muy delgadas, *seis onzas.*

Quina escogida quebrantada, *media onza.*

Corteza de naranja, *dos dracmas.*

Se maceran durante tres días, se cuela y se filtra.

I. Fiebres intermitentes, debilidad de es-

tómago y convalecencia de las enfermedades agudas. *D.* De una á dos onzas al dia.

VINO DE ESTRAMONIO.

Semillas de estramonio machacadas, *dos onz.*

Vino de Málaga, *ocho onzas.*

Alcohol, *una onza.*

Se digiere á un calor suave durante algunos dias y se filtra.

Se usa como anodino. Hufeland considera á esta preparacion como superior al opio. *D.* De seis gotas á un escrúpulo en un vaso de agua azucarada.

VINO FEBRÍFUGO.

Vino de España, *dos cuartillos.*

Quina amarilla machacada, *dos onzas.*

Alcohol á 35°, *media onza.*

Palo de Surinam, *una dracma.*

Se maceran durante ocho ó diez dias y se filtra. *D.* De una á dos onzas en ayunas.

VINO FEBRÍFUGO DE QUINA.

Quina calisaya, *cuatro onzas.*

Angustura verdadera, *media onza.*

Se machacan las dos cortezas y se echa encima:

Alcohol á 21°, *ocho onzas.*

Se dejan en contacto durante veinte y cua-

tro horas en una vasija tapada y se añade :

Vino blanco de Borgoña comun, pero ácido, *dos cuartillos.*

Se macera durante un mes, meneando de cuando en cuando, y se aclara.

I. y D. Se usa como febrífugo á la dosis de dos á cuatro onzas, y como tónico de media á dos onzas antes de comer.

VINO FEBRÍFUGO DE S.

Vino de España, *dos cuartillos.*

Alcohol á 20°, *una onza.*

Quina amarilla.

Cáscaras secas de naranjas.

Raíces de genciana.

Flores de manzanilla.

} *a. cinco drac-*
mas y diez y
ocho granos.

II. S. A. I. Fiebres intermitentes. *D.* De una á dos onzas, dos veces al día, entre los accesos.

VINO DE FORDYCE.

Vino generoso, *un cuartillo.*

Quina en polvo, *dos onzas.*

Clavo, *media dracma.*

Se maceran durante dos dias y se decanta. Se vierte sobre el polvo un cuartillo de agua hirviendo, se deja infundir durante doce horas y se filtra. Se mezcla esta infusion con el vino.

I. Blenorragia crónica. *D.* Cuatro cucharadas al dia.

VINO DE GUAYACO CON ELÉBORO (*Lewis*).

Vino blanco, *cuatro cuartillos*.

Palo de guayaco.	} <i>a. dos onzas.</i>
Raiz de eléboro negro.	
Semillas de cardamomo me-	} <i>a. una onza.</i>
nor.	
Cáscaras secas de naranjas.	

Se infunden durante doce horas y se cuela.

I. Hidropesías y reumatismos. *D.* Una cucharada, dos ó tres veces al día.

VINO HIDRAGOGO.

Lirio de Florencia.	} <i>a. una onza.</i>
Corteza interior de saúco.	
Raiz de énula.	} <i>a. onza y media.</i>
Hojas de sen.	
Raiz de jalapa, <i>dos dracmas.</i>	
Vino blanco generoso, <i>dos cuartillos.</i>	

Se maceran durante ocho días y se filtra. *D.*

Un vaso por la mañana en ayunas contra las hidropesías.

VINO DE HIDRIODATO DE HIERRO (*Pierquin*).

Hidriodato de hierro, *cuatro dracmas.*

Vino de Burdeos, *un cuartillo.*

H. S. A. I. Amenorrea, leucorrea, cloro-

sis , escrófulas , &c. *D.* Una cucharada mañana y tarde.

VINO DE HUXHAM.

Vino de Málaga , *una onza.*

Emético , *un grano.*

H. S. A. I. Supresion de la traspiracion.
D. De treinta á cuarenta gotas en un vehículo apropiado.

VINO ROSADO.

Rosas rojas secas , *cuatro onzas.*

Vino tinto generoso , *dos cuartillos.*

H. S. A. I. Se usa exteriormente en inyecciones ó para tópicos. Es un tónico astringente poderoso.

VINO DE RUIBARBO COMPUESTO.

Vino de España , *un cuartillo.*

Ruibarbo en polvo. }
Alcohol. } *a. dos onzas.*

Canela blanca , *una dracma.*

Se maceran durante siete dias y se filtra.

I. Diarrea y debilidad de estómago. *D.* De una á dos onzas.

VINO DE LEGUIN.

Quina amarilla quebrantada. }
 Cáscara seca de naranja id. } *a. diez drac.*
 Raiz de genciana id. . . } *y media.*
 Flor de manzanilla id. . . }
 Vino de España, *cuatro cuartillos.*
 Alcohol á 20º, *dos onzas.*

Se maceran durante diez ó quince dias, se filtra y se guarda.

I. Fiebres intermitentes. *D.* Una ó dos onzas.

VINO SUDORÍFICO ú *oenolado sudorifico*
(Dr. Smith).

Extracto sudorífico del doctor Smith, *diez y siete onzas.*

Vino generoso, *siete cuartillos.*

Aceite volátil de saсаfrás, *sesenta y cuatro gotas.*

Se agita el aceite con el vino, se disuelve el extracto en la mezcla y se filtra despues la disolucion.

Nota. Cada onza de esta preparacion representa una cantidad igual de especies sudoríficas, y contiene una dracma de extracto y media gota de aceite de saсаfrás; cada cucharada representa cuatro dracmas de especies sudoríficas, y contiene media dracma de extracto y una cuarta parte de gota de aceite de saсаfrás.

VINO DE SULFATO DE QUININA (*Magendie*).Sulfato de quinina, *doce granos*.Vino bueno de Madera, *dos cuartillos*.

H. S. A. Nota. Se puede hacer esta preparación con vino de Málaga ó comun. Se la puede hacer poniendo dos onzas de alcohol de quinina por dos cuartillos de vino. *D.* De una á dos onzas á cucharadas cada dos horas.

VINO TÓNICO AMARGO (*Cottureau*).

Tintura alcohólica de quina.	} <i>a. una onza.</i>
— — de genciana.	
— — de lúpulo.	

Vino de Madera, *un cuartillo*.

Se mezcla, se filtra en una vasija tapada y se añade *S. A.* al líquido colado:

Jarabe antiescorbútico.	} <i>a. dos onz.</i>
— de cortezas de naranjas.	

I. Bocio ó disposición á las escrófulas en los niños. *D.* Tres cucharadas al día. *Nota.* Se puede aumentar esta dosis por grados hasta el doble y aun mas.

VINO TRIACAL.

Triaca, *una dracma*.Vino bueno, *ocho onzas*.

Se da en dos tomas en el espacio de una ho-

ra para reanimar las fuerzas de las personas medio heladas ó que han caído en el agua.

VINO DE ZARZAPARRILLA ú *oenolado de extracto de zarzaparrilla.*

Vino de España, *quince onzas.*

Extracto hidro-alcohólico de zarzaparrilla, *una onza.*

Se disuelve el extracto en el vino y se filtra por un papel. *Nota.* Dos onzas de esta preparacion representan una onza de zarzaparrilla.

VOMI-PURGATIVO DE LE ROY.

Vino blanco de buena calidad, *cinco libras y cuatro onzas.*

Sen, *cuatro onzas.*

Se infunde en frio durante tres dias, meneando la mezcla de cuando en cuando, se cuele y se exprime de modo que resulte en cuanto sea posible la cantidad de vino indicada.

Se añade por cada diez y seis onzas de vino preparado de este modo una dracma de tártaro emético. Se cuele.

Este licor puede representarse por

Vino de sen, *treinta y cuatro dracmas.*

Tártaro emético, *cuatro granos y medio.*

D. Una cucharada.

WAKAKA DE LOS INDIOS.

Azúcar, *cuatro onzas.*

Cacao mondado, *onza y media.*

Azúcar de vainilla, *diez dracmas.*

Canela. . . . }
 Achiote seco. . . } *a. una dracma.*

H. S. A. un polvo fino. *I. y D.* Este polvo aromático y fortificante ¡reanima el apetito de los ancianos y de los convalecientes: se echa una cucharada en caldo de arroz, de fideos ó en leche. Los Españoles toman media dracma en una gícara de chocolate.

ZUMOS.

ZUMO DE YERBAS ANTIESCORBÚTICAS.

Zumo de hojas frescas de berro. . . }
 — — — de coclearia. . . } *a. part.*
 — — — de fumaría. . . } *ig.*

D. De tres á cuatro onzas por la mañana en ayunas. Se prolonga su uso durante veinte ó treinta días.

ZUMO DE YERBAS DEPURATIVO.

Hojas de achicoria. . . }
 — de fumaría. . . }
 — de borraja . . . } *a. partes iguales.*
 — de perifollo. . . }

para obtener cuatro onzas de zumo. Se ma-

chacan estas plantas en un mortero de mármol, se exprime el zumo y se filtra por un papel en un sitio fresco. *I.* Enfermedades epsóricas y reumáticas. *D.* De una vez en ayunas.

ZUMO DE YERBAS DIURÉTICO.

Hojas frescas de borraja.	.	.)	} <i>a. partes igual.</i>
— — de parietaria.	.)	
— — de achicoria.	.)	
— — de perifollo.	.)	

H. S. A. cuatro onzas de zumo y añádase:
Acetato de potasa, *una dracma*

ZUMO DE YERBAS FUNDENTE (*Honoré*).

Achicoria.	.	.	} <i>a. partes iguales.</i>
Diente de leon.	.)	
Lechuga.	.)	
Perifollo.	.)	

para obtener cuatro onzas de zumo. *I.* Cólicos hepáticos. *D.* En una toma por la mañana en ayunas. Algunas veces se añade una *dracma* de acetato de potasa.

ZUMO DE YERBAS PURGANTE.

Zumo de borraja y achicoria, *cuatro onzas.*
Sulfato de sosa, *media onza.*

D. En una toma por la mañana en ayunas.

ZUMO DE YERBAS PURGANTE.

Sal de Glaubero, *media onza*.

Zumo de achicorias, *cuatro onzas*.

Disuélvase. *D.* Se toma de una vez por la mañana en ayunas.

PARTE QUINTA.

AGUAS MINERALES MEDICINALES.

Entre los medios mas eficaces con que cuenta la Terapéutica deben incluirse las aguas minerales, ó mas propiamente dicho las *aguas minerales medicinales*; porque no entendiéndose por aguas minerales sino las que contienen en *disolucion la suficiente cantidad de materias estrañas para tener comunmente un sabor particular y ser capaces de producir una accion muy notable sobre la economia animal*, pueden estar mineralizadas por principios nocivos á la salud, que no permitan su uso en el tratamiento de las enfermedades; tales son las aguas cargadas de óxido de cobre ó de sulfato de cal.

Habiéndose llegado á conocer con mas ó menos exactitud por medio del análisis la composicion de muchas de las aguas minerales, se han imitado por el arte con mayor ó menor perfeccion. Así se han obtenido las aguas minerales llamadas *artificiales* (1) para distinguirlas de las que pre-

(1) No habiéndose propuesto aun ninguna fór-

senta la naturaleza. De esta manera en los parajes distantes de aquellos en que las aguas naturales no existen ó á los que no podrian trasladarse los enfermos sin sufrir grandes trastornos, se tiene un medio supletorio de las que salen del seno de la tierra. Sin embargo son mucho menos eficaces; porque prescindiendo de que el arte está aun distante de poder competir con la naturaleza, faltan las mas veces en el uso de las aguas artificiales otros medios auxiliares que influyen poderosamente en los buenos efectos de las naturales.

La temperatura de las aguas minerales varía mucho: en algunas es bastante alta, superior á la de la atmósfera y aun á veces próxima á la del agua hirviendo; en otras es igual á la del aire ó mas baja. Las primeras se han llamado *calientes* ó *termales*; las segundas han recibido el nombre de *frias*.

Esta diversidad de temperatura de las aguas, así como la de los principios que contienen, dependen al parecer de la diferente profundidad y naturaleza de los terrenos de donde vienen ó que atraviesan, donde se cargan de dichas sus-

mula para reemplazar las aguas minerales de España, he llenado este vacío incluyendo en notas la composición de las aguas minerales artificiales francesas.

tancias. Estas mismas materias, segun que sobresalen mas por su cantidad, su energía ó virtudes medicinales, han servido de base de muchas clasificaciones y en particular de la mas generalmente admitida, en la que las aguas se dividen en *sulfurosas*, *acidulas* ó *gaseosas*, *ferruginosas* ó *marciales* y *salinas*, á las que puede agregarse otra clase de aguas poco comunes, que son las llamadas *ioduradas*, las cuales hasta ahora no han sido halladas en nuestro suelo.

Las *aguas sulfurosas*, llamadas *hepáticas* por los antiguos, exhalan un olor á cieno ó á huevos podridos, tienen un gusto desagradable azufroso y nauseabundo, ponen primero amarilla y despues ennegrecen la plata, y por último depositan azufre al contacto del aire atmosférico. Su principio mineralizador es el ácido hidrosulfúrico ó hidrógeno sulfurado, sustancia volátil, que se desprende de las aguas, en las cuales se halla en estado de libertad ó combinado con las bases salificables, formando hidrosulfatos sulfurados de cal y de potasa.

Las *aguas acidulas* ó *gaseosas* tienen un gusto agrio y picante, análogo al de la cerveza, presentan en su superficie ampollitas ó gorgoritas, y enrojecen la tintura azul de girasol y de violetas. Deben estas propiedades al ácido carbónico que, como el ácido hidrosulfúrico, se desprende al contacto del aire.

Las *ferruginosas* ó *marciales* se conocen

por su sabor áspero de hierro ó de tinta mas ó menos marcado, por la telita irrescente ó rojiza que se forma en la superficie, cuando estan por algun tiempo espuestas al aire, por la propiedad de ennegrecer la infusion de agallas y por el ocre que lentamente depositan en los parajes por donde corren. El óxido de hierro, disuelto por el ácido carbónico con exceso ó sin él y rara vez por el ácido sulfúrico, es el mineralizador de estas aguas. El calor y la accion de la atmósfera las descomponen, haciendo desprender el ácido carbónico.

Las *aguas salinas* son aquellas en que predominan las sales de base alcalina ó terrosa, aunque contengan algunas otras materias. Su sabor es variable, pero por lo comun desagradable, y en razon de las sales predominantes, es amargo, salado ó picante. Por la evaporacion dejan mucho residuo, compuesto principalmente de sulfatos de magnesia ó de cal, hidroclosatos y carbonatos de magnesia, cal, sosa y aun á veces de sulfato de alumina; se descomponen por la potasa y las disoluciones jabonosas. Nunca estan mineralizadas por una sola sal, pues siempre hay una mezcla que, segun su naturaleza y cantidad, les da ciertas propiedades que espresan las calificaciones de *saladas, blandas, crudas, purgantes, alcalinas, &c.*

Las *aguas ioduradas* son aquellas que contienen iodo en estado de combinacion, el cual

hasta ahora solo se ha encontrado en estado de hidriodato, en las aguas sulfurosas, como las de Castel-novo de Asti, en el agua salada de Voghera, &c. y en una agua salina de la provincia de Antioquia, en la América del Sud. Esta agua tiene un color amarillo, un sabor picante y un olor de mar muy notable. Los reactivos del iodo y principalmente el almidon le descubrirían fácilmente. Todas las aguas que se conocen de esta clase estan en países extranjeros. Acaso existan en España, pero aun no se las ha descubierto (1).

Aunque los cuerpos que hemos mencionado como mineralizadores son los mas importantes, no por eso son los únicos que se encuentran en las aguas minerales. En efecto, hay otros varios que no carecen de virtud y que modifican mas ó menos las propiedades clásicas del agua. El oxígeno existe en algunas, el azoe abunda en las frias y acompaña algunas veces en grande abundancia á las sulfurosas. Los ácidos sulfuroso é hidrocórico se hallan en algunas aguas, que

(1) Sin embargo de lo que acabamos de esponer no puede considerarse esta clasificacion como rigurosa y absoluta, porque comunmente se ven algunas aguas que son acidulas y ferruginosas ó sulfurosas, y al mismo tiempo salinas, &c.; pero siempre se puede fijar su carácter con mas ó menos exactitud.

salen de terrenos volcánicos, el hidrosulfúrico existe en algunas ferruginosas, y la sílice está disuelta en muchos manantiales. Los sulfatos y carbonatos de cal, sosa, potasa, magnesia y aun de hierro, y los hidroclosatos de potasa, sosa, cal, magnesia, alúmina y amoniacco existen en muchas aguas de diferentes clases. Tambien parece que alguna vez se ha hallado hidroclosato de barita y de manganeso; pero estas sustancias son menos comunes, así como los hidrobromatos de cal y de sosa, el hidriodato de potasa y el fluato de cal. Tambien se halla una materia llamada glerina.

Las aguas minerales no solo obran por las materias salinas ó gaseosas que contienen, sino que la temperatura del manantial, la presión de la atmósfera, que varía según la altura geográfica á que aquel está situado, y el estado higrométrico del aire tienen sin duda una acción poderosa. Cuando se usan las aguas minerales en el sitio de su nacimiento, contribuyen eficazmente á sus buenos efectos el movimiento del viaje, el cambio de alimentos, aires y lugares, tal vez el nuevo género de vida, la distracción de objetos tristes y las diversiones.

Los hechos observados con cuidado prueban al parecer que las aguas minerales curan las enfermedades, produciendo en general (excepto acaso las acídulas) una escitación mas ó menos manifiesta, cuya energía varía según

la naturaleza y temperatura de las aguas y la susceptibilidad del sugeto. Así, unas veces se observan los resultados de esta escitacion en la piel por el sudor, en los riñones por el aumento de orina, en los intestinos ó pulmon por las evacuaciones de vientre ó una abundante expectoracion, y aun en ciertos casos en los órganos locomotores, cuyos movimientos se hallan enervados por un largo reposo. De este modo, á no ser las de la clase arriba esceptuada, la accion de las aguas minerales debe referirse al método revulsivo.

Sin embargo, á pesar de esta analogía de accion no todas ellas tienen el mismo modo de obrar.

Las *sulfurosas* obran aumentando el círculo sanguíneo, el apetito y la traspiracion, por lo que convienen en las enfermedades cutáneas, en las escrófulas, en la gota y en los reumatismos antiguos, en las obstrucciones ó infartos del hígado, del bazo y del pancreas, en la anorexia y en la dispepsia, en las tisis pulmonal y laringea cuando estan muy al principio, en las afecciones consecutivas á los envenenamientos y á los cólicos, como son los temblores, las parálisis y las convulsiones generales y parciales. Las aguas sulfurosas generalmente se administran al interior á la dosis de media á dos ó mas libras, mezclándolas con leche ó un cocimiento emoliente ó diluente, si ocasionasen mucha es-

citacion; esteriormente se usan en baños, en las enfermedades cutáneas, en los engurgitamientos reumáticos, atónicos y sífilíticos crónicos, en la gota, en las úlceras antiguas y en la parálisis. En este caso sirven de mucho los chorros: son útiles tambien estas aguas en inyeccion en la supuracion de la vejiga y en las úlceras incipientes de la matriz. El légamo ó sedimento, compuesto principalmente de glerina y azufre precipitado muy dividido, es sumamente útil en los engurgitamientos antiguos, sobre todo de las articulaciones, en las hidropestías de las articulaciones, en las úlceras y en los mismos casos que los baños. Estas aguas no deben usarse cuando hay alguna irritacion local ó general, en los escirros y en los sugetos predispuestos á las hemorragias activas.

Las *aguas acidulas* disminuyen la escesiva sensibilidad del sistema nervioso, arreglando ó moderando la accion pervertida ó desarreglada de los órganos y sus funciones. Así convienen en los vómitos pertinaces, en algunas inapetencias, en algunos defectos de la digestion, en las afecciones hipocondriacas é histéricas, en los dolores puramente nerviosos, en los flujos blancos, en las diarreas serosas, en ciertas supresiones del flujo menstrual y en los exantemas crónicos acompañados de mucha sensibilidad. Aprovechan en los que padecen afecciones calculosas ó irritaciones de las vias urinarias, en la clorosis, en la

parálisis y en otras afecciones atónicas ó por debilidad. Estas aguas son perjudiciales para los sujetos amenazados de apoplejía. Se toman en grande cantidad y exigen el mismo régimen que las salinas.

Las *aguas ferruginosas* escitan la circulación, favorecen la sanguificación y promueven el apetito: son tónicas, aperitivas, astringentes y pueden por lo tanto ser muy útiles en las enfermedades de inercia y debilidad de los órganos, como en las blenorragias y leucorreas muy antiguas, en las afecciones que resultan de las cuartanas, como obstrucciones, &c., en las debilidades del estómago, en la esterilidad, cuando depende de la debilidad y demasiada humedad de las partes genitales, en la consunción por los placeres venéreos y en todos los casos en que estan indicados el hierro y sus preparados.

Las *aguas salinas* obran aumentando la acción del sistema linfático y de los aparatos secretorios, y se consideran como aperitivas. Se emplean cuando las primeras vias estan llenas de materiales mucosos y viscosos, y las digestiones estan viciadas por dichos materiales. Tambien son útiles en ciertos engurgitamientos de las vísceras del bajo vientre, en los infartos del hígado y del bazo, en las ictericias lentas y en las afecciones que resultan de la apoplejía, sobre todo de la serosa: convienen igual-

mente en el asma húmedo, en muchas especies de parálisis, en diversas enfermedades de la piel, como herpes antiguos, sarna y tiña inveteradas, en los reumatismos crónicos y en las enfermedades lácteas.

Las aguas salinas, así como las acídulas y ferruginosas, empiezan á beberse de ocho á doce onzas, dosis que podrá repetirse mas adelante y siempre por la mañana, si se creyese conveniente, hasta tomar ocho ó diez libras al día, interpolando un alimento de fácil digestion y haciendo el enfermo el ejercicio que le permitan sus fuerzas. Todas estas y particularmente las salinas calientes se emplean tambien en baños y sobre todo los chorros en los ingurgitamientos crónicos, en la parálisis, en el reumatismo crónico, en la gota tofacea, en el anquilosis incipiente y en las infiltraciones articulares.

Aunque las aguas minerales son un recurso poderoso para el tratamiento de las enfermedades que se han resistido á toda clase de medios, tambien es cierto que la ignorancia les ha atribuido mas virtudes que las que realmente poseen. Para que las aguas surtan los buenos efectos que se esperan de ellas, es necesario prescribirlas en dosis proporcionadas en los casos convenientes, teniendo presente que unas mismas, aunque se parezcan en sus caracteres exteriores, no pueden emplearse

indistintamente en todas las enfermedades ó en todos los grados de las mismas, ni pueden administrarse á todos los sujetos, ni son saludables en todos los tiempos.

Respecto de estos dos últimos extremos es necesario advertir que no debe aguardarse á que el sujeto esté enteramente estenuado y la enfermedad se resista á todo, para prescribirle el uso de las aguas minerales. El tiempo mas á propósito para usarlas es la primavera y el otoño. No obstante, instruidos los facultativos de la localidad del manantial, de la dolencia y modo de emplear las aguas, podrán prescribirlas en otras estaciones, teniendo presente que en el invierno muchas veces se alteran con las lluvias, los enfermos se esponen á los rigores atmosféricos, no tiene efecto la reaccion y se presentan con dificultad ciertas escreciones como la del sudor, cuyo aumento pudiera ser muy ventajoso. Por otra parte el calor estremado fatiga á los enfermos y les impide el ejercicio que tanto aprovecha.

Con estas precauciones, con la de descansar del viaje, corregir algun desarreglo que se oponga al uso de las aguas minerales y con la observancia cuidadosa de sus efectos, para ver si pasan fácilmente por las vias digestivas, si las secreciones que escitan son saludables y si la cantidad que se evacua por los emuntorios está en relacion con el agua que se toma, los

manantiales de aguas minerales pueden ser un remedio positivo y general.

Tampoco es indiferente á la terapéutica de las aguas minerales medicinales el conocimiento de la duracion de los baños, segun las varias temperaturas que tienen; así pues, si las aguas esceden de la temperatura de 35° R. deberán templarse hasta que marquen 30 á 32° R. y los primeros baños durarán de cuatro á ocho minutos, á no ser que el sujeto sea poco escitable ó bien se quiera promover una irritacion conveniente. Los vahos en general y las aguas que tienen de 48 á 26° R. podrán durar desde veinte á treinta minutos; y si de 8 á 16° R. unos cinco á diez minutos, variando poco mas ó menos, segun la indicacion ó el estado y la constitucion del paciente.

AGUAS SULFUROSAS (1).

ALCARAZ. Se encuentra esta poblacion á tres leguas de Peñaranda de Bracamonte, provincia

(1) *Agua de Aix-la-Chapelle artificial.*

Bicarbonato de sosa, 14 granos.

Hidroclorato de cal, 3 granos y medio.

— de magnesia, 1 grano.

Sal marina, 25 granos.

Sulfato de sosa, 8 granos.

de Salamanca, y á poca distancia de ella se halla la fuente llamada del *Regajal*; temperatura 22° Reamur. Nada se sabe de los principios constituyentes que acompañan al ácido hidrosulfúrico.

ALCEDA. V. *Ontaneda*.

ALHAMA DE GRANADA. Se halla á siete leguas de Granada, á cuatro de Loja y á seis de Velez Málaga, provincia de Granada; temperatura 35° R., pero llega á 47° en los calores del estío. Contienen estas aguas mucha cantidad de ácido hidrosulfúrico con una pequeña de gas ácido carbónico, y en 60 libras se han encontrado 30 granos de hidrociorato de sosa, 20 de sulfato de magnesia, 15 de carbonato de magnesia, 10 de sulfato de cal, 4 de hidrociorato de magnesia y 3 de sílice. *Primera temporada*: desde 1.º de abril hasta 15 de junio; segunda, desde 15 de agosto á 15 de octubre (Director).

ALMEIDA. Se halla á siete leguas de Zamora, provincia de Leon; hervideros de San Vicente, 22° R.

ARCHENA. Se encuentra en la orilla derecha del rio Segura á cuatro leguas de Murcia,

Agua, 1 botella.

Acido carbónico, 2 volúmenes.

Agua hidro-sulfurada, 2 onzas.

Agua sulfurosa artificial. V. pág. 329, t. I.

provincia de Murcia : temperatura 42° . Contienen, segun el análisis del señor Gonzalez Crespo, en cada dos libras de agua las sustancias siguientes : 47,6 granos de ácido carbónico, 9,4 de ácido hidrosulfúrico, 18 de carbonato de cal, 6 de azufre, 20,6 de hidroclorato de sosa y 9 de sulfato de magnesia. Segun el análisis de don Juan Alix resulta que cada libra de agua tiene 86 pulgadas cúbicas de ácido carbónico, 23 de gas ácido hidrosulfúrico, 14 granos de muriato de sosa, 10 de carbonato de cal y 4 de sulfato de magnesia. *Temporada* : 1 de abril á 23 de junio: segunda, 1 de setiembre á fin de octubre (Director).

ARDALES. V. *Carratraca*.

ARENOSILLO. Se halla en el término de la ciudad de Montoro, reino de Córdoba. La temperatura de estas aguas es de 49° R. Cada 2 libras castellanas contienen 1,50 de ácido hidrosulfúrico, 0,75 de ácido carbónico, 1,25 de hidroclorato de sosa, 1,00 de hidroclorato de magnesia, 0,50 de hidroclorato de cal, 0,75 de óxido de silicio y 1,25 de sustancia vegeto-animal.

ARTELJO. Pueblo que se halla á legua y media de la Coruña, provincia de este nombre: hay tres baños, cuyas temperaturas son 18, 20 y 30° . Se dice que estas aguas contienen hidroclorato de sosa, hidroclorato de magnesia y ácido hidrosulfúrico. *Temporada* : 1 de julio á

fin de setiembre (Director). Este mismo cuida de las de Carballo.

BANDE. Provincia de Orense.

BAÑOLAS. Está situada esta población á dos y un tercio leguas de Gerona, provincia de dicho nombre; *Font pudosa* (fuente hedionda) temperatura 13° y medio. Contiene esta agua gran cantidad de gas hidrógeno sulfurado, sulfato de magnesia, un poco de sulfato de cal y una corta cantidad de muriato de sosa. A muy poca distancia se halla otro manantial de agua ferruginosa que contiene bastante cantidad de carbonato de hierro, una porcion de sulfato de magnesia, un poco de sulfato de cal y una corta cantidad de muriato de sosa.

BAÑOS. Pequeño pueblo en la provincia de Estremadura; temperatura moderada, pero no hay datos suficientes para decidir los grados que señalan.

BAÑOS DE MONTEMAYOR Ó DE BEJAR. A dos leguas de Bejar y una de Montemayor, provincia de Cáceres: temperatura 30° ó mas R. Contienen ácido hidrosulfúrico, hidroclorato de sosa, carbonato de cal, un poco de alumbre, sílice, y tal vez algo de carbonato de hierro y sulfato de cal. *Temporada:* 1 de junio á fin de setiembre (Director).

BAZA, ZÚJAR Ó BENZALEMA. Se hallan estos baños á dos leguas de Baza, en el término de

la villa de Zujar, provincia de Granada. Su temperatura es de 30° R. Estas aguas contienen mucho ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico, carbonato de sosa, carbonato de cal, hidrociorato de sosa, hidrociorato de magnesia, sulfato de sosa, sulfato de cal y sílice.

BEA. Provincia de la Coruña.

BERTUA. Se halla esta poblacion á seis leguas de la Coruña, provincia del mismo nombre.

BURGA DEL TREMOR. Provincia de la Coruña.

CALDAS DE BOHÍ. Provincia de Lérida; los diferentes manantiales que se encuentran tienen 34 y 36° y medio R. Cada libra de agua sulfurosa, segun el análisis de Don Francisco Carbonell y Brabo, contiene 2 y media pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado y un poco de gas ácido carbónico, y en cada 10 décimas de aquel residuo se hallan: 1 de carbonato de cal, 3 de muriato de sosa, 1 de sulfato de cal y 3 de sílice y materias estrañas.

CALDAS DE CUNTIS. Se encuentra á cuatro y media leguas de Santiago, una y media de Caldas de Reyes, tres de Pontevedra y dos de Padron, en la provincia de Pontevedra. Su temperatura varía entre 30° cent. (24° R.) y 54° (43° R.); así la casa antigua de la Era tiene 32° cent. (25° y medio R.), los de la casa

nuevâ de la Era 29° (23° R.), unos y otros 34° (27° R.), los de Santa María ó de la Virgen se graduan á voluntad y el agua más caliente les viene de una arqueta llamada *Fuego de Dios*, donde el termómetro señala 54° (43° R.); el agua de los baños del chorro tienen 50° (40° R.), la del baño romano 54° (43° R.) y la de la casa de Castro 41° (32° y medio R.). Todas presentan la misma composición, pero solo se ha analizado la del baño templado de la Era, y en ochenta onzas de dicha agua mineral, analizadas por D. Antonio Casares, se han encontrado 276 granos ó 0,762 pulgadas cúbicas de hidrógeno sulfurado, 5,99 de sulfuro de sódio, 37,60 granos de cloruro de sódio, 4,87 de sulfato de sosa, 7,50 de sílice y una materia animalizada análoga á la gelatina. *Temporada*. Véase la siguiente.

CALDAS DE REYES. A cinco leguas y media de Santiago en Galicia, entre las villas de Padron y Pontevedra, provincia de este último nombre. Casa de *Dávila* y casa de *Acuña*; la temperatura de la arqueta que surte las casas de *Dávila* es de 46° y medio term. cent. (37° de R.), en el baño público 42° y medio (34° R.). En la casa de *Acuña* hay dos fuentes: la de afuera de *Acuña* es de 30° c. (24° R.), y la de adentro 35° c. (28° R.)

Segun D. Antonio Casares, las sustancias contenidas en las aguas minerales de Caldas de

Reyes son el cloruro de sódio y el sulfato de cal. La fuente de dentro de la casa de Acuña y la de Dávila contienen además una cantidad sumamente pequeña de hidrógeno sulfurado. *Temporada*: 1 de julio á 30 de setiembre (Director).

CALDELAS DE TUY. Se halla á una legua corta de Tuy, provincia de Pontevedra: temperatura 37° y medio R. Contienen ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, hidroclorato de sosa, carbonato de sosa, sílice y acaso carbonato de hierro. *Temporada*: 1 de julio á fin de setiembre (Director).

CARBALLINO. A media legua de Partovia, provincia de Orense: temperatura 22° R. *Temporada*: 15 de julio á fin de setiembre (Director).

CARBALLO. Provincia de la Coruña: temperatura segun los pozos 24, 25, 29 y 30° R. Contienen ácido hidrosulfúrico y acaso un poco de ácido carbónico, hidroclorato de cal, carbonato de magnesia, carbonato de cal, sulfato de magnesia y sulfato de cal. *Temporada*: véase Arteijo.

CARRATRACA. Se halla á media legua de Ardales, provincia de Málaga: temp. 15° R. En cada libra de agua, analizada por D. Juan de la Monja, se han encontrado 3 y cuarto granos ó 9 pulgadas cúbicas de ácido hidrosulfúrico, 1 y medio granos ó 3 y media pulgadas

cúbicas de ácido carbónico, un tercio de grano de hidrocloreto de magnesia, 1 grano y un tercio de sulfato de magnesia, 1 grano de sulfato de cal y medio de alumbre. Analizados 50 granos de los copos blanquecinos que contiene el agua han dado 23 granos de azufre puro, 11 de carbonato de magnesia, 10 y medio de carbonato de cal y 4 de arcilla. *Temporada*: 20 de junio á 20 de setiembre (Director).

CASARES. A dos leguas de la villa de este nombre, siete de Gibraltar y seis de Ronda, provincia de Málaga, se hallan los baños que se llaman *Casares de Fuensanta y Fuente del Duque*: temperatura 13° y medio R. Contienen ácido hidrosulfúrico, y en cada 25 libras se han encontrado 10 granos de sulfato de cal, 7 de sulfato de magnesia, 5 de carbonato de magnesia, 4 de hidrocloreto de cal y 2 de sílice.

CASTILNUEVO. Se encuentra á un cuarto de legua de la ciudad de Molina, provincia de Calatayud: temperatura 10° R. Contienen ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico, sulfato de cal, carbonato de cal y sílice.

CHICLANA DE LA FRONTERA. A cuatro leguas de Cádiz hay dos manantiales de aguas sulfurosas conocidas con el nombre de *Fuente Amarga y Pozo de Braque*: temperatura 7 y 10° R. Contienen hidrocloreto de sosa, sulfato de

cal, carbonato de magnesia interpuesto con el de cal, sulfato de alúmina, hidrociorato de magnesia, azufre y una sustancia resiniforme. *Temporada*: 1 de junio á fin de octubre (Director).

CORTEGADA. Se halla á cinco leguas de Orense, provincia de este último nombre: la temperatura del baño de la Piedra es de 20° y á veces 24, la del baño del Campo 24 á 30° R., la del baño del Monte y antiguamente del Castaño 26°. Contienen ácido hidrosulfúrico, sulfato de sosa y carbonato de cal.

ELORRIO. Se halla á dos leguas de Durango, dos de Vergara, dos de Mondragon, siete de Bilbao y siete de Vitoria en el señorío de Vizcaya: temperatura, la de la atmósfera. Contienen ácido hidrosulfúrico, ácido carbónico, sulfato de cal, sulfato de sosa, sulfato de magnesia é hidrociorato de cal.

ESPARRAGUERA. A seis leguas de Barcelona. Estas aguas son conocidas en Cataluña con el nombre de *aguas de la Puda* (hedor). Nacen á poca distancia del rio Llobregat á una legua de Esparraguera y á otra de Olesa, distan uno de otro media legua y se comunican por una barca: su temperatura es de 23° R. Según don Mariano de la Paz Graells contienen gas azoe, hidrógeno sulfurado y ácido carbónico libres, y los ácidos sulfúrico, carbónico é hidrociorico unidos en varias combinaciones sa-

linas con la cal, la magnesia y probablemente con la sosa, sílice y materia seudo-orgánica. Según el doctor don Antonio Coca, antecesor de Graells, cada libra contiene gas ácido carbónico y ácido hidrosulfúrico en cantidades indeterminadas, 3,83 granos de hidrociorato de sosa, 1,35 de hidrociorato de cal, 0,43 de hidrociorato de magnesia, 1,55 de subcarbonato de cal, 0,32 de sub-carbonato de magnesia y 1,07 de sulfato de cal. *Temporada*: 1 de julio á fin de setiembre (Director).

FUENTE SANTA DE TORELLÓ, Font Santa de Torelló. Se halla á corta distancia de S. Felix de Torelló, á catorce leguas de Barcelona y dos de Vich. Su temperatura es igual á la de la atmósfera y aun no se han analizado.

FRAILES. Se halla á una legua de Alcalá la Real, provincia de Jaen. Temperatura 15° R.

GRAVALOS. A dos leguas de Arnedo, provincia de Logroño, hay una fuente llamada por los naturales *Podrida*; temperatura 16° R. Contienen sus aguas ácido hidrosulfúrico, hidrociorato de sosa, carbonato de cal, un poco de alumbre y sílice.

GUESALIVAR. V. *Santa Agueda*.

GUIRIZ (Santiago de). Provincia de Lugo.

LEDESMA. A siete leguas de Salamanca y á legua y media de Ledesma, provincia de Salamanca, al pie de un cerro junto al rio Tormes, se halla la fuente de estas aguas: temperatura

40° R. Contienen ácido hidrosulfúrico y acaso un poco de ácido carbónico, sulfato de sosa, carbonato de sosa, hidrociorato de sosa y sulfato de hierro. *Temporada*: 1 de junio á 1 de setiembre (Director).

LOSA. En Castilla la Vieja: fuente de la *Salud*: temperatura 12° R.

LUGO. Provincia del mismo nombre: hay tres manantiales, uno de 32° y otro de 20° R. (Véase Lugo en las *ferruginosas*).

MOLAR Ó FUENTE DEL TORO. A siete leguas de Madrid, á la derecha del camino real que va á Burgos, y á un cuarto de legua de la villa, se halla la fuente llamada del *Toro*; su temperatura es de 13° en el manantial, 14 en el caño y 15 en el pilon. Segun la análisis hecha recientemente de orden del Gobierno por don Vicente Santiago Masarnau, don Diego Genaro de Lletget y don José Abades y Rezano, médico director de los baños, contiene azoe, ácido hidrosulfúrico, aire atmosférico, hidrociorato de sosa, sulfatos de cal y de magnesia, carbonatos de las mismas sustancias y sílice. Los gases existen en gran cantidad y las demás sustancias en muy poca. Don José Gonzalez Crespo ha encontrado que 4 libras de esta agua contienen, además de los ácidos hidrosulfúrico y carbónico, cuyas cantidades no apreció, y del azufre depuesto por descomposicion de parte del gas ácido hidrosulfúrico, 3,30 gr. de sulfato de cal,

6,45 de carbonato de la misma sustancia, 8,54 de hidroclicorato de sosa y 6,11 de sulfato de magnesia. *Temporada*: 15 de junio á 15 de setiembre (Director).

MOLDES. Provincia de Orense.

OLESA. Véase Esparraguera.

ONTANEDA. Se halla en el valle de Toranzo, provincia de Santander: temperatura 28°,5 del term. cent. Cada cinco libras de agua contienen 9,51 de ácido hidrosulfúrico, 9,29 de ácido carbónico, 77,429 gr. de hidroclicorato de magnesia, 64,838 de hidroclicorato de sosa, 46,334 de sulfato de sosa, 65,892 de sulfato de cal, 5,614 de sub-carbonato de magnesia, 4,957 de sub-carbonato de cal y 2,819 de sílice. En su inmediacion existen los de Alceda, de la misma naturaleza.

ORENSE. Provincia del mismo nombre: temperatura 39° R.

PANTICOSA. Se hallan casi en la cresta de los altos Pirineos, legua y media mas allá de dicho pueblo en el alto Aragon; dista 17 leguas de Huesca, 27 y media de Zaragoza y 77 y media de Madrid: fuente del *Estómago*: temperatura 23° R. Sesenta libras medicinales de agua contienen 130,81 gr. ó 355,4 pulgadas cúbicas de gas ácido hidrosulfúrico, 9,14 de hidrosulfato de sosa, 14,40 de hidroclicorato de sosa, 26,48 de sulfato de sosa, 20,0 de carbonato neutro de sosa, 13,0 de glicerina (sustancia

vegeto-animal), 9,0 de sílice y 2,0 de hidrosulfato de cal. *Temporada*: 4 de julio á principios de setiembre (Director).

PARACUELLOS DE JILOCA. Provincia de Teruel : temperatura, la de la atmósfera. Contiene ácido hidrosulfúrico, hidrociorato de sosa y alguna otra sal.

PARTOVIA (*Santiago de*). A media legua de Carballino, provincia de Orense : temperatura 27° R. *Temporada*: véase Carballino.

PREJIGUERO. Pueblo pequeño, inmediato al rio Cervés, provincia de Orense. Sus aguas son muy calientes. Se infiere que contienen azufre y otras sustancias salinas.

*SAN AGUSTIN. A seis leguas de Madrid en el camino de Burgos, provincia de Madrid: temperatura 15° R. Estas aguas han sido analizadas de orden del Gobierno por don Diego Genaro de Lletget, don Vicente Santiago Masarnau y don José Abades y Rezano, médico director de los baños del Molar, y son iguales á las de este último pueblo en cuanto á temperatura y composición, solo que es mas cuantioso su caudal. Han encontrado una corta cantidad de gas hidrosulfúrico libre, una proporcion muy notable de azoe y algunas sales térreas, como hidrocioratos, carbonatos, &c.

SANTA AGUEDA Ó GUESALIBAR. Se halla esta villa inmediata á Mondragon en la provincia de Guipúzcoa, en el camino real de Madrid á

Francia, á cinco leguas de Vitoria, nueve de Bilbao y sesenta y seis de Madrid; contiene aguas sulfurosas, salinas y ferruginosas. Las salinas son como las de Cestona, y las ferruginosas muy puras; temperatura $44^{\circ},5$ term. cent. Según la análisis hecha por don Francisco Gallinas y don Pedro Sanchez Toca y Lobera, en 100 libras de agua encontraron 93 pulgadas cúbicas de gas ácido hidrosulfúrico seco, 324 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico, 327,443 granos de subcarbonato de cal, 4,641 de subcarbonato de magnesia, 429,654 de sulfato de cal, 218,417 de sulfato de magnesia, 283,689 de sulfato de sosa, 166,135 de hidrociorato de magnesia, 503,784 de hidrociorato de sosa y 15,690 de residuo carbonoso. Don Antonio Moreno ha repetido esta análisis y ha obtenido los mismos resultados que los anteriores, solo que encontró un poco de azoe.

SAN VICENTE. En Cataluña.

SANTAELLA. Se halla á siete leguas de Córdoba y á tres de la Carlota, provincia de Córdoba: temperatura 18° R.

TIERMAS. Se halla á seis leguas de Jaca, provincia de Zaragoza, fuente de la Teja ó Chorro 34° R., la de los baños 33° R., y la de la Ripa 32° R. Contienen bastante cantidad de ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico, sulfato de potasa, sulfato de cal, hidrociorato de sosa, hidrociorato de magnesia,

carbonato de magnesia, carbonato de hierro y carbonato de cal. *Temporada*: 1.º de mayo á fin de setiembre (Director).

TRILLO. Se encuentra á la orilla del río Tajo, á dos leguas de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. El manantial de la *Piscina ó Leprosa* tiene 21º R. de temperatura. Contienen gas oxígeno, una pequeña cantidad de azoe y ácido hidrosulfúrico, hidrosulfato de cal, hidroclorato de cal, hidroclorato de magnesia y sulfato de cal. La fuente *Nueva ó del Director*: temperatura 19º R. Contienen sus aguas ácido carbónico, ácido hidrosulfúrico, gas oxígeno, gas azoe y además carbonato de hierro, hidroclorato de sosa, sulfato de cal y azufre. *Temporada*: 24 de junio á 15 de setiembre (Director).

VERAN (San Berisimo de). Provincia de Orense, existe una fuente muy copiosa, cuya temperatura es de 22º R.

VILLAVIEJA. Se encuentra á tres leguas de Murviedro, provincia de Castellon de la Plana: temperatura de la *f fuente Calda* 24º R. *Temporada* 1.ª 1.º de mayo á fin de junio: 2.ª 1.º de setiembre á principios de octubre (Director).

ACIDULAS (1).

ALANGE. A tres leguas de la ciudad de Mérida, provincia de Badajoz, se halla la villa de Alange. La temperatura del agua mineral es de 22° R. Contiene bastante cantidad de ácido carbónico, y además en 15 libras de agua 6 y medio granos de hidrociorato de magnesia, 6 de carbonato de magnesia, 3 de carbonato de sosa, 8 de sulfato de sosa, 2 de sulfato de cal y 1 de sílice. *Temporada:* 15 de julio á 31 de agosto (Director).

ALHAMA DE ARAGON. Pueblo del reino de

(1) *Agua de Seltz artificial.*

Cloruro de calcio cristalizado, 6 granos.

— de magnesio cristalizado, 5 granos.

— de sódio, 20 granos.

Carbonato de sosa cristalizado, 16 granos.

Fosfato de sosa cristalizado, 1 gr. y 1 tercio.

Sulfato de sosa cristalizado, 1 grano.

Acido carbónico, 5 volúmenes.

Agua pura, 20 onzas.

Se disuelven en el agua por una parte las sales de sosa y por separado los cloruros térreos; se mezclan los líquidos y se los carga de ácido carbónico; el agua salina gaseosa que resulta se echa en botellas, las que se tapan inmediatamente. Esta agua reemplaza al agua de Seltz natural, y es preferible porque está mas cargada de ácido carbónico.

Aragon, en la provincia de Calatayud, á cinco leguas de la capital del mismo nombre, y situado á la orilla del rio Jalon. La temperatura de sus aguas es de 29°. Contienen ácido carbónico, hidróclorato de sosa, hidróclorato de magnesia, sulfato de cal y sulfato de hierro. *Temporada:* 45 de junio á 15 de setiembre (Director).

ALHAMILLA, BAÑOS DE PECHINA Ó ALMERÍA.

A tres leguas de la hermosa ciudad de este último nombre, á una legua de Pechina, provincia de Almería, á veinte y tres leguas de Granada y 15 de Guadix; temperatura 42° R. Estas aguas, segun el análisis de don Mariano José Gonzalez Crespo, contienen 12,8 de ácido carbónico, 6,26 de gas oxígeno, 13,66 de

También se usa para preparar el agua de Seltz el polvo siguiente:

Bicarbonato de sosa, 2 *dracmas*.

Acido cítrico cristalizado, 3 y media *dracmas*.

Se introducen en una botella llena de agua y se tapa inmediatamente.

Agua gaseosa simple. V. pág. 318, t. I.

Agua de Pougens artificial.

Carbonato de cal, 16 *granos*.

— de magnesia, *grano y medio*.

— de sosa, 36 *granos*.

Sal marina, 3 *granos*.

Cloruro de hierro seco, 1 *sesto de grano*.

Agua pura, 1 *botella*.

Acido carbónico, 5 *volúmenes*.

gas azoé, 9,92 de carbonato de magnesia, 4,20 de carbonato de cal, 3,80 de hidroclicorato de cal, 3,38 de hidroclicorato de sosa, 4,62 de hidroclicorato de magnesia, 12,52 de sulfato de magnesia, 4,84 de sulfato de cal y 1,76 de sílice. *Temporadas*: 1.^a desde 1.^o de abril á fin de junio: 2.^a de setiembre á fin de octubre (Director).

BOAL. Provincia de Asturias.

FERREIRA. Provincia de Lugo.

GERONA. En esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, hay un arrabal llamado de *Pedret*, donde hay varios pozos y particularmente uno llamado del Carbonero. En el país son conocidos con el nombre de *picantes*. Son frias, y segun el análisis hecha por don Pablo de Cortada y Castañer, resulta que contienen una porcion considerable de gas ácido carbónico libre, carbonato de cal, sulfato de magnesia, hidroclicorato de cal, vestigios de una sal de base de potasa y una cortísima cantidad de hierro.

HERVIDEROS DE FUENSANTA. En la dehesa llamada de Villafranca, á dos leguas y media de Almagro y una de Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad-Real: temperatura 47^o R. Cada 16 onzas de agua medicinal contienen, segun el análisis de don José Torres, 106 y cinco cuartas partes de grano ó 147 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico, 15 granos de hidroclicorato de sosa, 11 de carbonato de mag-

nesia, 1 y medio de sulfato de sosa, 1 y medio de carbonato de hierro y 4 de carbonato de cal. *Temporada*: 15 de junio á 15 de setiembre (Director).

LANJARON. Provincia de Granada á siete leguas al poniente de dicha ciudad, fuente de la *Salud*: temperatura de 12 á 14°. Abunda en ácido carbónico, pues la análisis apenas descubre en ella una pequeña porción de carbonato de cal. *Temporada*: 15 de mayo á 30 de setiembre (Director).

MARMELLA. Provincia de Granada: temperatura 20° R.

MARMOLEJO. A corta distancia de la villa de este nombre, junto al rio Guadalquivir, á una legua de Andujar, en el reino de Jaen, provincia de este nombre, se encuentra el manantial de aguas minerales, que tienen 17° de temperatura: 25 libras contienen gran cantidad de gas ácido carbónico, 1 onza y 7 granos de sulfato de magnesia, 1 onza y 2 granos de carbonato de magnesia, 20 granos de sulfato de cal, 16 granos de carbonato de cal, 12 y medio granos de carbonato de hierro, 6 de hidrocloreto de magnesia, 6 de sílice y 2 de nitrato de cal.

MELON. Provincia de Orense.

PATERNA. Pueblo situado á tres leguas de Ujijar y seis de Guadix, en la provincia de Granada: la temperatura del manantial es de 11°

R. 50 libras de esta agua contienen gran cantidad de gas ácido carbónico, un poco de gas ácido hidrosulfúrico y además 26 granos de sulfato de cal, 16 de carbonato de hierro, 20 de carbonato de magnesia, 19 de sulfato de magnesia; 12 de sílice y 10 de hidrociorato de magnesia.

PORTUBUS Ó PITRES. Se halla este pueblo en la provincia de Granada, á 10 ú 11 leguas de la capital; su fuente mineral tiene 11 á 13° de temperatura. Contienen ácido carbónico, y en 50 libras de esta agua se encuentran 17 y medio granos de carbonato de hierro, 12 de sulfato de magnesia, 12 de sílice, 10 de sulfato de cal, 10 de hidrociorato de magnesia, 7 de carbonato de magnesia y 5 de carbonato de cal.

PUERTOLLANO. Pueblo situado en la provincia de Ciudad Real, á siete leguas de Almagro. La temperatura de su agua mineral es de 13° R. Cada cuartillo contiene, según la análisis de don Pedro Gutierrez Bueno, 23 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico, 4 y un cuarto granos de hidrociorato de magnesia, 1 y medio grano de carbonato de hierro y 1 y un cuarto de grano de sílice. *Temporada*: 18 de junio á 8 de setiembre (Director).

SAN HILARIO SACALM. Esta villa está situada á cuatro leguas de Vich y á 12 de Barcelona, en la provincia de Gerona. Son frias y

contienen una corta cantidad de carbonato de hierro y muchos volúmenes de gas ácido carbónico libre.

SEGURA DE ARAGON. A poca distancia de esta villa, en la provincia de Teruel, se hallan los baños, que tienen 19° R. de temperatura. Cada libra medicinal contiene 1,237 granos de ácido carbónico, 1,27 de sulfato de cal, 0,93 de hidrociorato de magnesia, 0,75 de hidrociorato de sosa, 0,61 de sulfato de magnesia, 0,45 de sulfato de sosa y átomos de sílice.

SOLAN DE CABRAS. Se halla en el término de la villa de Beteta, á nueve leguas de Cuenca, en la provincia de este nombre. La temperatura de sus aguas es de 15 á 17° R. 600 libras contienen, segun la análisis hecha por don Domingo García Fernandez, 576 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico, 90 id. de aire atmosférico, 1 onza, 3 dracmas y 23 y medio granos de tierra caliza, 45 granos de hidrociorato de sosa, 76 y siete octavos de grano de hidrociorato de magnesia, 44 y dos tercios granos de hidrociorato de potasa, 1 dracma y 68 granos de sulfato de sosa, 2 dracmas y 71 y un tercio granos de sulfato de magnesia, 45 granos de sulfato de potasa, 64 granos de nitrato de magnesia, 1 dracma y 2 escrúpulos de carbonato de magnesia, 29 y un cuarto granos de carbonato de hierro y 6 y cuatro novenos granos de arcilla y sílice. *Temporada:* 15 de

junio á 15 de setiembre (Director).

En Saelices, á una legua de Uclés, en la provincia de Cuenca, hay unos baños minerales análogos á estos.

SOLARES. Se halla á dos leguas de Santander, provincia del mismo nombre. Tiene un manantial muy abundante: temperatura 22° y medio R. Cada 16 onzas de agua contienen 0,598 granos de subcarbonato de cal, 0,204 de subcarbonato de magnesia, 0,276 de sulfato de sosa, 2,319 de hidrociorato de sosa, 0,186 de hidrociorato de cal, 0,149 de hidrociorato de magnesia y 0,066 de sílice.

SUMAS AGUAS. En la provincia de Madrid á legua y media de la capital, inmediato á Pozuelo de Aravaca, en una hacienda llamada Sumas Aguas: temperatura 15 á 19°. Contienen ácido carbónico, carbonato de magnesia, carbonato de alúmina, carbonato de cal, carbonato de hierro, hidrociorato de sosa, hidrociorato de magnesia, hidrociorato de cal, sulfato de magnesia, sulfato de cal y sílice.

VERIN. Provincia de Orense.

VILLAVIEJA. Se halla esta villa en la provincia de Castellon de la Plana, á cuatro leguas de la capital: agua de los pozos; su temperatura es muy elevada, y hay aguas de 24 á 30° R. Parece que contienen ácido carbónico y algunos sulfatos, especialmente el de cal. *Temporada.* Véase en las *sulfurosas*.

NOTA. En el campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, se encuentran muchos manantiales de aguas acídulas: tales son el de las *Tiñosas*, á legua y media de la Mesanza, el de *Pajares*, los *Hervideros de Javalon*, *Dehesa de la Higuera*, *Granátula*, *Bolaños*, los de *Diezgo*, los de *Valverde* y otros.

FERRUGINOSAS (1).

ALISEDA. Se encuentra á legua y media de

(1) *Agua de Spa artificial.*

- Carbonato de sosa cristalizado, 3 granos.
- de cal, tres quintas pts. de grano.
- de magnesia, un cuarto de grano.
- Protocloruro de hierro, 2 tercios de grano.
- Alumbre cristalizado, 1 séptimo de grano.
- Agua privada de aire, 20 onzas.
- Acido carbónico, 5 volúmenes.

Se disuelve el carbonato de sosa en una pequeña cantidad de agua y se diluye en el licor el carbonato de cal y el de magnesia; por separado se disuelve el alumbre y el cloruro de hierro en otra porcion de agua y se mezcla esta disolucion con el primer líquido; se echa todo en botellas y se acaban de llenar con agua gaseosa simple.

Agua de Pymont artificial.

- Carbonato de cal, 12 gr.
- de sosa cristalizado, 32 gr.
- Sulfato de sosa cristalizado, 8 gr.
- de cal, 14 gr.
- de magnesia, 16 gr.

la Carolina, capital de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, provincia de Jaen: su temperatura es de 13° R. Contienen bastante cantidad de gas ácido carbónico, hidrociorato de magnesia, sulfato de magnesia, sulfato de cal, carbonato

Sulfato de hierro cristalizado, 2 gr.

Sal marina, 2 tercios de gr.

Hidrociorato de magnesia, 4 gr.

Cloruro de mangán., una vigés. sép. part. de gr.

Agua, 1 botella.

Acido carbónico, 5 volúmenes.

Agua de Forges artificial.

Hidrociorato de cal crist., cuatro quintos de gr.

— de mag. crist., un octavo de gr.

Sulfato de hierro, dos tercios de grano.

— de cal, un tercio de grano.

Sulfato de magnesia cristalizado, 1 gr.

Carbonato de sosa cristalizado, 2 gr.

Agua, 1 botella.

Acido carbónico, 5 volúmenes.

Agua de Contrexeville artificial.

Sulfato de cal, 12 gr.

— de magnesia, un sexto de grano.

Carbonato de cal, 10 gr.

— de magnesia, gr. y medio.

— de sosa crist., un cuarto de gr.

Hidrociorato de cal crist., dos tercios de gr.

— de magn. crist., 1 tercio de gr.

Sulfato de hierro, 1 tercio de gr.

Agua, 1 botella.

Acido carbónico, 5 volúmenes.

Agua calibeadada. V. pág. 309, t. I.

de magnesia, carbonato de alúmina, carbonato de hierro y sílice.

ALMAGRO. Provincia de Ciudad-Real: agua de la Nava á tres leguas de la capital: temperatura 18° R.

ANGELES (Santa María de los Angeles).
Provincia de Santiago.

BAÑOLAS. (Véase en las *sulfurosas*.)

BARREIRO. Provincia de Lugo; fuente de *san Cosme*.

BENASQUE. Provincia de Huesca, fuente de *san Cosme y san Damian*, la de *san Marcial* 22° R., y la de las *Opiladas* 21° R.

BOÑAR. Pueblo á seis leguas de Leon, en la provincia del mismo nombre.

CALDAS DE OVIEDO. Se hallan á una legua de la capital de la provincia de su nombre, y su temperatura es de 34°. Parece que constan de gran cantidad de gas ácido carbónico libre combinado con cal y hierro. *Temporada*: 1.º de junio á fin de de setiembre (Director).

CASTAÑAR DE IBOR. A dos leguas de esta poblacion se halla la fuente llamado del *Oro*, en la provincia de Badajoz, cuya temperatura es de 14°. Contienen ácido carbónico y ácido sulfuroso en cortas cantidades, sulfato de hierro, sulfato de magnesia, alumbre y un poco de hidrocloreto de cobre.

CHICLANA. Fuente de la Naveta y del Cha-

parral: temperatura 9° R. (todo lo demás véase en las *sulfurosas*.)

CORTEGADA. A poca distancia del baño de la *Piedra*, de que se ha hablado en las *sulfurosas*, se hallan dos fuentes, cuya temperatura es de 18 á 20° R., y contienen carbonato de hierro, carbonato de cal y acaso algo de ácido hidrosulfúrico y sulfato de cal.

CUERVO. A cinco leguas de Medina-Sidonia, provincia de Cádiz, en un desierto se hallan unas fuentes que contienen sulfato de hierro.

ENTRAMBASMESTAS. A media legua de Ontaneda, provincia de Santander.

ESPLUGA DE FRANCOLÍ. Se halla á siete leguas de Tarragona, provincia de dicho nombre. Son frías.

FERREIRA Ó PERALEJO. Provincia de Granada: la temperatura del manantial es de 12° R. Contienen un poco de ácido carbónico y en 25 libras se han encontrado los principios siguientes: 16 granos de hidrociorato de magnesia, 15 de hidrociorato de sosa, 23 de sulfato de magnesia, 60 de sulfato de cal, 8 de carbonato de magnesia, 6 de carbonato de cal, 11 y medio de carbonato de hierro y 11 de sílice.

FONT DEN XIROT, llamada así por corrupcion del apellido *Auxirot* del antiguo poseedor de aquellas tierras, se halla situada á media legua corta de Barcelona. Es fría y contiene

bastante cantidad de óxido amarillo de hierro.

FONT GROGA Ó FUENTE AMARILLA. Se halla á una legua de Barcelona, y es fría.

FUENCALIENTE. Provincia de Ciudad Real, á trece leguas de la ciudad de este último nombre, catorce leguas de Jaen, diez y seis de Córdoba, siete de Puertollano y siete de las minas de Almaden: temperatura 32° R. Segun el análisis hecha por don Carlos Mestre cada 8 libras de agua contienen 20,40 granos de ácido carbónico, 27,50 id. de carbonato de hierro, 31,35 de sulfato de cal, 23,47 de hidrociorato de sosa, 15,31 de sulfato ácido de alúmina y 3,13 de sílice. *Temporadas*: 1.^a de 1.º de mayo á 15 de junio: 2.^a desde 1.º de setiembre á 15 de octubre (Director).

FUENTE SUBLANTINA. Cerca de los vestigios de la antigua Sublancia y á un cuarto de legua de Leon, capital de esta provincia, se encuentra la fuente Sublantina; su temperatura es de 16° R. Contienen, segun el análisis hecha por don Antonio Chalanzon, publicado en 1821, 33 partes de gas ácido carbónico, 3,262 de oxígeno, 8,044 de carbonato de hierro, 11,211 de carbonato de cal, 5,189 de carbonato de magnesia, 0,940 de hidrociorato de cal, 0,983 de hidrociorato de magnesia, 1,414 de sílice, 0,435 de materia extractiva y tal vez 0,025 de ácido bórico.

GAVA. A dos leguas y media de Barcelo-

na, en la montaña llamada de Rocabruna, se halla la fuente, cuya temperatura en los meses de junio y setiembre es de 13 á 14° y medio R. 100 libras de esta agua contienen, segun el análisis del doctor don Francisco Samponts, 140 granos de carbonato de hierro, 101 de hidroclorato de cal, 58 de hidroclorato de magnesia, 80 de sulfato de magnesia, 49 de sulfato de sosa y 40 de sulfato de cal.

GRAENA. A poco mas de una legua de Guadix, capital de la provincia de este nombre en el reino de Granada, nacen varios manantiales; la temperatura del baño fuerte es 32° R.; la del templado, Tejilla y Teja 28° R.; y la de la fuente fria 11° R. Contienen ácido carbónico, carbonato de hierro, carbonato de cal, hidroclorato de magnesia, sulfato de magnesia, sulfato de cal y sílice. *Temporadas*: 1.^a 25 de mayo á 8 de julio: 2.^a 15 de agosto á 4 de octubre (Director).

LANJARON. (Topografía y temporada véase en las *acidulas*.) A un cuarto de legua de la poblacion está la *f fuente Capuchina*, á media hora de camino al O. del pueblo se encuentra el manantial llamado de la *Capilla*, al O. N. O. y á un cuarto de legua se halla la *f fuente de los Baños*: temperatura de la fuente Capuchina y Capilla 16°, y la de los Baños 23°. Doce cuartillos de la 1.^a contienen 110,88 granos de ácido carbónico, 23,64 de bicarbonato de

hierro, 49,68 de carbonato de magnesia, 96,36 de carbonato de cal, 462,12 de hidrociorato de magnesia, 143,04 de hidrociorato de cal, 312 de hidrociorato de sosa, y 18 de sulfato de cal. Otros 12 cuartillos de la 2.^a contienen 87,12 granos de ácido carbónico, 1,31 de bicarbonato de hierro, 8,28 de carbonato de magnesia, 9,37 de carbonato de cal, 8,0 de hidrociorato de magnesia, 0,84 de hidrociorato de cal, 16,0 de hidrociorato de sosa, 2,50 de sulfato de cal, 0,50 de sulfato de magnesia y 4 de sílice. Otra tanta cantidad de la 3.^a contiene 59,40 granos de ácido carbónico, 11,82 de bicarbonato de hierro, 55,86 de carbonato de magnesia, 104,40 de carbonato de cal, 163,86 de hidrociorato de magnesia, 61,26 de hidrociorato de cal, 189,0 de hidrociorato de sosa y 6,0 de sulfato de cal.

LLORENS Ó BAÑERAS. Se halla á nueve leguas de Barcelona. Sus aguas son frias.

LUGO. Provincia del mismo nombre: temperatura 32° R. *Temporada*: 15 de junio á fin de setiembre (Director).

MONCADA. Esta fuente está situada en la montaña del mismo nombre, provincia de Barcelona, á legua y media de la capital; su temperatura es de 13° y medio R. Cada 100 libras de agua contienen 336 granos de sulfato de sosa, 24 de sulfato calcareo, 130 de hierro y 5 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico por libra

de agua. El hierro está combinado con el ácido carbónico y forma un carbonato de hierro.

PANTICOSA. (Su topografía véase en las *sulfurosas*.) Fuente conocida con el nombre de *Purgante* ó de *Laguna* : su temperatura 21° R. Cada 60 libras medicinales contienen muy corta cantidad de gas ácido carbónico, 25 granos de sulfato de sosa, 11 de hidrociorato de sosa, 9 de subcarbonato de hierro, 10,7 de sílice y 6 de carbonato de cal.

PRIORIO. Provincia de Oviedo: temperatura 28° R.

SAELICES. A una legua de Uclés, provincia de Cuenca : temperatura 17° R.

SAN PEDRO MARTIR. A unos tres cuartos de legua de Barcelona, provincia de dicho nombre, hay dos manantiales frios. Parece que contienen carbonato de hierro y alguna cantidad de ácido carbónico libre.

SORRADO. Provincia de la Coruña, parece que hay diversos manantiales.

TRILLO. (Topografía y temporada véase en las *sulfurosas*.) Baños del Rey, de la Reina, de los Militares y Pobres : temperatura 23° R. Contienen estas aguas los gases oxígeno, azoe y ácido carbónico, carbonato de cal, carbonato de hierro, hidrociorato de cal, hidrociorato de magnesia y sulfato de cal.

VILAMAJOR. A cuatro leguas de Mataró y seis de Barcelona, provincia de id., hay un

manantial llamado *Fontferrusa* (fuente herrumbrosa). Segun el doctor don Tomás Balvey y Parés contienen sulfato de hierro. *Temporada.* A último de la primavera y en el verano.

GUESALIVAR. Véase santa Agueda en las *sulfurosas*.

SALINAS (1).

ALCANTUD. Se halla el manantial de este nombre á una legua de la poblacion y á la orilla del rio Guadiela, provincia de Cuenca: temperatura 16° R.

ALICUN. Provincia de Granada, á mas de cuatro leguas al norte de la ciudad de Guadix,

(1) *Agua de Vichy artificial.*

Carbonato de sosa, 1 *dracma* y 54 *granos*.

Cloruro de sódio, 1 *tercio de grano*.

— de calcio, 11 *granos*.

Sulfato de sosa, 6 *granos*.

— de magnesia, 3 *granos*.

— de hierro crist., 1 *tercio de gr.*

Agua privada de aire, 20 *onzas*.

Gas ácido carbónico, 3 *volúmenes y medio*.

Se hace una disolucion de las sales de base de sosa, otra del sulfato de magnesia y la tercera del cloruro de calcio; se mezclan todos estos líquidos y se los carga de ácido carbónico; se recibe el agua gaseosa salina que resulta en botellas en que se haya introducido el sulfato de hierro disuelto en una cantidad muy pequeña de agua. El agua que resulta se diferencia de la natural de Vichy en que no contiene materias orgánicas.

hay una fuente conocida con dicho nombre y el de baños de Alicun : temperatura 27°. Contienen un poco de ácido carbónico, hidrocloreto de magnesia, carbonato de cal, sulfato de magnesia, sulfato de cal y sílice.

ARANJUEZ. A siete leguas de Madrid y ocho de Toledo, en una de las cañadas que forman los cerros, llamados *salinilla de Alpuzes*,

Agua de Vals artificial.

Carbonato de sosa , 2 dracmas.

Sulfato de sosa , 1 grano.

— de hierro , 3 cuartas partes de gr.

Magnesia blanca , 1 y 3 cuartos gr.

Cloruro de calcio , 5 gr.

Agua , 1 botella.

Acido carbónico , 5 volúmenes.

Se prepara del mismo modo que la de Vichy.

Agua de S. Nectario artificial.

Carbonato de sosa cristalizado , 92 gr.

Sal marina , 20 gr.

Sulfato de sosa cristalizado , 4 gr.

Hidrocloreto de cal , 12 gr.

— de magnesia cristalizado , 6 gr.

Sulfato de hierro crist., una cuarta parte de gr.

Agua gaseosa con 5 volúmenes , una botella.

Agua de Carlsbad artificial.

Sulfato de sosa cristalizado , 56 gr.

Carbonato de sosa cristalizado , 64 gr.

Hidrocloreto de cal cristalizado , 8 gr.

Sal marina , 8 gr.

Sulfato de hierro crist., la sexta parte de gr.

Agua gaseosa con 5 volúmenes , una botella.

Se prepara del mismo modo que la de Vichy.

que le rodean por la parte del Mediodia, antes de llegar á su cumbre se encuentra la *fuenta Amarga*. Es fria.

ARCE. Asturias.

ARENYS DE MAR Ó BAÑOS DE TITUS. A un cuarto de hora de la villa del mismo nombre, á media legua del pueblo de Caldetas, provincia de Barcelona, se hallan unos baños de la misma naturaleza que los de Caldetas, solo que hay una pequeña diferencia en la temperatura.

Agua de Mont-Dore artificial.

Carbonato de sosa cristalizado, 2 *dracmas*.

Cloruro de calcio cristalizado, 8 *gr.*

— de magnesio cristalizado, *gr. y med.*

— de sódio, 1 *gr. y 1 tercio de gr.*

Sulfato de hierro cristalizado, 2 *gr.*

— de sosa crist., 1 *gr. y 1 tercio de gr.*

Agua privada de aire, 20 *onzas*.

Gas ácido carbónico, 5 *volúmenes*.

Se disuelve el carbonato de sosa y la sal marina en el agua y se carga la disolucion de ácido carbónico; se disuelven á parte los cloruros térreos y el sulfato de hierro, se mezclan las dos disoluciones, se las introduce en botellas y se las acaba de llenar con el agua salina gaseosa; se las tapa inmediatamente.

Agua de Plombieres artificial.

Carbonato de sosa crist., 2 *gr. y 2 tercios*.

Sulfato de sosa cristalizado, 1 *gr.*

Sal marina, 1 *tercio de gr.*

Hidrocl. de cal crist., *cuatro quintas pt. de gr.*

Agua pura, 1 *botella*.

ARNEDILLO. Se halla á cinco leguas de Calahorra y á dos de Arnedo, en la provincia de Logroño, y á 1020 pasos de él se encuentra el manantial: temperatura 42° R. Cada libra contiene 2 granos de hidroclicato de magnesia, 16 de sulfato de cal, 50 de hidroclicato de sosa ó sal comun, 14 de sulfato de sosa, 2 de

Agua de Bussang artificial.

Carbonato de sosa cristalizado, 16 gr.

Sulfato de cal, 2 gr.

— de magnesia crist., 1 tercio de gr.

Hidroclicato de cal cristalizado, 3 gr.

Sulfato de hierro cristalizado, 2 tercios de gr.

Agua gaseosa con 5 volúmenes, 1 botella.

Agua alcalina gaseosa.

Bicarbonato de potasa, 80 gr.

Agua pura, 20 onzas.

Acido carbónico, 5 volúmenes.

Se disuelve la sal de potasa en el agua, se la carga de ácido carbónico y se la embotella. Cada onza contiene en disolucion 4 granos de bicarbonato de potasa.

Agua magnesiána gaseosa y agua magnesiána. V. pág. 322, t. I.

Agua de sosa carbonatada. V. pág. 328, t. I.

Agua de Balaruc artificial.

Cloruro de sodio, 70 gr.

Hidroclicato de cal, 68 gr.

— de magnesia, 33 gr.

Sulfato de sosa cristalizado, 20 gr.

Bicarbonato de sosa cristalizado, 2 gr.

Agua gaseosa con 3 volúmenes, 1 botella.

carbonato de magnesia, y oxígeno y azoe combinados en partes iguales.

BENASQUE. Provincia de Huesca, fuente de san Juan 29° R.; la de san Roque 28° R., y la de san Vitoriano 18° R.

BUGARIN. Provincia de Pontevedra.

BUSOT. Provincia de Alicante, hay varios manantiales de la misma naturaleza; los que se usan con preferencia son los de la *Cogolla* y los *Baños*; la temperatura del 1.º es de 33° R., y la del 2.º es de 32° R. Cada 16 onzas de agua mineral contienen, segun el análisis hecha por don Agustin Alcon, 3 pulgadas cúbicas de aire atmosférico, 6,38 granos de sulfato de cal, 9,20 de sulfato de magnesia y 4,42 de muriato de

Agua de Baden artificial.

Sal marina, 32 gr.

Muriato de magnesia cristalizado, 2 gr.

— de cal crist. 43 gr.

— de hierro seco, un cuarto de gr.

Sulfato de sosa crist. 11 gr.

Carbonato de sosa crist., medio gr.

Agua gaseosa con 5 volúmenes, 1 botella.

Agua de Audinac artificial.

Sulfato de cal, 8 gr.

Sulfato de magnesia cristalizado, 13 gr.

Muriato de magnesia crist., 8 gr.

Carbonato de cal, 6 gr.

Sulfato de hierro crist., 1 cuarto de gr.

Carbonato de sosa crist., 1 cuarto de gr.

Agua gaseosa con 5 volúmenes, 1 botella.

magnesia. *Temporadas*: 1.^a 1.^o de mayo á 30 de junio, y 2.^a 1.^o de setiembre á 30 de octubre (Director).

CALDAS DE ESTRACH (*vulgarmente Caldetas*). Pueblo marítimo á legua y media de Mataró y cinco y cuarto de Barcelona, provincia de este último nombre. Su manantial tiene 32 á 33^o R. de temperatura. Contiene carbonato de cal, hidrociorato de cal, sulfato de cal, hidrociorato de sosa y acaso carbonato é hidrociorato de magnesia.

CALDAS DE MALAVELLA. Provincia de Gerona, á tres leguas de la capital. Se ignora su temperatura, pero hay un manantial muy caliente.

CALDAS DE MOMBUY. Se hallan estos baños á cuatro leguas de Barcelona y á otras

Agua de Seidschutz artificial (Bohemia).

Sulfato de magnesia crist., 3 *dracmas y med.*

Hidrociorato de cal cristalizado, 7 *gr.*

Carbonato de cal, 2 *gr.*

— de magnesia, 4 *gr.*

Agua gaseosa con 5 *volúmenes*, 1 *botella.*

Agua de Pultna artificial (Bohemia).

Sulfato de sosa cristalizado, 4 *dracmas.*

— de magnesia crist. 5 *y media dracm.*

Hidrociorato de cal, 18 *gr.*

— de magnesia, 56 *gr.*

Sal marina, 19 *gr.*

Agua gaseosa con 5 *volúmenes*, 1 *botella.*

cuatro de Mataró, en la provincia de Barcelona; la temperatura de la fuente del *Leon* 55 á 56° R.: en la Canaleta 54° R.: en las Cabellas 51° R.: en el caño del hospital 52°, y en los demás baños varía de 24 á 56° R. Cada dos pies cúbicos de agua contienen, segun el análisis de don Ignacio Graells, 325,98 pulgadas cúbicas de fluidos elásticos é igual cantidad de agua deja por la evaporacion un residuo de 1 onza, 6 dracmas, 4 escrúpulo y 12 granos de materias salinas, y guardan las proporciones siguientes: 85 pulgadas cúbicas de aire atmosférico y 240,88 pulgadas cúbicas de gas ácido carbónico, 811,0 granos de hidrocloreto de sosa, 58,0 de sulfato de sosa, 24,5 de sulfato de cal, 21,0 de subcarbonato de sosa, 42,5 de subcarbonato de cal, 65,0 de sílice, 11,0 de alúmina, 7,0 de materia orgánica y una cantidad inapreciable de hidrocloreto de cal. *Temporadas*: 1.^a 1.º de mayo á 15 de julio; 2.^a 1.º de setiembre á 15 de octubre (Director).

CESTONA Ó GUESALAGA. Nacen estas aguas á un cuarto de legua de este pueblo al pie del monte Ayaquehoz, provincia de Guipúzcoa. Temperatura 28 á 30°, pero por la tarde baja á 24. Contienen ácido carbónico, carbonato de hierro, hidrocloreto de sosa en gran cantidad é hidrocloreto de magnesia, segun unos, ó hidrocloreto de sosa, hidrocloreto de cal, sulfato de sosa, sulfato de cal, carbonato de cal y

silice, segun otros; siendo lo que mas abunda en ellas el hidrociorato y el sulfato de sosa.

CORCOIES. Villa situada á seis leguas de Huete y cerca de dos leguas de Sacedon, provincia de Guadalajara; fuente de la *Aurora*, 22° R.

CREVILLENTE. A media legua de esta villa y 6 leguas de Alicante.

FALCES. Provincia de Navarra, fuente de *Calchetas*.

FITERO. Se halla situada á siete leguas de Tafalla en el reino de Navarra, y á legua y media se halla la fuente, cuya temperatura es de 38° R. Contiene algo de ácido hidrosulfúrico, pequeña cantidad de sulfato de hierro, sulfato de cal, hidrociorato de magnesia é hidrociorato de sosa. *Temporada*: 15 de mayo á 15 de octubre (Director).

FONTS CALENTS. Es un manantial corto á tres leguas al O. de Alicante; son análogas á las de Busot.

FONT SANTA DE SAN JUAN DE CAMPOS. A legua y media de la villa de Campos en Mallorca; su temperatura es de 36 centígrados. Segun el análisis cualitativo hecha por don Lorenzo Vicens, el gas que se desprende del manantial es azoe puro, y además contiene bastante cantidad de ácido hidrosulfúrico libre, muy poco ácido carbónico libre, indicios de silice, carbonato de cal, carbonato de magnesia, hidroclo-

rato de sosa, ácido sulfúrico ó hidroclosatos combinados con uno, muchos ó todos los óxidos siguientes : sosa, magnesia, cal, indicios de potasa y sustancias orgánicas.

FORTUNA. A cuatro leguas de Archena, provincia de Murcia, y á media legua de la poblacion se halla el manantial. Dicen que esta agua contiene sulfato de alúmina, hidroclosato de sosa, betun y hierro.

FUENTE DEL FRESNO. Pueblo de la provincia de Ciudad-Real, y á media legua de la poblacion se halla la fuente llamada del *Regajo*. Son calientes en invierno y frias en verano.

FUENTE DE PIEDRA Ó DE ANTEQUERA. A dos leguas de esta última ciudad y tres de Estepona, en el reino de Granada, provincia de Málaga, se hallan las aguas, que tienen 14° de temperatura. Contienen hidroclosato de cal, hidroclosato de magnesia, carbonato de magnesia, sulfato de cal, sulfato de magnesia y sílice.

JABALCUZ. Se hallan estos baños en la provincia de Jaen á media legua de la capital : temperatura 23° y medio. Contienen un poco de ácido carbónico, hidroclosato de cal, hidroclosato de sosa, carbonato de magnesia, sulfato de magnesia, sulfato de cal, alumbre y sílice.

LAS CALDAS. Provincia de Santander.

PANTICOSA. (Su topografía véase en las *sulfurosas*.) Fuente del *Higado* : temperatura 22° R. Cada 60 libras medicinales, marcando el término

metro de R. 18° y el barómetro 27 pulgadas, contienen 321,45 granos ó 1066,2 pulgadas cúbicas de gas azoe, 31,0 de sulfato de sosa, 10,60 de hidrociorato de sosa, 2,0 de carbonato de cal, 2,10 de hidrociorato de magnesia y 8,0 de sílice. La fuente llamada de los Herpes: temperatura 21° y medio R.: 60 libras medicinales han dado por resultado en iguales circunstancias 214,3 granos ó 710,8 pulgadas cúbicas de gas azoe, 29,0 de sulfato de sosa, 12,0 de hidrociorato de sosa, 5,7 de carbonato de cal, 3,0 de hidrociorato de magnesia y 7,0 de sílice.

QUINTO. Se halla en las faldas de una montaña, á la derecha del canal del Ebro, en la provincia de Zaragoza: temperatura 15 á 17° R. Contienen sulfato de cal, sulfato de magnesia, hidrociorato de sosa, hidrociorato de cal y un residuo insoluble. Temporada: 1.º de mayo á fin de setiembre (Director).

RIBAS. Provincia de Gerona. La fuente dista del pueblo cinco cuartos de hora. Cada libra de agua contiene, segun el análisis de don Luis Bach, de 10 á 15 granos de sulfato de magnesia, 6 á 8 de hidrociorato de cal y 3 á 4 de carbonato de magnesia. Temporada: 1.º ó á mediados de julio á últimos de agosto.

ROSAL DE BETETA Ó FUENTE DEL ROSAL. Se halla situada á medio cuarto de legua de Beteta, provincia de Cuenca: temperatura 17° R. Contiene ácido carbónico, hidrociorato de mag-

nesia, hidrocloreto de sosa, carbonato de cal, carbonato de magnesia, carbonato de hierro, sulfato de magnesia, sulfato de sosa, sulfato de cal, nitrato de magnesia, alumbre y sílice.

SACEDON Ó REAL SITIO DE ISABELA. En el centro de la Alcarria, provincia de Guadalupe, en un valle rodeado de montañas, cerca del río Guadiela, se halla situado dicho real Sitio, á una legua de Sacedon: temperatura 22° y aun suele llegar á 23 y 23° y medio R. Cada libra contiene 26 pulgadas cúbicas de aire atmosférico, 0,7 granos de hidrocloreto de cal, 4,0 de hidrocloreto de sosa y 0,3 de sulfato de cal. *Temporada:* 1.º de junio á fin de setiembre, aunque pueden usarse con utilidad en cualquier tiempo del año (Director).

TERUEL. Capital de la provincia de su nombre en el reino de Aragón, á media legua de la población y á las márgenes del río Alhambra, nacen varios manantiales, cuya temperatura es de 20 á 22° R. Contienen sulfato de cal, sulfato de alúmina y nitrato de potasa.

TORTOSA (Ciudad de) provincia de Tarragona, junto al río Ebro. Fuente de la Virgen de la Cinta.

TRILLO. (Su topografía y la temporada véase en las *sulfurosas*.) Baños de la Princesa, temperatura 24° R.: baños de la Condesa, temperatura 23° R. Contienen los gases oxígeno y azoe, hidrocloreto de cal, hidrocloreto de mag-

nesia, hidrociorato de sosa y sulfato de cal.

VACIA MADRID. A tres leguas de Madrid. Se halla una fuente, que contiene entre otras sales gran cantidad de sulfato de magnesia.

AGUA DE MAR. Esta agua, empleada en bebida, tiene una accion purgante y debe prescribirse con mucha prudencia; pues solo conviene á los sugetos de temperamento linfático. Se la recomienda en los infartos crónicos del hígado, en la ictericia, en la clorosis, en el coma y en las escrófulas. Se usa á la dosis de tres á cuatro vasos al dia.

Los baños de mar son muy útiles en un gran número de enfermedades, y sobre todo son eficaces en la raquitis, en las parálisis antiguas; en las enfermedades nerviosas con debilidad ó atonía y en las afecciones escrofulosas. Son útiles en la clorosis, en los infartos crónicos del cuello de la matriz, en la esterilidad, en la dismenorrea, en las cefaleas, en las gastralgias, en los dolores intestinales, en el corea, en los reumatismos, en el carreau, en las úlceras escorbúticas y escrofulosas, en las contorsiones y contusiones, &c.

Agua de mar artificial.

Sal comun, 24 libras y 4 onzas.

Sulfato de sosa cristalizado, 9 libras y 4 onzas.

Hidrociorato de cal, 2 libras y 2 onzas.

Hidrociorato de magnesia, 7 libras y 10 onzas.

Agua, seiscientos cuartillos.



PARTE SESTA.

ENVENENAMIENTOS.



Signos generales de un envenenamiento.

Se deberá sospechar un envenenamiento siempre que un enfermo se queje de un olor nauseabundo é infecto, ó de un sabor desagradable, ácido, alcalino, acre, estíptico ó amargo ó de un calor acre quemante en la garganta y en el estómago; si la boca está seca ó espumosa, el aliento es fétido y la garganta está constreñida; si la lengua y las encías están lívidas, de un amarillo limon, blancas, rojas ó negras; si siente un dolor mas ó menos vivo, mas ó menos fijo á lo largo del conducto digestivo, ó en uno de estos puntos mas bien que en otros; si tiene eruptos, náuseas ó vómitos mas ó menos frecuentes de materias mucosas, biliosas ó sanguinolentas, blancas, amarillas, verdes, azules, rojas ó parduscas, que hierven sobre los ladrillos, que enrojezcan ó enverdezcan el color del girasol; si se observa hipo, constipacion

ó deyecciones alvinas mas ó menos abundantes, con ó sin tenesmo, de diferente color y naturaleza; si la respiracion es dificil, el pulso pequeño, frecuente, concentrado, irregular, comunmente insensible ó fuerte y regular; si la sed es ardiente, tiene frecuentes escalofrios y la piel y los miembros inferiores estan helados ó atormentados por un calor quemante ó una erupcion dolorosa; si los sudores son frios y pegajosos; la emision de la orina dificil, muy rara ó quemante, y se expelen las bebidas del estómago inmediatamente que se ingieren en él. Tambien se tendrá en consideracion la alteracion de la fisonomía, el color pálido, lívido ó aplomado de la cara, la pérdida de la vista y del oido, la rubicundez de los ojos y la vista fija; la contraccion y el color de la pupila, la agitacion general, los gritos, el delirio, las convulsiones generales ó locales, las contorsiones, la risa sardónica, el trismo, el estupor, el síncope, la pesadez de cabeza, la somnolencia, los vértigos, las parálisis locales ó generales, la postracion de fuerzas, la alteracion de la voz, el priapismo, &c. Por último, el médico comprobará si hay cesacion ó aparicion mas ó menos regular de los diferentes síntomas que acabamos de enumerar.

Tratamiento general. Cuando se vaya á asistir á un envenenado, lo primero que debe hacerse es determinar la naturaleza del veneno, ó averiguarla por todos los indicios posi-

bles. Se examinará con mucho cuidado el estado del enfermo , las materias del vómito y de las deposiciones , y si es necesario se harán algunos ensayos analíticos ; pero teniendo presente que si la primera condicion es conocer el veneno , la segunda es obrar con prontitud. Las indicaciones que se deben llenar varían segun el tiempo que ha pasado despues del envenenamiento. Así , si el veneno ha sido tragado hace poco tiempo y se halla aun en el estómago , ó bien se puede suponer que no ha sido enteramente absorvido , ó en otros términos que el médico es llamado en la primera época de los accidentes , se procurará expeler la porcion de veneno no absorvida , ya por arriba , ya por abajo , por medio de los evacuantes , ó bien neutralizar sus propiedades venenosas combinándole con una sustancia llamada *contraveneno*. Si la sustancia deletérea ha sido tragada durante cierto tiempo ó ha sido introducida en la economía por otra via diferente que el estómago , y si se han manifestado los síntomas del envenenamiento , se combatirá la enfermedad por los medios generales apropiados á la naturaleza de los síntomas , al estado del sugeto y de los órganos afectados , al género de veneno , &c. ; así , unas veces se recurrirá á los evacuantes , otras á los escitantes y otras á los debilitantes ; en ciertos casos á los evacuantes vomitivos , en otros á los purgantes , &c.

Los debilitantes serán las sangrías, los baños, &c.; se elegirán los escitantes de los aromáticos, de los difusibles, &c.

Los evacuantes que se usan en el primer período de los envenenamientos son: el agua caliente y en gran cantidad, el emético, el sulfato de zinc, la pocion vomitiva de Magendie, la titilacion de la campanilla con las barbas de una pluma, las bebidas mucilaginosas y dulcificantes, &c.

Los contravenenos ó *antídotos* son unas sustancias capaces de descomponer ó neutralizar los venenos, combinándose con ellos. Estas sustancias deben ser susceptibles de poderse tomar en gran cantidad sin ningun peligro, y su accion debe ser pronta é independiente de los jugos gástricos, mucosos, biliosos, &c. contenidos en el estómago.

Generalmente se dividen los venenos en irritantes, corrosivos ó cáusticos, en venenos narcóticos, en venenos narcóticos-acres y en venenos sépticos.

PRIMERA CLASE.

VENENOS IRRITANTES, CORROSIVOS Ó CÁUSTICOS.

I ÁCIDOS MINERALES Y VEGETALES.

Contravenenos. Magnesia calcinada diluida en agua, bicarbonato de potasa, bicarbonato

de sosa, maceracion de la semilla de lino ó de malvabisco, agua de jabon, jabon medicinal, poción del doctor Andry, lavativas emolientes, &c.

Tratamiento. Si no se ha verificado el vómito, lo que es muy raro, se titilará la campanilla con las barbas de una pluma; luego que se haya neutralizado el veneno, que aun no ha tenido lugar de obrar, se recurrirá á los antistrogísticos, á los fomentos emolientes sobre el abdómen, á los baños tibios, á una sangría del brazo y á las sanguijuelas, si no bastan los primeros remedios, á las bebidas mucilaginosas, y á las sanguijuelas al cuello, si no puede verificarse la deglucion.

Corregidos los accidentes, se prescribirán algunas tazas de agua de vaca ó de caldo de pollo; se favorecerá la convalecencia con el uso de la harina de avena mondada, de las féculas, de las cremas de arroz y de los caldos grasos; se evitarán el vino, los espirituosos y los alimentos sólidos; por último, confirmada la convalecencia, se permitirán los alimentos sólidos, pocos á la vez y de fácil digestion.

Si por una causa cualquiera el enfermo no puede tragar ninguno de los medicamentos prescritos, se los introducirá en el estómago por medio de la sonda de Boerhaave, modificada.

2. **ÁLCALIS CONCENTRADOS** (potasa, sosa y amoniaco).

Contra venenos. Vinagre, zumo de limon dilatado en agua (dos cucharadas de café para un vaso de agua), mucha agua caliente y agua albuminosa.

Tratamiento. Se hace vomitar y despues se recurre á las bebidas, fomentos emolientes, cataplasmas, sanguijuelas &c., si no ceden los accidentes. Véase *ácidos*.

3. PREPARACIONES MERCURIALES.

Contra venenos. Agua albuminosa, leche dilatada en agua, gluten de Taddei y harina diluida en agua; la harina obrará por su gluten.

El agua albuminosa se prepara con la clara de huevo mas ó menos diluida en agua. Duvergie prefiere la yema á la clara de huevo.

El gluten de Taddei se prepara con seis partes de gluten fresco y diez partes de jabon blando (jabon de potasa). Se mezclan, se extiende la mezcla en platos, se deja secar en la estufa y se la pulveriza. Treinta y seis granos de este polvo diluidos en una onza de agua pueden neutralizar un grano de sublimado.

Tratamiento. Véase *ácidos*.

4. PREPARACIONES DE ARSÉNICO.

Contra venenos. Agua azucarada pura ó mezclada con una tercera parte de agua de cal, pocion aceitosa, leche, albumina diluida en agua, cocimiento de nuez de agalla ó de quina, polvo de carbon, sulfuros alcalinos, aguas sulfurosas artificiales, hidrato de peróxido de hierro

(doce á quince veces el peso presumido del veneno) diluido en agua azucarada. V. pág. 154, tomo II.

Tratamiento. Cocimientos emolientes, agua de vaca ó de pollo, sangrías, &c., si hay fenómenos de sobreirritacion y de irritacion general. Si hay postracion, debilidad, coma, sopor, &c., la mezcla tónica del doctor Rognetta (caldo seis ú ocho partes, vino cuatro ó cinco partes, y alcohol ó aguardiente dos ó tres partes), que produce buenos efectos en los perros; ¿deberá empleársela en el hombre, ó se quiere que la experiencia sancione este nuevo método de tratamiento? Véase *ácidos*.

5. PREPARACIONES DE COBRE. Véase *preparaciones mercuriales*.

6. PREPARACIONES DE ANTIMONIO.

Contravenenos. Agua tibia en abundancia. Si no se ha verificado el vómito, se administrarán muchas tazas de infusion de nuez de agalla, de cocimiento de quina, de sáuce ó de corteza de roble.

Tratamiento. Se combatirá el vómito dando agua azucarada ó muchos vasos de agua que tengan en disolucion un grano de opio ó una onza de jarabe de opio. Se podrá reemplazar este líquido con un cocimiento de tres ó cuatro cabezas de adormideras en dos vasos de agua endulzada con azúcar. Si persisten los dolores y los vómitos, se aplicarán algunas sanguijuelas

en la region del estómago; ó al rededor del cuello, si es dificil la deglucion. Por último, se procederá del mismo modo que en los envenenamientos por los ácidos, si se aumentan ó persisten los dolores intestinales.

7. SALES DE ESTAÑO, BISMUTO, ORO, ZINC, URANO, CERIO, MANGANESO, IRIDIO, NIQUEL, COBALTO Ó PALADIO, HIDROCLORATO DE PLATINO, CROMATO DE POTASA Ó HIDROCLORATO DE CROMO.

Contravenenos. Leche mezclada con agua ó agua albuminosa.

Tratamiento. Véase *ácidos y preparaciones de arsénico.*

8. NITRATO DE PLATA.

Contravenenos. Disolucion de sal comun, preparada con una cucharada de café de sal comun y dos azumbres de agua.

Tratamiento. Véase *ácidos.*

9. NITRATO DE POTASA.

Tratamiento. Agua caliente para hacer vomitar, y despues combatir la flegmasia por los emolientes, y los síntomas nerviosos por los opiados.

10. HIDROCLORATO DE AMONIACO. Véase *nitrato de potasa.*

11. HIGADO DE AZUFRE Ó SULFURO DE POTASA.

Tratamiento. Se favorecerá el vómito por medio de una gran cantidad de agua caliente; despues se dará cloro líquido, preparado con una

cucharada de cloro líquido por vaso de agua; se calmarán los dolores de vientre con las sanguijuelas, y se procederá despues del mismo modo que para los ácidos.

12. AGUA DE JAVELLE. Esta se prepara con ciento veinte y cinco granos de cloruro de potasa y dos cuartillos de agua.

Tratamiento. Se provocará el vómito, se dará agua albuminosa y se procederá del mismo modo que hemos indicado para los ácidos.

De igual modo se tratan los envenenamientos por el *cloruro de sosa* y el *alumbre*.

13. PREPARACIONES DE BARITA.

Contra venenos. Agua de pozo, que contenga sulfato de cal y disoluciones de sulfato de sosa ó de sulfato de magnesia (dos dracmas de una de estas dos sales en dos cuartillos de agua).

Tratamiento. Agua azucarada, bebidas emolientes, &c. Véase *ácidos*.

14. FÓSFORO, IODO, HIDRIODATO DE POTASA, BROMO, HIDROBROMATO DE POTASA. Véase *ácidos*.

15. CANTÁRIDAS Y SUS PREPARACIONES.

Tratamiento. Agua tibia y maceracion de semilla de lino, de raiz de malvabisco, &c. en suficiente cantidad para producir vómitos, emulsiones alcanforadas, alcanfor; se inyectarán en la vejiga líquidos mucilaginosos, se harán fricciones en la parte interna de los muslos y de

las piernas con aceite alcanforado, si persisten el ardor en la vejiga y la dificultad de orinar; no se darán líquidos aceitosos, que aumentarían los accidentes disolviendo los principios activos de las cantáridas. Si las cantáridas no se han administrado interiormente, y solo se han aplicado sobre la piel ó sobre las heridas, no se debe provocar el vómito, y solo limitarse á dar algunos vasos de agua azucarada, á un baño general, á fricciones aceitosas y alcanforadas, á algunas sanguijuelas, á los fomentos emolientes sobre los puntos dolorosos, &c.

16. VIDRIO Ó ESMALTE. *Tratamiento.* Llevar al enfermo de alimentos feculentos á fin de que rodeen al veneno y disminuyan su acción sobre la membrana mucosa del estómago; recurrir después al vómito y en seguida á los mucilaginosos, á los dulcificantes, á los fomentos, á los baños emolientes, á las sanguijuelas sobre los puntos doloridos, &c.

17. PREPARACIONES DE PLOMO.

Contraveneno. Las disoluciones de sulfato de magnesia, de sulfato de sosa y el agua de pozo.

Tratamiento antiflogístico. Sanguijuelas y evacuaciones generales, baños y lavativas emolientes, bebidas mucilaginosas y pociones calmantes. Véase *cólico de plomo*, en el *Memorial Terapéutico*.

18. VENENOS IRRITANTES VEGETALES. *Anémoma, brionia, colocintida, clemátide, cohombri-*

*llo silvestre , celedonia , creosota , euforbio , gra-
ciola , gutagamba , torbisco , jalapa , manzanillo ,
narciso de los prados , croton tiglio , zumaque
oeneroso , ricino , ranúnculo , sabina y estafisagria.*

Tratamiento. Bebidas emolientes, baños y fomentos emolientes; si no hay dolores abdominales ó son poco intensos, los vómitos són frecuentes y el abatimiento y la sensibilidad muy notables, se darán algunas tazas de infusion de café (dos cuartillos de agua para ocho onzas de café en polvo). En el caso contrario se procederá como hemos dicho para el sublimado y los ácidos.

SEGUNDA CLASE.

VENENOS NARCÓTICOS.

1 **BELEÑO, BELLADONA, MANDRÁGORA, YEBBAMORA, LECHUGA VIROSA, &c.**

Tratamiento. Provocar el vómito con medio escrúpulo de ipecacuana, una cucharada de la pocion vomitiva de Magendie, cuatro ó cinco granos de emético, veinte ó veinte y cuatro granos de sulfato de zinc ó tres ó cuatro granos de sulfato de cobre, disueltos en un vaso de agua, y favorecer el éxito de uno ú otro de estos remedios, introduciendo los dedos en la garganta, ó estimulando la campanilla con las barbas de una pluma; dar despues del vó-

mito las bebidas aciduladas, preparadas con zumo de limon, vinagre, ácidos vegetales, tartrato ácido de potasa, &c.; combatir el narcotismo con agua de café, con la bebida anti-narcótica de Van-Mons, con el vinagre de café de Swediaur, con pociones estimulantes, alcoholizadas, vinosas, amoniacales ó etéreas; por último, son tambien útiles las fricciones secas sobre los miembros y sobre todo el cuerpo, lo mismo que la sangría del brazo ó de la yugular, si el enfermo está atacado de apoplejía, y si los medios ordinarios no han producido ningun alivio.

Si se ha aplicado el veneno exteriormente, se procederá del mismo modo, solo que nos abstendremos de producir vómitos.

Cuando el envenenamiento sea producido por una sustancia que obre por contener un álcali vegetal, se puede usar una disolucion de tanino ó un cocimiento de nuez de agalla; pero el contraveneno que, segun se asegura, produce muy buenos efectos es la *disolucion de ioduro de potasio iodurada*, que se prepara con dos dracmas de ioduro de potasio, medio escrúpulo de iodo y diez y seis onzas de agua. Se da á medios vasos.

2. OPIO, SUS PREPARADOS Y SUS PRODUCTOS.

Tratamiento. Hacer vomitar, dar el cocimiento de nuez de agalla, y despues agua de café; en lo demás se procederá del mismo mo-

do que en el tratamiento por el envenenamiento por el beleño, &c.

3. **ÁCIDO PRÚSICO, CIANURO DE MERCURIO Y CIANURO DE ORO.**

Tratamiento. Hacer vomitar, hacer respirar el agua de cloro (cuatro partes de agua y una de cloro líquido), dar el agua amoniacal (una parte de amoniaco líquido y doce partes de agua); afusiones de agua muy fría sobre la cabeza, sobre la nuca y sobre todo el trayecto de la columna vertebral; hielo sobre la cabeza, sangría de la yugular ó del brazo, sanguijuelas detrás de las orejas, fricciones en las sienes con tintura de cantáridas y el amoniaco, y sinapismos en las plantas de los pies.

TERCERA CLASE.

VENENOS NARCÓTICO-ACRES.

1. **HONGOS VENENOSOS.** Hongo carmesí falso, agárico cicuta verde, hongo carmesí amarillento, hongo carmesí blanco, hongo carmesí raton, hongo carmesí cruz de malta, agárico vulboso, agárico de primavera, agárico mortífero, agárico acre, agárico cáustico, agárico estíptico, agárico lechoso, agárico cabeza de medusa, agárico lechoso puntiagudo, agárico de embudo hueco y venenoso, &c.

Tratamiento. Hacer vomitar prontamente

al enfermo con el emético, y despues administrar los purgantes siguientes: una onza de aceite de ricino y onza y media de jarabe de flores de melocoton, que tomará á cucharadas cada media hora, ó dos onzas de cañafístula quebrantada, media draema de sen mondado, media onza de sulfato de magnesia y dos cuartillos de agua, que se usan en lavativa. Se repite este evacuante dos ó tres veces, y si no ha producido ningun efecto, se le reemplaza por un cocimiento de tabaco preparado con una onza de tabaco por dos cuartillos de agua. Despues del vómito, ocasionado casi siempre por las lavativas de tabaco, se dan algunas cucharadas de la pocion siguiente: agua de flores de naranjo cuatro onzas, éter ó licor de Hoffmann dos dracmas y jarabe simple dos onzas. Si hacen progresos los accidentes, se administrará agua azucarada, una disolucion de goma ó una maceracion de simiente de lino ó raiz de malvabisco; se aplicarán fomentos emolientes sobre los puntos doloridos; se meterá al enfermo en un baño; se le pondrán algunas sanguijuelas; y por último, se procederá segun la naturaleza y la violencia de los síntomas.

Si se reclaman muy tarde los socorros, la fiebre es muy intensa, el vientre está inflado y muy dolorido, &c., no se usarán los purgantes, se sangrará al enfermo y se aplicarán sanguijuelas, fomentos emolientes sobre los

puntos doloridos, &c. V. los remedios contra los envenenamientos por los hongos, pág. 144 y 145, tomo III.

2. NUEZ VÓMICA, HABA DE SAN IGNACIO, ESTRICNINA, VENENO AMERICANO, COCA DE LEVANTE, UPAS TIEUFÉ, UPAS ANTIAR, ANGUSTURA FALSA, BRUCINA, ALCANFOR, CURARA, WORORA, TICUNOS Y TANGUIN.

Tratamiento. Provocar el vómito por los medios ya indicados; prevenir la asfixia insuflando aire en los pulmones; dar algunas cucharadas de una pocion preparada con dos onzas de agua, dos dracmas de éter, dos dracmas de esencia de trementina y media onza de jarabe simple.

Si se ha aplicado el veneno sobre una herida, ó se le ha introducido por medio de una flecha ó de un instrumento picante, &c., se sacarán los cuerpos extraños, se cauterizarán las heridas y se obrará del modo dicho anteriormente; excepto que no se producirán vómitos.

3. TABACO, BELLADONA, CICUTA (mayor y menor), ELÉBOROS, ESTRAMONIO, LAUREL ROSA, ZIZAÑA, CÓLCHICO, DIGITAL, RUDA, ACÓNITO, CEBOLLA ALBARRANA, VERATRINA, SABADILLINA, LAUREL REAL Y ACEITE DE ALMENDRAS AMARGAS.

Tratamiento. Vomitivos, purgantes y sangrías para combatir el estado comatoso; despues del vómito, bebidas acídulas, y por último los antillogísticos.

4. CENTENO CORNEZUELO.

Si los accidentes son ligeros, se prescribirán agua y vinagre ó agua en la cual se haya exprimido el zumo de un limon; si la gangrena es inminente, se coloca al enfermo en una habitacion seca y caliente y sobre una cama muy caliente, cuyas cubiertas se renuevan frecuentemente, &c.

5. CIANURO DE ORO.

Tratamiento. Se provocará el vómito por medio de bebidas mucilaginosas abundantes; se calmarán los movimientos convulsivos por las fricciones alcohólicas, amoniacaes ó etéreas sobre las sienes, ó haciendo respirar estos mismos tópicos: se precaverá el desarrollo de los accidentes inflamatorios por las emisiones sanguíneas locales ó generales.

CUARTA CLASE.

VENENOS SÉPTICOS Ó PÚTRIDOS.

1. MORDEDURAS DE VÍBORAS Y SERPIENTES.

Tratamiento externo. Practicar inmediatamente una ligadura no muy apretada encima de la herida; suprimirla cuando ha dado lugar á accidentes; dejar desangrar la herida; comprimir la para favorecer la salida de la sangre y cubrirla con muchas ventosas; lavar la herida, si es posible. Si son mas graves los ac-

cidentes y la hinchazon y los dolores son mas considerables, se procederá á la cauterizacion por medio del hierro hecho ascua, del nitrato de plata fundido, de la potasa, del deuto-cloruro de antimonio, de la manteca antimonial de Gondret, de la moxa, &c.

Tratamiento interno. Calmantes, sudoríficos y algunos estimulantes difusibles; pociones con la tintura de quina, algunas gotas de amoniaco líquido, zumo de euforbio, tintura alcohólica de hiperico vulneraria de la F. E., agua de Luce, &c.

2. MORDEDURA DE ESCORPION.

Tratamiento. Bebidas y pociones calmantes ó diaforéticas; se aplicarán sobre la herida cataplasmas emolientes rociadas con algunas gotas de amoniaco líquido.

3. PICADURAS HECHAS POR LAS ABEJAS, AVISPAS, TARÁNTULAS, ZÁNGANOS, TÁBANOS, ARAÑAS DE LAS CUEVAS, AVEJONES, MOSCAS Y MOSQUITOS DE TROMPETILLA.

Tratamiento. Si son ligeros el dolor, la hinchazon y la fiebre se frotarán las partes picadas con una mezcla hecha con dos partes de aceite de almendras dulces y una de amoniaco líquido, y se prescribirá una bebida diaforética. Pero si los síntomas son mas graves, la temperatura muy elevada y el insecto ha chupado el jugo de plantas venenosas, cadáveres corrompidos ó animales que han muerto de enfermedades

pestilenciales, se aplicarán uno de los caústicos propuestos para las mordeduras de víboras, después de haber tenido cuidado de registrar la herida y quitar por medio de unas pinzas el aguijón que podría estar clavado. En algunos casos menos graves nos limitaremos á lavar la herida con agua fría ó agua salada, ó con un linimento hecho con partes iguales de aceite y amoniaco. Si el enfermo ha sido atacado de un gran número de mosquitos de trompetilla, se le hará acostar y se le dará una bebida diaforética con algunas gotas de amoniaco líquido ó de agua de Luce.

4. ENVENENAMIENTO POR CIERTOS ANIMALES (*Dorada, congrio, clupea escamosa y almejas*).

Tratamiento. Eméticos, purgantes, éter sobre azúcar, pocion antiespasmódica con éter ó con licor de Hoffmann, vino de opio compuesto, &c., bebidas acídulas, combatir los dolores de estómago con algunas sanguijuelas, &c.


5. MORDEDURAS DE ANIMALES RABIOSOS.

Tratamiento. Se empezará por desnudar al enfermo, se lavarán los vestidos, si se han manchado por la baba; si la herida es reciente y da todavía sangre, se la comprimirá en todos sentidos para desangrarla bien, se la lavará después con agua comun, agua de jabon ó agua de sal; si la mordedura es sinuosa y profunda, se la agrandará con el bisturi, se hará salir sangre por medio de la presión ó de una ventosa.

sa, y despues se cauterizará la herida muy profundamente, lo mismo que todas las desolladuras que podrian existir, y en todos los casos se tendrá cuidado de respetar los vasos gruesos; siete ú ocho horas despues de haber efectuado la cauterizacion, se cubrirá la escara con un ancho vejigatorio, que se curará despues con un cerato ó con cualquier otro cuerpo graso muy fresco.

Si la herida está en la cabeza, se afeita el cabello para cauterizarla bien. Si la cauterizacion es seguida de hinchazon ó inflamacion, se aplican fomentos emolientes y resolutivos. Si han sido mordidos los párpados, los labios ó las mejillas, &c., se los cauterizará del mismo modo, teniendo la precaucion de conservar el globo del ojo; si este último ha sido tocado por la baba, se pasa ligeramente por encima de él un pincel empapado en un cáustico, y se lava despues el ojo con un líquido mucilaginoso, si fuese necesario. Si la mordedura es antigua, está ya cicatrizada y estamos seguros de que está hecha por un animal rabioso, se la abre, se la cauteriza y se la hace supurar. Si se perciben las pústulas sublinguales indicadas por Marochetti, se las abrirá y cauterizará. En cuanto al cocimiento de retama, á los calomelanos, al opio, á las fricciones mercuriales, al alcanfor, á los baños frios por sorpresa, á la sangría, al cloro, &c. alabados para curar la rabia, es nece-

sario preferir como específico la cauterización y no emplearlos sino como medios accesorios. Véase el Tratamiento antihidrofóbico por el doctor Gottlieb de Schalleru, página 245, tomo III.



PARTE SEPTIMA.

SOCORROS QUE DEBEN DARSE Á LOS ASFIXIADOS!

En todos los casos de asfixia es necesario apresurarse á socorrer lo mas pronto posible al enfermo y continuar prestándole socorros, aun cuando se crea que se van á obtener pocos resultados.

A las personas asfixiadas por el *vapor del carbon*, por el de los *hornos de cal*, por las *cubas de mosto*, de *vinos* y otros *líquidos* en fermentacion, por los *pantanos*, por las *minas de carbon*, por *falta de aire respirable*, y por último, por el *gas óxido de carbono* y por el *ácido carbónico* (1), se las sustraerá primero de la causa que ha producido la asfixia; despues habiendo seguridad de que la muerte no es real, se expondrá al sugeto al aire libre, se le desnudará ó á lo menos se hará de modo que

(1) Las asfixias por el gas ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido hidrotórico, ácido carbónico, óxido de carbono, hidrógeno carbonado, hidrógeno sulfurado é hidrógeno arseniado son verdaderos envenenamientos.

nninguna parte del cuerpo , sobre todo el pecho, esté comprimida por los vestidos. Se colocará el cuerpo sobre una cama ó sobre cualquier otro plano inclinado , cubierto de un acolchado, de una manta ó de un haz de paja ó de heno; se tendrá cuidado de que la cabeza y el pecho esten mas elevados que el resto del cuerpo. Se alejarán todas las personas inútiles. Se rociarán la cara y el pecho con agua y vinagre fria ; se darán fricciones en el cuerpo , sobre todo en el epigastrio y en el bajo vientre , con pedazos de franela empapados en líquidos alcohólicos y aromáticos , tales como el aguardiente alcanforado, el agua de colonia, el agua carmelitana , &c. A los cuatro ó cinco minutos se enjugarán las partes mojadas con toallas calientes, y se darán nuevas fricciones. Se irritarán las plantas de los pies , las palmas de las manos y todo el trayecto de la columna vertebral con un cepillo fuerte.

Se hará respirar con precaucion el gas ácido sulfuroso , dirigiendo á la nariz los vapores de una pajuela ardiendo , y se levantará un poco la cabeza del enfermo: pueden tambien emplearse el amoniaco y el vapor de vinagre ó de alcohol. Se irritará el interior de las narices con las barbas de una pluma ó con cualquier otro cuerpo ligero ; se procurará hacer tragar por medio de una sonda de goma elástica introducida en el esófago algunas cucharadas de

agua y vinagre (una parte de vinagre y tres de agua), ó se administrará una lavativa de agua fria mezclada con una tercera parte de vinagre; despues otra lavativa de agua fria que contenga dos ó tres onzas de sal comun y una onza de sal de la higuera.

Se insuflará aire en los pulmones, ya con la boca, ya con el fuelle de Gorcy, la cánula de Pia, el tubo laringeo de Chaussier, la sonda laringea, &c.; generalmente se prefiere este último medio, que proporciona un aire mas puro y es menos repugnante. La insuflacion del aire debe hacerse con mucha suavidad, porque esta operacion tan útil por sí misma, practicada sin inteligencia y con fuerza, llegaria á ser funesta.

Insuflacion del aire en los pulmones. Deprimida la base de la lengua con el dedo índice de la mano izquierda, se coloca en la laringe la extremidad menor del tubo laringeo de Chaussier, teniendo la precaucion de colocar bien sobre la abertura de la laringe el pedazo de piel de búfalo ó de agárico; coloca el operador en su boca la otra extremidad del tubo, y aspira las mucosidades que podrian estar en los bronquios. Es indispensable que el tubo tenga en la mitad de su longitud una parte mas ensanchada, y un diafragma con muchos agujeros; el primero sirve de depósito á las mucosidades aspiradas del estómago, y el

segundo impide que estas lleguen á la boca del operador. Llenadas estas indicaciones, se adapta á la extremidad bucal del tubo una vejiga llena de aire ó un fuelle pequeño; se empuja el aire poco á poco y por tiempos, de modo que se imite á la respiracion: al mismo tiempo se dan fricciones sobre el vientre y sobre el pecho con un pedazo de paño ó de franela.

Si no tenemos á nuestra disposicion el tubo laringeo de que acabamos de hablar, y no se puede por medio de palancas de boj ó de marfil llegar á separar las mandíbulas del enfermo, se insufla aire en los pulmones por medio de una sonda de goma elástica que se introduce por la nariz en la laringe; por último, si la epiglotis está de tal modo aplicada sobre la laringe que es imposible levantarla tirando de la lengua hácia adelante y haciéndola bajar en su base, se hace una incision en la traquiarteria.

Si todos estos medios no han sido suficientes y el sugeto está sumergido en el sopor, sus ojos están salientes, sus labios hinchados y su cara roja, se practicará una sangría del pie ó de la yugular.

Si el sugeto ha vuelto en sí, se le coloca en una cama caliente y en una habitacion ancha y ventilada, cuyas ventanas estarán abiertas; solo se deja al rededor de él las personas necesarias. Se administran algunas cucharadas de vino

de Málaga, de Alicante, de Madera, &c. ó de vino caliente azucarado, de agua destilada aromática ó de una pocion etérea. Si se manifiestan deseos de vomitar, se darán algunas tazas de agua emetizada; pero es mejor recurrir á una lavativa purgante é irritante preparada con sal comun y sal de la higuera.

Todos estos socorros, cuyo conjunto tiende á restablecer la respiracion, la circulacion y el calor, y á despertar la accion nerviosa, la sensibilidad y la irritabilidad del estómago y de los intestinos, deben administrarse con prontitud é inteligencia, y se los debe continuar durante muchas horas. Se ha visto no volver á la vida á algunos asfixiados hasta despues de cinco ó seis horas de socorros continuos.

Entre los medios á propósito para restablecer la irritabilidad y la sensibilidad de los intestinos, tales como el humo de tabaco, los vapores de plantas aromáticas, el gas ácido carbónico, el aire caliente, las lavativas purgantes, &c., dirigidos al recto, se desecha el tabaco, aconsejado aun por algunos médicos, á causa de sus efectos narcótico-acres. Sin embargo, puede conservarse esta sustancia en las cajas de socorro y emplearla solamente en aquellos casos en que los demás medios no han producido ningun resultado.

ASFIXIA POR LOS GASES DE LAS LETRINAS,

DE LOS POZOS DE AGUAS INMUNDAS Y DE LOS ALBAÑALES.

Para socorrer á los asfixiados por estas causas se recurrirá á la exposicion al aire libre, á las aspersiones con agua y vinagre, á las fricciones secas, á la inspiracion del cloro, á la compresa clorosa con vinagre, al emético, á la ipecacuana ó á una tacita de aceite para hacer expeler del estómago las materias que el enfermo haya podido tragar; á una ó dos sangrías del brazo (proporcionadas á la fuerza del enfermo) si los medios anteriores son insuficientes y los latidos del corazon son desordenados; al baño frio y á los antiespasmódicos para calmar los accidentes nerviosos; y por último, á las fricciones en todo el cuerpo, á los sinapismos en las extremidades, &c. si el enfermo está sin conocimiento y sin movimiento.

ASFIXIA POR SUMERSION.

Cuando socorramos á un ahogado, debemos apresurarnos á proporcionarle todos los socorros del arte, y á continuarlos durante mucho tiempo aunque sean poco numerosos los casos en que se hayan obtenido buenos resultados; porque se ha visto á algunos ahogados volver á la vida despues de haber estado largo tiempo debajo del agua, y siete ú ocho horas despues de haberlos sacado.

Si no hay ningun obstáculo, se empezará

el tratamiento á la orilla del rio; en el caso contrario, se colocará el cuerpo con precaucion y sin sacudidas sobre una camilla, unas angarillas ó las manos juntas de dos ó cuatro personas, y se le transportará, colocado sobre el lado derecho y la cabeza un poco elevada, al sitio mas inmediato y mas conveniente. Allí se desnudará al ahogado, si está vestido, cortando los vestidos con tijeras para no perder tiempo; se le pondrá una camisa y un gorro de lana; se le echará, siempre que sea posible, sobre el lado derecho y con la cabeza un poco alta, sobre una cama mas bien algo elevada (para mayor comodidad de los asistentes) que baja, cubierta de un acolchado y medianamente caliente; se desembaraza la boca, la nariz, los ojos y los oidos del moco y de los demás cuerpos extraños, teniendo la cabeza un poco inclinada y las mandíbulas algo separadas.

Se reconoce el estado de la superficie del cuerpo para observar si ha recibido alguna herida mortal, lo que haria infructuosas todas las tentativas que se hiciesen para que recobrase la vida.

Siendo la muerte aparente, se aspiran los líquidos contenidos en la traquea y en los bronquios por medio de una geringuilla provista de una cánula de goma elástica, que se introduce en una de las narices, mientras que se cierra la otra y la abertura de la boca. Se hacen

respirar olores fuertes , se calienta lenta y progresivamente al enfermo , recorriendo las diversas partes de su cuerpo con vejigas llenas de agua caliente , con una plancha calentada , con un calentador tambien calentado (las planchas y los calentadores estarán cubiertos de rodillas) ó con saquitos llenos de ceniza caliente ; se colocará un ladrillo caliente en los pies , en las ingles y en los sobacos ; se darán primero fricciones secas y despues fricciones con líquidos alcohólicos , alcanforados ó alcalinos ; se harán compresiones ligeras y alternativas sobre el pecho y sobre el bajo vientre , á fin de simular los movimientos del pecho durante la respiracion natural. Se titilarán las fosas nasales y la campanilla con una pluma larga , seca ó empapada en alcali volátil debilitado , y algunas veces se hará penetrar esta última en la faringe para extender la irritacion en toda la extension de este conducto y hasta el estómago.

Se insufla aire en los pulmones ; se administra una lavativa purgante ; y si no mejora el estado del ahogado , se aplican algunas moxas en el hueco del estómago , en los muslos y en los brazos.

Si el sugeto ha vuelto en sí y se ha restablecido la deglucion , se administrará cada cinco minutos una cucharada de un líquido difusible cualquiera. En el caso contrario , es decir , si el ahogado lejos de volver en sí queda sin cono-

cimiento, si tiene la cara roja, violada ó negra, si los ojos estan saltones, en una palabra, si existen todos los signos de una congestion cerebral, una contusion ó una fractura en la cabeza, y los miembros estan flexibles y calientes, se practicará una sangría del brazo ó de la yugular; no debe hacerse esta sangría si el cuerpo y las extremidades estan frios.

Si las bebidas que se ha podido hacer tomar al enfermo le producen náuseas, si la lengua está cargada, la boca pastosa y el estómago lleno de alimentos, se facilita el vómito por medio de dos ó tres granos de emético disueltos en un vaso de agua caliente. Si por el contrario los medicamentos producen deposiciones de vientre, se dan algunas cucharadas de vino caliente. Por último, solo se abandona al enfermo cuando ya no hay esperanza de volverle á la vida.

El galbanismo, la electricidad, la electropuntura, la urticacion, la flagelacion y la us-tion han sido empleados con buen éxito en los ahogados.

ASFIXIA POR ESTRANGULACION.

Nos conduciremos con muy poca diferencia como acabamos de decir para los ahogados; solamente es inútil calentar el cuerpo, á no ser que esté colgado hace mucho tiempo y enteramente frio; se cortará el lazo que ha servido para ahorcarle, se cortará el nudo y se hará

una sangría del pie ó de la yugular á causa de la ingurgitacion de los vasos del cerebro determinada por la presion del cuello.

ASFIXIA POR EL FRIO.

Despues de haber trasportado al enfermo rodeado de una manta y con la cabeza descubierta del sitio en que se le ha encontrado al punto donde se le pueden suministrar los socorros, se procurará calentarle, pero lentamente y por grados; para esto se le desnudará, se le meterá entre nieve ó en agua muy fria, cuya temperatura se eleva poco á poco, primero por medio de agua fria, despues menos fria y por último tibia.

Colocado de este modo el enfermo en un baño, se le dan fricciones desde el vientre hasta las extremidades, se le hacen aspersiones de agua á la cara, se estimulan los labios é interior de las narices con un cuerpo ligero, se le insufla aire en los pulmones y se le hace respirar olores fuertes.

Luego que el cuerpo empieza á calentarse, se coloca al enfermo en una cama bien seca; se le administra una lavativa irritante; se le dan bebidas acídulas, inmediatamente que pueda deglutir, y alimentos, luego que el enfermo esté completamente restablecido.

Cuando la congelacion es parcial, es decir, cuando solo los miembros se han congelado ó amenazan congelarse, se recurre al mismo trata-

miento , pero local ; así no se le sumerge en el baño , solo se dan fricciones en las partes enfermas y se le administran los sudoríficos interiormente.

ASFIXIA POR EL CALOR.

Se coloca al sugeto en un sitio fresco , se le desnuda y se quitan todos los obstáculos que pueden dificultar la circulacion de la sangre ; se le dan limonadas vegetales y se le administrará una lavativa de agua salada ; se aplicarán algunas sanguijuelas en las regiones temporales y se hará una sangría del pie ó de la yugular , si la respiracion está como extinguida , &c. Véanse las *asfixias* por el carbon. Estos son los medios con que se debe esperar salvar al asfixiado por el calor.

ASFIXIA DE LOS RECIEN NACIDOS.

Si el recién nacido no ha gritado , si su cara está pálida y sus miembros flácidos y si la respiracion es nula , nos apresuraremos á separarle de la madre. Por consiguiente se corta el cordon y se le ata. Por el contrario, nos guardaremos de cortar y de estirar el cordon umbilical si no hay hemorragia , si la placenta no ha empezado aun á desprenderse , y sobre todo si el cordon presenta todavía algunas pulsaciones.

Cualquiera que sea el estado del recién nacido , y si no son evidentes los signos de la putrefaccion , se colocará el cuerpo de lado , la

cabeza un poco elevada y la cara descubierta; se cubrirán las demás partes con un cobertor de lana; nos aseguraremos de la libertad de la boca y narices, y se quitará todo lo que se oponga á la entrada del aire en los pulmones; se insuflará aire en estos últimos con un fuelle pequeño destinado á esta operacion; se practicarán fricciones secas en el espinazo y en las plantas de los pies; se frotarán las demás partes del cuerpo con lienzos mojados en vino ó en líquidos aromáticos; se harán ligeras presiones sobre el cordon umbilical, el vientre y el pecho y se administrará la cuarta parte de una lavativa ligeramente irritante, preparada con vinagre y algunos granos de sal.

Si todos estos medios son insuficientes, se sumergirá al enfermo hasta los sobacos en un baño de agua tibia, al cual se añadirá vino á la temperatura de 24 ó 28°.

MUERTE APARENTE. SUS SIGNOS GENERALES.

Se sabe por experiencia que la putrefaccion ó un principio de putrefaccion es un signo cierto de la muerte; pero como no siempre se puede aguardar á estos fenómenos de destruccion, es importante conocer los diversos signos que por su reunion pueden en ciertos casos equivaler casi á la certidumbre. Estos signos son: la ausencia de la circulacion y de la respiracion, la rigidez del cuerpo, el aspecto cadavérico de la cara tan bien descrito por Hipó-

crates (1), la blancura, el hundimiento, la flaccidez y el oscurecimiento de los ojos, el frio glacial de todas las partes del cuerpo y la insensibilidad á las incisiones, á las quemaduras, á las vexcaciones y á las cauterizaciones.

Pero aunque no se perciba la circulacion, despues de la exploracion de las arterias, en las diversas partes del cuerpo, como en la parte interna del brazo, en los sobacos, en la parte interior del abdómen, al nivel de la arteria crural, á los lados del cuello, &c., no se debe creer que la muerte sea real, porque está perfectamente probado que se puede vivir muchas horas sin que sea posible sentir el mas ligero movimiento en las diversas regiones que acabamos de citar. Lo mismo diremos de la respiracion, que puede restablecerse al cabo de cierto tiempo, sin que se haya podido comprobarla por la agitacion de la llama de una vela ó de un cuerpo ligero aproximado á las ventanas de la nariz, ó por el empañamiento de la luna de un espejo

e. f. s.

región

(1) *Cara hipocrática.* Frente arrugada y árida, ojos hundidos, nariz afilada, rodeada de un círculo violado ó negruzco, sienas caidas, huecas, orejas frias y arrugadas y sus pulpejos vueltos ligeramente hácia abajo, labios péndulos, mejillas salientes, barba arrugada, color de la piel apfomado ó violado, pelos de las narices ó de las pestañas cubiertos de una especie de polvo de color blanco amarillento.

colocado delante de la boca y de las fosas nasales.

Aun cuando la *rigidez del cuerpo* sea uno de los signos mas ciertos de la muerte, es menester no olvidar que este signo puede ser producido por la congelacion, por los tétanos, por las convulsiones, por ciertos síncope y por las asfixias. Pero si recordamos que en las personas que se han helado y que pueden ser vueltas á la vida la dureza de los órganos es igual á la de los músculos (en la rigidez cadavérica solo los músculos presentan resistencia); que en la rigidez convulsiva no se puede hacer cambiar á los miembros de posicion sino con la mayor dificultad, y que no pueden quedar fijos cuando se los ha llegado á apartar de su lugar (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); que en el síncope la rigidez es instantánea, y se percibe aun el calor en el vientre y pecho (sucede lo contrario en la rigidez cadavérica); y por último, que en los asfixiados la rigidez es un signo cierto de la muerte (en estos últimos la muerte es pronta y no se manifiesta la rigidez sino despues de diez ó doce horas, tiempo en el cual un asfixiado no puede volver á la vida), no será difícil dar el verdadero valor á la rigidez cadavérica.

Considerada aisladamente la cara hipocrática no tiene ningun valor, porque puede preceder á la muerte treinta y seis y aun cuarenta

y ocho horas; se sabe tambien que este signo falta comunmente á las personas que han perecido de muerte repentina.

El hundimiento de los ojos en sus órbitas, su blandura, su flacidez y su oscurecimiento son signos que no se observan siempre despues de la muerte. La insensibilidad á los escitantes, á las moxas, &c. es un comprobante de poco valor, porque hay ciertas enfermedades en que los sujetos estan incapaces de sufrir ningun dolor.

Por consiguiente solo la putrefaccion es un signo cierto de la muerte, y todos los que hemos examinado no tienen ningun valor cuando estan aislados. Ahora ¿quién decidirá si hay ó no principio de putrefaccion? solo el médico que ha aprendido á distinguir las manchas lívidas, los equímosis y el olor infecto de un miembro ó de un órgano gangrenado, de los caracteres ciertos de la putrefaccion general.

PARTE OCTAVA.

CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS.

ASTRINGENTES (*Estípticos, deterrentes*).

Acacia bastarda.	Ceanota americana.
— egipcia ó verdadera.	Cinorrodon.
Acetato neutro de plomo.	Ciprés.
Acido sulfúrico.	Corteza de granada.
Acido sulfuroso líquido.	Encina.
Actea de los Alpes.	Flores de granado.
Agrimonia.	Fresa.
Alamo temblon.	Goma kino.
Alcornoque.	Llanten.
Aligustre.	Madreselva.
Alquimila.	Membrillo.
Ancusa.	Minio.
Bellotas.	Nuez.
Bistorta.	— de agalla.
Borato de sosa.	Oxido de zinc.
Bol arménico.	Palo de Campeche.
Cal.	Protóxido de plomo.
Calamina.	Ratania.
Carbonato de plomo.	Rosas rojas.
Cariofilea.	Rubia.
Catecú.	Sangre drago.
	Sub-acetato de plomo líquido.

- Sulfato ácido de alúmina y potasa.**
 — de hierro.
 — de zinc.
Tanino.
Tormentila.
Zumaque.
Agua vegeto-mineral de la F. E., I, 330.
Alcohol sulfúrico, I, 333.
Apocema astringente, I, 343.
Bebida astringente, I, 374.
Bolos astringentes, I, 386, 387.
Cerato de Goulard, I, 426.
 — de plomo de los H. M., I, 427.
Cocimiento astringente de los H. de M., I, 446.
Electuario astringente de Fuller de la F. E., I, 518.
Emplasto del Abate Doyen, II, 21.
 — de Nuremberg, II, 42.
Especies astringentes, II, 79.
Gargarismos astringentes, II, 132 y 133.
Gargarismo astringente de los H. M., II, 133.
Granos de catecú, II, 151.
Infusion de rosas rojas, II, 171.
Jarabe de catecú, II, 223.
Lavatorio astringente de los H. de M., II, 287.
Polvo astringente, III, 15.
 — de kino compuesto, III, 54.
 — restrictivos de ciprés de la F. E., III, 66.
Pomada de la Condesa, III, 96.
Tisanas astringentes, III, 224 y 225.
Trociscos de Ramich, de la F. E., III, 274.
Ungüento de la Condesa, de la F. E., III, 282.
 — de minio de los H. M., III, 290.
 — de plomo de la F. E., III, 297.
 — magistral de la F. E., III, 289.
 — nutrido de la F. E., III, 294.
Vino estíptico de la F. E., III, 324.

TÓNICOS (*amargos, depurativos*).

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Abedul. | Enula campana. |
| Acebo. | Floritzino. |
| Acetato de quinina. | Fumaria. |
| Aciano. | Genciana. |
| Acido láctico. | Gencianino. |
| — piroleñoso. | Hidroclorato de quinina. |
| Adhatoda. | Hidro-ferro-cianato de quinina. |
| Achicoria amarga. | Hierro. |
| Ajenjo. | Ilicina. |
| — menor. | Jabonera. |
| Alfónsigo comun. | Lactato de protóxido de hierro. |
| Angustura verdadera. | Liquen islándico. |
| Bardana. | Lupulina. |
| Bilis de buey. | Lúpulo. |
| Carbonato de hierro. | Monesia. |
| Cardo estrellado. | Oxidos de hierro. |
| — santo. | Paciencia. |
| Cascarilla. | Poligala amarga. |
| Castaño de Indias. | Quina amarilla. |
| Centaurea menor. | — anaranjada. |
| Cetrarino. | — blanca. |
| Cianuro de hierro. | — gris. |
| Cinconina. | — roja. |
| Cinisino. | Quinina. |
| Citrato de hierro. | Quasia amarga. |
| — de quinina. | Salicina. |
| Cloruros de hierro. | Sauce blanco. |
| Cloruro de hierro amoniacal. | Simaruba. |
| Cochinilla. | Sulfato de cinconina. |
| Colombo. | — de quinina. |
| Diente de Leon. | |

- Tartrato de potasa y hierro.
- Trebol de agua.
- Tusilago.
- Agua gaseosa marcial de Trousean, I, 318.
- bromurada, I, 308.
- mineral ferruginosa de Marc, I, 324.
- Alcoholado de sulfato de quinina, I, 336.
- de cinchonina, I, 334.
- Apocema tónico, I, 345.
- Bebida ferruginosa, I, 376.
- Bolas de Marte, I, 382.
- Café de bellotas, I, 400.
- Cocimientos amargos, I, 440.
- Electuario estomacal de Alibert, I, 524.
- Especies amargas, II, 78.
- Extracto de líquen, II, 96.
- Granos de vida de Mesué, II, 152.
- Jarabe calibeadado de Willis, II, 220.
- de ajenos, II, 206.
- de artemisa compuesto, II, 216.
- de cáscaras de naranjas amargas, II, 223.
- de cinchonina de Magendie, II, 226.
- Jarabe de citrato ácido de quinina de Magendie, II, 228.
- de citrato de potasa ferruginoso, II, 229.
- de gencianino de Magendie, II, 245.
- de rosas rojas de la F. E., II, 263.
- depurativo amargo de Bouillon-Lagrange, II, 233.
- Julepe amargo de Gall, II, 273.
- Infusion compuesta de genciana, II, 168.
- de ruibarbo de los H. M., II, 172.
- fria de quina, II, 168.
- Mistura tónica de Dubois, II, 406.
- triacal, II, 407.
- Osmazomo de Thénard, II, 416.
- Pan ferruginoso de Louvel, II, 421.
- Pastillas de citrato de hierro, II, 437.
- de chocolate y hierro reducido por el hidrógeno de Miquelard y Quevenne, II, 442.
- de sulfato de quinina, II, 450.
- Píldoras ante cibum, II, 461.

- Píldoras de cinchonina, hierro, III, 184.
 — II, 498.
 — de gencianino, II, 524.
 — de quina alcanforadas, — de cañela compuesta, III, 197.
 II, 553.
 — de salicina, II, 555.
 — de sulfato de cinchonina, II, 557.
 — de sulfato de quinina, II, 557.
 Poción de cinchonina de Magendie, III, 207.
 Mariani, II, 588.
 — de quinina, II, 622.
 — de sulfato de quinina, II, 623.
 — tónica de los H. M., II, 625.
 — tónica de Recamier, II, 625.
 Polvo caquético de Hartmann, III, 19.
 — ferruginoso, III, 49.
 — para agua gaseoso-ferruginosa de Queneville, III, 49.
 Sacarolado de citrato de hierro de Beral, III, 156.
 Sal esencial de Lagaraye, III, 157.
 Tabletas de quina, III, 180.
 Tartrato de potasa y
- Tintura corroborante de With de la F. E., III, 199.
 — de genciana amoniacal, III, 206.
 — de genciana compuesta, III, 206.
 — de gencianino de Magendie, III, 207.
 — de ruibarbo inglés, III, 217.
 — elástica del Dr. Bañares, III, 200.
 Ungüento de la condesa de la F. E., III, 282.
 Vinagre de hierro, III, 311.
 Vino amargo aromático de Lazerme, III, 314.
 — de ajenjos, III, 313.
 — de sulfato de quinina de Magendie, III, 330.
 — febrífugo de quina, III, 325.
 — rosado, III, 328.
 — triacal, III, 330.
 Wakaka de los indios, III, 332.

ESCITANTES GENERALES (*estimul.*, *diffusib.*, &c.).

- | | |
|------------------------|------------------------|
| Abeto. | Arseniato de sosa. |
| Abrótano. | Arsenito de potasa. |
| — silvestre. | Artemisa. |
| Aceite de laurel. | Badiana. |
| Acetato de amoniaco. | Bálsamo del Canadá. |
| Acido arsenioso. | — de copaiba. |
| — azóico. | — de la Meca. |
| — benzóico. | — del Perú. |
| — carbónico. | — de Tolú. |
| — clorhídrico. | Becabunga. |
| — fosfórico. | Benjuí. |
| — hidro-cloro-nítrico. | Berros. |
| — pirotartárico. | Berro de Pará. |
| Adormidera. | Betónica. |
| Agatófilo aromático. | Brea. |
| Ajedrea. | Bromuro de potasio. |
| Alamo negro. | Café. |
| — balsamero. | Cálamo aromático. |
| Albahaca común. | Caléndula oficial. |
| — de hojas pequeñas. | Camedrios. |
| Alcaravea. | Camepiteos. |
| Aliaria. | Canela de Ceylan. |
| Almáciga. | — blanca. |
| Amomo zerumbet. | — del Malabar. |
| Anacardo. | Cantueso. |
| Anagálide. | Carbonato de amoniaco. |
| Angélica oficial. | Cardamomo menor. |
| Anís. | — mayor. |
| Aristolochia larga. | — mediano. |
| — redonda. | Cáscara de naranja. |
| Arseniato de amoniaco. | Cilantro. |
| — de hierro. | Clavo especia. |
| — de potasa. | Cloro. |

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Cloruro de cal. | Marrubio blanco. |
| Cloruro de cobre amoniacal. | Matricaria. |
| — de protóxido de potasio. | Mejorana. |
| — de sosa. | Mirra. |
| Coclearia. | Nuez moscada. |
| Comino. | Orégano. |
| Contrayerba. | Ortiga menor. |
| Corteza de Winter. | Pelitre. |
| Cubebas. | Perifollo. |
| Cúrcuma. | Pez blanca. |
| Delfina. | — de Borgoña. |
| Electricidad. | — negra. |
| Enebro. | Pimienta anual. |
| Eneldo. | — larga. |
| Escordio. | — negra. |
| Esencia de trementina. | — de Tabasco. |
| Espliego. | Piperino. |
| Estoraque líquido. | Polígala de Virginia. |
| — sólido. | Rábano rústico. |
| Gengibre. | Resina elemí. |
| Hidrociorato de cobre y de amoniaco. | Romero. |
| — de sosa. | Sal amoniaco. |
| Hipericon. | Salvia. |
| Hinojo. | Serpentaria virginiana. |
| Hisopo. | Sisimbrio. |
| Hollin. | Sulfato de cobre amoniacal. |
| Imperatoria. | Té. |
| Iucienso. | — de España. |
| Lentejas. | Tomillo. |
| Macis. | Toronjil. |
| Manzanilla hedionda. | Trementina. |
| — ordinaria. | Vainilla. |
| — romana. | Verónica. |
| | Yedra terrestre. |
| | Yerbabuena elegante. |

- Yerbabuena rizada. de Loebelitts de Loebenstein, II, 106.
- Yerbabuena de sabor de pimienta. Extracto de enebro compuesto, II, 95.
- verde. Infusion de cáalamo aromático con el cloro, II, 166.
- Zedoaria redonda. Inyeccion de creosota, II, 181.
- Aceite aromático, I, 294.
- de éter, I, 295.
- fosforado de Lescot, I, 297.
- Acido sulfúrico con el alcohol aromático, I, 301.
- Alcoholato vulnerario, I, 337.
- Alcoholato de melisa compuesto, I, 338.
- Bálsamo de Fioraventi, I, 357.
- Cala comun de los H. de M., III, 168.
- Emplasto emetizado, II, 34.
- tartarizado, II, 49.
- tartarizado alcanforado, II, 49.
- Especies aromáticas, II, 78.
- carminativas de la F. M., II, 80.
- Espíritu de rábano compuesto, II, 91.
- de sal dulce de la F. E., II, 91.
- Eter fosforado de Pelletier, II, 102.
- Eter sulfúrico fosforado de Loebelitts de Loebenstein, II, 106.
- Extracto de enebro compuesto, II, 95.
- Infusion de cáalamo aromático con el cloro, II, 166.
- Inyeccion de creosota, II, 181.
- Jabon de Starkey, II, 196.
- estibiado, II, 192.
- medicinal, II, 193.
- Jarabe de café, II, 220.
- de hisopo, II, 248.
- gomoso de copaiba de Puche, II, 246.
- Lavativa de copaiba de Ricord, II, 296.
- Linimento resolutivo, II, 343.
- Linimentos cantaridados, II, 332.
- Looc contraestimulante de Trousseau, II, 362.
- Mistura de Scudamore, II, 405.
- escitante de los H. de M., II, 395.
- Panes de anís, II, 420.
- Pastillas de yerbabuena de sabor de pimienta, II, 452.
- de yerbabuena de sabor de pimienta de la F. E., II, 451.

- Pediluvios hidroclóricos, F. E., III, 168.
 II, 452. Tabletas de bálsamo de
 Pez de Borgoña de A. Tolú, III, 173.
 Chereau, II, 454. Tintura alcohólica de
 Píldoras de quina alcan- cantáridas de la F. E.,
 foradas, II, 553. III, 187.
 Poción aromática, II, — aromática, III, 195.
 581. — de espliego compues-
 — contraestimulante, II, ta, III, 201.
 591. — de hollin, III, 208.
 — estimulante aromáti- Tisanacarminativa, III,
 ca, II, 604. 227.
 — fosforada con aceite de Ungüento basilicon de la
 Soubeiran, II, 606. F. E., III, 279.
 — fosforada con éter de — de Arceo de la F. E.,
 Soubeiran, II, 606. III, 277.
 Pomada de brea de Emery, Vino calibeadado, III,
 III, 90. 320.
 — irritante de los H. — de cantáridas, III,
 M., III, 118. 320.
 Supositorio de miel de la

DIURÉTICOS.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| Acetato de potasa. | Brusco. |
| — de potasa líquido. | Cainca. |
| — de sosa. | Caña. |
| Acido cáinico. | Carbonato de potasa. |
| Agave de América. | — de potasa y sosa. |
| Alcaparro. | — de sosa. |
| Aliso comun. | Cardo corredor. |
| Alquequenje. | Cebolla albarrana. |
| Androsemo. | Diosma afestonada. |
| Apio. | Doradilla. |
| Bicarbonato de potasa. | Esparraguera. |
| — de sosa. | Gatuña. |

- Gayuba.**
Nitrato de potasa.
Pareira brava.
Parietaria.
Perejil.
Urea.
Cataplasma diurética, I,
 416.
Cocimiento aperitivo de
la F. E., I, 446.
 — aperitivo de los H. de
 M., I, 446.
Diurético de Dehaen,
I, 508 y 509.
Esencia dulce de Hales,
II, 72.
Especies diuréticas, II,
80.
 — para tisana de Bal-
 dingieri, II, 82.
Jabon amigdalino, II,
192.
Jarabe de las cinco rai-
ces de la F. E., II,
227.
Julepe diurético, II, 277.
Lavativas diuréticas, II,
297.
Licor refrigerante de Cot-
tereau, II, 316.
Limonada gaseosa acídu-
la, II, 320.
Linimentos diuréticos, II,
336.
Misturas diuréticas, II,
394 y 395.
Ojimiél cólchico, II, 417.
Ojimiél escilítico de la
F. E., II, 418.
Pastillas de digital, II,
439.
Pildoras de cainca, II,
491.
 — hidragogas, II, 525.
Pocion diurética de los
H. M., II, 595.
 — diurética y calmante,
 II, 595.
Pociones diuréticas, II,
594.
Polvo diurético, III, 33.
 — nitro alcanforado de
 Swediaur, III, 58.
Suero nitrado, III, 164.
Tintura alcohólica de
cainca, III, 187.
 — de semillas de cólchi-
 co, III, 218.
 — hidrólica de cainca,
 III, 207.
Tisana aperitiva de los
H. M., III, 224.
 — comun, III, 227.
 — de cainca compuesta,
 III, 227.
 — diurética, III, 230.
 — emulsionada y nitra-
 da, III, 233.
Vino escilítico, III, 323.
 — escilítico de los H. de
 M., III, 324.
 — sudorífico del Doctor

Smihl, III, 329.

co, III, 333.

Zumo de yerbas diuréticas.

DIAFORÉTICOS Ó SUDORÍFICOS.

- Acido sulfhídrico. I, 369.
 Alcanforada. Baño de vapor aromático, I, 369.
 Astrágalo sin tallo. Bolos diaforéticos ingleses, I, 391.
 Azufre. — diaforéticos, I, 390.
 Boj. Elixir sudorífico de Willis, II, 16.
 Calaguala. Jarabe de claveles, II, 229.
 Cebolla albarrana. Julepe sudorífico, II, 284.
 Claveles rojos. Mistura diaforética, II, 393.
 Cólchico de otoño. — diaforética de Selle, II, 394.
 China. — sudorífica, II, 406.
 Dulcamara. Poción diaforética, II, 594.
 Escabiosa. Polvo diaforético, III, 32.
 Escorzonera. Polvos de Dower de la F. E., III, 35.
 Guayaco. — de Dower de los H. M., III, 35.
 Juncia larga. Tisana diaforética de Brera, III, 229.
 — redonda. — diaforética de Gimelle, III, 229.
 Lobelia sílfítica. — diaforética de los H. M., III, 229.
 Olmo piramidal. — sudorífica de los H. M.
 Sándalo blanco. — sudorífica de los H.
 — cetrino.
 — rojo.
 Sasafrás.
 Sulfuro de cal.
 — de potasa.
 — de sosa.
 Yerba mora.
 Zarzaparrilla.
 Alcoholado de extracto de zarzaparrilla, I, 335.
 Baño de vapor acuoso,

M., III, 237.	F. E., III, 318.
Tisanas sudoríficas, III, 237.	Vino emético claro de los H. de M., III, 318.
Vino antimoniado de la	

EMENACOGOS.

Azafran.	Sulfuro de carbono.
Centeno cornezuelo.	Píldoras calibeadas, II, 491.
Culantrillo.	Tisana emenagoga, III, 232.
Culantrillo del Canadá.	
Ruda.	V. Amenorrea.
Sabina.	

MEDICAMENTOS ESCITANTES QUE OBRAN SOBRE LAS GLÁNDULAS.

Acetato de mercurio.	Ioduro de azufre.
Bromo.	— de bário.
Bromuro de hierro.	— de hierro.
— de potasio.	— de hierro y quinina.
Cianuro de mercurio.	— de iodhidrato de quinina.
— de oro.	— de mercurio.
Cloruro de bário.	— de mercurio y morfina.
— de calcio.	— de plomo.
— de mercurio y morfina.	— de potasio.
— de oro.	— de zinc.
— de oro y sódio.	Mercurio.
Deuto-cloruro de mercurio.	— soluble de Hahnemann.
Esponja calcinada.	Nitrato ácido de mercurio.
Iodo.	
Iodoforma.	Oro.
Ioduro de amoniaco.	Oxido de oro.
— de arsénico.	— rojo de mercurio.

- Protocloruro de mercurio. oro opiadas, II, 496.
 Pastillas de cloruro de
 Protonitrato amoniaco-oro de Chrestien, II,
 mercurial. 438.
 — de mercurio. Pomada de hidriodato de
 Sub-deuto-sulfato de mer-amoniaco de Bielt, III,
 curio. 111.
 Sulfuro negro de mer- — de hidriodato de hier-
 curio. ro de Pierquin, III,
 — rojo de mercurio. 112.
 Pastillas de cianuro de — con el hidrociorato
 oro de Chrestien, II, de oro de Chrestien,
 437. III, 112.
 Pildoras de cianuro de *V. Sifilis, &c.*

MEDICAMENTOS ESCITANTES QUE OBRAN SOBRE
EL SISTEMA NERVIOSO.

- Alcohol. Alcoholado de nuez v6-
 Arnica. mica, I, 336.
 Brucina. Pildoras de brucina de
 Cianuro de oro. Magendie, II, 491.
 Estricnina. — de extracto alcoh6-
 F6sforo. lico de nuez v6mi-
 Haba de san Ignacio. ca de Fouquier, II,
 Ioduro de estricnina. 519.
 — de iodhidrato de es- — de estricnina de Ma-
 tricnina. gendie, II, 519.
 — de zinc y morfina. Pocion estimulante con
 Nuez v6mica. la estricnina de Ma-
 Vino. gendie, II, 602.
 Alcoholado de brucina, — estimulante de bruci-
 I, 334. na, II, 603.
 — de estricnina, I, Polvo de estricnina de
 336. Magendie, III, 45.

- Pomada de fósforo, III, de Ure, III, 117.
 110. Tintura de nuez vómica,
 — de ioduro de zinc III, 214.

ANTIESPASMÓDICOS.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Abelmosco. | Gálbano. |
| Aceite animal de Dippel. | Goma amoniaco. |
| — de cajeput. | Hojas de naranjo. |
| — de cuerno de ciervo. | Ioduro de zinc y mor- |
| — de hígado de bacalao. | fina. |
| — de hígado de raya. | Opoponaco. |
| Acido succínico. | Peonía. |
| Alcanfor. | Sagapeno. |
| Algalia. | Sucino. |
| Almizcle. | Tilo. |
| Ambar gris. | Valeriana. |
| Asa fétida. | Jarabe de corteza de ci- |
| Azafran. | dra, II, 232. |
| Bismuto. | — de corteza de cidra |
| Castóreo. | amarga de la F. E., |
| Eter acético. | II, 233. |
| — hidrocórico. | Licor anodino mineral |
| — nítrico. | de Hoffmann, II, |
| — sulfúrico. | 308. |
| Flores de naranjo. | V. Neuroses, &c. |

NARCÓTICOS (*anodinos, calmantes, &c.*).

- | | |
|---------------------|--------------------|
| Acetato de morfina. | Adormidera comun. |
| Acido cianhídrico. | Albaricoque. |
| Acónito. | Alelí amarillo. |
| Aconitina. | Almendras amargas. |
| Adelfa. | Atropina. |

- Belesio negro.
 — blanco.
 — amarillo.
 Belladona.
 Cianuro de potasio.
 — de zinc.
 Cicuta.
 Citrato de morfina.
 Codeina.
 Digital purpúrea.
 Estramonio.
 Hidroclorato de codeina.
 — de morfina y codeina.
 Ioduro de iodhidrato de morfina.
 Lactucario.
 Laurel real.
 Lechuga.
 Morfina.
 Nitrato de codeina.
 Opio.
 Pulsatila.
 Sulfato de morfina.
 Tabaco.
 Tridacio.
 Aceite rosado, I, 299.
 Agua destilada de almendras amargas, I, 311.
 — destilada de laurel real, I, 312.
 — hidrocianica vegetal, I, 319.
 Bálsamo tranquilo, I, 361.
 Cataplasma narcótica, I, 419.
 Ceratos opiados, I, 429.
 Cocimiento anodino de gordolobo de la F. E., I, 441.
 Embrocacion de aconitina, II, 19.
 Emulsion anodina de los H. de M., II, 53.
 — calmante, II, 55.
 Especifico anodino de Paracelso, II, 86.
 Extracto de opio por fermentacion de Deyeux, II, 98.
 — de opio privado de narcotina, II, 98.
 — de semillas de estramonio, II, 100.
 Fomento calmante, II, 112.
 — narcótico, II, 115.
 — opiado de Ricord, II, 115.
 Gotas calmantes de Magendie, II, 149.
 — negras de Lancastre, II, 150.
 Inyecciones anodinas, II, 176.
 — narcóticas, II, 185.
 Jarabe cianico de Magendie, II, 225.
 — de acetato de morfina de Magendie, II, 205.
 — de claveles compuesto de Cottereau, II, 229.

- Jarabe de codeina**, II, 230.
 — de lactucario, II, 251.
 — de meconio de la F. E., II, 253.
 — de tridacio, II, 268.
 — de diacodion, II, 236.
 — sedante, II, 265.
Julepes calmantes, II, 275.
 — de codeina de Magendie, II, 276.
 — laurinado, II, 281.
Láudano cidoniado de Vanhelmont, II, 284.
 — de Rousseau, II, 286.
 — líquido de Sydenham de la F. E., II, 285.
Lavatorio anodino de los H. de M., II, 287.
Licor acético de Dunghlison, II, 307.
Linimento anodino, II, 326.
 — de aconitina, II, 324.
 — narcóticos, II, 342.
 — sedante, II, 345.
Looc calmante, II, 362.
Mistura calmante, II, 387.
 — calmante de Houlton, II, 388.
Pastillas de tridacio, II, 451.
Píldoras de acetato de morfina, II, 455.
Píldoras de aconitina de Turnbull, II, 457.
 — de acónito opiadas de los H. M., II, 458.
 — de belladona, II, 488.
 — de cinoglosa de la F. E., II, 498.
 — de cinoglosa de los H. M., II, 499.
 — de clorhidrato de morfina, II, 499.
 — de cloruro de mercurio y morfina, II, 499.
 — de codeina, II, 500.
 — de codeina de Magendie, II, 501.
 — de sulfato de morfina, II, 557.
 — depurativas de Dubois, II, 507.
 — orientales, II, 546.
Pocion calmante, II, 585 y 586.
 — de acónito, II, 569.
 — de agua destilada de almendras amargas de Sundelin, II, 569.
 — de codeina, II, 589.
 — de tridacio, II, 626.
 — morfina de los H. M., II, 614.
 — opiada de los H. M., II, 616.
Polvo narcótico y tó-

- nico de Marc , III, 58.
 — tebaica de Bamberg, III, 218.
 Pomada antiespasmódica de los H. M., III, 90.
 Tópico calmante de Thompson, III, 243.
 Pomadas calmantes, III, 32.
 — calmante de Pougens, III, 243.
 Pomada de belladona, III, 89.
 Ungüento de calabaza, III, 281.
 Supositorio anodino, III, 166.
 — de populeon de la F. E., III, 297.
 — de tomate, III, 301.
 — calmante, III, 166.
 Tintura de opio amoniacal, III, 215.
 Vinagre de opio, III, 311.
 — paregórica de la F. 325.
 Vino de estramonio, III, 325.

EMÉTICOS (*vomitivos*).

- Acido antimónico.
 Jarabe de emetina de Magendie, II, 240.
 — antimonioso.
 Julepe emetizado de Rasi-
 Azufre dorado de anti-
 monio. sori, II, 278.
 Emetina.
 Limonada emetizada, II,
 — de color. 319.
 Ipecacuana blanca.
 Mezcla vomitiva, II,
 — estriada. 375.
 — oficial.
 Mistura vomitiva de Hu-
 Kermes mineral. ssfeldand, II, 408.
 Siempreviva menor.
 Pastillas de emetina vo-
 Sulfato de cadmio. mitivas de Magendie,
 Sulfuro de antimonio. II, 440.
 Tartrato antimoniado de — de ipecacuana con azú-
 potasa. car de la F. E., II, 444.
 Cataplasma vomitiva, I, 424.
 Poción emética de los H. M., II, 600.

- Pocion vomitiva de Magendie, II, 627.
 Polvo de Helvetius, III, 77.
 Polvos eméticos de los H. M., III, 39.
 — vomitivos, III, 77.
 Tintura de ipecacuana anisada de Alibert, III, 209.
 Tabletas de ipecacuana y chocolate de Daubenton, III, 178.
 Vomi-purgativo de Leroy, III, 331.

PURGANTES Y LAXANTES (*Catárticos, drásticos, &c.*).

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Acacia falsa. | Graciola. |
| Aceite de been. | Gutagamba. |
| — de croton tiglio. | Jalapa. |
| — de tártago. | Lirio de Florencia. |
| Acetato de potasa. | Mechoacan. |
| Acibar. | Rapóntico. |
| Agárico blanco. | Ruibarbo. |
| Alazor. | Sen. |
| Albérchigo. | Sulfato de magnesia. |
| Alcohol de los campos. | — de potasa. |
| — de los setos. | — de sosa. |
| Asaro. | — de veratrina. |
| Boj. | Tartrato de potasa neutro. |
| Brionia. | — de potasa y sosa. |
| Cólchico. | Vencetósigo. |
| Coloquintida. | Veratrina. |
| Elaterina. | LAXANTES. Aceite de almendras dulces. |
| Elaterio. | — de ricino. |
| Eléboro negro. | Algarroba. |
| Escamonea de Alepó. | Cañafístula. |
| — de Esmirna. | Cremor de tártaro. |
| Espino cerval. | — de tártaro soluble. |
| Enforbio. | |
| Fosfato de sosa. | |

- Magnesia calcinada.** Bizcochos purgantes, I, 380.
 — comun.
Maná. Bolo drástico de Roucher, I, 391.
Manito.
Melocoton. Café purgante, I, 401.
Mercurial. Cala de jabon, III, 169.
Miel. — purgante, III, 170.
Rosas de Alejandría. Caldo de vaca emetizado, I, 406.
Tamarindo. — de vaca tamarindado, I, 406.
Aceite de ricino artificial de Hufeland, I, 298. Caldos purgantes, I, 406.
Agua de Sedlitz artificial, I, 328. Cerveza purgante, I, 435.
 — de Trevez, I, 329. — purgante de Sydenham, I, 435.
 — fundente, I, 317.
Agua magnesia, I, 322. Cerveza purgante inglesa, I, 435.
 — purgante, I, 327.
Aguardiente aleman, I, 302. Ciruelas purgantes, I, 436.
 — purgante de Mezaize, I, 302.
Alcoholado de veratrina, I, 337. Cocimiento de ruibarbo, I, 461.
Apocema emeto-catártico, I, 343. — de ruibarbo de la F. E., I, 461.
 — laxante, I, 344. — laxante de maná de la F. E., II, 612.
 — purgante, I, 344.
Azúcar anaranjada purgante, I, 347. Conserva de ciruelas de la F. M., I, 488.
 — purgante, I, 349. — de ciruelas con purgante, I, 488.
Bebidas laxantes, I, 377. Chocolate purgante de Charles, II, 163.
Bebida purgante de Les cure, I, 378. Disolucion de sulfato de veratrina, I, 508.
 Electuario de cañafistula

- tamarindado de la F. E., I, 520.
- Electuario de sen compuesto de la F. E., I, 532.
- diacatolicon, I, 521.
- diafenicon, I, 522.
- Elíxir balsámico de Hoffmann, I, 52.
- de drogas amargas, II, 7.
- purgante, II, 14.
- sagrado, II, 15.
- Emulsion purgante, II, 60.
- purgante con aceite de tártago de Calderini, II, 61.
- Emulsion purgante con escamonea, II, 61.
- purgante con resina de jalapa, II, 61.
- purgante de Alibert, II, 60.
- purgante de Foy, II, 62.
- purgante de la F. E., II, 62.
- Especies pectorales de San German, II, 83.
- Extracto de acibar de Poerner, II, 93.
- de coloquintida compuesto, II, 94.
- de ruibarbo compuesto, II, 99.
- Granos de salud de Bally y Cadet, II, 152.
- de vida de Mesé, II, 152.
- Infusion catártica, II, 166.
- purgante, II, 170.
- Jabon de aceite de croton tiglio de Caven-
tous, II, 190.
- de jalapa, II, 193.
- Jalea laxante, II, 199.
- purgante, II, 203.
- Jarabe de achicorias compuesto, II, 207.
- de cártamo solutivo de la F. E., II, 222.
- de rosas pálidas de la F. E., II, 263.
- Jarabe de ruibarbo, II, 264.
- drástico, II, 239.
- Lavativa de Koempf, II, 300.
- estimulante, II, 299.
- laxante, II, 301.
- laxante de los II. M., II, 301.
- Lavativas purgantes, II, 303.
- Lavativa salina, II, 304.
- Leche purgante de Planché, II, 305.

- Limonada con el cre-** Píldoras alterantes de
mor de tártaro, II, Alibert, II, 458.
319. — azules, II, 486.
Linimento purgante, II, — benedictas de Fuller,
343. II, 490.
Looc jabonoso, II, 363. — católicas de la F. M.,
— laxante para los niños, II, 494.
II, 364. — cóchias de la F. E., II,
— purgante con tártaro, 501.
II, 364. — de Barclay, II, 488.
— purgante de aceite — de Belloste, II, 489.
de croton tiglio, II, — de jabon compuestas,
364. II, 533.
Medicina de Napoleon, — de los tres diablos de
de Corvisart, II, 368. Maetzius, II, 508.
Mermelada de Tronchin, — de Rufus, II, 554.
II, 370. — de tribus con ruibarbo,
— de Zanetti, II, 370. II, 563.
Miel mercurial compues- — de veratrina, II, 565.
ta, II, 376. — de veratrina de Ma-
gendie, II, 565.
Mistura jabonosa pur- — desobstruentes de los
gante de Plenck, II, H. M., II, 507.
398.
Mistura purgante, II, Píldoras drásticas, II,
403. 511.
— purgante de Andry, — drásticas de Rayer, II,
II, 403. 511.
Pastillas acídulas pur- — escocesas, II, 516.
gantes de Delvincourt, — escocesas de Anderson,
II, 435. II, 515.
— de maná, II, 445. — esplénicas, II, 516.
— de salud de Del- — hidragogas, II, 525.
vincourt, II, 449. — hidragogas de Bontius,
— de tártago, de Bally y II, 526.
Cadet, II, 450. — hidragogas de Janin
— purgantes, II, 449. de Lion, II, 526.

- Píldoras purgantes**, II, 618 y 619.
 550.
 — purgantes de Dehaen, II, 551.
 — purgantes de Franck, II, 552.
 — purgantes y fundentes de Saiffert, II, 552.
 — tartáreas de Bontius de la F. E., II, 558.
 — tartáreas de Schroederer, II, 558.
 — tónicas de Huln, II, 560.
Pocion angélica de la F. E., II, 571.
 — antimonial de los H. M., II, 578.
 — catártica de Mende, II, 587.
 — de aceite de croton tiglio de Cory, II, 567.
Pocion emeto-catártica de los H. M., II, 600.
 — laxante de Fernel, II, 612.
 — laxante de la F. E., II, 612.
 — laxante de Viena, II, 613.
Pociones purgantes, II, 619.
Pocion purgante con el aceite de ricino, II, 618 y 619.
Pocion purgante de Andry, II, 620.
 — purgante de Cruveilhier, II, 520.
 — purgante de Planche, II, 620.
 — purgante de tártago, II, 621.
Polvo atemperante y laxante de Bouillon-Lagrange, III, 70.
Polvos catárticos de los H. M., III, 20.
Polvo de Ailhaut, III, 1.
Polvos de calomelanos de Swediaur, III, 19.
Polvo de escamonea compuesto de Forminng, III, 39.
 — del conde de Warwick, III, 24.
 — de Sedlitz compuesto de Planche, III, 70.
Polvo de Sedlitz inglés, III, 69.
 — laxante, III, 56.
 — purgante compuesto, III, 64.
 — purgante de los H. de M., III, 65.
 — purgante y atemperante, III, 64.
Pomada purgante, III, 129.
Purgante de calomela-

- nos, III, 135.
 Purgante de Leroy, III, 135.
 Sal de Guindre, III, 157.
 Soda-powder, III, 159.
 Suero emetizado, III, 163.
 — gaseoso y purgante, III, 164.
 — purgante, III, 164.
 — tamarindado, III, 165.
 Supositorio de jabon, III, 169.
 — laxante, III, 170.
 — purgante, III, 170.
 Tabletas de aceite de croton tiglio, III, 170.
 — purgantes para los niños, III, 180.
 Tintura de aceite de croton tiglio, III, 186.
 — de Daffy, III, 199.
 Tintura de elaterina de Morrus, III, 200.
 — de ruibarbo compuesta, III, 216.
 Tintura sagrada, II, 217.
 Tisana anticólica de la F. E., III, 221.
 — laxante de los H. M., III, 221.
 — purgante, III, 236.
 — real, III, 236.
 Trociscos de Alhandal, III, 270.
 Ungüento de artánita compuesto de la F. E., III, 278.
 Vino antiaplopéctico, III, 316.
 Zumo de yerbas purgante, III, 333 y 334.

ATEMPERANTES (*refrigerantes, &c.*).

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Acedera comun. | Berberis. |
| Acederilla. | Frambuesa. |
| Acido acético impuro. | Grosellas. |
| — acético puro. | Limon. |
| — bórico. | Manzana de la reina. |
| — cítrico. | Moras. |
| — málico. | Naranjas. |
| — oxálico. | Nenufar. |
| — tartárico. | Oxalato de potasa. |
| Agracejo. | Bebida atemperante, I, |
| Agraz. | 375. |

- Caldos de yerbas, I, 407.
- Cocimiento de cebada perlada, I, 450.
- Emulsiones comunes, II, 55 y 56.
- de goma arábica, II, 58.
- Jarabe de ácido cítrico, II, 205.
- de cáscaras de naranjas dulces, II, 223.
- de granada de la F. E., II, 247.
- de vinagre de la F. E., II, 270.
- Limonada gaseosa en polvo, II, 322.
- gaseosa líquida de Chatard, II, 320.
- seca, II, 323.
- Oxirato de Andria, II, 417.
- Pastillas de ácido cítrico, II, 435.
- de ácido oxálico, II, 435.
- Píldoras tartáreas de Bontius, II, 558.
- Polvo atemperante de Sthal, III, 16.
- Polvo atemperante y laxante de Bouillon Lagrange, III, 70.
- diurético atemperante, III, 33.
- de nitro alcanforado de Swediaur, III, 58.
- Suero, III, 160.
- artificial, III, 163.
- clarificado de la F. E., III, 162.
- facticio, III, 163.
- gaseoso, III, 164.
- nitrado, III, 164.
- preparado de la F. E., III, 161.
- Tisana atemperante de los H. de M., III, 225.
- comun, III, 227.
- refrigerante y atemperante en polvo, III, 237.
- simple de los H. M., III, 228.
- Ungüento magistral de la F. E., III, 289.
- Vinagre rosado de la F. E., III, 312.

EMOLIENTES.

Acanto.

Aceite de adormideras.

Aceite de almendras dulces.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Aceite de avellana. | Higos. |
| — de hayuco. | Lino. |
| — de huevos. | Malva. |
| — de lino. | Malvabisco. |
| — de nueces. | Manteca. |
| — de olivas. | Medula de los huesos. |
| Acelgas. | Meliloto. |
| Alcea. | Melon. |
| Algodonero herv cco. | Miga de pan blanco. |
| Alholva. | Musgo marino perlado. |
| Almendras dulces. | Nabo. |
| Almidon. | Pasas. |
| Alsine. | Pepino. |
| Amapola. | Regaliz. |
| Arroz. | Sagú. |
| Avena. | Salvado. |
| Azufaixas. | Salep. |
| Borraja. | Sauco. |
| Buglosa. | Sebesten. |
| Cacao. | Semillas frias mayores. |
| Calabaza blanca larga. | Siempreviva mayor. |
| — comun. | Tapioca. |
| Cañamones. | Violeta. |
| Caracoles. | Zaragatona. |
| Cebada. | Aceite de calabaza, I, |
| Cetina. | 295. |
| Cinoglosa. | Baño emoliente, I, 365. |
| Ciruelas pasas. | Ceratocosmético de Van- |
| Cola de pescado. | Mons, I, 424. |
| Consuelda mayor. | — de Galeno, I, 426. |
| Dátiles. | — simple, I, 431. |
| Esperma de ballena. | Cocimiento emoliente de |
| Goma arábica. | raiz de malvabisco de |
| — tragacanto. | la F. E., I, 453. |
| Gordolobo. | — emoliente de los H. M., |
| Gramma. | I, 453. |

- Cocimiento mucilaginoso de los H. M., I, 457.
- Disolucion arábica de los H. de M., I, 498.
- Emplasto de cera, II, 28.
- de meliloto simple de la F. E., II, 40.
- de meliloto compuesto de la F. E., II, 40.
- de sebo anodino de la F. E., II, 48.
- Emplasto simple, II, 46.
- simple de los H. de M., II, 47.
- Emulsiones calmantes, II, 55.
- de goma arábica, II, 58.
- Especies béchicas, II, 79.
- emolientes, II, 80 y 81.
- para tisanas de Baldingieri, II, 82.
- Fomentos emolientes, II, 113.
- Hidrogala, II, 156.
- Inyeccion emoliente, II, 182.
- Jarabe de almendras, II, 209.
- comun de violetas de la F. E., II, 271.
- Jarabe de goma, II, 246.
- Julepes gomosos, II, 280.
- Lavativa emoliente, II, 298.
- emoliente de hojas de malvas de la F. E., II, 298.
- emoliente de los H. de M., II, 298.
- Leche de burras, II, 305.
- de cabras, II, 305.
- Linimento emoliente de los H. de M., II, 337.
- Pastillas de goma arábica, II, 441.
- de malvabisco, II, 444.
- de malvabisco gomosas, II, 445.
- Pocion gomosa de los H. M., II, 606.
- Polvo de liquen.
- Tisana de Buchan, III, 226.
- emoliente de los H. M., III, 232.
- emulsionada, III, 232.
- Ungüento de altea de la F. E., III, 276.
- de tuétano de vaca de la F. E., III, 302.
- rosado de la F. E., III, 299.

RUBEFACIENTES Y EPISPÁSTICOS.

- Ajo.**
Cantáridas.
Cantaridina.
Celedonia mayor.
Clemátide.
Creosota.
Euforbio.
Mostaza blanca.
 — negra.
Ranúnculo acre.
 — bulboso.
Torbisco.
Verbena.
Cataplasma isquiática de Willis, I, 418.
 — rubefaciente, I, 422.
Emplasto de euforbio, II, 36.
Epitema rubefaciente de Faure, II, 68.
Fomento amoniaco alcanforado, II, 109.
Pomada de pimienta, III, 127.
Sinapismos de mostaza, III, 158.
Cerato epispástico de Regimbeau, I, 426.
Emplasto de cantáridas, II, 27.
 — de cantáridas de la F. E., II, 26.
- Emplasto perpétuo de Jannin, II, 43.**
 — vejigatorio, II, 50.
 — vejigatorio de Mejean, II, 51.
 — vejigatorio inglés, II, 50.
Fomento sinapizado de Fouquier, II, 118.
Papel epispástico, II, 421.
 — vejigatorio de Coldefi-Dorly, II, 422.
Pomada de Grand-Jean, III, 110.
 — de Thierry, III, 133.
 — de torbisco, III, 108.
 — epispástica alcanforada, III, 107.
 — epispástica amarilla ó suave, III, 106.
 — epispástica de los H. M., III, 106.
 — epispástica verde, III, 107.
Sinapismo de mostaza, III, 158.
 — mitigado, III, 159.
 — para las plantas de los pies de la F. E., III, 158.
Tafetanes vejigatorios, III, 182.

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Taftan vejigatorio de Guilbert, III, 183. | III, 305. |
| — vejigatorio de torbisco, III, 183. | Vejigatorio de Trousseau, III, 306. |
| Vejigatorio amoniacoal, III, 303. | — de Wanters, III, 306. |
| — de Bouvoisin, III, 303. | — económico, III, 304. |
| — de Bretonneau, III, 304. | — magistral, III, 305. |
| — de Gondret, III, 304. | Ungüento epispástico, III, 285. |
| — de Lecomte, III, 305. | — epispástico de Cadet, III, 286. |
| — de Louyer Villermay, | — epispástico de la F.E., III, 286. |


CÁUSTICOS.

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Acetato de cobre neutro. | Sosa cáustica. |
| — bibásico de cobre. | Sulfato de cobre. |
| Acido azóico ó nítrico. | Pasta escarótica de Canquoin, II, 428. |
| — sulfúrico. | Polvo de Viena, III, 76. |
| Amoniaco líquido. | Trociscos de minio, III, 263. |
| — gaseoso. | — escaróticos de la F.E., III, 272. |
| Cloruro de antimonio. | |
| — de zinc. | |
| Fuego. | |
| Nitrato de plata fundido. | |
| Potasa cáustica. | |

ANTIHELMÍNTICOS Ó VERMÍFUGOS.

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Acederac. | Coralina de Córcega. |
| Ajenjo marino. | Corteza de raíz de granado. |
| Ajo. | Estaño. |
| Cebadilla. | |

- Helecho macho. ranjas amargas, II,
223.
Musgo de Córcega. Lavativa de aceite de ri-
cino, II, 288.
Petroleo. Ungüento vermífugo, III,
302.
Santónico. V. Lombrices.
Tanaceto.
Jarabe de ajo, II, 208.
— de cáscaras de na-



PARTE NOVENA.

MEMORIAL TERAPEUTICO.

- Abscesos agudos.* Emisiones sanguíneas. Purgantes, III, 440. Cataplasmas emolientes, I, 416. — de fécula, I, 417. — supurantes, I, 422. — resolutivas, I, 420. Ungüento de la merè de la F. E., III, 291. Puncion. Compresion. Fomentos resolutivos, II, 116. Agua vegeto-mineral, I, 330.
- Abscesos crónicos.* Aguas sulfurosas, III, 346. Purgantes. Moxas, III, 189. Chorro aromático de Plenck, I, 163. Cauterio actual, I, 188. — objetivo, I, 188. Cataplasma de fécula, I, 417. — madurativa, I, 420 y 421. Ungüento basilicon, III, 279. Emplasto de Canet, II, 26. Ungüento de la merè, III, 291. Inyeccion irritante, II, 184. — estimulante de los H. M., II, 184. — escitante de Swediaur, II, 182. — tónica, II, 190. Linimento estimulante inglés, II, 337. Puncion. Compresion.
- Acedias.* V. Agrios. *Acidez de las primeras vias.* V. Agrios. *Acidos del estómago.* V. Agrios.
- Acne.* V. Herpes. Mezclas para lociones, II, 373. Píldoras contra el acne rosáceo de Bielt, II, 501. Pomada contra el acne endurecido,

III, 97. — de ioduro de azufre, III, 116. — de protocloruro de mercurio amoniacal de Bielt, III, 129. Tópico contra el acné, III, 243.

Afecciones. V. la enfermedad en particular. — *adinaámicas*. V. Fiebre adinámica. — *atónicas*. V. As-
tenia. — *atónicas de la mucosa bucal*, &c. V. Estomatitis, escorbuto, &c. — *catarrales*. V. Catarros pulmonales, neumonía y romadizo. — *comatosas*. V. Coma. — *convulsivas*. V. Convulsiones. — *crónicas de los órganos digestivos*. V. Gastritis crónica, diarrea crónica, dispepsia, &c. — *cutáneas*. V. Herpes. — *de la piel*. V. Herpes, enfermedades cutáneas, &c. — *de las encías*. V. Escorbuto. — *de las primeras vías*. V. Embarazo gástrico é intestinal y dispepsia. — *de las vías urinarias*. V. Cistitis, blenorragia y cálculos. — *del corazón*. V. Hipertrofia del corazón. — *de los riñones*. V. Cálculos urinarios é iscuria. — *de pecho*. V. Neumonía, tisis y bronquitis. — *dolorosas de las vías urinarias*. V. Blenorragia y cistitis. — *epsóricas*. V. Sarna. — *escamosas*. V. Herpes. — *escorbúticas*. V. Escorbuto. — *escrofulosas*. V. Escrófulas. — *espasmódicas*. V. Neuroses y antiespasmódicos. — *flatulentas*. V. Cólico ventoso y flatuosidades. — *gotosas*. V. Gota. — *herpéticas*. V. Herpes. — *histéricas*. V. Histerismo. — *intestinales*. V. Diarrea, disenteria y cólicos.

Afecciones lechosas. Cataplasmas resolutivas, I, 420. Cocimiento diurético alcalino, I, 452. Elixir americano de Courcelles, II, 1. Fomento de Justamond, II, 115. Tisana de caña, I, 34.

Afecciones linfáticas. V. Escrófulas, &c. — *nerviosas*. V. Neuroses. — *nerviosas del estómago*. V. Gastrodinia. — *nerviosas de los intestinos*. V. Cólico nervioso. — *papulosas*. V. Herpes. — *pa-*

pulosas de la cara. V. Herpes. — *pulmonales*. V. Neumonía, bronquitis y tisis. — *reumáticas*. V. Reumatismo. — *sifilíticas*. V. Sífilis. — *tifoideas*. V. Fiebre tifoidea. — *verminosas*. V. Lombrices y ténia.

Afonia. Disolución de nitrato de plata, I, 507. Eter balsámico de Tolú, II, 102. Gargarismos: aluminoso de Bennati, II, 128. — astringente de Colombat, II, 133. Jarabe compuesto de erisimo de la F. E., II, 240. Jarabe de lombarda compuesto de Fouquet, II, 252. Poción del Dr. Mongenet, II, 597.

Aftas confluentes. Colutorios: acidulado, I, 480. — deterivos, I, 481. Gargarismos: detergente, II, 139. — detergente de los H. de M., II, 138. — con miel rosada, II, 137. — verde de Swediaur, II, 146. Poción contra las aftas confluentes gangrenosas, II, 590. Tocar ligeramente las aftas con alumbre.

Aftas benignas. Bebida antiflogística de Stoll, I, 371. Tisanas: de cebada, I, 36. — común, III, 227. Gargarismos: de ácido hidroclicórico de Ricord, II, 126. — aluminoso de Ricord, II, 128. — atemperante de los H. de M., II, 134. — astringente, II, 132. — boratados, II, 135. — boratado de los H. M., II, 135. — boratado de Swediaur, II, 135. — clórico, II, 136. Licor contra las aftas de Swediaur, II, 313. Miel rosada, II, 378. Mistura de Boyle, II, 386.

Agalaxia. Cataplasma emoliente, I, 416. Polvo de Rosen de Rosenstein, III, 68.

Agrios. Aguas: alcalina gaseosa, I, 303. — de cal, I, 309. — de sosa carbonatada, I, 328. — magnesiana, I, 322. — magnesiana gaseosa, I, 322. Azúcar alcalina de Blondeau, I, 347. Electuario de azafran compuesto, I, 518. — de magnesia, I,

529. Jabon medicinal, II, 193. Magnesia, I, 218. Mistura con la creta, II, 389. — de creta compuesta de Brande, II, 390. Pastillas: absorbentes de Chevallier, II, 434. — de bicarbonato de sosa, II, 436. — de catecú, de canela y de magnesia, II, 437. — de salud de Delvincourt, II, 449. Píldoras antiácidas, II, 461. Pociones: absorbente de los H. M., II, 567. — antiácida, II, 572. — antiácida de Chevallier, II, 572. — calmante, II, 586. Polvos: absorbente, III, 1. — antiácido, III, 2. — de carbonato de magnesia, III, 20. — de carbonato de magnesia con la sosa de Nicolai, III, 20. — de creta compuesto, III, 29. — del conde de Palma, III, 23. — de Rosen de Rosenstein, III, 68. Tabletas: de magnesia, III, 179. — de magnesia y catecú, III, 179. — de sub-nitrato de bismuto, de Trousseau, III, 181.

Aliento fétido. V. Fetidez del aliento.

Alopecia. Combatir las causas que la producen.

Pomadas: contra la calvicie de Dupuytren, III, 98. — contra la caída de los cabellos, III, 98.

Almorranas. V. Hemorroides.

Amaurosis ó gota serena. Emisiones sanguíneas.

Ventosas escarificadas. Electricidad, I, 173. Colirios: de Henderson, I, 472. — de Plenck, I, 474. Preparaciones de acónito, I, 93. Aconitina, I, 94. Preparaciones de arnica, I, 113. Sedal en la nuca. Embrocaciones oftálmicas de Siebel, II, 20. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Infusion de arnica de los H. de M., II, 165. Pomada antioftálmica de Siebel, III, 85. Vejigatorio de Gondret, III, 304. Estricnina, I, 182, y sus preparados. Purgantes, III, 440.

Amenorrea y dismenorrea. Azalcan, I, 116. Mirra, I, 225. Preparaciones: de ajenojo, I, 97. —

de polígala, I, 214. — de acibar, I, 83. — de castoreo, I, 144. — de oro, I, 158 y 236. Sulfuro de carbono, I, 274. Sabina, I, 256. Rueda, I, 255. Tisana de artemisa, I, 34. Artemisa, I, 115. Purgantes drásticos, III, 440. Acetato de amoniaco y hierro líquido, I, 300. — de peróxido de hierro, I, 300. Aguas: calibeada, I, 309. — ferruginosa, I, 315. — de Bañares, I, 307. — de hidriodato de hierro, I, 318. Alcoholados: de acetato de hierro, I, 333. — de citrato de hierro, I, 334. — de percloruro de hierro, I, 336. Apocema tónico de Babeyrac, I, 345. Baños: de agua de mar, III, 387. — de agua corriente, I, 69. — de hidriodato de hierro, I, 367. Bebida ferruginosa, I, 376. Bolas de Marte, I, 381. Bolos: emenagogos, I, 392. — emenagogos de Desbois de Rochefort, I, 392. Cianuro de oro, I, 150. Citrato de peróxido de hierro, I, 437. Cocimiento de acibar compuesto, I, 439. Confeccion de rueda, I, 484. Conserva de ajenjos, I, 487. Chocolate con el hidriodato de hierro, II, 160. Elixires: americano de Courcelles, II, 1. — antiartrítico de la Isla de Francia, II, 2. — uterino de Crolius, II, 17. Emulsion emenagoga de Franck, II, 57. Esencia carminativa de Wedel, II, 71. Eterolados: de acetato de hierro de Beral, III, 203. — de percloruro de hierro de Beral, III, 204. Extractos: de acibar de Poerner, II, 93. — de Marte, II, 96. Fumigaciones: aromática, II, 122. — estimulante, II, 124. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Jarabes: de acetato de amoniaco y hierro de Beral, II, 204. — de acetato de hierro de Beral, II, 204. — de artemisa compuesto, II, 216. — de citrato de hierro de Beral, II, 228. — de citrato de hierro de Trousseau, II, 228. — de percloruro de

hierro de Beral, II, 259. Lavativa iodada de Cottereau, II, 299. Leche amoniacal, II, 305. Linimento aromático de Rosen, II, 330. Mezcla emenagoga de Mansfeld, II, 371. Opiata antiépiléptica de Idler, II, 409. Pan ferruginoso de Louvel, II, 421. Pastillas: de citrato de hierro, II, 437. — de chocolate y hierro reducido por el hidrógeno de Miquelard y Quevenne, II, 442. — de citrato de hierro, II, 437. — de hidriodato de hierro, II, 442. Percloruro de hierro, I, 159. Píldoras: anticaquéticas de Dehaen, II, 463. — anti gastrálgicas de Trousseau, II, 470. — calibeadas, II, 491. — de iodoforma, II, 529. — de Rufus, II, 554. — de tribus con ruibarbo, II, 563. — emenagogas de Barthez, II, 513. — emenagogas de Fouquier, II, 513. — esplénicas, II, 516. — ferruginosas, II, 521. — histéricas de la F. M., II, 527. — para restablecer las reglas, II, 547. — tónicas de Stoll, II, 560. — tónicas y laxantes, II, 560. Poción emenagoga, II, 599. — emenagoga de Desbois, II, 599. — emenagoga de Furnari, II, 599. — ocítica de Charles, II, 615. Pomadas: de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 112. — de hidrobromato de hierro bromurado de Cottereau, III, 111. Polvos: contra la amenorrea de Fouquier, III, 24. — emenagogos, III, 39. — ferruginoso, III, 49. — para agua gaseosa y ferruginosa de Quesneville, III, 49. — tónico de Bories, III, 72. Sacarolado de citrato de hierro de Beral, III, 156. Tabletas marciales, III, 179 y 180. Tartrato de potasa y hierro, III, 184. Té tunka, III, 185. Tinturas: de acibar compuesta, III, 186. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 207. — de Marte tartarizada, III, 211. — elástica del Dr. Bañares, III, 200. — etérea de acetato de

hierro de Beral, I, 203. — etérea de percloruro de hierro de Beral, III, 204. — vinosa de hierro tartarizada de la F. E., III, 218. — volátil de gnayaco de Dewees, III, 219. Tisana emenagoga, III, 232. Vinos: calibreado de Parmentier, III, 320. — de acetato de hierro líquido, III, 313. — de ajenjos, III, 313. — de citrato de hierro de Beral, III, 321. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 327. — marcial de los H. de M., I, 320. Dos sanguijuelas en la parte interna y superior de los muslos.

Amigdalitis. V. Angina.

Anafrodíxia. Cantáridas, I, 135. Cantaridina, I, 136. Fósforo, I, 185. Vainilla, I, 285. Confección de ruda, I, 484. Diabolines estimulantes de Virey, I, 492. Eteres: fosforado de Pelletier, II, 102. — sulfúrico fosforado de Loebelius, II, 106. Pastillas: de geng-seng, II, 441. — mogólicas, II, 446. Pociones: estimulante aromática, II, 604. — fosforada con aceite, II, 606. — fosforada con éter, II, 606.

Anasarca. V. Hidropesías. Aceite de croton tiglio, I, 76. Purgantes, III, 440. Alcoholado de veratrina, I, 337. Bolos de escila, I, 393. Cocimientos: de los leños de la F. E., I, 456. — diurético alcalino, I, 452. Disolución de sulfato de veratrina de Magendie, I, 508. Jarabe drástico, II, 239. Linimentos: de veratrina de Turnbull, II, 347. — de veratrina é ioduro de potasio de Turnbull, II, 347. — de veratrina y mercurio de Turnbull, II, 347. — diuréticos, II, 336. — diurético de Rullier, II, 336. Píldoras: anti-hidrópicas de Graefe, II, 474. — diuréticas de Dupuytren, II, 511. Pociones: diurética, II, 594. — diurética de Fouquier, II, 596. — diurética de Hallé, II, 596. Pomada de veratrina

de Magendie, III, 134. Tratamiento de Dupuytren &c., III, 269. Diuréticos, III, 431.

Anemia. V. Clorosis y astenia. Tónicos, III, 425.

Hierro y sus preparados. Tisanas: de quasia amarga, I, 33. — de simaruba, I, 33.

Aneurismas. Digital, I, 169. Emisiones sanguíneas. Compresion. Hielo, I, 187. Preparaciones antimoniales. Ligadura. Torsion.

Aneurismas del corazon. V. Aneurismas é hipertrofia del corazon. Emplasto de digital, II, 33. Jarabes: calmante de Roux, II, 221. — de puntas de espárrago de A. Chevallier, II, 260. Hidromel espectorante, II, 158. Linimento sedante de Cottereau, II, 345. Maniluvios, II, 367.

Angina. Emisiones sanguíneas. Cataplasmas emolientes, I, 416. Bálsamo tranquilo de Chomel, I, 362. Cerato de Rechoux, I, 430. Colutorios: acidulado, I, 480. — calmante, I, 481. — deterativo, I, 481. Gargarismos: acetoso, II, 126. — acídulos, II, 127. — aluminoso de Bennati, II, 128. — con miel rosada, II, 137. — dulcificante, II, 139. — emoliente de los H. M., II, 139. — boratados, II, 134 y 135. — boratado de Swediaur, II, 135. — atemperante de los H. M., II, 134. — antilogístico, II, 130. — astringente, II, 132 y 133. — astringente de Jannart, II, 134. — atemperante de los H. de M., II, 134. — amoniacal, II, 129. — clórico, II, 136. — con el ácido clórico, II, 137. — con el sublimado de Ricord, II, 137. — de escila de Swediaur, II, 139. — estimulante, II, 141. — estimulante de Swediaur, II, 141. — fundente de los H. de M., II, 141. — hidroclórico, II, 141. — iodado de Ricord, II, 142. — resolutivo de los H. de M., II, 145. Jarabe de erisimo compuesto, II, 240. — de

granadas de la F. E., II, 247. — de lombarda compuesto de Fouquet, II, 252. Pastillas de peñitre de Lacombe, II, 448. Pediluvio sinapizado, II, 452. — hidrocórico, II, 452. Poción contra la angina peliculosa de Billard, II, 591. Trociscos de Chaussier, III, 272.

Angina de pecho. Gotas calmantes, II, 149. Linimento sedante de Cottereau, II, 345. — volátil de Plenck, II, 347. Píldoras diuréticas, II, 510. Poción de Andry contra la cardialgia, II, 596. Tintura etérea de digital purpúrea, I, 168.

Angina estridula. V. Croup.

Angina maligna ó gangrenosa. Nitrato de plata, I, 230. Preparaciones de mirra, I, 225. Pimienta, I, 242. Gargarismos: acidulos, II, 127. — acetoso, II, 126. — alcanforado, II, 127. — antipútrido de los H. de M., II, 131. — antiséptico, II, 131. — antiséptico de los H. M., II, 131. — con el ácido hidrocórico de los H. M., II, 137. — con miel rosada, II, 137. — detergente, II, 138 y 139. — de ácido bórico, II, 126. — de quina, II, 144. — escitante, II, 140. — estimulante, II, 140. — hidrocórico, II, 141. — tónico y astringente de Hunter, II, 146.

Angina membranosa. V. Croup. *Angina sifilitica.* V. Sífilis. *Anorexia.* V. Dispepsia.

Anquilosis. Baños, I, 69. Linimento amoniacal, II, 326. Chorros de agua caliente, aromáticos, ó sulfurosos. Linimento estimulante inglés, II, 337. Piel de Goulard, II, 455.

Antrax benigno. V. Divieso.

Antrax maligno. Hacer incision. Cauterio actual, I, 188. Cáusticos, III, 450. Bebidas tónico-estimulantes.

Aortitis. V. Aneurismas.

Apoplejia (Hemorragia cerebral). Emisiones san-

guíneas. Bebidas emetizadas. Agua espirituosa de Anhalt, I, 313. Alcohol de veratrina de Magendie, I, 337. Apocema contraestimulante de Laennec, I, 343. Cataplasma rubefaciente, I, 422. Disolucion de sulfato de veratrina de Magendie, I, 508. Epitema rubefaciente de Faure, II, 68. Fomento sinapizado de Fouquier, II, 118. Infusion de arnica de los H. de M., II, 165. Lavativa emetizada, II, 297. — estimulante, II, 299. — estimulante de los H. de M., II, 298. — irritante de los H. M., II, 300. — irritante de vino antimoniado de la F. E., II, 300. Limonada con el cremor de tártaro, II, 313. Mistura pectoral de Quarin, II, 402. Pediluvios alcalinos, II, 452. — sinapizados, II, 453. — sinapizados de los H. M., II, 454. Píldoras de veratrina de Magendie, II, 565. Pomada de veratrina de Magendie, III, 134. Trociscos de Alhandal, III, 270. Vino antiapopléctico, III, 316. Vejigatorios, III, 303. Rubefacientes, III, 419. Sedales.

Apoplejia de los recién nacidos. Cortar el cordón, facilitar la salida de la sangre por medio de ligeras fricciones. Dos sanguijuelas detrás de las orejas. Baños tibios.

Apoplejia serosa (Hidrocefalo de los ancianos). Agua espirituosa de Anhalt, I, 313. Purgantes, III, 440. Revulsivos.

Aracnoiditis. V. Frenesí.

Ardores de entrañas. Julepe refrigerante, II, 283.

Ardores de orina. V. Disuria.

Arenillas. V. Cálculos urinarios.

Arteritis. V. Aneurismas.

Artritis. V. Gota.

Artrodinia. V. Gota.

Ascitis aguda. Emisiones sanguíneas. Antiflogísti-

cos. Diuréticos, III, 431. Cocimientos aperitivos, I, 446. Emulsiones: purgante con aceite de tártago de Calderini, II, 61. — purgante con escamonea, II, 61. Jarabe drástico, II, 239. Polvo de escila nitrada de Vanhelimont, III, 40. Vinagre cólchico de Reus, III, 308. Vino diurético amargo de la Caridad, III, 322.

Ascitis crónica. V. Hidropesías.

Asfixia. V. Pág. 408, tomo III.

Asfixia por espuma brónquica. Poción expectorante, II, 601. — kermetizada, II, 612. — pectoral amarga, II, 617. Tisana de polígala, I, 245.

Asma. Asafétida, I, 115. Belladona, I, 123. Belemnó, I, 122. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Tridacio, I, 285. Goma amoniaco, I, 192. Preparaciones: de digital, — de ácido hidrocianico. Agua destilada de laurel real, I, 312. Aguas sulfurosas, III, 346. Bolos antiasmáticos, I, 383. Cigarros de estramonio, I, 437. Disolucion amoniaca de los H. de M., I, 497. Elixires: antiasmático de Boerhaave, II, 2. — de Barthez, II, 7. — paregórico inglés, II, 13. Emulsiones: aceitosa, II, 52. — antiasmática de Foller, II, 53. — de Brunero, II, 55. Esencia escilitica de Keup, II, 72. Eter balsámico de Tolú de Moreau, II, 172. Fumigaciones de estramonio II, 125. Hidrocloro medicinal, I, 155. Hidromeles: antiasmático, II, 157. — expectorante, II, 158. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Jabon estibiado, II, 192. Jarabes: antiasmático, II, 210. — calmante de Roux, II, 221. — cianico de Magendie, II, 225. — de Dessesart, II, 237. — de Gardanne, II, 238. — de ioduro de potasio, II, 249. — de nicociana de Lamure, II, 254. — pectoral balsámico de Charles, II, 255. — pectoral contra el coqueluche, II, 256. — pectoral dulcifi-

cante de Selle, II, 257. — pectoral de Boubart, II, 255. — pectoral de Courti, II, 256. — pectoral de Maloet, II, 258. — pectoral de Rivet, II, 258. — pectoral inglés, II, 257. Julepes: espectorante, II, 279. — fétido de Barthez, II, 280. Lavativa de asa fétida, II, 263. Licor amoniaco anisado, II, 307. Linimento sedante de Cottereau, II, 345. Looc de Gordon, II, 363. Maniluvins, II, 367. Mezcla para fumar, II, 371. Mistura antiasmática de Van-Swieten, II, 380. Ojimeles: escilítico de la F. E., II, 418. — pectoral de los daneses, II, 419. — pectoral de Edimburgo, II, 418. — simple de la F. E., II, 419. Pastillas: de ipecacuana de L. C. Cadet, II, 443. — de pelitre de Lacombe, II, 448. Píldoras: anti-neurálgicas de Trousseau, II, 477. — balsámicas de Morton, II, 487. — calmantes, II, 492. — de amoniaco, II, 460. — de asa fétida. — de asa fétida y alcanfor, II, 481. — de belladona, II, 488. — de cianuro de potasio de Bally, II, 497. — de gálbano compuestas de Murray, II, 524. — de Quarin, II, 552. — tónicas y calmantes de Courti, II, 559. Pociones: de asa fétida de Millar, II, 581. — de cianuro de potasio de Bally, II, 588. — de ipecacuana de Haller, II, 610. — de hidriodato de potasa y ácido hidrocianico de Fermon, II, 607. — del Dr. Mongenot, II, 597. — espectorante de Babeyrac, III, 41. — pectoral de Magendie, II, 617 y 618. — sedante II, 622. Polvos: calmante de Cottereau, III, 13. — de Dower, de la F. E., III, 35. — de Dower de los H. M., III, 35. — de escila compuesto de Stahl, III, 40. — de Quarin contra la tos convulsiva, III, 65. — pectoral de Wedel, III, 62. Tabletillas: anticatarrales de Tronchin, III, 171. — de Calabria de Manfredi, III, 173. — de ker-

mes, III, 178. Tinturas: anisada de Alibert, III, 191. — de felandrio de Martius, III, 206, — de lobelia inflata de J. Andrew, III, 210. — etérea de digital, I, 48. Tisanas: de Buchan, III, 226. — de émula campana, I, 33. Trociscos de Chaussier, III, 272. Electricidad, I, 173. Emisiones sanguíneas. Gutabamba, I, 197. Derivativos. Vestidos de franela.

Astenias: Astringentes, III, 423. Catecú, I, 145. Amargos, III, 425. Aromáticos, III, 428. Preparaciones de ajénjos. Acido sulfúrico con el alcohol aromático, I, 301. Agua bromurada, I, 308. — de magnanimidad, I, 321. — de Sedlitz, I, 328. — espirituosa de Anhalt, I, 313. Apocema tónico, I, 345. — tónico amargo, I, 346. — tónico de Babeyrac, I, 345. Bálsamo de vida de Hoffmann, I, 363. — sajón, I, 360. Bolos fortificantes de Alibert, I, 366. — fortificantes de Desbois, I, 366. Cerveza amarga, I, 432. — antiescorbútica de Butler, I, 433. — estomacal inglesa, I, 434. Chocolates: analéptico de salep, II, 159. — blanco de Pierquin, II, 160. — de liquen, II, 161 y 162. — de liquen de Robinet, II, 161. Electuario anticaquéctico de Ward, I, 511. Electricidad, I, 173. Elíxires: de Garus, II, 11. — visceral de Hoffmann, II, 18. — tónico, II, 16. Emplastos: confortativo, II, 31. — de Canet, II, 26. — estíptico de Swediaur, II, 34. Esencia alexifarmaca de Stahl, II, 69. Infusion fría de quina, II, 168. Jabón estibiado. II, 192. Licores: amoniacaal anisado, II, 307. — vital de J. Rucco, de Nápoles, II, 317. Limonada alcohólica, II, 318. Mistura tónica de Du Bois, II, 406. Pastillas mogólicas, II, 446. Píldoras: purgantes de Dehaen, II, 551. — estomacales, II, 517 y 518. — estomacales de Cadet.

II, 518. — estomacal de Smith, II, 519. Píldoras: tónicas y calmantes de Courti, II, 559. — tónicas y estomacales, II, 559. — tónicas de Hulm, III, 560. Pociones: aromática, II, 581. — cordial, II, 592 y 593. Polvos: diaromaton inglés, III, 32. — digestivo simple de Duc, III, 33. — digestivo compuesto, III, 33. — estimulante, III, 42. Tabletas de vida, III, 182. Té tunka, III, 185. Tinturas: de cardamomo compuesta, III, 197. — de espliego compuesta, III, 201. — nervino-tónica de Bestuchef, III, 213. Preparaciones de hierro. — de quina. Triaca magna, I, 526. Tannino, I, 278. Vainilla, I, 285. Vino, I, 288.

Astenia de la matriz. V. Amenorrea.

Atonia. V. Astenia. Tabletas de magnesia, III, 179. Píldoras fundentes de Roucher, II, 522. Pociones cordiales, II, 593. Polvo estomacal de Birkmann, III, 44.

Atonia de los órganos digestivos. V. Dispepsia. Ajenjos, I, 97. Tónicos, III, 425. Alkermes líquido de los italianos, I, 344. Apocema tónico amargo, I, 346. Agua de canela lacticinosa, I, 320. Agua espirituosa de Anhalt, I, 313. Alcoholado de cinconina, I, 334. Bálsamo de vida de Lelievre, I, 363. Bolos: estomacales de Parmentier, I, 394. — fortificantes de Desbois, I, 397. — de tartrato de hierro, I, 399. — tónicos de Roucher, I, 399. — amargos, I, 383. Crema de ajenjos blanca, I, 490. Cataplasma de vinagre y corteza de pan de la F. E., I, 423. Conserva de ajenjos, I, 487. Cerveza amarga, I, 432. Cocimientos: amargo de camedrios de la F. E., I, 440. — amargos de los H. M., I, 440. — de acibar compuesto, I, 439. Cerveza de quina, I, 436. Emplasto de tacamaca de la F. M., II, 48. Esencia balsámica, II, 70. Elixir tónico, II, 16. Electuario de azafran com-

TOMO III. 30

puesto, I, 518. Elíxir balsámico de Wverlhoff, II, 6. — balsámico, estomacal y atemperante de Hoffmann, II, 5. — estomacal de la F. E., II, 9. — estomacal de Stoughton, II, 8. — de drogas amargas de los indios, II, 7. — de Garus, II, 11. — de larga vida, II, 11. — fortificante de Selle, II, 10. — de Perhylo, II, 13. — de propiedad de la F. E., II, 14. — sagrado, II, 15. — uterinode Crolius, II, 17. — de vitriolo dulce, II, 19. — visceral de Hoffmann, II, 18. Electuario de Fuller, I, 525. — de catecú compuesto, I, 521. Genciana, I, 190. Infusiones: de colombo compuesta, II, 167. — de catecú compuesta, II, 166. — compuesta de genciana, II, 168. — tónica de ipecacuana de Berthe, II, 173. Jarabes: de catecú, II, 223. — vinoso cardiaco de Wvirtemberg, II, 271. — de coclearia, II, 231. — de achicorias simple de la F. E., II, 207. Licor de enebro, II, 314. Opiata estomacal de Helvetius, II, 411. Polvos: cordial, III, 28. — de antimonio marcial diaforético de Keup, III, 9. — de ruibarbo opiado, III, 68. — estomacales, III, 44. — tónico, III, 71. — tónico de Bories, III, 72. Pastillas de catecú, de cauela y de magnesia, II, 437. Píldoras antecibum, II, 461. — estomacales de Cadet, II, 518. — tónicas de Hulm, II, 560. — tónicas y estomacales, II, 559. — tónicas de Stoll, II, 560. — estomacales, II, 518. Polvos: estomacal, III, 44. — cefrático de Selle, III, 37. — digestivo simple de Duc, III, 33. — digestivo compuesto, III, 32. Pociones: amarga, II, 510. — tónica de Recamier, II, 625. Píldoras: de Maquiavelo, II, 535. — estomacales, II, 517. Quina, I, 249. Quinta esencia de ajenjos, III, 139. Tisana angélica, III, 226. Tinturas: de ruibarbo de Spielmann, III, 217. — de ruibarbo compuesta, III, 216. Tabletas

de ruibarbo, III, 181. — de catecú, III, 175. Tinturas: de canela compuesta, III, 197. — estomacal, III, 203. — de genciana compuesta, III, 206. — estomacal, III, 202. — estomacal amarga, III, 201. — de espliego compuesta, III, 201. Té tunka, III, 185. Tisana de Datisbuis, III, 228. Vinos: de ruibarbo compuesto, III, 328. — amargo y diurético de la Caridad, III, 315. — amargo y diurético de Corvisart, III, 315. — amargo de Dubois, III, 314. — de cinconina de Magendie, III, 320.

Atonia de los órganos genitales. V. Anafrodixia.

Atrofia. V. Marasmo y consunción. Alcohol de nuez vómica, I, 336. Bálsamos: sajón, I, 360. — de vida de Hoffmann, I, 363. Linimento fosforado, I, 338. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Tintura legivial de Vogler, III, 210.

Aturdimiento. Sangrías. Sanguijuelas. Lociones frias á la frente. Apocema laxante, I, 344. Bebidas diluentes y laxantes. Tónicos ó antiespasmódicos, segun los casos, III, 425.

Baile de S. Vito. V. Corea.

Blefaritis. V. Oftalmia.

Blefaroftalmias. V. Oftalmia.

Blefarorrea escrofulosa. V. Oftalmia escrofulosa.

Blenorragia y blenorrea. Emisiones sanguíneas. Alcanfor, I, 100. Baños, I, 69. Bálsamo de copaiba, I, 119. Cubebas, I, 167. Estoraque, I, 181. Grama, I, 194. Nitrato de plata, I, 230. Purgantes drásticos, III, 440. Preparaciones de iodo, I, 203. — de cubebas, I, 167. — de copaiba, I, 119. — de hierro, I, 200. Aguas: celeste, I, 310. — diurética alcanforada, I, 312. Alcoholado de extracto oleo-resinoso de cubebas, I, 335. Bolos: antigonorráicos, I, 385. — astringentes, I, 386 y 387. — de copaiba, I, 390. —

de cubebas, copaiba y trementina de Puche, I, 397. — fortificantes de Desbois, I, 396. — de Puche, I, 397. Candelillas: mercuriales solubles de Hecker, I, 410. — de potasa cáustica, I, 410. Confites de Keisser, I, 486. Electuarios: anti-
 blenorragico, I, 510. — antiblenorrágico, I, 511. — de cubebas, I, 521. Elixires: antiblenorrágico, II, 3. — antivenéreo de Lemort, II, 4. Emulsiones: alcanforada y nitrada, II, 53. — antigonorreica de Graef, II, 54. — astringente de Cadet, II, 54. — calmante de Fages, II, 55. — de copaiba, II, 56. — de cubebas de Beral, II, 58. — nitrada compuesta, II, 59. — de extracto oleo-resinoso de cubebas de Beral, II, 97. Fomento de vino aromático con tanino de Ricord, II, 119. Granos de catecú, II, 152. Inyecciones: aluminosa para la uretra de Ricord, II, 176. — astringente, II, 177 y 178. — astringente contra la gonorrea crónica, II, 179. — astringente de la F. E., II, 178. — astringente de los H. M., II, 178. — astringente de Swediaur, II, 179. — anodinas, II, 176. — clorurada, II, 181. — de acetato de plomo para la uretra, de Ricord, II, 174. — de acibar de Bories, II, 175. — de Clarck, II, 181. — de cubebas de Chevallier, II, 182. — de Girtanner, II, 183. — de tanino de Ricord, II, 188. — de Whately, II, 189. — emoliente, II, 182. — calmantes, II, 180. — iodada de Velpeau, II, 183. — irritante, II, 184. — mercurial, II, 184. — mercurial de Bromfield, II, 185. — narcótica, II, 185. — oleo-calcárea de Dupuytren, II, 186. — para la blenorrea de los H. de M., II, 186. — sedante, II, 187. — sedante de Guerin de Mamers, II, 187. — sedante de Hamilton, II, 187. Jarabes: de bálsamo de copaiba, II, 217. — de estoraque

de Lheritier, II, 241. — de horchata, II, 209. Jarabe de sub-carbonato de potasa de Puche, II, 266. — calmante de Ricord, II, 221. — ferruginoso con ratania de Ricord, II, 244. — gomoso de copaiba de Puche, II, 246. — sulfúrico alcoholizado de Friad, II, 267. — sedante, II, 265. Lavativas: alcanforada de los H. M., II, 289. — antigonorréica de Velpeau, II, 291. — con el bálsamo de copaiba, II, 295 y 296. — de copaiba de Ricord, II, 296. — de cubebas de Velpeau, II, 297. — emolientes, II, 298. — opiada alcanforada de Ricord, II, 302. Leche terebintinada, II, 306. Licor aluminoso compuesto, II, 307. Limonada ferruginosa y astringente, II, 319. — Mermelada astringente de Olier, II, 369. Misturas: astringente de Lallemand, II, 384. — balsámica de Fricke, II, 385. — balsámica de Fuller, II, 385. — brasileña contra la gonorrea, II, 386. — brasileña en pasta, II, 387. — brasileña líquida de Lepère, II, 386. — contra la gonorrea de Lisemann, I, 391. — de Cronier, II, 393. Opiatas: de Larrey, II, 413. — de Martinier, II, 414. Píldoras: aluminosas, II, 459. — antiblenorrágicas, II, 462. — antiblenorrágicas de Gall, II, 463. — antigonorréicas, II, 470. — astringentes de Capuron, II, 483. — astringentes de Cavarra, II, 484. — astringentes de Cullerier, II, 485. — astringentes de los H. de M., II, 484. — astringentes de Swediaur, II, 483. — astringentes de Walch, II, 484. — astringentes y calmantes de Dupuytren, II, 485. astringentes, II, 486. — balsámicas, II, 487. — contra la blenorragia, II, 502. — de Carlos Bell, II, 494. — de copaiba mercuriales de los H. M., II, 506. Pastillas de geng-seng, II, 441. — de los tres diablos

de Maetzius, II, 508. — mercuriales del Dr. Estor, II, 540. — de Quarin, II, 553. — de Sainte Marie para terminar la gonorrea, II, 555. — de Valett con cubebas de Puche, II, 564. Pirotomide, II, 566. Pociones: alcanforada, II, 569. — antigonorreica de Delpech, II, 577. — astringente, II, 582. — astringente de Pradel, II, 583. — balsámica de Choppard, II, 584. — Capivi de Willis, II, 587. — nitrada, II, 615. Polvos: diuréticos, III, 33 y 34. — atemperante, III, 33. — diurético ó tisana seca, III, 34. — de nitro alcanforado de Swediaur, III, 58. — refrigerantes y diuréticos, III, 66 y 67. — tónico y astringente de Otto, III, 71. Pomada antiostrálmica de Guthrie, III, 84. Supositorio de copaiba de Colombat, III, 168. Tinturas: de antimonio de Jacobi, III, 194. — de extracto oleo-resinoso de cubebas de Beral, III, 205. — de nuez de agalla compuesta de Lepère, III, 213. Tisana refrigerante y atemperante en polvo, III, 237. Vinos: anti-leucorréico, III, 317. — de Fordyce, III, 326. Suspensorio en el hombre.

Bocio. V. Escrófulas. Aguas iodadas de Lugol, I, 319. Collar de Morand, I, 470. Disoluciones: de hidriodato de potasa de Magendie, I, 504. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, I, 504. Etiope vegetal de Russel, II, 108. Jalea de fuco de Russel, II, 199. Pastillas de Dubois, II, 439. Píldoras: de iodoforma, II, 529. — de ioduro de hierro, II, 531. — de ioduro de potasio, II, 532. Pomadas: crisócrona, III, 103. — de hidriodato de amoniaco de Bielt, III, 111. — de hidrobromato de potasa, III, 113. — de hidriodato de potasa de los II. de M., III, 112. — de hidriodato de potasa de Magendie, III, 112. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, III, 113.

— de iodato de zinc, III, 117. — de iodo, III, 115. Poción con el bromuro de potasio, II, 585. Pomadas: hidriodatada, III, 111. — hidriodatada é iodorada de Bielt, III, 111. — iodoradas, III, 115. Polvos de esponja compuestos, III, 41. Preparaciones: de iodo, I, 203. — de oro, I, 236. — mercuriales. Remedio del Dr. Coindet de Ginebra, III, 148. Saquito resolutivo, III, 157. Tabletas: contra el bocio de Dubois, III, 176. — de esponja tostada, III, 176. Tinturas: de iodo, III, 208. — de iodo de los H. M., III, 208. Vino tónico amargo de Cottereau, III, 330.

Broncorrea. Bálsamos: del Perú, I, 120. — de Tolú, I, 120. Polígala, I, 244. Poción expectorante, II, 601. Jarabes expectorantes. Julepe expectorante, II, 279. Preparaciones de copaiba, I, 119.

Bronquitis aguda y bronquitis crónica. Emisiones sanguíneas. Emolientes, III, 446. Opio y sus productos, I, 234. Maná, I, 219. Lactucario, I, 212. Tridacio, I, 285. Preparaciones: de cicuta, I, 151. — de opio, I, 234. — expectorantes. — de mirra, I, 225. — de ánula campana, I, 176. — de polígala, I, 244. — de ácido hidrocianico, I, 87. — de benjui, I, 124. Bálsamos: del Perú, I, 120. — de Tolú, I, 120. Aguas sulfurosas naturales y artificiales, III, 346. — de brea, I, 129. — destilada de laurel real, I, 312. — sulfurosa compuesta, I, 329. Apocema tónico y dulcificante de Barthez, I, 346. Bebida anticitarral, I, 370. — pectoral de Cottereau, I, 378. Bolos: contra los catarros de Bally, I, 389. — de Pringle, I, 397. — escitantes, I, 393. — expectorantes, I, 393. Caldos: anticitarral de Riviere, I, 401. — pectorales, I, 406. Cocimientos: de cebada compuesto de la F. E., I, 450. — pectoral de la F. E., I, 457. Cocimiento pectoral

de los H. de M., I, 458. Cremas: pectoral de Cottreau, I, 490. — pectoral de Jeannet de Longrois, I, 490. — pectoral de Huc, I, 491. — pectoral de Pierquin, I, 491. — pectoral de Tronchin, I, 491. Chocolates: de liquen, II, 161 y 162. — de liquen de Robinet, II, 161. Disoluciones: amoniaca de los H. de M., I, 497. — arábica de los H. de M., I, 498. Electuarios: antiaquético de Ward, I, 511. — béchico de Fee, I, 520. Emplastos: de digital, II, 33. — de pez, II, 43. — de pez de Borgoña, II, 44. — emetizado de Lespinasc, II, 34. Emulsiones: aceitosa, II, 52. — balsámica, II, 54. — de Brunero, II, 55. Especies: béchicas, núm. 1.º, II, 79. — béchicas, núm. 2.º, II, 79. — para té, II, 84. — pectorales de Wirttemberg, II, 83. Eter balsámico de Tolú, II, 102. Fumigaciones: de brea, II, 123. — resinosa, II, 125. Hidrocloro medicinal, I, 155. Hidromeles: anticatarral, II, 157. — espectorante, II, 158. Infusiones: acuosa de opio de Chaussier, II, 164. — béchica, II, 165. Jabon estibiado, II, 192. Jaleas: de cuerno de ciervo de Ferrez, II, 197. — de liquen, II, 200. — de liquen de Berál, II, 201. — de liquen de Coldefi, II, 201. — de lombarda, II, 202. — laxante, II, 199. Jarabes: compuesto de erisimo de la F. E., II, 240. — de acetato de morfina de Magendie, II, 205. — de hálamo de copaiba, II, 217. — de beleño de A. Chevallier, II, 217. — de caracoles de Figuier, II, 221. — de Desessart, II, 237. — de diacodion, II, 236. — de Gardane, II, 238. — de hidrocianato de potasa, II, 249. — de hígado de azufre, II, 249. — de hisopo, II, 248. — de ipecacuana. — de nicociana de Lamure, II, 252. — de puntas de espárragos de A. Chevallier,

II, 260. — de sapos, II, 264. — de tridacio, II, 268. — emético de Morgan, II, 239. — pectoral balsámico de Charles, II, 255. — pectoral contra el coqueluche, II, 256. — pectoral de Bouvart, II, 255. — pectoral de Courti, II, 256. — pectoral de Dumas, II, 257. — pectoral de Maloet, II, 258. — pectoral de Rivet, II, 258. — pectoral dulcificante de Selle, II, 257. — pectoral inglés, II, 257. — resolutivo de Selle, II, 263. — sedante, II, 265. Julepes: con el ácido benzóico, II, 276. — espectorante, II, 279. — estimulante y ligeramente anodino de Gall, II, 279. Leche amoniaca, II, 304. Liniméntos: de ajo, II, 324. — sedante de Cottereau, II, 345. Loocs: aceitoso, II, 359. — amari- llo, II, 359. — blanco, II, 361. — compuesto, II, 362. — de Gordon, II, 363. — dulcificante de Gaubius, II, 362. — pectoral, II, 364. — verde, II, 365. Manjar blanco, II, 365. Mer- meladas: de Tronchin, II, 370. — de Zanetti, II, 370. Mezclas: pectoral de Magendie, II, 374. — pectoral de Villermé, II, 375. Misturas: anti- catarral rusa, II, 380. — balsámica de Fuller, II, 385. — pectoral de Boerhaave, II, 401. — de Werlhof, II, 408. Ojimeles: escilítico de la F. E., II, 418. — pectoral de Edimburgo, II, 418. — pectoral de los Daneses, II, 419. — simple de la F. E., II, 419. Opiatas: antitubercu- losa de Dufresnoy, II, 410. — de Michu, II, 415. Pastas: de azufre, II, 425. — de caraco- les de Figuiet, II, 426. — de goma arábiga, II, 429. — de liquen de Henri, II, 430. — de li- quen de Robinet, II, 430. — de regaliz blanca, II, 433. — de regaliz parda, II, 433. — de re- galiz negra, II, 433. — pectoral balsámica, II, 431. — pectoral de boses de vaca de Gage, II,

432. — pectoral de Parmentier, II, 432. Pastillas: contra el romadizo de Lepère, II, 438. — contra la tos de Lepère, II, 438. — de Chaussier, II, 442. — de emetina pectorales de Magendie, II, 439. — de goma arábica, II, 441. — de ipecacuana de L. C. Cadet, II, 443. — de Lepère, II, 438. — de malvabisco, II, 444. — de malvabisco de la F. E., II, 445. — de maná, II, 445. — de petitre de Lacombe, II, 448. — pectorales, incisivas y calmantes de Jobard, II, 448. — de tridacio, II, 451. Píldoras anticatarrales de Pariset, II, 463. — anticatarrales y calmantes de Petit, II, 464. — antitísicas, II, 480. — astringentes, II, 483. — balsámicas de Boerhaave, II, 487. — balsámicas de los H. de M. II, 487. — balsámicas de Morton, II, 487. — de cianuro de potasio de Bally, II, 497. — de cinoglosa, II, 498. — de clorhidrato de morfina, II, 499. — de escila compuestas, II, 514. — de trementina cocida, II, 561. — de trementina oficinales, II, 561. — espectorantes, II, 516. — incisivas de Cadet, II, 528. — incisivas de J. J. Leroux, II, 528. — sudoríficas calmantes de Dumeril, II, 556. Pociones: aceitosa, II, 568. — béchica, II, 585. — calmantes, II, 585 y 586. — de cianuro de potasio de Bally, II, 588. — de hidriodato de potasa y ácido hidrocianico de Fermon, II, 607. — de ipecacuana de Haller, II, 610. — del Dr. Mougénot contra la afección, II, 597. — escilítica, II, 600. — espectorante, II, 601 y 603. — gomosa de los H. M., II, 606. — incindente de los H. M., II, 609. — iodurada de Fermon, II, 609. — kermelizada, II, 612. — pectoral aceitosa de Virey, II, 616. — pectoral amarga, II, 617. — pectoral de los H. M., II, 616. — pectoral de Magendie, II, 617 y 618.

Jar. sedante, II, 622. Polvos: anticatarral, III, 4. — calmante de Cottereau, III, 18. — contra el coqueluche y catarro nervioso, III, 25. — de escila compuesto, III, 40. — de escila compuesto de Stahl, III, 40. — de Hirschel, III, 53. — de liquen azucarado, de Robinet, III, 56. — de Quarín contra la tos convulsiva, III, 65. — estibioopiado, III, 42. — espectorante de Recamier, III, 41. — incisivo, III, 40. — incisivo de Mongenot, III, 53. — pectoral de Wedel, III, 62. — atemperante y laxante de Bonillon-Lagrange, III, 70. Pomada de Autenrieth, III, 87. Racaout de los Árabes, III, 137. Sacarolado de gelatina de liquen, III, 156. Tabletás: anticatarrales de Tronchin, III, 171. — de azufre, III, 172. — de bálsamo de Tolú, III, 173. — de Calabria de Manfredi, III, 173. — de carbon y chocolate de A. Chevallier, III, 174. — de gelatina de liquen, de Beral, III, 177. — de kermes, III, 178. — de liquen de Robinet, III, 177. — incisivas pectorales, III, 178. — Tinturas: anisada de Alibert, III, 191. — de felándrio de Martius, III, 206. — etérea de digital purpúrea, I, 48. Tisanas: de amapolas, I, 35. — de Buchan, III, 226. — de culantrillo, I, 34. — de dátiles, I, 36. — de enebro, I, 36. — de felándrio, I, 36. — de gordolobo, I, 35. — de hisopo, I, 34. — de lino, I, 36. — de malva, I, 35. — de malvabisco, I, 35. — de melisa, I, 35. — de polígala, I, 33. — de tusílagó, I, 35. — de verónica, I, 34. — de violetas, I, 35. — de yedra terrestre, I, 35. — pectoral, III, 236. Triaca magna, I, 526.

Bubon venéreo indolente. V. Sífilis. Preparaciones de iodo. Emplastos: antivenéreo de Boerhaave II, 25. — emetizado del Dr. Lespinasse, II, 34.

Emp. fundente de Cottereau y Verdé-Delisle, II, 36. — resolutivo, II, 48. Chorros, I, 71. Fomentos de sal amoniaco. Tintura de iodo debilitada de Ricord, III, 209. Ungüento de la mère de la F. E., III, 291. Ventosas secas. Rubefacientes, III, 419. Vejigatorios, III, 303. Punción.

Bubon venéreo inflamatorio. V. Sífilis. Dieta. Emisiones sanguíneas. Bebidas mucilaginosas. Baños, I, 69. Cataplasmas: de fécula, I, 417. — resolutiva de Kerndel, I, 421. Fomentos de tintura de iodo. Emplasto mercurial de Vigo, II, 41. Pomadas: crisócroma de Cottereau y Verdé-Delisle, III, 103. — con los calomelanos, III, 104. — de calomelanos, III, 92. — de fosfato de mercurio de Albano, III, 109. — de iodo, III, 113. — de proto-ioduro de mercurio de Bielt, III, 128. — de proto-ioduro de mercurio de Magendie, III, 128.

Caidas. V. Contusiones.

Caida del recto. Supositorio fortificante de Reuss, III, 169. Disolución acuosa de extracto de nuez vómica. Operación.

Calambres de estómago. V. Gastrodinia.

Calambre doloroso de la cara. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Píldoras: de acetato de morfina, II, 455. — de Meglin, II, 537. Opio y preparaciones opiadas, I, 234. Electricidad, I, 173.

Cálculos biliares. Preparaciones de esencia de trementina, I, 178. Acetato de potasa, I, 83. Aguas salinas termales, III, 376. Baños emolientes, I, 366. Eter nítrico terebintinado de Leschenault de Latour, II, 104. Jabón medicinal, II, 193. Lavativas emolientes, II, 298. Misturas:

de Whitt, II, 407. — litontríptica de Durande, II, 398. Píldoras de Tronchin, II, 563. Zumo de yerbas fundente de Honoré, III, 333.

Cálculos urinarios. Litotricia. Litotomía. Agua. Alcalinos. Magnesia, I, 218. Baños, I, 69. Aguas: minerales, III, 335. — de Bussang, I, 308. — de sosa carbonatada, I, 328. — diurética alcanforada, I, 313. — diurética alcanforada de Fuller, I, 313. — gaseosa simple, I, 318. Bebida de bicarbonato de sosa de Robiquet, I, 375. Cerveza diurética inglesa, I, 434. Jabón medicinal, II, 193. Jarabá de sub-carbonato de potasa de Puche, II, 266. Lejía litontríptica de Saunders, II, 306. Licor antinefrítico de Adams, II, 310. Litontríptico de Tulp, II, 350. Pastillas de bicarbonato de sosa, II, 436. Píldoras de trementina magistrales, II, 562. Poción litontríptica, II, 613. Ratafia del comendador de Coumartin contra las arenillas, III, 138. Tábletas de ácido láctico de Magendie, III, 171. Tintura legivial de Vogler, III, 210. Tisanas: alcalina, III, 221. — contra la piedra, III, 228. — diurética de Recamier, III, 231.

Calenturas adinámicas. V. Fiebre adinámica. — atáxicas. V. Fiebre atáxica. — nerviosas. V. Fiebre atáxica. — nerviosas y pútridas. V. Fiebres atáxicas y adinámicas.

Callos. Desgastarlos frotando con piedra pomez, con una lima, &c., ó bien quitarlos por capas, con un cortaplumas ó navaja de afeitar. Emplastos: de gálbano simple de la F. E., II, 38. — de jabón, II, 33. — de gálbano crocado de la F. E., II, 38.

Cánceres y carcinomas. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Opio, I, 234. Preparados de opio. Pre-

paraciones: de cicuta, I, 251. — de acónito, I, 93. — de iodo, I, 203. Agua vulneraria, I, 331. Alcoholaturo de jugo de belladona, I, 333. Cataplasmas: de cicuta, I, 251. — narcótica, I, 419. Cerato de laurel real, I, 427. Disoluciones: de arseniato de amoniaco, I, 438. — de Heincke, I, 503. — de hidriodato de potasa de Magendie, I, 504. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, I, 504. Emplastos: anodino-calmanete de Boerhaave, II, 24. — de beleño, II, 26. — de belladona de Planche, II, 26. — de cicuta, II, 28. — de cicuta de los H. M., II, 29. — de estramonio, II, 26. — de goma amoniaco, II, 39. — de goma amoniaco compuesto, II, 39. — de Pissier contra los cánceres, II, 47. — fundente y sedante de Dupuytren, II, 37. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Fomento narcótico, II, 115. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Inyeccion calmante y astringente de Gall, II, 180. Ioduro de hierro, I, 205. Licores: anticancerosa de Kapeler, II, 308. — arsenical de Fowler, II, 311. Linimentos: arsenical, II, 331. — de Pissier, II, 242. Locion hidrociánica de Magendie, II, 356. Mezcla para lociones de Magendie, II, 374. Mistura calmante de Houlton, II, 388. Pastas: antimonial de Canquoin, II, 425. — cáustica de Fray Cosme, II, 427. Píldoras: contra los infartos glandulosos crónicos, II, 505. — de arseniato de hierro de Bielt, II, 481. — de belladona ioduradas, II, 489. — de cicuta ioduradas, II, 497. — de cicuta y quina, I, 498. — de iodoforma, II, 529. — de ioduro de plomo cristalizado de Cottureau y Verdé-Delisle, II, 529. Polvos: arsenical de Justamond, III, 14. — arsenical de Pluncquet, III, 14. — arsenical de Rouselot, III, 15. — be-

nedictos de Loeches , III, 17. — de Dupuytren, III, 36. Pomadas: calmantes , III, 92 y 93. — crisócroma de Cottereau y Verdé-Delisle , III, 103. — de arseniato de sosa , III, 87. — de belladona , III, 89. — de ioduro de arsénico de Biett, III, 115. — de James, III, 118. — de lupulina de Freake , III, 119. — resolutive , III, 129. — resolutive de Biett , III, 130. — resolutive de Dupuytren , III, 130. — resolutive de Sandelin , III, 131. — ioduradas , III, 115. Tópico calmante de Thompson , III, 243. Trociscos de minio , III, 273. Ungüentos: de lúpulo de Swediaur , III, 289. — madurativo de Canquoin , III, 289. Compression. Amputacion.

Cáncer de la matriz. V. Cánceres. Disolucion saturada de nitrato de plata , I, 508. Inyeccion calmante y astringente de Gall , II, 180. Mezcla para lociones de Magendie , II, 374. Mistura calmante de Recamier , I, 388. Pomada crisócroma de Cottereau y Verdé-Delisle , III, 103.

Caquexia. V. Astenia, atonía y tónicos. Agua de magnanimidad , I, 321. Bálsamo de vida de Hoffmann , I, 363. — sajón , I, 360. Baño aromático de Bally , I, 365. — aromático de los H. M. , I, 366. — facticio de Plombieres , I, 366. Chocolate á la polenta de Cadet de Vaux , II, 162. — analéptico de salep , II, 159. — con vainilla , II, 161. Electuario anticaquético de Ward , I, 511. Elíxir resolutive de Selle , II, 15. Hidroclorato de amoniaco y hierro , II, 156. Infusion de hollin compuesta de Piderit , II, 169. Jalea de sagú , II, 203. — de salep , II, 203. Jarabe calibeadado de Willis , II, 220. — vinoso cardiaco de Wirtemberg , II, 271. Lavativa nutritiva , II, 302. — nutritiva de Nasse , II, 302. Mistura de mirra alcalizada de Griffith , II, 399. — analépti-

ca de Lewis, II, 379. Osmazomo, II, 416. Pastillas ferruginosas de Bailly, II, 440. Píldoras calibeadas, II, 491. — de almendras amargas, II, 458. — de amoniaco, II, 460. — fundentes de Roucher, II, 522. — marciales de Koempf, II, 535. Polvo caquético de Hartmann, III, 19. — de antimonio marcial diaforético de Keup, III, 9. — purgante y diurético de Lescure, III, 64. Palamoud, II, 420. Racahout de los árabes, III, 137. Tintura vinosa de hierro tartarizada de la F. E., III, 218.

Caquexia hemorrhoidal. V. Hemorroides.

Caquexia hidrópica. V. Hidropesías.

Carcinomas. V. Cánceres.

Cardialgia. Canela, I, 135. — del Malabar, I, 135. Cascarilla, I, 144. Corteza de Winter, I, 165. Clavo, I, 154. Cardamomo mayor y menor, I, 141. Cúrcuma, I, 168. Cálamo aromático, I, 134. Gengibre, I, 192. Nuez moscada, I, 232. Eter y preparaciones etéreas, I, 183. Magnesia, I, 218. Macis, I, 217. Pimienta, I, 242. Zedoaria, I, 322. Agua destilada de almendras amargas, I, 311. — destilada de laurel real, I, 312. Chocolate marcial de Trousseau, II, 162. Emplasto de estoraque estomacicon de la F. M., II, 35. Epitema de triaca, I, 69. Electuario grande triacal de la F. E., I, 526. — triacal de la F. E., I, 532. Jarabe ciánico, II, 225. Julepe moscado de Fuller, II, 282. Linimento antiespasmódico de Selle, II, 329. — sedante de Cottereau, II, 345. Mezcla de cianuro de zinc de Magendie, II, 371. Mistura con la creta, II, 389. Mistura de magnesia aromática, II, 399. Píldoras antieméticas de los H. M., II, 466. — antiespasmódicas de Lombart, II, 468. — anti-gastrálgicas de Trousseau, II, 470. — de iodu-

de zinc y morfina, II, 532. — de nitrato de plata de Ruel, II, 545. Poción absorbente de los H. M., II, 567. — antiácida, II, 572. — del Doctor Audry, II, 596. — antiemética, II, 574. Polvo anodino de Helvetius, III, 2. — antigastálgico, III, 8. — contra el eretismo de los nervios del estómago de Wendt, III, 26. — contra los calambres de estómago de Wendt, III, 27. — de carbonato de magnesia, III, 20. — de carbonato de magnesia con la sosa de Nicolai, III, 20. — de creta con ruibarbo de Nicolai, III, 29. — del Doctor Odier, III, 34. — de Roberto Thomas, III, 67. — de ruibarbo y magnesia, III, 68. Pomada antiespasmódica de Golfín, III, 81. Té tunka, I, 185. Tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. — calmante de Herisson, III, 196. — volátil de guayaco, III, 220.

Caries. Cauterización. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Preparaciones de mirra, I, 225. Agua de creosota, I, 166. Cocimiento de hollín, I, 455. Inyección detersiva, II, 182. Jarabe de ácido fosfórico, II, 206. Tintura de acibar, I, 186.

Caries de las vértebras. Mal de Pott. V. Escrófulas. Moxas, I, 189. Preparaciones de cicuta, I, 151. Pomadas: calmante, III, 92. — de hollín, III, 113.

Caries de los dientes. V. Odontalgia. Bálsamo antidontálgico, I, 354. Enjuagatorio de ruda, II, 65. Masa odontálgica de Henry, II, 366. Mistura odontálgica, II, 400. Paraguay: con creosota, II, 422. — rojo, II, 424.

Carnes fungosas. V. Ulceras fungosas.

Carraspera. V. Angina.

Carreau. V. Escrófulas. Agua sulfurosa compuesta,

I, 329. Eter antimonial de Huxhan, II, 107. Hidroclorato de mercurio ferrurado de Hartmann, II, 156. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Ipecacuana á dosis refractas. Julepe amargo de Gall, II, 273. Mistura de Baumes contra el carreau, II, 385. Píldoras: anti-herpéticas, II, 472. — de acónito mercuriales de Duble, II, 457. — de iodoforma, II, 529. — de ioduro de plomo cristalizado de Cottreau y Verdé-Delisle, II, 529. — de óxido de oro de Chrestien, II, 546. — hidragogas, II, 525. — tónicas y laxantes de Swediaur, II, 560. — de Fordyce, III, 50. Tintura de malato de hierro, III, 211.

Catalepsia. V. Neurosis.

Catarata. Sedales. Purgantes, III, 440. Vejigatorios, III, 303. Colirios: tónico de Courti, I, 478. — de Newmann, I, 473. Emisiones sanguíneas. Operacion.

Catarros de la uretra. V. Catarro de la vejiga y del aparato urinario.

Catarro de la vejiga y del aparato urinario. Trementina, I, 284. Bálsamos: de la Meca, I, 120. — del Perú, I, 120. — de Tolú, I, 120. Aguas: diurética alcanforada, I, 312. — de Quercetan, I, 327. — diurética alcanforada de Fuller, I, 313. Cerveza diurética inglesa, I, 434. Emulsiones de trementina, II, 63. Especies diuréticas, II, 80. Inyecciones: de ictiocola con mirra de Dorfurt, II, 183. — de nitrato de plata, I, 230. — de nitrato ácido de mercurio, I, 230. Jarabe de sub-carbonato de potasa de Puche, II, 266. Licor antinefrítico de Adams, II, 310. Leche terebintinada, II, 132. Limonada ferruginosa y astringente, II, 319. Misturas: balsámica de Fuller, II, 385. — de Cromier, II, 393. Pirotoni-

de de Ranque, II, 566. Preparaciones de enebro, I, 175. Píldoras: de trementina cocida, II, 561. — de trementina magistrales, II, 562. — de trementina oficinales, II, 561.

Catarro intestinal. V. Diarrea.

Catarros pulmonales agudos. V. Bronquitis aguda.

Catarros pulmonales crónicos. V. Bronquitis crónica.

Cefalalgia. Hielo á la cabeza. Sedal. Moxas, I, 189. Vejigatorios, III, 303. Emisiones sanguíneas. Drásticos, III, 440. Aceites: de croton tiglio, I, 76. — de tártago, I, 80. Agua contra la jaqueca, I, 311. Cerveza cefálica inglesa, I, 433. Disoluciones: calmante, I, 500. — de arseniato de amoníaco, I, 498. — de Heincke, I, 503. Electuario antiespasmódico de Swediaur, I, 515. Emplastos: de tacamaca de la F. de P., II, 49. — de tacamaca de la F. M., II, 48. Esencia de Ward, II, 73. Frontales: anodino de la F. M., II, 120. — astringente, II, 120. — hinóptico, II, 120. Gotas cefálicas inglesas, II, 150. Infusion de valeriana de los H. de M., II, 173. Licor arsenical de Pearson, II, 311. Píldoras anticefálicas de Broussais, II, 464. Polvos: cefálico de tabaco, III, 22. — estornutatorio, III, 45. — estornutatorio ó de ásaro compuesto, III, 45. Baños de agua de mar, III, 387. Disoluciones: de cianuro de potasio. — de acetato de morfina. Aplicaciones del éter.

Cefalea. V. Cefalalgia.

Ciática. V. Neuralgias y Reumatismos. Bolo drástico, I, 392. Cataplasma isquiática de Willis, I, 418. Electricidad, I, 173. Emulsion de Quarin, II, 62. Preparaciones de esencia de trementina, I, 284. Opio y preparaciones de opio, I, 234.

Tiuntura de guayaco compuesta, III, 207.

Cicatrices de la córnea. V. Manchas de la córnea.

Cistitis aguda (Catarro agudo de la vejiga). Antiflogísticos. Opio y productos opiados, I, 234. Emulsiones: calmante de Fages, II, 55. — terebintinada, I, 284. Lavativa alcanforada de los H. M., II, 289. Leche terebintinada, II, 306. Licor antinefrítico de Adams, II, 310. Píldoras contra la cistitis, II, 502. Poción nitrada, II, 615. Polvo refrigerante y diurético, III, 66.

Cistitis crónica. V. Catarro de la vejiga.

Clavos. V. Diviesos.

Clorosis. Amargos, III, 425. Aguas minerales ferruginosas, III, 368. Preparaciones: de hierro, I, 200. — de mirra, I, 225. Acetatos: de amoníaco y hierro líquido, I, 300. — de peróxido de hierro, I, 300. Aguas: calibeada, I, 309. — de Bañares, I, 307. — de brea, I, 129. — de Bussang, I, 308. — gaseoso-ferruginosa de Colombat, I, 317. Alcoholados: de acetato de hierro, I, 333. — de citrato de hierro, I, 334. — de percloruro de hierro, I, 336. Apocema tónico de Babeyrac, I, 345. Baños: facticio de Plombières, I, 366. — de hidriodato de hierro, I, 367. Bebida ferruginosa, I, 376. Bolas de Marte, I, 381. Bolos fortificantes de Alibert, I, 396. Café de bellotas, I, 400. Citrato de peróxido de hierro, I, 437. Chocolate marcial de Trousseau, II, 162. Elixires: amargo de Dubois, II, 1. — americano de Courcelles, II, 1. — antiartrítico de la Isla de Francia, II, 2. Especies amargas, II, 78. Eterolado de percloruro de hierro de Beral, III, 204. Extracto de Marte, II, 96. Ioduro de hierro y quinina, I, 206. Jarabes: calibeado de Willis, II, 220. — de acetato de hier-

ro de Beral, II, 204. — de citrato de hierro de Beral, II, 228. Jarabes: de citrato de hierro de Trousseau, II, 228. — de citrato de potasa ferruginoso, II, 229. — de genciana, I, 244. — de genciana iodurado de Ricord, II, 244. — de percloruro de hierro de Beral, II, 259. Julepe alcanforado de la F. E., II, 272. Mistura de mirra alcalizada de Griffith, II, 399. Pan ferruginoso de Louvel, II, 421. Pastillas: de citrato de hierro, II, 437. — de chocolate y hierro reducido por el hidrógeno de Miquelard y Quevenne, II, 442. — de émula campana, II, 440. — de hidriodato de hierro, II, 442. — ferruginosas de Bailly, II, 440. Percloruro de hierro, I, 159. Píldoras: anticaquéticas de Dehaen, II, 463. — anticloróticas de Bland, II, 464. — calibeadas, II, 491. — de asa fétida é ioduro de hierro, II, 482. — de ioduro de hierro y quinina, II, 531. — de proto-carbonato de hierro de Valet, II, 548. — ferruginosas, II, 521. — marciales de la F. E., II, 536. — marciales de Koempf, II, 535. — marciales de los II. de M., II, 536. — tartáreas de Schroederer, II, 558. — tónicas de Stoll, II, 560. — tónicas y laxantes de Swediaur, II, 560. Poción ferruginosa, II, 605. Polvo anticlorótico de Dubois, III, 4. Pomada de hidro-bromato de hierro, III, 111. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 112. Sacarolado de citrato de hierro de Beral, III, 156. Polvo ferruginoso, III, 49. Tablettes marciales, III, 179 y 180. Tartrato de potasa y hierro, III, 184. Tintura de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 207. — de hollin, III, 208. — de malato de hierro, III, 211. — de marte tartarizada, III, 211. — etérea de acetato de hierro de Beral, III, 203.

— etérea de percloruro de hierro de Beral, III, 204. — vinosa de hierro tartarizada de la F. E., III, 218. Tisana de manzanilla, I, 35. Vinos: calibeado de Parmentier, III, 320. — de citrato de hierro de Beral, III, 321. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 327. — marcial de los H. de M., III, 320. Insolacion. Ejercicio. Buenos alimentos. Fricciones secas.

Cólera morbo asiático. Emisiones sanguíneas. Hielo, I, 187. Aceite de cajeput, I, 76. Eter, I, 183. Preparaciones etéreas. Ipecacuana, I, 209. Droga amarga de Virey, I, 509. Láudano líquido de Sydenham, II, 285. Lavativas: astringente, II, 293. — con dos escrúpulos de extracto de ratania. — de almidon. — de almidon con láudano. Limonadas: gaseosa en polvo, II, 322. — gaseosa líquida de Chatard, II, 320. Linimentos: estimulante rubefaciente de Petit, II, 338. — húngaro, II, 339. Mistura nitrosa y opiada contra la disenteria de Hope, II, 400. Opio y sus preparados, I, 234. Ponche. Píldoras: antieméticas de Fuller, II, 465. Pociones: antiemética de Chaussier, III, 574. — antiespasmódica, II, 576. — antitísica de Selle, II, 578. Polvos: de Sedlitz compuesto de Planche, III, 70. — de Sedlitz inglés, III, 69. Poción estimulante de Alibert, II, 602. Polvo purgante y atemperante, III, 64. Soda powder de Paris, III, 159. Tintura de nuez vómica amoniacal de Magendie, II, 214. Yerbabuena, I, 289. Sinapismos, III, 158. Vejigatorios, III, 303.

Cólera morbo esporádico. Opio y productos de opio. Bebidas emolientes. — frias. Fomentos emolientes, II, 113. Hielo, I, 187. Mistura tónica de Gall, II, 406. Láudano líquido de Sydenham, II, 285. Lavativas emolientes, II, 298.

Lavativa de almidon. — con láudano. Sinapismo sobre el epigastrio.

Cólico bilioso. Bálsamos: de vida de Hoffmann, I, 363. — tranquilo de Chomel, II, 362. Purgantes. Pociones antieméticas, II, 573 y 574. Mistura fundente de Mutzel, II, 396. Zumo de yerbas fundente, III, 333.

Cólicos de estómago. V. Cardialgia.

Cólico de los pintores. V. Cólico de plomo.

Cólico de plomo. Aceites: de croton tiglio, I, 76. — de tártago, I, 80. Elaterio, I, 172. Electuario purgante, I, 531. Estricnina, I, 182. Limonadas: sulfúrica, II, 323. — sulfúrica de los H. M., II, 323. Linimento antineuropático del Doctor Ranque, II, 330. Opio y preparaciones opiadas, I, 234. Oxicato de Andria, II, 417. Píldoras drásticas de Rayer, II, 511. Pociones aluminosas, II, 570. Tratamiento de la Caridad, III, 256. — del cólico de plomo de Martin Solon, II, 266. — del cólico de plomo de Ranque, III, 261. Baños, I, 69.

Cólicos hepáticos. V. Cálculos biliares.

Cólico nefrítico. V. Nefritis.

Cólico nervioso (Miserere). Antiespasmódicos, III, 436. Baños tibios, I, 69 y 70. Castóreo y sus preparados, I, 144. Opio y productos de opio, I, 234. Bálsamo anodino de Bath, I, 352. Bolos carminativos, I, 388. Electuarios: de escordio opiado de la F. E., I, 523. — opiado de beleño de la F. E., I, 529. Fomentos emolientes, II, 113. Lavativas emolientes, II, 298. Pociones: antiespasmódica anisada, III, 576. — antiespasmódica de los H. M., II, 577. Linimento antiespasmódico de Selle, II, 329. Poción de Spielmann, II, 623. Tinturas: alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. — anticólica de Palacios de la F.

E., III, 192. Tisana anticólica de la F. E., III, 221. — laxante de los H. de M., III, 221.

Cólico vegetal (cólico de Poitou). Antiflogísticos. Baños tibios, I, 70. Opio y sus productos, I, 234. Purgantes, III, 440.

Cólico ventoso. V. Flatuosidades. Bálsamos: anodino de Bath, I, 352. — de vida de Hoffmann, I, 363. Bolos carminativos, I, 388. Cocimiento carminativo de malvas de la F. E., I, 449. Esencia carminativa de Wedel, II, 71. Especies viscerales de Koempf, III, 85. Espiritus: de anís compuesto, II, 88. — de enebro compuesto, II, 88. — de espliego compuesto, II, 89. Eter nítrico alcoholizado, II, 104. Gotas amargas, II, 147. Lavativa carminativa de la F. M., II, 295. Linimentos: carminativo de Writt, II, 331. — volátil de Plenck, II, 387. Pastillas de salud de Delvincourt, II, 440. Píldoras: carminativas de Barthez, II, 494. — escilíticas de Chrestien, II, 515. Poción de Spielmann, II, 623. Polvo diaromatón inglés, III, 32. Tinturas: antiespasmódica de Keup, III, 193. — anticólica de Palacios de la F. E., III, 192. — de cardamomo compuesta, III, 107. — de hollín, III, 208. — de ruibarbo de Spielmann, III, 217. — de ruibarbo inglés, III, 217.

Cólicos de los niños. Especies carminativas de la F. M., II, 80. Jarabes: de achicorias compuesto, II, 207. — de flores de melocoton, I, 57. Leoc laxante, II, 364. Poción del Dr. Goelis, II, 597.

Coma. Preparaciones de almizcle, I, 107. Calor irritante de los H. de M., III, 169. Lavativas: de almizcle alcanforada, II, 290. — emetizada, II, 297. — estimulante de los H. de M., II, 298. — irritante de los H. M., II, 300. — irritante de vino antimoniado de la F. E., II, 300. Suposi-

torio irritante de la F. E., III, 169. Vino emético turbio de la F. E., III, 323.

Comezon, prurito. V. Herpes.

Condilomas. V. Escrescencias sifilíticas.

Congestion cerebral. V. Conmocion.

Congestiones sanguíneas. V. Apoplejías.

Conjuntivitis. V. Oftalmias.

— *escrofulosa crónica.* V. Oftalmia escrofulosa.

Conmocion. Emisiones sanguíneas. Sanguijuelas detrás de las orejas. Hielo á la cabeza. Bebidas atemperantes. Bebidas emetizadas. Aceite de ricino, I, 79. Acibar, I, 83. Lavativas: estimulante, II, 299. — irritantes, II, 300. — purgantes, II, 303. Limonada de cremor de tártaro, II, 319. Pediluvios: con el ácido hidroclórico, II, 452. — sinapizados, II, 454. Sinapismos, III, 158. Suero tamarindado, III, 165. Sulfatos: de magnesia, I, 271. — de sosa, I, 272. Vaca tamarindada, I, 277.

Constipacion. Granos de mostaza blanca, I, 227. Aceite de ricino, I, 298. Agua de Sedlitz artificial, I, 328. — de Trevez, I, 329. — fundente, I, 317. — magnesiana, I, 322. — gaseosa, I, 322. — purgante, I, 327. Bebidas emetizadas, I, 278. — laxantes, I, 377. Cerveza purgante, I, 435. — purgante de Sydenham, I, 435. — purgante inglesa, I, 435. Electuario de azufre, I, 519. Lavativa emoliente, II, 298. — emoliente de hojas de malva de la F. E., II, 298. — purgante, II, 302. Pastillas acídulas purgantes de Delvincourt, II, 435. — de eulorbio, I, 184. — de salud de Delvincourt, II, 449. Píldoras escocesas de Anderson, II, 515. — relajantes de Buchan, II, 554. — tónicas y laxantes de Svediaur, II, 560. Poción laxante de Fernel, II, 612. — de Viena, II, 613. Polvo de Sedlitz, III,

70. Purgantes, III, 440. Preparaciones de acibar, I, 83. Tisana de cañafistula, I, 137. — de tamarindos, I, 277. — purgante de los H. de M., III, 236. — real, III, 236. Zumo de yerbas purgante, III, 334.
- Constricción espasmódica de los esfínteres.* Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Opio, I, 234. Preparaciones de belladona, I, 123. — de beleño, I, 122. — de estramonio, I, 181. Pomada de belladona, III, 89.
- Consuncion.* V. Caquexia.
- Contorsiones.* V. Contusiones.
- Contracción espasmódica de la matriz.* Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Pomada de belladona, III, 89.
- Contracción espasmódica de la pupila.* Belladona, I, 123. Extracto de belladona, I, 123. Colirio de belladona, I, 466. Pomada de belladona, III, 99.
- Contracción espasmódica de la uretra.* Lavativa de belladona, II, 295.
- Contracturas.* Aguas salinas termales, III, 376. Alcoholaturo de jugo de belladona, I, 339. Baños de vapor, I, 69.
- Contusiones.* (Equimosis.) Emisiones sanguíneas. Agua de Alibour, I, 304. — del arcabuzazo de Theden, I, 306. — de bola, I, 381. — de magnanimidad, I, 321. — de Premier, I, 328. — tédiana de los H. de M., I, 306. — vegeto-mineral, I, 330. Alcoholato vulnerario, I, 337. Bálsamo del caballero de Laborde, I, 356. — samaritano de los H. M., I, 361. — samaritano de Tornamira, I, 361. — opodeldoc, I, 359. — líquido, I, 359. Bolas de marte, I, 381. Embro-

cacion amoniaca de Swediaur, II, 19. Esencia de Ward, I, 73. Fomento amoniaca alcanforado, II, 109. — aromático, II, 110 — de los H. de M., II, 110. — fortificante, II, 114. — jabonoso, II, 115. — resolutivo, II, 116. Linimento jabonoso de Koempf, II, 341. Fomento resolutivo de Richter, II, 117. — resolutivo fuerte de los H. de M., II, 117. — resolutivo suave de los H. de M., II, 117. Locion resolutiva, II, 357. Preparaciones de arnica, I, 113. Tintura aromática de arnica, III, 195. — vulneraria, III, 220. Tisana de arnica, I, 113. Ungüento blanco alcanforado, III, 280.

Convalecencia en general y

Convalecencia de las fiebres graves. Agua de Seltz, I, 328. Apocema amargo, I, 342. Bebida ferruginosa, I, 376. Caldo anticatarral de Riviere, I, 401. Cerveza de quina de Mutis, I, 436. — estomacal inglesa, I, 434. Chocolates: II, 159. — á la polenta de Cadet de Vaux, II, 162. — analéptico de arrow-root, II, 159. — analéptico de salep, II, 159. — blanco de Pierquin, II, 160. — con vainilla, II, 161. — de líquen, II, 161. — de líquen, II, 162. — de líquen de Robinet, II, 161. Elixir balsámico de Wverlhoff, II, 6. — balsámico, estomacal y atemperante de Hoffmann, II, 5. Eter sulfúrico marcial, II, 106. Infusion tónica de Courti, II, 172. Jalea de sagú, II, 203. — de salep, II, 203. Jarabe vinoso cardiaco, II, 271. Lavativa de Koempf, II, 300. — nutritiva, II, 302. — nutritiva de Nasse, II, 302. Limonada alcohólica, II, 318. — vinosa, II, 324. — vinosa alcohólica, II, 324. Manjar blanco, II, 365. Mixture analéptica de Lewis, II, 379. — de mirra alcalizada de Griffith, II, 399. Osmazomo, II,

416. Palamoud, II, 420. Pociones cordiales, II, 592 y 593. Polvo corroborante de Werlhoff, III, 28. — de Haly, III, 52. Racahout de los árabes, III, 137. Tabletillas de vida, III, 182. Tisana angélica, III, 226. — de Datisbuis, III, 228. Triaca, I, 526. Vino de Málaga. — de Borgoña. — estomacal de Plenck, III, 324. Wakaka de los indios, III, 332.

Convalecencia de las fiebres intermitentes. Bolos amargos, I, 383. Cocimiento amargo de camedrios de la F. E., I, 440. Especies amargas, II, 78. Píldoras de Plummer, II, 547.

Convulsiones de los adultos. V. Neuroses é histerismo. Disolucion de nitrato de plata, I, 507. Electuarios: astringente de los H. de M., I, 530. — peruviano antiépiléptico de Fuller de la F. E., I, 530. Julepe fétido de Barthez, II, 280. Linimento aromático de Rosen, II, 330. Píldoras: anti-espasmódicas de Piderit. — de cianuro de potasio, II, 497. — de nitrato de plata de Merat, II, 545. Poción calmante, II, 586. Polvos: anti-espasmódico, III, 7. — anti-espasmódico de Magendie, III, 7. — de Tunquin de Reuss, III, 73. Tintura de hollin de Edimburgo.

Convulsiones de los niños. Oxido de zinc, I, 238. Jarabe de achicorias, II, 207. Gotas alcalinas de Hamilton, II, 147. Licor amoniaco anisado, II, 307. Polvos anti-espasmódicos de Brachet, III, 7. — de la princesa de Cariñan, III, 62. Tinturas: de asa fétida compuesta, III, 196. — de hollin, III, 208. — de hollin fétida, I, 202.

Coqueluche. Acónito, I, 93. Asa fétida, I, 115. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Preparaciones: de beleño, I, 122. — de belladona, I, 123. — de estramonio, I, 181. — de cicuta, I, 151. Anti-espas-

médicos, III, 436. Preparaciones de ácido hidrocianico, I, 87. Alcoholaturo de jugo de belladona, I, 339. Elixir paregórico inglés, II, 13. Emplasto contra el coqueluche de Corsin, II, 31. Fumigaciones: de belladona, II, 122. — de estramonio, II, 125. Goma amoniaco, I, 192. Hidromel anticatarral, II, 157. Jarabes: contra el coqueluche, II, 231. — contra el coqueluche de Boullay, II, 232. — de belladona de Trousseau, II, 318. — de beleño de A. Chevallier, II, 217. — de Boullay, II, 222. — de codeina, II, 230. — de Gardane, I, 236. — de ipecacuana, I, 209. — de Lescure, II, 251. — del Dr. Desessart, II, 237. — del Dr. Gilet, II, 238. — de narciso de los prados, II, 253. — de sapos, II, 264. — emético de Morgan, II, 239. — pectoral, II, 256. — pectoral balsámico de Charles, II, 255. — pectoral de Bouvart, II, 255. — pectoral de Courti, II, 256. — pectoral de Dumas, II, 257. — pectoral de Maloet, II, 258. — pectoral de Rivet, II, 238. — pectoral dulcificante de Selle, II, 257. — pectoral inglés, II, 257. Julepes: calmante, II, 275 y 276. — calmante de Baron, II, 275. Lavativa de asa fétida, II, 293. Linimento de ajo, II, 324. Mistura de asa fétida de Kopp, II, 384. Pastillas: de emetina pectorales de Magendie, II, 439. — de ipecacuana de L. C. Cadet, II, 443. — de Lepère, II, 438. — de pelitre de Lacombe, II, 448. — pectorales, incisivas y calmantes de Jobard, II, 448. — calmantes de Koop, II, 492. — de asa fétida, I, 100. — de asa fétida y alcanfor, II, 481. — de belladona de Trousseau, II, 489. — sudorificas calmantes de Dumeril, II, 556. — tónicas y calmantes de Courti, II, 559. Pociones: béchica, II, 585. — contra el coqueluche de Buettner, II, 589. — contra el coqueluche de

Roberto Tomás de Salisbury, II, 590. — de Juan Roy, II, 610. — de Quarin, II, 622. — de Quarin contra la tos sufocativa, II, 622. — sedante, II, 623. Polvos: antiespasmódico de Brachet, III, 7. — contra el coqueluche, III, 24. — contra el coqueluche de Kahleiss, III, 24. — contra el coqueluche y el catarro nervioso, III, 25. — del Dr. Marc, III, 34. — de Quarin, III, 65. — sedante de Velzler, III, 69. Pomadas: de Autenrieth, III, 87. — estibiada de los H. de M., III, 88. — estibiada de los H. M., III, 88. Tabletás: anticatarrales de Tronchin, II, 171. — de Calabria de Manfredi, III, 173. Tintura anisada de Alibert, III, 191. Trociscos de Chaussier, III, 272.

Corea. Baños: frios, I, 90. — de agua de manantial. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Opio y productos opiados, I, 234. Castoreo, I, 144. Drásticos. Bolos de valeriana, I, 400. Linimento aromático de Rosen, II, 330. Píldoras: antiespasmódicas de Petit, II, 469. — antineurálgicas de Trousseau, II, 477. — de Merat, II, 537. — de Meglin, II, 537. — de ioduro de zinc y morfina, II, 532. — anticoreicas de Rasori, II, 554. Poción moscada de Dubois, II, 614. Polvos de Bresler, III, 18. Preparaciones de cicuta, I, 151.

Coriza. Fumigaciones aromáticas. Vejigatorio á la nuca. Pediluvios sinapizados, II, 463. Purgantes, III, 440.

Coroiditis crónica. V, Oftalmia.

Crup. Antiflogísticos. Alumbre, I, 267. Nitrato de plata, I, 230. Asa fétida, I, 115. Ipecacuana, I, 209. Tártaro emético, I, 280. Preparaciones de opio, I, 234. Cerato de Rechoux, I, 430. Gargarismos: clórico, II, 136. — hidroclórico, I,

141. Jarabes : amoniacal, II, 210. — de hígado de azufre, II, 249. — emético de Morgan, II, 239. Julepes : contra el crup, II, 276. — escocés, II, 279. Lavativa de asa fétida, II, 293. Mistura contra el crup, II, 390. Pastillas de Chaussier, II, 442. Pociones : anticrupal, II, 573. — contra el crup, II, 590. — de asa fétida de Millar, II, 581. — de Jadelot, II, 611. Polvo contra el crup de Weber, III, 25. Pomada rubefaciente, III, 131. Poligala, I, 244. Vejigatorio en el cuello. Revulsivos.

Debilidad de estómago. V. Dispepsia.

— *de los órganos genitales.* V. Anafrodisia.

— *general.* V. Astenia.

— *muscular.* V. Caquexia y parálisis.

Delirium tremens. Opio y sus productos, I, 234.

Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I,

123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Pre-

parados de almizcle, I, 107.

Descenso de la matriz. Inyeccion astringente, II, 178. Pesarios.

Desfallecimiento. V. Síncope.

Desinfectantes. V. Miasmas.

Diabetes sacarina. Disminuir la cantidad de pan y de los alimentos feculentos. Prescribir las carnes, los huevos, los pescados y las legumbres no feculentas; todo en cantidad moderada. Vinos generosos. Hacer aparecer las hemorroides, si se han suprimido. Opio y productos opiados, que obran moderando el apetito y por consiguiente disminuyen la cantidad de orina. Polvos de Dower, III, 35. Baños de vapor. Ejercicio. Cubrir al enfermo de franela.

Diarrea aguda. Antislogísticos. Opio y productos opiados, I, 234. Agua de arroz, I, 113. Bolos anodino-astringentes de la F. M., I, 383. Coci-

mientos : blanco gomoso de la F. E. , I , 448. — blanco de Sydenham de la F. E. , I , 449. — de Pringle , I , 453. — gomoso de los H. M. , I , 448. — gomoso tenue de cuerno de ciervo de la F. E. , I , 448. Lavativas: anodina de almidon de la F. E. , II , 290. — anodina de los H. de M. , II , 291. — de adormideras , II , 288. — de adormideras y almidon , II , 288. — de almidon y acetato de morfina , II , 289. Píldoras contra la diarrea , II , 502. Poción con clara de huevo de Ricord , II , 589. Lavativa de salvado. Polvos: absorbente , III , 1. — de Haly , III , 52. Remedios de Quarin , III , 151. Tisanas: de arroz gomosa , III , 224. — de arroz y catecú , III , 224.

Diarrea colicuativa de los tísicos. Acetato de plomo , I , 82. Opio y preparaciones opiadas. Lavativas: clorosa de Cottereau , II , 295. — contra la diarrea , II , 296. Poción contra la diarrea de los tísicos de Cottereau , II , 591. Lavativa de albayalde de Devergie , II , 289. Píldoras de acetato de plomo de Fouquier , II , 456. — estípticas de Dameril , II , 517. Poción antitísica de Ameling , II , 580. Polvo antitísico de Bories , III , 13.

Diarrea crónica. Tanino , I , 278, y otros astringentes. Alumbre , I , 267. Colombo , I , 163. Opio y sus preparaciones , I , 234. Ipecacuana , I , 209. Quasia amarga , I , 248. Catecú , I , 145. Ratania , I , 252. Goma kino , I , 193. Bistorta , I , 127. Extracto de ratania , I , 252. Agua alcalina gaseosa , I , 303. — aluminosa de la F. E. , I , 304. Apocemas: astringente , I , 343. — tónico y dulcificante de Barthez , I , 346. Baños: aromático de Bally , I , 365. — aromático de los H. M. , I , 366. Bebidas: astringente , I , 374. — de Koempf , I , 376. Bolos: astringentes , I , 386 y 387. — contra la diarrea crónica , I , 389.

Bolos de Pringle, I, 337. Cataplasma de vinagre y corteza de pan de la F. E., I, 423. Cocimientos: astringente de los H. de M., I, 447. — blanco gomoso de la F. E., I, 448. — blanco de Sydenham, I, 449. — gomoso de los H. M., I, 448. — gomoso tenue de cuerno de ciervo de la F. E., I, 448. Confeccion del Japon, I, 521. Conserva de rosas rojas, I, 488. Electuarios: anticaquético de Ward, I, 511. — astringente, I, 517. — astringente de Bally, I, 517. — astringente de Fuller de la F. E., I, 518. — de catecú compuesto, I, 521. — de escordio opiado de la F. E., I, 523. — peruviiano astringente de Fuller de la F. E., I, 531. — grandetriacal, I, 526. — triacal de la F. E., I, 532. Granos de catecú, II, 151. Jarabes: de catecú, II, 223. — de ratanía, II, 262. Julepe antidisentérico, II, 273. Láudano líquido de Sydenham de la F. E., II, 285. Lavativas: astringentes, II, 293 y 294. — astringente de la F. E., II, 294. — astringente de los H. M., II, 294. — con la clara de huevo de Ricord, II, 296. — contra la diarrea, II, 296. — de nuez de agalla opiada, II, 301. Licor antidiarréico de William Kerr, II, 308. Limonadas: sulfúrica, II, 323. — sulfúrica de los H. M., II, 323. Linimento aromático de Rosen, II, 330. Loocs: de almidon, II, 359. — gomoso, II, 363. Misturas: de creta compuesta de Brande, II, 390. — de ipecacuana y creta compuesta de Hoope, II, 398. — gomosa de sulfato de hierro de la F. E., II, 396. — nitrosa y opiada contra la disenteria de Hoope, II, 400. — para curar las grietas del ano, de Bretonneau, II, 401. — tónica de Gall, II, 406. Opiata astringente de Babeyrac, II, 410. Pastillas de catecú, de canela y de magesia, II, 437. Píldoras: astringen-

tes y calmantes de Dupuytren, II, 485. — estípticas de Dumeril, II, 517. Pociones: antidisentérica de Spielmann, II, 573. — astringente, II, 582. — astringente de Pradel, II, 583. — del Dr. William Kerr, II, 598. — tónica y estomacal, II, 625. Polvos: de creta compuestos, III, 29. — anodino de Helvetius, III, 2. — antidiarético, III, 5. — astringente, III, 16. — de carbonato de cal compuesto, III, 19. — de opio y creta, III, 60. — astringentes, III, 16. — restrictivos de ciprés de la F. E., III, 66. Suero aluminoso, I, 267. Subnitrate de bismuto, I, 266. Sulfato de magnesia, I, 271. Trementina, I, 284. Tisanas: de arroz, I, 36. — de ratania, I, 33. Vino de ruibarbo compuesto, III, 328. Lavativa con dos dracmas de tanino, ó dos escrúpulos de extracto de ratania ó dos escrúpulos de catecú.

Dificultad de menstruar. V. Amenorrea.

Difteritis. V. Crup.

Digestion difícil. V. Dispepsia é indigestion.

Dilatacion de los esfinteres. Inyecciones astringentes, II, 177 y 178. Pomada de la Cordesa, III, 96. Astringentes, III, 423.

Disenteria adinámica. Preparaciones: de quina, I, 249. — de ruibarbo, I, 256. Limonadas sulfúricas, II, 323.

Disenteria aguda. Antiflogísticos. Agua albuminosa, I, 303. Cocimientos: blanco de Sydenham de la F. E., I, 449. — blanco gomoso de la F. E., I, 448. — de Pringle, I, 459. — gomoso de los H. M., I, 448. — gomoso ténue de la F. E., I, 448. Lavativas: anodina de almidon de la F. E., II, 290. — anodina de los H. de M., II, 291. — de almidon, I, 289. Mistura nitrosa y opiada contra la disenteria de Hoope, II, 400. Poción con cla-

ra de huevo de Ricord, II, 589. Opio y preparaciones de opio, I, 234. Tisana de arroz gomosa, III, 224. Segun Mondiere las lavativas de agua albuminosa obran como específico de la disenteria.

Disenteria crónica. Bolos de Pringle, I, 397. Conserva de rosas rojas, I, 488. Electuarios: antidisentérico de Bochan, I, 512. — antidisentérico de Wilkerson, I, 512. — astringente de Barthez, I, 517. — de catecú compuesto, I, 521. — de escordio opiado de la F. E., I, 523. — grande triacal, I, 526. Ipecacuana, I, 209. Sulfato de magnesia, I, 271. Julepe antidisentérico, II, 273. Lavativas: astringente, II, 294. — astringente de Boerhaave, II, 294. — astringente de la F. E., II, 294. — astringente de los H. M., II, 294. — con media dracma de catecú ó un escrúpulo de extracto de ratania. Licor antidiarréico de William Kerr, II, 308. Loco astringente de Swediaur, II, 361. Misturas: calmante astringente de Monin, II, 387. — de ipecacuana y creta compuesta de Hoope, II, 398. — para curar las grietas del ano, de Bretonneau, II, 401. — tónica de Gall, II, 406. Opiatas: astringente de Babeyrac, II, 410. — astringente de Roucher, II, 411. Píldoras antidisentéricas de Willis, II, 465. Pociones: antidisentérica de Spielmann, II, 573. — astringente de Fouquier, II, 583. — astringente de los H. M., II, 583. — purgante y tónica de Roucher, II, 621. Polvos: anodino de Helvetius, III, 2. — de carbonato de cal compuesto, III, 19. — de creta compuesto, III, 29. Remedios de Quarin, III, 151. Tanino, I, 278 y las sustancias que le contienen. Tisanas: astringente de Chaptal, III, 225. — astringente de los H. M., III, 225. — de arroz y catecú, III, 224.

- Dismenorrea.** V. Amenorrea. Electuario opiado de beleño de la F. E., I, 529. Lavativa anodina de los H. de M., II, 291. Píldoras contra la dismenorrea de Pigeaux, II, 502. Preparaciones de castoreo, I, 144.
- Disnea.** V. Sufocacion. Aire comprimido. Antiespasmódicos, III, 436. Píldoras de cianuro de potasio de Bally, II, 497.
- Dispepsia.** Alcaravea, I, 102. Badiana, I, 118. Angélica, I, 111. Anis, I, 112. Cilantro, I, 153. Hinojo, I, 201. Eneldo, I, 176. Comino, I, 164. Yerbabuena, I, 289. Vainilla, I, 285. Triaca magna, I, 526. Genciana, I, 190, y otros amargos. Agua alcalina gaseosa, I, 303. Polvo para agua de Seltz artificial, I, 70. Agua espirituosa de Anhalt, I, 313. Ajenjo suizo, I, 331. Alcohol de quinina, I, 336. Alcoholado de cinchonina, I, 334. Alkermes líquido de los italianos, I, 341. Apocema amargo, I, 342. Bálsamos: de vida de Leliebre, I, 363. — sajón, I, 360. Baños: aromático de Bally, I, 365. — aromático de los H. M., I, 366. Bebidas: carminativa, I, 375. — ferruginosa, I, 376. Bolos: amargos, I, 383. — digestivos, I, 391. — estomacales, I, 394. — estomacales de Parmentier, I, 394. — de tartrato de hierro, I, 399. — fortificantes de Desbois, I, 396. — tónicos y estomacales, I, 399. — Café de bellotas, I, 400. Caldo de cangrejos de Astruc, I, 403. Cervezas: amarga, I, 432. — amarga de Mutis, I, 432. — antiescorbúlica, I, 433. — estomacal inglesa, I, 434. — purgante, I, 435. — purgante de Sydenham, I, 435. Cocimientos: amargo de comedrios de la F. E., I, 440. — de acibar compuesto, I, 439. Conserva de ajenjos, I, 487. Electuarios: anticaquetico de Ward, I, 511. — de catecú compuesto, I, 521. — de Fu-

ller, I, 525. — estomacal de Alibert, I, 524. Elíxires: balsámico de Werlhoff, II, 6. — balsámico, estomacal y atemperante de Hoffmann, II, 5. — de drogas amargas de los indios, II, 7. — de Garus, II, 11. — de larga vida, II, 11. — de Perylho, II, 13. — de propiedad de la F. E., II, 14. — estomacal de la F. E., II, 9. — estomacal de Stoughton, II, 8. — fortificante de Selle, II, 10. — sagrado, II, 15. — uterino de Crollius, II, 17. — visceral de Hoffmann, II, 18. Esencias: balsámica, II, 70. — carminativa de Wedel, II, 71. Especies: carminativas de la F. M., II, 80. — para té, II, 84. Espíritus: de anís compuesto, II, 88. — de espliego compuesto, II, 89. Extracto de enebro compuesto, II, 95. Gotas amargas, II, 147. Granos: de catecú, II, 151. — de salud, II, 152. — de vida de Mesué, II, 152. Infusiones: de genciana compuesta, II, 168. — fría de quina, II, 168. — tónica de Courti, II, 172. Jarabes: de catecú, II, 223. — de cinconina, II, 226. — de quinina, II, 262. — vinoso cardiaco, II, 271. Licor vital de Ruco, II, 317. Misturas: antieméticas, II, 380 y 381. — con la creta, II, 389. — contra la pirosis de Vogt, II, 392. — de creta compuesta de Brande, II, 390. — tónica de Dubois, II, 406. Opiata estomacal de Helvetius, II, 411. Osmazomo, II, 416. Pastillas: de bicarbonato de sosa, II, 436. — de catecú, de canela y de magnesia, II, 437. — mogólicas, II, 446. Píldoras: absorbentes de Chevallier, II, 455. — ante cibum, II, 461. — contra la dispepsia, II, 503. — de cinconina, II, 498. — de Maquiavelo, II, 535. — de Moscon, II, 560. — de sulfato de cinconina, II, 556. — de sulfato de quinina, II, 557. — escoceas de Anderson, II, 515. — estomacales, II, 517.

Píldoras estomacales de Cadet, II, 518. — estomacales de Smith, II, 519. — marciales de la F.E., II, 536. — marciales de los H. de M., II, 536. — purgantes y fundentes de Saifert, II, 552. — tónicas de Hula, II, 560. — tónicas de Stoll, II, 560. Pociiones: amarga, II, 570. — de sulfato de cinchonina, II, 557. — de sulfato de quinina, II, 623. — efervescente de Chaussier, II, 598. — estimulante aromática, II, 604. — estimulante de Alibert, II, 602. Poción estomacal, II, 604. — tónica y estomacal, II, 625. Polvo de creta compuesto, III, 29. — de creta con ruibarbo de Nicolai, III, 29. — de Haly, III, 52. — del Doctor Odier, III, 34. — de Nicolai, III, 29. — de opio y creta, III, 60. — de Rosen de Rosenstein, III, 68. — de ruibarbo opiado, III, 68. — diaromaton inglés, III, 32. — digestivo compuesto, III, 33. — digestivo simple de Duc, III, 33. — estimulante, III, 42. — estimulante y nutritivo, III, 42. — estomacal, III, 44. — narcótico y tónico de Marc, III, 58. — tónico, III, 71. — tónico de Borries, III, 72. — tónico incisivo de Lassone, III, 72. Tabletillas de ácido láctico de Magendie, III, 171. Té de Suiza. — de tunka, III, 185. Tinturas: de cardamomo compuesta, III, 197. — de espliego compuesta, III, 201. — de malato de hierro, III, 211. — de ruibarbo de Spielmann, III, 217. — de ruibarbo inglés, III, 216. — estomacal, III, 202. — estomacal amarga, III, 201. — estomacal de Moscati, III, 203. — nerval y tónica, III, 212. — sagrada, III, 217. Tisana de cáscara de naranja amarga, I, 36. — de Datisbuis, III, 228. — de quina, I, 33. Vinos: amargo aromático de Lazermé, III, 314. — amargo de Dubois, III, 314. — amargo y diurético de Corvisart, III, 315. — amargo y diurético

de la Caridad, III, 315. — de ajeno, III, 313. — de cinchonina, III, 320. — de quinina, III, 330. — de ruibarbo compuesto, III, 328. — estomacal de Plenck, III, 324. Wakaka de los indios, III, 332.

Disuria. V. Iscuria. Antillogísticos. Cataplasma contra la iscuria, I, 416. Poción diurética y calmante, II, 595. — diurética de Buchard, II, 595. Tintura volátil de guayaco, III, 220.

Diviosos. V. Absceso agudo. Escarificaciones ó mejor incisiones cruciales profundas. Escisión de las partes gangrenadas. Emplasto de gálbano crocado de la F. E., II, 38. — de gálbano simple de la F. E., II, 38. — para los clavos de los pies, II, 29. — de Canet, II, 26. — fundente de Lamotte, II, 37. Ungüento de la mère, III, 291. Ungüento amarillo, III, 279.

Dolores. Opio y preparaciones opiadas, I, 234. Lactucario, I, 212. Morfina, I, 226. Acetato de morfina, I, 82. Preparaciones de acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Bálsamo anodino de Bath, I, 352. — de vida de Hoffmann, I, 363. Disolución de acetato de morfina de Magendie, I, 496. Jarabe de meconio de la F. E., II, 253. Linimentos narcóticos, II, 342. Mixture calmante de Roux, II, 388. Píldoras anodinas de Recamier, II, 460. — de acetato de morfina, II, 455. — de codeína, II, 500. — de codeína de Magendie, II, 501. Poción calmante, II, 586. Tridacio, I, 285. Triaca magna, I, 526.

Dolores cólicos. V. Cólico.

Dolores de dientes. V. Odontalgia.

Dolores de estómago. V. Gastrodinia.

Dolor de oídos. Opio y preparaciones opiadas, I, 234. Acetato de morfina, I, 82. Beleño, I, 122. Cicuta, I, 151 &c. Gotas de aconitina, II, 147. Inyeccion anodina de la F. E., II, 176. Inyecciones calmantes, II, 180. Inyeccion de leche opiada de los H. M., II, 177. Tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188.

Dolores de tripas. V. Indigestiones.

Dolores nefríticos. V. Nefritis.

Dolores osteocopos. Opio y preparaciones opiadas, I, 234. Preparaciones de acónito, I, 93. Cloruro doble de mercurio y morfina. Ioduro doble de mercurio y morfina, I, 208.

Dolores reumáticos. V. Reumatismo.

Dotinenteritis. V. Fiebres tifoideas.

Eclampsia. V. Epilepsia.

Ectima. V. Herpes. Cataplasma de carbon de Cazenave, I, 415.

Eczema. Cataplasma de fécula, I, 417. Licor arsenical de Biett, II, 310. Limonada nítrica, II, 322. Mezclas: para lociones de Biett, II, 372 y 373. — para lociones de Cazenave, II, 374. Mistura alcalina de Biett, II, 378. Píldoras contra el eczema de Biett, II, 503. Pomada contra el eczema de Biett, III, 97. Píldoras de arseniato de hierro de Biett, II, 481. Polvo sulfuro-magnesiano de Biett, III, 70.

Edema de los miembros. V. Anasarca. Fumigaciones: de benjuí, I, 124. — de enebro, I, 175. Cocimiento resolutivo de los H. de M., I, 461. Fomentos: calmante, II, 112. — resolutivos para los edemas, II, 117. Píldoras antihidrópicas de Graefe, II, 474. Polvos antireumáticos de Olivencia, III, 10. Ungüento de artanita compuesto de la F. E., III, 278.

Edema de los pulmones. Bolos de Richard de Hau-

tensierk , I , 398. Uno ó dos vejigatorios volantes á los lados del pecho. Diuréticos , III , 431.

Efelides. Aguas sulfurosas , III , 346. Loción de borax , I , 128.

Embarazo gástrico. Dieta. Eméticos , III , 439.

Purgantes , III , 440. Sub-nitrato de bismuto , I , 127. Aguas: bromurada , I , 308. — de Trevez ,

I , 329. — fundente , I , 317. Caldo resolutivo de Fouquet , I , 407. Cervezas: purgante , I , 435. —

purgante de Sydenham , I , 435. Granos: de salud , II , 152. — de vida de Mesué , II ,

152. Lavativa de Koempf , II , 300. Píldoras amargas de Gall , II , 460. Poción de ipecacuana de Haller , II , 610. Polvos: estomacal de Birk-

mann , III , 44. — de creta compuestos , III , 29. — eméticos de los H. M. , III , 39. — tónico in-

cisivo de Lassone , III , 72.

Embarazo intestinal. V. Laxantes y purgantes.

Embriaguez. Pociones: contra la embriaguez , II , 592. — de amoniaco , I , 109.

Enagenacion mental. V. Manía.

Encefalitis. V. Meningitis.

Enfermedades adinámicas. V. Fiebres adinámicas.

— *convulsivas.* V. Convulsiones y epilepsia.

— *cutáneas.* V. Herpes , sifilides , sarna y enfermedades de la piel.

— *de corazon.* V. Aneurismas é hipertrofia.

— *de languidez.* V. Astenia.

Enfermedades de la piel. V. Herpes , sifilides y

sarna. Aguas: clorurada , I , 310. — de cal com-

puesta de Carmichael , I , 309. — oxigenada de Alyon , I , 326. Baños: de gelatina , I , 367. —

de vapor acuoso , I , 369. — de vapor aromático , I , 369. — de vapor clóricos , I , 369. — de va-

por sulfurosos , I , 370. Cocimientos: diaforético de Brera , I , 452. — sudorífico de los H. M. , I ,

461. **Cosméticos**: de Alibert, I, 489. — de Siemerling, I, 489. Emulsion purgante, II, 60. Jarabes: antiescorbútico de Portal, II, 213. — antisifilitico de Laffecteur, II, 215. Leche cosmética, II, 305. Licor arsenical de Bielt, II, 310. Limonada hidroc্লórica, II, 322. Píldoras: de almendras amargas de Kranischfeld, II, 458. — de dulcamara y sulfuro de antimonio, II, 512. — de Sainte Marie, II, 554. — mercuriales de Renou, II, 544. Polvos: atemperante y laxante de Bouillon-Lagrange, III, 70. — de Grimaldi, III, 51. — mercurial y de carbonato de magnesia de Cheyne, III, 57. Pomadas: de Boyer, III, 90. — de ioduro de azufre, III, 116. — de la sultana, II, 96. Tabletas antimoniales de Kunkel, III, 172. Tintura de lupulina, III, 210. Tisanas: de Feltz, III, 233. — de guayaco y dafne mecereon, III, 234. — de vinagre, III, 241. Tópico de Hufeland contra las manchas hepáticas, III, 244. Trociscos de Alhandal, III, 270. Suero de Weis, III, 165. Ungüentos: de Alderete de la F. E., III, 276. — mercurial blanco, III, 290. — oxigenado mercurial del Dr. Bañares, III, 295.

- Enfermedades de las encías.* V. Escorb. y estom.
 — *de las vías urinarias.* V. Cálculos urinarios, cistitis é iscuria.
 — *del hígado.* V. Hepatitis.
 — *de los huesos.* V. Necrosis y caries.
 — *de los ojos y de los párpados.* V. Oftalmia.
 — *de pecho y del pulmón.* V. Bronquitis, neumonia y tisis.
 — *epsóricas.* V. Sarna.
 — *espasmódicas.* V. Espasmos.
 — *asténicas.* V. Asténia.
 — *herpéticas.* V. Herpes.

- Enfermedades inflamatorias.* V. Flegmasias &c.
 — *lechosas.* V. Afecciones lechosas.
 — *linfáticas.* V. Escrófulas , asténia y escorbuto.
 — *nerviosas.* V. Neurosis y neurálgias.
 — *pituitosas.* V. Pituita.
 — *reumáticas.* V. Reumatismo.
 — *sifilíticas.* V. Sífilis.
 — *soporosas.* V. Coma.
 — *venéreas.* V. Sífilis.
 — *verminosas.* V. Lombrices.
- Enfriamiento.* Vino triacal , III, 330. Espliego , I, 180. Salvia , I, 259. Romero , I, 254. Toronjil , I, 283.
- Engrosamiento de la córnea.* Polvo contra el engrosamiento de la córnea, de Graeff, III, 26.
- Enteritis aguda.* Antiflogísticos. Atemperantes, III, 445. Dieta. Opio , I, 234, y preparaciones de opio.
- Enteritis crónica.* V. Flegmasias crónicas.
- Envenenamientos.* V. pág. 388 , tomo III.
- Epifora.* Proporcionar una salida artificial á las lágrimas, cuando no puede restablecerse la natural. Combatir la inflamacion cuando proviene de una oftalmia crónica , &c. Aguas : anti-oftálmica de Loche , I, 301. — oftálmica fortificante de Selle , I, 325.
- Epilatorios.* Epilatorio de Plenck , II, 65. Pomada de los hermanos Mahon , II, 66. Rusma de los orientales , II, 67. Ungüento epilatorio de Swediaur , II, 67.
- Epilepsia.* Acónito , I, 93. Alcanfor , I, 100. Al- mizcle , I, 107. Beleño , I, 122. Belladona , I, 123. Castóreo , I, 144. Cicuta , I, 151. Estramonio , I, 181. Estricnina , I, 182. Ioduro de zinc y estricnina , I, 208. Oxido de zinc , I, 238. Nitrato de plata , I, 230. Agua etérea alcanforá- da de Brugnatelli , I, 314. Bolos de valeriana,

I, 400. Caldo antiépiléptico de Babeyrac, I, 402. Cerveza cefálica inglesa, I, 433. Disolución antiépiléptica de Magendie, I, 497. Electuarios: antiépiléptico de Mead, I, 514. — antiépiléptico de los H. de M., I, 530. — antiespasmódico de Swediaur, I, 515. — antibelméntico de Grimaud, I, 513. — peruviiano antiépiléptico de Fuller de la F. E., I, 530. Espíritus: de amoniaco, II, 87. — de amoniaco aromático, II, 87. — de amoniaco fétido, II, 87. Eter zincado, II, 107. Hidroclorato de amoniaco cobreoso de Van Mons, II, 155. Infusión de valeriana de los H. de M., II, 173. Jarabe de peonía de la F. E., II, 259. Lavativas: estimulante de los H. de M., II, 298. — irritante de los H. M., II, 300. — irritante de vino antimoniado de la F. E., II, 300. Píldoras: antiépilépticas de Recamier, II, 466. — antiépilépticas inglesas, II, 466. — antiespasmódicas de Petit, II, 469. — antineurálgicas de Trousseau. — contra la epilepsia, de Dupuytren, II, 503. — de cobre de Swediaur, II, 500. — de Kopp, II, 533. — de Merat, II, 537. — de nitrato de plata de Merat, II, 545. — de Quarin contra la epilepsia, II, 553. Pociones: calmante, II, 586. — moscada de Dubois, II, 614. Polvos: antiépilépticos de Kirckhoff, III, 5. — antiépiléptico de Quincy, III, 5. — antiespasmódico, III, 7. — antiespasmódico de Magendie, III, 7. — de Bresler, III, 18. — de Tunquin de Reuss, III, 73. Preparaciones: de cantáridas, I, 135. — de valeriana, I, 286. Tinturas: alcohólica de mirra uterina de la F. E., III, 190. — antihistérica, III, 200.

Epistaxis. Hielo á la frente. Pediluvios sinapizados, II, 453. Polvos restrictivos de ciprés de la F. E., III, 66. Suero aluminoso, I, 267. Tamponamiento.

- Equimosis.* V. Contusiones.
- Erecciones.* V. Blenorragia aguda.
- Eretismo.* V. Espasmos.
- Erisipela.* Cataplasma de fécula, I, 417. Fomento contra la erisipela, II, 113. Emisiones sanguíneas. Bebidas atemperantes. Dieta. Aire caliente. Alcanfor. Purgantes. Eméticos. Saúco, I, 261.
- Erupciones crónicas.* V. Herpes.
- *de la piel.* V. Herpes.
- *sifilíticas.* V. Sifilides y sífilis.
- Eruetos.* V. Flatuosidades.
- Escarlatina.* Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Bebida atemperante. Disolución profiláctica de Hahnemann, I, 508. Emulsion común con nitro. Pociones: atemperante de los H. M., II, 584. — de Sthahl, II, 624. Preparaciones de belladona, I, 123.
- Escorbuto* (Afecciones escorbúticas). Nutrición vegetal. Insolacion. Frutos ácidos. Becabunga, I, 121. Berro, I, 125. Coclearia, I, 160. Mostaza, I, 227. Rábano picante, I, 251. Preparaciones: de becabunga, I, 121. — de berro, I, 125. — de coclearia, I, 160. — de mirra, I, 225. — de mostaza, I, 227. — de quina, I, 249. — de rábano picante, I, 251. Aguas: de brea, I, 129. — de madama Vrilliere, I, 320. — oriental de Delabarre, I, 326. Alcoholato de coclearia, I, 337. Alcoholaturos: de berro de Pará, I, 339. — de jugo de berro de Pará, I, 340. Apocema antiescorbútico de Lescure, I, 342. Azúcar de berro de Pará, I, 347. Cervezas: antiescorbútica, I, 433. — antiescorbútica de Butler, I, 433. Cocimiento antiescorbútico de los H. M., I, 442. Colutorios: antiescorbútico, I, 480. — deterivos, I, 482. Conserva antiescorbútica de Selle, I, 487.

Dentífrico antiescorbútico , I, 492. Disoluciones: de cloruro de cal alcoholizada , I, 502. — de hidriodato de potasa de Magendie , I, 504. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet , I, 504. Elixires : antiescorbútico de Boerhaave , II, 3. — antiescorbútico de Selle , II, 4. — dentífrico de Angelot , II, 7. — de propiedad de la F. E. , II, 14. — odontálgico de Lerroy de la Faudignere , II, 12. Espíritu de rábano compuesto , II, 91. Etiope vegetal de Russel , II, 108. Gargarismos: antiescorbútico , II, 129. — antiescorbútico de Gramaire , II, 130. — antiescorbútico de Ricord , II, 130. — astringente , II, 132. — clórico , II, 136. — detergente , II, 138. — hidroclórico , II, 141. — antiescorbúticos de los H. M. , II, 129. — tónico y astringente de Hunter , II, 146. — Genciana , I, 190 , y otros tónicos. Jabon estibiado , II, 192. Jarabes : antiescorbútico , II, 212. — antiescorbútico de Portal , II, 213. — de berro de Pará , II, 219. — de berros , II, 219. — de co-clearia , II, 231. — depurativo amargo de Bouillon-Lagrange , II, 233. Julepes: antiescorbútico , II, 273. — del Dr. Franck , II, 277. Lavatorio antiescorbútico de los H. de M. , II, 287. Limonada sulfúrica , II, 323. Misturas: antiescorbútica , II, 381. — para las encías , II, 401. Pastillas de émula campana , II, 440. Pociones: antiescorbútica , II, 575. — antiescorbútica de Franck , II, 575. Polvo dentífrico antiescorbútico , III, 30. Sueros : antiescorbútico , III, 162. — antiescorbútico de Boerhaave , III, 162. Tesoro para la boca , III, 186. Tintura antiescorbútica , III, 192. Tisanas: antiescorbútica , III, 222. — de rábano , I, 33. — de yemas de abeto , I, 33. Vinagre bezoárdico de Berlin , III, 308. Vino antiescorbútico , III, 316. Zumo de yerbas

antiescorbúticas, III, 332.

Escirro. V. Cáncer.

Escoriaciones. V. Grietas.

Escrescencias sífilíticas. V. Sífilis. Antiflogísticos si hay dolor é inflamacion. Ligaduras. Escision. Cauterizacion con agua cáustica, I, 309. Licores: arsenical, II, 310. — mercurial alcanforado, II, 315. Tópico aurífero de Niel, III, 242. Cura con unguento mercurial, III, 291. Pomada de calomelanos, III, 92 y 104. Proto-ioduro de mercurio.

Escrófulas. Aire seco. Insolacion. Buenos alimentos. Acetatos: de amoniaco y hierro líquido, I, 300. — de peróxido de hierro, I, 300. Aceites: de hígado de bacalao, I, 78. — fosforado de Lescot, I, 297. Aguas: calibeada, I, 309. — de Bañares, I, 307. — de brea, I, 129. — de cal compuesta de Carmichael, I, 309. — de hidriodato de hierro, I, 318. — ferruginosa, I, 315. — iodada, I, 319. — minerales ioduradas, I, 324. — minerales sulfurosas, III, 346. — sulfurosa compuesta, I, 329. Alcoholados: de acetato de hierro, I, 333. — de cinconina, I, 334. — de citrato de hierro, I, 334. — de percloruro de hierro, I, 336. — de quinina, I, 336. Azúcar alcalina de Blondeau, I, 347. Baños: iodurados, I, 367. — salino y gelatinoso, I, 368. Bebidas: antiescrofulosa, I, 371. — de Russel, I, 379. Bolos antimoniales, I, 336. Bolas de Marte, I, 381. Bolos: antiescrofulosos, I, 384. — tónicos de Roucher, I, 399. Café de bellotas, I, 400. Cataplasmas: mercurial, I, 419. — narcótica, I, 419. Cervezas: amarga, I, 432. — antiescorbútica de Butler, I, 433. — de quina de Mutis, I, 436. Citrato de peróxido de hierro, I, 437. Cloruro de bário, I, 156. Cocimiento antiescrofuloso, I,

442. Conserva antiescorbútica de Selle, I, 487. Chocolates: con el hidriodato de hierro, II, 160. — marcial de Trousseau, II, 162. Disoluciones: alcohólica de deuto-ioduro de mercurio, I, 496. —de cloruro de bário de Sichel, I, 501.—de cloruro de cal, I, 502.—de hidriodato de potasa de Magendie, I, 504. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, I, 504. — ioduradas, I, 505. — iodurada cáustica, I, 505.—iodurada concentrada, I, 505. — iodurada para uso externo, I, 505. — iodurada rubefaciente, I, 506. Electuario antiartrítico, I, 510. — antiescrofuloso de Baumer, I, 514. — de Kortum, I, 529. Elixires: amargo de Dubois, II, 1.—antiescrofuloso de Peyrhuilo, II, 13. — contra las escrófulas, II, 14. Emplastos: de gálbano crocado de la F. E., II, 38. — de gálbano simple de la F. E., II, 38. — fundente, II, 37.— fundente de Cottureau y Verdé-Delisle, II, 36. Emulsion purgante de Alibert, II, 60. Espiritu de rábano compuesto, II, 91. Eteres: antimonial de Huxham, II, 107. — sulfúrico con el deuto-ioduro de mercurio, II, 105. — sulfúrico iodurado de Magendie, II, 105. Eterolados: de acetato de hierro de Beral, III, 203. — de percloruro de hierro de Beral, III, 204. Etiopes: antimonial de Huxham, II, 107. — vegetal de Russel, II, 108. Extracto de marte, II, 96. Genciana, I, 190, y otros tónicos. Grama iodurada de Magendie, II, 151. Hidrocloratos: de amoníaco y hierro, II, 156.— de mercurio ferrurado de Hartmann, II, 156. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Ioduro de hierro y quinina, I, 206. Jabon estibiado, II, 192. Jalea de fuco de Russel, II, 199. Jarabes: alcohólico de ioduro de potasio iodado de Puche, II, 209. — antiescorbútico, II, 212 — antiescorbú-

tico de Portal, II, 213. — antiescrofuloso, II, 214. — de acetato de hierro de Beral, II, 204. — de acetato de amoniaco y hierro de Beral, II, 204. — de berro de Pará, II, 219. — de cincónina, II, 226. — de citrato de hierro de Beral, II, 228. — de citrato de hierro de Trousseau, II, 228. — de genciana iodurado de Ricord, II, 244. — de gencianino de Magendie, II, 245. — de Gollin, II, 245. — de hígado de bacalao de Duclos, II, 250. — de iodo de Henry, II, 249. — de ioduro de hierro, II, 249. — de ioduro de hierro y quinina, II, 230. — de ioduro de potasio de Henry, II, 249. — de lupulina, II, 252. — de percloruro de hierro de Beral, II, 259. — de quinina, II, 252. Licor depurativo de François, II, 313. Jarabe depurativo de Majault, II, 235. Lavativa iodada de Cottereau, II, 299. Licor de Koechlin, II, 312. Linimentos: anodino y resolutive, II, 327. — de Hufeland, II, 339. — de Roncalli, II, 344. — de veratrina de Turnbull, II, 347. — de veratrina é ioduro de potasio de Turnbull, II, 347. — de veratrina y mercurio de Turnbull, II, 347. — de Hufeland, II, 339. — Loción de saúco con alcohol alcanforado, II, 358. Mercuriales. Pan ferruginoso de Louvel, II, 421. Pastillas: de citrato de hierro, II, 437. — de chocolate y hierro reducido por el hidrógeno de Miquelard y Quevenne, II, 442. — de cloruro de oro, II, 438. — de hidriodato de hierro, II, 442. — de iodoforma, II, 443. Percloruro de hierro líquido, I, 159. Píldoras: antiartríticas, II, 461. — antiartríticas de Gall, II, 462. — antiescrofulosas, II, 468. — antiescrofulosas de Baudelocque, II, 467. — antiescrofulosas de Henry y Goibourt, II, 467. — antiherpéticas, II, 472. — blancas de Barthez, II, 490. — contra los infartos glandu-

losos crónicos, II, 505. — de acónito mercuriales de Duple, II, 457. — de belladona ioduradas, II, 489. — de bromuro de hierro de Magendie, II, 491. — de cianuro de oro, II, 496. — de cicuta ioduradas, II, 497. — de cinconina, II, 498. — de cloruro de oro, II, 499. — de hidrocloreto de hierro de Bielt, II, 527. — de iodo de los H. de M., II, 529. — de iodoforma, II, 529. — de ioduro de hierro, II, 205. — de ioduro de plomo cristalizado de Cottercau y Verde-Delisle, II, 529. — de ioduro de hierro y quinina, II, 531. — de lupulina, II, 534. — de óxido de oro de Chrestien, II, 546. — de proto-ioduro de mercurio, II, 531. — de sulfato de cinconina, II, 557. — de sulfato de quinina, II, 557. — ferruginosas, II, 521. — hidragogas, II, 525. — tónicas y estomacales, II, 559. — tónicas de Hulm, II, 560. — tónicas de Stoll, II, 560. Póciones: antiescrofulosa, II, 576. — con el bromuro de potasio, II, 585. — de aceite de hígado de bacalao, II, 567. — de cinconina, II, 588. — de hidro-bromato de potasa de Magendie, II, 608. — de sulfato de quinina, II, 623. — iodurada de Cullerier, II, 609. Polvos: de antimonio mercurial de Smith, III, 10. — de cianuro de oro, I, 150. — de cloruro de oro, III, 23. — de cloruro de oro y sódio, III, 23. — de Plumer, antisifilítico y antiescrofuloso, III, 63. — de Prince, III, 63. — ferruginoso, III, 49. — fundente de Cottereau, III, 51. — oftálmicos de Sichel, III, 59. Pomadas: calmante, III, 92. — crisocroma de Cottereau y Verde-Delisle, III, 103. — de bromuro de potasio, III, 90. — de bromuro de potasio bromurado de Magendie, III, 91. — de hidriodato de amoniaco, III, 111. — de hidriodato de hierro, III, 112. — de hidriodato de potasa

de los H. de M., III, 112. — de hidriodato de potasa de Magendie, III, 112. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, III, 113. — de hidrobromato de hierro bromurado, III, 111. — de hidrobromato de potasa, III, 113. — de iodato de zinc, I, 208. — de iodo, III, 115. — de ioduro de azufre, III, 116. — de ioduro de bárrio de Bielt, III, 116. — de ioduro de plomo, III, 117. — hidriodatada é iodurada de Baudelocque, III, 115. — resolutiva de Dupuytren, III, 130. Preparaciones bromuradas. — de azufre, I, 117. — de hierro, I, 200. — de guayaco, I, 196. — de sulfuro de antimonio, I, 274. — de dulcamara, I, 171. — de oro, I, 236. — ioduradas. — de lúpulo, I, 216. — de lupulina, I, 216. — de berro, I, 125. — de coclearia, I, 160. — de becabunga, I, 121. — de mostaza, I, 227. — de rábano silvestre, I, 251. — de quina, I, 249. Pomadas: ioduradas, III, 115. — resolutiva de Dupuytren, III, 130. — resolutiva de Sandelin, III, 131. — Sacarolado de citrato de hierro de Beral, III, 156. — Tinturas: de genciana amoniaca, III, 206. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 207. — de hollin, III, 208. — de iodo, III, 208. — de iodo de los H. M., III, 208. — etérea de acetato de hierro de Beral, III, 203. — legivial de Vogler, III, 210. Tabletas: de cianuro de oro y chocolate, III, 175. — de citrato de hierro, III, 437. — de esponja tostada, III, 176. — marciales, III, 179 y 180. Tartrato de potasa y hierro, III, 184. Tinturas: de gencianino de Magendie, III, 207. — de ioduro de potasio de Puche, III, 209. — de lupulina, III, 210. — de malato de hierro, III, 211. — de marte tartarizada, III, 211. — etérea de percloruro de hierro de Beral, III,

204. — Tisanas: antiescorbútica, III, 222. — contra las escrófulas, III, 227. — de camedrios, I, 34. Tintura de iodo, III, 208. Tisanas: de trinitaria, I, 34. — iodada de Cullerier, III, 233. Vinos: amargo, III, 314. — antiescorbútico, III, 316. — calibreado de Parmentier, III, 320. — de acetato de hierro líquido, III, 313. — de cinconina de Magendie, III, 320. — de citrato de hierro de Beral, III, 321. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 327. — de quinina, III, 330. — marcial de los H. de M., III, 320. — tónico amargo de Cottereau, III, 330.

Espasmos. V. Neuroses é Histerismo. Antiespasmódicos, III, 436. Debilitantes. Narcóticos, III, 436. Régimen suave. Agua etérea alcanforada, I, 314. Bolos de valeriana, I, 400. Elixires: fé-tido de Fulde, II, 10. — paregórico inglés, II, 13. Eter acético ferrurado de Klaproth, II, 101. Extracto de hollin de Reuss. Gotas: calmantes de Magendie, II, 149. — cefálicas inglesas, II, 150. Infusion de valeriana compuesta, II, 173. Jarabes: de claveles compuesto, II, 229. — de karabé, II, 231. Julepes: antiespasmódico, II, 274. — moscado de Fuller, II, 281. Píldoras: carminativas de Barthez, II, 494. — esténicas de Brown, II, 517. Polvo de Tunquin de Reuss, III, 73. Té tunka, III, 185. Tintoras: antiespasmódica de Keup, III, 193. — etérea de digital purpúrea, I, 48. — nerval y tónica, III, 212. — nervino-tónica de Bestuchef, III, 213.

Espustos de sangre. V. Hemoptisis.

Esquinancia. V. Angina.

Estomatitis. Antiflogísticos. Colutorios: acidulado, I, 480. — antiséptico, I, 480. — astringente, I, 481. — calmante, I, 481. — de Angelot, I, 481. — deterativo, I, 481. Gargarismos: desinfectan-

te de Magendie, II, 138. — escitante, II, 140. — sedante de Swediaur, II, 145. Jarabe de granadas, II, 247. Lavatorio de cebada odontológico de los H. de M., II, 288. Miel de moras de la F. E., II, 377.

Estomatitis mercurial. V. Salivacion mercurial.

Estranguria. V. Disuria é Iscuria.

Estrechez de la uretra. Sondas, III, 160. Baños, I, 69. Nitrato de plata, I, 230. Antiflogísticos. Candelillas, I, 408. — de Daran, I, 408.

Estrechez del recto. Dilatacion simple ó forzada por medio de mechas ó de supositorios de belladona. Candelilla emoliente, I, 409. Pomada de la Condesa, III, 96. Cauterizacion é incision. Bebidas laxantes. Bebidas purgantes.

Estreñimiento. V. Constipacion.

Estomacace. V. Crup.

Exantemas. V. Sarampion, viruelas, &c.

Exóstosis. V. Sífilis y escrófulas.

Exutorios. Guisantes: de cauterio, II, 153. — supurativos, II, 153. Papeles de cauterio, II, 421.

Fæus. V. Tiña.

Fetidez del aliento. Disolucion de cloruro de cal, I, 502. Colutorio de Angelot, I, 481. Misturas: contra la fetidez del aliento, II, 391. Pastillas para desinfectar el aliento, de Magendie, II, 447. Polvo dentífrico de A. Chevallier, III, 31. Tabletas: de carbon y chocolate de Chevallier, III, 174. — de catecú, III, 175. — de cloruro de cal de A. Chevallier, III, 175. — de cloruro de cal de Deschamps, III, 176.

Fiebre adinámica. Aceite fosforado de Lescot, I, 297. Aguas: del arcabuzazo de Theden, I, 306. — diurética alcanforada, I, 312. — etérea alcanforada de Brugnatelli, I, 314. — tediána de los

H. de M., I, 306. Apocema tónico, I, 345. Bebida vinosa, I, 379. Bolos estimulantes y tónicos, I, 393. Cataplasma tónica, I, 423. Cocimientos: antisépticos de Boerhaave, I, 443. — antiséptico de quina de la F. E., I, 443. — antiséptico purgante de quina, I, 444. — antiséptico de los H. M., I, 443. — bezoárdico completo de Curvo, de la F. E., I, 447. — bezoárdico incompleto de Curvo, de la F. E., I, 447. — de quina compuesto de Pringle, I, 460. — de quina de los H. de M., I, 460. — de quina de los H. M., I, 460. Disolucion citro-muriática, I, 501. Elixir febrífugo de Whitt, II, 9. Emulsiones alcanforadas, II, 52. Esencia alexifármaca de Stahl, II, 69. Infusion tónica de Courti, II, 172. Jarabe vinoso cardiaco de Wvirtemberg, II, 271. Julepes: antisépticos, II, 274. — moscado de la F. E., II, 282. Lavativas: alcanforada, I, 289. — antiséptica, II, 292. Licor vital de Rucco, II, 317. Limonadas: alcohólica, II, 318. — vinosa alcohólica, II, 324. — nítrica de los H. M., II, 322. Misturas: ácida de Selle, II, 378. — antimonial de Masdevall de los H. de M., II, 383. — de mirra alcoholizada de Griffith, II, 399. Opiata de Masdesvall, II, 414. Píldoras: antisépticas, II, 477. — de quina alcanforadas, II, 553. Pociones: antiséptica, II, 579. — clórica, II, 588. — de extracto de quina. — escitante, II, 601. Polvo de James, III, 54. Preparaciones: de quina, I, 249. — de serpentaria, I, 263. Tintura alexifármaca de Huxham, III, 190. Tisanas: de Datisbuis, III, 228. — de quina, I, 249. Vinagres: alcanforado de Spielmann, III, 307. — bezoárdico de Berlin, III, 308.

Fiebre amarilla. Vinagre bezoárdico de Berlin, III, 308.

- Fiebre atáxica.* Antiespasmódicos, III, 436. Al-
mizcle, I, 107. Preparaciones de almizcle, I, 107.
Aceite fosforado de Lescot, I, 297. Agua etérea
alcanforada de Brugnatelli, I, 314. Bebida vi-
nosa, I, 379. Bolos estimulantes y tónicos, I,
393. Cocimientos: antiséptico de quina, I, 443.
— antiséptico purgante de la F. E., I, 444. —
antiséptico de los H. M., I, 443. — bezoárdico
completo de Curvo de la F. E., I, 447. — be-
zoárdico incompleto de Curvo de la F. E., I,
447. — de quina compuesto de Pringle, I, 460.
— de quina de los H. de M., I, 460. — quinado
de los H. M., I, 460. Emulsiones alcanforadas,
II, 52. Eter y preparaciones etéreas, I, 183. Ju-
lepes: moscado de la F. E., II, 282. — moscado
de los H. de M., II, 283. Lavativas: alcanfora-
da, II, 289. — de quina alcanforada, II, 303.
Píldoras: antiespasmódicas de Petit, II, 469. —
de quina alcanforadas, II, 553. Pociones: an-
tiespasmódica, II, 576. — moscada de Dubois,
II, 614. Tintura alexifármaca de Huxham, III,
190. Vinagres: alcanforado de Spielmann, III,
307. — bezoárdico de Berlin, III, 308.
- Fiebre biliosa.* Bebida vinosa, I, 379. Jarabe de
ácido tartárico, II, 206. Limonadas: cítrica, II,
318. — comun de los H. M., II, 319. — gaseo-
sa en polvo, II, 322. — gaseosa líquida de Cha-
tard, II, 320. Licor refrigerante de Cottereau,
II, 316. Pastillas de ácido oxálico, II, 435. Po-
cion atemperante de los H. M., II, 584. Polvo
purgante y antihelmíntico de Pringle, III, 63.
Tisanas: comun, III, 227. — simple de los H.
M., III, 228. Vinagre bezoárdico, III, 308. Agua
purgante, I, 327. Tisana de ruibarbo, I, 256.
Agua de Sedlitz, I, 328. Poción emeto-catártica,
II, 600. Tratamiento antiflogístico. Ipecacuana,

I, 209. Emético, III, 439. Purgantes, III, 440. Poción vomitiva de Magendie, II, 627. Polvo vomitivo, III, 77. Bebidas atemperantes, I, 375.

Fiebre hectica. V. Asténia general.

Fiebre inflamatoria. Bebida antilogística, I, 372. Emisiones sanguíneas. Bebidas atemperantes. Medicamentos emolientes, III, 446. Bolos diaforéticos, I, 390. Cocimiento mucilaginoso de los H. M., I, 457. Emulsion nitrada, II, 59. Limonadas: cítrica, II, 318. — común de los H. M., II, 319. — de cremor de tártaro, II, 319. Lavativa de vinagre, II, 304. Mistura diaforética de Selle, II, 394. Póciones: ácida astringente, II, 568. — atemperante de los H. M., II, 584. Tisanas: común, III, 227. — de malvabisco, I, 219. — de tamarindos, I, 227. — simple de los H. M., III, 228.

Fiebre intermitente. Genciana, I, 190. Centaura menor, I, 147. Trebol de agua, I, 283. Quasia amarga, I, 248. Simaruba, I, 264. Colombo, I, 163. Augustura verdadera, I, 111. Salicina, I, 259. Acebo, I, 73. Floritzino, I, 185. Cinisino, I, 153. Eméticos, III, 439. Café, I, 131. Ipecacuana, I, 209. Pimienta, I, 242. Agua mineral ferruginosa, I, 324. Ajenjo suizo, I, 331. Alcoholados: de cinconina, I, 334. — de sulfato de quinina, I, 336. Apocema tónico, I, 345. Bebida ferruginosa, I, 576. Bolos: febrífugo, I, 395. — febrífugo de Dupuytren, I, 395. — amargos, I, 383. — febrífugos amargos, I, 396. — febrífugos de Laennec, I, 395. — febrífugos del Dr. Marc, I, 395. — fortificantes de Alibert, I, 396. Caldo amargo y dulcificante de Roucher, I, 401. Cerveza de quina, I, 436. Cocimientos de corteza de sáuce compuesto de Bremen, I, 451. — febrífugo y purgante de Senac, I, 454. Disolucio-

nes: arsenical de Prusia, I, 499. — de arseniato de amoniaco, I, 498. — de Heincke, I, 503. — febrífuga de Marc. Electuarios: anticuartanario purgante de los H. de M., I, 511. — antifebril, I, 515. — antifebril de Boerhaave, I, 515. — de Fuller, I, 525. — de Quarin, I, 527. — febrífugo de la F. E., I, 524. — febrífugo de los H. de M., I, 524. — febrífugo de Tissot, I, 525. — febrífugo y purgante de Senac, I, 525. — hidragogo de Quarin, I, 528. Elixires: antiséptico y febrífugo de Huxham, II, 4. — balsámico de Werthoff, II, 6. — balsámico, estomacal y atemperante de Hoffmann, II, 5. — de propiedad de la F. E., II, 14. — febrífugo y aperitivo de Gaubius, II, 10. Emulsiones: febrífuga de Mylius, II, 57. — febrífuga de Niemann, II, 57. Gelatina de quina de Gauthier, II, 146. Infusiones: fria de quina, I, 168. — de heléboro negro de Hoffmann, II, 168. — de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Ioduro de hierro y quinina, I, 206. Jabon medicinal, II, 193. Jarabes: calibeado de Willis, II, 220. — de cinconina de Magendie, II, 226. — de ioduro de hierro y quinina, II, 250. — de quina con vino, II, 262. — de quina de la F. E., II, 261. — de salicina, II, 264. — de sulfato de quinina de Magendie, II, 262. — febrífugo de Bories, II, 243. — febrífugo de quina, II, 244. Julepe febrífugo de Magendie, II, 280. Lavativas: de acebo, I, 73. — de quina, II, 303. — de sulfato de quinina, I, 272. — febrífuga de los H. M., II, 299. Licores: arsenical de Fowler, II, 311. — arsenical de Pearson, II, 311. Linimentos de Schuster, II, 346. Misturas: diaforética de Selle, II, 394. — disolvente compuesta, II, 394. — febrífuga metálica, II, 396. — resolutive de Selle, II, 404. — sudorífica, II,

406. Opiatas: febrífuga, II, 412. — febrífuga de Lescure, II, 413. — febrífuga de Tissot, II, 412. Pastillas de sulfato de quina, II, 450. Píldoras: antitípicas de los H. M., II, 480. — de arsénico americanas, II, 481. — de Barton, II, 488. — de cinconina, II, 498. — de cobre de Swediaur, II, 500. — de ioduro de hierro y quinina, II, 531. — de ioduro de iodhidrato de quinina, I, 207. — de piperino, II, 547. — de salicina, II, 555. — de sulfato de cinconina, II, 557. — de sulfato de quinina, II, 557. — febrífugas de Andonart, II, 520. — febrífugas inglesas, II, 520. — febrífugas inglesas de Lochstaedt, II, 520. — tartáreas de Schroederer, II, 558. Pociones: de cinconina de Mariani, II, 588. — de ipecacuana de Haller, II, 610. Polvos de quina amarilla, I, 249. Pociones: de quinina, II, 622. — de sulfato de quinina, II, 623. — estibioopiada de Peysson, II, 602. — febrífuga, II, 605. Polvos: de Fontaneilles, III, 50. — corroborante de Werlhoff, III, 28. — de cetrarino de Muller, III, 22. — de quinina emetizada del Dr. Gouja, III, 65. — de quina y morfina de Magendie, III, 66. — antimoniales de escamonea de la F. E., III, 28. — febrífugas compuestas de los H. M., III, 46. — febrífugas de Boullemer, III, 46. — febrífugo de Chleghorn, III, 46. — de Fontaneilles, III, 50. — febrífugo de Hartmann, III, 47. — febrífugos de Jadelot, III, 46. — febrífugo de Juncker, III, 47. — febrífugo de los pobres, III, 48. — febrífugo de Roucher, III, 47. — febrífugo y purgante de Helvetius, III, 47. — febrífugos simples de los H. M., III, 48. Preparaciones: de arsénico, I, 114. — de manzanilla, I, 221. — de ajeno, I, 97. — de quina, I, 234. Sulfatos: de cinconina, I, 268. — de quinina, I, 272.

Tinturas: alexifármaca de Fluxham, III, 190. — de quina amarilla, I, 234. — febrífuga de Clutton, III, 205. **Vinos:** de cinconina, III, 320. — de Leguin, III, 329. — de sulfato de quinina de Magendie, III, 330. — estomacal de Plenck, III, 324. — febrífugo, III, 325. — febrífugo de quina, III, 325. — febrífugo de S., III, 326. **Tanino**, I, 278; y otros astringentes.

Fiebres intermitentes perniciosas. Quina, I, 249. Sulfato de quinina, I, 272. Preparaciones de quina, I, 249.

Fiebres lardadas. Se tratan del mismo modo que las fiebres intermitentes perniciosas.

Fiebre puerperal. Antillogísticos. Ipecacuana, I, 209. Fricciones con alcoholato de melisa. Poción alcalino-gomosa, II, 569. Pomadas: mercurial de manteca de cacao de Plauche, III, 121. — mercurial opiada, III, 121. Preparaciones de esencia de trementina, I, 284. Ungüento de mercurio de la F. E., III, 291.

Fiebre pútrida y maligna. V. Fiebre adinámica y atáxica.

Fiebres tifoideas. Agua de Sedlitz artificial, I, 328. Apocema tónico, I, 345. Cocimientos: antiséptico de quina, I, 443. — antiséptico purgante de quina de la F. E., I, 444. — antiséptico de los H. M., I, 443. — bezoárdico completo de Curvo de la F. E., I, 447. — bezoárdico incompleto de Curvo de la F. E., I, 447. Esencia alexifármaca de Stahl, II, 69. Julepes antisépticos, II, 274. Lavativas: de quina alcanforada, II, 303. — de vinagre de los H. M., II, 304. Limonada hidrocórica, II, 322. Mistura antimonial de Masdevall de los H. de M., II, 383. Opiata de Masdevall, II, 414. Pociiones: antiséptica, II, 588. — clórica, II, 588. — con el extracto de quina de

Chomel, II, 589. — escitante, II, 601. Tisana clorurada, III, 226.

Fimosis. V. Parafimosis.

Fistulas. V. Ulceras fistulosas.

Fistulas del ano. V. Ulceras fistulosas. Inyecciones irritantes. — ioduradas. Compresion. Operacion. Digestivo de Plenck, II, 495. Opiata de Ward, II, 415.

Flatusidades. Angélica, I, 111. Alcaravea, I, 102. Anis, I, 112. Asa fétida, I, 115. Badiana, I, 118. Cilantro, I, 153. Comino, I, 164. Eneldo, I, 176. Hinojo, I, 201. Aguas: carmelitana, I, 338. — de canela lactiginosa, I, 320. Ajenjo suizo, I, 331. Bálsamos: anodino de Bath, I, 352. — de vida de Hoffmann, I, 363. — de vida de Lescure, I, 363. Bebida carminativa, I, 375. Bolos: antiespasmódicos, I, 384. — antiespasmódicos de Bally, I, 384. — carminativos, I, 388. — estomacales de Parmentier, I, 394. Cocimiento carminativo de malvas de la F. E., I, 449. Elíxires: de vitriolo dulce, II, 19. — uterino de Crollius, II, 17. Emplastos: de meliloto simple de la F. E., II, 40. — de meliloto compuesto de la F. E., II, 40. Esencia carminativa de Wedel, II, 71. Especies: carminativa de la F. M., II, 80. — viscerales de Koempf, II, 85. Espiritus: de anis compuesto, II, 88. — de espliego compuesto, II, 89. — de enebro compuesto, II, 88. Gotas amargas, II, 147. Lavativa carminativa de la F. M., II, 295. Linimento carminativo de Writt, II, 331. Lavativa de asa fétida, II, 293. Looc auisado, II, 360. Mistura de magnesia aromática, II, 399. Pastillas de salud de Delvincourt, II, 449. Píldoras: carminativas de Barthez, II, 494. — de asa fétida y alcanfor, II, 481. — de gálbano compuestas de Murray, II,

524. — escilíticas de Chrestien, II, 515. Poción aromática, II, 582. Polvo diaromaton inglés, III, 32. Preparaciones de azafran, I, 117. Té de Suiza. Tinturas: antiespasmódica de Keup, III, 192. — de cardamomo compuesta, III, 197. — de hollin, III, 208. — de ruibarbo de Spielmann, III, 217. — de ruibarbo inglés, III, 217. — estomacal, III, 202. Tisanas: carminativa, III, 227. — de anís, I, 36. — de manzanilla, I, 35. — de matricaria, I, 35. Yerbabuena, I, 289.

Flebitis. Antimoniales. Baños, I, 69. Emisiones sanguíneas. Cataplasma de fécula, I, 417.

Flegmasias. Emisiones sanguíneas. Baños tibios, I, 69. — emolientes, I, 69. — emolientes, III, 446. Aceitosos. Bebidas atemperantes, I, 375. Cataplasmas: anodina, I, 411 y 412. — de fécula, I, 417. — emolientes, I, 416 y 417. — opiada, I, 420. Emulsiones, II, 52. Especies: emolientes, II, 80. — emolientes de la F. M., II, 81. — emolientes de Stahl, II, 81. Fomento narcótico, II, 115. Hidrógala, I, 156. Hidromel, I, 157. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Lavativa refrescante, II, 303. Limonadas: cítrica, II, 319. — comun de los H. M., II, 319. Mistura de Cronier, II, 393. Oxicroto, I, 417. Poción atemperante de Sydenham, II, 584. Polvo contraestimulante, III, 25. Preparaciones de calomelanos, I, 134. Mercuriales. Opio, I, 234, y preparaciones opiadas. Suero, I, 160. Tisanas: comun, III, 227. — de cebada, I, 146. — de felandrio, I, 36. — de hisopo, I, 34. — de malvabisco, I, 35. — de melisa, I, 35. — de poligala, I, 33. — de yedra terrestre, I, 35. — de verónica, I, 34. — pectoral de los H. M., III, 236. Revulsivos.

Flegmasia alba dolens. Antiflogísticos; pero las san-

grías deben ser moderadas. Baños emolientes, I, 366. Cataplasmas emolientes, I, 416. Fomentos emolientes, II, 113.

Flegmasia de las vías urinarias. V. Iscuria y catarro de la vejiga.

Flegmon. Emisiones sanguíneas. Bebidas atemperantes, I, 375. Cataplasmas: anodina, I, 411 y 412. — anodina de miga de pan, I, 411. Vejigatorios, III, 303. Insolacion.

Flores blancas. V. Leucorrea.

Flujos crónicos. V. Blenorrea y leucorrea.

Flujo hemorroidal. Bebidas atemperantes. Posición horizontal. Polvos restrictivos de ciprés de la F. E., III, 66.

Fluxion de pecho. V. Neumonía.

Fotofobia. V. Oftalmía aguda.

Fracturas. V. Contusiones. Riegos de agua fría. Aguas: del arcabuzazo de Theden, I, 306. — tediána de los H. M., I, 306. — vegeto-mineral, I, 330. Emplastos: confortativo, II, 31. — de cola para las hernias, de la F. E., II, 30. Mistura para los aparatos inamovibles de Larrey, II, 405. Se unen las tiras de papel de que se compone el aparato inamovible con destriana diluida en agua.

Frenesi (aracnoiditis). Emisiones sanguíneas. Sanguijuelas detrás de las orejas. Bebidas atemperantes, I, 375. Dieta. Hielo á la cabeza. Revulsivos.

Fungosidades. V. Ulceras fungosas.

Fumigatorios. V. Miasmas.

Galactirrea. Atemperantes. Laxantes. Bebidas anti-lacteas, I, 373. Cataplasma resolutive, I, 321. Píldoras antilechosas de Massau, II, 477. Suero de Weiss, III, 165. Sudoríficos, III, 433.

Gangrena. Alcanfor, I, 100. Cloruro de sosa, I,

160. Preparaciones de mirra, I, 225. Aguas: del arcabuzazo de Theden, I, 306. — tediána de los H. de M., I, 306. Bálsamo de Goulard, I, 358. Cataplasmas: antiséptica alcanforada de Reuss, I, 414. — fermentante de los rusos, I, 418. — tónica, I, 423. Cocimientos: antiséptico de quina, I, 443. — antiséptico purgante de quina de la F. E., I, 444. — antiséptico de los H. M., I, 443. Fomentos: alcanforado, II, 109. — antiséptico, II, 109. — de Schmuker, II, 110. — opiado de Ricord, II, 115. — para la gangrena de los H. de M., II, 114. Inyección antipútrida de quina de la F. E., II, 177. Julepes antisépticos, II, 274. Lavativas antisépticas, II, 292. Licor desinfectante de cloruro de óxido de sódio de Labarraque, II, 314. Píldoras contra la gangrena de hospital, II, 504. Poción antiséptica, II, 579. Polvos: antiséptico de Swediaur, III, 13. — de quina amarilla, I, 250.

Gangrena de hospital. Cloro, I, 155. Cloruros: de cal, I, 157. — de sosa, I, 160. Bebidas estimulantes. Aguas: de creosota, I, 166. — verde de Artmand, I, 330. Píldoras antisépticas, II, 477. Polvos: aromático de Dupuytren, III, 13. — de quina, I, 249. — de quina y carbon.

Gastralgia. V. *Gastrodinia.*

Gastritis aguda. Emisiones sanguíneas. Emolientes, III, 446. Bebidas atemperantes, I, 375. Hielo, I, 187. Dieta. Cocimiento mucilaginoso de los H. M., I, 457. Disolución arábiga de los H. de M., I, 498. Lavativa atemperante de los H. de M., II, 295.

Gastritis crónica. Aguas minerales alcalinas, III, 376. Opiados. Aguas: alcalina y gaseosa, I, 303. — de Bussang, I, 308. Baño de Plombières facticio, I, 366. Cocimiento mucilaginoso de los

H. M., I, 457. Jarabe de ácido tartárico, II, 206. Limonada de cremor de tártaro, II, 319. Mistura antiácida y absorbente de Delile, II, 280. Poción de Pitschaft, II, 618. Tisana refrigerante y atemperante en polvo, III, 237.

Gastro-enteritis. V. Gastritis. Baño facticio de Plombieres, I, 366.

Glositis. V. Flegmasia.

Gingivitis crónica. Agua de madama Vrilliere, I, 320. Colutorios: antiséptico, I, 480. — detergente, I, 481. Gargarismo antiescorbútico, II, 129. Mistura antiescorbútica, II, 381.

Gonorrrea aguda y crónica. V. Blenorragia y blenorrea.

Gota. Amargos, III, 485. Antiflogísticos. Alcanfor, I, 100. Preparaciones: de colchico, I, 162. — de zarzaparrilla, I, 291. Aguas: alcalinas, I, 303. — medicinal de Husson, I, 323. Aguardiente purgante de Mezaize, I, 302. Ajenjo suizo, I, 331. Alcoholado de veratrina, I, 337. Antigotoso de Want, I, 341. Bálsamos: acético alcanforado de Pelletier, I, 350. — acético etéreo de Vergnes, I, 351. — anodino de Bath, I, 352. — antiartrítico de Sanchez, I, 352. — de acero, I, 350. — aromático de Bally, I, 365. — aromático de los H. M., I, 366. Bolos antimoniales, I, 386. Cataplasmas: anodina de miga de pan, I, 411. — antiartrítica de Pradier, I, 412. Cocimientos: antiartrítico de Quarin, I, 441. — de mecereon compuesto de Vans-Mons, I, 456. Disolución de sulfato de veratrina de Magendie, I, 568. Electuario antiartrítico de Buchan, I, 510. Elíxires: antiartrítico de la Isla de Francia, II, 2. — purgante, II, 14. Emplastos: de gálbano crocado de la F. E., II, 38. — de gálbano simple de la F. E., II, 38. — de jabon, II, 39. Esencia de ja-

bon, II, 73. Especies amargas, II, 78. Eter anti-
 monial de Huxham, II, 107. Fomento de Heis-
 ter, II, 114. Gotas antiespasmódicas de Eller,
 II, 148. Infusion de hollin compuesta de Pide-
 rit, II, 169. Jarabes: antiartrítico y antihidróp-
 ico, II, 210. — antigotoso, II, 214. Linimen-
 tos: antiartrítico de Desbois, II, 328. — antiar-
 trítico de Home, II, 328. — con el sulfuro de
 carbono de Wutzer y Pellengam, II, 332. — de
 Mustard, II, 341. — de veratrina de Turnbull,
 II, 347. — de veratrina é ioduro de potasio de
 Turnbull, II, 347. — de veratrina y mercurio
 de Turnbull, II, 347. — estimulante in-
 glés, II, 337. — jabonoso de Koemf, II, 341.
 — jabonoso y alcanforado de Ferriar, II, 340.
 — resolutivo de Pott, II, 343. — terebintinado,
 III, 268. Miel de hayas de saúco de la F. E., II,
 375. Misturas: calmante de Roux, II, 388. —
 resino-jabonosa de Plenck, II, 404. Piel de Gon-
 lard, II, 455. Píldoras: antiartríticas, II, 461.
 — antiartríticas de Gall, II, 462. — antiartríti-
 cas de Vicq de Azir, II, 462. — de aconitina de
 Turnbull, II, 457. — de veratrina de Magendie,
 II, 565. Pociones: antiartrítica de Perard, II,
 572. — antilogística y sudorífica, II, 577. Pol-
 vos: antiartrítico de Hartmann, III, 2. — an-
 tiartrítico de Marc, III, 3. — antiartrítico pur-
 gante, III, 3. Pomada de veratrina de Magendie,
 III, 134. Ratafia de los Caribes, III, 138. Reme-
 dio contra la gota de Turk, III, 147. Tabletas
 antimoniales de Kunkei, III, 172. Tintura alco-
 bólica jabonosa de opio de la F. E., III, 189.
 Tisana de guayaco y dafne meceron, III, 234.
 — volátil de guayaco, III, 220. Vino de cólchi-
 co, III, 521. Sinapismos, III, 158.

Gota serena. V. Amaurosis.

Granos de la cara. V. Herpes.

Granulaciones de la córnea. Tintura de opio compuesta de Carrea de Villards, III, 215.

Grietas y escoriaciones. Bálsamo del caballero Laborde, I, 356. Ceratos: de Galeno, I, 426. — de Goulard, I, 426. — de plomo de los H. M., I, 427. — de Turner, I, 431. — emoliente, I, 426. — simple, I, 471. Emplasto de albayalde, II, 23. Manteca de cacao, I, 131. Pomadas: astringente, III, 87. — con los calomelanos, III, 104. — contra las grietas de los pechos, de Cruveilhier, III, 99. — de Boyer, III, 90. — para los labios, I, 118. Tintura de almáciga compuesta, III, 189. Ungüentos: de acetato de plomo de la F. E., III, 275. — de Montpellier, III, 292. — rosado de la F. E., III, 299.

Grietas del ano. Linimento alcalino de Plenck, II, 325. Mistura para curar las grietas del ano, de Bretonneau, II, 401. Pomadas: de belladona, III, 89. — de camuesas, III, 91. — sedante de Dapnytren, III, 131. Nitrato de plata, I, 231. Operacion.

Grietas de los labios. V. Grietas. Unturas con aceite ó unguento de saturno ú opiadas. Cerato para las grietas de los labios, I, 429. Pomadas: astringente de agraz, III, 87. — de calomelanos, III, 92. — de camuesas, III, 91. — para los labios, III, 118.

Grietas del pecho. V. Grietas. Unturas con aceite ó unguento de saturno ú opiadas. Bálsamo de Laborde, II, 356. Cerato cosmético de Van-Mons, I, 424. Linimento contra las grietas de los pezones, II, 333. Pomadas: astringente, III, 87. — astringente de agraz, III, 87. — contra las grietas de los pechos, de Cruveilhier, III, 99. — para las

grietas de los pechos, de Chevallier, III, 127.
Vino tibio con miel.

Hematemesis activa. V. Hemorragias.

Hematemesis pasiva. V. Hemorragias pasivas. Bál-
samo astringente de Richard de Hautensierk, I,
354. Bebidas frias. Jarabe de ratania, II, 262.
Mistura astringente de Silvio de los H. de M.,
II, 405. Píldoras: astringentes de Cullen, II, 485.
Pocion hemostática de Broussonnet, II, 607. Sue-
ro aluminoso, I, 267. Tópicos frios sobre el epi-
gastro.

Hematuria activa. V. Hemorragias.

Hematuria pasiva. V. Hemorragias pasivas.

Hemiplejia. V. Parálisis.

Hemoptisis activa. V. Hemorragias activas. Emi-
siones sanguíneas. Reposo absoluto. Revulsivos.
Pocion de tanino, I, 278.

Hemoptisis pasiva. V. Hemorragias pasivas. Apo-
cema tónico de Babeyrac, I, 345. Bálsamos: as-
tringente de Richard, I, 354. — astringente de
Richard de Hautensierk, I, 354. Electuarios:
balsámico de Barthez, I, 519. — astringente de
Barthez, I, 517. — astringente de Fuller de la
F. E., I, 518. Jarabes: de catecú, II, 223. — de
ratania, II, 262. Looc astringente de Swediaur,
II, 361. Manilovios, II, 367. Misturas: de Qua-
rin, II, 403. — de Silvio de la F. E., II, 405.
Píldoras antihemoptóicas de Cottereau, II, 471.
Pociones: hemostática de Broussonnet, II, 607.
— de Jussieu, II, 611. Polvos: de Haly, III,
52. — restrictivos de ciprés de la F. E., III,
66.

Hemorragia cerebral. V. Apoplejía.

Hemorragias activas y traumáticas. Reposo abso-
luto. Emisiones sanguíneas. Hielo, I, 187. Re-
vulsivos en los miembros. Bebidas atemperan-

tes. Disolución aluminosa de Scudamore, I, 497. Polvo astringente de Gaubius, III, 16. Píldoras de alumbre de Helvetius, II, 459. Polvos: estíptico, III, 43. — estíptico de Colbatch, III, 43. — de Vernix, III, 76. — hemostático del doctor Bonnafox, III, 52. Ventosas secas.

Hemorragias pasivas. Tanino, I, 278. Astringentes, III, 423. Acetato de plomo, I, 82. Alumbre, I, 267. Antimoniales. Acido sulfúrico con el alcohol aromático, I, 301. Aguas: aluminosa de la F. E., I, 304. — del arcabuzazo de Theden, I, 306. — estíptica de la F. E., I, 314. — tediana de los H. de M., I, 306. Apocema tónico de Babeyrac, I, 345. Bebida astringente, I, 374. Bálsamo astringente de Richard de Hautensierk, I, 354. Bebida ferruginosa, I, 376. Bolos astringentes, I, 386 y 387. Caldo astringente de Astruc, I, 402. Cocimientos: astringente de los H. de M., I, 447. — de centeno cornezuelo, I, 148. Electuarios: astringente, I, 517. — astringente de Barthez, I, 517. — astringente de Fuller, I, 518. — balsámico de Barthez, I, 513. Especies astringentes, II, 79. Eter sulfúrico marcial, II, 106. Fomento astringente, II, 111. Infusiones: de centeno cornezuelo, II, 167. — de rosas rojas, II, 171. Jarabes: de catecú, II, 223. — de ratania, II, 262. — de tanino de Friad, II, 267. Limonadas: nítrica de los H. M., II, 322. — sulfúrica, II, 323. — sulfúrica de los H. M., II, 323. Loción astringente, II, 352. Misturas: de centeno cornezuelo de Bocquet y Dufresnoy, II, 389. — de Quarin, II, 403. Píldoras: astringentes de los H. de M., II, 484. — de cobre de Swediaur, II, 500. Pociones: astringente, II, 582. — astringente de Fouquier, II, 583. —

astringente de Gamba, II, 583. — de tanino, I, 278. — estíptica, II, 604. — ferruginosa, II, 605. — hemostática de Broussonet, II, 607. Polvos: astringentes, III, 16. — de kino compuesto, III, 54. — estíptico de Colbatch, III, 43. Suero aluminoso. Supositorios fortificantes de Reuss, III, 169. Tisanas: astringente, III, 224. — astringente de Chaptal, III, 225. — astringente de los H. M., III, 225. Baños fríos, I, 69. Lavativas con media dracma de extracto de ratania. Tópicos fríos.

Hemorragias intestinales. V. Hemorragias.

Hemorragias traumáticas. V. Hemorragias activas.

Hemorragias uterinas. V. Metrorragia.

Hemorroides. Sanguijuelas. Bálsamos: tranquilo de Chomel, I, 362. — tranquilo de la F. E., I, 361. Bolos contra las hemorroides, I, 390. Cocimiento de acibar compuesto, I, 439. Electuarios: anticaquéctico de Ward, I, 511. — antihemorroidal de Reuss, I, 515. — de azufre, I, 519. Extracto de acibar de Poerner, II, 93. Escudo antihemorroidal de Pierquin, II, 67. Linimentos: antihemorroidal de los H. M., II, 329. — de Andry, II, 326. — sedante, II, 345. Opiata ó pasta de Ward, II, 415. Píldoras para restablecer las hemorroides, II, 546. Pomadas: antihemorroidal de Cullen, III, 86. — astringente de agraz, III, 97. — de Boyer, III, 80. Supositorios: aloético, III, 166. — contra las hemorroides, III, 169. — fortificante de Reuss, III, 168. — para provocar las hemorroides, III, 167. Tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. Ungüentos: antihemorroidal, III, 277. — de Falck, III, 287. — de la Condesa, de la F. E., III, 282. — de Montpellier, III, 292. —

de propoleos, de Cadet, III, 298. — de tomate, III, 301. — hemorroidal, III, 288. — hemorroidal de la F. M., III, 288. — populeon de la F. E., III, 297. Para provocar las hemorroides se usa el acibar en polvo.

Hepatitis aguda. V. Ictericia. Emisiones sanguíneas. Antimoniales. Bebida atemperante, I, 375. Julepe contra-estimulante de Laennec, II, 277.

Hepatitis crónica. V. Ictericia. Moxas, I, 188. Aguas: alcalinas, I, 303. — de mar, III, 387. Baño facticio de Plombieres, I, 366. Electuario de Kortum, I, 629. Eteres: nítrico alcoholizado, II, 204. — nítrico terebintinado de Leochenault de Latour, II, 104. Extracto de bilis de buey, I, 127. Jabon vegetal, II, 197. Julepe amargo de Gall, II, 273. Limonada hidroclicóica, II, 322. Mercuriales. Pediluvios nitro-muriáticos de Scott, II, 453. Píldoras: antiictéricas de Coeroly, II, 476. — de jabon, II, 533. — de jabon compuestas, II, 533. — de Plumer, II, 547. — fundentes de Richter, II, 522. — fundentes de Smith, II, 523. — jabonosas de los H. de M., II, 532. Polvo purgante y atemperante, III, 64. Pomadas: de Fabrè, III, 109. — fundente de Lermnier, III, 110. Zumo de yerbas fundente, III, 333.

Heridas. Antiflogísticos. Aguas sulfurosas, III, 346. Riegos de agua fria. Aceite de óxido de cobre verde, I, 297. Bálsamo verde de los H. de M. Aguas: de Alibour, I, 304. — verde de Artmann, I, 330. — de vegetal de la F. E., I, 330. Bálsamos: de Arceo de los H. M., III, 278. — de Goulard, I, 358. — samaritano de Tornamira, I, 361. — samaritano de los H. M., I, 361. Cerato de Hufeland, I, 427. — de Pott, I, 430. Digestivos, I, 493. Disolucion contra las heridas hechas durante la diseccion, II, 503. Emplastos: adhesivo,

II, 21. — de Baynton, II, 25. — de Canet, I, 26. — de caoutchu de Swediaur, II, 27. — aglutinante de Andrés de la Cruz, II, 21. — aglutinante de Woodstock, II, 22. — aglutinante inglés, II, 22. — emoliente de esperma de ballena, II, 34. Esparadrappo: aglutinante de Sevin, II, 73. — común, II, 76. — de cola de pescado, II, 75. — de diapalma, II, 77. Inyeccion tónica, II, 290. Locion resolutive, II, 357. Tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. Ungüentos: de acetato de plomo, III, 275. — de Arceo de la F. E., III, 277. Vino con miel, III, 321.

Hérnias. Reduccion. Vendaje. Emplastos: aglutinante de Andrés de la Cruz, II, 21. — de cola para las hérnias, de la F. E., II, 30. — de pez negra regio de la F. E., II, 44. Extracto de belladona, I, 123. Pomada de tanino, III, 132. Astringentes, III, 423.

Herpes. Preparaciones: de dulcamara, I, 171. — de zarzaparrilla, I, 291. — ioduradas. — de azufre, I, 117. Sulfuro de potasa, I, 275. Cloruro de sosa, I, 160. Nitrato de plata, I, 230. Tabaco, I, 276. Purgantes. Sulfatos: de magnesia, I, 271. — de sosa, I, 272. Aceite oxigenado de Deimann, I, 298. Aguas: antiherpética del Cardenal de Laynes, I, 305. — clorurada, I, 310. — de cal compuesta, I, 309. — oxigenada de Alyon, I, 326. — roja de Alibert, I, 328. — sulfurosas, III, 346. — salinas termales. — sulfurosa compuesta, I, 329. Baños: de agua de jabon. — de agua de salvado, I, 364. — de gelatina, I, 367. — de sublimado, I, 168. — de vapor acuoso, I, 363. — de vapor aromático, I, 369. — sulfurosos, III, 346. Bebidas antiherpéticas, I, 372. Bolos: anti-mercuriales, I, 386. — diaforéticos ingleses, I, 391.

Caldo de cangrejos de Astruc, I, 403. Cataplasma de fécula, I, 417. Ceratos: azufrado, I, 425. — de Goulard, I, 426. — de plomo de los H. M., I, 427. — de precipitado blanco de Gibert, I, 430. — mercurial de Falck, I, 428. — mercurial de Zeller, I, 428. — nicocianado de Conbruch, I, 428. Cocimientos: de hollin de Bland, I, 455. — de Pollini, primera fórmula, I, 458. — de Pollini, segunda fórmula, I, 459. Cosméticos: de Alibert, I, 483. — de Siemerling, I, 489. Chorros sulfurosos, III, 346. Disoluciones: boratada de Huffeland, I, 500. — contra las afecciones herpéticas del oído, I, 502. — de arseniato de amoniaco, I, 499. — de carbonato de sosa, I, 500. — de cloruro de cal, I, 502. — de Heincke, I, 503. Electuarios: antiherpético de Fouquet, I, 516. — antiherpético de Pougens, I, 516. — de azufre, I, 519. Embrocacion mercurial de Baleman, II, 19. Emulsiones: mercurial de Duncan, II, 59. — purgante de Alibert, II, 60. Extracto de zumaque venenoso antimonial de Fages, II, 99. Fumigaciones: mercurial, II, 125. — sulfurosas. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169. Jabon mercurial de Chaussier, II, 195. Jarabes: de higado de azufre, II, 249. — depurativo azufrado, II, 234. — depurativo de Larrey, II, 235. — depurativo de Majault, II, 235. Licores: antisifilítico de Chaussier, II, 311. — arsenical de Biett, II, 310. — arsenical de Fowler, II, 311. — arsenical de Pearson, II, 311. — de Pressavin, II, 316. Limonada hidroclórica, II, 322. Liniamentos: jabonoso hidrosulfurado de Jadelot, II, 340. — resolutivo, II, 343. Lociones: alcalina, II, 350. — aluminosa y sulfurosa de Gall, II, 351. — antiherpética y astringente de Alibert,

- II, 351. — con jabon, II, 354. — escitante y cáustica de Alibert, II, 355. — gomosa y mercurial de Franck, II, 353. — hidrocianica de Magendie, II, 356. — ioduro-sulfurosa de Dauvergne, II, 356. — mercurial, II, 357. Mercuriales. Mezclas: para lociones de Biett, II, 372. — para lociones de Magendie, II, 374. Mistura alcalina de Biett, II, 379. Nitrato ácido de mercurio, I, 230. Opiata napolitana, II, 415. Píldoras: antiherpéticas, II, 471 y 472. — antiherpéticas de Barthéz, II, 472. — antiherpéticas de Dubois, II, 473. — antiherpéticas de Kunkel, II, 474. — antiherpéticas y antisifilíticas de Bally, II, 473. — asiáticas, II, 482. — de acónito mercuriales de Doble, II, 457. — de arseniato de hierro de Biett, II, 481. — de cloruro de oro, II, 499. — de dulcamara y sulfuro de antimonio, II, 512. — de ioduro de arsénico, I, 205. — de Plumer, II, 547. — de Sainte Marie, II, 454. — mercuriales de Cadet, II, 540. Polvos: arsenical de Dupuytren, III, 36. — arsenical de Justamond, III, 14. — atemperante y laxante de Bouillon-Lagrange, III, 70. — de cloruro de oro, III, 23. — de cloruro de oro y sódio, III, 23. — de Dupuytren, III, 36. — mercurial y de carbonato de magnesia de Cheyne, III, 57. — sulfuro-magnesiano de Biett, III, 70. Pomadas: alcalina, III, 78. — alcalina de Biett, III, 78. — antiherpética, III, 82. — antiherpética de Gollier, III, 83. — antiherpética de Chevallier, III, 82. — antiherpética de Dubois, III, 83. — antiherpética de los H. M., III, 82. — antiherpética de Gibert, III, 80. — antioftálmica de Dessault, III, 83. — azufrada, III, 88. — citrina con aceite de olivas, de Planche, III, 94. — clorada, III, 95. — con los calomelanos, III, 104. — de cianuro de

mercurio de Bielt, III, 93. — de Bauyen, III, 89. — de Cyrillo, III, 94. — de deut-ioduro de mercurio de Bielt, III, 104. — de deutóxido de mercurio de Bielt, III, 105. — de Duchesne Duparc, III, 105. — de calomelanos, III, 92. — de Giroax, III, 110. — de hollin de Bland, III, 113. — de ioduro de arsénico de Bielt, III, 115. — de ioduro de azufre, III, 116. — de proto-cloruro de mercurio amoniacal de Bielt, III, 129. — de proto-ioduro de mercurio de Bielt, III, 128. — de proto-ioduro de mercurio de Magendie, III, 128. — de protonitrato de mercurio, III, 129. — de sulfuro de mercurio de Bielt, III, 132. — sulfuro-jabonosa de Lugol, III, 132. — de turbit de Alibert, III, 134. — oxigenada de la F. E., III, 126. — oxigenada de los H. M., III, 126. — resolutive de Bielt, III, 130. Preparaciones de dafne merceon. — de oro, I, 236. — de arsénico. — de mercurio usadas exteriormente. Tabletetas: de azufre compuestas, III, 173. — de azufre simples, III, 172. Tintura de lupulina, III, 210. Tisanas: alcalina de Bielt, III, 221. — antiépsórica, III, 222. — antiherpética de Gibert, III, 223. — de achicoria, I, 97. — de bardana, I, 121. — de saponaria, I, 260. — de Feltz, III, 233. — de guayaco y dafne merceon, III, 234. — de zarzaparrilla compuesta, III, 242. — de Vinache, III, 241. — diaforética de Brera, III, 229. — de Gimelle, III, 223. — de los H. M., III, 229. Tópico calmante de Thompson, III, 213. Ungüentos: contra los herpes, de la F. E., I, 283. — oxigenado mercurial del Dr. Bañares, III, 295. — mercurial blanco, III, 290. Se hará aparecer los herpes suprimidos por medio de un vejigatorio, cuando sobrevienen accidentes á consecuencia de su supresion, y se administra-

rán además las preparaciones de dulcamara.

Hidrocefalo agudo. Apocems contraestimulante de Laennec, I, 343. Polvos: contraestimulantes, III, 25. — de calometanos, I, 134. Antiflogísticos. Derivativos. Revulsivos.

Hidrofobia. V. pág. 405, tomo III.

Hidrocele. Fomentos: con tintura de iodo, I, 203. — vinoso, II, 119. Inyecciones: estimulante de los H. M., II, 181. — iodada de Velpeau, II, 183. — irritante, II, 184. Locion astringente, II, 353. Tintura de iodo debilitada de Ricord, III, 209. Operacion.

Hidropesia. Aceites: de croton tiglio, I, 76. — de tártago, I, 80. Corteza de saúco, I, 261. Coloquintida, I, 163. Elaterio, I, 172. Escamones, I, 177. Gutagamba, I, 197. Agua diurética alcanforada, I, 312 y 313. Alcohol de Boerhaave, I, 332. Alcoholados: de extracto de cainca, I, 334. — de veratrina, I, 337. Azúcares: alcalina de Blondeau, I, 347. — de extracto de cainca, I, 348. Bolos de escila, I, 393. Bebida ferruginosa, I, 376. Cataplasma diurética, I, 416. Cerveza diurética inglesa, I, 434. Cocimientos: de coloquintida compuesto, I, 450. — de escila compuesto, I, 454. — de los leños de la F. E., I, 456. — diurético alcalino, I, 452. Disolucion de veratrina de Magendie, I, 508. Electuario de cainca, I, 520. Extracto de ruibarbo compuesto, I, 99. Electuarios: hidragogo de Fouquier, I, 521. — hidragogo de Quarin, I, 527 y 528. — purgante, I, 531. Elixir resolutivo de Selle, II, 15. Emulsion diurética de Swediaur, II, 56. Esencia escilítica de Kenp, II, 72. Especies diuréticas, II, 80. Espíritu de enebro compuesto, II, 88. Extractos: alcohólico de cainca, II, 93. — de coloquintida compuesto, II, 94. — de enebro

compuesto, II, 95. Fricciones con tintura de digital. Jabon ácido de Carminati, II, 191. Jarabes: antiartrítico y antihidrópico, II, 210.—calibeado de Willis, II, 220.—de las cinco raíces aperitivas, II, 226.—de las cinco raíces, de la F. E., II, 227.—drástico, II, 239. Julepe escilítico, II, 278. Jarabes: hidrólico de extracto de caínca, II, 248.—oenólico de extracto de caínca, II, 254. Lavativas diuréticas, II, 297. Linimentos: diuréticos, II, 336.—diurético de Ruyér, II, 336. Miel de bayas de saúco de la F. E., II, 375. Miel escilítica, II, 376. Misturas: catártica árabe, II, 589.—de mirra alcalizada de Griffith, II, 399.—hidragoga de Vvan-Swieten, II, 397.—hidrogoga de Sundelin, II, 397. Nitrato de potasa, I, 231. Ojinielles: cólchico, II, 417.—escilítico de la F. E., II, 418. Pastillas de énula campana, II, 440. Píldoras: antihidrópicas de Graefe, II, 474.—contra la hidropesía, II, 504.—de Bacher, II, 486.—de Barclay, II, 488.—de caínca, II, 491.—de cantáridas, II, 493.—de digital, de Withering, II, 509.—de Dupuytren, II, 512.—de veratrina de Magendie, II, 565.—diuréticas de los H. M., II, 510.—diuréticas hidragogas, II, 510.—escilíticas, II, 514.—escilíticas de Chrestien, II, 515.—escilíticas de los H. de M., II, 514.—esténicas de Brown, II, 517.—hidragogas, II, 525.—hidragogas de Bontius, II, 526.—hidragogas de Janin, II, 526.—purgantes de Dehaen, II, 551.—purgantes y diuréticas de Franck, II, 551.—Pociones: aperitiva, II, 581.—de Huffeland, II, 608.—de ipecacuana de Haller, II, 610.—diuréticas, II, 534.—diurética de Buchard, II, 594.—diurética de Fouquier, II, 596.—diurética de los H. M., II,

595. — diurética de Hallé, II, 596. — diurética y calmante, II, 595. — emulsionada de maná, II, 600. — escilítica, II, 600. — escilítica de los H. M., II, 601. Polvos: de Ailhaut, III, 1. — de escila compuesto de Stahl, III, 40. — de escila nitrado de Vanhelmont, III, 40. — diurético, III, 33. — diurético atemperante, III, 33. — purgante y diurético de Lescure, III, 64. Pomada de veratrina de Magendie, III, 134. Preparaciones: de acónito, I, 93. — de cainca, I, 132. — de colchico, I, 162. — de cebolla albarrana, I, 146. — de digital, I, 168. — de émula campana, I, 176. Purgante de Leroy, III, 135. Suero nitrado, I, 164. Tinturas: alcohólica de cainca, III, 187. — alcohólica de cainca amoniacal, III, 187. — antihidrópica de Boerhaave, III, 193. — etérea de digital purpúrea, I, 168. — hidrólica de cainca, III, 207. — vinosa de hierro tartarizada de la F. E., III, 218. Tisanas: aperitiva de los H. M., III, 224. — Tisana de apio, I, 33. — de cainca compuesta, III, 227. — de esparraguera, I, 33. — diuréticas, III, 230. — diurética de Dubois, III, 231. — diurética de Foy, III, 231. — diurética de Recamier, III, 231. Trociscos de Alhandal, III, 270. Ungüento diurético, III, 284. Vinagres: de colchico de Reuss, III, 308. — de pimienta de Indias, de Swediaur, III, 312. Vinos: antihidrópico de Fuller, III, 317. — de cainca, III, 319. — de colchico de Locher Baber, III, 321. — de guayaco con eléboro de Lewis, III, 327. — de semillas de colchico, III, 322. — diuréticos, III, 328. — diurético amargo, III, 322. — diurético inglés, III, 322. — escilítico de Richard, III, 323. — hidragogo, III, 327. — con nitro, I, 231. Sedal.

Hidrotorax. V. Hidropesías. Bolos antiasmáticos,

I, 383. Píldoras: de digital, de Withering, II, 509. — de Dupuy contra el hidrotorax, II, 512. Preparaciones de polígala, I, 244.

Hinchazon de las articulaciones. V. Tumores blancos y gota.

Hinchazones edematosas. V. Edema de los miembros.

Hidrocéfalo de los ancianos. V. Apoplejía serosa.

Hipertrofia del corazón. Digital, I, 168. Disoluciones: atrófica de Magendie, I, 499. — atrófica con la tintura de digital, de Magendie, I, 500. — de hidriodato de potasa de Magendie, I, 504. — de hidriodato de potasa iodurado de Coindet, I, 504. Emplasto de digital, II, 33. Hidromel espectorante, II, 158. Jarabes: calmante de Roux, II, 221. — de puntas de espárrago, I, 57. — de puntas de espárrago, de Chevallier, II, 260. Julepe sedante de Fouquier, II, 283. Linimento sedante de Cottereau, II, 345. Píldoras: de bromuro de hierro de Magendie, II, 491. — de digital de Withering, II, 509.—sedantes, II, 556. Poción sedante de Fouquier, II, 623. Polvos: calmante de Cottereau, III, 18. — fundente de Cottereau, III, 51. Tintura etérea de digital purpúrea, I, 168.

Hipo. Eteres, I, 183, y preparaciones etéreas. — nítrico alcoholizado, II, 104. Jarabe de éter, II, 242. Pociões antiespasmódicas, II, 576. Antiespasmódicos, III, 436. Poción estimulante de Alibert, II, 602.

Hipocondria. Aguas: alcalinas, I, 303. — de mar, III, 387. Antiespasmódicos, III, 436. Drásticos, III, 440. Agua fundente, I, 317. Emulsiones: purgante con aceite de tártago, de Calderini, II, 61. — purgante con escamonea, II, 61. Jabón medicinal, II, 193. Píldoras: calibeadas, II,

491. — de amoniaco, II, 460. — esplénicas, II, 516. — marciales de la F. E., II, 536. — marciales de los H. de M., II, 536. — tónicas de Huhn, II, 560. — tónicas de Stoll, II, 560. Preparaciones de acibar, I, 83.
- Histerismo.* Almizcle, I, 107. Ambar gris, I, 109. Castóreo, I, 144. Asa fétida, I, 115. Baño frío, I, 69. Alcoholato de melisa compuesto, I, 338. Bálsamo antihistérico de Virey, I, 353. Bolos: antiespasmódicos, I, 384. — antiespasmódicos de Bally, I, 384. — antiespasmódicos de Buchan, I, 385. — carminativos, I, 388. — de valeriana, I, 400. Cerveza cefálica inglesa, I, 433. Electuarios: antiepiléptico de los H. de M., I, 530. — antiespasmódico de Swediaur, I, 515. — peruviano antiepiléptico de Fuller de la F. E., I, 530. Elíxir fétido de Fulde, II, 10. Emplastro antihistérico, II, 24. Esencia antihistérica de Lemort, II, 70. Espiritus: de amoniaco, II, 87. — de amoniaco aromático, II, 87. — de amoniaco fétido, II, 87. — de éter, II, 89. — de éter sulfúrico, II, 90. — de hollin, de Reuss, II, 90. — etéreo aromático, II, 89. Eter, I, 183. Flores: de naranjo, I, 228. — de tilo, I, 282. Eteres: acético marcial de Klapproth, II, 101. — hidrocórico alcoholizado, I, 103. — nítrico, I, 183, y II, 104. — zincado, II, 107. Gotas: antiespasmódicas, II, 248. — antihistéricas, II, 148. — calmantes, II, 149. — cefálicas inglesas, II, 150. Infusiones: de valeriana de los H. de M., II, 173. — de valeriana compuesta, II, 173. — nervina de los H. de M., II, 170. Jarabes: de claveles compuesto, de Cottereau, II, 229. — de éter, II, 242. — de karabé, II, 251. Julepe alcanforado de la F. E., II, 272. Lavativas: de almizcle alcanforada, II, 290. — de asa fétida, II, 293. Mistura antihistérica, II, 381.

- Opiata antiépiléptica de Idler, II, 409. Píldoras: antiespasmódicas de Petit, II, 469. — antiespasmódicas de Piderit, II, 469. — antihistéricas, II, 475. — antihistéricas de Selle, II, 475. — benedictas de Fuller, II, 489. — de asa fétida é ioduro de hierro, II, 482. — de asa fétida y alcanfor, II, 481. — de cobre de Swediaur, II, 500. — de gálbano compuestas de Murray, II, 524. — de ioduro de zinc y morfina, I, 209. — de Koopp, II, 533. — de Quarin contra la epilepsia, II, 553. — de valeriana, II, 564. — fundentes de Smith, II, 523. — fundentes de Richter, II, 522. — histéricas de la F. M., II, 527. — marciales de Koempf, II, 535. — marciales de la F. E., II, 539. — marciales de los H. de M., II, 536. — moscadas compuestas de Hunter, II, 545. Póciones: antiespasmódica, II, 576. — antihistérica, II, 578. — calmante y antiespasmódica, II, 586. — moscada de Dubois, II, 614. Polvos: antiespasmódico, III, 7. — antiespasmódico de Magendie, III, 7. — de Tunquin de Reuss, III, 73. — fumigatorio fétido, III, 50. Preparaciones: de azafran, I, 117. — de valeriana, I, 286. Purgantes, III, 440. Supositorio antiespasmódico, III, 166. Té tunka, III, 185. Tinturas: alcohólica de mirra uterina de la F. E., III, 190. — antiespasmódica de Keup, III, 193. — antihistérica, III, 200. — de hollin, III, 208. — tebáica de Bamberg, III, 218. Tisana de valeriana, I, 33. Antiespasmódicas, III, 436.
- Ictericia.* Amargos, III, 425. Bebidas atemperantes. Electuario de Kortum, I, 529. Elixires: de propiedad de la F. E., II, 14. — febrífugo de Whitt, I, 9. Eter nítrico terebintinado de Leschenault de Latour, II, 104. — sulfúrico marcial, II, 106. Infusion de hollin compuesta de Piderit, II, 169.

- Jabones**: ácido de Carminati, II, 191. — medicinal, II, 193. Miel de bayas de saúco de la F. E., II, 375. Mistura de Quarin, II, 404. Píldoras: amargas de Gall, II, 460. — antiictéricas de Buchan, II, 476. — antiictéricas de Coeroly, II, 476. — antiictéricas de Storck, II, 476. — de Greding contra la ictericia, II, 525. — fundentes de Richter, II, 522. — fundentes de Smith, II, 523. — tartáreas de Schroederer, II, 558. Poción de ipecacuana de Haller, II, 610. Polvo de antimonio marcial diaforético de Keup, III, 9. Tintura de ruibarbo de Spielmann, III, 217. Polvo purgante y atemperante, III, 64. Preparaciones de acibar, I, 83. Vino antiictérico, III, 317. Zumode yerbas depurativo, III, 332. — de yerbas fundente, III, 333.
- Ileo**. Antiespasmódicos, III, 436. Narcóticos, III, 436. Purgantes, III, 440. Tópico de hielos.
- Impétigo**. Cataplasma de fécula, I, 417. Disolución de nitrato de plata de Biett, I, 507. Licor arsenical de Biett, II, 310. Mezclas: para lociones, II, 372. — para lociones de Biett, II, 372. Polvo contra el impétigo, de Biett, III, 26. Pomada contra el impétigo, III, 97. Preparaciones de arsénico.
- Incontinencia de orina**. Mistura contra la incontinencia de la orina, II, 392. Pastillas de geng-seng, II, 441. Píldoras contra la incontinencia de orina de los niños, de Ribes, II, 504.
- Indigestion**. Eméticos, III, 439. Ipecacuana, I, 209. Preparaciones de éter, I, 183. Bebida carminativa, I, 375. Elixires: americano de Courcelles, II, 1. — de larga vida, II, 11. Píldoras: contra la indigestion de las bebidas vinosas, II, 505. — estomacales de Cadet, II, 518. — estomacales de Smith, II, 519. Póciones: de Spielmann, II, 623. — calmantes, II, 586. Té tunka, III, 185. **Tu-**

turas: estomacal, III, 202. — estomacal amarga, III, 201. — estomacal de Moscati, III, 203. — sagrada, III, 217.

Inercia de la matriz. V. Parto laborioso.

Infartos abdominales. V. Hepatitis crónica y esplenitis crónica. — *crónicos de las amígdalas.* V. Angina. — *crónicos de las vísceras abdominales.* V. Obstrucciones. — *de las mamas.* V. Tumores glandulosos de los pechos. — *de las vísceras abdominales.* V. Esplenitis y hepatitis crónicas. — *del bajo vientre.* V. Nefritis crónica, &c. — *del cuerpo tiroideo.* V. Bocio. — *del hígado.* V. Hepatitis. — *del pecho.* V. Tumores del pecho.

Infartos de los testículos. Píldoras de calomelanos compuestas de Ricord, II, 493. Polvo de Plumer, III, 63. Pomadas ioduradas, III, 115. — *del sistema linfático.* V. Carreau y escrófulas. — *escrofulosos.* V. Escrófulas. — *glandulosos.* V. Tumores. — *linfáticos.* V. Escrófulas, carreau, &c. — *venéreos.* V. Sífilis.

Inflamaciones. V. Flegmasías. — *catarrales.* V. Bronquitis, angina, &c. — *crónica de los párpados.* V. Oftalmia crónica. — *de la boca.* V. Estomatitis. — *de las encías.* V. Estomatitis y escorbuto. — *de la lengua.* V. Flegmasia.

Inflamacion de la retina. V. Oftalmia aguda. Tratamiento de Dupuytren contra la inflamacion de la retina, III, 251.

Inflamaciones de pecho. V. Catarros, neumonia, pleuresia, &c.

Insomnio. Opio, I, 234, y preparaciones opiadas. Clorhidrato doble de morfina y codeina, I, 158. Disolucion de acetato de morfina de Magendie, I, 496. Electuario opiado de beleño de la F. E., I, 529. Elíxir de Barthez, II, 7. Emulsiones: anodina de los H. de M., II, 53. — calmante, II, 55.

Específico anodino de Paracelso, II, 86. **Extracto de opio acuoso privado de narcotina**, II, 98. — de opio por fermentacion, II, 98. **Frontales: anodino de la F. M.**, II, 120. — **hinóptico**, II, 120. **Gotas calmantes**, II, 149. **Infusión acuosa de opio**, II, 164. **Jarabes: de acetato de morfina**, II, 205. — de beleño de Chevallier, II, 217. — de karabé, II, 251. — de claveles compuesto de Cottereau, II, 229. — de meconio de la F. E., II, 253. **Píldoras: de acetato de morfina**, II, 455. — de codeína, II, 500. — de codeína de Magendie, II, 501. — de lactucario, I, 212. — orientales, II, 546. **Polvo calmante de Cottereau**, III, 18. **Tintura tebaica de Bamberg**, III, 218.

Iscuria. V. Disuria. Aguas: de Quercetan, I, 327. — **diurética alcanforada de Fuller**, I, 313. — **espirituosa de Auhalt**, I, 313. **Candelillas de Darán**, I, 408. **Cataplasma contra la iscuria**, I, 416. **Disoluciones: de acetato de morfina**, I, 496. — de citrato de morfina, I, 501. **Diurético de Dehaen**, I, 508. **Esencias: dulce de Hales**, II, 72. — **carminativa de Wedel**, II, 71. **Espíritu de enebro compuesto**, II, 88. **Leche terebintinada**, II, 306. **Licor antinefrítico de Adams**, II, 310. **Linimentos: diurético de Kuser**, II, 336. **Misturas: de Cronier**, II, 393. — **diurética**, II, 394. **Píldoras de Carlos Bell**, II, 494. — de trementina magistrales, II, 562. — **escilíticas**, II, 514. **Pociones: capivi**, II, 587. — **diurética de Buchan**, II, 594. — **diurética de Hallé**, II, 599. — **volátil de guayaco de Londres**, III, 219. **Polvo atemperante y laxante de Bouillon-Lagrange**, III, 70. **Pomada antiespasmódica de Gollin**, III, 81.

Iritis crónica. V. Oftalmia.

Irritaciones: de estómago. V. Gastritis. — de la garganta. V. Angina. — de la piel. V. Enferme-

dades cutáneas. — *de la vejiga de la orina*. V. Cistitis. — *de vientre*. V. Gastro-enteritis. — *gastro-intestinal*. V. Gastro-enteritis.

Jaqueca. V. Cefalalgia.

Laringitis. V. Angina y fleugasias.

Lepra. Cocimiento diaforético de Brom, I, 452.

Licor arsenical de Bielt, II, 310. Píldoras asiáticas, II, 482. Pomada de proto-nitrato de mercurio de Bielt, III, 129. Preparaciones: de arsénico. — de dulcamara, I, 171. — de mercurio, I, 224.

Letargo. V. Coma. Alcohol de veratrina de Magendie, I, 337. Disolución de veratrina de Magendie, I, 287. Espíritus: de amoniaco, II, 87. — de amoniaco aromático, II, 87. Lavativas: estimulante de los H. de M., II, 298. — irritante de los H. M., II, 300. — irritante de vino antimoniado de la F. E., II, 300. Mistura antiletárgica de Franck, II, 383. Píldoras de veratrina, II, 565. Pomada de veratrina, II, 134. Trociscos de Alhandal, III, 270.

Leucoflegmasia. V. Anasarca é hidropesías.

Leucorrea ó flores blancas. V. Clorosis y Astenia.

Buenos alimentos. Insolacion. Tanino y otros astringentes. Preparaciones de iodo. Centeno cornezuelo, I, 148. Cobebas, I, 167. Preparaciones: de copaiba, I, 165. — de hierro, I, 200. Acetatos: de amoniaco y hierro líquido, I, 300. — de peróxido de hierro, I, 300. Aguas: aluminosa de la F. E., I, 304. — calibeada, I, 309. — celeste, I, 310. — hidriodada, I, 206. — de hidriodato de hierro, I, 318. Ajenjo suizo, I, 331. Alcoholados: de acetato de hierro, I, 333. — de citrato de hierro, I, 334. — de percloruro de hierro, I, 336. Apocemas: tónico de Babeyrac, I, 345. — tónico dulcificante de Barthea,

I, 346. Baños: de ioduro de hierro. — facticio de Plombieres, I, 366. — de hidriodato de hierro, I, 367. Bebida ferruginosa, I, 376. Bolas de Marte, I, 381. Bolos: antigonorreicos, I, 385. — de ratania, I, 398. — fortificantes de Desbois, I, 337. Citrato de peróxido de hierro, I, 437. Confitos contra las flores blancas, de Colombat, I, 484. Chocolate con el hidriodato de hierro, II, 160. Disolucion de sulfato de cobre, I, 269. Electuario peruano astringente de Fuller de la F. E., I, 531. Elíxires: americano de Courcelles, II, 1. — de vitriolo dulce, II, 19. — estomacal de Stoughton, II, 8. — febrífugo de Whitt, II, 9. — fortificante de Selle, II, 10. — uterino de Crollios, II, 17. Emplasto estíptico de Swediaur, II, 34. Emulsion de cubebas de Beral, II, 58. Eterolado de acetato de hierro de Beral, III, 203. — de percloruro de hierro de Beral, III, 204. Extracto de Marte, II, 96. Fomento de vino aromático con tanino de Ricord, II, 119. Granos de catecú, II, 151. Inyecciones: aluminosa y fuliginosa, II, 175. — aluminosa para la vagina, de Ricord, II, 176. — astringente, II, 177. — de acetato de plomo para la vagina, II, 174. — de cubebas de Chevallier, II, 182. — de Girtanner, II, 183. — de Pringle, II, 187. — de tanino de Ricord, II, 188. — de Tavernier, II, 188. — de Young, II, 189. — mercurial, II, 184. — mercurial de Bromfield, II, 185. — de proto-ioduro de hierro. — de rosas rojas. Jarabes: de acetato de amoniaco y hierro de Beral, II, 204. — de acetato de hierro de Beral, II, 204. — calibeado de Willis, II, 220. — de citrato de hierro de Beral, II, 228. — de citrato de hierro de Trousseau, II, 228. — de citrato de potasa ferruginoso, II, 229. — de esto-

raque de Lheritier, II, 241. — de percloruro de hierro de Beral, II, 259. — ferruginoso con ratania de Ricord, II, 244. Licor aluminoso compuesto, II, 307. Limonada ferruginosa y astringente, II, 319. Mezcla para lociones de Bielt, II, 373. Misturas: astringente de Lallemand, II, 384. — balsámica de Fuller, II, 385. — de micra alcalizada de Griffith, II, 399. Opiatas: antileucorréica de Roberto Tomas de Salisbury, II, 409. — antileucorréica de Tissot, II, 409. Pastillas: de citrato de hierro, II, 437. — de chocolate y hierro reducido por el hidrógeno de Miquelard y Quevenne, II, 442. — de hidriodato de hierro, II, 442. — ferruginosas de Bailly, II, 440. Píldoras: antihemoptóicas de Cottercau, II, 471. — astringentes, II, 483. — astringentes de Cavarra, II, 484. — astringentes y calmantes de Dupuytren, II, 485. — astringentes de los H. M., II, 484. — de centeno cornezuolo, II, 495. — marciales de la F. E., II, 536. — marciales de Koempf, II, 535. — marciales de los H. de M., II, 536. — estomacales, II, 518. Pirotónide, II, 566. Pociones: astringente, II, 582. — astringente de Gamba, II, 583. — balsámica de Chopard, II, 584. — ferruginosa, II, 605. Pomadas: de hidriodato de hierro, III, 112. — de hidrobromato de hierro bromurado, III, 111. Remedio contra las flores blancas, del Dr. Koopp, III, 142. Sacarolado de citrato de hierro de Beral, III, 156. Supositorio de copaiba de Colombat, III, 168. Tabletas marciales, III, 179. Tartrato de potasa y hierro, I, 280. Tisana astringente de Chaptal, III, 225. Tinturas: de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 207. — de nuez de agalla compuesta de Lepère, III, 213. — etérea de acetato de hierro de Beral, III, 203. — etérea

de percloruro de hierro de Beral, III, 204. Vinos: antileucorréico, III, 317. — calibreado de Parmentier, III, 320. — de acetato de hierro líquido, III, 313. — de citrato de hierro, III, 321. — de hidriodato de hierro de Pierquin, III, 327. — marcial de los H. de M., III, 320.

Lienteria. V. Diarrea. Apocema tónico y dulcificante de Barthez, I, 346. Bebidas: astringente, I, 374. — de Koempf, I, 376. Bolos astringentes, I, 386. Electuario astringente de Bally, I, 517. Linimento aromático de Rossen, II, 330. Poción astringente, II, 582.

Liquen. V. Herpes. Licor arsenical de Bielt, II, 310. Limonada nítrica, II, 322. Mezcla para lociones, de Bielt, II, 372. — para lociones de Cazenave, II, 374. Misturas: alcalina de Bielt, II, 378. — contra el liquen agrius de Bielt, II, 390. — contra el liquen crónico de las manos, de Bielt, II, 390. Pomadas: contra el liquen de Bielt, III, 98. — de cianuro de potasio de Bielt, III, 93. Tisana alcalina de Bielt, III, 221.

Lombrices intestinales. V. Ténia. Aceites: aloético batavo, I, 293. — etéreo de helecho, I, 296. — de ricino, I, 298. Agua mercurial, I, 323. Ajenjo suizo, I, 331. Azúcares: vermífugo, de la F. E., I, 349. — vermífugo mercurial de Baumé, I, 320. Bálsamo de vida de Leliebre, I, 363. Bebidas: antihelmíntica de Broussonnet, I, 372. — vermífuga, I, 379. Bizcochos vermífugos, I, 380 y 381. Bolos vermífugos de Foy, I, 400. Calomelanos, I, 134. Cataplasma antihelmíntica, I, 413. Cerveza amarga, I, 432. Confites vermífugos, I, 486. Conserva de ajenjos, I, 487. Chocolates: purgante de Charles, II, 163. — vermífugo, II, 163. Bolos: antihelmínticos de Babeyrac, I, 386. — antihelmíntico de Chaussier,

I, 386. Electuarios: antihelmintico de Grimaud, I, 513. — antihelmintico de Heister, I, 513. — antihelmintico de Vogler, I, 513. — vermifugo de Spielmann, I, 533. Elixires: antiartritico de la isla de Francia, II, 2. — balsámico de Wverlhoff, II, 6. — balsámico, estomacal y atemperante de Hoffmann, II, 5. — de larga vida, II, 11. — de propiedad de la F. E., II, 14. — estomacal de Stoughton, II, 8. — sagrado, II, 15. — vermifugo de Reboul, II, 17. Emplastro vermifugo, II, 51. Epitema vermifugo, II, 69. Especies vermifugas, II, 85. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Extracto de liquen, II, 96. Galagamba, I, 197. Hidroclorato de amoniaco ferrurado de Hartmann, II, 156. Jarabe antihelmintico de espigelia, II, 211. Jalea de musgo de Córcega, II, 202. Jarabes: de quina de la F. E., I, 260. — vermifugo de Bouillon-Lagrange, II, 269. — vermifugo de Boullay, II, 268. — vermifugo de Cruveilhier, II, 270. — vermifugo y purgante, II, 270. Lavativas: aloética de Clark, II, 290. — antihelmintica, II, 291. — antihelmintica de Duncan, II, 292. Linimento antihelmintico de Dubois, II, 329. Locc antihelmintico, II, 390. Mistura vermifuga, II, 408. Opiata vermifuga de Malonet, II, 416. Pastillas: de musgo de Córcega de Deleschamps, II, 447. — vermifugas de Barthez, II, 451. — antihelminticas de Schomaker, II, 471. — vermifugas, II, 565. Pociones: purgante y vermifuga de Macartan, II, 621. — vermifuga, II, 626. Polvos: antihelmintico, III, 8. — antihelmintico de Dupuytren, III, 8. — antihelmintico de los H. de M., III, 9. — febrifugo y purgante de Helvetius, III, 47. — purgante y antihelmintico de Pringle, III, 63. — vermifugos, III, 73 y 74. — vermifugo de Brugnatelly,

III, 74. — vermífugo de estaño, III, 75. — vermífugo purgante de Bally, III, 75. Pomada de acibar, III, 73. Preparaciones de acibar, I, 83. Remedios vermífugos de Bremser, III, 152. Supositorios: antihelmintico, III, 166. — antihelmintico de los H. de M., III, 167. — antihelmintico de Swediaur, III, 167. Tabletillas: antihelminticas, III, 171. — vermífugas de santónico, III, 181. Tinturas: contra las ascárides, de Dorfmueller, III, 198. — de renuevos de helecho macho de Peschier, III, 216. Tisana de ajenjos, I, 97. Trociscos antihelminticos de la F. M., III, 270. Ungüentos: antihelmintico de Boerhaave, III, 277. — de artanita compuesto de la F. E., III, 278. — vermífugo, III, 302. Vinagre rosado de la F. E., III, 312.

Zumbago. V. Reumatismos. Looc terebintinado, III, 267. Preparaciones de trementina, I, 284.

Lupia. V. Tumores.

Lupus. V. Herpes. Disolucion de hidroclicato de cal de Bielt, I, 504. Polvos: aromático de Dupuytren, III, 13. — arsenical de Justamond, III, 14.

Luxaciones. V. Contusiones. Reduccion. Inmovilidad de las partes reducidas. Baños. Cataplasmas. Sangrías, &c. Dieta. Reposo. Aguas: del arcabuzazo de Theden, I, 306. — tedianas de los H. de M., I, 306. Emplastos: de cola para las hernias, de la F. E., II, 30. — de pez negra regio de la F. F., III, 44. Emulsion purgante, II, 60. Etíope antimonial de Huxham, II, 107. Fomentos: aromático, II, 110. — aromático de los H. de M., II, 110. — fortificante, II, 114. — resolutivo, II, 116. — resolutivo suave de los H. de M., II, 117. Jabones: de aceite de croton tiglio, II, 190. — de jalapa, II, 193. Jarabe vermífugo de corali-

na, II, 269. Linimentos: resolutivo de Richer, II, 117. — resolutivo suave de los H. de M., II, 117. Pastillas de euforbio.

Mal aliento. V. Aliento fétido.

Mal de Pott. V. Caries de las vértebras.

Manchas de la córnea. Colirios: contra las manchas de la córnea, I, 469. — contra las manchas de la córnea de Boerhaave, I, 469. — contra las manchas de la córnea de Weller, I, 469. — de Gimbernat, I, 471. — resolutivo de Recamier, I, 475. — seco, I, 477. — seco de alumbre calcinado de Beer, I, 478. — seco de Dupoytren, I, 477. — seco de Lagneau, I, 477. — seco de los H. M., I, 478. — seco de Recamier, I, 477. Gotas resolutivas, II, 151. Láudano de Rousseau, II, 286. Pomadas: oftálmica, III, 122. — oftálmica de Sichel, III, 123.

Manchas hepáticas. V. Pecas.

Mania. Enagenacion mental. Demencia. Monomanía, Medios morales, aislamiento, trabajo. Emisiones sanguíneas. Purgantes, III, 440. Baños, I, 70. Chorro, I, 71. Polvo de Tunquin de Reuss, III, 73.

Marasmo. V. Caquexia.

Marasmo de los niños. V. Caquexia y astenia.

Melancolia. Tratamiento moral é higiénico, viajes, ejercicios, viajes á los baños termales. Pocos laxantes. Cerveza cefálica inglesa, I, 433. Julepe amargo de Gall, II, 373. Píldoras esplénicas, II, 516.

Meningitis. V. Flegmasias. Tópico de hielo. Antiflogísticos.

Menorragia. V. Metrorragia.

Mentagra. V. Herpes.

Metritis. V. Flegmasias.

Metrorragia. V. Hemorragias activas.

Miasmas. Agua clorurada, I, 310. Bolos desinfect-

tantes, I, 381. Clavos para sahumar de Ayr, I, 438 y 439. Cloruro de cal y cloruro de sosa, I, 157 y 160. Especies fumigatorias olorosas, II, 82. Fumigaciones: antiloimica de Gaud, II, 121. — aromática, II, 122. — clorurada de los H. M. II, 125. — de Carmichael Smith, III, 123. — de cloro de Guiton de Morveau, II, 123. — guitoniana de los H. M., II, 124. Licor desinfectante de cloruro de óxido de sódio de Labarraque, II, 314. Polvos: oloroso de Berlin, III, 60. — para fumigaciones, III, 61. Vinagre de los cuatro ladrones, de la F. E., III, 309.

Miserere. V. Cólico nervioso.

Mordeduras de animales rabiosos. V. Hidrofobia. — *de animales venenosos.* V. pág. 403, t. III.

Narcotismo. V. Envenenamientos por los narcóticos. Bebida antinarcótica de Van-Mons, I, 374. Tisana de café.

Necrosis. V. Cáries.

Metrorragia crónica. V. Hemorragias pasivas. Preparaciones de centeno cornezuelo, I, 148. Tannino, I, 278, y otros astringentes. Agua de Bañares, I, 307. Bolos astringentes, I, 387. Caldo astringente de Astruc, I, 402. Cocimientos: astringente de los H. de M. I, 447. — de centeno cornezuelo, I, 148. Electuario peruiano astringente de Fuller de la F. E., I, 531. Inyeccion de acetato de plomo con mirra de P. Franck, II, 174. Infusion de centeno cornezuelo, II, 167. Jarabe de centeno cornezuelo de Hebert, II, 224. Jarabe de centeno cornezuelo de Martin, II, 225. Linimento aromático de Rosen, II, 330. Limonada sulfúrica, II, 323. Píldoras: antibemoptóicas de Cottereau, II, 471. — astringentes de Cullen, II, 485. — contra la metrorragia crónica, II, 505. Pirotonide de Ranque, II, 566. Pociones: ácida astringente

gente, II, 568. — aluminosa, II, 570. — astringente, II, 582. — astringentes de Fouquier, II, 583. — astringente de Gamba, II, 583. — astringente de Pradel, II, 583. — astringente de los H. M., II, 583. — de centeno cornezuelo, II, 587. — ocítica de Charles, II, 615. — obstétrica de Dewes, II, 615. Polvo de centeno cornezuelo, III, 22. Posición horizontal.

Nefritis. Licor antinefrítico de Adams, II, 310. Agua de Quercetau, I, 327. Emulsión de trementina, II, 63. Opiata antiepiléptica de Idler, II, 409. Pociones: contra los dolores nefríticos, II, 592. — antinefrítica de Willams de Norford, II, 579. Tintura volátil de guayaco, III, 220.

Neumonia. V. Pulmonía.

Neuralgia. Moxas, I, 189. Electricidad, I, 173. Opio, I, 234, y productos opiados. Morfina, I, 226. Agua de Plombieres. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Acetato de plomo, I, 82. Alcanfor, I, 100, y preparaciones alcanforadas. Almizcle, I, 107. Castóreo, I, 144. Veratrina, I, 287. Preparaciones: de belladona, I, 123. — de beleño, I, 122. — de cicuta, I, 151. — de estramonio, I, 181. — de esencia de trementina, I, 284. — de tilo, I, 282. — de naranjo, I, 228. — de valeriana, I, 286. Agua hidrocianica vegetal, I, 319. Bálsamos: acético alcanforado de Pelletier, I, 350. — acético etéreo de Vergnes, I, 351. — anodino de Bath, I, 352. — nervino, I, 358. — tranquilo, I, 361. — tranquilo de Chomel, I, 362. Bolos: antiespasmódicos de Bally, I, 384. — antiespasmódicos de Buchan, I, 385. — calmantes de Chaussier, I, 388. Cataplasmas: isquiática de Willis, I, 418. — narcótica, I, 419. — rubefaciente de Astruc, I, 422. Disoluciones: cal-

mante, I, 500. — de acetato de morfina de Magendie, I, 496. — de cianuro de potasio, I, 150. — de citrato de morfina de Porter, I, 501. Elixir fétido de Fulde, II, 10. Espíritu de amoniaco fétido, II, 87. Emulsion de Quarin, II, 62. Gotas: calmantes, II, 149. — cefálicas inglesas, II, 150. Infusion de valeriana compuesta, II, 173. Inyeccion narcótica, II, 186. Linimentos: de Pearson, II, 342. — de veratrina de Turnbull, II, 347. — de veratrina é ioduro de potasio de Turnbull, II, 347. — de veratrina y mercurio de Turnbull, II, 347. — jabonoso de Kocmpf, II, 341. — sedante de los H. de M., II, 345. Miel terebintinada de Recamier, II, 378. Misturas: antiespasmódica de Sydenham, II, 383. — antihistérica, II, 381. Piel divina, II, 454. Píldoras: anodinas de Recamier, II, 460. — antiespasmódicas de Piderit, II, 469. — antihistéricas, II, 475. — antihistéricas de Selle, II, 475. — antineurálgicas de los H. M., II, 537. — antineurálgicas de Trousseau, II, 477. — de Meglin, II, 537. Poción calmante, II, 586. Polvos: de la princesa de Carignan, II, 62. — de Wittchicke, III, 76. Pomadas: contra las neuralgias, III, 99. — contra la neuralgia facial de Fouquier, III, 99. — de belladona, III, 99. — de veratrina de Magendie, III, 134. Tinturas: calmante de Herisson, III, 196. — de hollin fétida, III, 208. Tratamiento de las neurálgias por la esencia de trementina, III, 266.

Neuroses. Opio, I, 234, y preparados de opio. Oxido de zinc, I, 238. Píldoras de óxido de zinc. Acónito, I, 93. Alcanfor, I, 100. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Naranja, I, 228. Tilo, I, 282. Yerbabuena, I, 289. Aguas: de flores de naranja facticia, I, 315. — destilada de laurel real, I, 312. — hi-

drociánica vegetal, I, 319. Alcohol amoniacoal, I, 332. Alcoholaturo de jngode belladona, I, 349. Bálsamos : anodino de Bath, I, 352. — de vida de Hoffmann, I, 363. Baño de gelatina, I, 367. Bebida antiespasmódica, I, 371. Bolos antiespasmódicos, I, 382. — antiespasmódicos de Bally, I, 384. — antiespasmódicos de Buchan, I, 385. — de valeriana, I, 400. Disolucion de acetato de morfina de Magendie, I, 496. — de citrato de morfina de Porter, I, 501. Electuarios : astringente de los H. de M., I, 530. — peruviano antiépiléptico de Fuller de la F. E., I, 530. Elíxir fétido de Fulde, II, 10. Esencia antihistérica de Lermort, II, 70. Espíritus : de amoniaco fétido, II, 87. — de hollin, II, 90. — de nitro dulce de la F. E., II, 90. — de éter, II, 89. — de éter sulfúrico compuesto, II, 90. — etéreo aromático, II, 89. Eteres : acética marcial de Klaproth, II, 101. — balsámico de Tolú, II, 102. — hidrocórico, II, 103. — hidrocórico alcoholizado, II, 103. — mercurial de Cheron, II, 103. — nítrico alcoholizado, II, 104. — sulfúrico marcial, II, 106. — zincado, II, 107. Gotas : antiespasmódicas de Eller, II, 148. — antihistéricas, II, 148. — calmantes, II, 149. — calmantes de Magendie, II, 149. Infusiones : nervina de los H. de M., II, 170. — de valeriana de los H. de M., II, 173. Jarabes : de claveles compuesto de Cottureau, II, 229. — de éter, II, 242. — de karabé, II, 251. Julepes : alcanforado de la F. E., II, 272. — moscado, II, 281. — moscado de Fuller, II, 282. — moscado de los H. de M., II, 283. — antiespasmódicos, II, 274 y 275. Lavativas : antiespasmódica de los H. M., II, 291. — de almizcle alcanforada, II, 290. — de asa fétida, II, 293. — moscada de los H. M., II, 301. Licores : anodino mineral de Hoffmann, II,

308. — antiespasmódico de Grimaud, II, 309. — de cuerno de ciervo sucinado, II, 312. Linimento antiespasmódico de Selle, II, 329. Misturas: antiespasmódica con opio de los H. de M., II, 382. — antiespasmódica de Sydenham, II, 382. — antiespasmódica sin opio de los H. de M., II, 382. Píldoras antiespasmódicas, II, 468. — Píldoras antiespasmódicas de Henning, II, 468. — antiespasmódicas de Lombart, II, 468. — antiespasmódicas de Montaigne, II, 469. — antiespasmódicas de Petit, II, 469. — antiespasmódicas de Piderit, II, 469. — antihistéricas de Selle, II, 475. — de asa fétida y alcanfor, II, 481. — de cianuro de potasio de Bally, II, 497. — de ioduro de zinc y morfina, II, 532. — de valeriana, II, 564. — esténicas de Brown, II, 517. — moscadas compuestas de Hunter, II, 545. Pociones: anodina de los H. M., II, 571. — antihistérica, II, 578. — calmante, II, 586. — calmante y antiespasmódica, II, 586. — etérea de los H. M., II, 614. — de ioduro de zinc y morfina, II, 532. — estimulante de Alibert, II, 602. Polvos: antiespasmódico de Brachet, III, 7. — contra la risa convulsiva de Usteinan, III, 27. — de la princesa de Carignan, III, 62. — de Tunquin de Reuss, III, 73. — antiespasmódicos, III, 7. — antiespasmódicos de Recamier, III, 8. Preparaciones: de belladona, I, 123. — de beleño, I, 122. — de cicuta, I, 151. — de estramonio, I, 181. — de ácido cianhídrico, I, 87. — de valeriana, I, 286. Supositorio antiespasmódico, III, 166. Te tunka, III, 185. Tinturas: antiespasmódica de Keup, III, 193. — de ambar balsámica de Dippel, III, 191. — de asa fétida compuesta, III, 196. — de hollin, III, 208. — nerval y tónica, III, 212. — nervino-tó-

nica de Bestuchef, III, 213. — tebaica de Bamberg, III, 218. Tisana antiespasmódica, III, 222. Baños, I, 69.

Ninfomania. Alcanfor, I, 100. Antiflogísticos.

Obstrucciones de las vísceras abdominales. V.

Hepatitis, gastritis, &c., crónicas. Aguas: bromurada, I, 308. — de Bussang artificial, I, 308. — destilada de laurel real, I, 312. — diurética alcanforada de Fuller, I, 313. Caldo resolutivo de Fouquet, I, 407. Cocimientos aperitivos, I, 446. Electuario de Kortum, I, 529. Emplastos: de meliloto simple de la F. E., II, 40. — de meliloto compuesto de la F. E., II, 40. Extracto de coloquintida compuesto, II, 94. Infusiones: de ajeno nitrada, II, 164. — de hollín compuesta de Piderit, II, 169. Jabones: medicinal, II, 193. — vegetal, II, 197. Lavativa de Koempf, II, 300. Limonada ferruginosa y astringente, II, 319. Mistura fundente de Mutzel, II, 396. Píldoras: de acibar jabonosas, II, 457. — de amoniaco, II, 460. — de jabon, II, 533. — de Plumer, II, 547. — desobstruentes de los H. M., II, 507. — fundentes de Lemonier, II, 521. — fundentes de Recamier, II, 522. — fundentes de Roucher, II, 522. — fundentes de Vicq D'Azir, II, 523. — jabonosas de los H. de M., II, 532. — laxantes y fundentes de Sanchez, II, 534. — purgantes y fundentes de Saiffert, II, 552. — tartáreas de Schroederer, II, 558. Polvos: católicos de escamonea de la F. E., III, 21. — católicos purgantes de la F. E., III, 21. — cefractico de Selle, III, 37. — purgante y diurético de Lescare, III, 64. Pomada de Fabre, III, 109. Tintura de antimonio de Jacobi, III, 194.

Ocena. Inyecciones: emolientes. — deterativas. — cloruradas. Exutorios permanentes. Purgantes,

- III, 440. Régimen suave. Inyección contra la ocena de Horner, II, 181. Gargarismo mercurial de Plenck, II, 142.
- Octorrea.** Mezcla acústica de Richter, II, 371. Pomada contra la octorrea crónica de Meniere, III, 100.
- Odontalgia.** Aguas: de Botot, I, 307. — de Madama Vrilliere, I, 320. — oriental de Delabarre, I, 326. Alcoholaturos: de barro de Pará, I, 339. — de jugo de barro de Pará, I, 340. Bálsamos antiodontálgicos, I, 354. Colutorios: odontálgico de Fox, I, 482. — odontálgico de Schyron, I, 483. Creosota, I, 166. Preparaciones de pelitre, I, 240. Dentífricos: I, 492. — antiescorbútico, I, 492. Elíxires: dentífrico de Angellot, II, 7. — odontálgico de Desforges, II, 12. — odontálgico de Bories, II, 12. Emplasto antiodontálgico de Tissot, II, 24. Enjuagatorios: de ruda, II, 65. — odontálgico, II, 64. — odontálgico reumático, II, 65. Espíritu odontálgico de Boerhaave, II, 91. Etíope vegetal de Russel, II, 108. Emulsion de resina de guayaco, II, 63. Gargarismo odontálgico de Plenck, II, 143. Gotas calmantes de Fothergill, II, 149. Masas: odontálgica de Henry, II, 366. — odontálgica de Vogler, II, 366. Misturas: del doctor Bories contra el dolor de dientes, II, 395. — odontálgica, II, 400. — odontálgica de C. L. Cadet, II, 400. Opiata dentífrica, II, 411. Paraguay rojo, II, 422. Polvos: de carbon, III, 19. — dentífrico, III, 29. — dentífrico de sangre drago de la F. E., III, 31. — dentífrico descolorante de Magendie, III, 30. — dentífrico de sulfato de quinina de Pelletier, III, 32. — dentífrico de Bally, III, 30. — dentífrico de Charl., III, 30. — dentífrico de Chevallier, III, 31. Tesoro

para la boca, III, 186. Tinturas: alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. — odontálgica, III, 214. Vinagre de espliego, III, 311.

Oftalmia aguda. Emisiones sanguíneas. Sedal. Moxas, I, 189. Opio, I, 234, y preparaciones de opio. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Preparaciones: de beleño, I, 122. — de belladona, I, 123. — de estramonio, I, 181. Aguas: destilada de meliloto, I, 42. — destilada de rosas, I, 42. Cataplasmas: antiostálmica de Plenck, I, 414. — ostálmica de los H. de M., I, 420. Colirios: anodinos, I, 464 y 465. — anodino de los H. M., I, 465. — contra la conjuntivitis, de Sichel, I, 469. — contra la blefaritis, de Sichel, I, 468. — de belladona, I, 466. — de nitrato de plata, I, 231. — de Scarpa, I, 476. — gomoso de los H. M., I, 471. — resolutivo, I, 474. — resolutivo de Recamier, I, 475. — narcóticos, I, 473. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Pediluvios, I, 452. Purgantes, III, 440. Pomadas: antiostálmica de Carron de Villards, III, 84. — ostálmicas de Sichel, III, 124. — ostálmica de Velpeau, III, 124. Trociscos de carbonato de plomo alcanforado de la F. E., III, 271.

Oftalmia blenorragica. V. Oftalmias sifilíticas.

Oftalmia escrofulosa. V. Escrófulas. Disoluciones: de cloruro de bario de Sichel, I, 501. — iodurada rubefaciente, I, 506. Colirios: antiescrofuloso de Baudelocque, I, 465. — barítico de Mojon, I, 466. — iodurado, I, 472. — resolutivo, I, 476. — seco de Velpeau, I, 478. Polvos ostálmicos de Sichel, III, 58 y 59. Pomadas: antiostálmica de St. Ives, III, 85. — de nitrato de plata de Guthrie, III, 121. — ostálmica de Car-

ron de Villards, III, 122. — oftálmica de **Du-puytren**, III, 122. — oftálmica de **Jadelot**, III, 123.

Oftalmias gotosas. V. Gotas.

Oftalmias crónicas. Purgantes drásticos, III, 440. Laxantes, III, 440. Sedal. Preparaciones de poligala, I, 244. Sulfato de cobre, I, 268. Aguas: antioftálmica de **Loche**, I, 305. — celeste, I, 310. — de **Alibour**, I, 304. — oftálmica fortificante de **Selle**, I, 325. — para los ojos, de **Ibel**, I, 326. Cerato de **Huffeland**, I, 427. Clara de huevo aluminosa, I, 438. Colirios: I, 463. — aluminoso, I, 464. — astringente de los H. M., I, 466. — astringente resolutivo, I, 466. — blanco de **Rasis** de los H. de M., I, 467. — boratado, I, 467. — comun de los H. M., I, 467. — contra la conjuntivitis de **Sichel**, I, 468. — contra la conjuntivitis crónica de **Sichel**, I, 468. — contra las manchas de la córnea, I, 469. — contra las manchas de la córnea, de **Boerhaave**, I, 469. — contra las manchas de la córnea de **Weller**, I, 469. — de **Brun**, I, 467. — de **Gimbernath**, I, 471. — de **Janin**, I, 472. — de **Newman**, I, 473. — de piedra divina, I, 242. — deter-sivo de la F. M., I, 470. — gomoso astringente de los H. M., I, 471. — oftálmico fortificante de **Selle**, I, 474. — resolutivos, I, 474, 475 y 476. — seco, I, 477. — seco de **Dupuytren**, I, 477. — seco de **Recamier**, I, 477. — seco de **Velpeau**, I, 478. — tónico de **Courti**, I, 478. — verde de los H. de M., I, 479. Hidromel fermentado y opiado, II, 158. Licor aluminoso compuesto, II, 307. Linimentos: antioftálmico de **Plenck**, II, 330. — contra la inflamacion de los cartilagos de los párpados, II, 333. Pirotónide de **Ranque**, II, 566. Polvos: contra el engrosamiento de la córnea, de

Graeffe, III, 26. — de Laeyson, III, 55. — de Prince, III, 63. — oftálmico de Delille, III, 60. — revulsivo de Ivel, III, 67. Pomadas: alcanforada, III, 78. — antioftálmica de Desault, III, 83. — antioftálmica de Gran-Jean, III, 84. — antioftálmica de Guthrie, III, 84. — de hollin de Carron de Villards, III, 113. — de Lyon, III, 119. — de nitrato de plata de Guthrie, III, 121. — oftálmicas, III, 122. — oftálmica de Carron de Villards, III, 122. — oftálmica de Janin, III, 125. — oftálmica de Regent, III, 125. — oftálmica de Saint Ives, III, 85. — oftálmica de Sichel, III, 123. Tisana de polígala, I, 33. Ungüentos: oftálmico de Smellome, III, 294. — de tucia, III, 302.

Oftalmias periódicas. Polvo oftálmico de Sichel, III, 59. Sulfato de quinina, I, 272.

Oftalmias reumáticas. V. Reumatismo.

Oftalmia sifilitica. V. Sífilis. Agua oftálmica mercurial, I, 325. Colirios: contra la oftalmia gonorréica, de Kerzberg, I, 470. — mercurial, I, 473. — seco de Velpeau, I, 478.

Opacidad de la córnea. V. Manchas de la córnea.

Orquitis sifilitica. Antiflogísticos. Emplastos: anti-venéreo de Boerhaave, II, 25. — resolutivo, II, 48. — mercurial de Vigo, II, 41. Pomadas: de belladona, III, 89. — de hidriodato de potasa, III, 112. Ungüento mercurial blanco, I, 290. Suspensorio.

Ortofnea. V. Asma. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Píldoras de cianuro de potasio de Bally, II, 497. Pociones: de cianuro de potasio de Bally, II, 588. — pectoral de Magendie, II, 617. — pectoral de Magendie, II, 618.

Otitis. V. Flegmasias. Inyecciones: anodina de la

F. E., II, 176. — de leche opiada de los H. M., II, 177. Opio, I, 234, y preparaciones opiadas. Sanguijuelas.

Palpitaciones. V. Aneurismas é hipertrofia del corazón.

Panarizo. V. Absceso agudo.

Papera. V. Bócio.

Parafimosis y Fimosis. Sanguijuelas. Antiflogísticos. Pomada de belladona. Operacion.

Parálisis y Hemiplegia. Emisiones sanguíneas. Electricidad, I, 173. Estricnina, I, 182. Brucina, I, 130. Aceites: de croton tiglio, I, 76. — de tártago, I, 80. Elaterio, I, 172. Espíritu de amoniaco, I, 87. Ioduros: de iodhidrato de estricnina, I, 207. — de zinc y morfina, I, 209. Nuez vómica, I, 233. Veratrina, I, 287. Aguas: bromurada, I, 308. — de magnanimidad, I, 328. Alcoholado de brucina, I, 234. Alcoholes: de estricnina, I, 336. — de nuez vómica, I, 336. Bálsamos: nervino, I, 358. — sajón, I, 360. — de vida de Hoffmann, I, 363. Bolos de Swediaur, I, 398. Cerveza cefálica inglesa, I, 433. Chorro aromático de Plenck, II, 163. Esencia de Ward, II, 73. Espíritus: de amoniaco, II, 87. — de amoniaco aromático, II, 87. Cocimiento de los leños de la F. E., I, 456. Eteres: acético cantaridado de Duble, II, 101. — fosforado de Pelletier, I, 102. — sulfúrico fosforado de Loebelius, I, 106. Etiope antimonial de Huxham, I, 107. Gargarismo de Quarin, II, 144. Infusiones: de arnica de los H. de M., II, 165. — de lino cantaridada, II, 170. Lavativa estimulante, II, 299. Linimentos: cantaridado, II, 332. — estimulante inglés, II, 337. — estimulante resolutivo, II, 338. — fosforado, II, 338. Pildoras: de brucina, II, 491. — de extrato alcohólico de nuez vó-

mica de Fouquier, II, 319. — de estriçnina, II, 519. — de nitrato de plata de Merat, II, 545. Pociones: estimulante de brucina, II, 603. — estimulante de estriçnina, I, 602. Preparaciones de arnica, I, 113. Purgantes, III, 440.

Parálisis de la vejiga. V. Incontinencia de orina y Parálisis.

Parótidas. V. Flegmasias.

Partos laboriosos por inercia de la matriz. Centeno cornezuolo, I, 148. Cocimiento de centeno cornezuolo, I, 148. Infusiones: de centeno cornezuolo, II, 167.—de Hearns, II, 172. Jarabes: de centeno cornezuolo de Hebert, II, 224. — de centeno cornezuolo de Martin, II, 225. Mistura de centeno cornezuolo de Bocquet y Dufresnoy, II, 389. Pociones: de centeno cornezuolo, II, 587.—obstétrica de Dewes, II, 613.—ocítica de Charles, II, 615. Polvo de centeno cornezuolo, III, 22. Vino de Balardini, III, 319. Sulfuro de carbono, I, 274. Castoreo, I, 144. Baño tibio, I, 70.

Pecas. V. Manchas hepáticas. Gargarismo verde de Swediaur, II, 146. Disolucion boratada de Hufeland, I, 500. Lociones: aluminosa y sulfurosa de Gall, II, 351. — de borato de sosa, II, 353. Tópico contra las manchas hepáticas, III, 244. Ungüento contra los herpes de la F. E., III, 283.

Pérdidas uterinas. V. Metrorragia.

Pericarditis. V. Flegmasias.

Perineumonia. V. Pulmonía.

Peritonitis. V. Flegmasias. Emisiones sanguineas. Mercuriales.

Peritonitis puerperal. Pociones: alcalino-gomosa, II, 569. — purgante de Cruveilhier, II, 620. Pomada mercurial opiada, III, 121.

Ungüento de mercurio de la F. E., I, 291.

Picaduras de animales venenosos. V. pág. 403, tomo III.

Piojos. Agua antipedicular, I, 306. Locion mundificante de Boerhaave, II, 357. Polvo de estafisagria. Ungüento de mercurio de la F. E., I, 291.

Pirosis. Misturas: con la creta, II, 389. — contra la pirosis, de Vogt, II, 392. Poción absorbente de los H. M., II, 567. Polvos: de carbonato de magnesia, III, 20. — de creta con ruibarbo de Nicolai, III, 29. — de ruibarbo y magnesia, III, 68. de ruibarbo opiado, III, 68.

Pituita. Abstinencia de las bebidas. Jabon estibiado, II, 192. Pastillas: de ipecacuana con azúcar de la F. E., II, 444. — de ipecacuana de Cadet, II, 443.

Plétora. Antiflogísticos, evacuantes, &c., segun el individuo. Apocema laxante, I, 344.

Pleuresia aguda. Emisiones sanguíneas. Antimoniales. Bebidas antillogísticas, I, 371. Vejigatorios, III, 303. Apocema contra-estimulante de Laccnec, I, 343. Cocimientos: pectoral de la F. E., I, 457. — pectoral de los H. M., I, 458. — de cebada compuesto de la F. E., I, 450. Looc dulcificante de Gaubius, II, 362.

Pleuresia crónica. Aguas sulfurosas, III, 346. Caldo anticatarral de Riviere, I, 401. Cataplasma anti-pleurítica, I, 414. Emplastos: de pez, II, 43. — de pez de Borgoña, II, 44. — estibiado, II, 34. Emulsion aceitosa, II, 52. Jarabe pectoral de Dumas, II, 257. Polvo anodino de Helvetius, III, 2.

Pleurodinia. V. Reumatismos. Bálsamo terebintinado, I, 355. Emisiones sanguíneas. Cataplasma rubefaciente, I, 422. Sinapismos, III, 158. Acupuntura.

Pórrigo. V. Tiña.

- Priapismo.** Preparaciones de cicuta, I, 151. Alcanfor, I, 100.
- Prostatitis.** Antiflogísticos. Bebidas diluentes. — diuréticas. — laxantes. Baños de asiento, Reposo. Inyección oleo-calcárea de Dupuytren, II, 186.
- Prúrigo pedicularis.** V. Herpes. Loción de eléboro blanco de Swediaur, II, 355. Mezcla para lociones de Biett, II, 373. Mistura alcalina de Biett, II, 378. Pomadas: antipruriginosa de Gibert, III, 86. — antiherpética, III, 81. — de cianuro de potasio de Biett, III, 93. — de cinabrio, III, 94. — de Giroux, III, 110. Tisana alcalina de Biett, III, 221.
- Prurito.** Lociones: de borato de sosa, II, 353. — de carbonato de sosa, I, 140. — de sublimado, I, 266.
- Psoriasis.** V. Herpes. Licor arsenical de Biett, II, 310. Mistura contra el psoriasis labial, de Biett, I, 391. Pomada de proto-nitrato de mercurio de Biett, III, 129.
- Puerros.** V. Vegetaciones sífilíticas.
- Pulmonia.** Emisiones sanguíneas. Antimoniales. Apocema contra-estimulante de Laennec, I, 343. Caldo anticatarral de Riviere, I, 401. Cocimientos: de cebada compuesto de la F. E., I, 450. — pectoral de los H. de M., I, 458. — pectoral de la F. E., I, 457. Disoluciones: arábica, I, 498. — arábica de los II. de M., I, 498. Emulsión aceitosa, II, 52. Infusión acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Julepe contra-estimulante de Laennec, II, 277. Loocs: aceitoso, II, 359. — blanco, II, 361. — contra-estimulante de Trousseau, II, 362. — dulcificante de Gaubius, II, 362. — verde, II, 365. Pociones: de Goelis, II, 607. — estibiada de Louis, II, 602. — pectoral aceitosa de Virey, II, 616. Polvo espectorante de Reca-

mier, III, 41. Tisana de amapola, I, 108. — de culantrillo, I, 167. — de gordolobo, I, 194. — de lino, I, 214. — de líquen, I, 215. — de malva, I, 218. — de malvabisco, I, 219. — de tusílago, I, 285. — de violetas, I, 289.

Pulmonia atáxica. Preparaciones de almizcle, I, 107, y otros antiespasmódicos.

Pulmonia crónica. Vejigatorios, III, 303. Aguas sulfurosas, III, 346. Polígala, I, 244. Emplasto emetizado de Lespinasse, II, 34. Infusion de cáalamo aromático con el cloro, II, 166. Jarabes: de nicociana de Lamure, II, 254. — pectoral de Dumas, II, 257. Julepe con el ácido benzóico, II, 276. Manjar blanco, II, 365. Ojimiél pectoral de Edimburgo, II, 418. Opiatas: antituberculosa de Dufresnoy, II, 410. — de Michu, II, 415. Pastillas de pelitre de Lacombe, II, 448. Poción iodurada de Fermon, II, 609. Polvos: espectorante de Babeyrac, III, 41. — incisivo de Mongenot, III, 53. Tabletás de carbon y chocolate de A. Chevalhier, III, 174. Tisana de polígala, I, 33.

Purgaciones. V. *Blenorragia y Sífilis.*

Pústulas. V. *Sífilides.*

Quemaduras. 1.^{er} Grado. Hielo, I, 187. Fomento de eter sulfúrico. Pulpa de patatas, I, 30. Disolucion de benjuí con agua de rosas. Irrigaciones de agua fría. Agua vegeto-mineral, I, 330. Cerato opiado, I, 429. Linimento calcáreo contra las quemaduras, II, 391. Tintura de benjuí compuesta, III, 196. 2.^o Grado. Bálsamos: samaritano de los H. M., I, 361. — samaritano de Tornamira, I, 361. Cera-
tos: de Galeno, I, 426. — de Goulard, I, 426. — de Jaurel real, I, 427. — de Turner, I, 431. — opiado, I, 429. Cataplasmas emolientes, I, 416. Fomentos: emolientes, II, 113. — de cloruro de TOMO III.

sosa. Linimentos: calcáreo contra las quemaduras, II, 331. — contra las quemaduras de los H. de M., II, 333. — contra las quemaduras de los H. M., II, 334. — resolutivo fuerte de los H. de M., II, 117. Loción resolutiva, II, 357. Pomada contra las quemaduras, III, 100. Ungüentos: de acetato de plomo de la F. E., III, 275. — para las quemaduras de los H. de M., I, 296. 3.^{er} Grado. Cloro, I, 155. Cloruros: de sosa, I, 160. — de óxido de calcio, I, 157. Ceratos: de plomo de los H. de M., I, 427. — de saturno alcanforado de F. Cosme, I, 434. Esparadrapo de diapalma, II, 77. Ungüentos: de acetato de plomo de la F. E., III, 275. — de altea, III, 276. — de Arceo, III, 277. — blanco alcanforado, III, 280.

Rabia. V. pág. 403 del tomo III.

Raquitis. V. Escrófulas. Aguas sulfurosas. Baños de mar, III, 387. Aceite fosforado de Lescot, I, 297. Bebida antiescrofulosa, I, 371. Cocimiento antiescrofuloso, I, 442. Poción de aceite de hígado de bacalao, II, 567. Polvo contra la raquitis, de Temple, III, 27.

Reabsorción purulenta. V. Supuración.

Reblandecimiento de las encías. V. Escorbuto. — *gelatiniforme del estómago.* V. Gastritis crónica.

Relajación. V. Contusiones.

— *de la campanilla.* Alumbre, I, 267. Pimienta, I, 242.

Retardo de las reglas. V. Amenorrea.

Retención de orina. V. Iscuria.

Retracción de los miembros. V. Contractura.

Reuma del cerebro. V. Coriza.

Rumatismo agudo. Emisiones sanguíneas. Antimonioales. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladonna, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181.

Opio, I, 234, y sus compuestos. Morfina, I, 226. Acetato de morfina, I, 82. Preparaciones de belladona, I, 123. Apocema contra-estimulante de Laennec, I, 343. Bálsamos: tranquilo, I, 361. — tranquilo de Chomel, I, 362. Baños de vapor acuoso, I, 369. Bebida antillogística de Stoll, I, 371. Especies sudoríficas para infusión, II, 84. Julepe contra-estimulante de Laennec, II, 277. Linimentos: alcanforado de Fournier, II, 325. — anodino, II, 326. — contra los reumatismos, de Reveillé-Parisé, II, 334. Miel de bayas de saúco de la F. E., II, 375. Píldoras de Deslandes, II, 507. Pociones: amoniaca. — antillogística y sudorífica, II, 577. — de ioduro de potasio, I, 208. Baños tibios, I, 69. Vejigatorios, I, 303. Revulsivos.

Reumatismo crónico. Electricidad, I, 173. Preparaciones: de guayaco, I, 196. — de acónito, I, 93. — de arnica, I, 113. — ioduradas. — de enebro, I, 175. — de trementina, I, 284. — de zarzaparrilla, I, 291. Genciana y amargos. Alcanfor, I, 100, y preparaciones alcanforadas. Aceites: bezoárdico de Wedel, I, 295. — de tapsia antireumático, I, 299. Aguas: salinas termales, III, 376. — sulfurosas, III, 346. — de brea, I, 129. — de Premier, I, 327. — Aguardiente purgante de Mezaize, I, 302. Alcohol alcanforado de la F. E., I, 332. Alcoholato de melisa compuesto, I, 338. Alcohol de veratrina de Magendie, I, 337. Bálsamos: acético alcanforado de Pelletier, I, 350. — acético etéreo de Vergnes, I, 351. — anodino de Bath, I, 352. — antiartrítico de Sanchez, I, 352. — de Fioraventi, I, 357. — del caballero de Laborde, I, 356. — de vida de Hoffmann, I, 363. — nervino, I, 358. — opodeldoc líquido, I, 359. — opodel-

doc, I, 359. — tranquilo, I, 361. — tranquilo de Chomel, I, 362. Baños: aromático de Bally, I, 365. — aromático de los H. M., I, 366. — de vapor acuoso, I, 369. — aromático, I, 369. — facticio de Plombieres, I, 366. — de vapor de benjuí, I, 124. — calientes. — sulfurosos. — sulfuroso y gelatinoso de Dupuytren, I, 368. Bolos diaforéticos ingleses, I, 391. — drástico, I, 391. Cataplasmas: antipléurítica, I, 414. — anodinas, I, 411. — calmante, I, 415. — narcótica, I, 419. — rubefaciente de Astruc, I, 422. Cinturon medicamentoso, II, 121. Cocimientos: antiartrítico de Quarin, I, 441. — de dulcamara compuesto, I, 452. — de guayaco compuesto, I, 454. — de los leños de la F. E., I, 456. — dulzurante de zarzaparrilla de la F. E., I, 453. — sudorífico de los H. M., I, 461. Chorros: aromáticos. — sulfurosos. — aromático de Plenck. Disolución de sulfato de veratrina de Magendie, I, 508. Electuario antiartrítico, I, 510. Elixires: antiartrítico de la isla de Francia, II, 2. — purgante, II, 14. Emplastos: ceroneo, II, 28. — de belladona de Planche, II, 26. — de jabon, II, 39. — de pez, II, 43. — de pez de Borgoña, II, 44. — emetizado de Lespinasse, II, 34. — perpetuo de Janin, II, 43. Emulsion de Willis, II, 64. Esencias: de jabon, II, 73. — de Ward, II, 73. Especies: aromáticas, II, 18. — sudoríficas de Smith, II, 35. — sudoríficas para cocimiento, II, 84. — sudoríficas para infusion, II, 84. Eteres: acético cantaridado de Doble, II, 101. — nítrico terebintinado de Leschenault de Latour, II, 104. Fomento de Heister, II, 114. Fricciones: de agua de melisa simple. — con tinturas estimulantes. Fumigaciones de enebro, II, 124. Gotas antiEspasmódicas de Eller, II, 148,

Hidrolado de extracto de zarzaparrilla, II, 157. Jabones: acético etéreo de Pelletier, II, 192. — estibiado, II, 192. Jarabes: de china compuesto de la F. E., II, 250. — de extracto de zarzaparrilla, II, 242. — sudorífico de Cuisinier, II, 266. Linimentos: alcanforado de Fournier, II, 325. — anodino, II, 326. — antiartrítico, II, 327. — antiartrítico de Desbois de Rochefort, II, 328. — antiartrítico de Home, II, 328. — antireumático de los H. de M., II, 330. — con el sulfuro de carbono de Wutzer y Pellen-gam, II, 332. — contra los reumatismos de Reveillé-Parisé, II, 334. — Hidromel fermentado y opiado, II, 258. Linimentos: de Mustard, II, 341. — de veratrina de Turnbull, II, 347. — de veratrina é ioduro de potasio de Turnbull, II, 347. — de veratrina y mercurio de Turnbull, II, 347. — de Whitehead, II, 348. — estimulante inglés, II, 337. — estimulante resolutivo, II, 338. — fosforado, II, 338. — jabonoso, II, 340. — jabonoso de Koempf, II, 341. — jabonoso y alcanforado de Ferriar, II, 340. — resolutivo de Pott, II, 343. — rubefaciente, II, 344. — amoniacales, II, 326. — escitantes, II, 337. — volátil alcanforado, II, 326. — volátil de Plenck, II, 347. Miel de hayas de saúco de la F. E., II, 373. Misturas: amoniaco mercurial de Blanc, II, 379. — calmante de Roux, II, 388. — resino-jabonosa de Plenck, II, 404. — resino-jabonosa purgante, II, 404. Opiata napolitana, II, 415. Pielas: de Goulard, II, 455. — divina, II, 454. Píldoras: calmantes, II, 492. — de acónito de Bielt, II, 457. — de veratrina, II, 565. — diaforéticas, II, 509. — diaforéticas de Roucher, II, 509. Pociones: antiflogística y sudorífica, II, 577. — diaforé-

tica , II, 534. Polvos: antireumático , III, 12. — de Dower , III, 35. — para fumigaciones , III, 61. — antireumáticos de Olivencia , III, 10. — oftálmico de Sichel , III, 59. Pomadas: antiespasmódica de Gollin , III, 81. — de laurel , III, 119. — de veratrina de Magendie , III, 134. Sinapismos , III, 158. Tabletillas antimoniales de Kunkel , III, 172. Te tunka , III, 185. Tinturas: alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E. , III, 188. — alcohólica jabonosa de opio de la F. E. , III, 189. — de jabon , III, 209. Tisana de Vigaroux , III, 239. Ungüento de Piderit , III, 296. Vejigatorio de Wauters , III, 306. Ungüento de populeon , III, 297. Veratrina , I, 287. Vinos: aromático , III, 318. — de cólchico de Locher Balber , III, 321. — de guayaco con élbora de Lewis , III, 327. — de semillas de cólchico , III, 322. Zumo de yerbas depurativo , III, 332.

Rigidez espasmódica de la matriz. V. Espasmos.

Rígideces espasmódicas de la uretra. V. Constricción espasmódica de la uretra.

Risa convulsiva. V. Neuroses.

Romadizo. V. Catarro pulmonal. Polvo incisivo de Mongenot , III, 53. Trociscos de cubebas del Dr. Spita , III, 271.

Ronquera. V. Afonía.

Rupia. V. Herpes. Disolución de nitrato de plata de Bielt , I, 507.

Sabañones no ulcerados. Bálsamo del caballero de Laborde , I, 356. — contra los sabañones , I, 357. Fomentos: astringente , II, 111. — cloroso , II, 112. Jabon resolutivo de Cottereau y Verdé-Delisle , II, 195. Linimentos: contra los sabañones , II, 334 y 335. — contra los sabañones inminentes , de Fievée , II, 335. Lociones: contra los sa-

bañones , II, 354. — contra los sabañones no ulcerados , II, 354. — de alumbre , I, 108. Mistura contra los sabañones , de Marjolin , II, 393. Pasta contra los sabañones , II, 428. Pomada contra los sabañones , de Kuserlzer , III, 100. Remedio de Pougens , III, 150. Pirotónide , II, 566. Tinturas: de almáciga compuesta , III, 189. — de benjui , III, 196. — de benjui compuesta , III, 196. Tópicos: contra los sabañones de Berton , III, 244. — contra los sabañones de Hufeland , III, 244. Ungüento de Swediaur , III, 301.

Sabañones ulcerados. Cloro , I, 155. Cloruro de cal , I, 157. — de sosa , I, 160. Cauterio objetivo , I 188. Cerato de Saturno , I, 431. Disolucion de tintura de benjui en agua. Linimento contra los sabañones , II, 334. Pirotónide de Ranque , II, 566. Pomada contra los sabañones , de Kuserlzer , III, 100. Tópicos: contra los sabañones , de Berton , III, 244. — contra los sabañones de Hufeland , III, 244. Ungüento de Plenck , III, 297.

Salivacion mercurial. Alumbre en polvo , I, 267. Acido hidroclicóric , I, 90. Bebida purgante de Lescure , I, 378. Bolos contra la salivacion mercurial , I, 390. Colutorio deterativo , I, 482. Gargarismos: aluminoso de Ricord , II, 128. — astringente , II, 133. — astringente de Jannart , II, 134. — boratado de los H. M. , II, 135. — de nuez de agalla , II, 143. — contra el tialismo , II, 137. — terebintinado de Geddings , II, 145. — Rodomel cidoniado de Bahi , III, 155. Remedio contra el tialismo , III, 147. Preparaciones de esencia de trementina , I, 284. Purgantes , III, 440.

Sarampion. Bebidas diaforéticas. — atemperantes. Dieta: Reposo. Aire caliente.

Sarna. Aguas: antiépsóricas, I, 305. — antiépsórica de Ranque, I, 304. — clorurada, I, 340. — de tabaco. Alcanfor, I, 100. Baños: antiépsórico de Jadelot, I, 364. — antiépsórico de los H. M., I, 365. — sulfuroso, I, 368. Bolos antimoniales, I, 386. Cerato antiépsórico, I, 424. Disolución antiépsórica de Derheines, I, 497. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Fomigaciones de azufre, I, 117. Jabones: mercurial de Chaussier, II, 195. — sulfuroso de Franck, II, 196. Jarabes: depurativo azufrado, II, 234. — depurativo de Majault, II, 235. Linimentos: alcanforado de Fournier, II, 325. — alcanforado de los H. M., II, 325. — alcanforado de Vaydi, II, 325. — amoniacoal, II, 326. — antiépsórico, II, 328. — de Valentin, II, 346. — jabonoso hidrosulfurado de Jadelot, II, 340. — resolutivo, II, 343. Lociones: alcalina, II, 350. — alcohólico-jabonosa, II, 350. — antiépsórica de los H. M., II, 352. — con agua de jabon. — gomosa y mercurial de Franck, II, 355. — mercurial, II, 357. — mercurial de Adams, II, 356. — sulfuro-jabonosa, II, 358. — sulfurosa ácida de Dupuytren, II, 358. Mezcla para lociones de Bielt, II, 373. Píldoras de acónito mercuriales de Doble, II, 457. — diaforéticas, II, 509. Polvo: antiépsórico, III, 6. — antiépsórico de Bally, III, 6. — antiépsórico de Chaussier, III, 6. Pomadas: antiépsóricas, III, 79. — antiépsórica de Alibert, III, 79. — antiépsórica de Giraud, III, 80. — antiépsórica de los H. M., III, 101. — antiépsórica de Pouzin, III, 80. — antiépsórica de Thomann, III, 80. — azufrada, III, 88. — azufrada de Helmerich, III, 88. — citrina con el aceite de olivas de Planche, III, 94. — clorada, III, 95. — con el cloruro de cal, III, 95. — contra la sarna, III, 101. — contra la sar-

na de Lisson, III, 102. — contra la sarna, de Rolb, III, 101. — de brea de Emery, III, 90. — de Crolius, III, 103. — de eléboro, III, 106. — de Melier, III, 120. — de Pringle, III, 126. — de proto-nitrato de mercurio de Bielt, III, 129. — de Werthof, III, 133. — de Willar, III, 134. — llamada de los H. M. contra la sarna, III, 114. — mercurial de Jadelot, III, 120. — oxigenada de la F. E., III, 126. — oxigenada de los H. M., III, 126. — contra la sarna, III, 101. — sulfuro-jabonosa de Lugol, III, 132. Quinta esencia antiépsórica, III, 139. Sulfuro de cal de Pihorel, III, 165. Tisana antiépsórica, III, 222. Ungüentos: citrino de la F. E., III, 282. — contra los herpes, de la F. E., III, 283. — de Alderete, de la F. E., III, 276. — de mercurio de la F. E., III, 291. — mercurial blanco, III, 290. — oxigenado III, 295. — para la sarna, de los H. de M., III, 296. Zumo de yerbas depurativo, III, 332.

Satiriasis. Alcanfor, I, 100. Purgantes, III, 440.

Sicosis. V. Herpes.

Sifilides. Preparaciones de acónito, I, 93. Mercuriales. Aguas: antiherpética del Cardenal de Luy-nes, I, 305. — fagedénica, I, 315. — mercurial de Piderit, I, 323. — negra alemana, I, 324. — roja de Alibert, I, 328. Cerato mercurial, I, 427. — mercurial de Falck, I, 428. — mercurial de Zeller, I, 428. Cosmético de Siemerling, I, 489. Digestivo mercurial, I, 495. Disolución mercurial opiada, I, 507. Emulsion mercurial de Duncan, II, 59. Fumigación mercurial, II, 125. Licor de Gowlard, II, 315. Limonada nítrica, II, 322. Loción gomosa y mercurial de Franck, II, 355. Mezcla para lociones de Bielt, II, 372. Mielles: con proto-ioduro de mercurio de Bielt, II, 377. — de mercurio dulce de Swediaur,

II, 377. Pediluvio mercurial, II, 453. Píldoras: contra la sífilides, II, 506. — de deuto-ioduro de mercurio, II, 508. — de mercurio de Hahnemann, II, 224. — de proto-ioduro de mercurio, II, 531. — de proto-ioduro de mercurio de Biett, II, 548. — de Sainte Marie, II, 554. — mercuriales de Biett, II, 539. Polvo mercurial y de carbonato de magnesia de Cheyne, III, 57. Pomada de deuto-ioduro de mercurio de Biett, III, 104. — de ioduro de azufre, III, 116. — de ioduro de mercurio, I, 207. — de nitrato de plata de Guthrie, III, 121. — de sulfuro de mercurio de Biett, III, 132. — mercurial de Jadelot, III, 120. — mercurial de manteca de cacao de Planche, III, 121. — resolutive de Biett, III, 130. Ungüentos: de mercurio de la F. E., III, 231. — mercurial blanco, III, 290. — oxigenado mercurial del Dr. Bañares, III, 295.

Sífilis. Aguas: cáustica de Plenck, I, 309. — sagedénica, I, 315. — mercurial de Piderit, I, 322. — negra alemana, I, 324. — oxigenada de Alyon, I, 326. — sulfurosas, III, 346. Baño antisifilítico, I, 365. Ceratos: mercurial de Falck, I, 428. — opiado de Lagneau, I, 429. Cocimientos: antisifilítico nutritivo de Brera, I, 444. — de dulcamara compuesto, I, 452. — de guayaco compuesto, I, 454. — de ictiocola compuesto de Eimbke, I, 455. — de los leños de la F. E., I, 456. — de mecereon compuesto de Van-Mons, I, 456. — de Pollini, 1.^a fórmula, I, 458. — de Pollini, 2.^a fórmula, I, 459. — de zarzaparrilla compuesto, I, 463. — de zarzaparrilla de Callac, de la F. E., I, 462. — dulzurante de zarzaparrilla de la F. E., I, 453. Confites: de Keisser, I, 486. — del Dr. Vaume, I, 485. Disoluciones: alcohólica de deuto-ioduro de mercurio, I, 496. — antive-

nérea de Weikard , I , 488. — cianurada , I , 505.
 — de hidrargirato de potasa de Puche , I , 503.
 — de ioduro de potasio , I , 504. Elixir antivené-
 reo de Wright , II , 5. Emplastos : amoniaco mer-
 curial de Selle , II , 23. — antivenéreo de Boerhaave ,
 II , 25. — de ranas con mercurio de la F. E. , II ,
 45. — de ranas con mercurio de los H. M. , II ,
 46. — fundente , II , 37. Esencia concentrada de
 zarzaparrilla , II , 71. Especies : sudoríficas de
 Smith , II , 85. — sudoríficas para cocimiento ,
 II , 84. Etiope antimonial de Huxham , I , 107.
 Eteres : mercurial de Cheron , II , 103. — sulfú-
 rico con el deuto-bromuro de mercurio , II , 105.
 — sulfúrico con el deuto-ioduro de mercurio , II ,
 105. Extractos : hidro-alcohólico de zarzaparrilla ,
 II , 95. — oenolizado de zarzaparrilla , II , 96. —
 sudorífico de Smith , II , 100. Fomento con subli-
 mado , I , 168. Fricciones : con cloruro de oro , I ,
 158. — con el muriato de oro y sosa , I , 158. Fu-
 migaciones : de cinabrio , I , 152. — mercurial ,
 II , 125. Gargarismos : antisifilítico , II , 131 y
 132. — antisifilítico de los H. M. , II , 131. — as-
 tringente , II , 132. — calmante , II , 136. — cló-
 rico , II , 136. — con el sublimado , II , 137. —
 de cianuro de mercurio de Parent , II , 136. —
 hidrocórico , II , 141. — mercurial , II , 142. —
 mercurial de Plenck , II , 142. — verde , II , 146.
 Gotas antivenéreas , II , 148. Hidrolado de extrac-
 to de zarzaparrilla , II , 157. Inyecciones : mer-
 curial , II , 184. — mercurial opiada , II , 185.
 Jabon mercurial de Chaussier , II , 195. Jarabes :
 alcohólico de ioduro de potasio iodado de Puche ,
 II , 209. — antiescorbútico de Portal , II , 213. —
 antisifilítico de Chrestien , II , 214. — antisifilí-
 tico de Laffecteur , II , 215. — de Belet , II , 217.
 — de cianuro de oro de Broussonnet , II , 225.

Jar. de cloruro de oro de Chrestien, II, 230. — de éter mercurial de Cheron, II, 243. — de extracto de zarzaparrilla, II, 242. — de Hahnemann, II, 247. — de Peyrilho, II, 290. — depurativo de Larey, II, 235. — depurativo de Majault, II, 235. — de zarzaparrilla, II, 266. — etéreo de acetato de mercurio de Virey, II, 241. — mercurial gomoso de Lagneau, II, 253. — sudorífico de Coisinier, II, 266. — sudorífico simple, II, 266. Lavativa antisifilítica, II, 293. Licores: antisifilítico de Chaussier, II, 311. — de Pressavin, II, 316. — de Van-Swieten, II, 317. — depurativo de François, II, 313. Linimento mercurial, II, 341. Mercuriales. Mercurios: con creta, II, 368. — gomoso de Plenck, II, 368. — soluble de Hahnemann, II, 369. — soluble de Moretti, II, 369. Misturas: amoniaco-mercurial de Blanc, II, 379. — antisifilítica de Cazenave, II, 383. — antisifilítica de Cyrillo, II, 384. Mieles: con el proto-ioduro de mercurio de Bielt, II, 377. — mercurial de Swediaur, II, 376. Opiata napolitana, II, 413. Opio I, 234, y preparaciones de opio. Oro. Pastillas de mercurio sacarino de Lagneau, II, 446. Pediluvio mercurial, II, 453. Pildoras: antiherpéticas y antisifilíticas de Bally, II, 473. — antisifilíticas de Alibert, II, 478. — antisifilíticas de Dupuytren, II, 478. — antisifilíticas de Recamier, II, 479. — antivenéreas, II, 480. — azules, II, 486. — de acetato de mercurio, II, 456. — de acónito de Bielt, II, 457. — de acónito mercuriales de Double, I, 457. — de Bellosté, II, 489. — de cianuro de mercurio compuestas de Parent, II, 496. — de cianuro de mercurio simples de Parent, II, 495. — de cianuro de oro opiadas, II, 496. — de cianuro de oro y extracto de me-

cereon, II, 496. — de cicuta con calomelanos, de Cullerier, II, 497. — de cloruro de mercurio y morfina, I, 158. — de cloruro de oro, II, 499. — de cloruro de oro y sódio de Chrestien, II, 500. — de deuto-ioduro de mercurio, II, 568. — de Hahnemann, II, 525. — de iodhidrargirato de potasa de Puche, II, 536. — de ioduro doble de mercurio y morfina, II, 530. — de mercurio aluminosas, II, 539. — de óxido de oro, II, 546. — de oro, I, 236. — de Plumer, II, 547. — de proto-ioduro de mercurio, II, 531. — de Sainte Marie, II, 555. — de unguento napolitano de Fouquier, II, 563. — Edimburgenses de la F. E., II, 512. — mayores de Hoffmann, II, 536. — menores de Hoffmann, II, 536. — mercuriales, II, 538 y 539. — mercuriales de Brugnatelly, II, 539. — mercuriales de Cadet, II, 540. — mercuriales de Lagneau, II, 542. — mercuriales de los H. de M., II, 541. — mercuriales de los H. M., II, 541. — mercuriales de Moscati, II, 542. — mercuriales de Plenck, II, 543. — mercuriales de Sedillot, II, 544. — mercuriales glicirrizadas de la F. E., II, 341. — mercurio-opiadas de los H. M., II, 543. — suecas, II, 556. Pociones: antisifilítica de los H. M., II, 580. — iodurada de Cullerier, II, 609. Polvos: antireumático, III, 12. — antireumático de Olivencia, III, 11. — cáustico de Kruger, III, 21. — cáusticos de los H. de M., III, 21. — cáustico de Plenck, III, 21. — de cianuro de oro, I, 150. — de cloruro de oro, III, 23. — de cloruro de oro y sódio, III, 23. — de Knox, III, 55. — de mercurio sacarino de Lagneau, III, 58. — de Plumer, antisifilítico y anti-escrofuloso, III, 63. — de Prince, III, 63. — fumigatorio mercurial, III, 51. — mercurial de

Hahnemann, III, 57. Pomadas: antisifilítica, III, 86. — antisifilítica de Gibert, III, 86. — con los calomelanos, III, 104. — crisocroma, III, 126. — de cianuro de mercurio, III, 93. — de cloruro de oro. — de cloruro de oro y sódio de Magendie, III, 96. — de deuto-ioduro de mercurio, III, 105. — de fosfato de mercurio de Albano, III, 109. — de mercurio amoniacoal, III, 120. — de proto-ioduro de mercurio, III, 128. — epispástica con las preparaciones de oro, de Niel, III, 108. — mercurial de Jadelot, III, 120. — mercurial de manteca de cacao de Planche, III, 121. Preparaciones: de dulcamara, I, 171. — de dasne mecereon. — de china, I, 202. — de guayaco, I, 196. — ioduradas. — de zarzaparrilla, I, 291. Rob depurativo, III, 154. — depurativo de Duvergie, III, 155. Tabletas: de cianuro de oro y chocolate, III, 175. — de mercurio sacarina de Laguean, III, 446. Tinturas: antivenérea de Falck, III, 194. — de cianuro de mercurio de Parent, III, 198. — de ioduro de potasio de Puche, III, 209. Tisanas: antisifilítica de Arnoud, III, 229. — antisifilítica de Dupuytren, III, 223. — de boj, I, 33. — de Felt, III, 233. — de guayaco y dasne mecereon, III, 234. — de Vigaroux, III, 240. — de vinagre, III, 241. — de zarzaparrilla, III, 241. — de zarzaparrilla compuesta, III, 242. — iodada de Cullerier, III, 235. — lusitana, III, 235. — sudorífica, III, 237. — sudorífica de Dubois, III, 238. — sudorífica de los H. M., III, 238. — sudorífica económica, III, 238. Tratamientos: antisifilítico de Dupuytren, III, 253. — antisifilítico de Zittmann, III, 248. — de la sífilis de Dzondi, III, 247. — de la sífilis de Dzondi, modificado, III, 247. Ungüentos: mercurial blan-

co, III, 290. — de mercurio de la F. E., III, 291. Vinos: de extracto de zarzaparrilla, III, 331. — de zarzaparrilla, III, 331. — sudorífico de Smith, III, 329.

Sincope, desfallecimiento. V. Histerismo. Eter, I, 183. Aire frío. Sal volátil inglés. Agua de Luce, I, 320. Vinagres: aromático inglés, III, 307. — de los cuatro ladrones, de la F. E., III, 309.

Sobresaltos. Antiespasmódicos, III, 436. Preparaciones de almizcle, I, 107.

Sordera. Aceites: aromático, I, 294. — de creosota, I, 295. Aguas sulfurosas, III, 351. Bálsamos: acústico de Virey, I, 351 y 352. — acústico, I, 352. Inyecciones: acústica de Alibert, II, 175. — terebintinada benzóica de Detharding, II, 183. Mezcla acústica de Richter, II, 371.

Sudores de los tísicos. V. Tisis.

Sufocacion. V. Histerismo y neuroses. Eter, I, 183. Aire comprimido. Eter balsámico de Tolú, II, 102. Pociones: antiespasmódica, II, 576. — antiespasmódica anisada, II, 576.

Supresion de las reglas. V. Amenorrea.

Supresion de la traspiracion. Estimulantes difusivos, tales como el te, café, &c. Diaforéticos, III, 433. Bebidas tibias. Elixir sudorífico de Willis, II, 16. Fomentos diuréticos, II, 112 y 113. Infusion de hollin de Piderit, II, 169. Mistura diaforética de Selle, II, 394. Pediluvios irritantes, II, 453. Pomada antiespasmódica de Goulin, III, 81. Vino de Huxham, III, 328.

Supuracion. Reabsorcion purulenta. Arnica, I, 113. Julepe tónico y alcanforado, II, 284. Electuario estimulante, I, 523.

Tartamudeo. Se ordenará al enfermo que hable rítmicamente, que retire la lengua hácia la fa-

ringe y eleve la punta de este órgano hacia la campanilla, que separe los labios trasversalmente de modo que se alejen las comisuras como si quisiese reir, y hará preceder á cada frase una profunda inspiracion (Colombat).

Temblor nervioso. V. Convulsiones.

Ténia. Aceite antihelmíntico de Chabert, I, 293.

Bolos: antihelmínticos de Babeyrac, I, 386. —

vermífugos de Foy, I, 400. Cocimiento de corteza de raíz de granado, I, 195. Electuarios: antihelmíntico de Deslandes, I, 512. — vermífugo de Fouquier, I, 533. — vermífugo de Spielmann, I, 533. Emulsiones: purgante con aceite de tártago de Calderini, II, 61. — purgante con escamonea, II, 61. Extracto oleo-resinoso de helecho, I, 198. Mistura antihelmíntica, II, 382. Opiata vermífuga de Malouet, II, 416. Píldoras antihelmínticas, II, 471. Polvo vermífugo de Brugnatelly, III, 74. Preparaciones de esencia de trementina, I, 284. Remedios: contra la ténia, de Mathieu, III, 143. — contra la ténia, de Alibert, III, 140. — de Bordier, III, 141. — de Dubois, III, 147. — de Guilbert, III, 142. — de Madama Nouffer, III, 149. — vermífugo de Bremser, III, 154. Tisana de helecho, I, 198. Trociscos antihelmínticos de la F. M., III, 270.

Tétanos. Antiflogísticos. Antiespasmódicos, III, 436. Opio, I, 234, y preparaciones de opio. Preparaciones de esencia de trementina, I, 284. Acónito, I, 93. Beleño, I, 122. Belladona, I, 123. Cicuta, I, 151. Estramonio, I, 181. Julepe del Doctor Fournier, II, 278. Lavativas de belladona, II, 295. Linimento estimulante rubefaciente de Petit, II, 338. Pociones: antitetánica de Fournier, II, 580. — de Stuetz, II, 624. — emetiza-

da, II, 599. — moscada y opiada de Cheselden, II, 614.

Tialismo. V. Salivacion.

Tifo. V. Fiebre tifoidea.

Timpanitis. Bebidas aromáticas. Linimento volátil de Plenck, II, 347. Píldoras escilíticas de Chrestien, II, 515. Tópicos con agua amoniaca. Régimen un poco tónico y no feculento.

Tiña. Aceite oxigenado de Deimann, I, 208. Cocimiento de hollin de Blaud, I, 454. Lociones: contra la tiña, II, 354.—contra la tiña de los H. de M., II, 354.—de Barlow, II, 353.—de eléboro blanco de Swediaur, II, 355. Licor de Gowlard, II, 315. Linimento contra la tiña, de Pourché, II, 335. Mezcla para lociones de Biett, II, 373. Pomadas: alcalina, III, 78.—alcalina de Biett, III, 78.—contra el favus, III, 97.—contra la tiña, III, 102.—contra la tiña, de Bories, III, 103.—clorada, III, 95.—de Alibert, II, 66.—de azufre y carbon de Biett, III, 89.—de Bauyer, III, 89.—de creosota de Hiff, III, 103.—de hollin de Blaud, III, 113.—de hollin de Lablache, III, 114. Polvo de los hermanos Mahon, III, 53. Poción contra la tiña, II, 592. Remedios de Bicker, III, 141.—del Doctor Barlow, III, 148. Ungüentos: contra la tiña, III, 283.—contra la tiña con carbon animal de los H. de M., III, 284.

Tisis pulmonal. Ejercicio. Insolacion. Nutricion reparadora. Preparaciones: de bálsamo de Tolú, I, 120.—de bálsamo de copaiba, I, 119.—de liquen, I, 215.—de mirra, I, 225. Aguas: de brea, I, 129.—de hidriodato de hierro, I, 318.—iodada, I, 319. Bebidas: antiescrofulosa, I, 371.—estibiada de Preziosi, I, 376.—pectoral de Cottereau, I, 378. Bolos antiescrofulosos,

I, 384. Cloruros: de oro y sódio, I, 158. — de sódio, I, 160. Cremas: pectoral de Cottereau, I, 490. — pectoral de Jeannet de Longrois, I, 490. — pectoral de Pierquin, I, 491. — pectoral de Tronchin, I, 491. Cocimientos: antitísico de Wvauters, I, 445. — de cebada compuesto de la F. E., I, 450. Chocolates: analéptico de arrow-root, II, 159. — analéptico de salep, I, 159. — blanco, II, 160. — con el hidriodato de hierro, II, 160. — de liquen, II, 161 y 162. — de liquen de Robinet, II, 161. Elixir de vitriolo aromático de Dehaen, II, 18. Emplasto emetizado de Lespinasse, II, 34. Emulsion aceitosa, II, 52. Fumigaciones: de belladona, II, 122. — de brea, II, 123. — resinosa, II, 125. Inspiraciones de cloro. Hidroclorato de amoníaco y hierro. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Jaleas: de cuerno de ciervo, de Ferrez, II, 197. — de liquen, II, 200. — de liquen de Beral, II, 201. — de liquen de Coldefy, II, 201. — de lombarda, II, 202. Jarabes: ciánico de Magendie, II, 225. — de caracoles de Figuier, II, 221. — de beleño de A. Chevallier, II, 217. — de hidrocianato de potasa de Villermé, II, 247. — de hígado de azufre, II, 249. — de puntas de espárragos de A. Chevallier, II, 260. — de sapos, II, 264. — pectoral de Bouvart, II, 255. — pectoral de Courti, II, 256. — pectoral de Maloet, II, 258. — pectoral de Rivet, II, 258. — pectoral dulcificante de Selle, II, 257. — pectoral inglés, II, 257. — resolutivo de Selle, II, 263. Lavativas: clorosa de Cottereau, II, 295. — iodada de Cottereau, II, 299. Linimento sedante de Cottereau, II, 345. Loocs: aceitoso, II, 359. — blanco, II, 361. — pectoral de Preziosi, II, 365. — verde, II, 365. Mistura pecto-

ral de Cottereau, II, 402. Mezclas: pectoral de Magendie, II, 374.—pectoral de Villerimé, II, 375. Opiatas: antituberculosa de Dufresnoy, II, 410.—de Michu, II, 415. Ojímieles: pectoral de Edimburgo, II, 418.—pectoral de los Daneses, II, 419. Pastas: de caracoles de Figuier, II, 426. Pasta de liquen de Henri, II, 430.—de liquen de Robinet, II, 430. Pastillas: de Chaussier, II, 442.—de emetina pectorales de Magendie, II, 439.—de ipecacuana, II, 443.—de pelitre de Lacombe, II, 448. Píldoras: antisudoríficas de los H. M., II, 479.—antitípicas, II, 480.—balsámicas de Boerhaave, II, 487.—balsámicas de los H. de M., II, 487.—contra los sudores de los tísicos de Burdack, II, 506.—de acetato de plomo de Fouquier, II, 456.—de carbon alcalinas, II, 493.—de cianuro de potasio de Bally, II, 497.—de ioduro de plomo cristalizado de Cottereau y Verdé-Delisle, II, 529.—eméticas de Swediaur, II, 514.—esténicas de Brun, II, 517.—incisivas pectorales de Buchan, II, 528.—tónicas y calmantes, II, 559. Pociones: antitísica de Ameling, II, 580.—contra la diarrea de los tísicos, de Cottereau, II, 591.—de cianuro de potasio de Bally, II, 588.—de hidriodato de potasa y ácido hidrocianico de Fermon, II, 607.—de Quarin contra la tos sufocativa, II, 622.—estibio-opiada, II, 602.—iodurada, de Fermon, II, 609.—pectoral de Magendie, II, 617.—pectoral de Magendie, II, 618. Polvos: antitísico de Bories, III, 13.—calmante de Cottereau, III, 18.—de liquen azucarado de Robinet, III, 56.—estibio-opiado, III, 42.—fundente de Cottereau, III, 51.—pectoral de Wedel, III, 62. Pomadas: de Autenrieth, III, 87.—crisocroma, III, 103. Racahout de los ára-

bes, III, 137. Sacarolado de gelatina de liquen, III, 156. Tabletas: anticatarrales de Tronchin, III, 171. — de Calabria, de Manfredi, III, 173. — de carbon y chocolate de A. Chevallier, III, 174. — de carbon y chocolate de A. Chevallier, III, 174. — de cloruro de cal de A. Chevallier, III, 175. — de gelatina de liquen de Beral, III, 177. Tintura etérea de digital purpúrea, I, 168. Te pectoral de Boerhaave, III, 185. Tintura de felandrio del Dr. Marcius, III, 206. Tisana de Buchan, III, 226. Trociscos de Chaussier, III, 272.

Tofos. V. Gota.

Torceduras. V. Contusiones.

Tos. V. Catarro pulmonal. Cremas: pectoral de Cottereau, I, 490. — pectoral de Huc, I, 491. — pectoral de Jeannet de Longrois, I, 490. Electuario incrasante de Sydenham, I, 528. Emplasto de digital, II, 33. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Jarabes: calmante de Roux, II, 221. — compuesto de crisimo de la F. E., II, 240. — de beleño de A. Chevallier, II, 217. — del Dr. Gardane, II, 238. — de meconio de la F. E., II, 253. — pectoral de Dumas, II, 257. Julepe gomoso, II, 280. — gomoso calmante, II, 281. — gomoso de la F. E., II, 281. Píldoras: de amoniaco, II, 460. — de cinoglosa de la F. E., II, 498. Poción pectoral aceitosa de Virey, II, 616.

Tos convulsiva. Oxido de zinc, I, 238. Píldoras de óxido de zinc, I, 238. Antiespasmódicos, III, 436. Preparaciones de ácido cianhídrico, I, 87.

Toses nerviosas. V. Coqueluche.

— *pertinaces.* V. Bronquitis crónica.

— *sufocativa.* V. Coqueluche.

Trismo de los recién nacidos. V. Tétanos. Tintu-

ra de ambar balsámica de Dippel, III, 191.

Tubérculos de la piel. V. Herpes y Sifilides.

Tumores. Bálsamos: de azufre, I, 355. — de azufre anisado, I, 355. — de azufre succinado, I, 355. — de azufre terebintinado, I, 355. — de azufre terebintinado de Ruland, I, 355. Cataplasmas: madurativa, I, 418 y 419. — resolutivas, I, 421. — supurante de los H. de M., I, 422. — supurante de Boyer, I, 423. Emplastos: amoniaco-mercurial, II, 23. — antivénereo de Boerhaave, II, 25. — de cicuta, II, 28. — de cicuta de los H. M., II, 29. — contra los tumores enquistados, II, 32. — de Fouquet, II, 36. — de gálbano crocado de la F. E., II, 38. — de gálbano simple de la F. E., II, 38. — de goma amoniaco, II, 39. — de goma amoniaco compuesto, II, 39. — de pelitre de Fuller, II, 42. Esparadrapo de Vigo, II, 77. — de Vigo con mercurio opiado de Riccord, II, 78. Eter acético cantaridado de Duple, II, 101. Etiope antimonial de Huxham, II, 107. Fomentos: resolutivo, II, 116. — resolutivo de Richter, II, 117. Linimentos: de Hufeland, II, 339. — de Roncalli, II, 344. — jabonoso y alcanforado de Ferriar, II, 340. — jabonoso y alcanforado de Ferriar, II, 340. — resolutivo de Pott, II, 343. — resolutivo fuerte de los H. de M., II, 117. — resolutivo de Richter, II, 117. — resolutivo suave de los H. de M., II, 117. Locion resolutiva, II, 357. Poción de Spielmann, II, 623. Pomadas: crisocroma, III, 103. — de hidrobromato de potasa, III, 112. — de iodato de zinc, III, 117. — opiada, III, 126. — resolutiva, III, 129. Remedio de Purmann, III, 150.

Tumores articulares. Emisiones sanguíneas. Compresion. Moxas, I, 189. Mercuriales. Preparaciones de iodo, I, 203. Agua iodada, I, 319.

Bálsamo de acero, I, 350. — de azufre, I, 355. — de azufre terebintinado de Ruland, I, 355. Cataplasma aromática de los H. de M., I, 414. — iodurada, I, 418. — saturnina de los H. M., I, 422. Emplasto de ranas con mercurio de la F. E., II, 45. — de ranas con mercurio de los H. M., II, 46. — de belladona de Planché, II, 26. — de goma amoniaco, II, 39. — compuesto, II, 39. Fomento aromático, II, 110. — aromático de los H. de M., II, 110. — astringente, II, 111. — astringente de los H. de M., II, 111. — de Heister, II, 114. Linimento estimulante inglés, II, 337. Piel de Goulard, II, 455. Píldoras de iodo de potasio, II, 532. Pomada crisocroma, III, 103. Remedio de Pormann, III, 150. Ungüento del Duque, III, 284.

Tumores artríticos. V. Gota. — *blancos articulares.* V. Tumores articulares. — *crónicos.* V. Tumores. — *enquistados.* V. Tumores.

Escirrosos. V. Cáncer. Etiope vegetal de Russel, II, 108. Linimento de Roncalli, II, 344. Píldoras mercuriales de Plenck, II, 543. Ungüento fundente opiado, III, 288.

Tumores escrofulosos. V. Escrófulas.

— *fríos ó indolentes.* V. Tumores. Moxas, I, 189. Fumigaciones de benjní, I, 124. Bálsamo de azufre, I, 355. — de azufre anisado, I, 117. — terebintinado, I, 355. — sucinado, I, 117. — de vida, I, 363. Cataplasmas resolutivas, I, 420 y 421. Emplasto de pelitre de Fuller, II, 42. — de ranas de la F. E., II, 45. Linimento estimulante inglés, II, 337. Pomada de hidriodato de potasa de los H. de M., III, 112. — de hidriodato de potasa de Magendie, III, 112. — de hidriodato de potasa iodurado de

Coindet, III, 113. — de iodo, III, 115.

Tumores glandulosos del cuello. V. Escrófulas.

Tumores glandulosos del pecho. Antillogísticos. Opiados. Purgantes, III, 440. Aceite alcanforado, I, 100. Cataplasma calmante y resolutive, I, 415. — narcótica, I, 419. — resolutive, I, 420. Emplastro de esperma de ballena de la F. E., III, 34. — fundente de Lamotte, II, 37. Fomento de Justamond, II, 115. — resolutive de Swediaur, II, 118. Infusion acuosa de opio de Chaussier, II, 164. Pomada crisocroma, III, 103. Suero de Weiss, III, 165. Ungüento amoniacoal, III, 277.

Tumores inflamatorios. V. Flegmon. — *hemorroidales.* V. Hemorroides. — *sifiliticos.* V. Sifilis. — *sinoviales.* V. Gota y reumatismo. — *venéreos.* V. Sifilis.

Ulceras. Nitrato de plata, I, 230. Sulfato de cobre, I, 268. Antisépticos. Cauterio objetivo, I, 188. Aceite de óxido de cobre verde, I, 297. Bálsamo verde de los H. de M. I, 297. Aceite oxigenado de Deimann, I, 298. Agua clorurada, I, 310. — de Alibour, I, 304. — del arcabuzazo de Theden, I, 306. — fagedénica de la F. E., I, 315. — mercurial de Piderit, I, 323. — negra alemana, I, 324. — tedianana de los H. de M., I, 306. — verde, I, 330. Bálsamos: de Arceo de los H. M., III, 278. — de azufre, I, 355. — de azufre anisado, II, 555. — sucinado, I, 555. — terebintinado, I, 555. — de Goulard, I, 358. — del caballero de Laborde, I, 356. — samaritano de Tornamira, I, 361. — samaritano de los H. M., I, 361. Cataplasma fermentante de los rusos, I, 418. Cerato anodino de los H. M., I, 428. — anodino de la F. E., I, 424. — de Huleland, I, 427. — desecante de Kirkland, I, 425. — de

Galeno, I, 426. — de laurel real, I, 427. — de Pott, I, 430. — de saturno alcanforado de Fr. Cosme, I, 431. — opiado de Lagneau, I, 429. — emoliente de los H. de M., I, 426. — mercurial de Falch, I, 428. — opiado, I, 429. — simple, I, 431. Ceromel de Aitken, I, 432. Colirio de Fernandez de la F. E., I, 470. — de Lanfranc de los H. de M., I, 472. Digestivo, I, 493. — animado, I, 494. — de Plenck, I, 495. — opiado, I, 495. Disolucion de nitrato de plata, I, 507. Emplastos: adhesivo, II, 21. — aglutinante de Andrés de la Cruz, II, 21. — aglutinante de Woodstock, II, 22. — aglutinante inglés, II, 22. — de albayalde, II, 23. — de Baynton, II, 25. — de Canet, II, 26. — de Fouquet, II, 36. — del abate Doyen, II, 21. — de sebo anodino de la F. E., II, 48. — diapalma, II, 32. Esparadrapos: astringente de Loustonau, II, 74. — de cera, II, 74. — de diapalma, II, 77. Etiope antimonial de Huxham, II, 107. Fomentos: antiséptico, II, 110. — de vino aromático con opio de Ricord, II, 119. — vinoso de bayas de enebro, II, 119. — vinoso de rosas, II, 119. — vinoso de salvia, II, 119. Gargarismo clórico, II, 136. Licores: de mirra, II, 315. — desinfectante de cloruro de sosa, II, 314. Lociones: alcohólica de Swediaur, II, 351. — antiséptica, II, 352. — estimulante de Saviard, II, 355. Piel de Goulard, II, 455. Polvos: antiséptico de Swediaur, III, 13. — arsenical de Justamond, III, 14. — arsenical de Plunquet, III, 14. Pomadas: crisocroma, III, 103. — de tanino, III, 132. — opiada, III, 126. Tintura alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188. Ungüentos: basilicon de la F. E., III, 279. — blanco de Rhassis de la F. E., III, 280. — bruno, III,

287. — de acetato de plomo de la F. E., III, 275. — de Arceo de la F. E., III, 277. — de cobre de Swediaur, III, 282. — de estoraque, III, 286. — de estoraque de los H. de M., III, 287. — de la abadia de Bec, III, 275. — de La mère, de la F. E., III, 291. — del Duque, III, 284. — de propoleos de Cadet, III, 298. — de Ricour, III, 299. — egipciaco de la F. E., III, 285. — egipciaco de los H. M., III, 285. Vinos: aromático, III, 318. — aromático con tanino, III, 319. — con miel, III, 321.

Ulceras atónicas. V. *Ulceras.*

— *cancerosas.* V. *Cáncer.* Disoluciones: de cloruro de oro, I, 158. — de nitrato de plata, I, 230. Infusion de laurel real, II, 169. Linimento arsenical, II, 331. Licor de mirra, II, 315. Linimento arsenical, II, 331. Nitrato ácido de mercurio, I, 230. Polvos: anticarcinomatoso de Fr. Cosme, III, 3. — arsenical de Justamond, III, 14. — arsenical de Ploucquet, III, 14. Pomada iodo-narcótica alcanforada, III, 117.

— *carcinomatosas.* V. *Cáncer.*

— *crónicas de la faringe.* V. *Angina faríngea.*

— *cutáneas.* V. *Ulceras atónicas.*

— *de la boca.* V. *Estomatitis.*

Ulceras de la córnea. Colirio, I, 463. Láudano de Rousseau, II, 286. Tocarlas ligeramente con piedra infernal.

— *de las encías.* V. *Estomatitis.*

— *de la garganta.* V. *Angina.*

— *de la matriz.* V. *Cáncer de la matriz.*

— *de la vejiga de la orina.* V. *Catastro crónico de la vejiga.*

— *del cuello de la matriz.* V. *Cáncer de la matriz.*

— *de los párpados.* V. *Oftalmia.* Agua antioftálmica de Loche, I, 305. Cerato de Hufeland, I, 427.

Colirios: de Brun, I, 467. — mercurial, I, 473.

Ulcerae dolorosas. V. *Ulcerae.*

- *escrofulosas.* Alcanfor, I, 100. Baños iodurados, I, 69. Cloro, I, 155. Cloruros: de cal, I, 157. — de sosa, I, 160. Cataplasma de cicuta, I, 151. Cerato hidrociánico, I, 427. Disoluciones: ioduradas. — iodurada cáustica, I, 505. Pomadas: con los calomelanos, III, 104. — de calomelanos, III, 92. — iodo-narcótica alcanforada, III, 117. — de ioduro de plomo, III, 117. — de ioduro de zinc, III, 117. — hidriodatada, III, 111. — iodurada, III, 115. — iodurado-opiada de Lemassou, III, 116.
- *fistulosas.* Cloro, I, 155. Cloruro de cal, I, 151. — de sosa, I, 160. Digestivos, I, 493. — de Plenck, I, 495. Esponjas: preparada, II, 92. — preparada con cera, II, 92. Inyecciones: balsámica, II, 179. — escitante de Swediaur, II, 182. — iodurada, II, 184. — tónica, II, 190. Loción alcohólica de Swediaur, II, 351. Nitrato de plata, I, 230.
- *fungosas.* V. *Carnes fungosas.* Aceite verde, I, 300. Alumbre calcinado, I, 268. Digestivo consuntivo de los H. M., I, 494. Licor caterético, II, 312. Loción estimulante de Saviard, II, 355. Nitrato de plata, I, 230. Polvos: arsenical de Justamond, III, 14. — arsenical de Pluncquet, III, 14. — cáustico, III, 21. — de Prince, III, 63. Sulfato de cobre, I, 268. Ungüentos: de cobre de Swediaur, III, 282. — egipciaco de la F. E., III, 285. — egipciaco de los H. M., III, 285.
- *gangrenosas.* Agua de creosota, I, 166. Cataplasmas: de lúpulo, I, 216. — fermentante de los rusos, I, 418. Cerato de saturno alcanforado

de Fr. Cosme, I, 431. Digestivos: antipútrido de los H. de M., I, 494. — antiséptico de Boerhaave, I, 494. Disoluciones: de cloruro de oro, I, 158. — de nitrato de plata, I, 230. Fomentos: antiséptico, II, 109. — antiséptico de Schmucker, II, 110. — de Richard, II, 118. Fumigación clorurada de los H. M., II, 125. Gargarismo para las úlceras gangrenosas, de los H. de M., II, 144. Loción antiséptica, II, 352. Nitrato ácido de mercurio, I, 230. Pomada de lupulina, III, 119. Preparaciones de quina, I, 249. Polvo antiséptico de Swediaur, III, 13. Pomada de tanato de plomo de Yott, III, 132.

Úlceras gangrenosas de la boca. V. Estomatitis y aftas.

— *indolentes.* V. Úlceras.

— *pútridas.* V. Úlceras malignas.

— *sifilíticas.* Aguas: cáustica, I, 309. — fagedáica de la F. E., I, 315. — mercurial de Piderit, I, 323. — negra alemana, I, 324. Bálsamo de Gouillard, I, 358. Ceratos: anodino de los H. M., I, 428. — de precipitado blanco de Gibert, I, 430. — hidriocianico de Bielt, I, 427. — mercurial, I, 427. — mercurial de Falck, I, 428. — opiado de Lagneau, I, 428. Colirio de Lanfranc. Digestivo mercurial, I, 495. Vino aromático opiado, III, 319. Disolución mercurial opiada, I, 507. Esparadrapos: de Vigo, II, 77. — de Vigo con mercurio opiado de Ricord, II, 78. Eter antimonial de Huxham, II, 107. Fomentos: de cloruro de sosa, I, 160. — de vino aromático de Ricord, II, 119. Gargarismos: antisifilítico, II, 134. — de cianuro de mercurio de Parent, II, 136. — verde de Swediaur, II, 146. Inyecciones mercurial de Lagneau, II, 185. — mercurial opiada, II, 185. Jarabe de oro, II, 255. Loción

contra las úlceras venéreas, de Gibert, II, 355. Mieles: con proto-ioduro de mercurio de Bielt, II, 377.—mercurial dulce de Swediaur, II, 377. Pomadas: antisifilítica, III, 86.—con los calomelanos, III, 104.—de calomelanos opiada, III, 92.—de calomelanos, III, 92.—de cianuro de mercurio de Parent, III, 93.—de deuto-ioduro de Magendie, III, 104.—de ioduro de mercurio de los II. M., III, 104. Polvo de Prince, III, 63. Pomadas: de proto-ioduro de mercurio de Bielt, III, 128.—de proto-ioduro de mercurio de Magendie, III, 128.—iodo-narcótica alcanforada, III, 117.—mercurial opiada, III, 121. Tópicos: antisifilítico de Cerillo, III, 242.—aurífero de Niel, III, 249. Ungüento bruno, III, 281. Vino aromático con tanino, III, 319.

—*sifilíticas de la garganta*. V. Sífilis.

Uretritis aguda. V. Bleenorragia y flegmásias.

—*crónica*. V. Catarro del aparato urinario.

Vapores. V. Histerismo. Preparaciones antiespasmódicas.—de valeriana, I, 286.

Vegetaciones sifilíticas. V. Escrescencias sifilíticas.

Verrugas. V. Puerros. Acido azóico, I, 86. Cáusticos, III, 450. Cera verde.

Vértigos. Apocema laxante, I, 344. Bolos: anti-espasmódicos, I, 384.—antiespasmódicos de Bally, I, 384.—antiespasmódicos de Buchan, I, 485.

Vientos. V. Flatuosidades y cólico ventoso.

Viruela. Emisiones sanguíneas. Bebida antiflogística, I, 371. Emulsiones: sedante, II, 63. Esparadrapos: de Vigo, II, 77.—de Vigo con mercurio opiado de Ricord, II, 78. Nitrato de plata, I, 230. Poción gomosa con amoniaco. Tisana de borraja, I, 128. Vinagre alcanforado de Spielmann, III, 307.

Vómica, V. Neumonía crónica.

Vómito. Hielo, I, 187. Aguas: alcalina gaseosa, I, 303. — gaseosa simple, I, 318. Cataplasma de vinagre y corteza de pan, de la F. E., I, 423. Cerveza de gengibre, I, 192. Electuario opiado de beleño de la F. E., I, 529. Infusion de colombo compuesta, II, 167. Limonadas: gaseosa en polvo, II, 322. — gaseosa líquida de Chatard, II, 320. Misturas: antielmíntica de la F. E., II, 380. — antiemética de los H. de M., II, 381. Pociones: antiemética de Chaussier, II, 574. — antiemética de Dubois, II, 573. — antiemética de Gallereux, II, 574. — antiemética de Riverio, II, 574. — de Dehaen, II, 593. — efervescente de Chaussier, II, 598. Polvos: de Sedlitz compuesto de Planche, III, 70. — de Sedlitz inglés, III, 69. Píldoras: antieméticas de Fuller, II, 465. — antieméticas de los H. M., II, 466. Soda powder, III, 159. Vinagre rosado de la F. E., III, 312. *Zona*. Antiflogísticos. Atemperantes, III, 445. Laxantes, III, 440. Nitrato de plata, I, 230.

INDICE ALFABÉTICO

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTA OBRA

A

- Abedul, I, 72.
Abelmosco, I, 72.
Abeto, I, 72.
Abrótano, I, 72.
— silvestre, I, 73.
Acacia bastarda, I, 73.
— egipcia, I, 73.
— falsa, I, 73.
— verdadera, I, 73.
Acanto, I, 73.
Acebo, I, 73.
Acederac, I, 74.
Acedera comun, I, 74.
Acederilla, I, 74.
Aceite alcanforado, I,
101.
— aloético bávaro, I,
293.
— animal de Dippel, I,
75.
— antihelmíntico de Cha-
bert, I, 293.
Aceite aromático, I, 294.
— bezoárdico de Wedel,
I, 295.
— comun, I, 69.
— de adormideras, I,
75.
— de ajenos, I, 64 y
98.
— de almendras dulces
I, 75.
— de anagálide, I, 110.
— de artánita compuesto
de la F. E., I, 294.
— de avellana, I, 76.
— de Been, I, 76.
— de beleño, I, 65 y
122.
— de belladona, I, 65.
— de escharros, I, 294.
— de cajepul, I, 76.
— de calabaza, I, 295.
— de cantáridas, I, 65 y
135.

- Aceite de catapucia menor, I, 76.
 — de cicuta, I, 65 y 152.
 — de creosota, I, 295.
 — de croton tiglio, I, 76.
 — de cuerno de ciervo, I, 77.
 — de estramonio, I, 65.
 — de éter, I, 295.
 — de hayuco, I, 78.
 — de hígado de bacalao, I, 78.
 — de hígado de raya, I, 78.
 — de hipericon, I, 64 y 201.
 — de huevos, I, 78.
 — de laurel, I, 78.
 — de lino, I, 73.
 — de lombrices, de la F. E., III, 293.
 — de mandragora, I, 65.
 — de manzanilla, I, 64 y 221.
 — de meliloto, I, 64.
 — de unces, I, 79.
 — de olivas, I, 79.
 — de óxido de cobre verde de la F. E., I, 297.
 — de petróleo, I, 242.
 — de ricino, I, 73.
 — de ricino artificial de Hofeland, I, 298.
 Aceite de ruda, I, 64.
 — de sáuco, I, 64.
 — de semillas de fenogreco, I, 65.
 — de tabaco, I, 65 y 277.
 — de tapsia antireumático de la F. E., I, 299.
 — de tártago, I, 80.
 — de yerbamora, I, 65 y 290.
 — empireumático, I, 75.
 — esencial de ajeno, I, 98.
 — esencial de alcaravea, I, 102.
 — esencial de almendras amargas, I, 107.
 — esencial de anís, I, 112.
 — esencial de canela, I, 135.
 — esencial de cáscara de naranja, I, 229.
 — esencial de clavo, I, 155.
 — esencial de enebro, I, 176.
 — esencial de eneldo, I, 176.
 — esencial de espiego, I, 180.
 — esencial de flores de naranja, I, 229.
 — esencial de hinojo, I, 201.

- Aceite esencial de laurel real, I, 213.
 — esencial de manzanilla, I, 221.
 — esencial de nuez moscada, I, 232.
 — esencial de romero, I, 254.
 — esencial de ruda, I, 255.
 — esencial de salvia, I, 260.
 — esencial de sazafrás, I, 261.
 — esencial de succino, I, 266.
 — esencial de trementina, I, 178.
 — esencial de yerbabuena de sabor de pimienta, I, 290.
 — etéreo de almendras amargas, I, 296.
 — etéreo de helecho, I, 296.
 — fosforado, I, 297.
 — oxigenado, I, 268.
 — rosado, I, 299.
 Aceites, I, 293.
 — medicinales, I, 64.
 Aceite verde, I, 300.
 Acelgas, I, 80.
 Acetato bibásico de cobre, I, 81.
 — de amoniaco, I, 80.
 — de amoniaco y hierro líquido, I, 300.
 Acetato de cobre neutro, I, 81.
 — de mercurio, I, 82.
 — de morfina, I, 82.
 — de peróxido de hierro, I, 300.
 — de potasa, I, 83.
 — de potasa líquido, I, 83.
 — de quinina, I, 83.
 — de sosa, I, 83.
 — neutro de plomo, I, 82.
 Aciano, I, 83.
 Acibar, I, 83.
 Acido acético concentrado, I, 85.
 — acético impuro, I, 84.
 — acético puro, I, 84.
 — antimónico, I, 85.
 — antimonioso, I, 85.
 — arsenioso, I, 85.
 — aúrico, I, 86.
 — azóico, I, 86.
 — azóico alcoholizado, I, 86.
 — benzóico, I, 86.
 — bórico, I, 87.
 — cáncico, I, 87.
 — carbónico, I, 87.
 — cianhídrico, I, 87.
 — cítrico, I, 88.
 — clorhídrico, I, 89 y 90.
 — fosfórico, I, 89.

- hidrociánico, I, 87.
- hidrociánico vegetal, I, 107.
 - hidrocórico, I, 89.
 - hidroclore nítrico, I, 90.
 - hidrosulfúrico, I, 90.
 - láctico, I, 90.
 - málico, I, 90.
 - muriático, I, 89.
 - nítrico, I, 86.
 - nitro-muriático, I, 90.
 - oxálico, I, 90.
 - piroleñoso, I, 91.
 - piro tartárico, I, 91.
 - prúsico, I, 87.
 - prúsico alcoholizado, I, 88.
 - prúsico medicinal, I, 88.
 - sucínico, I, 91.
 - sulfhídrico, I, 91.
 - sulfúrico, I, 92.
 - sulfúrico alcoholizado, I, 92 y 333.
 - sulfúrico con el alcohol aromático, I, 301.
 - sulfuroso líquido, I, 92.
 - tánico, I, 93.
 - tartárico, I, 93.
- Aconitina**, I, 94.
- Acónito**, I, 93.
- Actea de los Alpes**, I, 94.
- Achicorias amargas**, I, 97.
- Adelfa**, I, 94.
 - Adhatoda**, I, 94.
 - Adipocira**, I, 94.
 - Adormidera comun**, I, 95.
 - marina, I, 95.
 - Afusiones**, I, 71.
 - Agalla**, I, 95.
 - Agárico blanco**, I, 95.
 - Agatofilo aromático**, I, 95.
 - Agave de América**, I, 96.
 - Agracejo**, I, 96.
 - Agraz**, I, 96.
 - Agrimonia**, I, 96.
 - Agua albuminosa**, I, 303.
 - alcalina gaseosa, I, 303.
 - alcanforada, I, 101.
 - aluminosa de la F. E., I, 304.
 - aluminosa de los H. de M., I, 304.
 - aluminosa de sulfato de zinc de la F. E., I, 314.
 - antiépsórica del Dr. Ranque, I, 304.
 - antiépsórica de los H. de M., I, 305.
 - antiépsórica de los H. M., I, 305.

- Agua antiherpética, I, 305.
 — antimonial de sulfato de hierro y magnesia de la F. E., I, 307.
 — antioftálmica, I, 305.
 — antipedicular, I, 306.
 — arterial de la F. E., I, 314.
 — bendita, III, 257.
 — bromurada, I, 308.
 — calibeadá, I, 309.
 — carmelitana, I, 338.
 — cáustica contra los condilomas, I, 309.
 — celeste, I, 310.
 — clorurada, I, 310.
 — contra la jaqueca, I, 311.
 — de ácido carbónico, I, 318.
 — de Aix-la-Chapelle, III, 346.
 — de Alibour, I, 304.
 — de arroz, I, 114.
 — de Audinac, III, 380.
 — de avena, I, 116.
 — de Baden, III, 380.
 — de Bañares, de la F. E., I, 307.
 — de Botot, I, 307.
 — de Bourbonne, I, 308.
 — de brea, I, 129.
 — de Bussang, I, 309, III, 379.
 — de cal, I, 133.
 Agua de cal compuesta, I, 309.
 — de cal de la F. E., I, 309.
 — de Carlsbad, III, 377.
 — de cáscara de naranja, I, 229.
 — de casia con los granos, III, 256.
 — de Contrexeville, III, 369.
 — de creosota, I, 166.
 — de flores de naranjo facticia, I, 315.
 — de Forges, III, 369.
 — de Goulard, II, 350.
 — de Heyfelder, I, 318.
 — de hidriodato de hierro, I, 318.
 — de Javelle, I, 159.
 — del arcabuzazo de Theden, I, 306.
 — de Luce, I, 320.
 — de madama Vrilliere, I, 320.
 — de magnanimidad, I, 321.
 — de mar, III, 387.
 — de mar artificial, III, 387.
 — de Mettemberg, III, 139.
 — de Mont-Dore, III, 377.

- Agua de pan, I, 225.
 — de Plombieres, III, 378.
 — de Pougens, III, 362.
 — de Premier, I, 327.
 — de Pultna, III, 381.
 — de Pymont, III, 368.
 — de Quercetan, I, 327.
 — de Rabel, I, 92 y 333.
 — de san Nectario, III, 377.
 — de Sedlitz, I, 328.
 — de Seidschutz, III, 381.
 — de Seltz, III, 361.
 — de sosa carbonatada, I, 328.
 — de Spa, III, 368.
 — destilada de ajeno, I, 43 y 98.
 — destilada de albahaca, I, 100.
 — destilada de alcara-
 vea, I, 102.
 — destilada de almen-
 dras amargas, I, 106
 y 311.
 — destilada de amapola,
 I, 42 y 108.
 — destilada de anís, I,
 43 y 112.
- Agua destilada de anis
 estrellado, I, 43 y
 119.
 — destilada de artemisa,
 I, 43 y 115.
 — destilada de bayas
 de enebro, I, 43 y
 176.
 — destilada de bien gra-
 nada, I, 44.
 — destilada de berros,
 I, 41.
 — destilada de borraja,
 I, 41 y 129.
 — destilada de canela,
 I, 43 y 135.
 — destilada de cascari-
 lla, I, 44 y 143.
 — destilada de clavo,
 I, 44 y 155.
 — destilada de coclearia,
 I, 41.
 — destilada de culantri-
 llo, I, 167.
 — destilada de espliego,
 I, 43 y 180.
 — destilada de flores de
 naranjo, I, 229.
 — destilada de flores de
 saúco, I, 262.
 — destilada de hino-
 jo, I, 201.
 — destilada de hisopo, I,
 43 y 202.
 — destilada de hojas de
 almendro, I, 41.

- Agua destilada de hojas de melocoton, I, 41.
 — destilada de las flores de peonía, I, 241.
 — destilada de laurel real, I, 41, 213 y 312.
 — destilada de lechuga, I, 40.
 — destilada de lechuga cultivada, I, 214.
 — destilada de llanten, I, 41 y 217.
 — destilada de matricaria, I, 222.
 — destilada de meliloto, I, 42 y 223.
 — destilada de melisa, I, 43.
 — destilada de ninfea, I, 42 y 230.
 — destilada de orégano, I, 42.
 — destilada de parieta-
 ria, I, 41 y 240.
 — destilada de perifollo,
 I, 242.
 — destilada de pulsatila,
 I, 248.
 — destilada de raíz de
 valeriana, I, 43.
 — destilada de rosas, I,
 42 y 254.
 — destilada de salvia,
 I, 43 y 260.
 Agua destilada de sasa-
 frás, I, 44 y 261.
 — destilada de saúco, I,
 42.
 — destilada de semillas
 de angélica, I, 43.
 — destilada de semillas
 de hinojo, I, 43.
 — destilada de semillas
 de perejil, I, 43.
 — destilada de serpol,
 I, 42.
 — destilada de tanaceto,
 I, 43.
 — destilada de tilo, I,
 42 y 282.
 — destilada de tomillo,
 I, 43.
 — destilada de toronjil,
 I, 283.
 — destilada de toron-
 jil compuesta, I,
 338.
 — destilada de vale-
 riana, I, 286.
 — destilada de verónica,
 I, 288.
 — destilada de yedra
 terrestre, I, 43 y
 289.
 — destilada de yerbabue-
 na de sabor de pimien-
 ta, I, 42 y 290.
 — de Trebez, I, 329.
 — de Vals, III, 377.
 — diurética alcanforada,

- I, 312.
- Agua diurética alcanforada de Fuller, I, 313.
- espirituosa de Anhalt, I, 313.
- estíptica de la F. E., I, 314.
- etérea, I, 184.
- etérea alcanforada, I, 101.
- etérea alcanforada de Brugnatelli, I, 314.
- fagedénica de la F. E., I, 315.
- fagedénica negra, I, 324.
- ferruginosa, I, 315.
- fundente, I, 317.
- gaseosa marcial de Trousseau, I, 318.
- gaseosa simple, I, 318.
- gaseoso-ferruginosa de Colombat, I, 317.
- hidriodada, I, 206.
- hidrocianica vegetal, I, 319.
- iodada de Lugol, I, 319.
- lacticinosa de canela de la F. E., I, 320.
- magnésiana, I, 322.
- magnésiana gaseosa, I, 322.
- medicinal de Husson, I, 323.
- mercurial de Piderit, I, 323.
- Agua mineral ferruginosa de Marck, I, 324.
- muriático-mercurial roja de la F. E., I, 315.
- oftálmica fortificante, I, 325.
- oftálmica mercurial, I, 325.
- negra alemana, I, 324.
- oriental de Delabarre, I, 325.
- oxigenada de Alyon, I, 326.
- para los ojos, de Ibel, I, 326.
- purgante, I, 327.
- Aguardiente, I, 102.
- alcanforado, I, 101.
- alemán, I, 302.
- alemán aromático, I, 302.
- de guayaco, I, 47.
- purgante de Mezaize, I, 302.
- Aguardientes, I, 302.
- Agua régia, I, 90.
- roja, II, 357.
- roja de Alibert, I, 328.
- Aguas, I, 303.
- aciduladas, III, 361.
- salinas, I, 377.
- saturada de cloro, I, 156.

- Aguas de Alange , III, 361.
 — de Alcantud , III, 376.
 — de Alcaraz , III, 346.
 — de Alceda , III , 347.
 — de Alhama de Aragón , III, 361.
 — de Alhama de Granada , III, 347.
 — de Alhamilla, III, 362.
 — de Alicun , III , 376.
 — de Aliseda , III , 368.
 — de Almagro , III, 370.
 — de Almeida , III, 347.
 — de Almería , III, 362.
 — de Angeles , III, 370.
 — de Aranjuez , III, 377.
 — de Arce , III , 378.
 — de Archena , III, 347.
 — de Ardales , III, 348.
 — de Arenosillo , III, 348.
 — de Arenys de Mar , III , 378.
 — de Arnedillo, III, 379.
 — de Arteijo , III , 348.
 — de Bande , III , 349.
 — de Bañolas , III, 349 y 370.
 — de Baños , III, 349.
 — de Barreiro , III, 370.
 — de Baza , III , 349.
 — de Bea , III, 350.
 — de Bejar , III, 349.
 — de Benasque , III, 370 y 380.
 Aguas de Benzalema, III, 349.
 — de Bertua , III, 350.
 — de Boal , III, 363.
 — de Boñar , III , 370.
 — de Bogarin , III, 380.
 — de Burga del Tremor , III, , 350.
 — de Busot , III, 380.
 — de Caldas de Bohi , III, 350.
 — de Caldas de Cuntis , III , 350.
 — de Caldas de Estrach , III , 381.
 — de Caldas de Malave-lla , III , 381.
 — de Caldas de Oviedo , III, 370.
 — de Caldas de Reyes , III , 351.
 — de Saldelas de Tuy , III , 352.
 — de Carballino, III, 352.
 — de Carballo , III, 352.
 — de Carratraca, III, 352.
 — de Casares , III , 353.
 — de Castañar de Ibor , III , 370.
 — de Castilnuevo , III, 353.
 — de Cestona , III, 382.
 — de Corcoles , III, 383.
 — de Cortegada , III, 354 y 371.
 — de Crevillente, III, 383.

- Aguas de Cuervo, III, 371.
 — de Chiclana, III, 370.
 — de Chiclana de la Frontera, III, 353.
 — de Elorrio, III, 354.
 — de Entrambasmiestas, III, 371.
 — de Esparraguera, III, 354.
 — de Espluga de Francolí, III, 371.
 — de Falces, III, 383.
 — de Ferreira, III, 363 y 371.
 — de Fitero, III, 383.
 — de Font Den Xiro, III, 371.
 — de Font Grogga, III, 372.
 — de Font Santa de san Juan de Campos, III, 383.
 — de Fortuna, III, 384.
 — de Frailes, III, 355.
 — de Fuente del Fresno, III, 384.
 — de Fuente de Piedra, III, 384.
 — de Fuente santa de Torelló, III, 355.
 Aguas de Gava, III, 372.
 — de Gerona, III, 363.
 — de Graena, III, 373.
 — de Grávalos, III, 355.
 — de Guesalivar, III, 355 y 376.
 Aguas de Jabalcuz, III, 384.
 — de la Fuente Sublantina, III, 372.
 — de la Fuente del Rosal, III, 385.
 — de Lanjaron, III, 364 y 373.
 — de las Caldas, III, 387.
 — de Ledesma, III, 355.
 — del Molar, III, 356.
 — de Losa, III, 356.
 — de los hervideros de Fuensanta, III, 363.
 — del rosal de Beteta, III, 385.
 — del sitio de la Isabela, III, 386.
 — de Lugo, III, 356 y 374.
 — de Llorens, III, 374.
 — de Marmella, III, 364.
 — de Marmolejo, III, 364.
 — de Melon, III, 364.
 — de Moldes, III, 357.
 — de Mombuy, III, 381.
 — de Moncada, III, 374.
 — de Montemayor, III, 349.
 — de Olesa, III, 357.
 — de Ontaneda, III, 357.
 — de Orense, III, 357.

- Aguas de Panticosa, III, 357, 375 y 384.
 — de Paracuellos de Jiloca, III, 358.
 — de Partovia, III, 358.
 — de Paterna, III, 364.
 — de Peralejo, III, 371.
 — de Pitres, III, 365.
 — de Portubus, III, 365.
 — de Prejiguero, III, 358.
 — de Priorio, III, 375.
 — de Puertollano, III, 365.
 — de Quinto, III, 385.
 — de Ribas, III, 385.
 — de Sacedon, III, 386.
 — de Saelices, III, 375.
 — de san Agustín, III, 358.
 — de san Berisimo de Veran, III, 360.
 — de san Hilario Sacalm, III, 365.
 — de san Pedro Mártir, III, 375.
 — de santa Agueda, III, 358.
 — de Santaella, III, 359.
 — de Santiago de Guiriz, III, 355.
 — de san Vicente, III, 359.
 — de Segura de Aragon, III, 366.
 Aguas de Sobrado, III, 375.
 — de Solan de Cabras, III, 366.
 — de Solares, III, 367.
 — destiladas, I, 40.
 — de Sumas Aguas, III, 367.
 — de Teruel, III, 386.
 — de Tiermas, III, 359.
 — de Tortosa, III, 386.
 — de Trillo, III, 360, 375 y 386.
 — de Vacia-Madrid, III, 387.
 — de Verin, III, 367.
 — de Vich, III, 376.
 — de Vilamajor, III, 375.
 — de Villavieja, III, 360 y 367.
 — de Zujar, III, 349.
 — ferruginosas, III, 368.
 — minerales ioduradas, I, 324.
 — minerales medicinales, III, 335.
 — salinas, III, 376.
 — sulfurosas, III, 346.
 Agua sulfurosa artificial, I, 329.
 — sulfurosa compuesta, I, 329.
 — tediada de los H. de M., I, 306.
 — vegeto-mineral de la

- F. E., I, 330.
- Agua vegeto-mineral de los H. de M., I, 330.
- verde corregida, I, 330.
- vulneraria, I, 337.
- vulneraria de Plenck, I, 331.
- Ajedrea, I, 97.
- Ajenjo, I, 97.
- marino, I, 98.
- menor, I, 98.
- pónico, I, 98.
- suizo, I, 331.
- Ajo, I, 99.
- Alamo balsamero, I, 99.
- negro, I, 99.
- temblon, I, 99.
- Alazor, I, 99.
- Albahaca comun, I, 99.
- de hojas pequeñas, I, 99.
- Albaricoque, I, 100.
- Albayalde, I, 139.
- Albérchigo, I, 100.
- Alcohol de los campos, I, 100.
- de los setos, I, 100.
- Alcali volátil concreto, I, 139.
- volátil líquido, I, 100.
- Alcanfor, I, 100.
- Alcanforado, I, 102.
- Alcaparro, I, 102.
- Alcaravea, I, 102.
- Alcea, I, 102.
- Alcohol, I, 102.
- Alcoholado de acetato de hierro, I, 333.
- de brucina, I, 334.
- de cinchonina, I, 334.
- de citrato de hierro, I, 334.
- de estriquina, I, 336.
- de extracto de cainca, I, 334.
- de extracto de zarzaparrilla, I, 335.
- de extracto oleo-resinoso de cubebas, I, 335.
- de nuez vómica, I, 36.
- de percloruro de hierro, I, 336.
- de sulfato de quinina, I, 336.
- de veratrina, I, 337.
- Alcoholados, I, 45 y 333.
- Alcohol alcanforado de la F. E., I, 332.
- amoniacoal, I, 332.
- Alcoholato de bergamota, I, 44.
- de cáñamo aromático, I, 45 y 134.
- de canela, I, 45 y 135.
- de cáscaras de naranja, I, 44.
- de cidra, I, 44.

- Alcoholato de clavo de especia, I, 45.
 — de coclearia, I, 160 y 337.
 — de espliego, I, 45 y 180.
 — de espliego amoniacoal, II, 150.
 — de limon, I, 44.
 — de melisa compuesto, I, 338.
 — de nuez moscada, I, 45.
 — de romero, I, 44.
 — de sasafrás, I, 45 y 261.
 — de toronjil, I, 45 y 283.
 — de trementina compuesto, I, 357.
 — de yerbabuena de sabor de pimienta, I, 45 y 290.
 Alcoholatos, I, 44 y 337.
 Alcoholato vulnerario, I, 337.
 Alcoholaturo de acónito, I, 48.
 — de beleño, I, 48.
 — de belladona, I, 48.
 — de berro de Pará, I, 339.
 — de cicuta, I, 48.
 — de digital, I, 48.
 — de joco de belladona, I, 339.
 Alcoholaturo de joco de berro de Pará, I, 340.
 — de lechuga virosa, I, 48.
 — de zumaque venenoso, I, 47.
 Alcoholaturos, I, 47 y 339.
 Alcohol de Boerhaave, I, 332.
 — de romero, I, 254.
 Alcoholes, I, 332.
 Alcohol jabonoso de alcanfor de la F. E., II, 340.
 — muriático etéreo de la F. E., II, 91.
 — nítrico etéreo de la F. E., II, 90.
 — sulfúrico, I, 103 y 333.
 — sulfúrico etéreo, II, 308.
 Alcornoque, I, 103.
 Alelí amarillo, I, 103.
 Alfónsigo comun, I, 103.
 Algalia, I, 104.
 Algarroba, I, 104.
 Algodonero herváceo, I, 104.
 Alholva, I, 104.
 Aliaria, I, 104.
 Aligustre, I, 104.
 Aliso comun, I, 105.
 Alkermes liquido, I, 341.
 Almáciga, I, 105.

- Almendras amargas , I, 106.
 — dulces , I, 105.
 Almidon , I, 107.
 Almizcle , I, 107.
 Aloe , I, 108.
 Alquequenje , I, 105.
 Alquimila , I, 128.
 Alsine , I, 108.
 Alumbre , I, 267.
 — calcinado , I, 268.
 — crudo , I, 267.
 — quemado , I, 268.
 Altea , I, 215.
 Amapola , I, 108.
 Amargon , I, 109.
 Amargos , III, 425.
 Ambar amarillo , I, 266.
 — gris , I, 109.
 Amomo zerumbet , I, 109.
 Amoniaco gaseoso , I, 109.
 — liquido , I, 109.
 Anacardo , I, 110.
 Anagálide , I, 110.
 Ancusa tintoria , I, 110.
 Androsemo , I, 111.
 Anémone pulsatila , I, 111.
 Angélica oficial , I, 111.
 Augustura verdadera , I, 111.
 Anima de ruiharbo de la F. E. , I, 461.
 Anís , I, 112.
 Anís estrellado , I, 118.
 Anodinos , III, 436.
 Antiespasmódicos , III, 436.
 Antigotoso de Want , I, 341.
 Antihelminticos , III, 450.
 Antimonio crudo , I, 274.
 Apio , I, 112.
 Apocema amargo , I, 342.
 — antiescorbútico , I, 342.
 — astringente , I, 343.
 — contraestimulante , I, 343.
 — emeto-catártico , I, 343.
 — laxante , I, 344.
 — purgante , I, 344.
 Apocemas , I, 36 y 342.
 Apocema tónico , I, 345.
 — tónico amargo , I, 346.
 — tónico de Babeyrac , I, 345.
 — tónico y dulcificante , I, 346.
 Aristoloquia larga , I, 112.
 — redonda , I, 112.
 Arnica , I, 113.
 Arrope , I, 52.
 — de saúco , I, 52.
 — de saúco de la F. E. , I, 375.
 Arroz , I, 113.
 Arseniato de amoniaco , I, 114.

- Arseniato de hierro, I, 114.
 — de potasa, I, 114.
 — de sosa, I, 114.
 Artemisa, I, 115.
 Asa fétida, I, 115.
 Asaro, I, 116.
 Astixias, III, 480.
 Aspersiones, I, 71.
 Astrágalo sin tallo, I, 116.
 Astringentes, III, 423.
 Atemperantes, III, 445.
 Atropina, I, 116.
 Avena, I, 116.
 Azafran, I, 116.
 — de marte aperitivo, I, 117.
 — de marte astringente, I, 117.
 Azúcar alcalina, I, 347.
 — anaranjada purgante, I, 347.
 — de berro de Pará, I, 347.
 — de extracto de cainca, I, 348.
 — de musgo de Córcega, I, 348.
 — de saturno, I, 82.
 Azúcares, I, 347.
 Azúcar purgante, I, 349.
 — vermífugo de la F. E., I, 349.
 — vermífugo mercurial, I, 350.
 Azufaisas, I, 117.
 Azufre, I, 117.
 — dorado de antimonio, I, 118.

B

- Badiana, I, 118.
 Baladre, I, 94.
 Bálsamo acético alcanforado, I, 350.
 — acético etéreo, I, 351.
 — acústico, I, 352.
 — acústico de Virey, I, 351.
 — anodino de Bath, I, 352.
 — anodino de la F. E., III, 189.
 — antiartrítico, I, 352.
 — antihistérico, I, 353.
 — Arceo de la F. E., III, 277.
 — Arceo de los H. M., III, 278.
 — astringente, III, 354.
 — católico de la F. E., III, 188.
 — de acero, I, 350.
 — de azufre, I, 355.
 — de azufre anisado, I, 118.
 — de azufre succinado, I, 355.
 — de azufre terebintinado, I, 355.

- Bálsamo de calabaza, III, 281.
 — de copaiba, I, 119.
 — de copalma, I, 181.
 — de Feuillet, I, 300.
 — de Fioraventi, I, 357.
 — de Fioraventi aceitoso, I, 358.
 — de Fioraventi negro, I, 358.
 — de Fourcroy, I, 356.
 — de Goulard, I, 358.
 — de Judea, I, 120.
 — de la Meca, I, 120.
 — del caballero de Laborde, I, 356.
 — del Canadá, I, 119.
 — del Perú, I, 120.
 — de Metz, I, 300.
 — de Tolú, I, 120.
 — de vida, de Hoffmann, I, 363.
 — de vida, de Lelievre, I, 363.
 — de vida externo, II, 337.
 — nervino, I, 358.
 — opodeldoc, I, 359.
 — opodeldoc líquido, I, 359.
 — oxigenado mercurial, III, 295.
 — pleurítico, I, 295.
 Bálsamos, I, 49 y 350.
 Bálsamo sajón, I, 360.
 — samaritano de los H. M., I, 361.
 Bálsamo samaritano de Tornamira, I, 361.
 Bálsamos antiodontálgicos, I, 354.
 — contra los sabañones, I, 357.
 Bálsamo tranquilo, I, 361.
 — tranquilo de Chomel, I, 362.
 — verde de la F. E., I, 297.
 — verde de los H. de M., I, 298.
 Baño antiépsórico de Jadelot, I, 364.
 — antiépsórico, de los H. M., I, 365.
 — antisifilítico, I, 365.
 — aromático de Bally, I, 365.
 — aromático de los H. M., I, 366.
 — de agua de salvado, I, 364.
 — de gelatina, I, 367.
 — de hidriodato de hierro, I, 367.
 — emoliente, I, 366.
 — facicio de Plombieres, I, 366.
 — para conservar los cadáveres, I, 368.
 Baños, I, 69 y 364.
 Baño salino y gelatinoso,

- I, 368.
- Baños de ácido hidrocloretrónico, I, 90.
- de agua de mar, I, 90.
- de asiento, I, 70.
- de deuto-cloruro de mercurio, I, 169.
- de manos, I, 70.
- de mar, III, 387.
- de Pechina, III, 362.
- de pies, I, 70.
- de pies con sal, I, 199.
- de sal amoniaco, I, 258.
- de vapor, I, 70.
- de vapor acuoso, I, 369.
- de vapor aromático, I, 369.
- de vapor clóricos, I, 369.
- de vapor sulfurosos, I, 370.
- gaseosos, I, 70.
- generales, I, 69.
- iodurados, I, 367.
- medicinales, I, 70.
- minerales, I, 70.
- parciales, I, 69.
- sulfuroso y gelatinoso, I, 368.
- Bardana, I, 121.
- Bebida anticatarral, I, 370.
- Bebida antiescrofulosa, I, 371.
- antiespasmódica, I, 371.
- antillogística, I, 371.
- antihelmíntica, I, 372.
- antiherpética, I, 372.
- antinarcótica, I, 374.
- astringente, I, 374.
- atemperante, I, 375.
- carminativa, I, 375.
- de bicarbonato de sosa, I, 375.
- de Koempf, I, 376.
- de Russel, I, 379.
- estibiada, I, 376.
- ferruginosa, I, 376.
- laxante, I, 377.
- pectoral, I, 378.
- purgante de Lescure, I, 378.
- Bebidas, I, 370.
- antilacteas, I, 373.
- laxantes, I, 377.
- Bebida tártaro-boratada, I, 378.
- vermífuga, I, 379.
- vinosa, I, 379.
- Becabunga, I, 121.
- Bejoquillo, I, 121.
- Beleño amarillo, I, 122.
- blanco, I, 122.
- negro, I, 122.
- Belladona, I, 123.
- Bellotas, I, 124.
- Benjuí, I, 124.

- Berberis**, I, 125.
Berro de Pará, I, 125.
Berros, I, 125.
Betónica, I, 125.
Bicarbonato de potasa,
 I, 126.
 — de sosa, I, 126.
Bilis de buey, I, 127.
Bioxalato de potasa, I,
 236.
Bismuto, I, 127.
Bistorta, I, 127.
Bizcochos, I, 380.
 — purgantes, I, 380.
 — vermifugos, I, 380 y
 381.
Blanco de afeite, I, 129.
 — de plomo, I, 129.
Boj, I, 129.
Bol arménico, I, 128.
Bolas, I, 381.
 — de marte, I, 381.
 — de Nancy, I, 381.
 — desinfectantes, I, 381.
**Bolo de tartrato de hier-
 ro**, I, 399.
Bolos digestivos, I, 391.
Bolo drástico, I, 391.
 — febrífugo, I, 395.
Bolos, I, 64 y 383.
 — amargos, I, 383.
 — anodinos astringentes
 de la F. M., I, 383.
 — antiasmáticos, I, 383.
 — antiescrofulosos, I,
 384.
Bolos antiespasmódicos,
 I, 384.
 — antiespasmódicos de
 Bally, I, 384.
 — antiespasmódicos de
 Buchan, I, 385.
 — antigonorréicos, I,
 385.
 — antihelmínticos de
 Babeyrac, I, 386.
**Bolo antihelmíntico de
 Chaussier**, I, 386.
Bolos antimoniales, I,
 386.
 — astringentes, I, 386
 y 387.
 — calmantes, I, 388.
 — carminativos, I, 388.
 — contra la salivacion
 mercurial, I, 390.
 — contra las diarreas
 crónicas, I, 389.
 — contra las hemorroí-
 des, I, 390.
 — contra los catarros,
 I, 389.
 — de copaiba, I, 390.
 — de escila, I, 393.
 — de estoraque líquido,
 I, 181.
 — de Pringle, I, 397.
 — de Puche, I, 397.
 — de ratania, I, 398.
 — de Richard de Au-
 tensierk, I, 398.
 — de Swediaur, I, 398.

- Bolos de triaca, III, 357.
 — de valeriana, I, 400.
 — diaforéticos, I, 390.
 — diaforéticos ingleses, I, 391.
 — emenagogos, I, 392.
 — emenagogos de Desbois de Rochefort, I, 392.
 — escitantes, I, 393.
 — espectorantes, I, 393.
 — estimulantes y tónicos, I, 393.
 — estomacales, I, 394.
 — estomacales de Parmentier, I, 394.
 — febrífugos amargos, I, 396.
 — febrífugos de Dupuytren, I, 395.
 — febrífugos de Laennec, I, 395.
 — febrífugos de Marc, I, 395.
 — fortificantés de Alibert, I, 396.
 — fortificantes de Desbois, I, 396.
 — purgantes de los pintores, III, 259.
 — tónicos y estomacales, I, 399.
 — vermífugos de Foy, I, 400.
 — tónicos de Roucher, I, 399.
- Borato de sosa, I, 128.
 Borax, I, 128.
 Borraja, I, 128.
 Brea, I, 129.
 Brionia, I, 129.
 Bromo, I, 130.
 Bromuro de hierro, I, 130.
 — de potasio, I, 130.
 Brucina, I, 130.
 Brusco, I, 131.
 Buchu, I, 131.
 Buglosa, I, 131.
 Bujías, I, 67.
- C**
- Cacao, I, 131.
 Café, I, 131.
 — de bellotas, I, 400.
 — purgante, I, 401.
 Cainca, I, 132.
 Cal, I, 133.
 Cala aloética, III, 166.
 — anodina de los H. de M., III, 166.
 — antiespasmódica, III, 166.
 — antihelmíntica, III, 166.
 Calabaza blanca larga, I, 133.
 — comun, I, 133.
 Cala comun de la F. E., III, 168.
 — comun de los H. de

- M., III, 168.
- Cala comun de miel, de la F. E., III, 168.
- de jabon; III, 169.
- Calaguala, I, 133.
- Cala irritante de la F. E., III, 169.
- irritante de los H. de M., III, 169.
- Calamina, I, 133.
- Cálamo aromático, I, 134.
- Cala purgante, III, 170.
- Calas, I, 68.
- Caldo amargo y dulcificante, I, 401.
- anticatarral de Riviere, I, 401.
- antiepiléptico de Babeyrac, I, 402.
- astringente de Astruc, I, 502.
- de boses de ternera, I, 37.
- de cangrejos, I, 37.
- de cangrejos de Astruc, I, 403.
- de caracoles, I, 403.
- de pollo, I, 37.
- de ranas, I, 37.
- de ternera, I, 37.
- de tortuga, I, 37.
- de vaca, I, 37.
- de vaca emetizado, I, 406.
- de vaca tamarindado, I, 406.
- Caldo gomoso de Petroz, I, 404.
- purgante, I, 406.
- purgante de sulfato de sosa, I, 273.
- resolutivo, I, 407.
- Caldos, I, 37 y 401.
- de yerbas, I, 407.
- pectorales, I, 406.
- Caléndula oficial, I, 134.
- Calmanes, III, 436.
- Calomelanos, I, 246.
- Camedrios, I, 134.
- Camepitos, I, 134.
- Canela blanca, I, 135.
- de Ceylan, I, 135.
- del Malabar, I, 135.
- Candelilla emoliente, I, 409.
- Candelillas, I, 67 y 408.
- de Daran, I, 408.
- de Falck, I, 499.
- de Hunter, I, 410.
- de potasa cáustica, I, 410.
- fundentes, I, 409.
- mercuriales solubles de Hecker, I, 410.
- Cantáridas, I, 135.
- Cantaridina, I, 136.
- Cantueso, I, 137.
- Caña, I, 137.
- Cañafistula, I, 137.
- Cañamones, I, 137.
- Caout-chu, I, 138.

- Caparrosa azul, I, 138.
 — blanca, I, 273.
 — verde, I, 138.
 Cápsulas de bálsamo de
 copaiba, I, 119.
 Caracoles, I, 138.
 Carbon, I, 138.
 Carbonato de amoniaco,
 I, 139.
 — de hierro, I, 139.
 — de magnesia, I, 218.
 — de plomo, I, 139.
 — de potasa, I, 140.
 — de potasa y sosa, I,
 140.
 — de sosa, I, 140.
 Cardamomo mayor, I,
 141.
 — mediano, I, 141.
 — menor, I, 141.
 Cardo corredor, I, 141.
 — estrellado, I, 142.
 — santo, I, 142.
 Cariofilea, I, 142.
 Cáscara de naranja, I,
 229.
 Cascarilla, I, 143.
 — fina, I, 249.
 Castaño de Indias, I,
 144.
 Castoreo, I, 144.
 Cataplasma anodina de
 los H. M., I, 412.
 — anodina de miga de
 pan de la F. E., I,
 411.
 Cataplasma antiartrítica
 de Pradier, I, 412.
 — antihelmíntica, I,
 413.
 — antioftálmica, I, 414.
 — antipleurítica, I, 414.
 — antiséptica alcanfora-
 da, I, 414.
 — aromática de los H.
 de M., I, 414.
 — calmante resolutive,
 I, 415.
 — contra la iscuria, I,
 416.
 — corroborante de los
 H. de M., I, 414.
 — de ajo, I, 99.
 — de carbon, I, 415.
 — de cebolla albarrana,
 I, 147.
 — de cicuta, I, 152.
 — de clemátide, I, 155.
 — de enebro, I, 176.
 — de fécula, I, 417.
 — de lino, I, 215.
 — de manzana de la rei-
 na, I, 220.
 — de mostaza, III, 158.
 — de vinagre y corteza
 de pan de la F. E.,
 I, 423.
 — de yerbamora, I, 290.
 — discuciente de mosta-
 za de la F. E., III, 158.
 — diurética, I, 416.
 — emoliente de mal-

- vabisco de la F. E., de M., I, 422.
 I, 416. Cat. tónica, I, 423.
 Cat. fermentante, I, 418. — vomitiva, I, 424.
 — iodurada, I, 418. Catárticos, III, 440.
 — isquiática, I, 418. Catecú, I, 145.
 — mercurial, I, 419. Cáusticos, III, 450.
 — narcótica, I, 419. Canterio actual, I, 188.
 — oftálmica de los H. de — objetivo, I, 188.
 M., I, 420. Ceanota americana, I,
 — opiada, I, 420. 145.
 — resolutive de Kerndel, Cebada, I, 146.
 I, 421. Cebadilla, I, 146.
 — resolutive de los H. Cebolla albarrana, I, 146.
 de M., I, 421. Celedonia mayor, I, 147.
 — resolutive fuerte de Centaura menor, I, 147.
 los H. de M., I, 421. Centeno cornezuelo, I,
 — rubefaciente, I, 422. 148.
 — rubefaciente de As- Cerato anodino de la F.
 truc, I, 422. E., I, 424.
 Cataplasmas, I, 68 y 411. — anodino de los H. M.,
 — anodinas, I, 411. I, 429.
 — anodinas de los H. de — antiépsórico, I, 424.
 M., I, 412. — azufrado, I, 118 y 425.
 Cataplasma saturnina de — cosmético, I, 424.
 los H. M., I, 422. — de Galeno, I, 426.
 Cataplasmas emolientes — de Goulard, I, 426.
 de los H. de M., I, — de Hufeland, I, 427.
 416 y 417. — de laurel real, I, 427.
 — madurativas, I, 418 — de plomo de los H.
 y 419. M., I, 427.
 — resolutive, I, 420. — de Pott, I, 430.
 Cataplasma sinapizada, — de precipitado blan-
 III, 159. co, I, 430.
 — supurante de Boyer, — de Rechoux, I, 430.
 I, 423. — de rosa, III, 118.
 — supurante de los H. — de sabina, I, 430.

- de Saturno alcanforado, I, 431.
- desecante, I, 425.
- de sub-acetato de plomo, I, 426.
- de Turner, I, 431.
- emoliente de los H de M., I, 426.
- epispástico, I, 426.
- hidrocianico, I, 427.
- mercurial, I, 427.
- mercurial de Falck, I, 428.
- mercurial de Zeller, I, 428.
- nicocianado, I, 428.
- opiado, I, 429.
- opiado de Lagneau, I, 429.
- para las grietas de los labios, I, 429.
- Ceratos, I, 65 y 424.
- Ceroto simple, I, 431.
- Ceromel, I, 432.
- Cerveza antiescorbútica, I, 264 y 433.
 - antiescorbútica de Butler, I, 433.
 - cefálica inglesa, I, 433.
 - de quina, I, 436.
 - diurética inglesa, I, 434.
 - estomacal inglesa, I, 434.
 - purgante, I, 435.
 - purgante de Sydenham, I, 435.
- Cerveza purgante inglesa, I, 435.
- Cervezas, I, 51 y 432.
- Cetina, I, 149.
- Cetrarino, I, 149.
- Cianuro de hierro, I, 149.
 - de mercurio, I, 149.
 - de oro, I, 150.
 - de potasio, I, 150.
 - de zinc, I, 150.
- Cicuta, I, 151.
- Cidra artificial, II, 316.
- Cigarros de estramonio, I, 437.
- Cilantro, I, 152.
- Cinabrio, I, 275.
- Cinamomo, I, 74.
- Cinconina, I, 152.
- Cinisino, I, 153.
- Cinoglosa, I, 153.
- Cinorrodon, I, 153.
- Cinturon medicamento-
so, I, 121.
- Ciprés, I, 153.
- Ciruelas pasas, I, 154.
 - purgantes, I, 436.
- Citrato de hierro, I, 154.
 - de morfina, I, 154.
 - de peróxido de hierro, I, 437.
 - de quinina, I, 154.
- Clara de huevo aluminosa, I, 438.

- Clasificación de los medicamentos**, III, 423.
Claveles rojos, I, 154.
Clavo de especia, I, 154.
Clavos para sahumar, I, 439.
 — para sahumar de Ayr, I, 438.
Clemátide, I, 155.
Clorhidrato de zinc, I, 160.
Cloro, I, 155.
 — líquido, I, 156.
Cloruro de antimonio, I, 156.
 — de bário, I, 156.
 — de cal, I, 157.
 — de calcio, I, 157.
 — de cal líquido, I, 157.
 — de cobre amoniacal, I, 157.
 — de hierro amoniacal, II, 156.
 — de mercurio y morfina, I, 158.
 — de oro, I, 158.
 — de oro y sódio, I, 158.
 — de protóxido de potasio, I, 159.
 — de sódio, I, 199.
 — de sosa, I, 160.
 — de zinc, I, 160.
Cloruros de hierro, I, 159.
Cocimiento, I, 32.
Coc. amargo de camedrios de la F. E., I, 440.
 — amargo de los H. de M., I, 440.
 — amargo de los H. M., I, 440.
 — anodino de gordolobo de la F. E., I, 441.
 — antiartrítico, I, 441.
 — antiescorbútico de los H. de M., I, 442.
 — antiescrofuloso de la F. E., I, 442.
 — antiséptico de Boerhaave, I, 443.
 — antiséptico de los H. M., I, 443.
 — antiséptico de quina de la F. E., I, 443.
 — antiséptico purgante de quina de la F. E., I, 444.
 — antisifilítico nutritivo, I, 444.
 — antitísico, I, 445.
 — aperitivo de la F. E., I, 446.
 — aperitivo de los H. de M., I, 446.
 — bezoárdico completo de la F. E., I, 447.
 — bezoárdico de Curvo, de la F. E., I, 447.
 — bezoárdico de escorzonera de la F. E., I, 447.

- Cocimiento bezoárdico solutivo de escorzonera de la F. E., I, 447.
- blanco de la F. E., I, 448.
- blanco de Sydenham, de la F. E., I, 449.
- Cocimiento carminativo de matvas de la F. E., I, 449.
- carminativo de maná de la F. E., III, 221.
- carminativo emoliente de la F. E., I, 449.
- de abeto, I, 72.
- de acebo, I, 74.
- de acedera, I, 74.
- de acederilla, I, 75.
- de acibar compuesto, I, 439.
- de achicoria, I, 97.
- de adormideras, I, 95.
- de albahaca, I, 100.
- de alcaparro, I, 102.
- de arcornoque, I, 103.
- de alholva, I, 104.
- de angélica, I, 111.
- de angustura verdadera, I, 111.
- de apio, I, 112.
- de aristoloquia, I, 113.
- Cocim. de arroz, I, 114.
- de astrágalo sin tallo, I, 116.
- de avena, I, 116.
- de azufre, I, 117.
- de bardana, I, 121.
- Cocimiento de bistorta, I, 127.
- de borraja, I, 129.
- de brusco, I, 131.
- de café, I, 132.
- de cainca, I, 132.
- de calagnala, I, 133.
- de caña, I, 137.
- de cañafístula, I, 137.
- de caracoles, I, 138.
- de cardo estrellado, I, 142.
- de cardo santo, I, 144.
- de cariofilea, I, 143.
- de castaño de Indias, I, 144.
- de catecú, I, 145.
- de cebada, I, 146.
- de cebada acidulado, I, 89.
- de cebada compuesto de la F. E., I, 450.
- de cebada pectoral de la F. E., I, 450.
- de cebada perlada, I, 450.
- de celedonia, I, 117.

- Cocimiento de centeno cornezuelo, I, 148.
 -- de cicuta I, 152.
 Cocimiento de ciruelas, I, 154.
 Cocimiento de colombo, I, 163.
 -- de coloquintida, I, 450.
 -- de consuelda mayor, I, 164.
 -- de corteza de la raíz de granado, I, 196.
 -- de corteza de sáuce compuesto, I, 451.
 -- de cuerno de ciervo con miga de pan de la F. E., I, 449.
 -- de china, I, 202.
 -- de dátiles, I, 168.
 -- de diente de leon, I, 169.
 -- de dulcamara, I, 171.
 -- de dulcamara compuesto, I, 452.
 -- de encina, I, 175.
 -- de émula campana, I, 176.
 -- de émula campana compuesto, II, 158.
 -- de escabiosa, I, 177.
 -- de escila compuesto, I, 454.
 Cocimiento de escorzo-nera, I, 178.
 -- de esparraguera, I, 179.
 -- de espino cerval, I, 180.
 -- de flor de malva, I, 218.
 -- de frutos béchicos, I, 187.
 -- de fumaría, I, 189.
 -- de gatuña, I, 190.
 -- de gayuba, I, 190.
 -- de genciana, I, 191.
 -- de gengibre, I, 192.
 -- de goma kino, I, 192.
 -- de graciola, I, 194.
 -- de grama, I, 195.
 -- de grama compuesto, de la F. E., I, 446.
 -- de guayaco compuesto, I, 454.
 -- de Heister, I, 114.
 -- de helecho macho, I, 198.
 -- de hojas de naranjo, I, 229.
 -- de hollin, I, 455.
 -- de ictiocola compuesto, I, 455.
 -- de jabonera, I, 210.
 -- de lino, I, 215.
 -- de líquen, I, 215.
 -- de lobelia sífilítica, I, 266.
 -- de los leños, de la F.

- E., I, 456.
- Cocimiento de lupulina, I, 216.
- de llanten, I, 217.
- de malvabisco, I, 219.
- de manzana de la reina, I, 220.
- de mecereon compuesto, I, 456.
- de mercurio, I, 224.
- de ninfea, I, 230.
- de nitrato de plata, I, 231.
- de nuez de agalla, I, 232.
- de paciencia, I, 239.
- de palo de campeche, I, 239.
- de palo de guayaco compuesto de la F. E., I, 456.
- de pareira brava, I, 240.
- de parietaria, I, 240.
- de pasas, I, 240.
- de pelitre, I, 240.
- de perejil, I, 241.
- de piedra divina, I, 269.
- de polígala amarga, I, 244.
- de polígala virginiana, I, 245.
- de Pollini, I, 458.
- de Pringle, I, 459.
- de quina compuesto, I, 460.
- Cocimiento de quina de los H. de M., I, 460.
- de raíz de arnica, I, 113.
- de raíz de fresa, I, 187.
- de rapóntico, I, 252.
- de ratania, I, 253.
- de rosas rojas, I, 255.
- de rubia, I, 255.
- de ruibarbo de la F. E., I, 461.
- de sáuce blanco, I, 261.
- de sebesten, I, 262.
- de simaruba, I, 265.
- de tabaco, I, 277.
- de tamarindo, I, 277.
- deterativo de los H. de M., I, 451.
- de torbisco, I, 282.
- de tormentila, I, 283.
- de trebol de agua, I, 284.
- de vencelósigo, I, 287.
- de zaragatona, I, 291.
- de zarzaparrilla, I, 291.
- de zarzaparrilla compuesto, I, 463.
- de zarzaparrilla de la

- F. E., I, 462.
- Cocimiento de zumaque, I, 292.
- de zumaque venenoso, I, 292.
- diaforético, I, 452.
- diurético alcalino, I, 452.
- dulzurante de zarzaparrilla, de la F. E., I, 453.
- emoliente de los H. de M., I, 453.
- emoliente de raíz de malvabisco, de la F. E., I, 453.
- febrífugo y purgante, I, 454.
- gomoso de cuerno de ciervo de la F. E., I, 448.
- gomoso de los H. M., I, 448.
- gomoso tenue de cuerno de ciervo, de la F. E., I, 448.
- laxante de maná, de la F. E., II, 612.
- mucilaginoso de los H. M., I, 457.
- pectoral de azufre, de la F. E., I, 457.
- pectoral, de la F. E., I, 457.
- pectoral de los H. de M., I, 458.
- Cocimiento purgante de Curvo, I, 447.
- purgante de maná, de la F. E., II, 571.
- quinado de los H. M., I, 460.
- resolutivo de los H. de M., I, 461.
- Cocimientos, I, 439.
- astringentes de los H. de M., I, 446 y 447.
- emolientes de los H. M., I, 453.
- Cocimiento sudorífico de los H. M., I, 461.
- Coclearia, I, 160.
- Cochinilla, I, 161.
- Codeina, I, 161.
- Cohombriño amargo, I, 572.
- Cola de pescado, I, 162.
- Cólchico de otoño, I, 162.
- Colirio, I, 463.
- aluminoso, I, 464.
- anodino, I, 465.
- anodino de los H. M., I, 465.
- antiescrofuloso, I, 465.
- astringente de los H. M., I, 466.
- astringente resolutivo, I, 466.
- barítico, I, 466.
- blanco de Rasis de la

- F. de M., I, 467.
- Colirio boratado, I, 128 y 467.
- comun de los H. M., I, 467.
- contra la blefaritis, I, 468.
- contra la conjuntivitis de Sichel, I, 468.
- contra las manchas de la córnea, de Boerhaave, I, 469.
- contra las manchas de la córnea, de Weller, I, 469.
- contra la oftalmia gonorreica, I, 470.
- de beleño, I, 467.
- de belladona, I, 466.
- de Brun, I, 467.
- de deuto-cloruro de mercurio, I, 169.
- de estramonio, I, 467.
- de Fernandez, de la F. E., I, 470.
- de Gimbernat, I, 471.
- de Henderson, I, 472.
- de Janin, I, 472.
- de Lanfranc de los H. de M., I, 472.
- de Newman, I, 473.
- de Plenck, I, 474.
- de Scarpa, I, 476.
- de sulfato de zinc, I, 273.
- Colirio deterativo de la F. M., I, 470.
- fundente de los H. de M., I, 471.
- gomoso astringente de los H. M., I, 471.
- gomoso de los H. M., I, 471.
- iodurado, I, 472.
- mercurial, I, 473.
- oftálmico fortificante, I, 474.
- Colirios, I, 68.
- anodinos, I, 464.
- contra las conjuntivitis crónicas, de Sichel, I, 468 y 469.
- contra las manchas de la córnea, del maestro Juan, I, 469.
- seco, I, 238 y 477.
- seco amoniacoal, III, 55.
- seco de alumbre calcinado, I, 478.
- seco de Dupuytren, I, 477.
- seco de Lagneau de los H. de M., I, 477.
- seco de los H. M., I, 478.
- seco de Recamier, I, 477.
- seco de Velpeau, I, 478.

- Colirios gaseosos, I, 69.
 — líquidos, I, 68.
 — narcóticos, I, 473.
 — resolutivos, I, 474,
 475 y 476.
 — resolutivos de Recamier, I, 475.
 — secos, I, 68.
 Colirio tónico, I, 478.
 — verde de los H. de M., I, 479.
 Colombo, I, 163.
 Coloquintida, I, 163.
 Colutorio acidulado, I, 480.
 — antiescorbútico, I, 480.
 — antiséptico, I, 480.
 — antiséptico de Angelot, I, 481.
 — astringente, I, 481.
 — calmante, I, 481.
 — odontálgico, I, 482.
 — odontálgico de Schyron, I, 483.
 Colutorios, I, 69 y 480.
 — deterrentes, I, 481 y 482.
 Collar de Morand, I, 479.
 Comino, I, 164.
 Compresa clorosa con vinagre, I, 483.
 Confeccion antiepiléptica de quina de la F. E., I, 530.
 — onfeccion astringente de quina, de la F. E., I, 531.
 — astringente de rosas encarnadas de la F. E., I, 518.
 — de cáscara de naranja, I, 229.
 — de jacintos, I, 518.
 — del Japon, I, 521.
 — de quina antimonial de la F. E., I, 524.
 — de ruda, I, 484.
 Confecciones, I, 60 y 484.
 Confites, I, 484.
 — contra las flores blancas, I, 484.
 — de Keyser, I, 486.
 — del Dr. Vaume, I, 485.
 — vermífugos, I, 486.
 Conserva antiescorbútica, I, 487.
 — béchica de yedra terrestre, I, 487.
 — de acedera, I, 74.
 — de acederilla, I, 75.
 — de ajenjos, I, 487.
 — de angélica, I, 111.
 — de berros, I, 125.
 — de borraja, I, 487.
 — de cañafistula, I, 137.
 — de cinorrodon, I, 153.
 — de ciruelas con pur-

- gante, I, 488.
- Conserva de ciruelas de la F. M., I, 488.
- de coclearia, I, 160.
- de émula campana, I, 177.
- de romero, I, 487.
- de rosas rojas, I, 488.
- de tamarindo, I, 278.
- de violetas, I, 487.
- Conservas, I, 61 y 487.
- Consideraciones generales sobre el arte de formular, I, 1.
- Consuelda mayor, I, 164.
- Contrayerba, I, 164.
- Copaiba, I, 165.
- Coralina de Córcega, I, 165.
- Coral rojo, I, 165.
- Corteza de Winter, I, 165.
- Cosmético de Alibert, I, 489.
- de Siemerling, I, 489.
- Cosméticos, I, 489.
- Crema de ojos blanca, I, 490.
- pectoral de Cottereau, I, 490.
- pectoral de Huc, I, 491.
- pectoral de Jeanne de Longrois, I, 490.
- Crema pectoral de Pierquin, I, 491.
- pectoral de Tronchin, I, 491.
- Cremas, I, 490.
- Cremor de tártaro, I, 165.
- de tártaro soluble, I, 166.
- Creosota, I, 166.
- Cristales de Venus, I, 81.
- Cubebas, I, 167.
- Cuerno de ciervo, I, 167.
- Culantrillo, I, 167.
- del Canadá, I, 167.
- Cúrcuma, I, 168.

CHI

- China, I, 202.
- Chocolate á la Polenta II, 162.
- analéptico, II, 159.
- blanco, II, 160.
- con el hidriodato de hierro, II, 160.
- de liquen, II, 161.
- de liquen de Robinet, II, 161.
- de vainilla, II, 161.
- marcial, II, 162.
- purgante, II, 163.
- Chocolates, II, 159.
- Chocolate vermífugo, II, 163.

- Chorro aromático**, II, de M., I, 494.
 163. **Digestivo antiséptico**, I,
Chorros, I, 71. 494.
 — **consuntivo de los H.**
 de M., I, 494.
 — **de Plenck**, I, 495.
 — **mercurial**, I, 495.
 — **opiado**, I, 495.
Dátiles, I, 168. **Digital purpúrea**, I, 169.
Dedalera, I, 168. **Diosma afestonada**, I,
Delfina, I, 168. 170.
Dentífrico, I, 492. **Disolucion**, I, 31.
 — **antiescorbútico de la**
 F. M., I, 492. — **acuosa de bromo**, I,
Depurativos, III, 425. 130.
Detersivos, III, 423. — **alcohólica de creoso-**
Deuto-cloruro de mercurio, I, 168. **ta**, I, 166.
Deuto-ioduro de mercurio, I, 207. — **alcohólica de deuto-**
Deuto-sulfato de cobre, I, 268. **ioduro de mercurio**,
 I, 496.
Deutóxido de plomo, I, — **aluminosa**, I, 497.
 237. — **amoniacal de los H.**
Diabolines estimulantes, de M., I, 497.
 I, 492. — **anticpiléptica**, I, 497.
Diacatolicon doble, I, — **antiepsórica**, I, 497.
 521. — **antisifilitica**, II, 105.
Diaforéticos, III, 433. — **antivenérea**, I, 498.
Diascordio, I, 523. — **arábiga de los H. de**
Diente de león, I, 169. M., I, 498.
Difusibles, III, 428. — **arsenical de Prusia**,
 I, 499.
Digestion, I, 32. — **atrófica**, I, 499.
Digestivo, I, 493. — **atrófica con la tintu-**
Digestivos, I, 493. **ra de digital**, I, 500.
Digestivo animado, I, — **boratada**, I, 500.
 494. — **calmante**, I, 500.
 — **antipútrido de los H.** — **citro-muriática**, I, 501.

- Disolución contra las afecciones herpéticas del conducto auditivo, I, 502.
- contra las heridas hechas durante la disección, I, 503.
- de acetato de morfina, I, 496.
- de acetato neutro de plomo, I, 82.
- de ácido tartárico, I, 93.
- de alumbre, I, 267.
- de arseniato de amoníaco, I, 498.
- de carbonato de sosa, I, 500.
- de cloruro de mercurio, I, 150.
- de cianuro de potasio, I, 150.
- de citrato de morfina, I, 501.
- de cloruro de bário, I, 501.
- de cloruro de cal alcoholizada, I, 502.
- de goma arábiga, I, 193.
- de Heincke, I, 503.
- de hidrídargirato de potasa, I, 503.
- de hidriodato de potasa, I, 504.
- de hidriodato de potasa iodurado, I, 504.
- Disolución de hidrocloreto de cal, I, 504.
- de hidrocloreto de morfina y codeína, I, 199.
- de mostaza, I, 227.
- de nitrato ácido de mercurio, I, 230.
- de nitrato de plata, I, 507.
- de nitrato de plata de Bielt, I, 507.
- de opio, I, 235.
- de potasa cáustica, I, 245.
- de sulfato de cobre, I, 262.
- de sulfato de cobre alcanforada, I, 269.
- de sulfato de veratrina, I, 508.
- iodurada cáustica, I, 505.
- iodurada concentrada, I, 505.
- iodurada rubefaciente, I, 506.
- mercurial opiada, I, 507.
- profiláctica, I, 508.
- saturada de nitrato de plata, I, 508.
- Disoluciones, I, 496.
- ioduradas, I, 505.
- Diuréticos, III, 431.

- Diuréticos de Dehaen, I, 508 v 509.
 Doradilla, I, 171.
 Dosis de los medicamentos, I, 11.
 Drásticos, III, 440.
 Droga amarga, I, 509.
 Dulcamara, I, 171.
- E**
- Elaterina, I, 172.
 Elaterio, I, 172.
 Eléboro blanco, I, 173.
 — fétido, I, 173.
 — negro, I, 172.
 — verde, I, 173.
 Electuario antiartrítico, I, 510.
 — anticaquético, I, 511.
 — anticuartanario purgante de los H. de M., I, 511.
 — antidisentérico de Buchan, I, 512.
 — antidisentérico de Wilkenson, I, 512.
 — antiépiléptico de los H. de M., I, 530.
 — antiépiléptico de Mead, I, 514.
 — antiescrofuloso, I, 514.
 — antiespasmódico, I, 515.
 — antifebril, I, 515.
 Electuario antifebril de Boerhaave, I, 515.
 — antihelmíntico de Deslandes, I, 512.
 — antihelmíntico de Grimaud, I, 513.
 — antihelmíntico de Heister, I, 513.
 — antihelmíntico de Vogler, I, 513.
 — antihemorroidal, I, 515.
 — antiherpético de Fouquet, I, 516.
 — antiherpético de Pougens, I, 516.
 — astringente, I, 517.
 — astringente de Bally, I, 517.
 — astringente de Barthez, I, 517.
 — astringente de Fuller, de la F. E., I, 518.
 — de azafran compuesto, I, 518.
 — de azufre, I, 519.
 — balsámico, I, 519.
 — béchico, I, 520.
 — católico comun, I, 532.
 — de acibar, I, 510.
 — de agárico, I, 95.
 — de Bremser, III, 152.
 — de cainca, I, 520.
 — de cañafistula tamarindado de la F. E.,

- I, 520.
- Electuario de catecú compuesto, I, 521.
- de cubebas, I, 521.
- de escamonea y turbit compuesto, I, 522.
- de escordio opiado, de la F. E., I, 523.
- de Fuller, I, 525.
- de Kortum, I, 529.
- de magnesia, I, 529.
- de sen compuesto, de la F. E., I, 532.
- diacatolicon, I, 521.
- diafenicon, I, 522.
- estimulante, I, 523.
- estomacal, I, 524.
- febrífugo, de la F. E., I, 524.
- febrífugo de los H. de M., I, 524.
- febrífugo de Tissot, I, 525.
- febrífugo y purgante, I, 525.
- grande triacal, I, 526.
- hidragogo de Fouquier, I, 527.
- incrasante, I, 528.
- lenitivo, de la F. E., I, 520.
- opiado de beleño, de la F. E., I, 529.
- peruviano antiepiléptico de Fuller, de la F. E., I, 530.
- Electuario peruviano astringente de Fuller, de la F. E., I, 531.
- purgante, I, 531.
- Electuarios, I, 60 y 510.
- antiblenorrágicos, I, 510 y 511.
- hidragogos de Quarin, I, 527 y 528.
- Electuario simple de rosas rojas, I, 488.
- triacal, de la F. E., I, 532.
- vermífugo de Fouquier, I, 533.
- vermífugo de Spielmann, I, 533.
- Eleosácara de anís, I, 112.
- de hinojo, I, 201.
- Eleosácaros, I, 62.
- Electricidad, I, 173.
- Elíxir ácido aromático, I, 301.
- alcanforado, II, 4.
- amargo, II, 1.
- americano, II, 1.
- antiartrítico, II, 2.
- antiasmático, II, 2.
- antiblenorrágico, II, 3.
- antiescorbútico de Boerhaave, II, 3.
- antiescorbútico de Selle, II, 4.

- Elíxir antivenéreo de Lemort, II, 4.
 -- antivenéreo de VVright de la Jamaica, II, 5.
 -- balsámico, II, 6.
 -- balsámico, estomacal y atemperante, II, 5.
 -- contra las escrófulas, III, 206.
 -- de Barthez, II, 7.
 -- de drogas amargas, II, 7.
 -- de Garrus, II, 11.
 -- de larga vida, II, 11.
 -- dentífrico, II, 7.
 -- de Perytho, II, 13.
 -- de propiedad de la F. E., II, 14.
 -- de Spina, I, 363.
 -- de vitriolo aromático, II, 18.
 -- de vitriolo dulce de la F. E., II, 19.
 Elíxires, I, 49 y II, 1.
 -- estomacal de la F. E., II, 9.
 -- estomacal de Stoughton, II, 8.
 -- febrífugo de Huxham, II, 4.
 -- febrífugo de VVhitt, II, 9.
 -- febrífugo y aperitivo, II, 10.
 -- fétido, II, 10.
 -- fortificante, II, 10.
 Elíxir odontálgico de Bories, II, 12.
 -- odontálgico de Desfor- ges, II, 12.
 -- odontálgico de Leroy de Faudignere, II, 12.
 -- paregórico inglés, II, 13.
 -- purgante, II, 14.
 -- resolutivo, II, 15.
 -- sagrado, II, 15.
 -- sudorífico, II, 16.
 -- tónico, II, 16.
 -- uterino, II, 17.
 -- vermífugo, II, 17.
 -- visceral, II, 18.
 Embrocacion amoniacal, II, 19.
 -- de aconitina, II, 19.
 Embrocaciones, I, 71.
 -- oftálmicas, II, 20.
 -- mercurial, II, 19.
 Emenagogos, III, 434.
 Emético, I, 173.
 Eméticos, III, 439.
 Emetina, I, 174.
 -- de color, I, 175.
 Emolientes, III, 446.
 Emplastro adhesivo, II, 21.
 -- aglutinante de Andrés de la Cruz, de la F. E., II, 21.
 -- aglutinante de los H. de M., II, 22.
 -- aglutinante de resinas de la F. E., II, 21.

- Emplasto aglutinante de Woodstock**, II, 22.
 — aglutinante inglés, II, 22.
 — amoniaco-mercurial, II, 23.
 — anodino calmante, II, 24.
 — antihistérico, II, 24.
 — antiodontálgico, II, 24.
 — antivenéreo, II, 25.
 — ceróneo, II, 28.
 — confortativo, II, 31.
 — contra el coqueluche, II, 31.
 — contra los tumores enquistados, II, 32.
 — contrarotura, II, 30.
 — contrarotura de la F. E., II, 44.
 — de albayalde, II, 23.
 — de Bayton, II, 25.
 — de beleño, II, 26.
 — de belladona, II, 26.
 — de Canet, II, 26.
 — de cantáridas, II, 27.
 — de cantáridas de la F. E., II, 26.
 — de caoutchu, II, 27.
 — de cera, II, 28.
 — de cicuta, II, 28.
 — de cicuta de los H. M., II, 29.
 — de cola para las her-
 nias, de la F. E., II, 30.
 — de digital, II, 33.
 — de estoraque estomático de la F. M., II, 35.
 — de estramonio, II, 26.
 — de euforbio, II, 36.
 — de Fouquet, II, 36.
 — de gálbano crocado de la F. E., II, 38.
 — de gálbano simple de la F. E., II, 38.
 — de goma amoniaco, II, 39.
 — de goma amoniaco compuesto, II, 39.
 — del Abate Doyen, II, 21.
 — de los cuatro fundentes, II, 48.
 — de meliloto compuesto de la F. E., II, 40.
 — de meliloto simple de la F. E., II, 40.
 — de minio, II, 42.
 — de Nuremberg, II, 42.
 — de pelitre, II, 42.
 — de pez, II, 43.
 — de pez de Borgoña, II, 44.
 — de pez negra régio de la F. E., II, 44.
 — de Pissier, II, 47.
 — de ranas con mercurio

- riode la F. E., II, 45.
- Emplasto de ranas con mercurio de los H. M., II, 46.
- de ranas de la F. E., II, 45.
- de resina, II, 21.
- de sebo anodino de la F. E., II, 48.
- de tabaco, II, 26.
- de tacamaca de la F. de P., II, 49.
- de tacamaca de la F. M., II, 48.
- de Vigo con mercurio, II, 41.
- de yerba mora, II, 26.
- diapalma, II, 32.
- diaquilon gomado, II, 32.
- diaquilon gomado de los H. M., II, 33.
- emetizado, II, 34.
- epispástico de la F. E., II, 26.
- de esperma de ballena de la F. E., II, 34.
- estíptico, II, 34.
- fundente de Cottereau y Verde-Delisle, II, 36 y 37.
- fundente de Lamotte, II, 37.
- fundente y sedante, II, 37.
- mercurial, II, 41.
- Emplasto para los clavos de los pies, de la F. de P., II, 29.
- perpétuo, II, 43.
- Emplastos, I, 66 y II, 21.
- Emplasto simple, II, 46.
- simple de los H. M., II, 47.
- resolutivo, II, 48.
- tartarizado, II, 49.
- tartarizado alcanforado, II, 49.
- vejigatorio, II, 50.
- vejigatorio de la F. E., II, 26.
- vejigatorio de Mejean, II, 51.
- vejigatorio inglés, II, 50.
- vermífugo, II, 51.
- Emulsion aceitosa, II, 52.
- alcanforada, II, 52.
- alcanforada de los H. de M., II, 53.
- alcanforada de los H. M., II, 53.
- alcanforada y nitrada, II, 53.
- anodina de los H. de M., II, 53.
- antiasmática, II, 53.
- antigonorreica, II, 54.
- arábica, II, 58.

- Emulsion arábica de los H. de M.**, II, 58.
 — arábica de los H. M., II, 58.
 — astringente de Cadet, II, 54.
 — balsámica, II, 54.
 — calmante, II, 55.
 — calmante de Fages, II, 55.
 — comun de la F. E., II, 55.
 — comun de los H. de M., II, 56.
 — comun de los H. M., II, 56.
 — con maná de la F. E., II, 62.
 — de abelmosco, I, 72.
 — de alfónsigo, I, 38 y 104.
 — de almendras amargas, I, 106.
 — de Brunero de la F. E., II, 55.
 — de cañamones, I, 38 y 138.
 — de copaiba, II, 56.
 — de cubebas, II, 58.
 — de goma arábica de la F. E., II, 58.
 — de piñones, I, 38.
 — de Quarin, II, 62.
 — de resina de guayaco, II, 63.
Emulsiones de semillas frias, I, 38.
Emulsiones de trementina, II, 63.
 — de Willis, II, 64.
 — diurética de Swediaur, II, 56.
 — emenagoga de Franck, II, 57.
Emulsiones, I, 37, II, 52.
Emulsion febrífuga de Mylius, II, 57.
 — febrífuga de Niemann, II, 57.
 — mercurial, II, 59.
 — nitrada compuesta, II, 59.
 — purgante, II, 60.
 — purgante con aceite de tártago, II, 61.
 — purgante con escamonea, II, 61.
 — purgante con resina de jalapa, II, 61.
 — purgante de Alibert, II, 60.
 — purgante de Foy, II, 62.
 — purgante de la F. E., II, 62.
 — sedante, II, 63.
 — simple, I, 38.
Encina, I, 175.
Enebro, I, 175.
Eneldo, I, 176.

- Enema de abrotano**, I, 73. II, 69.
Enjuagatorio de ruda, II, 65.
 — odontálgico, II, 64.
 — odontálgico reumático, II, 65.
Enula campana, I, 176.
Envenenamientos, III, 388.
Epilatorios, II, 65.
Epilatorio de Plenck, II, 65.
Epispásticos, III, 419.
Epitema antigotoso, II, 68.
 — de Ranque, III, 262.
 — de triaca, II, 69.
 — lumbar, III, 262.
 — rubefaciente, II, 68.
Epitemas, II, 68.
Epitema vermífugo, II, 69.
Escabiosa, I, 177.
Escamonea de Alepo, I, 177.
 — de Smirna, I, 178.
Escila, I, 178.
Escitantes generales, III, 428.
Escordio, I, 178.
Escorzonera, I, 178.
Escudo antihemorroidal, II, 67.
Escudos, I, 67.
Esencia alexifarmacæ,
- antihistérica, III, 200.
 — antihistérica de la F. E., III, 190.
 — antihistérica de Lermert, II, 70.
 — balsámica, II, 70.
 — carminativa, II, 71.
 — cefálica, III, 195.
 — concentrada de cubebas, I, 335.
 — concentrada de zarzaparrilla, II, 71.
 — de jabon, II, 73.
 — de trementina, I, 178.
 — de Ward, II, 73.
 — dulce, II, 72.
 — escilitica, II, 72.
Esencias, II, 69.
Esparadrappo aglutinante, II, 73.
 — astringente, II, 74.
 — comun, II, 76.
 — de cera, II, 74.
 — de cola de pescado, II, 75.
 — de diapalma, II, 77.
 — de Vigo, II, 77.
 — de Vigo con mercurio opiado, II, 78.
Esparadrapos, I, 67, y II, 73.
Esparraguera, I, 179.

- Especies, I, 63 y II, 78.
- amargas, II, 78.
 - aromáticas, II, 78.
 - astringentes, II, 79.
 - béchicas, numerosas primero y segundo, II, 79.
 - carminativas de la F. M., II, 80.
 - de salud, II, 83.
 - diuréticas, II, 80.
 - emolientes, II, 80.
 - emolientes de la F. M., II, 81.
 - emolientes de Stahl, II, 81.
 - fumigatorias olorosas, II, 82.
 - para lavativas, de Bremser, III, 152.
 - para té, II, 84.
 - para tisanas, II, 82.
 - pectorales de san German, II, 83.
 - pectorales de Wirtemberg, II, 83.
 - sudoríficas para cocimiento, II, 84.
 - sudoríficas para infusion, II, 84.
 - sudoríficas para infusion, de Smith, II, 85.
 - vermífugas, II, 85.
 - viscerales, II, 85.
 - vulnerarias, II, 78.
- Específico anodino, II, 86.
- astringente, III, 43.
- Esperma de ballena, I, 179.
- Espiro cervical, I, 179.
- Espíritu de amoniaco, II, 87.
- de amoniaco aromático, II, 87.
 - de anís compuesto, II, 88.
 - de canela, I, 45.
 - de coclearia, I, 337.
 - de enebro compuesto, II, 88.
 - de espliego compuesto, II, 89.
 - de éter, II, 89.
 - de éter sulfúrico compuesto, II, 90.
 - de hollín, II, 90.
 - de nitro dulce de la F. E., II, 90.
 - de nuez moscada, I, 232.
 - de rábano compuesto, II, 91.
 - de romero, I, 44.
 - de sal dulce de la F. E., II, 91.
 - de vino, I, 102.
 - etéreo aromático, II, 89.
 - odontálgico, II, 91.
- Espíritus, II, 87.

- Espíritu volátil de succino, I, 267.
 Espliego, I, 180.
 Esponja calcinada, I, 180.
 — preparada, II, 92.
 — preparada con cera, II, 92.
 Estaño, I, 181.
 Estimulantes, III, 428.
 Estípticos, III, 423.
 Estoraque líquido, I, 181.
 — sólido, I, 181.
 Estornutatorio de pelitre, I, 241.
 Estramonio, I, 181.
 Estricnina, I, 182.
 Eter acético, I, 183.
 — acético cantaridado, II, 101.
 — acético marcial, II, 101, y III, 204.
 — balsámico de Tolú, II, 102.
 Eteres, I, 101.
 Eter fosforado, II, 102.
 — hidrocórico, I, 183.
 — hidrocórico alcoholizado, II, 103.
 — mercurial, II, 103.
 — nítrico, I, 183.
 — nítrico alcoholizado, II, 104.
 — nítrico terebintinado, II, 104.
 Eter sulfúrico, I, 183.
 — sulfúrico con el deutoioduro de mercurio, II, 105.
 — sulfúrico fosforado, II, 106.
 — sulfúrico iodurado, II, 105.
 — sulfúrico marcial, II, 106.
 — zincado, II, 107.
 Eterolado de acetato de hierro, III, 203.
 — de percloruro de hierro, III, 204.
 Eterolados, I, 45 y II, 107.
 Etiope antimonial, II, 107.
 — marcial, I, 184.
 — mineral, I, 184.
 — vegetal, II, 108.
 Euforbio, II, 184.
 Extracto acuoso de acibar, I, 84.
 — acuoso de acónito, I, 93.
 — acuoso de beleño, I, 122.
 — acuoso de belladona, I, 123.
 — acuoso de cicuta, I, 151.
 — acuoso de estramonio, I, 182.
 — acuoso de quina, I,

- 250 y 251.
- Extracto alcohólico de acónito, I, 94.
- alcohólico de agárico, I, 95.
- alcohólico de azafran, I, 56 y 117.
- alcohólico de cabezas de adormideras, I, 55 y 95.
- alcohólico de beleño, I, 122.
- alcohólico de belladona, I, 124.
- alcohólico de cainca, I, 55 y 132; II, 93.
- alcohólico de cantáridas, I, 55 y 136.
- alcohólico de cebolla albarrana, I, 55 y 147.
- alcohólico de cicuta, I, 54 y 151.
- alcohólico de corteza de quina, I, 55, 250 y 251.
- alcohólico de corteza de raíz de boj, I, 55.
- alcohólico de corteza de raíz de granado, I, 55.
- alcohólico de coluquintida, I, 56 y 164.
- alcohólico de estramonio, I, 55 y 182.
- alcohólico de hojas de acónito, I, 55 y 94.
- Extracto alcohólico de hojas de anémoma, I, 55.
- alcohólico de hojas de beleño, I, 55 y 122.
- alcohólico de hojas de belladona, I, 55 y 124.
- alcohólico de hojas de digital, I, 55 y 170.
- alcohólico de hojas de estramonio, I, 55.
- alcohólico de hojas de ruda, I, 55 y 255.
- alcohólico de hojas de sabina, I, 55 y 257.
- alcohólico de flores de arnica, I, 55.
- alcohólico de flores de lúpulo, I, 55.
- alcohólico de flores de narciso de los prados, I, 55.
- alcohólico de mirra, I, 56 y 226.
- alcohólico de nuez vómica, I, 56 y 233.
- alcohólico de raíz de cainca, I, 55.
- alcohólico de raíz de colchico, I, 55.
- alcohólico de raíz de colombo, I, 55 y 163.
- alcohólico de raíz de eleboro negro, I, 55 y 173.

- Extracto alcohólico de raíz de ipecacuana, I, 55 y 210.
- alcohólico de raíz de jalapa, I, 55 y 210.
- alcohólico de raíz de polígala, I, 55.
- alcohólico de raíz de valeriana, I, 55 y 286.
- alcohólico de raíz de zarzaparrilla, I, 55 y 291.
- con la fécula verde de acónito, I, 53 y 93.
- con la fécula verde de anémoma, I, 53.
- con la fécula verde de beleño, I, 53 y 122.
- con la fécula verde de belladona, I, 53 y 123.
- con la fécula verde de cicuta, I, 52 y 151.
- con la fécula verde de estramonio, I, 53 y 182.
- con la fécula verde de lechuga virosa, I, 53.
- con la fécula verde de zumaque venenoso, I, 53.
- con las hojas de borraja, I, 54 y 129.
- Extracto con las hojas de digital, I, 54 y 170.
- con las hojas de sen, I, 54 y 263.
- con las hojas de trinitaria silvestre, I, 54.
- con las semillas de beleño, I, 122.
- de abedul, I, 72.
- de acederilla, I, 75.
- de acibar de Poerner, II, 93.
- de achicoria, I, 52 y 97.
- de adormideras, I, 95.
- de ajeno, I, 98.
- de algarroba, I, 104.
- de aristoloquia, I, 112.
- de artemisa, I, 115.
- de azafran, I, 117.
- de bardana, I, 121 y 54.
- de bayas de belladona, I, 52.
- de bayas de saúco, I, 52 y 262.
- de berros, I, 125.
- de bistorta, I, 128.
- de borraja, I, 129.
- de caínca, I, 132.
- de camedrios, I, 134.
- de cantáridas, I, 136.
- de cañafístula, I, 137.

- Extracto de cardo estre- llado, I, 142.
 — de cardo santo, I, 142.
 — de cebolla albarrana, I, 147.
 — de centaurea menor, I, 148.
 — de cicuta, I, 52.
 — de cicuta preparado sin fécula, I, 151.
 — de cinoglosa, I, 153.
 — de coclearia, I, 52 y 161.
 — de cohombro silvestre, I, 52.
 — de colchico, I, 162.
 — de colombo, I, 163.
 — de coloquintida, I, 164.
 — de coloquintida compuesto, II, 94.
 — de corteza de saúco, I, 54.
 — de corteza verde de nuez, I, 52.
 — de china, I, 202.
 — de diente de leon, I, 52 y 169.
 — de digital purpúrea, I, 170.
 — de dulcamara, I, 54 y 172.
 — de elaterio, I, 172.
 — de eléboro de Bacher, I, 173.
 Extracto de eléboro negro, I, 173.
 — de enebro, I, 176.
 — de enebro compuesto, II, 95.
 — de énula campana, I, 177.
 — de escabiosa, I, 177.
 — de espino cerval, I, 52 y 180.
 — de estramonio, I, 52 y 182.
 — de fumarica, I, 52 y 189.
 — de genciana, I, 191.
 — de grosella, I, 52.
 — de guayaco, I, 196.
 — de ipecacuana, I, 210.
 — de jabonera, I, 210.
 — de jalapa, I, 211.
 — de las flores de centaurea menor, I, 54.
 — de las flores de manzanilla, I, 54 y 221.
 — de las hojas de agenos, I, 54.
 — de las hojas de artemisa, I, 54.
 — de las hojas de came- drios, I, 54.
 — de las hojas de cardo santo, I, 54.
 — de las hojas secas de acónito, I, 54 y 94.
 — de las hojas secas de anémoma, I, 54.

- Extracto de las hojas secas de beleño, I, 54 y 122.
 — de las hojas secas de belladona, I, 54 y 124.
 — de las hojas secas de cicuta, I, 54.
 — de las hojas secas de estramonio, I, 54.
 — de las semillas de estramonio, I, 182.
 — de lechuga, I, 213.
 — de líquen, II, 96.
 — del jugo clarificado de belladona, I, 123.
 — de lupulina, I, 216.
 — de lúpulo, I, 217.
 — de manzanilla, I, 221.
 — de marrubio blanco, I, 222.
 — de marte, II, 96.
 — de mirra, I, 226.
 — de monesia, I, 226.
 — de nuez vómica, I, 233.
 — de opio, I, 235.
 — de opio acuoso privado de narcotina, I, 235, II, 98.
 — de opio por fermentacion, II, 98.
 — de ortiga, I, 52.
 — de paciencia, I, 239.
 — de perifollo, I, 242.
 Extracto de poligala amarga, I, 244.
 — de poligala virginiana, I, 245.
 — de pulsatila, I, 248.
 — de quasía amarga, I, 248.
 — de raíz de bardana, I, 54.
 — de raíz de bistorta, I, 54.
 — de raíz de énula campana, I, 54 y 177.
 — de ratania, I, 253.
 — de raíz de genciana, I, 54 y 191.
 — de raíz de grama, I, 54.
 — de raíz de paciencia, I, 54 y 239.
 — de raíz de pareira, I, 54.
 — de raíz de peregil, I, 54.
 — de raíz de quasía amarga, I, 54 y 248.
 — de raíz de ratania, I, 54 y 253.
 — de raíz de saponaria, I, 54.
 — de regaliz, I, 53 y 253.
 — de ruda, I, 255.
 — de ruibarbo, I, 256.
 — de ruibarbo compuesto, II, 99.

- Ext. de sabiná , I , 257. Extracto vinoso de opio.
 -- de sáuce blanco, I, 261. I, 235.
 -- de semillas de estra-
 monio , II , 100.
 -- de sen , I , 263.
 -- de tallos de dulcama-
 ra , I , 54.
 -- de trebol de agua , I ,
 52 y 284.
 -- de uva , I , 52.
 -- de valeriana , I , 286.
 -- de zarzaparrilla , I ,
 201.
 -- de yerbamora , I , 290.
 -- de zumaque , I , 292.
 -- de zumaque venenoso,
 I , 292.
 -- de zumaque venenoso
 antimoniado , II , 99.
 -- de zumo de beleño , I ,
 52.
 -- de zumo de bellado-
 na , I , 52 y 123.
 -- hidro-alcohólico de
 zarzaparrilla , II , 95.
 -- oenolizado de zarza-
 parrilla , II , 96.
 -- oleo-resinoso de cu-
 bebas , II , 97.
 -- panquinagogo y ca-
 tártico , II , 99.
 Extractos , I , 51 ; II , 93.
 Extracto seco , I , 250.
 -- seco de quina , III ,
 157.
 -- sudorífico , II , 100.

E

- Febrífugo de Brousson-
 net , I , 511.
 Fécula amilácea , I , 107.
 Fenogreco , I , 104.
 Filonio romano , I , 529.
 Flores cordiales cálidas
 de la F. M. , I , 185.
 -- cordiales de la F. M.,
 I , 185.
 -- de azufre , I , 185.
 -- de naranjo , I , 229.
 -- de saúco , I , 262.
 -- de zinc , I , 185.
 Floritzino , I , 185.
 Fomento alcanforado , II ,
 109.
 -- amoniacal alcanfora-
 do , II , 109.
 -- anodino de la F. E.,
 I , 441.
 -- antiséptico , II , 109.
 -- antiséptico de Schmu-
 ker , II , 110.
 -- aromático , II , 110.
 -- aromático de los H.
 de M. , II , 110.
 -- astringente , II , 111.
 Fomentos astringentes de
 los H. de M. , II , 111.
 Fom. calmante , II , 112.
 -- cloroso , II , 112.

- Fom. de Heister**, II, 114.
 — de Justamond, II, 115.
 — de nuez de agalla, I, 232.
 — de Richard, II, 118.
 — de sulfato de hierro, I, 271.
 — de sulfato de zinc, I, 274.
 — de vino aromático con opio, II, 119.
 — de vino aromático con tanino, II, 119.
 — diurético, II, 112 y 113.
 — emoliente, II, 113.
 — en la erisipela, II, 113.
 — fortificante, II, 114.
 — jabonoso, II, 115.
 — narcótico, II, 115.
 — opiado, II, 115.
 — para la gangrena, de los H. de M., II, 114.
 — refrigerante inglés, II, 116.
 — resolutivo, II, 262.
 — resolutivo de Richter, II, 117.
 — resolutivo de Swediaur, II, 118.
 — resolutivo fuerte de los H. de M., II, 117.
 — resolutivo suave de los H. de M., II, 117.
- Fomentos**, I, 71, y II, 109.
 — de beleño, II, 186.
 — de belladona, II, 186.
 — de estramonio, II, 186.
 — de yerbamora, II, 186.
 — emolientes de los H. de M., II, 113.
 — resolutivos, II, 116.
- Fomento sinapizado de Fouquier**, II, 118.
 — vinoso de bayas de enebro, II, 119.
 — vinoso de rosas, II, 119.
 — vinoso de salvia, II, 119.
- Formas farmacéuticas**, I, 29.
- Formulario**, I, 293.
- Fosfato de sosa**, I, 185.
- Fósforo**, I, 185.
- Frambuesa**, I, 186.
- Fresa**, I, 186.
- Fricciones con el carbonato de sosa**, I, 141.
 — de bicarbonato de sosa, I, 126.
 — de cloruro de oro, I, 158.
 — de cloruro de oro y sódio, I, 159.
 — de éter acético, I, 183.

Frio, I, 187.
Frontal anodino de la
 F. M., II, 120.
 — astringente, II, 120.
 — hinóptico, II, 120.
Frotos béchicos, I, 187.
 — carminativos, I, 187.
 — de saúco, I, 262.
 — pectorales, I, 187.
Fuego, II, 188.
Fumaria, I, 189.
Fumigacion antiloimica,
 II, 121.
 — aromática, II, 122.
 — clorurada de los H.
 M., II, 125.
 — de belladona, II, 122.
Fumigaciones de brea,
 II, 123.
Fumigacion de Carmi-
 chael Smith, II, 123.
 — de cloro, II, 123.
 — estimulante, II, 124.
 — Guitioniana de los H.
 M., II, 124.
 — mercurial, II, 125.
 — resinosa, II, 125.
Fumigaciones, I, 70, y
 II, 121.
 — de ácido nítrico, I,
 86.
 — de enebro, II, 124.
 — de estramonio, II,
 125.
Fundente de Lassone, I,
 377.

G

Galbanismo, I, 174.
Galbano, I, 190.
Gargarismo aceitoso, II,
 126.
 — alcanforado, II, 127.
 — aluminoso, II, 128.
 — aluminoso de Ricord,
 II, 128.
 — amoniacal, II, 129.
 — antiescorbútico de
 Grammaire, II, 130.
 — antiescorbútico de los
 H. M., II, 129.
 — antiescorbútico de Ri-
 cord, II, 130.
 — antiflogístico, II, 130.
 — antiséptico, II, 131.
 — antiséptico de los H.
 M., II, 131.
 — antisifilítico, II, 131.
 — antisifilítico, II, 132.
 — antisifilítico de los
 H. M., II, 131.
 — antipútrido de los H.
 de M., II, 131.
 — astringente de Colom-
 bat, II, 133.
 — astringente de Jan-
 nard, II, 134.
 — atemperante de los
 H. de M., II, 134.
 — atemperante de los
 H. M., II, 134.

- Gar. boratado**, I, 128.
 — boratado de los H. M., II, 135.
 — boratado de Swe-
 diaur, II, 135.
 — calmante, II, 136.
 — clórico, II, 136.
 — con el ácido hidro-
 clórico de los H. M.,
 II, 137.
 — con el sublimado, II,
 137.
 — con miel rosada, II,
 137.
 — contra el tialismo, II,
 137.
 — de ácido bórico, II,
 126.
 — de ácido cáncico, I,
 87.
 — de ácido clorhídrico,
 I, 89, y II, 126.
 — de ácido sulfúrico, I,
 92.
 — de cianuro de mer-
 curio, II, 136.
 — de deuto-cloruro de
 mercurio, I, 169.
 — de escila, II, 139.
 — de nuez de agalla, II,
 143.
 — de pelitre, I, 241.
 — de pimienta negra, I,
 243.
 — de Quarin, II, 144.
 — de quina, II, 144.
- Gar. desinfectante**, II,
 138.
 — detergente de los H.
 de M., II, 138.
 — dulcificante, II, 139.
 — emoliente de los H.
 M., II, 139.
 — estimulante, II, 141.
 — fundente de los H. M.,
 II, 141.
 — hidrocórico, II, 141.
 — iodado, II, 142.
 — mercurial, II, 142.
 — mercurial de Plenck,
 II, 142.
 — odontálgico, II, 143.
 — para las úlceras gan-
 grenosas de los H. de
 M., II, 144.
 — resolutivo de los H.
 de M., II, 145.
- Gargarismos**, I, 69, y II,
 126.
 — acidulos, II, 127.
 — antiescorbúticos, II,
 129.
 — astringentes, II, 132
 y 133.
 — boratados, II, 135.
 — detergentes, II, 138
 y 139.
 — escitantes, II, 140.
 — estimulantes, II, 140
 y 141.
- Gargarismo sedante**, II,
 145.

- Gar. terebintinado**, II, 145.
 -- tónico y astringente, II, 146.
 -- verde, II, 146.
Gatuña, I, 190.
Gayuba, I, 190.
Gelatina de quina, II, 146.
Gelatinas, II, 146.
Genciana, I, 190.
Gencianino, I, 191.
Gengibre, I, 192.
Goma amoniaco, I, 192.
 -- arábica, I, 193.
 -- elástica, I, 138.
 -- kino, I, 193.
 -- roja astringente gambiense, I, 193.
 -- tragacanto, I, 194.
Gordolobo, I, 194.
Gotas, II, 147.
 -- alcalinas, II, 147.
 -- amargas, II, 147.
 -- antiespasmódicas, II, 148.
 -- antihistéricas, II, 148.
 -- antivenéreas, II, 148.
 -- calmantes, II, 149.
 -- calmantes alemanas, II, 148.
 -- calmantes de Fothergill, II, 149.
 -- calmantes de Magendie, II, 149.
 -- cefálicas inglesas, II, 150.
Gotas de aconitina, II, 147.
 -- de los cuácaros, II, 150.
 -- negras, II, 150.
 -- resolutivas, II, 151.
Graciola, I, 194.
Gramma, I, 194.
 -- iodurada, II, 151.
Granado, I, 195.
Granos de catecú, II, 151.
 -- de salud, II, 552.
 -- de salud de Bally y Cadet, II, 152.
 -- de vida, II, 152.
Grosellas, I, 196.
Guayaco, I, 196.
Guisantes de cauterio, II, 153.
 -- supurativos, II, 153.
Gutagamba, I, 197.

III

- Haba de san Ignacio**, I, 198.
Harina de cebada, I, 146.
Harinas emolientes, I, 198.
 -- resolutivas, I, 198.
Helecho macho, I, 198.
Hidrato de peróxido de hierro, II, 154.
Hidriodato de hierro, I, 205.

- Hidriodato de potasa, I, 208.
- Hidrocianato de potasa medicinal, I, 150.
- Hidrociorato de amoniaco, I, 257.
- de amoniaco cobreoso, II, 156.
- de amoniaco y hierro, II, 156.
- de cobre y de amoniaco, I, 193.
- de codeina, I, 199.
- de mercurio ferrurado, II, 156.
- de morfina y codeina, I, 199.
- de quinina, I, 200.
- de sosa, I, 199.
- Hidro-ferrocianato de quinina, I, 200.
- Hidrogala, II, 156.
- Hidrógeno sulfurado, I, 91.
- Hidrolado de extracto de zarzaparrilla, II, 157.
- Hidromel, I, 225.
- antiasmático, II, 157.
- anticatarral, II, 157.
- espectorante, II, 158.
- fermentado y opiado, II, 158.
- vinoso, I, 225.
- Hielo artificial de Courdemanche, II, 159.
- Hiera picra, I, 510.
- Hierro, I, 200.
- enrojecido, I, 188.
- reducido por el hidrógeno (preparacion del) II, 443.
- Hígado de azufre, I, 273.
- Higos, I, 200.
- Hinojo, I, 201.
- Hipericon, I, 201.
- Hisopo, I, 201.
- Hojas de naranjo, I, 228.
- Hollin, I, 202.
- Hombrecillo, I, 216.

H

- Ictiocola, I, 162.
- Ilicina, I, 202.
- Iman, I, 203.
- Imperatoria, I, 203.
- Incienso, I, 203.
- Infusion, I, 32.
- acuosa de opio, II, 164.
- béchica, II, 165.
- catártica, II, 165.
- compuesta de genciana, II, 168.
- concentrada de abrotano, I, 73.
- de abedul, I, 72.
- de adelfa, I, 94.
- de agrimonia, I, 96.
- de ajeno, I, 98.

- Infusion de ajeno marino**, I, 98.
 — de ajeno nitrada, II, 164.
 — de albérchigo, I, 100.
 — de alcaparro, I, 102.
 — de alcaravea, I, 102.
 — de alquimila, I, 108.
 — de angostura verdadera, I, 111.
 — de anís, I, 112.
 — de apio, I, 112.
 — de arnica de los H. de M., II, 165.
 — de artemisa, I, 115.
 — de azafran, I, 117.
 — de badiana, I, 129.
 — de becabunga, I, 121.
 — de belladona, I, 123.
 — de bellotas, I, 124.
 — de berros, I, 125.
 — de borrajas, I, 128.
 — de buglosa, I, 131.
 — de cálamo aromático, I, 134.
 — de cálamo aromático con el cloro, II, 166.
 — de caléndula, I, 134.
 — de camedrios, I, 134.
 — de canela, I, 135.
 — de cardo corredor, I, 142.
 — de cardo estrellado, I, 142.
 — de cardo santo, I, 142.
- Infusion de cáscara de granada**, I, 195.
 — de cáscara de naranja, I, 229.
 — cascarilla, I, 143.
 — de catecú, I, 145.
 — de catecú compuesto, II, 166.
 — de ceanota americana, I, 146.
 — de centaurea menor, I, 148.
 — de centeno cornezuelo, I, 148; II, 167.
 — de cilantro, I, 152.
 — de ciprés, I, 153.
 — de claveles, I, 154.
 — de coclearia, I, 160.
 — de colombo, I, 163.
 — de colombo compuesta, II, 167.
 — de comino, I, 164.
 — de contrayerba, I, 165.
 — de coralina, I, 165.
 — de corteza de Winter, I, 165.
 — de culantrillo, I, 167.
 — de digital purpúrea, I, 170.
 — de diosma afestonada, I, 171.
 — de doradilla, I, 171.
 — de dalcámara, I, 171.
 — de eléboro negro, I, 173.
 — de eléboro negro de

- Hoffman, II, 168.
- Infusion de enebro, I, 176.
- de eneldo, I, 176.
- de éñula campana, I, 176.
- de escordio, I, 178.
- de espliego, I, 180.
- de flores de granado, I, 195.
- de flores de gordolobo, I, 194.
- de flor de malva, I, 218.
- de flores de naranjo, I, 229.
- de flores de saúco, I, 262.
- de frutos carminativos, I, 187.
- de fumaría, I, 189.
- de gayuba, I, 190.
- de hinojo, I, 201.
- de hisopo, I, 202.
- de hojas de naranjo, I, 229.
- de hollin compuesto, II, 169.
- de imperatoria, I, 203.
- de juncia, I, 211.
- de laurel real, II, 169.
- de lino, I, 215.
- de lino cantaridada, II, 170.
- Infusion de lúpulo, I, 217.
- de madreSelva, I, 217.
- de malvabisco, I, 219.
- de manzanilla, I, 221.
- de marrubio blanco, I, 222.
- de matricaria, I, 222.
- de mejorana, I, 222.
- de meliloto, I, 223.
- de melocoton, I, 223.
- de musgo de Córcega, I, 228.
- de nuez, I, 233.
- de nuez de agalla, I, 232.
- de orégano, I, 236.
- de pelitre, I, 240.
- de peregil, I, 241.
- de polígala virginiana, I, 245.
- de pulsatila, I, 248.
- de rábano rusticano, I, 252.
- de ratania, I, 253.
- de regaliz, I, 253.
- de romero, I, 254.
- de rosas rojas, I, 255; II, 171.
- de rubia, I, 255.
- de ruda, I, 255.
- de ruibarbo de los II. M., II, 172.
- de sabina, I, 257.
- de salvia, I, 260.

- Infusion de santónico,** I, 260.
 — de sen , I, 263.
 — de serpentaria virgiana , I, 264.
 — de simaruba , I, 265.
 — de Stearns , II, 172.
 — de tabaco , I, 277.
 — de tamarindo , I, 277.
 — de tanaceto , I, 278.
 — de té , I, 281.
 — de tomillo , I, 282.
 — de toronjil , I, 283.
 — de trebol de agua , I, 284.
 — de tusilago , I, 285.
 — de vainilla , I, 286.
 — de valeriana compuesta , II, 173.
 — de valeriana de los H. de M. , II, 173.
 — de verónica , I, 288.
 — de violeta , I, 289.
 — de yerbabuena de sabor de pimienta , I, 289.
 — de yedra terrestre , I, 289.
Infusiones, II, 164.
Infusion fria de quina, II, 168.
 — lijera de abrotano , I, 73.
 — nervina de los H. de M. , II, 170.
 — purgante , II, 170.
- Infusion teiforme de amapola ,** I, 108.
 — teiforme de hipericon , I, 201.
 — tónica , II, 172.
 — tónica de ipecacuana , II, 173.
 — vinosa de acebo , I, 74.
Inyeccion acústica, II, 175.
 — alcanforada de muriato de mercurio de la F. E. , I, 470.
 — aluminosa para la uretra , II, 175.
 — aluminosa para la vagina , II, 176.
 — aluminosa y fuliginosa , II, 175.
 — anodina de la F. E. , II, 176.
 — anodina de los H. de M. , II, 177.
 — anodina de los H. M. , II, 177.
 — antipútrida de los H. M. , II, 177.
 — antipútrida de quina de la F. E. , II, 177.
 — astringente , II, 177.
 — astringente contra la gonorrea crónica , II, 179.
 — astringente de la F. E. , II, 178.

- Inyeccion astringente de los H. M., II, 177.
 — astringente de Swediaur, II, 179.
 — balsámica, II, 179.
 — calmante y astringente de Gall, II, 180.
 — clorurada, II, 181.
 — contra la ocena, II, 181.
 — de acetato de plomo con mirra, II, 174.
 — de acetato de plomo para la uretra, II, 174.
 — de acetato de plomo para la vagina, II, 174.
 — de acibar, II, 175.
 — de ácido clorhídrico, I, 89.
 — de beleño, II, 186.
 — de carbonato de sosa, I, 141.
 — de Clarck, II, 181.
 — de creosota, II, 181.
 — de cubebas, II, 182.
 — de especies aromáticas, I, 186.
 — de estramonio, II, 186.
 — de Girtanner, II, 183.
 — de ictiocola con mirra, II, 183.
 — de leche opiada de la F. E., II, 176.
 Inyeccion de leche opiada de los H. M., II, 176.
 — de nuez de agalla, I, 232.
 — de tanino, II, 188.
 — de Tavernier, II, 188.
 — de Whately, II, 189.
 — de Young, II, 189.
 — de yerbamora, II, 186.
 — deterativa, II, 182.
 — emoliente, II, 182.
 Inyecciones, II, 174.
 — astringentes, II, 178.
 — calmantes, II, 180.
 — calmantes de laurel real, I, 213.
 — de bicarbonato de sosa, I, 127.
 — de belladona, II, 186.
 — de sulfato de hierro, I, 271.
 — de sulfato de zinc, I, 273.
 Inyeccion escitante, II, 182.
 — estimulante de los H. M., II, 184.
 — iodada, II, 183.
 — iodurada, II, 184.
 — irritante, II, 184.
 — mercurial, II, 184.
 — mercurial de Bromfield, II, 185.

- Inyeccion mercurial de Lagneau**, II, 185.
 — mercurial opiada, II, 185.
 — narcótica, II, 185 y 186.
 — oleo-calcárea, II, 186.
 — para la blenorrea, de los H. de M., II, 186.
 — de Pringle, II, 187.
Inyecciones de especies aromáticas, II, 186.
Inyeccion sedante, II, 187.
 — sedante de Guerin de Mamers, II, 187.
 — sedante de Hamilton, II, 187.
 — terebintinada benzoi-
 ca, II, 189.
 — tónica, II, 190.
Iodhidrato de morfina, I, 203.
Iodo, I, 203.
Iodoforma, I, 204.
Ioduro de ammonium, I, 205.
 — de arsénico, I, 205.
 — de azufre, I, 205.
 — de bario, I, 205.
 — de estriquina, I, 205.
 — de hierro, I, 205.
 — de hierro y quinina, I, 206.
 — de iodhidrato de es-
 tricnina, I, 206.
Ioduro de iodhidrato de morfina, I, 206.
 — de iodhidrato de qui-
 nina, I, 207.
 — de mercurio, I, 207.
 — de mercurio y mor-
 fina, I, 208.
 — de plomo, I, 208.
 — de potasio, I, 208.
 — de zinc, I, 208.
 — de zinc y estriquina, I, 208.
 — de zinc y morfina, I, 209.
Ipecacuana blanca, I, 210.
 — estriada, I, 210.
 — oficial, I, 209.

J

- Jabon ácido**, II, 191.
 — animal, II, 191.
 — animal aromático, I, 352.
 — acéticoetéreo, II, 192.
 — amigdalino, II, 193.
 — amigdalino de Cadet, II, 192.
Jaboncillo amoniacoal, II, 326.
Jabon de aceite de croton tiglio, I, 77.
 — de croton tiglio de Ca-
 ventou, II, 190.

- Jabon de gutagamba, I, 197.
 — de jalapa, II, 193.
 — de Starkey, II, 196.
 — de trementina, II, 196.
 Jabones, II, 190.
 Jabon estibiado, II, 192.
 Jabonera, I, 210.
 Jabon medicinal, II, 193.
 — mercurial, II, 195.
 — resolutivo, II, 195.
 — sulfuroso, II, 196.
 — vegetal, II, 197.
 Jalapa, I, 210.
 Jalea de cuerno de ciervo, II, 197.
 — de fuco, II, 199.
 — de liquen, II, 200.
 — de liquen de Coldeñ, II, 201.
 — de liquen de Beral, II, 201.
 — de lombarda, II, 202.
 — de musgo de Córcega, II, 202.
 — de sagú, II, 203.
 — de salep, II, 203.
 — laxante, II, 199.
 — purgante, II, 203.
 Jaleas, I, 61, y II, 197.
 Jarabe alcohólico de ioduro de potasio iodado de Puche, II, 209.
 — amoniacal, II, 210.
 Jarabe antiartrítico y antihidrópico, II, 210.
 — antiasmático, II, 210.
 — antiescorbútico, II, 212.
 — antiescorbútico de Portal, II, 213.
 — antiescrofuloso, II, 214.
 — antigotoso, II, 214.
 — antihelmíntico de espigelia, II, 211.
 — antireumático de la F. E., II, 250.
 — antisifilítico de Cbretien, II, 214.
 — antisifilítico de Laffecteur, II, 215.
 — calibeado de Willis, II, 220.
 — calmante de Roux, II, 221.
 — ciánico, II, 225.
 — compuesto de erisimo, II, 240.
 — compuesto de erisimo de la F. E., II, 240.
 — comun de violetas de la F. E., II, 271.
 — contra el coqueluche, II, 231.
 — contra el coqueluche, de Boullay, II, 232.
 — de abedul, I, 72.
 — de acedera, I, 74.

- Jarabe de acederilla, I, 75.
- de acetato de amoníaco y hierro, II, 204.
- de acetato de hierro, II, 204.
- de acetato de morfina, II, 205.
- de ácido cítrico, II, 205.
- de ácido fosfórico, II, 206.
- de ácido láctico, I, 90.
- de ácido succínico, I, 91.
- de ácido tartárico, II, 206.
- de achicorias compuestas, II, 207.
- de achicorias simple de la F. E., II, 207.
- de adormideras, II, 236.
- de agárico, I, 95.
- de agracejo, I, 57, y 96.
- de ajénjos, I, 98, y II, 206.
- de ajo, II, 208.
- de almendras dulces, I, 106.
- de almendras, II, 209.
- de amapola, I, 58 y 109.
- de apio, II, 248.
- Jarabe de apio compuesto de la F. E., II, 227.
- de artemisa, I, 115.
- de artemisa compuesta, II, 216.
- de azafran, I, 117.
- de azuláifas, I, 117.
- de bálsamo de copaiba, II, 217.
- de bálsamo de Tolú, I, 121.
- de becabunga, I, 121.
- de beleño, I, 122.
- de beleño blanco, I, 123.
- de beleño de A. Chevallier, II, 217.
- de Belet, reformado, II, 217.
- de belladona, I, 124.
- de belladona de Trouseau, II, 218.
- de benjuí, I, 124.
- de berberis, I, 125.
- de berro de Pará, II, 219.
- de berros, I, 57, 125, y II, 219.
- de bilis de buey, I, 127.
- de borraja, I, 57.
- de borraja de la F. E., II, 207.
- de Bullay contra el coqueluche, II, 220.

- Jarabe de café de Ferrarri, II, 220.
- de canica con vino, II, 254.
- de canela, I, 57 y 135.
- de cantueso, I, 137 y II, 248.
- de caracoles, I, 138.
- de caracoles de Figuier, II, 221.
- de cártamo solutivo de la F. E., II, 222.
- de cáscara de naranja, I, 229.
- de cáscaras de naranjas amargas, II, 223.
- de cáscaras de naranjas dulces, II, 223.
- de cascarilla, I, 144.
- de catecú, I, 223.
- de centeno cornezuelo de Hebert, II, 224.
- de centeno cornezuelo de Martin, II, 225.
- de cerezas, I, 57.
- de cianuro de oro, II, 225.
- de cianuro de potasio, I, 150.
- de cinconina de Magendie, II, 226.
- de cinoglosa, I, 59 y 153.
- de citrato ácido de quinina, II, 228.
- Jarabe de citrato de hierro de Beral, II, 228.
- de citrato de hierro de Trousseau, II, 228.
- de citrato de potasa ferruginoso, II, 229.
- de claveles, I, 58 y II, 229.
- de claveles compuesto, II, 229.
- de cloruro de oro, II, 230.
- de coclearia, I, 57 y 160; II, 231.
- de codeina, II, 230.
- de consuelda mayor, I, 59 y 164.
- de corteza de cidra, I, 232.
- de corteza de cidra amarga de la F. E., II, 233.
- de corteza peruviana de la F. E., II, 261.
- de culantrillo, I, 167.
- de china compuesto de la F. E., II, 250.
- de dictamo, II, 248.
- de digital purpúrea, I, 170.
- de dulcamara, I, 172.
- de emetina de Magendie, II, 240.
- de escordio, II, 248.
- de espino ceryal, I,

59 y 180.

- Jarabe de estoraque, II, 241.
 — de estramonio, I, 182.
 — de éter, II, 242.
 — de éter mercurial, II, 243.
 — de extracto de opio de la F. E., II, 253.
 — de extracto de zarzaparrilla, II, 242.
 — de flores de albérchigo, I, 100.
 — de flores de melocoton, I, 57 y 223.
 — de flores de naranjo, I, 56 y 229.
 — de frambuesas, I, 57 y 186.
 — de fumaria, I, 58 y 189.
 — de fumaria, de la F. E., II, 207.
 — de genciana, I, 191.
 — de genciana iodurado, II, 244.
 — de gencianino, II, 245.
 — de gengibre, I, 192.
 — de goma arábiga, I, 193, y II, 246.
 — de golfín, II, 245.
 — de granada, I, 57.
 — de granadas, de la F. E., II, 247.
 — de grosella, I, 57 y
196.
 Jarabe de grosella, de la F. E., II, 247.
 — de Hahnemann, II, 247.
 — de hidrocianato de potasa, II, 247.
 — de hidrociorato, de morfina, II, 205.
 — de hígado de azufre, II, 249.
 — de hígado de bacalao, II, 250.
 — de hinojo, I, 201.
 — de hisopo, I, 202, y II, 248.
 — de horchata, II, 209.
 — de iodo, II, 249.
 — de ioduro de hierro, II, 249.
 — de ioduro de hierro y quinina, II, 250.
 — de ioduro de potasio, II, 249.
 — de ipecacuana, I, 210.
 — de karabé, II, 251.
 — de lactucario, II, 251.
 — de las cinco raíces aperitivas, II, 226.
 — de las cinco raíces de la F. E., II, 227.
 — del Dr. Desessart, II, 237.
 — del Dr. Gardane,

- II, 238.
 Jarabe del Dr. Gilet, II, 238.
 -- de lechugas, I, 57.
 -- de Lescure contra el coqueluche, II, 251.
 -- de limon, I, 57 y 214.
 -- de limon de la F. E., II, 247.
 -- de lombarda, I, 57.
 -- de lombarda compuesto, II, 251.
 -- de los cantores, II, 241.
 -- de lupulina, II, 252.
 -- de llanten de la F. E., II, 207.
 -- de madreselva, I, 58 y 218.
 -- de malvabisco, I, 59 y 219.
 -- de manito, II, 220.
 -- de manzanas, I, 57.
 -- de manzanas de la reina, I, 220.
 -- de manzana olorosa de la F. E., II, 271.
 -- de manzanilla, I, 58 y 221.
 -- de marrubio, II, 248.
 -- de meconio, de la F. E., II, 253.
 -- de membrillo, I, 57 y 223.
 Jarabe de miel, I, 59 y 225.
 -- de mirto, II, 248.
 -- de magnesia, I, 226.
 -- de moras, I, 57 y 226.
 -- de musgo de Córcega, I, 228.
 -- de naranja, I, 57 y 229.
 -- de narciso de los prados, I, 58, y II, 253.
 -- de nicociana de Lamure, II, 254.
 -- de ninfea, I, 58 y 230.
 -- de ninfea de la F. E., II, 272.
 -- de oro, II, 255.
 -- de ortiga, I, 59.
 -- de ortiga de la F. E., II, 207.
 -- de peonía, I, 58 y 241.
 -- de peonía de la F. E., II, 259.
 -- de percloruro de hierro de Beral, II, 259.
 -- de perifollo, I, 57.
 -- de Peyrillo, II, 260.
 -- de puntas de espárragos, I, 57.
 -- de puntas de espárragos de A. Chevallier, II, 260.

- Jarabe de quina, I, 250.
- de quina con vino, II, 262.
- de quina de la F. E., II, 261.
- de rábano compuesto, II, 212.
- de ratania, I, 253, y II, 262.
- de rosas, I, 57.
- de rosas pálidas, I, 57.
- de rosas pálidas de la F. E., II, 263.
- de rosas rojas de la F. E., II, 263.
- de ruibarbo, I, 256, y II, 264.
- de salicina, II, 264.
- de sapos, II, 264.
- de sisimbrio, I, 265.
- de sub-carbonato de potasa, II, 266.
- de sulfato de morfina, II, 205.
- de sulfato de quinina, II, 262.
- de tauino, II, 267.
- de trebol de agua, I, 59 y 284.
- de tridacio, II, 268.
- de tusilago, I, 58.
- de valeriana, I, 286.
- de vinagre, I, 57 y 85.
- Jarabe de vinagre con frambuesas, I, 57 y 85.
- de vinagre de la F. E., II, 270.
- de violetas, I, 58 y 289.
- de yedra terrestre, I, 289, y II, 248.
- de yerbabuena de sabor de pimienta, I, 57 y 290.
- de yerbabuena rizada, II, 248.
- de zumo de membrillo de la F. E., II, 271.
- depurativo amargo, II, 233.
- depurativo azufrado, II, 234.
- depurativo de Larrey, II, 235.
- depurativo de Majau, II, 235.
- diacodion, II, 236.
- drástico, II, 239.
- emético de Morgan, II, 239.
- etéreo de acetato de mercurio, II, 241.
- febrífugo de Bories, II, 243.
- febrífugo de quina, II, 244.
- ferruginoso con rata-

- nia, II, 244.
 Jarabe gomoso de copai-
 ha, II, 246.
 -- hidrólico de extracto
 de cainca, II, 248.
 -- mercurial gomoso, II,
 253.
 -- oenólico de extracto
 de cainca, II, 254.
 -- pectoral balsámico de
 Charles, II, 255.
 -- pectoral contra el co-
 queluche, II, 256.
 -- pectoral de Bouvart,
 II, 255.
 -- pectoral de Courti, II,
 256.
 -- pectoral de Dumas, II,
 257.
 -- pectoral de Maloet,
 II, 258.
 -- pectoral de Rivet, II,
 258.
 -- pectoral dulcificante,
 II, 257.
 -- pectoral inglés, II, 257.
 -- resolutivo de Selle,
 II, 263.
 Jarabes, I, 56, y II, 204.
 Jarabe simple, I, 56.
 -- sedantes, II, 265.
 -- sudorífico de Cuisinier,
 II, 266.
 -- sudorífico simple, II,
 266.
 -- sulfúrico alcoholiza-
 do, II, 267.
 Jarabe usual simple de
 violetas, II, 271.
 -- vermífugo de Boullay,
 II, 268.
 -- vermífugo de Boui-
 llon Lagrange, II, 269.
 -- vermífugo de corali-
 na, II, 269.
 -- vermífugo de Crou-
 veilhier, II, 270.
 -- vermífugo y purgan-
 te, II, 270.
 -- vinoso cardiaco, II,
 271.
 Julepe alcanforado de la
 F. E., II, 272.
 -- aluminoso, II, 272.
 -- amargo, II, 273.
 -- antidisentérico, II,
 273.
 -- antiescorbútico, II,
 273.
 -- antiespasmódico, II,
 274 y 275.
 -- calmante, II, 275.
 -- calmante de Baron,
 II, 275.
 -- calmante de la F. E.,
 II, 276.
 -- con el ácido benzóico,
 II, 276.
 -- contra el crup, II,
 276.
 -- contraestimulante, II,
 277.

- Jul. de codeína, II, 276.
 -- del Dr. Fournier, II, 278.
 -- del Dr. Franck, II, 277.
 -- diurético, II, 277.
 -- emetizado, II, 278.
 -- escilítico, II, 278.
 -- escocés, II, 279.
 -- espectorante, II, 279.
 -- estimulante y ligeramente anodino, II, 279.
 -- febrífugo, II, 280.
 -- fétido, II, 280.
 -- gomoso, II, 280.
 -- gomoso calmante, II, 281.
 -- gomoso de la F. E., II, 281.
 -- laurinado, II, 281.
 -- moscado, II, 281.
 -- moscado de Fuller, II, 281.
 -- moscado de la F. E., II, 282.
 -- moscado de los H. de M., II, 283.
 -- refrigerante, II, 283.
 Julepes, I, 40, y II, 272.
 -- antisépticos, II, 274.
 Julepe sedante, II, 283.
 -- sudorífico, II, 284.
 -- tónico alcanforado, II, 284.
 Juncia larga, I, 211.
 -- redonda, I, 211.
- ## K
- Kermes mineral, I, 211.
- ## L
- Lactato de protóxido de hierro, I, 212.
 Lactucario, I, 212.
 Láudano cidoniado de Vanhelmont, II, 284.
 Láudano de Rousseau, II, 286.
 -- líquido de Sydenham, de la F. E., II, 285.
 Laurel real, I, 213.
 Lavativa alcanforada de los H. M., II, 289.
 -- aloética de Clark, II, 290.
 -- amilácea de los H. M., II, 290.
 -- anodina de almidon, de la F. E., II, 290.
 -- anodina de los H. de M., II, 291.
 -- anodina de los pintores, III, 257.
 -- antiespasmódica de los H. M., II, 291.
 -- antigonorreica, II, 291.
 -- antihelmíntica, II,

291.
 Lavativa antihelmíntica de Duncan, II, 292.
 — antineuropática, III, 263.
 — antipútrida de los H. M., II, 292.
 — antisifilítica, II, 293.
 — astringente, II, 293 y 294.
 — astringente de Boerhaave, II, 294.
 — astringente de la F. E., II, 294.
 — atemperante de los H. de M., II, 295.
 — carminativa de la F. M., II, 295.
 — clorosa, II, 295.
 — con el bálsamo de copaiba, II, 296.
 — con la clara de huevo, II, 296.
 — contra la diarrea, II, 296.
 — de acebo, I, 74.
 — de aceite de ricino, I, 80, y II, 288.
 — de adormideras, II, 288.
 — de adormideras y almidón, II, 289.
 — de albayalde, II, 289.
 — de almidón y de acetato de morfina, II, 289.
 — de almizcle alcanforada, II, 290.
 — de asa fétida, I, 116, y II, 293.
 — de bálsamo de copaiba, I, 120.
 — de belladona, II, 295.
 — de cáscara de granada de la F. E., II, 294.
 — de castoreo, I, 145.
 — de copaiba, II, 296.
 — de cubebas, II, 297.
 — de esencia de trementina, I, 179.
 — de Koempf, II, 300.
 — de nuez de agalla opiada, II, 301.
 — de parietaria, I, 240.
 — de quina, II, 303.
 — de quina alcanforada, II, 303.
 — de seu, I, 263.
 — de tabaco, II, 304.
 — de trementina, I, 284.
 — de vinagre de los H. M., II, 304.
 — emetizada, II, 297.
 — emoliente, II, 298.
 — emoliente de hojas de malva de la F. E., II, 298.
 — emoliente de los H. de M., II, 298.
 — emoliente de los H.

- M., II, 298.
- Lavativa estimulante,
II, 299.
- febrífuga de los H.
M., II, 299.
- iodada, II, 299.
- irritante de los H. M.,
II, 300.
- irritante de vino an-
timoniado de la F. E.,
II, 300.
- laxante, I, 80; II,
301.
- laxante de los H. M.,
II, 301.
- moscada de los H. M.,
II, 301.
- nutritiva, II, 302.
- nutritiva de Nasse,
II, 302.
- opiada alcanforada,
II, 302.
- purgante, II, 302 y
303.
- purgante de los pin-
tores, III, 256.
- refrescante, II, 303.
- Lavativas, II, 288.
- Lavativa salina, II, 304.
- Lavativas antisépticas,
II, 292.
- diuréticas, II, 297.
- Lavativa terebintinada,
III, 269.
- Lavatorio anodino de los
H. de M., II, 287.
- Lavatorio antiescorbúti-
co de los H. de M.,
II, 287.
- astringente de los H.
de M., II, 287.
- de cebada odontálgica
de los H. de M., II,
288.
- Lavatorios, II, 287.
- Laxantes, III, 440.
- Leche cosmética, II, 305.
- de almendras, I, 38.
- de burras, II, 305.
- de cabras, II, 305.
- de canela de la F. E.,
I, 320.
- de tierra, I, 218.
- purgante de Planche,
II, 305.
- Leches amoniacales, II,
304 y 305.
- Leche terebintinada, II,
306.
- Lechuga, I, 213.
- Lejía de jaboneros, I,
265.
- litontríptica, II, 306.
- Lentejas, I, 214.
- Licor acético de Dun-
glisson, II, 307.
- aluminoso compuesto,
II, 307.
- amoniacal anisado,
II, 307.
- anodino mineral de
Hoffmann, II, 308.

- Licor anodino nitroso ,
 II, 104.
- antiartrítico, II, 148.
- anticanceroso , II,
 308.
- antidiarréico , II,
 308.
- antiespasmódico , II,
 309.
- antinefrítico, II, 310.
- antisifilítico de Chaus-
 sier, II, 311.
- antisifilítico de Pear-
 son, II, 311.
- arsenical de Bielt, II,
 310.
- arsenical de Fowler,
 II, 311.
- catarrético, II, 312.
- contra las aftas, II,
 313.
- de citrato de morfina,
 I, 501.
- de cuerno de ciervo
 sucinado, II, 312.
- de enebro, II, 315.
- de Gouvlard, II,
 315.
- de Koechlin, II, 312.
- de mirra, II, 515.
- de Pressavin, II, 316.
- de Van-Swieten, II,
 317.
- depurativo, II, 313.
- desinfectante de clo-
 ruro de óxido de só-
- dio, II, 314.
- Licores, II, 307.
- Licor mercurial alcan-
 forado, II, 315.
- refrigerante, II, 316.
- vinoso de amoniaco,
 I, 332.
- vital, II, 317.
- Limaduras de estaño, I,
 181.
- Limon, I, 214.
- Limonada, I, 214.
- alcohólica, II, 318.
- cítrica, I, 88; II,
 318.
- comun de los H. M.,
 II, 319.
- con cremor de tárta-
 ro, II, 319.
- emetizada, II, 319.
- ferruginosa y astrin-
 gente, II, 319.
- fosfórica, I, 89.
- gaseosa acidula, II,
 320.
- gaseosa en polvo, II,
 322.
- gaseosa líquida, II,
 320.
- hidroc্লórica, II, 322.
- láctica, I, 90.
- nítrica, I, 86.
- nítrica de los H. M.,
 II, 322.
- oxálica, I, 91.
- Limonadas, II, 318.

- Limonada seca , II, 323.
 — sulfúrica , II, 323.
 — sulfúrica de los H. M., II, 323.
 — tartárica, I, 93.
 — viosa , II, 324.
 — viosa alcohólica, II, 324.
 Linimento alcalino de Plenck , II, 325.
 — alcanforado de Fournier , II, 325.
 — alcanforado de los H. M., II, 325.
 — alcanforado de Vaydi , II, 325.
 — amoniacal , II, 326.
 — amoniacal alcanforado de los H. de M., II, 326.
 — amoniacal de los H. de M., II, 326.
 — anodino , II, 326.
 — anodino de Boyer, II, 327.
 — anodino y resolutivo, II, 327.
 — antiartrítico, II, 327.
 — antiartrítico de Desbois de Rochefort , II, 328.
 — antiartrítico de Home, II, 328.
 — antiepsórico, II, 328.
 — antiespasmódico de Selle , II, 329.
 Linimento antihelmíntico , II, 329.
 — antihemorroidal de los H. M., II, 329.
 — antineuropático , III, 263.
 — antiostálmico, II, 330.
 — antireumático de los H. de M., II, 330.
 — aromático, II, 330.
 — arsenical , II, 331.
 — calcáreo , II, 331.
 — carminativo, II, 331.
 — con el sulfuro de carbono , II, 332.
 — contra la hidropesía, III, 269.
 — contra la inflamación de los cartílagos de los párpados, II, 333.
 — contra las grietas de los pezones, II, 333.
 — contra las quemaduras, de los H. de M., II, 333.
 — contra las quemaduras, de los H. M., II, 334.
 — contra la tiña, II, 335.
 — contra los reumatismos, I, 334.
 — contra los sabañones, II, 334 y 335.
 — contra los sabañones, de Cottereau, II, 334.

- Linimento contra los sa-**
bañones inminentes,
 II, 335.
 — de aconitina, II, 324.
 — de ajo, II, 324.
 — de Andry, II, 326.
 — de Hufeland, II, 339.
 — de Mustard, II, 341.
 — de nuez vómica, I,
 233.
 — de Pearson, II, 342.
 — de Pissier, II, 342.
 — de Soucailly, II, 344.
 — de Valentin, II, 346.
 — de veratrina, II, 347.
 — de veratrina é ioduro
 de potasio, II, 347.
 — de veratrina y mer-
 curio, II, 347.
 — de Whitehead, II,
 348.
 — diurético de Kuser,
 II, 336.
 — diurético de Rullier,
 II, 336.
 — emoliente de los H. de
 M., II, 337.
 — epílatorio, II, 67.
 — estimulante inglés, II,
 337.
 — estimulante resoluti-
 vo, II, 338.
 — estimulante rubefa-
 ciente, II, 338.
 — fosforado, II, 338.
 — húngaro, II, 339.
- Linimento irritante, I,**
 77.
 — jabonoso de la F. E.,
 II, 340.
 — jabonoso de Koempf,
 II, 341.
 — jabonoso hidrosulfu-
 rado, II, 340.
 — jabonoso y alcanfora-
 do, II, 340.
 — mercurial, II, 341.
 — purgante, II, 343.
 — resolutivo, II, 343.
 — rubefaciente, II, 344.
- Linimentos, I, 64; II,**
 324.
 — cantaridados, II, 332.
 — de Schuster, II, 346.
 — diuréticos, II, 336.
 — escitantes, II, 337.
 — narcóticos, II, 342.
 — resolutivos, II, 343.
 — sedante de Cottreau,
 II, 345.
 — sedante de los H. de
 M., II, 345.
 — sedantes, II, 345.
- Linimento terebintina-**
do, III, 268.
 — volátil, II, 326.
 — volátil de Plenck, II,
 347.
- Lino, I, 214.**
Liquen islándico, I, 215.
 — extracción de su princi-
 pio gelatinoso, II, 348.

- Lirio de Florencia I, 215.
 Litargirio, I, 216.
 Litontrípico de Tulp, II, 350.
 Lobelia sifilítica, I, 216.
 Loción alcalina, II, 350.
 — alcoholica, II, 351.
 — alcoholica jabonosa, II, 350.
 — aluminosa y sulfurosa, II, 351.
 — antiépsórica de los H. M., II, 352.
 — antiherpética y astringente de Alibert, II, 351.
 — antiséptica, II, 352.
 — con jabon, II, 354.
 — contra las úlceras venéreas, II, 355.
 — contra la tiña, II, 354.
 — contra la tiña de los H. de M., II, 354.
 — contra los sabañones, II, 354.
 — contra los sabañones no ulcerados, II, 354.
 — de acetato de plomo, II, 350.
 — de ácido clorhídrico, I, 89.
 Lociones de ácido sulfúrico, I, 93.
 — de azufre, I, 118.
 Loción de Barlow, II, 353.
 — de bistorta, I, 128.
 Lociones de borato de sosa, I, 128.
 Loción de borato de sosa, II, 353.
 — de eléboro blanco, II, 355.
 — de saúco con alcohol alcanforado, II, 358.
 Lociones, I, 71, y II, 350.
 — astringentes, II, 352 y 353.
 — calmantes de laurel real, I, 213.
 Loción escitante y cáustica, II, 355.
 Lociones de sublimado, I, 169.
 — de sulfato de hierro, I, 271.
 Loción estimulante, II, 355.
 — gomosa y mercurial, II, 355.
 — hidrocianica, II, 355.
 — ioduro-sulfurosa, II, 356.
 — mercurial, II, 357.
 — mercurial de Adams, II, 356.
 — mundificante, II, 357.
 — resolutive, II, 357.

- Manz. ordinaria, I, 221.
 — romana, I, 221.
 Marrubio blanco, I, 221.
 Martillo de Mayor, I, 189.
 Masa odontálgica de Henry, II, 366.
 — odontálgica de Vogler, II, 366.
 Masticatorio de pelitre, I, 241.
 — indiano, II, 367.
 — irritante, II, 367.
 Materia perlada de Kerkringius, I, 85.
 Matricaria, I, 222.
 Mechoacan, I, 222.
 Medicamentos que obran sobre el sistema nervioso, III, 435.
 — que obran sobre las glándulas, III, 434.
 Medicina de Napoleon, II, 368.
 Médula de los huesos, I, 222.
 Mejorana, I, 222.
 Meliloto, I, 222.
 Melisa, I, 283.
 Melocoton, I, 223.
 Melon, I, 223.
 Membrillo, I, 223.
 Memorial terapéutico, III, 452.
 Menta, I, 223.
 Mercurial, I, 223.
 Mercurio, I, 224.
 — con creta, II, 368.
 — dulce, I, 246.
 — gomoso, II, 368.
 — soluble de Hahnemann, I, 247, y II, 369.
 — soluble de Moretti, II, 369.
 — astringente, II, 369.
 — de Tronchin, II, 370.
 — de Zanetti, II, 370.
 Mermeladas, II, 369.
 Mezcla acústica, II, 371.
 — de cloruro de zinc, II, 371.
 — emenagoga de Mansfeld, II, 371.
 — para fumar, II, 371.
 Mezclas para lociones de Bielt, II, 372 y 373.
 Mezcla para lociones de Magendie, II, 374.
 — pectoral de Magendie, II, 374.
 — pectoral de Villermé, II, 375.
 Mezclas, II, 371.
 — para lociones de Caizenave, II, 374.
 Mezcla vomitiva, II, 375.
 Miel, I, 225.
 — con proto-ioduro de mercurio, II, 377.
 — de bayas de saúco de

- la F. E., II, 375.
- Miel de cólchico, I, 163.
- Mistura de Quarin, contra la hemoptisis, II, 403.
- de Quarin, contra la ictericia, II, 404.
- de Scudamore, II, 405.
- de Silvio contra el vómito de sangre, de la F. E., II, 405.
- de Werthof, II, 408.
- de Whitt, II, 407.
- diaforética, II, 393.
- diaforética de Selle, II, 394.
- disolvente compuesta, II, 394.
- disolvente simple, II, 394.
- escitante de los H. de M., II, 395.
- febrífuga metálica, II, 396.
- fundente, II, 396.
- gomosa de sulfato de hierro, de la F. E., II, 396.
- hidragoga, II, 397.
- hidragoga de Van-Swieten, II, 397.
- jabonosa purgante, II, 398.
- litontríptica de Durande, II, 398.
- Mistura marcial etérea, II, 101.
- nitrosa y opiada contra la disenteria, II, 400.
- odontálgica, II, 400.
- odontálgica de C. L. Cadet, II, 400.
- para curar las grietas del ano, II, 401.
- para las encías, II, 401.
- para los aparatos inamovibles, II, 405.
- pectoral de Boerhaave, II, 401.
- pectoral de Cottereau, II, 402.
- pectoral de Quarin, II, 402.
- purgante, II, 403.
- purgante de Andry, II, 403.
- resino-jabonosa, II, 404.
- resolutiva, II, 404.
- Misturas, I, 40, y II, 378.
- diuréticas, II, 394 y 395.
- Mistura sudorífica, II, 406.
- tónica de Du Bois, II, 406.
- tónica de Gall, II

- 406.
- Mist. triacal, II, 407.
- vermífuga, II, 408.
- vomitiva, II, 408.
- Monesia, I, 226.
- Moras, I, 226.
- Morfina, I, 226.
- Moscada, I, 227.
- Mostaza blanca, I, 227.
- negra, I, 227.
- Moxas, I, 189.
- Mucílago de goma arábiga, I, 193.
- de goma tragacanto, I, 194.
- de lino, I, 39 y 215.
- de raíz de malvabisco, I, 39 y 219.
- de semillas de membrillos, I, 39.
- Mucílago, I, 38.
- Muriato de amoniaco, I, 227.
- de barita, I, 227.
- de cal, I, 227.
- de oro, I, 227.
- de oro y sosa, I, 227.
- oxigenado de cal, I, 227.
- sobrecxigenado de mercurio, I, 168.
- de sosa, I, 199.
- Musgo de Córcega, I, 227.
- marino perlado, I, 228.
- Miel de mercurio dulce, II, 377.
- de moras de la F. E., II, 377.
- de vinagre de cebolla albarrana de la F. E., II, 418.
- de vinagre de la F. E., II, 419.
- Mieles, II, 375.
- Miel escilitica, I, 247, y II, 376.
- Mieles medicinales, I, 59.
- Miel mercurial, I, 224.
- mercurial compuesta, II, 376.
- mercurial de Swediaur, II, 376.
- rosada, II, 378.
- terebintinada, II, 378, y III, 267.
- Miga de pan blanco, I, 225.
- Minio, I, 237.
- Mirra, I, 225.
- Mistura ácida, II, 378.
- alcalina, II, 379.
- alcanforada de la F. E., II, 272.
- almizclada de la F. E., II, 282.
- amoniaco-mercurial, II, 379.
- analéptica, II, 379.
- antiácida y absorven-

- te, II, 380.
- Mistura antiasmática, II, 380.
- anticatarral rusa, II, 380.
- antiemética de la F. E., II, 380.
- antiemética de los H. de M., II, 381.
- antiescorbútica, II, 381.
- antiespasmódica con opio de los H. de M., II, 382.
- antiespasmódica de Sydenham, II, 382.
- antiespasmódica sin opio de los H. de M., II, 382.
- antibelmíntica, II, 382.
- antihistérica, II, 381.
- antiletárgica, II, 382.
- antimonial de Masdeval de los H. de M., II, 383.
- antisifilítica de Cazenave, II, 383.
- antisifilítica de Cirillo, II, 384.
- astringente de Lallemand, II, 284.
- astringente de Silvio, de los H. de M., II, 405.
- balsémica de Fricke, II, 385.
- Mistura balsámica de Fuller, II, 385.
- brasileña contra la gonorrea, II, 386.
- brasileña en pasta, II, 387.
- brasileña líquida de Lepère, II, 386.
- calmante, II, 387.
- calmante astringente, II, 387.
- calmante de Houlton, II, 388.
- calmante de Recamier, II, 388.
- calmante de Roux, II, 388.
- catártica árabe, II, 389.
- con la creta, II, 389.
- contra el crup, II, 390.
- contra el psoriasis labial, II, 391.
- contra el líquen agrius, II, 390.
- contra el líquen crónico de las manos, II, 390.
- contra la fetidez del aliento, II, 391.
- contra la gonorrea, II, 391.
- contra la incontinen-
cia de orina, II, 392.

- Mistura contra la pirosis,** Narcóticos, III, 436.
 II, 392. Nenufar, I, 229.
 — **contra los sabañones,** Ninfea, I, 229.
 II, 393. Nitrato ácido de mercurio, I, 230.
 — **de asa fétida,** II, 384. — de bismuto, I, 230.
 — **de Baumes,** II, 385. — de codeína, I, 230.
 — **de Boyle,** II, 386. — de plata fundido, I, 230.
 — **de carbonato de potasa de ajenjos de la F. E.,** II, 380. — de potasa, I, 231.
 — **de centeno cornezuelo,** Nitro, I, 231.
 II, 389. Nuez, I, 233.
 — **de creta compuesta de Brande,** II, 390. — de agalla, I, 231.
 — **de Cronier,** II, 393. — moscada, I, 232.
 — **de cubebas,** II, 58. — vómica, I, 233.
 — **de goma amoniaco de la F. E.,** II, 55.
- ⊙
- Odontálgico de Pará,** I, 340.
Odontina, I, 234.
Oenolado de acetato de hierro, II, 409.
 — **de acetato de hierro líquido,** III, 313.
 — **de citrato de hierro,** III, 321.
 — **de zarzaparrilla,** III, 331.
 — **sudorífico,** III, 329.
Ojimiél cólchico, II, 417.
 — **de ajo,** I, 99.
Ojimiéles, I, 60, y II, 417.
Ojimiél escilítico, I, 147.
 — **escilítico de la F. E.,**
- N**
- Nabo,** I, 228.
Naranja, I, 229.
Naranjada, I, 229.
 — **seca,** II, 323.
Naranjo, I, 228.

- II, 418.
 Ojiviel simple de la F. E., II, 419.
 — pectoral de Edimburgo, II, 418.
 — pectoral de los Daneses, II, 419.
 Olíbano, I, 234.
 Olmo piramidal, I, 234.
 Opiata antiepiléptica, II, 409.
 — antileucorreica de Salisbury, II, 409.
 — antileucorreica de Tissot, II, 409.
 — antituberculosa, II, 410.
 — astringente de Babeyrac, II, 410.
 — astringente de Roucher, II, 411.
 — de Larrey, II, 413.
 — de Martinier, II, 414.
 — de Masdesvall, II, 414.
 — de Michu, II, 415.
 — de Ward, II, 415.
 — dentífrica, II, 411.
 — estomacal, II, 411.
 — febrífuga, II, 412.
 — febrífuga de Lescure, II, 413.
 — febrífuga de Tissot, II, 412.
 — napolitana, II, 415.
 Opiatas, I, 60, y II, 409.
 Opiata terebintinada, III, 268.
 — vermífuga, II, 416.
 Opio, I, 234.
 — de Rousseau, II, 286.
 Opoponaco, I, 235.
 Orégano, I, 235.
 Oro, I, 236.
 Orozuz, I, 236.
 Ortiga menor, I, 236.
 Osmazomo, II, 416.
 Oxalato de potasa, I, 236.
 Oxierato, I, 85, y 236.
 — de Andria, II, 417.
 Oxido blanco de arsénico, I, 85.
 — blanco de arsénico, I, 236.
 — de antimonio, I, 236.
 — de cal, I, 133.
 — de magnesia, I, 237.
 — de oro, I, 237.
 — de zinc, I, 238.
 — negro de hierro, I, 237.
 — rojo de hierro, I, 237.
 — rojo de mercurio, I, 238.
 Oxidos de hierro, I, 236.
 — de plomo, I, 237.

P

- Paciencia , I, 239.
 Palanoud , II, 420.
 Palo de campeche , I, 239.
 Palo santo , I, 196.
 Panes de anís , II, 420.
 Pan ferruginoso , II, 421.
 Papel de cauterio , II, 421.
 -- epispástico , II, 421.
 Papeles , II, 421.
 Papel esparadrápico , II, 422.
 -- vejigatorio de Golde-
 fy-Dorly , II, 422.
 -- vejigatorio de Trou-
 seau , III, 306.
 Paraguay con creosota ,
 II, 424.
 -- rojo , II, 424.
 Pareira brava , I, 239.
 Parietaria , I, 240.
 Pasas , I, 240.
 Pasta antimonial , II, 425.
 -- cáustica de Fr. Cos-
 me , II, 427.
 -- cáustica de Rosselot ,
 II, 427.
 -- contra los sabañones ,
 II, 428.
 -- de almendras , II, 424.
 Pasta de azufraifas , II, 425.
 -- de dátiles , II, 426.
 -- de caracoles , II, 426.
 -- de goma arábica , II, 429.
 -- de malvabisco , II, 429.
 -- de liquen , II, 430.
 -- de liquen de Robinet ,
 II, 430.
 -- de regaliz blanca , II, 433.
 -- de regaliz negra , II, 433.
 -- de regaliz parda , II, 433.
 -- de Ward , II, 415.
 -- escarótica , II, 428.
 -- pectoral balsámica , II, 431.
 -- pectoral de hofes de
 vaca , II, 432.
 -- pectoral de Parmen-
 tier , II, 432.
 Pastas , I, 61 ; II, 424.
 Pastillas , I, 62 ; II, 434.
 -- absorbentes , II, 434.
 -- acidulas purgantes ,
 II, 435.
 -- aromáticas de flor de
 naranjo de la F. E. ,
 II, 450.
 -- aromáticas de limon
 de la F. E. , II, 452.
 -- aromáticas de rosas

- de la F. E., II, 452.
- Pastillas contra el ro-
madizo, II, 438.
- contra las toses ner-
viosas, II, 438.
- contra la tos, II, 438.
- de ácido cítrico, II,
435.
- de ácido oxálico, II,
435.
- de agracejo, I, 96.
- de bicarbonato de so-
sa, II, 436.
- de catecú, de canela
y de magnesia, II,
437.
- de cianuro de oro, II,
437.
- de citrato de hierro,
II, 437.
- de cloruro de oro,
II, 438.
- de Chaussier, II, 442.
- de chocolate y hierro
reducido por el hi-
drógeno, II, 442.
- del D' Arcet, II, 436.
- de digital, II, 439.
- de Dubois, II, 439.
- de emetina pectorales,
II, 439.
- de emetina vomitivas,
II, 440.
- de émula campana, II,
440.
- de geng-seng, II, 441.
- Psstillas de goma arábi-
ga, II, 441.
- de hidriodato de hier-
ro, II, 442.
- de iodoforma, II,
443.
- de ipecacuana con azú-
car de la F. E., II,
444.
- de ipecacuana de L.
C. Cadet, II, 443.
- de liquen, III, 177.
- de malvabisco, II,
444.
- de malvabisco go-
mosas de la F. E., II,
445.
- de maná, II, 445.
- de mercurio sacari-
no, II, 446.
- de musgo de Córcega,
II, 447.
- de pelitre, II, 448.
- de salud, II, 449.
- de sulfato de quinina,
II, 450.
- de tártago, II, 450.
- de tridacio, II, 451.
- de Vichy, II, 436.
- de yerbabuena de sa-
bor de pimienta, I,
290.
- de yerbabuena de sa-
bor de pimienta de la
F. E., II, 451.
- ferruginosas, II, 440.

- Pastillas mogólicas**, II, 446.
 -- para desinfectar el aliento, II, 447.
 -- pectorales, incisivas y calmantes, II, 448.
 -- purgantes, II, 449.
 -- vermífugas, II, 451.
Pediluvio mercurial, II, 453.
 -- nitro-muriático, II, 453.
Pediluvios, I, 70; II, 452.
 -- alcalinos, II, 452.
 -- ácido clorhídrico, I, 89.
 -- de ácido hidroclore nítrico, I, 90.
 -- hidróclóricos, II, 452.
 -- irritantes, II, 453.
 -- sinapizados, II, 453.
 -- sinapizados de los H. M., II, 454.
Pelitre, I, 240.
Peonía, I, 241.
Pepino, I, 241.
Peras marciales, I, 381.
Percloruro de antimonio, I, 241.
 -- de hierro, I, 159.
Peregil, I, 241.
Perifollo, I, 242.
Peróxido de hierro hidratado, II, 154.
Petroleo, I, 242.
Pez blanca, I, 242.
 -- de Borgoña, I, 242.
 -- de Borgoña de A. Chevreau, II, 454.
 -- negra, I, 242.
Pie de leon, I, 108.
Piedra calaminar, I, 133.
 -- de cauterio, I, 245.
 -- divina, I, 269.
 -- infernal, I, 242.
Piel divina, II, 454.
Pieles, II, 454.
Pildoras, I, 63, y II, 455.
 -- absorbentes, II, 455.
 -- aloéticas de sulfato de potasa de la F. E., II, 558.
 -- alterantes, II, 458.
 -- aluminosas, II, 459.
 -- amargas, II, 460.
 -- anodinas, II, 460.
 -- ante cibum, II, 461.
 -- antiácidas, II, 461.
 -- antiartríticas, II, 461.
 -- antiartríticas de Gall, II, 462.
 -- antiartríticas de Vicq de Azir, II, 462.
 -- antiblenorrágicas, II, 462.
 -- antiblenorrágicas de Gall, II, 463.

- Píldoras anticaquéticas, II, 463.
 — anticalarrales, II, 463.
 — anticalarrales y calmantes, II, 464.
 — anticefálicas, II, 464.
 — anticloróticas de Bland, II, 464.
 — anticoreicas de Rasi, II, 554.
 — antidisentéricas, II, 465.
 — antieméticas de Fuller, II, 465.
 — antieméticas de los H. M., II, 466.
 — antiepilépticas inglesas, II, 466.
 — antiepilépticas de Recamier, II, 466.
 — antiescrofulosas, II, 468.
 — antiescrofulosas de Baudelocque, II, 467.
 — antiescrofulosas de Henry y Guibourt, II, 467.
 — antiespasmódicas de Henning, II, 468.
 — antiespasmódicas de Lombart, II, 468.
 — antiespasmódicas de Montaigu, II, 469.
 — antiespasmódicas de Petit, II, 469.
 Píldoras antiespasmódicas de Piderit, II, 469.
 — antineurálgicas de los H. M., II, 537.
 — antineurálgicas de Trousseau, II, 477.
 — antisépticas, II, 477.
 — antisépticas de Dupuytren, II, 478.
 — antisifilíticas de Alibert, II, 478.
 — antisifilíticas de Dupuytren, II, 478.
 — antisifilíticas de Recamier, II, 479.
 — antisifilíticas de Sarasin, II, 479.
 — antisudoríficas de los H. M., II, 479.
 — antitípicas de los H. M., II, 480.
 — antitísicas, II, 480.
 — antivenéreas, II, 480.
 — asiáticas, II, 482.
 — astringentes, II, 483.
 — astringentes de Capuron, II, 483.
 — astringentes de Cavarra, II, 484.
 — astringentes de Cullen, II, 485.
 — astringentes de Cullerier, II, 485.
 — astringentes de los H. de M., II, 484.
 — astringentes de Swe-

- diaur, II, 483.
 Píldoras astringentes de
 VValch, II, 484.
 — astringentes y cal-
 mantes, II, 485.
 — atemperantes, II, 486.
 — azules, II, 486.
 — antigastrálgicas, II,
 470.
 — antigonorréicas, II,
 470.
 — antihelmínticas, II,
 471.
 — antihelmínticas de
 Schmuker, II, 471.
 — antihemoptóicas, II,
 471.
 — antiherpéticas, II,
 472.
 — antiherpéticas de Bar-
 thez, II, 472.
 — antiherpéticas de Du-
 bois, II, 473.
 — antiherpéticas de
 Kunkel, II, 474.
 — antiherpéticas y anti-
 sífilíticas, II, 463.
 — antihidrópicas, II,
 474.
 — antihistéricas, II,
 475.
 — antihictéricas de Bu-
 chan, II, 476.
 — antihictéricas de Coe-
 roly, II, 476.
 — antihictéricas de
 Storck, II, 476.
 Píl. antilechosas, II, 477.
 — balsámicas de Boer-
 haave, II, 487.
 — balsámicas de los H.
 de M., II, 487.
 — balsámicas de Morton,
 II, 487.
 — benedictas de Fuller,
 II, 490.
 — blancas de Barthez,
 II, 490.
 — calibeadas, II, 491.
 — calmantes, II, 492.
 — calmantes de Koop,
 II, 492.
 — carminativas, II,
 494.
 — católicas de la F. M.,
 II, 494.
 — cóclicos de la F. E.,
 II, 501.
 — compuestas de acibar
 de la F. E., II, 501.
 — contra el acné rosáceo,
 II, 501.
 — contra el eczema, II,
 503.
 — contra la blenorragia,
 II, 502.
 — contra la cistitis, II,
 501.
 — contra la diarrea, II,
 502.
 — contra la dismenorea,
 II, 502.

- Píldoras contra la dispepsia, II, 503.
- contra la epilepsia, II, 503.
- contra la gangrena de hospital, II, 504.
- contra la hidropesía, II, 504, y III, 269.
- contra la incontinencia de orina de los niños, II, 504.
- contra la indigestion de las bebidas vinosas, II, 505.
- contra la metrorragia crónica, II, 505.
- contra la sífilides, II, 506.
- contra los infartos glandulosos crónicos, II, 505.
- contra los sudores de los tísicos, II, 506.
- de aceite de croton, I, 77.
- de acetato de mercurio, II, 456.
- de acetato de morfina, II, 455.
- de acetato de plomo, II, 456.
- de acibar ~~h~~ónosas, II, 457.
- de aconitina, II, 457.
- de acónito de Biett, II, 457.
- Píldoras de acónito mercuriales, II, 457.
- de acónito opiadas de los H. M., II, 458.
- de almendras amargas, II, 458.
- de alumbre, II, 459.
- de amoniaco de la F. M., II, 460.
- de arseniato de hierro, II, 481.
- de arsénico americanas, II, 481.
- de asa fétida é ioduro de hierro, II, 482.
- de asa fétida y alcanfor, II, 481.
- de Bacher, II, 486.
- de Barclay, II, 488.
- de Barton, II, 488.
- de belladona, II, 488.
- de belladona de Trouseau, II, 489.
- de belladona ioduradas, II, 489.
- de Belloste, II, 489.
- de bromuro de hierro, II, 491.
- de brucina, II, 491.
- de cainca, II, 491.
- de calomelanos compuestas, II, 493.
- de cantáridas, II, 493.
- de carbon alcalinas,

- II, 493.
 Píldoras de Carlos Bell,
 II, 494.
 — de centeno cornezuelo, II, 495.
 — de cianuro de mercurio compuestas, II, 496.
 — de cianuro de mercurio simples, II, 495.
 — de cianuro de oro opiadas, II, 496.
 — de cianuro de oro y extracto de mecercon, II, 496.
 — de cianuro de potasio, II, 497.
 — de cicuta con calomelanos, II, 497.
 — de cicuta ioduradas, II, 497.
 — de cicuta y quina, II, 498.
 — de cinchonina, II, 498.
 — de cinoglosa, de la F. E., II, 498.
 — de cinoglosa de los H. M., II, 499.
 — de cinoglosa opiadas de la F. E., II, 498.
 — de clorhidrato de morfina, II, 499.
 — de cloruro de mercurio y morfina, II, 499.
 Píldoras de cloruro de oro, II, 499.
 — de cloruro de oro y sodio, II, 500.
 — de cobre, II, 500.
 — de codeína, II, 500.
 — de codeína de Magendie, II, 501.
 — de copaiba mercuriales de los H. M., II, 506.
 — de Deslandes, II, 507.
 — de deuto-ioduro de mercurio, II, 508.
 — de digital, II, 509.
 — de dulcamara y sulfuro de antimonio, II, 512.
 — de Dupuy, II, 512.
 — de escila compuestas, II, 514.
 — de estricnina, II, 519.
 — de extracto alcohólico de nuez vómica, II, 519.
 — de gálbano compuestas, II, 524.
 — de gencianino, II, 524.
 — de Greding, II, 524.
 — de Hahnemann, II, 525.
 — de hidrociorato de hierro, II, 527.
 — de iodhidrargirato de

- potasa , II , 530.
 Píldoras de iodo de los
 H. de M., II, 529.
 — de iodoformo , II, 529.
 — de ioduro de hierro
 y quinina , II, 531.
 — de ioduro de iodhi-
 drato de estriçnina,
 I, 206.
 — de ioduro de iodhi-
 drato de morfina , I,
 206.
 — de ioduro de iodhi-
 drato de quinina , I,
 207.
 — de ioduro de plomo
 cristalizado , II, 529.
 — de ioduro de potasio,
 II, 532.
 — de ioduro de zinc y
 estriçnina , I, 209.
 — de ioduro de zinc y
 morfina , II, 532.
 — de ioduro doble de
 mercurio y morfina,
 II, 530.
 — de ioduro doble de zinc
 y estriçnina , II, 531.
 — de jabon , II, 533.
 — de jabon compuestas,
 II, 533.
 — de Koopp , II, 533.
 — de lactecario , I, 212.
 — de lupulina , II, 534.
 — de Maquiavelo , II,
 535.
 Pil. de Meglin , II, 537.
 — de Merat , II, 537.
 — de mercurio albumi-
 nosas , II, 539.
 — de morfina , I, 226.
 — de Moscou , II, 560.
 — de nitrato de plata,
 II, 545.
 — de nuez vómica , I,
 233.
 — de óxido de oro , II,
 546.
 — de Piperino , II, 547.
 — de Plumer , II, 547.
 — de proto-carbonato
 de hierro , II, 548.
 — de proto-ioduro de
 mercurio , II, 531.
 — de proto-ioduro de
 mercurio de Biett , II,
 548.
 — de Quarín contra el
 asma , II, 552.
 — de Quarín contra la
 epilepsia , II, 553.
 — de Quarín contra la
 gonorrea , II, 553.
 — de quina alcanforadas,
 II, 553.
 — de Rasori , II, 554.
 — de Rufin , II, 554.
 — de sainte Marie , II, 554.
 — de sainte Marie para
 terminar la gonorrea,
 II, 555.
 — de salicina , II, 555.

- Píldoras de sulfato de cinchonina, II, 557.
 — de sulfato de morfina, II, 557.
 — de sulfato de quinina, II, 557.
 — de trementina cocida, II, 561.
 — de trementina officinales, II, 561.
 — de trementina magistrales, II, 562.
 — de tribus con ruibarbo de la F. M., II, 563.
 — de Tronchin, II, 563.
 — de unguento napolitano, II, 563.
 — de valeriana, II, 564.
 — de Valet, II, 548.
 — de Valet con cubebas, II, 564.
 — de veratrina, II, 565.
 — de veratrina de Magendie, II, 565.
 — de los tres diablos, de Maetzius, II, 508.
 — depurativas de Dubois, II, 507.
 — desobstruentes de los H. M., II, 507.
 — diaforéticas, II, 509.
 — diaforéticas de Roucher, II, 509.
 — diuréticas, II, 520.
 — diuréticas de Dupoy-
 tren, II, 511.
 Píldoras diuréticas hidragogas, II, 510.
 — diuréticas hidragogas de los H. M., II, 510.
 — drásticas, II, 511.
 — drásticas de Rayer, II, 511.
 — edimburgenses de la F. E., II, 512.
 — emenagogas de Barthez, II, 513.
 — emenagogas de Fouquier, II, 513.
 — eméticas de Swediaur, II, 514.
 — escilíticas de Chrestien, II, 515.
 — escilíticas de la F. Ed., II, 514.
 — escilíticas de los H. de M., II, 514.
 — escocesas, II, 516.
 — escocesas de Anderson, II, 515.
 — espectorantes, II, 516.
 — esplénicas, II, 516.
 — esténicas, II, 517.
 — estípticas, II, 517.
 — estomacales, II, 517 y 518.
 — estomacales de Cadet, II, 518.
 — estomacales de Smith, II, 519.
 — febrifugas de Ando-

- nart, II, 520.
 Píldoras febrifugas de
 Lochstaedt, II, 520.
 — febrifugas inglesas,
 II, 520.
 — ferruginosas, II, 521.
 — fundentes de Lemo-
 nier, II, 521.
 — fundentes de Re-
 camier, II, 522.
 — fundentes de Richter,
 II, 522.
 — fundentes de Roucher,
 II, 522.
 — fundentes de Smith,
 II, 523.
 — fundentes de Vicq
 D'Azir, II, 523.
 — hidragogas, II, 525.
 — hidragogas de Bon-
 tius, II, 526.
 — hidragogas de Janin
 de Lion, II, 526.
 — históricas de la F. M.,
 II, 527.
 — incisivas de Cadet, II,
 528.
 — incisivas de J. J. Le-
 roux, II, 528.
 — incisivas pectorales,
 II, 528.
 — jabonosas de los H. de
 M., II, 532.
 — laxantes y fundentes
 de Sanchez, II, 534.
 — marciales de la F. E.,
 II, 536.
 Píldoras marciales de
 los H. de M., II, 536.
 — mayores de Hoffmann,
 II, 536.
 — menores de Hoffmann,
 II, 536.
 — mercuriales, II, 538
 y 539.
 — mercuriales de Biet,
 II, 539.
 — mercuriales de Brug-
 natelly, II, 539.
 — mercuriales de Cadet,
 II, 540.
 — mercuriales de Koempf,
 II, 535.
 — mercuriales de la F.
 E., II, 541.
 — mercuriales del Dr.
 Estor, II, 540.
 — mercuriales de los H.
 de M., II, 541.
 — mercuriales de los H.
 M., II, 541.
 — mercuriales de Lag-
 neau, II, 542.
 — mercuriales de Mos-
 catti, II, 542.
 — mercuriales de Plenck,
 II, 543.
 — mercuriales de Re-
 nou, II, 544.
 — mercuriales de Sedi-
 illot, II, 544.
 — mercuriales glicirri-

- zadas de la F. E., II, 541.
- Píldoras mercurio-opiadas de los H. M., II, 543.
- moscadas compuestas, II, 545.
- orientales, II, 546.
- para restablecer las hemorroides, II, 546.
- para restablecer las reglas, II, 547.
- purgantes, II, 550.
- purgantes de Dehaen, II, 551.
- purgantes de Franck, II, 552.
- purgantes y diuréticas de Franck, II, 551.
- purgantes y fundentes, II, 552.
- relajantes de Buchan, II, 554.
- sedantes, II, 556.
- sudoríficas calmantes, II, 556.
- suecas, II, 556.
- tartáreas de Bon-tius, de la F. E., II, 558.
- tartáreas de Schroederer, II, 558.
- tónicas, II, 468.
- tónicas de Hulm, II, 560.
- Píldoras tónicas de Stoll, II, 560.
- tónicas y calmantes, II, 559.
- tónicas y estomacales, II, 559.
- tónicas y laxantes, II, 560.
- vermífugas, II, 565.
- Pimienta anual, I, 243.
- común, I, 242.
- de la Jamaica, I, 243.
- de las Indias, I, 243.
- de Tabasco, I, 243.
- negra, I, 242.
- larga, I, 244.
- Pinillo oloroso, I, 134.
- Piñones pequeños de las Indias, I, 244.
- Piperino, I, 244.
- Pirrotónide, II, 566.
- absorbente de los H. M., II, 567.
- ácida astringente, II, 568.
- alcalino-gomosa, II, 569.
- alcanforada, II, 569.
- amarga, II, 570.
- angélica de la F. E., II, 571.
- anodina de los H. M., II, 571.
- antiácida, II, 572.

- Pocion antiácida de Chevallier, II, 572.
- antiartrítica, II, 572.
- anticrupal, II, 573.
- antidisentérica, II, 573.
- antiemética de Chaussier, II, 574.
- antiemética de Dubois, II, 573.
- antiemética de Galleureux, II, 574.
- antiemética de Riverrío, II, 574.
- antiescorbútica, II, 575.
- antiescorbútica de Franck, II, 575.
- antiescrofulosa, II, 576.
- antiespasmódica, II, 576.
- antiespasmódica anisada, II, 576.
- antiespasmódica de los H. M., II, 577.
- antislogística y sudorífica, II, 577.
- antigonorreica de Delpech, II, 577.
- antihistérica, II, 578.
- antimonial de los H. M., II, 578.
- antinefrítica, II, 579.
- antineuropática, III, 263.
- Pocion antisifilítica de los H. M., II, 580.
- antitetánica, II, 580.
- antitísica de Ameling, II, 580.
- antitísica de Selle, II, 578.
- aperitiva, II, 581.
- aromática, II, 581.
- astringente de Fouquier, II, 583.
- astringente de Gamba, II, 583.
- astringente de los H. M., II, 583.
- astringente de Pradel, II, 583.
- atemperante de los H. M., II, 584.
- atemperante de Sydenham, II, 584.
- balsámica de Choppard, II, 584.
- béchica, II, 585.
- calmante de la F. E., II, 276.
- calmante y antiespasmódica, II, 586.
- capivi, II, 587.
- catártica, II, 587.
- clórica, II, 588.
- con clara de huevo, II, 589.
- con el bromuro de potasio, II, 585.
- con extracto de qui-

- na, II, 589.
- Pocion contraestimulante, II, 591.
- contra el coqueluche, de Buettner, II, 589.
- contra el coqueluche, de Roberto Tomas de Salisbury, II, 590.
- contra el crup, II, 590.
- contra la angina pelicular, II, 591.
- contra la diarrea de los tísicos, II, 591.
- contra la embriaguez, II, 592.
- contra la tiña, II, 592.
- contra las aftas confluentes gangrenosas, II, 590.
- contra los dolores nefríticos, II, 592.
- cordial, II, 592.
- de aceite de croton tiglió, II, 567.
- de aceite de higado de bacalao, II, 567.
- de acónito, II, 569.
- de agua destilada de almendras amargas, II, 569.
- de asa fétida de Millar, II, 581.
- de centeno cornezuelo, II, 587.
- Pocion de cianuro de potasio, II, 588.
- de cinconina, II, 588.
- de codeina, II, 589.
- de Dehaen, II, 593.
- de Goelis, II, 607.
- de hidriodato de potasa y ácido hidrocianico, II, 607.
- de hidro-bromato de potasa, II, 608.
- de Hufeland contra la hidropesia espasmódica, II, 608.
- de ioduro de zinc y estricnina, I, 209; y II, 609.
- de ioduro de zinc y morfina, I, 209; y II, 610.
- de ipecacuana de Haller, II, 610.
- de Jadelot contra el crup, II, 611.
- de Juan Roy contra el coqueluche, II, 610.
- de Jussieu contra los esputos de sangre, II, 611.
- del Dr. Andry contra la cardialgia, II, 596.
- del Dr. Andry contra los envenenamientos por los ácidos mi-

- nerales, II, 597.
 Poción del Dr. Goelis, II, 597.
 — del Dr. Monjenot contra la afonía, II, 597.
 — del Dr. Willians Kerr, II, 598.
 — de Pitschaft, II, 618.
 — de Quarin, II, 622.
 — de quinina, II, 622.
 — de Shahl, II, 624.
 — de Spielman, II, 623.
 — de Stuetz, II, 624.
 — de sulfato de quinina, II, 623.
 — de tridacio, II, 626.
 — diaforética, II, 594.
 — diurética, II, 594.
 — diurética de Buchard, II, 595.
 — diurética de Fouquier, II, 596.
 — diurética de Hallé, II, 596.
 — diurética de los H. M., II, 595.
 — diurética y calmante, II, 595.
 — efervescente, II, 598.
 — emenagoga, II, 599.
 — emenagoga de Desbois, II, 599.
 — emenagoga de Furnari, II, 599.
 — emética de los H. M., II, 600.
 Poción emetizada, II, 599.
 — emeto-catártica de los H. M., II, 600.
 — emulsionada de maná, II, 600.
 Pociones, I, 39; y II, 567.
 — aceitosas, II, 568.
 — aluminosas, II, 570.
 — antisépticas, II, 579.
 — astringentes, II, 582.
 — calmantes, II, 585 y 586.
 Poc. escilitica, II, 600.
 — escilitica de los H. M., II, 601.
 — escitante, II, 601.
 Pocs. cordiales, II, 593.
 — diuréticas, II, 594.
 — espectorantes, II, 603.
 — febrífugas, II, 605.
 Poc. espectorante, II, 601.
 Pocs. purgantes, II, 619.
 Poc. estibiada, II, 602.
 — estibio-opiada, II, 602.
 — estimulante aromática, II, 604.
 — estimulante con la estricnina, II, 602.
 — estimulante de Alibert, II, 602.
 — estimulante de brucina, II, 603.
 — estíptica, II, 604.

- Pocion estomacal , II, 604.
- etérea de los H. M., II, 605.
 - ferruginosa , II, 605.
 - fosforada con aceite, II, 606.
 - fosforada con éter , II, 606.
 - gaseosa , II, 574.
 - gomosa de la F. E., II, 281.
 - gomosa de los H. M., II, 606.
 - hemostática , II, 607.
 - incidente de los H. M., II, 609.
 - iedurada de Cullerier, II, 609.
 - iedurada de Fermon, II, 609.
 - kermetizada , II, 612.
 - laxante de Fernel, II, 612.
 - laxante de la F. E., II, 612.
 - laxante de Viena , II, 613.
 - litontríptica , II, 613.
 - morfínosa de los H. M., II, 614.
 - moscada de Dubois, II, 614.
 - moscada de los H. M., II, 614.
 - moscada y opiada , II, 614.
- Pocion negra , II, 273.
- nitrada , II, 615.
 - obstétrica , II, 615.
 - ocítica , II, 615.
 - opiada de los H. M., II, 616.
 - pectoral aceitosa , II, 616.
 - pectoral amarga , II, 617.
 - pectoral de los H. M., II, 616.
 - pectoral de Magendie, II, 617 y 618.
 - purgante con el aceite de ricino , II , 618 y 619.
 - purgante de Andry, II, 620.
 - purgante de Cruveilhier , II, 620.
 - purgante de los pintores , III, 258.
 - purgante de Planche, II, 620.
 - purgante de tártago, II, 621.
 - purgante y tónica, II, 621.
 - purgante y vermífuga , II, 621.
 - sedante , II, 622.
 - sedante de Fouquier, II, 623.
 - tónica de los H. M.

- II, 625.
 Poción tónica de Recamier, II, 625.
 — tónica y estomacal, II, 625.
 — vermífuga, II, 626.
 — vomitiva, II, 627.
 — de codeína, I, 161.
 Poleo, I, 290.
 Polígala amarga, I, 244.
 — de virginia, I, 244.
 Polvo absorbente, III, 1.
 — alcalino gomoso, II, 197.
 — anodino de Helvetius, III, 2.
 — antiácido, III, 2.
 — antiartrítico de Hartmann, III, 2.
 — antiartrítico de Marc, III, 3.
 — antiartrítico purgante, III, 3.
 — anticarcinomatoso de Fr. Cosme, III, 3.
 — anticatarral, III, 4.
 — anticlorótico, III, 4.
 — antidiarreico, III, 5.
 — antiepiléptico de Kirkhoff, III, 5.
 — antiepiléptico de Quincy, III, 5.
 — antiepsórico, III, 6.
 — antiepsórico de Bally, III, 6.
 Polvo antiepsórico de Chaussier, III, 6.
 — antiescrofuloso de la F. de H., I, 442.
 — antiespasmódico, III, 7.
 — antiespasmódico de Brachet, III, 7.
 — antiespasmódico de Magendie, III, 7.
 — antigastrálgico, III, 8.
 — antihelmíntico, III, 8.
 — antihelmíntico de Dupuytren, III, 8.
 — antihelmíntico de los H. de M., III, 9.
 — antireumático, III, 12.
 — antiséptico, III, 13.
 — antitísico, III, 13.
 — aromático, III, 13.
 — aromático especial, I, 349.
 — arsenical de Justamond, III, 14.
 — arsenical de Plunquet, III, 14.
 — arsenical de Rousset, III, 15.
 — astringente, III, 15.
 — astringente de Gaubius, III, 16.
 — atemperante de Stahl, III, 16.

- Polvo atemperante y laxante de Bouillon Lagrange, III, 70.
 — calmante, III, 18.
 — caquético, III, 19.
 — cáustico de Cruger, III, 21.
 — cáustico de Plenck, III, 21.
 — cefálico de tabaco, III, 22.
 — cefractivo, III, 37.
 — contra el coqueluche, III, 24.
 — contra el coqueluche de Cahleiss, III, 24.
 — contra el coqueluche y el catarro nervioso, III, 25.
 — contra el crup, III, 25.
 — contra el engrosamiento de la córnea, III, 26.
 — contra el eretismo de los nervios del estómago, III, 26.
 — contra el impétigo, III, 26.
 — contraestímulo, III, 25.
 — contra la amenorrea, III, 24.
 — contra la raquitis, III, 27.
 — contra la risa convul-
 siva, III, 27.
 Polvos contra los calambres de estómago, III, 27.
 Polvo cordial, III, 28.
 Polvos cornachinos ó de Tribus de la F. E., III, 28.
 Polvo corroborante, III, 28.
 — de abrotano, I, 72.
 — de acacia, I, 73.
 — de acebo, I, 74.
 — de ácido cáncrico, I, 87.
 — de ácido tartárico, I, 93.
 — de acónito, I, 93.
 — de agárico blanco, I, 95.
 — de agrimonia, I, 96.
 — de Ailbaut, III, 1.
 — de ajeno, I, 98.
 — de alcanfor, I, 101.
 — de alcaravea, I, 102.
 — de almáciga, I, 105.
 — de almizcle, I, 108.
 — de alquimila, I, 108.
 — de alumbre, I, 267.
 — de alumbre calcinado, I, 268.
 — de angélica, I, 111.
 — de angustura verdadera, I, 111.
 — de anís, I, 112.
 — de antimonio marcial

- diaforético, III, 9.
 Polvo de antimonio mercurial, III, 10.
 — de aristoloquia, I, 112.
 — de artemisa, I, 115.
 — de asa fétida, I, 115.
 — de ásaro, I, 116.
 — de ásaro compuesto, III, 45.
 — de azafran, I, 117.
 — de badiana, I, 119.
 — de bardana, I, 121.
 — de beleño, I, 122.
 — de belladona, I, 123.
 — de betónica, I, 126.
 — de bistorta, I, 127.
 — de brionia, I, 130.
 — de café no tostado, I, 132.
 — de café tostado, I, 132.
 — de cainca, I, 132.
 — de calagnala, I, 133.
 — de cálamo aromático, I, 134.
 — de camedrios, I, 134.
 — de canela, I, 135.
 — de cantáridas, I, 136.
 — de carbon, III, 19.
 — de carbonato de cal compuesto, III, 19.
 — de carbonato de hierro, I, 139.
 — de carbonato de magnesia, III, 20.
 Polvo de carbonato de magnesia con la sosa, III, 20.
 — de cardamomo menor, I, 141.
 — de cardo santo, I, 142.
 — de cariofilea, I, 143.
 — de cáscara de naranja, I, 229.
 — de cascarilla, I, 143.
 — de castaño de Indias, I, 144.
 — de castóreo, I, 144.
 — de catecú, I, 145.
 — de cebadilla, I, 146.
 — de cebolla albarrana, I, 147.
 — de centaurea, I, 148.
 — de centeno cornezuelo, I, 148 y III, 22.
 — de cetrarino, III, 22.
 — de cicuta, I, 151.
 — de cilantro, I, 152.
 — de cinoglosa, I, 153.
 — de ciprés, I, 153.
 — de clavo, I, 155.
 — de cloruro de oro, III, 23.
 — de cloruro de oro y sódio, III, 23.
 — de cólchico, I, 162.
 — colombo, I, 163.
 — de coloquintida, I, 163.
 — de comino, I, 164.

- Polvo de contrayerba, I, 164.
 -- de coralina, I, 165.
 -- de corteza de Winter, I, 165.
 -- de creta con ruibarbo, III, 29.
 -- de cubebas, I, 167.
 -- de digital, I, 170.
 -- de diosma afestonada, I, 171.
 -- de dulcamara, I, 171.
 -- de Dupuytren contra los herpes fagedénicos, III, 36.
 -- de elaterio, I, 172.
 -- de eléboro negro, I, 173.
 -- de encina, I, 175.
 -- de enebro, I, 176.
 -- de énula campana, I, 176.
 -- de escamonea compuesto, III, 39.
 -- de escamonea de Aleppo, I, 177.
 -- de escila compuesto, III, 40.
 -- de escila nitrada, III, 40.
 -- de escordio, I, 178.
 -- de espliego, I, 180.
 -- de esponja compuesto, III, 41.
 -- de estaño, I, 181.
 -- de estramonio, I, 182.
 Polv. de estriquina, I, 183.
 -- de estriquina de Magendie, III, 45.
 -- de flores de arnica, I, 113.
 -- de floritzino, I, 185.
 -- de Fontaneilles, III, 50.
 -- de Fordyce, III, 50.
 -- de gatuña, I, 190.
 -- de gayuba, I, 190.
 -- de genciana, I, 191.
 -- de gengibre, I, 192.
 -- de goma amoniaco, I, 192.
 -- de goma kino, I, 193.
 -- de goma tragacanto, I, 194.
 -- de graciola, I, 194.
 -- de Grimaldi, III, 51.
 -- de guayaco, I, 196.
 -- de gutagamba, I, 197.
 -- de haba de san Ignacio, I, 198.
 -- de Haly, III, 52.
 -- de helecho macho, I, 198.
 -- de hidrosferrocianato de quinina, I, 200.
 -- de hierro, I, 200.
 -- de hinojo, I, 201.
 -- de Hirschel, III, 53.
 -- de hojas de naranjo, I, 228.
 -- de imperatoria, I, 203.

- Polvo de incienso, I, 203.
- de ipecacuana, I, 210.
- de jalapa, I, 211.
- de James, III, 54.
- de juncia, I, 211.
- de kino compuesto, III, 54.
- de Knox, III, 55.
- de la corteza de granada, I, 125.
- de la corteza de la raíz de granado, I, 195.
- de Laeyson, III, 55.
- de la princesa de Carriñan, III, 62.
- del conde de Palma, III, 23.
- del conde de Warwick, III, 24.
- del Dr. Marc, III, 34.
- del Dr. Odier, III, 34.
- de liquen, I, 215; III, 56.
- de liquen azucarado, III, 56.
- de lirio de Florencia, I, 215.
- de los hermanos Mahon, III, 53.
- de lupulina, I, 216.
- de lúpulo, I, 217.
- de llanten, I, 217.
- de magnesia calcinada, I, 218.
- de manzanilla, I, 221.
- Polvo de marrubio blanco, I, 221.
- de matricaria, I, 222.
- de mechocan, I, 222.
- de mejorana, I, 222.
- de mercurio dulce, I, 246.
- de mercurio sacarino, III, 58.
- de mirra, I, 226.
- de monesia, I, 226.
- de musgo de Córcega, I, 228.
- de nitrato de plata, I, 231.
- de nitrato de potasa, I, 231.
- dentífrico, III, 29.
- dentífrico antiescorbútico, III, 30.
- dentífrico de Bally, III, 30.
- dentífrico de Charles, III, 31.
- dentífrico de Chevallier, III, 31.
- dentífrico de sangre drago de la F. E., III, 31.
- dentífrico descolorante, III, 30.
- dentífrico de sulfato de quinina, III, 32.
- dentífrico seco de la F. E., III, 31.

- Polvo de nuez de agalla, III, 66.
 I, 232.
 — de nuez moscada, I, 232.
 — de nuez vómica, I, 233.
 — de Olivencia, III, 10.
 — de opio, I, 235.
 — de opio y creta, III, 60.
 — de orégano, I, 236.
 — de paciencia, I, 239.
 — de pareira brava, I, 240.
 — de pelitre, I, 241.
 — de peonia, I, 241.
 — de pimienta anual, I, 244.
 — de pimienta de Tabasco, I, 243.
 — de pimienta negra, I, 243.
 — de polígala amarga, I, 244.
 — de polígala virginiana, I, 245.
 — de Prince, III, 63.
 — de Plumer, III, 63.
 — de quasia amarga, I, 248.
 — de Quarín, III, 65.
 — de quina, I, 249 y 250.
 — de quinina emetizada, III, 65.
 — de quinina y morfina, III, 66.
 Polvo de raíz de árnica, I, 113.
 — de rapóntico, I, 252.
 — de ratania, I, 252.
 — de regaliz, I, 253.
 — de resina de jalapa, I, 211.
 — de Roberto Thomas, III, 67.
 — de romero, I, 254.
 — de Rossen de Rosenstein, III, 68.
 — de ruda, I, 255.
 — de ruibarbo, I, 256.
 — de ruibarbo opiado, III, 68.
 — de ruibarbo y magnesia, III, 68.
 — de sabina, I, 257.
 — de salvia, I, 259.
 — de sangre de drago, I, 260.
 — de santónico, I, 260.
 — de sasafrás, I, 261.
 — de sáuce blanco, I, 261.
 — de Sedlitz, III, 69.
 — de Sedlitz compuesto, III, 70.
 — de sen, I, 263.
 — de serpentaria virginiana, I, 263.
 — de siempre viva menor, I, 264.
 — de simuruba, I, 265.

- Polvo de sublimado, I, 169.
 — de sulfato de cobre, I, 269.
 — de sulfato de cobre amoniacoal, I, 270.
 — de sulfato de estricnina, I, 270.
 — de sulfato de hierro, I, 271.
 — de tanaceto, I, 278.
 — de tanino, I, 278.
 — de té, I, 281.
 — de torbisco, I, 282.
 — de tormentila, I, 283.
 — de trebol de agua, I, 284.
 — de Tunquin de Reuss, III, 73.
 — de vainilla, I, 286.
 — de vencetósigo, I, 287.
 — de Vernix, III, 76.
 — de Viena, III, 76.
 — de Wittchicke, III, 76.
 — de yerbamora, I, 290.
 — de zarzaparrilla, I, 291.
 -- de zumaque, I, 292.
 -- de zumaque venenoso, I, 292.
 -- diaforético, III, 32.
 -- diaromaton inglés, III, 32.
 -- digestivo compuesto, III, 33.
 Polvo digestivo simple, III, 33.
 -- diurético, III, 33 y 34.
 -- diurético atemperante, III, 33.
 -- espectorante de Babeyrac, III, 41.
 -- espectorante de Recamier, III, 41.
 -- estibio-opiado, III, 42.
 -- estimulante III, 42.
 estimulante y nutritivo, III, 42.
 -- estíptico, III, 43.
 -- estíptico de Colbatch, III, 43.
 -- estomacal, III, 44.
 -- estornutatorio, III, 45.
 — febrifugo de Boullémer, III, 46.
 — febrifugo de Chleghorn, III, 46.
 — febrifugo de Hartmann, III, 47.
 — febrifugo de Jadelot, III, 46.
 — febrifugo de Juncker, III, 47.
 — febrifugo de los pobres, III, 48.
 — febrifugo de Roucher, III, 47.

- Polvo febrífugo y purgante, III, 48.
- ferruginoso, III, 49.
- fumigatorio fétido, III, 50.
- fumigatorio mercurial, III, 51.
- fundente, III, 51.
- hemostático, III, 51.
- incisivo, III, 40.
- incisivo de Mougnot, III, 53.
- laxante, III, 56.
- mercurial de Hahnemann, III, 57.
- mercurial y de carbonato de magnesia, III, 57.
- narcótico y tónico, III, 58.
- nitro-alcanforado, III, 58.
- oftálmico de Delille, III, 60.
- oftálmico de Sichel, III, 58.
- oloroso, III, 60.
- para agua gaseoso-ferruginosa de Queneville, III, 49.
- para embalsamar, III, 38.
- para fumigaciones, III, 61.
- para suero, III, 61.
- pectoral de Wedel, III, 62.
- Polvo purgante compuesto, III, 64.
- purgante de Bremsler, III, 152.
- purgante de los H. M., III, 65.
- purgante y antihelmíntico, III, 63.
- purgante y atemperante, III, 64.
- purgante y diurético, III, 64.
- refrigerante y diurético, III, 66 y 67.
- resolutivo, III, 67.
- Polvos, I, 29, y III, 1.
- antilísicos, I, 110.
- antiespasmódicos, III, 8.
- antimoniales de escamonea de la F. E., III, 28.
- antireumáticos, III, 10.
- antisépticos de quina de la F. E., III, 17.
- astringentes, III, 16.
- benedictos de Loches, III, 17.
- bezoardicos de Curbo, de la F. E., III, 17.
- catárticos de los H. M., III, 20.
- católicos de escamo-

- nea de la F. E., III, 21.
- Polvo católicos purgantes de la F. E., III, 21.
- de Bresler, III, 18.
- de calomelanos, III, 19.
- de creta compuestos, III, 29.
- de Dower de la F. E., III, 35.
- de Dower de la F. F., III, 33.
- de Dower de los H. M., III, 35.
- de ipecacuana con opio de la F. E., III, 35.
- de tribus de la F. E., III, 28.
- sedante, III, 69.
- Polvos emenagogos, III, 39.
- eméticos de los H. M., III, 39.
- estomacales, III, 44.
- febrifugos compuestos de los H. M., III, 46.
- febrifugos simples de los H. M., III, 48.
- estálucos, III, 59.
- para calas de la F. M., III, 61.
- restrictivos de ciprés de la F. E., III, 66.
- sulfuro-magnesiano, III, 70.
- Polvos vermífugos, III, 73.
- vomitivos, III, 77.
- Polvo tónico, III, 71.
- tónico de Bories, III, 72.
- tónico incisivo, III, 72.
- tónico y astringente, III, 71.
- vermífugo, III, 74.
- vermífugo de Brugnatelly, III, 74.
- vermífugo de estaño, III, 75.
- vermífugo mercurial, III, 75.
- vermífugo purgante, III, 75.
- vomitivo, III, 77.
- Ponada alcalina, III, 78.
- alcalina de Bielt, III, 78.
- alcanforada, III, 78.
- antiépórica de Albert, III, 79.
- antiépórica de Giraud, III, 80.
- antiépórica de los H. M., III, 101.
- antiépórica de Pouzin, III, 80.
- antiépórica de Thoman, III, 80.
- antiépasmódica de

- Golfin, III, 81.
- Pomada antiespasmódica de los H. M., III, 90.
- antihemorroidal, III, 86.
- antiherpética, III, 81 y, 82.
- antiherpética de Cullerier, III, 83.
- antiherpética de Chevallier, III, 82.
- antiherpética de Dubois, III, 83.
- antiherpética de Gilbert, III, 80.
- antiherpética de los H. M., III, 82.
- antioftálmica de Carron de Villards, III, 84.
- antioftálmica de Desault, III, 83.
- antioftálmica de Grand Jean, III, 84.
- antioftálmica de Guthrie, III, 84.
- antioftálmica de los H. M., III, 123.
- antioftálmica de St. Ives, III, 85.
- antioftálmica de Sichel, III, 85.
- antipruriginosa de Gilbert, III, 86.
- antisifilítica, III, 86.
- antisifilítica de Gilbert, III, 86.
- Pomada astringente, III, 87.
- astringente de agraz, III, 87.
- azufrada, III, 88.
- azufrada de Helmerich, III, 88.
- citrina con el aceite de olivas, III, 94.
- clorada, III, 95.
- con el cloruro de cal, III, 95.
- con el hidroclorato de oro, III, 112.
- contra el acné endurecido, III, 97.
- contra el eczema, III, 97.
- contra el favus, III, 97.
- contra el impétigo, III, 97.
- contra el liquen, III, 98.
- contra la caída de los cabellos, III, 98.
- contra la calvicie, III, 98.
- contra la neuralgia facial, III, 99.
- contra la octorrea crónica, III, 100.
- contra la sarna, III, 101.
- contra la sarna, de

- Rolb, III, 101.
 Pomada contra la sarna,
 de *Lisson*, III, 102.
 — contra la tiña, III,
 102.
 — contra la tiña, de
Bories, III, 103.
 — contra las grietas de
 los pechos, III, 99.
 — contra las neuralgias,
 III, 99.
 — contra las quemadur-
 ras, III, 100.
 — contra los sabañones,
 III, 100.
 — crisócroma, III, 103.
 — de acibar, III, 78.
 — de álamo negro, I,
 99.
 — de *Alibert*, II, 66.
 — de arseniato de sosa,
 III, 87.
 — de *Autenrieth*, III,
 87.
 — de azufre, I, 118.
 — de azufre y carbon,
 III, 89.
 — de *Bauyer*, III, 89.
 — de belladona, III, 89.
 — de *Boyer*, III, 90.
 — de hrea, III, 90.
 — de bromuro de pota-
 sio, III, 90.
 — de bromuro de pota-
 sio bromurado, III,
 91.
 Pomada de celomelanos,
 III, 92.
 — de celomelanos opia-
 da, III, 92.
 — de camuesas, III, 91.
 — de cantaridina, I,
 136.
 — de carbonato de plo-
 mo, III, 99.
 — de cianuro de mercurio,
 III, 93.
 — de cianuro de mercurio
 de *Parent*, III,
 93.
 — de cianuro de potasio,
 III, 93.
 — de cinabrio, III, 94.
 — de *Cirillo*, III, 94.
 — de cloruro de oro y
 sódio, III, 96.
 — de creosota, III, 103.
 — de *Crolius*, III, 103.
 — de deuto-ioduro de
 mercurio de *Bielt*, III,
 105.
 — de ioduro de mercurio
 de los H. M., III,
 104.
 — de deuto-ioduro de
 mercurio de *Magen-
 die*, III, 104.
 — de deutóxido de mer-
 curio, III, 105.
 — de *Duchesne Duparc*,
 III, 105.
 — de eléboro, III, 106.

- Pomada de Fabré, III, 109.
- de fosfato de mercurio, III, 109.
- de fósforo, I, 186.
- de fósforo, III, 109.
- de Giroux, III, 110.
- de Grand-Jean, III, 110.
- de hidriodato de amoniac, III, 111.
- de hidriodato de hierro, III, 112.
- de hidriodato de potasa de los H. de M., III, 112.
- de hidriodato de potasa, III, 112.
- de hidriodato de potasa iodurado, III, 113.
- de hidrobromato de hierro bromurado, III, 111.
- de hidrobromato de potasa, III, 113.
- de hollin contra la tiña, III, 114.
- de hollin de Bland, III, 113.
- de hollin de Carron de Villards, III, 113.
- de iodo, III, 115.
- de ioduro de arsénico, I, 205.
- de ioduro de arsénico de Bielt, III, 115.
- Pomada de ioduro de azufre, III, 116.
- de ioduro de bário, III, 116.
- de ioduro de plomo, III, 117.
- de ioduro de zinc, III, 117.
- de James, III, 118.
- de la Condesa, III, 96.
- de laurel, III, 119.
- de laurel real, III, 118.
- de los calomelanos, III, 104.
- de los hermanos Mahon, II, 66.
- de lupulina, I, 216.
- de lupulina de Freake, III, 119.
- de Lyon, III, 119.
- de Melier, III, 120.
- de mercurio amoniacal, III, 120.
- de nitrato de plata, III, 121.
- de pepino, III, 127.
- de pimienta, III, 127.
- de plumbagina, III, 127.
- de Pringle, III, 128.
- de proto-cloruro de mercurio amoniacal, III, 129.

- Pomada de proto-ioduro de mercurio, III, 128.
- de proto-ioduro de mercurio de Magendie, III, 128.
- de proto-nitrato de mercurio, III, 129.
- de sulfato de zinc, I, 274.
- de sulfuro de mercurio, III, 132.
- de tanato de plomo, III, 132.
- de tanino, III, 132.
- de Thierry, III, 133.
- de torbisco, III, 108.
- de turbit, III, 134.
- de veratrina, III, 134.
- de Werlhof, III, 133.
- de Willar, III, 134.
- epispástica alcanforada, III, 107.
- epispástica amarilla, III, 106.
- epispástica con las preparaciones de oro, III, 108.
- epispástica de los H. M., III, 106.
- epispástica suave, III, 106.
- epispástica verde, III, 107.
- estibiada de los H. de M., III, 88.
- Pomada estibiada de los H. M., III, 88.
- fosfórica, I, 90.
- fundente, III, 110.
- hidriodatada é iodurada, III, 111.
- iodo-narcótica alcanforada, III, 117.
- iodurado-opiada, III, 116.
- irritante de los H. M., III, 118.
- llamada de los H. M., III, 114.
- mercurial de Jadelot, III, 120.
- mercurial de manteca de cacao de Planche, III, 121.
- mercurial opiada, III, 121.
- nítrica de la F. E., III, 126.
- oftálmica de Carron de Villards, III, 122.
- oftálmica de Dupuytren, III, 122.
- oftálmica de Jadelot, III, 123.
- oftálmica de Janin, III, 125.
- oftálmica de Regent, III, 125.
- oftálmica de Sichel, III, 123.
- oftálmica de Velpeau,

- III, 124.
Pomada opiada, III, 126.
 — oxigenada de la E. E., III, 126.
 — oxigenada de los H. M., III, 126.
 — para el tacto, III, 133.
 — para las grietas de los pechos, III, 127.
 — para los labios, III, 118.
 — purgante, III, 129.
 — resolutive, III, 129.
 — resolutive de Bielt, III, 130.
 — resolutive de Sandelin, III, 131.
 — rubefaciente, III, 131.
Pomadas, I, 66; III, 78.
 — antiépsóricas, III, 79.
 — calmantes, III, 92.
 — sedante, III, 131.
 — ioduradas, III, 115.
 — oftálmicas, III, 122.
 — oftálmicas de Sichel, III, 124.
Pomada sulfuro jabonosa, III, 132.
 — virginal, III, 96.
Posologia, I, 74.
Potasa cáustica, I, 245.
Precipitado per se, I, 246.
Preparaciones magistra-
les, I, 20.
Preparaciones oficinales, I, 20.
Protoarseniato de hierro, I, 246.
Protocloruro de hierro, I, 159.
 — de mercurio, I, 246.
Protoioduro de mercurio, I, 207.
Protonitrato amoniaco-mercurial, I, 247.
 — de mercurio, I, 247.
Protosulfato de hierro, I, 270.
Protóxido de plomo, I, 237.
 — de sódio, I, 247.
 — de zinc, I, 247.
Pulpa de ajo, I, 30.
 — de azufañas, I, 30.
 — de hierro, I, 29.
 — de cebolla albarrana, I, 30.
 — de cebolla de lirio, I, 30.
 — de cebollas, I, 30.
 — de cicuta, I, 29.
 — de ciruelas, I, 30.
 — de coclearia, I, 29.
 — de dátiles, I, 30.
 — de especies emolientes, I, 30.
 — de membrillo, I, 30.
 — de paciencia, I, 30.
 — de patatas, I, 30.

Polpa de raíz de émula campana, I, 30.

— de raíz de malvabisco, I, 30.

— de rosas rojas, I, 29.

— de zanahoria, I, 30.

— mondada de cañafístula, I, 137.

— mondada de tamarindo, I, 277.

Pulpas, I, 29.

Pulsatila, I, 248.

Purgante de calomelanos, III, 135.

— de Leroy, III, 135.

Purgantes, III, 440.



Quasia amarga, I, 248.

Quina, I, 249.

— amarilla, I, 249.

— anaranjada, I, 249.

— blanca, I, 249.

— calisaya, I, 249.

— de Loja, I, 249.

— gris, I, 249.

— roja, I, 249.

Quinina, I, 251.

— en bruto, I, 251.

Quinta esencia antiépsórica, III, 139.

— esencia de ajénjos, III, 139.

R

Rábano rusticano, I, 251.

Racahout de los árabes, III, 137.

Raíces aperitivas, II, 80.

Ranúnculo acre, I, 252.

— bulboso, I, 252.

Rapóntico, I, 252.

Ratafia del comendador de Coumartin, III, 138.

Ratafia de los caribes, III, 138.

Ratania, I, 252.

Ricino, I, 254.

Receta, I, 20.

Refrigerantes, III, 445.

Regaliz, I, 253.

Remedio árabe, II, 239.

-- contra el envenenamiento por los hongos, III, 145.

-- contra el tialismo, III, 147.

-- contra la gota, III, 147.

-- contra las flores blancas, III, 142.

-- contra la ténia, III, 143.

-- contra los accidentes producidos por los hongos, III, 144.

- Remedio de Bicker, III, 141.
 -- de Bordier, III, 141.
 -- de Dubois, III, 147.
 -- de Guilbert, III, 147.
 -- del Dr. Barlow, III, 148.
 -- del Dr. Coindet, III, 148.
 -- de madama Nouffer, III, 149.
 -- de Pougens contra los sabañones, III, 150.
 -- de Purmann, III, 150.
 -- de Quarin contra las disenterias, III, 151.
 Remedios, III, 140.
 -- de Alibert, III, 140.
 Remedio vermifugo de Bremser, III, 152.
 Resina de guayaco, I, 197.
 -- de jalapa, I, 211.
 -- elemí, I, 253.
 Rob, I, 52.
 -- de Arnaud, III, 223.
 -- depurativo, III, 154.
 -- depurativo de Duvergie, III, 155.
 -- de saúco, I, 352.
 Rodomel cidoniado, III, 155.
 Romaza, I, 239.
 Romero, I, 254.
 Rosas de Alejandría, I, 254.
 Rosas pálidas, I, 254.
 -- rojas, I, 255.
 Rubefacientes, III, 449.
 Rubia, I, 255.
 Ruda, I, 255.
 Ruibarbo, I, 256.
 Rusma de los orientales, II, 67.
- S**
- Sabina, I, 256.
 Sacarolado de citrato de hierro, III, 156.
 -- de gelatina de liquen, III, 156.
 Sacarolados, III, 156.
 Sacaruros, I, 62.
 Sagapeno, I, 257.
 Sagú, I, 257.
 -- blanco, I, 278.
 Sal amoniaco, I, 257.
 -- catártica amarga, I, 271.
 -- comun, I, 199.
 -- de acederas, I, 236.
 -- de duobus, I, 272.
 -- de Egra, I, 271.
 -- de Epsom, I, 271.
 -- de Glanbero, I, 272.
 -- de Guindre, III, 157.
 -- de Lagaraye, I, 250.
 -- de la higuera, I, 271.
 -- de la Rochela, I, 258.
 -- de saturno, I, 259.
 -- de Seignette, I, 281.

- Salep, I, 257.
 Sales, III, 157.
 Sal esencial de Lagaraye, III, 157.
 Salicina, I, 259.
 Sal policresta de Glazer, I, 272.
 — refrigerante, I, 116.
 — sedativa de Homberg, I, 87.
 Salvado, I, 259.
 — vegetal, I, 280.
 Salvia, I, 259.
 Sándalo blanco, I, 260.
 — cetrino, I, 260.
 — rojo, I, 260.
 Sangre de drago, I, 260.
 Santónico, I, 260.
 Saponaria, I, 210.
 Saquito resolutivo, III, 157.
 Sasafrás, I, 260.
 Sauce blanco, I, 261.
 Saúco, I, 261.
 Sebesten, I, 262.
 Sedlitz power, III, 69.
 Semicupios, I, 69.
 Semillas frias mayores, I, 262.
 Sen, I, 263.
 Serpentaria virginiana, I, 263.
 Siempreviva mayor, I, 264.
 — menor, I, 264.
 Simaruba, I, 264.
 Sinapismo de mostaza, III, 158.
 — mitigado, III, 159.
 Sinapismos, III, 158.
 — para las plantas de los pies, de la F. E., III, 158.
 Sisimbrio, I, 265.
 Sobreoxalato de potasa, I, 265.
 Soda powder, III, 159.
 — water, I, 328.
 Sondas, III, 160.
 Sosa cáustica, I, 265.
 — cáustica líquida, I, 265.
 Sub-acetato de plomo líquido, I, 265.
 Sub-horato de sosa, I, 128.
 Sub-carbonato de amoniac, I, 266.
 — de magnesia, I, 266.
 — de plomo, I, 266.
 — de potasa, I, 266.
 — de sosa, I, 266.
 Sub-dentosulfato de mercurio, I, 266.
 Sub-fosfato de sosa, I, 266.
 Sub-hidrosulfato de antimonio, I, 211.
 — de antimonio sulfurado, I, 266.
 Sublimado corrosivo, I, 168.

- Sub-nitrato de bismuto, I,** 127.
Sucinato de amoniaco im-
puro, II, 312.
Sucino, I, 266.
Sudoríficos, III, 433.
Suero, I, 160; y **III,**
 160.
 — **antiescorbútico, III,**
 162.
 — **antiescorbútico de**
Boerhaave, III, 162.
 — **artificial, III,** 163.
 — **clarificado de la F. E.,**
III, 162.
 — **de Weis, III,** 165.
 — **emetizado, III,** 163.
 — **facticio, III,** 163.
 — **gaseoso, III,** 164.
 — **gaseoso y purgante,**
III, 164.
 — **nitrado, III,** 164.
 — **preparado de la F. E.,**
III, 161.
 — **purgante, III,** 164.
Sueros, III, 160.
Suero tamarindado, III,
 165.
Sulfato ácido de alúmina
y potasa, I, 267.
 — **de cadmio, I,** 268.
 — **de cinconina, I,** 268.
 — **de cobre, I,** 268.
 — **de cobre amoniacal, I,**
 269.
 — **de estriqnina, I,** 270.
Sulfato de hierro, I, 270.
 — **de magnesia, I,** 271.
 — **de morfina, I,** 271.
 — **de potasa, I,** 272.
 — **de quinina, I,** 272.
 — **de sosa, I,** 272.
 — **de veratrina, I,** 273.
 — **de zinc, I,** 273.
Sulfuro de antimonio, I,
 274.
 — **de cal, I,** 274.
 — **de cal de Pihorel, III,**
 165.
 — **de carbono, I,** 274.
Sulfuros de mercurio, I,
 275.
Sulfuro de potasa, I,
 275.
 — **de sosa, I,** 276.
 — **negro de mercurio, I,**
 275.
 — **rojo de mercurio, I,**
 275.
Supositorio aloético, III,
 166.
 — **anodino de los H. de**
M., III, 166.
 — **antiespasmódico, III,**
 166.
 — **antihelmíntico, III,**
 166.
 — **antihelmíntico de los**
H. de M., III, 167.
 — **antihelmíntico de Swe-**
diaur, III, 167.
 — **comun de la F. E.,**

- III, 168.
 Supositorio contra las he-
 morroides, III, 168.
 — de copaiba, III, 168.
 — de jabon, III, 169.
 — fortificante, III, 169.
 — irritante de la F. E.,
 III, 169.
 — laxante, III, 170.
 — para provocar las he-
 morroides, III, 167.
 — purgante, III, 170.
 Supositorios, I, 68; y
 III, 166.

T

- Tabaco, I, 276.
 Tabletillas, I, 62; y III,
 170.
 — anticatarrales, III,
 171.
 — antihelmínticas, III,
 171.
 — antimoniales, III,
 172.
 — contra el bocio, III,
 176.
 — de aceite de croton ti-
 glio, III, 170.
 — de ácido láctico, III,
 171.
 — de azufre compuestas,
 III, 173.
 — de azufre simples, III,
 172.
 Tabletillas de bálsamo de
 Tolú, III, 173.
 — de Calabria, III, 173.
 — de carbon y chocola-
 te, III, 174.
 — de catecú, III, 175.
 — de cianuro de oro y
 chocolate, III, 175.
 — de cloruro de cal, III,
 175.
 — de cloruro de cal de
 Deschamps, III, 176.
 — de Daubenton, III,
 178.
 — de esponja tostada, III,
 176.
 — de gelatina de liquen,
 III, 177.
 — de hierro, III, 180.
 — de ipecacuana y cho-
 colate, III, 178.
 — de kermes, III, 178.
 — de liquen de Robinet,
 III, 177.
 — de magnesia, III, 179.
 — de magnesia y de ca-
 tecú, III, 179.
 — de quina, III, 180.
 — de ruibarbo, III, 181.
 — desinfectantes, III,
 175.
 — de sub-nitrato de bis-
 muto, III, 181.
 — de vida, III, 182.
 — de yerbabuena de sabor
 de pimienta, I, 290.

- Tabletillas incisivas pectorales, III, 178.
 — marciales, III, 179 y 180.
 — purgantes para los niños, III, 180.
 — vermífugas de santónico, III, 181.
 Tafetan de Inglaterra, II, 22.
 — de Inglaterra, II, 75.
 Tafetanes, III, 182.
 — vejigatorios, III, 182.
 Tafetan vejigatorio de Guibert, III, 183.
 — vejigatorio de torbisco, III, 183.
 Tamarindo, I, 277.
 Tanaceto, I, 278.
 Tanino, I, 278.
 Tapioca, I, 278.
 Taraxacon, I, 169.
 Tártaro emético, I, 278.
 — estibiado, I, 280.
 — vitriolado, I, 272.
 Tartrato ácido de potasa, I, 280.
 — antimoniado de potasa, I, 278.
 — de potasa neutro, I, 280.
 — de potasa y hierro, I, 280, y III, 184.
 — de potasa y sosa, I, 281.
 Tártaro marcial soluble, I, 280.
 — soluble, I, 280.
 Te, I, 281.
 — de España, I, 281.
 — de las matronas americanas, II, 167.
 — de salud, II, 83.
 — pectoral de Boerhaave, III, 185.
 — tunka, III, 185.
 Tesoro para la boca, III, 186.
 Tierra foliada de tártaro, I, 83.
 — foliada mercurial, I, 82.
 — foliada mineral, I, 83.
 — japónica, I, 282.
 Tilo, I, 282.
 Tintura alcohólica de acibar compuesta de la F. E., II, 14.
 — alcohólica de ajeno, I, 98.
 — alcohólica de almáciga, I, 105.
 — alcohólica de almizcle, I, 46 y 108.
 — alcohólica de ambar gris, I, 46 y 109.
 — alcohólica de azafran, I, 46 y 117.
 — alcohólica de bálsamo de Tolú, I, 46 y 121.

- Tintura alcohólica de benjuí, I, 46 y 124.
- alcohólica de bulbo de cólchico, I, 47 y 162.
- alcohólica de bulbo de escila, I, 47 y 147.
- alcohólica de cainca, III, 187.
- alcohólica de cainca amoniaca, III, 187.
- alcohólica de canela, I, 46 y 135.
- alcohólica de cantáridas, I, 136.
- alcohólica de cantáridas de la F. E., III, 187.
- alcohólica de castóreo, I, 46 y 144.
- alcohólica de corteza de cascarilla, I, 46 y 144.
- alcohólica de catecú, I, 47 y 145.
- alcohólica de clavo de especia, I, 46 y 155.
- alcohólica de contra-yerba, I, 46 y 165.
- alcohólica de corteza de naranja de la F. E., III, 199.
- alcohólica de digital purpúrea, I, 170.
- Tintura alcohólica de énula campana, I, 177.
- alcohólica de escamonea de Alepo, I, 46 y 177.
- alcohólica de gengibre, I, 46.
- alcohólica de goma amoniaco, I, 46 y 192.
- alcohólica de hipericon vulneraria de la F. E., III, 188.
- alcohólica de hojas de acónito, I, 47 y 94.
- alcohólica de hojas de ajeno, I, 47.
- alcohólica de hojas de ásaro, I, 46.
- alcohólica de hojas de beleño, I, 47.
- alcohólica de hojas de belladona, I, 47.
- alcohólica de hojas de cicuta, I, 47.
- alcohólica de hojas de digital, I, 46.
- alcohólica de hojas de estramonio, I, 47 y 182.
- alcohólica de hojas de sen, I, 47 y 263.
- alcohólica jabonosa de opio de la F. E., III, 189.
- alcohólica de las go-

- mo-resinas, I, 46.
- Tintura alcohólica de los jugos resinosos, I, 46.
- alcohólica de mirra, I, 46 y 226.
- alcohólica de mirra uterina de la F. E., III, 190.
- alcohólica de nuez vómica, I, 46 y 233.
- alcohólica de opio de la F. E., III, 216.
- alcohólica de palo de guayaco, I, 47.
- alcohólica de pelitre, I, 46 y 241.
- alcohólica de pelitre floja, III, 189.
- alcohólica de quina, I, 47, 250 y 251.
- alcohólica de quina amarilla, I, 47, 250 y 251.
- alcohólica de quina compuesta de la F. E., III, 190.
- alcohólica de quina roja, I, 47, 450 y 451.
- alcohólica de raíz de eléboro negro, I, 46 y 173.
- alcohólica de raíces de énula campana, I, 47.
- alcohólica de raíz de genciana, I, 47 y 191.
- Tintura alcohólica de raíz de ipecacuana, I, 47 y 210.
- alcohólica de raíz de jalapa, I, 47 y 211.
- alcohólica de raíz de quasia amarga, I, 47 y 248.
- alcohólica de raíz de ruibarbo, I, 47 y 256.
- alcohólica de raíces de valeriana, I, 47 y 286.
- alcohólica de tremena, I, 46 y 248.
- alcohólica de vainilla, I, 46 y 286.
- alcohol-sulfúrica de genciana compuesta de la F. E., II, 19.
- alexifarmaca de Huxham de la F. E., III, 190.
- anisada de Alibert, III, 191.
- anticólica de Palacios, de la F. E., III, 192.
- antiescorbútica, III, 192.
- antiespasmódicas de Keup, III, 193.
- antihidrópica, III, 193.
- antihistérica, III, 200.
- anti venérea, III, 194.

- Tintura aromática , III, 195.
- aromática de arnica, III, 195.
- calmante , III, 196.
- con las hojas frescas de acónito , I, 94.
- con las hojas frescas de belladona , I, 124.
- con las hojas secas de belladona , I, 124.
- con las hojas secas de cicuta , I, 152.
- contra las ascarides, III, 198.
- corroborante de With de la F. E., III, 199.
- de aceite de croton tiglio , III, 186.
- de acibar , I, 84.
- de acibar compuesta, III, 186.
- de alcanfor compuesta , II, 13.
- de almagre compuesta, III, 189.
- de ambar balsámica, III, 191.
- de antimonio , III, 194.
- de angélica , I, 111.
- de asa fétida , I, 46 y 115.
- de asa fétida compuesta , III, 196.
- de beleño con las hojas frescas , I, 122.
- Tintura de beleño con las hojas secas , I, 122.
- de benjuí compuesta, III, 196.
- de Bestuchef , I, 159.
- de cainca , I, 132.
- de cálamo aromático compuesta , III, 198.
- de canela compuesta, III, 197.
- de cardamomo compuesta , III, 197.
- de cardamomo menor , I, 141.
- de cariofilea , I, 143.
- de cáscara de naranja , I, 229.
- de centeno cornezuelo , II, 225.
- de cianuro de mercurio , III, 198.
- de corteza de angustura verdadera , I, 112.
- de corteza de naranja compuesta de la F. E., II, 9.
- de Daffy , III, 199.
- de elaterina , III, 200.
- de espliego compuesta , III, 201.
- de extracto oleo-resinoso de cubebas , III, 205.
- de felandrio , III, 206.

- Tint. de gálbano, I, 190.
 — de genciana amoniacal, III, 206.
 — de genciana compuesta, III, 206.
 — de gencianino, III, 207.
 — de goma kino, I, 193.
 — de guayaco, I, 197.
 — de guayaco compuesta, III, 207.
 — de hidriodato de hierro, III, 207.
 — de hollin, I, 202; III, 208.
 — de hollin fétida, III, 196.
 — de iodo, III, 208.
 — de iodo debilitada, III, 209.
 — de iodo de los H. M., III, 208.
 — de iodo de Lugol, I, 319.
 — de ioduro de potasio, III, 209.
 — de ipecacuana anisada, III, 209.
 — de jabon, III, 209.
 — de lechuga, I, 214.
 — legixial, III, 210.
 — de lobelia inflata, III, 210.
 — de lupulina, III, 210.
 — de malato de hierro, III, 211.
 Tintura de marte tartarizada, III, 211.
 — de monesia, I, 226.
 — de nuez de agalla compuesta, III, 213.
 — de nuez vómica, III, 214.
 — de nuez vómica amoniacal, III, 214.
 — de opio alcanforada, II, 13.
 — de opio amoniacal, III, 215.
 — de opio compuesta, III, 215.
 — de rábano compuesta, III, 192.
 — de renuevos de helecho macho, III, 216.
 — alcohólica de resina de guayaco, I, 46 y 197.
 — de ruibarbo compuesta, III, 216.
 — de ruibarbo de Spielman, III, 217.
 — de ruibarbo inglés, III, 217.
 — de semillas de cólchico, III, 218.
 — de sucino, I, 266.
 — de zumaque venenoso, I, 292.
 — etérea de acetato de hierro, III, 203.
 — etérea de acónito, I, 48 y 94.

- Tintura etérea de almizcle, I, 49 y 108.
- etérea de ambar gris, I, 49 y 109.
- de asa fétida, I, 49 y 116.
- etérea de bálsamo de Tolú, I, 49.
- etérea de beleño, I, 48 y 122.
- etérea de belladona, I, 48 y 124.
- etérea de cantáridas, I, 136.
- etérea de castoreo, I, 48 y 145.
- etérea de cicuta, I, 48 y 152.
- etérea de digital purpúrea, I, 48 y 170.
- etérea de flores de arnica, I, 48 y 113.
- etérea de Klaproth, III, 204.
- etérea de las gomas-resinas, I, 49.
- etérea de las resinas, I, 49.
- etérea de percloruro de hierro, III, 204.
- etérea de raíz de pebete, I, 48.
- etérea de raíz de valeriana, I, 48.
- etérea de succino, I, 49 y 266.
- Tintura etérea de tabaco, I, 48 y 277.
- etérea de valeriana, I, 286.
- etérea de yerba mora, I, 48.
- elástica, III, 200.
- estomacal, III, 202.
- estomacal amarga, III, 201.
- estomacal de la F. M., III, 202.
- estomacal de Moscati, III, 203.
- febrífuga de Clutton, III, 205.
- fortificante de Bremser, III, 153.
- hidrólica de cainca, III, 207.
- hidrólica especial, II, 266.
- nerval y tónica, III, 212.
- nervino-tónica, III, 213.
- odontálgica de la F. M., III, 214.
- oenólica de cainca, III, 319.
- paregórica de la F. E., III, 216.
- purgante, II, 14.
- Tinturas, I, 45; III, 286.
- Tintura sagrada, III, 217.

- Tinturas alcohólicas, I, 45.
- etéreas, I, 46.
- Tintura tebáica, III, 218.
- vinosa de hierro tartarizada de la F. E., III, 218.
- vinosa de opio anticólica de la F. E., III, 192.
- vinosa de opio de Sydenham de la F. E., II, 285.
- volátil de guayaco, III, 220.
- volátil de guayaco de Dewees; III, 219.
- vulneraria, III, 220.
- Tisana alcalina, III, 220 y 221.
- angélica, III, 226.
- anticólica de la F. E., III, 221.
- antiépsórica, III, 222.
- antiescorbútica, III, 222.
- antiespasmódica, III, 222.
- antiherpética, III, 223.
- antisifilítica de Arnoud, III, 223.
- antisifilítica de Dupuytren, III, 223.
- aperitiva de los H. M., III, 224.
- Tisana astringente, III, 224.
- astringente de Chaptal, III, 225.
- astringente de los H. M., III, 225.
- atemperante de los H. de M., III, 225.
- carminativa, III, 227.
- clorurada, III, 226.
- comun, III, 227.
- con anís, I, 33.
- con ciruelas, I, 36.
- contra la piedra, III, 228.
- contra las escrófulas, III, 227.
- de achicorias, I, 33, 34 y 97.
- de amapola, I, 108.
- de angélica, I, 33.
- de apio, I, 33.
- de Arnoud, III, 223.
- de arroz, I, 36 y 114.
- de arroz gomosa, III, 224.
- de arroz y catecú, III, 224.
- de artemisa, I, 34.
- de avena, I, 116.
- de azufaitas, I, 36.
- de bardana, I, 33 y 121.
- de boj, I, 33.

- Tisana de borraja , I, 34 y 129.
 — de Buchan, III, 226.
 — de cainca compuesta, III, 227.
 — de Callac de la F. E., I, 462.
 — de camedrios , I, 34.
 — de caña, I, 34.
 — de cañafístula , I, 137.
 — de cardo corredor, I, 33.
 — de cardo santo , I, 34 y 142.
 — de cáscara de naranjas amargas , I, 36.
 — de cebada , I, 146.
 — de cebada perlada, I, 36.
 — de centaurea menor, I, 35 y 148.
 — de consuelda, I, 34.
 — de corteza de quina, I, 250.
 — de culantrillo , I, 34.
 — de dátiles , I, 36.
 — de Datisbuis , III, 228.
 — de émula campana , I, 33 y 177.
 — de escabiosa , I, 34.
 — de escolopendra , I, 34.
 — de escordio, I, 34.
 — de esparraguera, I, 33.
- Tisana de Feltz, III, 233.
 — de flores de amapola, I, 35.
 — de flores de arnica, I, 35 y 113.
 — de flores de gordolobo, I, 35.
 — de flores de manzanilla, I, 35.
 — de flores de matricaria, I, 35.
 — de flores de saúco , I, 35 y 262.
 — de fresa , I, 33.
 — de fumaría, I, 34.
 — de grama, I, 34 y 195.
 — de guayaco, I, 196.
 — de guayaco y dafne meceron, III, 234.
 — de harina de avena mondada, I, 36.
 — de helecho macho, I, 33.
 — de higos , I, 36.
 — de hisopo, I, 34.
 — de la simiente de lino, I, 36.
 — de los frutos de anís estrellado, I, 36.
 — de los frutos de enebro, I, 36.
 — de los frutos del phellandrium aquaticum, I, 36.
 — de lúpulo , I, 35.

- Tisana de malva, I, 35 y 219.
- de malvabisco, I, 33, 35 y 219.
- de marrubio, I, 35.
- de melisa, I, 35.
- de musgo marino perlado, I, 228.
- de naranjo, I, 34.
- de olmo piramidal, I, 234.
- de orégano, I, 35.
- de paciencia, I, 33 y 139.
- de parietaria, I, 34.
- de polígala, I, 33.
- de polígala amarga, I, 244.
- de polígala virginiana, I, 245.
- de quasía amarga, I, 33 y 248.
- de quina amarilla, I, 33.
- de quina gris, I, 33.
- de quina roja, I, 33.
- de rábano, I, 33.
- de ratania, I, 33.
- de rosas rojas, I, 35.
- de saponaria, I, 33 y 34.
- de sasafrás, I, 33 y 261.
- de saúco, I, 33.
- de sen, I, 34.
- de simaruba, I, 33 y 265.
- Tisana de tamarindo, I, 277.
- de tilo, I, 35 y 282.
- de trinitaria silvestre, I, 34.
- de tusilago, I, 35.
- de valeriana, I, 33 y 286.
- de verónica, I, 34.
- de Vigaroux, III, 239.
- de Vinache, III, 241.
- de violetas, I, 35.
- de yedra terrestre, I, 35.
- de yemas de abeto, I, 33.
- de zarzaparrilla, III, 241.
- de zarzaparrilla compuesta, III, 242.
- diaforética, I, 234.
- diaforética de Brera, III, 229.
- diaforética de Gimelle, III, 229.
- diaforética de los H. M., III, 229.
- diurética de Dubois, III, 231.
- diurética de Foy, III, 231.
- diurética de Recamier, III, 231.
- emenagoga, III, 232.

- Tisana emoliente de los H. M., III, 232.
- emulsionada, III, 232.
- emulsionada y nitrada, III, 233.
- iodada, III, 235.
- laxante de los H. de M., III, 221.
- lusitana, III, 235.
- pectoral de los H. M., III, 236.
- portátil de zarzaparrilla, II, 96.
- purgante de los H. de M., III, 236.
- real, III, 236.
- refrigerante y atemperante en polvo, III, 237.
- Tisanas, I, 32, y III, 220.
- diuréticas, III, 230.
- Tisana seca, III, 34.
- simple de los H. M., III, 228.
- sudorífica, III, 237, 238 y 257.
- sudorífica de Dubois, III, 238.
- sudorífica de los H. M., III, 238.
- sudorífica económica, III, 239.
- sudorífica laxante, III, 258.
- Tisana vinosa, I, 379.
- Tomillo, I, 282.
- Tónicos, III, 425.
- Tópico antisifilítico, III, 242.
- aurífero, III, 242.
- calmante, III, 243.
- calmante de Pougens, III, 243.
- contra el acné, III, 243.
- contra las manchas hepáticas, III, 244.
- contra los sabañones, III, 244.
- contra los sabañones, de Haffeland, III, 244.
- Tópicos, III, 242.
- Torbisco, I, 282.
- Tormentila, I, 283.
- Toronjil, I, 283.
- Tratamiento antihidrofóbico por Gottlieb de Schallern, III, 245.
- antisifilítico de Dupuytren, III, 253.
- antisifilítico de Zittmann, III, 248.
- de Dupuytren contra la hidropesía pasiva del tejido celular, III, 269.
- de Dupuytren contra la inflamación de la

- retina , III, 251.
- Tratamiento de Dzondi modificado, III, 247.
- de la Caridad, III, 256.
- de la sífilis de Dzondi, III, 247.
- de las neuralgias por la trementina, III, 266.
- del cólico de plomo de Solon, III, 266.
- del cólico de plomo de Ranque, III, 261.
- Tratamientos especiales, III, 245.
- Trebol de agua, I, 283.
- Trementina, I, 284.
- cocida, I, 284.
- Triaca magna, I, 526.
- Tridacio, I, 285.
- Trifolio fibrino, I, 283 y 285.
- Trociscos, I, 63, y III, 270.
- antihelmínticos de la F. M., III, 270.
- blancos de Rhasis, III, 271.
- de Alhandal de la F. E., III, 270.
- de cálamo aromático de Hedicroy de la F. E., III, 274.
- de carbonato de plomo alcanforado de la F. E., III, 271.
- Trociscos de cubebas, III, 271.
- de Chaussier, III, 272.
- de fruto de coloquin-tida de la F. E., III, 270.
- de Hedicroy de la F. E., III, 274.
- de minio, III, 273.
- de muriato oxigenado de mercurio de la F. E., III, 272.
- de Ramich de la F. E., III, 274.
- escaróticos de la F. E., III, 272.
- escilíticos de la F. E., III, 273.
- Tucia, I, 238.
- Tuétano de vaca, I, 222.
- Turbit mineral, I, 266.
- Tusílagó, I, 285.

U

- Ungüento amoniacoal, III, 277.
- antihelmíntico, III, 277.
- antihemorroidal, III, 277.
- basilicon de la F. E., III, 279.
- basilicon negro de la

- F. E., III, 279.
- Ung. blanco alcanforado, III, 280.
- blanco de los H. M., III, 280.
- blanco de Rhassis de la F. E., III, 280.
- bruno, III, 281.
- citrino de la F. E., III, 282.
- contra la tiña, III, 283.
- contra la tiña con carbon animal de los H. de M., III, 284.
- contra la tiña con carbon vegetal de los H. de M., III, 283.
- contra los herpes, de la F. E., III, 283.
- de acetato de plomo de la F. E., III, 275 y 294.
- de Alderete de la F. E., III, 276.
- de altea de la F. E., III, 276.
- de Arceo de la F. E., III, 277.
- de artanita compuesto de la F. E., III, 278.
- de calabaza, III, 281.
- de cantáridas de la F. E., III, 286.
- de cobre, III, 282.
- Ung. de colofonia amarillo de la F. E., III, 279.
- de estoraque, III, 286.
- de estoraque de los H. de M., III, 287.
- de Falck, III, 287.
- de la abadía de Bec, III, 275.
- de la Condesa, de la F. E., III, 282.
- de Lamère, de la F. E., III, 291.
- del Duque, III, 284.
- de lúpulo, III, 289.
- de mercurio de la F. E., III, 291.
- de mercurio de la F. E., III, 291.
- de mercurio dulce de la F. E., III, 283.
- de mercurio duplicado, III, 291.
- de mercurio oxigenado de la F. E., III, 276.
- de mercurio terciado de los H. M., III, 291.
- de minio de los H. M., III, 290.
- de Montpellier, III, 292.
- de muriato de mercurio oxigenado de la F. E., III, 276.

- Ungüento de nitrato de mercurio de la F. E., III, 282.
- de óxido de cobre de la F. E., III, 285.
- de óxido de plomo rojo de la F. E., III, 289.
- de Piderit, III, 296.
- de Plenck contra los sabañones, III, 297.
- de plomo de la F. E., III, 297.
- de propoleos, III, 298.
- de Ricour, III, 299.
- de ruda, III, 300.
- de saúco de la F. E., III, 300.
- de Swediaur contra los sabañones, III, 301.
- de tomate, III, 301.
- de tuéia, III, 302.
- de tuétano de vaca de la F. E., III, 302.
- diurético, III, 284.
- egipciaco de la F. E., III, 285.
- egipciaco de los H. M., III, 285.
- epilatorio, II, 67.
- epispástico, III, 285.
- epispástico de Cadet, III, 286.
- epispástico de la F. E., III, 286.
- Ungüento fundente opiado, III, 288.
- hemorroidal, III, 288.
- hemorroidal de la F. M., III, 288.
- madurativo, III, 289.
- magistral de la F. E., III, 289.
- marciaton de la F. E., III, 290.
- mercurial blanco, III, 290.
- negruzco de óxido de plomo de la F. E., III, 291.
- nervino, III, 293.
- nutrido de la F. E., III, 294.
- oftálmico, III, 294.
- oxigenado, III, 295.
- oxigenado mercurial, III, 295.
- para las quemaduras de los H. M., III, 296.
- para la sarna, de los H. M., III, 296.
- populeon de la F. E., III, 297.
- rosado de la F. E., III, 299.
- Ungüentos, I, 66, y III, 275.
- Ungüento vermífugo, III, 302.
- Urea, I, 285.

V

- Vainilla, I, 285.
 Valeriana, I, 286.
 Vejigatorio amoniacal,
 III, 303.
 — de Bouvoisin, III,
 303.
 — de Bretonneau, III,
 304.
 — de Gondret, III, 304.
 — de Lecomte, III, 305.
 — de Louyer Villermay,
 III, 305.
 — de Trousseau, III,
 306.
 — de Wauters, III, 306.
 — económico, III, 304.
 — inglés, II, 43.
 — magistral, III, 305.
 Vejigatorios, III, 303.
 Vencetósigo, I, 287.
 Venenos cáusticos, III,
 391.
 — corrosivos, III, 391.
 — irritantes, III, 391.
 — narcótico-acres, III,
 400.
 — narcóticos, III, 398.
 — pútridos, III, 403.
 — sépticos, III, 403.
 Veratrina, I, 287.
 Verbena, I, 287.
 Verde gris, I, 81.
 Verdete, I, 81.
 Vermífugos, III, 450.
 Verónica, I, 287.
 Vinagre, I, 84 y 85.
 — alcanforado, I, 101.
 — alcanforado de Spiel-
 mann, III, 307.
 — antiséptico alcanfo-
 rado de la F. E., III,
 309.
 — aromático inglés, III,
 307.
 — bezoárdico de Berlin,
 III, 308.
 — cólclico, III, 308.
 — de ajo, I, 99.
 — de café, III, 308.
 — de cebolla albarrana,
 I, 147.
 — de claveles, I, 51.
 — de cólclico, I, 50.
 — de espliego, I, 51; y
 III, 311.
 — de frambuesas, I,
 51.
 — de flores de saúco, I,
 51 y 262.
 — de los frutos rojos, I,
 51.
 — de hierro, III, 311.
 — de los cuatro ladro-
 nes, de la F. E., III,
 309 y 310.
 — de opio, III, 311.
 — de pimienta de Indias,
 III, 312.

- Vinagre de romero, I, 51 y 254.
 — de salvia, I, 51 y 260.
 — escilítico, I, 50; y III, 310.
 Vinagres medicinales simples, I, 50.
 Vinagre radical, I, 84.
 — rosado, I, 50.
 — rosado de la F. E., III, 312.
 Vinagres, III, 307.
 Vino, I, 288.
 — amargo alcoholizado, II, 6.
 — amargo aromático, III, 314.
 — amargo de Dabois, III, 314.
 — amargo y diurético, III, 315.
 — amargo y diurético de la Caridad, III, 315.
 — antiapoplético, III, 316.
 — antiescorbútico, III, 316.
 — antihidrópico, III, 317.
 — antiictérico, III, 317.
 — antileucorreico, III, 317.
 — antimoniado de la F. E., III, 318.
 Vino aromático, III, 318.
 — aromático con tanino, III, 319.
 — aromático opiado, III, 319.
 — con miel, III, 321.
 — de acetato de hierro líquido, III, 313.
 — de ajenjos, I, 49.
 — de ajenjo, I, 98.
 — de ajenjos, III, 313.
 — de Balardini, III, 319.
 — de cainca, I, 132, y III, 319.
 — calibeado, III, 320.
 — calibeado de Parmentier, III, 320.
 — de cantáridas, III, 320.
 — de cebolla albarrana, I, 147.
 Vino de cinchonina, III, 320.
 — de citrato de hierro, III, 321.
 — de colchico, I, 162.
 — de colchico de Locher Balber, III, 321.
 — de ónula campana, I, 177.
 — de estramonio, III, 325.
 — de Fordyce, III, 326.

- Vino de genciana, I, 191.
- de guayaco con elébore, III, 327.
- de hidriodato de hierro, III, 327.
- de Huxham, III, 328.
- del fruto de ciprés compuesto de la F. E., III, 324.
- de opio obtenido por fermentacion, II, 286.
- de óxido de antimonio de la F. E., III, 323.
- de quina, I, 250.
- de raiz de énula campana, I, 50.
- de ruibarbo compuesto, III, 328.
- de Leguin, III, 329.
- de semillas de cólchico, III, 322.
- de sulfato de quinina, III, 330.
- de zarzaparrilla, III, 331.
- diurético amargo de la Caridad, III, 322.
- diurético inglés, III, 322.
- emético claro de los H. de M., III, 318.
- emético de la F. E., III, 318.
- Vino emético turbio de la F. E., III, 323.
- escilítico, III, 323.
- escilítico de los H. de M., III, 324.
- escilítico de Richard, III, 323.
- estíptico de la F. E., III, 324.
- estomacal, III, 324.
- febrífugo, III, 325.
- febrífugo de S., III, 326.
- febrífugo de quina, III, 325.
- hidragogo, III, 327.
- marcial de los H. de M., III, 320.
- medicinal, II, 18.
- rosado, III, 328.
- Vinos, III, 313.
- medicinales, I, 49.
- Vino sudorífico, III, 329.
- tónico amargo, III, 330.
- triacal, III, 330.
- Violeta, I, 289.
- Vitriolo azul, I, 268.
- blanco, I, 273.
- verde, I, 270.
- Vomi-purgativo de Le Roy, III, 331.
- Vomitivos, III, 439.

W

Wakaka, III, 332.

Winter, I, 289.

Y

Yedra terrestre, I, 289.

Yerbabuena, I, 290.

— de sabor de pimienta,
I, 289.

— elegante, I, 290.

— rizada, I, 290.

— verde, I, 290.

Yerba de los pordioseros,
I, 155.

— lombriguera, I, 278.

— mora, I, 290.

— pulguera, I, 290.

Yerbas carminativas de
la F. M., II, 80.— emolientes de la E. M.,
II, 81.

Z

Zaragatona, I, 290.

Zarzaparrilla, I, 291.

— iodurada, I, 291.

Zedoaria redonda, I, 292.

Zibeto, I, 104.

Zinkater, II, 107.

Zumaque, I, 292.

— venenoso, I, 292.

Zumos acuosos, I, 30.

Zumos antiescorbúticos,
I, 161.

Zumo de acedera, I, 74.

— de achicoria, I, 30
y 97.

— de agracejo, I, 96.

— de bayas de saúco, I,
31.— de bayas de yezgo, I,
31.

— de berberis, I, 125.

— de borraja, I, 129.

— de cardo estrellado,
I, 142.— de celedonia mayor,
I, 147.

— de coclearia, I, 160.

— de corteza de raíz de
saúco, I, 31.— de diente de león, I,
169.

— de escabiosa, I, 177.

— de escordio, I, 178.

— de espino cerval, I,
31 y 180.— de estramonio, I, 31
y 182.

— de frambuesa, I, 186.

— de fresa, I, 187.

— de fumaría, I, 189.

— de grama, I, 195.

— de grosellas, I, 196.

— de hojas de bellado-
na, I, 31.— de hojas de cicuta, I,
31.

- Zumo de jabonera, I, 210.
 — de las plantas verdes, I, 31.
 — de limon, I, 274.
 — de lirio de Florencia, I, 216.
 — de llanten, I, 217.
 — de matricaria, I, 222.
 — de moras, I, 31 y 226.
 — de parietaria, I, 240.
 — de pétalos de rosa, I, 31.
 — de rábano rusticano, I, 252.
 — de siempreviva mayor, I, 264.
 — de tanaceto, I, 278.
- Zumo de trebol de agua, I, 284.
 — de verónica, I, 288.
 — de yerbas antiescorbúticas, III, 332.
 — de yerbas depurativo, III, 332.
 — de yerbas diurético, III, 333.
 — de yerbas fundente, III, 333.
 — de yerbas purgante, III, 334.
 — esprimido, I, 151.
 — esprimido de beca-bunga, I, 121.
 — esprimido de berros, I, 125.
 Zumos, III, 332.

FIN.

ERRATAS DEL TOMO III.

<u>Pág.</u>	<u>Lin.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
51	21	GRIMALDIO	GRIMALDI
81	22	OTRO	POMADA ANTIHERPÉTICA
85	5	ANTIHERPÉTICA	ANTIOFTÁLMICA
256	8	hay	no hay
282	10	<i>Añádase</i>	<i>I. Sarna.</i>
295	8	bálsamo	aceite oxigenado mercurial antiherpético.
370	20	libre	libre ,

ADICIONES.

Pág. 206, tomo I. *Ioduro de iodhidrato de morfina*. Se obtiene mezclando una disolución de sulfato ácido de morfina con otra disolución de ioduro de potasio iodurado, y manteniendo los líquidos durante una hora á la temperatura de 60°; se decanta el líquido, se lava el residuo, se le recoge sobre un filtro y se le deja secar.

Pág. 206, tomo I. *Ioduro de iodhidrato de estriocina*. Se prepara vertiendo una disolución de ioduro de potasio iodurado, en otra disolución de una sal de estriocina; se seca el precipitado, se le disuelve con alcohol á 85° hirviendo y se precipita por el enfriamiento.

Pág. 207, tomo I. *Ioduro de iodhidrato de quinina*. Se prepara vertiendo en una disolución ácida de quinina otra disolución de ioduro de hierro, que contenga un ligero exceso de iodo; se trata por el alcohol hirviendo el precipitado de color de castaña que se forma, se le filtra y se obtiene el ioduro por el enfriamiento.

Pág. 208, tomo I. *Ioduro de mercurio y morfina*. Se obtiene tratando por el alcohol hirviendo una mezcla de partes iguales de biioduro de mercurio y de iodhidrato de morfina. El precipitado obtenido por el enfriamiento es el ioduro.

Pág. 208, tomo I. *Ioduro de zinc y estriocina*. Se obtienen calentando durante muchos días agua de ioduro de iodhidrato de estriocina y del zinc; se filtran los líquidos hirviendo y cristaliza por el enfriamiento.

Pág. 209, tomo I. *Ioduro de zinc y morfina.*
Se obtiene hirviendo una parte de ioduro de iodhidrato de morfina con cincuenta partes de agua y diez de zinc. Después de algunos días se filtra el líquido hirviendo y se obtiene el ioduro por el enfriamiento.

JARABE DE IPECACUANA.

Extracto alcohólico de ipecacuana, *una onza.*

Agua pura, *ocho onzas.*

Jarabe simple, *doce libras.*

Se disuelve el extracto en el agua y se filtra; se echa la disolución en el jarabe hirviendo, se cuece hasta su debida consistencia y se cuela.

Cada onza contiene cuatro granos de extracto y representa 16 granos de la raíz. *D.* De media á dos onzas.

ANTRAKOKALI.

Este nuevo medicamento, inventado por Polya, se llama así de anthrax, *carbon*, y kali, *potasa*. Es simple ó sulfurado. El primero se prepara disolviendo carbonato de potasa en diez ó doce partes de agua hirviendo; se echa sucesivamente en esta disolucion toda la cal apagada necesaria para dejar aislada la potasa; por medio de esta manipulacion se obtiene potasa cáustica y carbonato de cal insoluble; se filtra el liquido, se le pone despues al fuego en una vasija de hierro, y se le deja evaporar hasta que no se forme espuma ni efervescencia, y el liquido presente una superficie unida como el aceite; entonces se le mezcla, meneando, con carbon de tierra porfirizado en la proporcion de ciento sesenta partes de carbon por ciento noventa y dos de potasa. Entonces se aparta la vasija del fuego, y se continúa agitando la preparacion en un mortero hasta que se haya convertido en un polvo negro homogéneo, que se conserva en un sitio seco y en frascos que se habrán calentado previamente. El antrakokali sulfurado se prepara mezclando con mucho cuidado diez y seis partes de flores de azufre con carbon de tierra, y se disuelve esta mezcla en la potasa cáustica del mismo modo que el anterior.

El antrakokali es un polvo negro, muy ténue, que tiñe el dedo cuando se le toca, de sabor subalcalino acre, y produce sobre la lengua una sensacion de quemadura; el antrakokali simple no tiene olor ó le tiene de hollin, y el sulfurado tiene un olor hidrocianico. Absorben la humedad del aire, pero no se liqnidan, y sus moléculas se hacen mas co-

herentes: expuesto al aire seco pierde su humedad y su sabor alcalino. Es muy soluble en el alcohol y en el agua, sin cambiar de temperatura.

Este nuevo medicamento, según expone Polya obra como un poderoso sudorífico; el antrakokali simple produce excelentes efectos en los herpes cuando no están complicados, y el sulfuroso en los herpes consecutivos á la sarna. En los casos en que los herpes están complicados con la sarna, con las afecciones sífilíticas ó con una diatesis cancerosa, Polya propone se le combine con otros medicamentos. Además, este medicamento es muy útil en las escrófulas que han resistido al uso del iodo, del mercurio y del azufre; cura también con mucha prontitud las concreciones tofaceas de la gota, las hinchazones articulares reumáticas y las hidrartrosis no purulentas; es muy útil en los reumatismos crónicos.

El modo de obrar de este medicamento es muy lento, principalmente el del antrakokali simple; pero sus efectos son más seguros que los del sulfurado.

La duración del tratamiento en los enfermos jóvenes, y cuyo régimen es vegetal, es comunmente de seis meses cuando más; pero si el enfermo tiene de cuarenta á setenta años, es necesario continuar con el uso del remedio durante doce y aun diez y ocho meses.

Una fiebre accidental es una contraindicación del uso del antrakokali; pero puede administrarse al mismo tiempo que el mercurio y el azufre.

El régimen que deben observar los enfermos es puramente vegetal, sin usar los ácidos ni las carnes; es muy útil el uso del agua.

La fórmula que emplea Polya contra los herpes simples es la siguiente:

Antrakokali simple, *dos granos.*

Polvo de raíz de regaliz ó carbonato de magnesia , cinco granos.

M. S. A. Se dan tres de estas dosis al día.

En los herpes complicados con sarna , se une el antrakokali simple ó sulfurado con las flores de azufre.

Antrakokali simple ó sulfurado , dos granos.

Flores de azufre lavadas , cinco granos.

Carbonato de magnesia ó polvo de raíz de regaliz , tres granos.

M. S. A. y se usan como el anterior.

Los herpes sifilíticos exigen el uso del antrakokali y del mercurio ; si existen úlceras sifilíticas primitivas ó una blenorragia sifilítica , se usan los calomelanos ó el mercurio soluble de Hahnemann.

Antrakokali simple , dos granos.

Calom. ó mercurio soluble de Hahnemann , de una quinta parte á dos quintas partes de grano.

Polvo de raíz de regaliz , tres granos.

M. S. A. D. La misma que el anterior.

Pero si la sífilis es constitucional , se dan además por separado las píldoras siguientes :

Deuto-cloruro de mercurio , un grano.

Se disuelve en

Espíritu de vino , *c. s.*

y se añade á la disolucion

Extracto de regaliz sólido , *c. s.*

para hacer veinte píldoras , que se rodearán de polvo de regaliz.

Todos los días el enfermo tomará cinco píldoras despues de comer , y cada tres días se aumentarán dos hasta que haya tomado el enfermo doce granos de sublimado , segun el método de Dzondi ; con estas píldoras se usa tambien el antrakokali solo ó combinado con las flores de azufre , segun las fórmulas anteriores.

El herpes desarrollado á la vez bajo la influencia del virus sifilitico y epsórico cede al uso combinado del antrakokali, de las flores de azufre y del mercurio, cuyos efectos se auxilian por el uso de las tisanas sudorificas.

El doctor Polya combate la lepra con el antrakokali y el antimonio.

Antrakokali simple ó sulfurado, *dos granos.*

Azufre dorado de antimonio ó	} <i>a. tres granos.</i>
antimonio crudo.	
Carbonato de magnesia ó.	
Polvo de regaliz.	

Cuando el herpes está complicado con una diatesis cancerosa, se combina el iodo con el antrakokali y con las flores de azufre.

Iodo puro, *un grano.*

Hidriodato de potasa, *dos granos.*

Se disuelve en:

Agua destilada simple, *dos onzas.*

Se empieza por cuatro gotas, mañana y tarde, y diariamente se aumentan dos, hasta llegar á diez ó catorce gotas, dosis que se continúa mañana y tarde.

El buen éxito que se consigne con este tratamiento depende del buen diagnóstico respecto á las complicaciones y de la eleccion juiciosa del remedio. Pero como las complicaciones se manifiestan algunas veces al mismo tiempo que la enfermedad, y otras durante su tratamiento y despues que se ha triunfado de una de estas diatesis, que tienen á la enfermedad dominada por su influencia, tambien las fórmulas muy compuestas citadas anteriormente, son las recomendadas por la necesidad.

ERRATAS DEL TOMO I.

<u>Pág.</u>	<u>Lin.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
24	18	alcoholados	alcoholatos
78	29	LAUREI	LAUREL
104	9	ALGARROBO	ALGARROBA
108	11	<i>Añádase.</i>	Astringente.
125	27	Alcoholatura	Alcoholaturo
134	13	Alcoholado	Alcoholato
135	20	Alcoholado	Alcoholato
160	25	Alcoholado	Alcoholato
178	1	diafenix	diafenicon
180	24	Alcohol	Alcoholato
200	23	Sulfato	Sulfuro
210	11	diaforético	diaforética
212	16	LACTUCARO	LACTUCARIO
212	21	Id.	Id.
213	2	CEREZO	REAL
237	17	MAGNESIA	MAGNESIO
237	23	ÓXIDO	OXIDOS
244	11	PIPERINA	PIPERINO
274	21	CARBON	CARBONO.
290	12	<i>Añádase.</i>	la yerbabuena,
305	10	del hospital	de los hospitales
312	27	OTRA	<i>Suprimase</i>
329	7	Hidrosulfato	ó hidrosulfato
354	13	moscada	nuez moscada
377	10	anterior.	siguiente.
397	21	PRINGI	PRINGLE
467	3	F. DE M.	H. DE M.

